

Госпитал хирургия фанидан амалий кўникма

БЛЕКМОР ЗОНДИНИ ЎРНАТИШ ТЕХНИКАСИ

Мақсад: Қизил ўнгач ва меъдани кардиал қисмидан қон кетишни тўхтатиш

Кўрсатма: Қизилўнгачнинг варикоз кенгайган веналаридан ёки Меллори-Вейс синдромида профуз қон кетиши

Анжомлар: шприц, вазелин, Жане шприци, Блекмор зонди, промедол, пипольфен.

Бажариладиган босқичлар:

№	Босқичлар	Бажар-мади	Тўлиқ тўғри бажарди
1	Баллончаларни бутунлигини тешириб уларнинг ичига кетадиган сув ёки хаво хажмини шприц ёрдамида аниқланади		10
2	Зондга вазелин ёки глицерин сурилади		5
3	Халкум томоқ йўли 0.5% дикаин эритмаси ёки лидокаин билан инсуфляция қилинади		5
4	Зонд бурун орқали қизилўнгачга, сўнг меъдага ўтказилади		15
5	Зонднинг ошқозон баллонига 100 мл шприц орқали хаво юборилиб сўнгра зонд юқорига тортилади		10
6	Зонднинг қизилўнгач қисмига Жане шприци ёрдамида 70 мл гача хаво юборилади (хар қайси бемор учун индивидуал)		10
7	Баллонларнинг шиширилган даражаси хаво ўтказгич каналдаги резинали баллончалар орқали назорат қилинади		10
8	Меъда тоза сувгача ювилади		10
9	Меъдадан ажраёлатган суюқликни таркибига қараб тампонада эффективлик даражаси аниқланадигини		10
10	Беморга вақти-вақти билан промедол, пипольфен қилинади		5
11	Зонд узоғи билан 24-72 соат гача қўйилади		10
	Жами		100

