

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ АГРАР УНИВЕРСИТЕТИ

МАНЗАРАЛИ БОҒДОРЧИЛИК ВА ЭКОЛОГИЯ КАФЕДРАСИ

**БАКАЛАВРИАТ 5410800 – ЎРМОНЧИЛИК ВА АҲОЛИ ЯШАШ
ЖОЙЛАРИНИ КЎКАЛАМЗОРЛАШТИРИШ ТАЪЛИМ
ЙЎНАЛИШИ**

**4-64- ГУРУҲ ТАЛАБАСИ
ДИЛОВАРОВ ДИЛЁР АБРОР ЎҒЛИНИНГ**

БИТИРУВ МАЛАКАВИЙ ИШИ

**Мавзу: “Зухра она плюс” МЧЖ шароитида қарағай кўчатларига
“НИВАКИ” услубида шакл бериш ва парваришlash**

Илмий раҳбар:

Манзарали боғдорчилик кафедраси
муздри, доцент

Э.Т.Бердиев

«Иш кўриб чиқилди ва ҳимояга қўйилди»

Манзарали боғдорчилик ва
экология кафедраси муздри,
доцент Э.Т.Бердиев

Ўрмон хўжалиги ва манзарали
боғдорчилик факультети декани,
доцент С.Жўраев

2018 йил «__» _____.

2018 йил «__» _____.

Тошкент – 2018 й.

МУНДАРИЖА

	КИРИШ	3
I БОБ	АДАБИЁТЛАР ШАРХИ	6
II БОБ	ПАРКЕНТ ТУМАНИ ХУДУДИНИНГ ТАБИИЙ ИҚЛИМ ШАРОИТЛАРИ	12
2.1	Релъефи ва гидрологияси	12
2.2	Иқлими	13
2.3	Тупроқ шароити	17
2.4	Ўсимлик дунёси	18
III БОБ	ҚАРАҒАЙ КЎЧАТЛАРИГА „НИВАКИ“ УСЛУБИДА ШАКЛ БЕРИШ	20
3.1	Қарағай турлари биологияси ва экологияси	21
3.2	Қарағай кўчатларини етиштириш агротехникаси	32
3.3	Қарағай кўчатларига шакл бериш усуллари ва муддатлари	38
3.4	Шакл берилган кўчатларни парваришlash усуллари	41
3.5	Шакл берилган кўчатларни доимий жойига кўчириб ўтказиш ва парваришlash	44
IV БОБ	ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ-	64
	ХУЛОСА	69
	ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР	71

Кириш

Ҳозирги кунда қурилиш ишларида ва шаҳарсозликдаги асосий муаммолардан бири - кўкаламзорлаштириш ишларини илмий асосда ташкил этишдир. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 7 сентябрдаги 186-сонли “Япон сафораси ва Сохта каштан дарахти кўчатларини экишни кўпайтириш чоралари тўғрисида”ги Қарори.

Шунингдек қарағай кўчатларини йетиштириш, кўкаламзорлаштириш ва меъёрий ландшафт қурилмалари тизимини такомиллаштириш чора тадбирилари тўғрисида” ги қарори имзоланди. Шунинг билан бирга Ландшафт дизайни ва аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш соҳаларига ҳам тубдан эътибор берилиб, ҳозирги пайтда ушбу соҳаларнинг янгича усуллари кенг қўламда фойдаланилмоқда.

Аҳоли турар жойлари - шаҳарлар, туманлар, қишлоқ ва посёлкаларни кўкаламзорлаштириш - бу жойларни ободонлаштиришнинг асосий воситаларидан бири ҳисобланади.

Кўкаламзорлаштириш кўлами – аҳоли яшаш маданиятидан далолат беради. Демографик тадқиқотларнинг кўрсатишича, кўкаламзорлашган ҳудудларга аҳоли келиб муқим жойлашади ҳамда бу жойлардан кўчиб кетиши камдан-кам кузатилади.

Ўзбекистон кам ўрмонли мамлакат, шу сабабдан яшил ўсимликлар бу ердаги табиат кўринишини белгилайди. Мамлакатимизда аҳоли яшаш жойлари, йўллар, ирригация иншоотлари, сув омборларини кўкаламзорлаштириш ишлари кенг қўламда амалга олиб борилади. Иҳота ва тоғ мелиоратив ўрмончилик улкан аҳамиятга эга, чунки сув, ҳаво ва тупроқни муҳофазалашда ўрмоннинг ўрни беқиёсдир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти ва ҳукумат қарорларида аҳоли яшаш ҳудудларини ободонлаштиришга алоҳида эътибор қаратилади. Ҳозирда кўкаламзорлаштириш ишларини олиб боришда бир қанча илмий ташкилотлар, ниҳол ўстириладиган кўчатхоналар фаолият кўрсатмоқда.

Кўкаламзорлаштиришда қўлланиладиган манзарали дарахтлар ва буталар турларини кенгайтириш, ўлкамиз шароитларига мослаша оладиган нав ва шакллари излаб топиш, илмий даражада асосланган технология бўйича парваришлашни тадбиқ этиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан саналади.

Ўзбекистонда мавжуд кўкаламзорлаштириш материаллари ассортименти чекланган бўлиб, уни кўпайтириш ва яхшилаш муҳимдир.

Кўчатхоналарда нобоп, ҳар қаердан олиб келинган ўсимликларни экиш ва кўпайтириш ярамайди. Шаҳарларда экишга мос бўлган, чидамли ва кўп йиллик, қимматли манзарали дарахтлардан жўка, каштан, эман, чинорлар, явор заранги, ўткир баргли заранг, лола дарахти, каталпа, рябина, грап, нинабарглилар турлари шу жумладан қарағай турларини экишга ва шакл бериб парваришлашга алоҳида эътибор бериш лозим.

Кўкаламзорлаштириш соҳаси олдидаги вазифаларни ечишда, аввало, ўсимлик турларини кўпайтиришда кўчатхоналарда етиштириладиган маҳсулотлар (кўчатлар, ўсимликлар) сифатини яхшилашда ҳозирда мавжуд бўлган ўсимликларнинг бой дендрологик фондидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.

Замонавий шаҳар ёки бошқа аҳоли яшаш жойлари-бу турли бинолар, кўп сонли муҳандислик иншоотлари, йўллар, сув хавзалари, майдонлар, очик жойлар ва яшил экинзорларнинг мураккаб комплекси. Шаҳарсозлик меъёрларига кўра, аҳоли яшаш жойлари ҳудудларининг 50% дан кам бўлмаган қисми кўкаламзорлаштириш объектларига ажратилиши керак

Шаҳарсозликдаги катта тажриба шуни кўрсатадики, асосий вазифалардан бири-табiiй ва сунъiiй яратилган муҳит ўртасида маълум мувозанат ва гармоник равишда уйғунлашувига эришиш, барча кўкаламзорлаштириш объектларининг ўзаро боғлиқлиги ва бир яхлит тизимга бирлаштирилиши саналади.

Боғ ҳиёбонларини яратиш санъатининг муҳим жиҳати- уларни ташкил этишда яшил дарахтларнинг табиий ўсган ҳудудларини ҳамда бадиий ижод намуналарини бир тизимга бирлаштириб, уйғунлаштиришдан иборат.

Яшил қурилиш-узоқ вақтни талаб этадиган, яратиш технологияси бўйича мураккаб ижодий жараён бўлиб, бир қанча ишлаб чиқариш масалаларини ечиш ва тадбиқ этиш билан боғлиқдир. Яшил қурилиш амалиёти: боғ ва ҳиёбонларни яратиш; у ёки бу аҳли яшаш жойларини ободонлаштириш; ҳар хил тупроқ-иқлим шароитига мос бўлган ўсимликларни танлаш; архитектура-қурилиш иншоатлари, сув хавзалари, йўллар, майдончалар, скульптураларга мос равишда ўсимликларни жойлаштириш ва гуруҳлаш; ўсимликларни экиб парвариш қилиш ишларини ўз ичига олади.

I БОБ. Адабиётлар шархи

Дарахт–буталарнинг халқ хўжалигидаги аҳамияти жуда ҳам юқори ва турли тумандир. Дарахт турларини қимматли хусусиятларини тўғри баҳолаш учун ушбу турларининг барча биологик, экологик ва физиологик хусусиятларини билиш зарур. Ҳозирги пайтда мамлакатимиз кўкаламзорлаштириш соҳаси олдида катта муаммолар ўз ечимини кутиб турибди, игнабаргли дарахтлар майдонини кенгайтириш, мамлакатимиз дендрофлорасини янги турлар билан бойитиш, Орол денгизи қуриган тубининг атроф-муҳитга зарарли таъсирини камайтириш ва ҳоказолардир.

Бу муаммоларни фақат чуқур дендрологик билимларга эга, юқори малакадаги мутахассислар ижобий ҳал этишлари мумкин. Шу ўтган даврда биология ва ўрмончилик фанлари кўплаб янги ва назарий маълумотлар билан бойиди. Дарахт турларини манзарали, экологик ва биологик хусусиятларига тавсиф берган ҳолда, турли иқлим–тупроқ шароитлари учун лозим бўлган турлар тавсия этилади.

Замонавий ва классик адабиётларда Pinaceae оиласи ва унинг турлари келиб чиқиши, пайдо бўлиши ҳақида аниқ маълумотлар ёзилган.³⁴

Қарағай турларини табиатда тарқалиши ва кўкаламзорлаштиришдаги аҳамияти тўғрисида кўпгина олимлар томонидан ижобий ишлар амалга оширилган ва ўз асарларида кенг ёритилган

А.Қ.Қайимов .[23] Қарағай кўчатларини кўкаламзорлаштиришдаги аҳамияти юқори даражада еканлигини такидлаган..

Есипова Т.В. .[16] (1988) маълум қиладики қарағайларнинг қолдиқлари Англия эоцена қатламларида, шунингдек Аляска ва Прибалтикада ҳам топилган.

Pinus туркуми турларини табиатда ва географик тарқалиши кўпгина олимлар ишларида ёритилган, Артаманов В.И., Бўриев, Л.А.Абдурахмонов, А. Т. Жононбекова. Бобринев В.П. [8.]

Досахметов А.О. [12] қарағайларни ривожланишини ёритганда, шуни таъкидлайдики, плеоцен сўнгида игнабаргли, кенг баргли ўрмонлар

тарқатилган бўлиб, улар сибир ўрмонзорлари ва қарағайнинг турли хил турларига эга бўлишган.

1886 йил . Бобринев В.П. [8] қарағай турларини секцияга ажратишни таклиф қилади: *Euricea* (ҳақиқий қарағай) ва *Omorika* (қарағай-оморика). У Секцияларга асосан барглар шаклига, тасмалар сонига ва жойлашувига қараб ажратган, бу ажратиш ҳозиргача сақланмоқда.

Гетко Н.В. Бобринов [9] (1987) қарағайларни игнасининг узунлиги яна 3 та секцияга ажратади: *Omorika*, *Euricea*, *Casicta*.

Яскина Л.В. [31] Дендрология. (1980.) қарағай турларини секцияларга ажратмасдан яхлит ўрганиб чиқади

Яскина Л.В. Вильком классификациясига тўхтадик, чунки Ботаника боғи коллекциясидаги қарағай турларининг кўпчилигида куббалар йўқ. Уруғ туғиш жараёни бошланган дарахтлар да эса улар битта-битта ҳосил бўлиб, катталиги ва бошқа хусусиятлари ўзгарувчан, шунинг учун бу белгиларни тур сифатида тавсия қилиб бўлмайди.

Есипова Т.В. [16] Қарағай кўчатларига дендрологик таъриф берган. Игнабарглилар тартиби ва турлари кўп бўлиши билан очик уруғлилар орасида ажралиб туради. Ҳавони турли микроблардан тозалайдиган фитонцид модда чиқариб туради

Есипова Т.В. [17] Игнабарглилар ихота дарахтзорлари барпо қилиш ва кўкаламзорлаштириш мақсадларида экилади. Чиройли шакллари шаҳарларда паркларга, кўчаларга экилади, унинг турли шакллари кўкаламзорлаштириш ишларида роль ўйнайди.

Яшил майдонларни Тошкент шаҳрида кўпайтириш паркларни кенгайтириш ва реконструкция қилиш ҳисобига, кўчатларни кўкаламзорлаштириш, катта кичик майдонларни кўкаламзорлаштириш ҳисобига бажарилади. А.Қ.Қайимов [23]

Дарахт турларини манзарали, экологик ва биологик хусусиятларига тавсиф берган ҳолда, турли иқлим – тупроқ шароитлари учун лозим бўлган турлар тавсия этилади А.К.Қайимов [25].

Ўрмон–бу ўсимликларнинг асосий тури ҳисобланиб унинг таркибида барча дарахтлар, бута ва ўрмон ости ўсимлик дунёси шунинг ҳайвонот олами ва тупроқ орасидаги ўзаро боғланган биогеоценоздан иборат бўлган ҳаётий жараён тушунилади. Яскина Л.В.[31].

А.К.Қайимов, Э.Т.Бердиев, А.Т.Турдиев, Ҳ.Ф.Ҳамроев, .[24.] Қарағайдошлар (pinaceae) оиласига мансуб бўлган турлар кўкаламзорлаштириш ишларида анчайин самарали ва истиқболли эканлигини таъкидлаб ўтганлар.

Қаландаров М. [26]. Ўрмон биологиясини ўрганиб чиқиб биз бундан кўраяпмизки фақат ташқи тузилишини эмас балки ички тузилишини таркибини ҳам ўзгаришига таъсир кўрсатади.

Т.И.Длавкина. [13]. Ўрмон дарахтлари ёши улғайиши билан унинг таксацияга оид кўрсаткичлари баландлиги, диаметри, кўндаланг кесми юзаси ёғоч захираси ўрмон тўлиқлиги ва маҳсулдорлиги ўзгариб боради. Дарахтларнинг ўзаро бир бирига таъсири натижасида унинг шакил кўриниши ҳам ўзгариб боради. Натижада дарахтзорлар ҳатто ўзининг ижобий ижобий таъсирини кўрсатади. Масалан шаҳар ичидаги дарахтзорлар атироф муҳитга эстетик кўркемлик намоён қилади, ишлаб чиқариш корхоналаридаги захарли газларни ушлаб қолади ва ҳавони тозалайди каналлар ва дарёлар бўйидаги дарахтзорлар тупроқни ювлиб кетишини олдини олади. Сув хавзалари атрофидаги дарахтзорлар унинг ички қисмида катта ҳажимда лойқа – ботқоқликни олдини олади.

II БОБ. Паркент тумани ҳудудининг табиий иқлим шароитлари

2.1. Рельефи ва гидрологияси

Манзарали боғдорчилик ва ўрмон хўжалиги Республика илмий ишлаб чиқариш марказига қарашли тажриба хўжалиги Паркент тумани ҳудудидаги Сўқоқсой ховзасида Чотқол тоғлар этагида жойлашган. У бугунги кунда Чотқол тоғ мелиоратив тажриба ўрмон хўжалиги деб номланади. Хўжалик 1936 йил 19-декабрда ташкил топган хўжаликнинг умумий эр майдони бугунги кунда 1516 га ни ташкил этади. Хўжаликнинг эр майдони 57 та кварталга ажиратилган. Ушбу хўжалик ҳудудида 60 дан ортиқ ноёб ва манзарали ўсимлик турлари ўсиб ривожланади. Шулардан зарафшон арчазорлари хўжалик ҳудудида 2200 м дан бошлаб табиий ҳолда ўсиб ривожланган. Хўжалик ҳудуди бўйича ўсимликлар қуйидагича тартибда тарқалган (Собир Одилхонов маълумотлари асосида): хўжаликни янги спорт комплекслари билан чегарадаги пастки участкасида кўчатхона ва 2 га эр майдони участкаларга ажратилган. Бу эрда ҳар хил турдаги япроқ ва нина баригли манзарали дарахт ва буталар шунингдек мевали кўчатлар ҳам этиштирилади. Шундан сўнг чизмалар ҳосил қилиб терак туркуми, кайин оқ ва шарқ чинори, қирим, элдор, оддий ва сибир қарағайлари, тайншон эли, кумушсимон баргли эл, грек ёнғоғи, 1.5 га эрда олмазор, 1.0 га эрда дарахтзорлар барпо қилинган. Навбатдаги чизма полосада эманзорлар, каштан, жўка, гинко-билоба, сўнг аралаш дарахтзорлар, оқ акас, айлант, ўзбекистон қайрағочи, майда баригли жийда участканинг қарама – қарши томонида – қарағайзорлар барпо қилинган. Ушбу хўжаликда тошкент шаҳри ва вилояти ўқув масканлари, илмий тадқиқот олийгоҳи ходимлари томонидан кўп қамровли илмий тадқиқотлар олиб борилади. Хусусан булар, тоғ ҳудудларида тупроқ қатламининг пайдо бўлиши, ювилиши, намлиги, музлаш жараёни, сел жараёнларининг вужудга келиши, эр ости сувларини ўзгариш қонуниятларини ўрганиш, ўрмон дарахтзорлари тўлиқлиги махсулдорлигини аниқлаш, тоғ ҳудудларида мос келадиган чидамли

турларни танлаш ва бошқа бир неча турдаги изланишлар олиб борилади. Ушбу илмий тадқиқот базасидан ўрганилган маънбалар асосида республикамизнинг бошқа тоғ ва тоғолди ҳудудлари амалий ишлар ўзлаштирилади, жорий қилинади. Илмий тадқиқот базасида кесиш ишларига рухсат берилмайди. Фақат касаллик ва ўсимликларни ҳар хил зараркунандалардан ҳимоялаш мақсадида санитар – тозалаш тозалаш ишлари ўтказилади. Ушбу тадқиқот марказида республика манзарали боғдорчилик ва ўрмон хўжалиги илмий – ҳодимлари йил мобайнида узлуксиз изланишлар олиб борадилар.

2.2 Иқлими

Бирор бир жойга хос об-ҳаво шароитларининг мажмуи ва тадрижий ўзгаришлари иқлим дейилади. Эр юзасида ва атмосферада бетўхтов ўтатиغان табиий жараёнлар иқлимни ҳосил қилади. Иқлимни ҳосил қилувчи омиллар қаторига: қуюш радиатсияси, иссиқлик ва бошқа ҳар хил энергия манбаларининг ўзгаришлари, сувни парга ва аксинча, ҳаво намлиги шу каби бошқа жараёнлар киради. Географик жойлашиши, эр сатхининг тузилиши, тоғ жинислари хусусиятларининг ўзгаришига олиб келади ва шу жой иқлимининг хусусиятларининг жойдан – жойга фарқ қилиши кўрсатилган мезонларни ўзгаришига олиб келади ва шу жой иқлимининг ўзига ҳослигини белгилайди. Ҳар бир жой иқлимининг хусусиятлари узоқ муддат кузатувлар натижасида аниқланади. Иқлим шунослигда иқлим – қуёш радиатсияси, атмосфера босими, ҳарорат намлиги ёғин миқдори шамол ва бошқа меторологик ходисалар билан изоҳланади.



2 -расм. Қора ва оддий қарағайнинг Сўқоқ Мэтостанцияси хуудидида ўсиб ривожланиши


Денгиз сатхидан 1352 м баландликда жойлашган Сўқоқ меторологик стансияси маълумотлари бўйича юқорида қайд этилган йиллик ва кўп йиллик ҳаво харороати, намлик, ёғингарчилик миқдори ва шамол йўналишининг ҳаракатигиа этибор қаратдик.

Ҳаво харорати ўртача суткалик энг балад кўрсаткичи июл ойида намоён бўлади ва у 27°C ташкил этади. Август ойидан у пасая бошлайди октябр ойида бу жараён кескинлашади. Ҳар бир ойда кузатиладиган ўртача ойлик

ҳаво ҳарорати йилдан йилга ўзгариши мумкин. Айниқса қиш фаслидаги ойларда ўзгарувчан бўлади. Лекин ўртача кўп йиллик ҳарорат жуда кам миқдорда ўзгаради.

“Сўқоқ” метеостансияси бўйича ҳаво ҳароратининг ўртача “мах” ва “мин” кўрсаткичлари.

2.1-график



Ҳаво намлигининг кўп йиллик ўртача миқдори 58% ни ташкил этади. Қиш фаслида ҳаво намлиги 68-70%га этади, ёз фаслида эса 38-41% атрофида бўлади. Базан қурғоқчилик йиллари ёз фаслида ҳаво намлиги 8% гача камайиши мумкин. Иссиқ кунларда ҳаводаги намликни пасайиши тупроқдаги намликнинг буғланишини тезлатади ҳамда нафас олишни энгиллаштиради. Ёғингарчилик қаттиқ (қор), ёмғирли ва аралаш ҳолатда содир бўлади. Ушбу ҳудудда ўртача кўп йиллик ёғин миқдори 536 мм ни ташкил этади. Тоғ минтақасига кўтарилган сари Сўқоқсой ҳудудида кўрсаткич 605-615 мм гача этади. Ёғ кўп ёғингарчилик миқдори март ойига тўғри келади. Ноябрьнинг иккинчи яримидан бошлаб мартнинг иккинчи яримигача эр юзасини қор қоплаши мумкин. Метеорологик кузатишлар даврида ёғ биринчи қор тушиши 13 – октябрда, охири 27 – апрелга қайд этилган.

Шамол ҳаракати туман ҳудудида нисбатан кичик (1-2 м/с) тезликлар билан эсиб турадиган ҳодиса. 50% дан ортиқ шамолларнинг тезлиги 0-1 м/с атрофида бўлади. 5 м/с тезликдаги шамоллар эса атиги 0.01% ни ташкил этади.

Шамоллар йўналишида шарқий, шимолий-шарқий оқимлар устунлиги сезилиб туради. Ушбу кўрсаткич, айниқса, қиш ва кузда намоён бўлади. Баҳор ва ёз фасилларида ғарбий ва шимолий ғарбий шамоллар ҳам такрорланиб туради. Бир сутка мобайнида шамол йўналиши асосан тоғ-водий сиркуляяси таъсирида бўлади. Тунги пайтларда асосан, баланд тоғ шамоллари кундизи эса водий шамоллари устунлик қилади. К.А.Тимирязев ботаник-физиолог сифатида дарахт ўсимликларининг озикланиш жараёни, хлорофилл функциялари ва яшил ўсимликларда органик моддалар ҳосил бўлиш жараёни механизмини очиқ берди. В.В.Докучаев тупроқшунос олим сифатида географик табиий комплекслар ва ҳудудлар тўғрисида таълимот яратди. Ушбу таълимот дарахт - бута ўсимликларнинг тупроқ ҳосил бўлиш жараёнидаги ролини чуқур ўрганишга имкон яратди. В.Р.Вильямс, В.В.Докучаев ишларини давомчиси сифатида

тупроқ ҳосил бўлиш жараёнини узлуксизлиги, тупроқ унумдорлигини тўхтовсиз ошиб боришида ўрмон, дарахт - бута ўсимликларнинг роли катта эканлиги ҳақида таълимот яратди. У яшил ўсимликлар тупроқ ҳосил бўлиш жараёнини ҳаракатлантирувчи кучи эканлигини исботлаб берди.

Бу тупроқ кучсиз турланган сулфад хлоридга нисбатан юқорироқ ва турлаш миқдори бу тупроқ учун характерли эмас. Унда миқдори 2% гача ва қатлами 0-10 см дан иборат, гаризонтда гумус -1.12%; фосфир 0.21% ва азот миқдори 0.15%; ва 25-35 гаризонтда 0.99; 0.20; 0.14% дан иборат шунингдек 80-100 гаризонтда озуқабоп моддалар камаяди; 0.36%; р. 0.12% ва Н -0.09%. лекин тажриба хўжалиги шароитидаги тупроқ ўсимликларнинг ўсиб ривожланишига анча шароит яхшироқ.

2.3.Жойининг тупроқ шароити

Паркент туманининг эр сатҳи бўйича тузилиши геоморфологик жиҳатдан ғарбдан шарққа қараб учта, минтақавий бўлиниши билан бири-биридан ажралиб туради. Булар: тоғолди текислиги, паст тоғлар ва юксак тоғ минтақаларидир. Тоғолди минтақаси денгиз сатҳига нисбатан 700-800 метр баландликдан 1200-1300 метргача бўлган сатҳларни ўз ичига олади. Бу эрларда ўрта ва пастки тўртламчи давр жинслари кўпроқ учрайди. Неоген, палеоген, бўр ва ҳатто палеозой жинсларидан иборат бўлган очилма сатҳлар анчагина.

Шунинг учун ушбу ҳудудда денудатсион, аккумулятив-денудатсион, аккумулятив-ерозион сатҳлар мавжуд. Ҳудудда кўчки, нураш, ювилиш ва сел босиш жараёнлари бўлиб туради. Сўқоқ, Заркент, Чанги ва Ҳисарак қишлоқлари ҳудди шундай хавфли минтақаларда жойлашган. Ҳозирги замон тоғ жинслари Паркентсой ўзанларида, уларнинг 1-ва 2-террасаларида, тоғ ён қияликлари ва сув айрилиш қисмларида кўпроқ учрайди.

Паркент тумани ҳудудий табиий геологик ва технологик жараёнлар жуда кўп учраб туриши билан ажралиб туради. Сув манбалари ҳам кўпдан кўп сойликларни ташкил этади. Сўқоқсой сув йиғилиши ҳавзаси Заркентсой сув ҳавзасига бориб тақалади. Сўқоқсой дарёсининг бошланиш қисми қояли тоғ жинисларидан ташкил топган. Сўқоқ қишлоғидан бошлаб эса икки ён қирғоқлари ўрта ва юқори тўртламчи давр лёсс жинсларидан ташкил топиб боради. Сўқоқсой дарёси нисбатан серсув.

Сўқоқсой ва бошқа сойларининг икки ёнидаги биринчи ва иккинчи ва учинчи террасаларни ташкил этувчи аллювиал ётқизиқлари тоғ жинисларининг сиртида жойлашган. Туроқ қалинлиги уларни ташкил қилувчи аллювиал лёссимон жинисларга хос. Бу жинислар устидаги тупроқ табиий ҳолатда зич ўсимликларга бой бўлиб – Оқ тусли қумли бўз тупроқларни ташкил этади, тупроқ жинисларининг қалинлигига қараб 5-20 см атрофида ўзгаради. Оч кулранг, тўқ қўнғир тусли тоғ – каштан тупроқлари денгиз сатхидан 1100 – 1800 м баландликларида жойлашган. Тупроқ қалинлиги 25 – 75 см гача боради. Бу эрларда ёғининг миқдори анча баланд ўртача кўп йиллик миқдори бир йилда 700 – 800 мм гача боради. Қора, қора – қўнғир тусли тупроқлар туман ҳудудида денгиз сатхидан 1800 – 2000 м баландликларда аллювиал – делювиал лёссимон жинисларнинг устида, кўп йиллик ўсимликлар остида вжудга келади. Бу тупроқ таркиби донадор қалинлиги 15 – 50 см атрофида бўлади. Тупроқ остидаги она – жинисларнинг қалинлиги 0.5 – 1.0 метрни ташкил этади. Бу ҳудудда ёз ойларида ҳам аҳён – аҳёнда ёҳин ёғиши кузатилади ва ўсимликлар учун қулай шаройит яратди.

2.4 Ўсимлик дунёси

Манзарвли боғдорчилик ва ўрмон хўжалиги Республика илмий ишлаб чиқариш марказига қарашли тажриба хўжалиги паркент тумани ҳудудидаги тупроқ шароити чиқинди миқдорига бой бўлганлиги учун ўсимликларнинг

Ўсиб ривожланишига анча яхши таъсир кўрсатганлиги сабабли, ушбу минтақа ўсимлик дунёси тули-туман.

Ўсимлик дунёси анча мўл. Сарик ва қизил дўлана, олма туркуми, нок, оқ акас, гледичия, қирим қарағайи, тяншанг қарағайи, грек ёнғоғи, зверабой, андўз, тоғ чойи ва пиёзи ва бошқалар. Паркент туманининг ўсимлик дунёси тоғли минтақада бўлганлиги сабабли ўзининг яшиллиги ва дориворлик бундан ташқари аҳолининг ехтиёжларини кодиришлилик даражаси билан ўхам ажралиб туради. Минтақанинг денгиз сатхидан ўртача 700 м дан 1300 м баландликда жойлашганли сабабли турли интрадукция қилиниб ўтказилган дарахт кўчатларининг ўсиб ривожланишига қулай шароит хисобланади.

Ўсимлик дунёсининг меъёрида ўсиб ривожланишига таъсир етувчи омилларнинг яна бири ушбу худудда ёз ойларининг ўрталарида ҳам ёғингарчиликнинг билиб туришидир. Худудда мевали дарахтлар аҳолининг даромад маанбайи хисобланади. Булардан: олма, гилос, узум, олхўри, анжир, олча, дўлана, беҳи, нок, ўрик, шафтоли ва кўпгина мевали дарахтлар шулар жумласидан. Бундан ташқари манзарали игна ва япроқ баргли дарахтлар ҳам кўргина тарқалган. Уларнинг асосий игна барглилари тоғли минтақаларда ёғингарчилик миқдори узоқ вақт сақланадиган жойларда худудларда ўсади. Шу жумладан „ZUXRA—ONA PLYUS” XUSUSIY KORXONASI нинг ер майдонида ҳам деярли барча турдаги манзаравийлик хусусиятига эга бўлган игна ваяпроқ баргли ўсимликларни ўстириб парвариш қилинаётганлиги алохида ахамит касп етади.

III БОБ.КЎЧАТЛАРИГИА “НИВАКИ”УСЛУБИДА ШАКЛ БЕРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

3.1 Қарағай турлари биологияси ва экологияси.

Қарағай туркуми (pinus) вакиллари қарағайдошлар оиласига (pinaceae) мансуб бўлиб, унга мингдан ортиқ турлар киради. Уларнинг 12 та тури МДХ давлатлари ҳудудида тарқалган. Қарағайларнинг 5 та тури пицунда, милова, моголь ва Европа қарағайлари „Қизил китоб”га киритилган камёб турлар ҳисобланади.

Қарағайлар тик ўсувчи доим яшил дарахтлар бўлиб, табиий шароитларда бўйлари 20-50 м, хаттоки 75 м баландликкача кўтарилади, танасининг диаметри 2-4 м келади. Қарағай дарахти ўрмонда тик ўсувчи танаси билан ажралиб туради. Қарағай дарахтлари ўрмон шароитларида қалин ўсади ва яшаш учун кураш –рақобат натижасида улар тик қоматли дарахтлар кўринишида етиладилар, шох-шаббалари фақат дарахт танасининг устки қисмида бўлади. Нинабарглариининг узунлиги 2-30 см, баъзи турларида 45 см гача етади. Қарағай нинабарглари новдаларида 3-6 йил сақланиб туради, сўнгра тўкилиб янги нинабарглари билан доимий равишда алмашилиб туради. Шу сабабли ҳам қарағай дарахти йил мобайнида доимий яшил ҳолатда сақланади. Оталик қуббалари шу йил чиққан новдалари асосида зич тўпланган бўлиб, оналик қуббалари эса шу йилги новдалари учидан ёки ёнларида яқка ёки гуруҳ бўлиб жойлашади. Қубба устидаги тангачалари ромбсимон, ялтироқ, қўнғир–яшил рангда бўлади. Қуббалари иккинчи ёки учинчи йили пишиб етилади.баъзи қарқғвй уруғларини 1600 дона уруғи 1 кг чиқса,Корея қарағайининг 200 дона уруғи, Сибир қарағайининг 400 дона уруғи, ер бағирлаб ўсувчи қарағайнинг 10-15 минг дона уруғи 1 кг га тўғри келади.

Қуббалариининг катталиги 2,5-13 см узунликда, эни эса 2,5 см келади.Марказий Осиёнинг қуруқ иссиқ иқлимида энг мувоффақиятли интродукция қилинганқарағай тури бу-қирим ёки паллас


қарағайидир. Қарағай турлари асосан шимолий ярим шарнинг мўтадил иқлим зонасида кенг тарқалган, улар асосан намсевар совуққа чидамли мўтадил иқлимни хуш кўрувчи ва иссиқни унча ёқтирмайдиган дарахт турлари ҳисобланадилар. Қарағай турларининг энг жанубий минтақаларида ўсиўга мослашган турлари-бу қирим ва элдор қарағайлари ҳисобланади. Нинбаргли дарахт турларини, шу жумладан қарағай турларини Ўзбекистоннинг маҳаллий шароитларига мослаштириш ва интродукция қилиш ишлари XIX аср охирларидан бошланган. Қирим қарағайи баъзан паллас қарағайи деб ҳам номланади. Дарахтларнинг баландлиги 15 метрдан 40 метргача кўтарилади танасининг эни 50-60 см. Бу дарахт 200-300 йил, қулай шароитларда ҳаттоки 500 йилдан ортиқ ҳам яшайди. танаси тик келишган бўлиб, яхши шохлайди. Қирим қарағайининг ватани Қирим ярим ороли бўлиб, у ердан ташқари бу қарағай тури Ғарбий Кавказ ор, тида, Шимолий Ғарбий Анталияда, Крит ва Кипр оролларида, Болқон ярим оролининг шарқий қисмида ҳамда Қора дэнгизнинг шарқий ва Эгей денгизи сохилларида табиий ҳолда ўсади.

Унинг юқори бонитетли қалин ўрмонлари денгиз сатҳидан 700-800 мт баландликда лўплаб қайд этилган. Марказий Осиёда, шу жумладан– Ўзбекистонда ушбу қарағай тури XIX-аср охирларида маданийлаштирилди. Бу дарахтлар дастлаб Тошкент ва Самарқандда кўплаб экилган, шу сабабли бу дарахт турининг ушбу шаҳарларда 100 ёшга кирган нусхалари ҳозирда ҳам яхши ўсиб турибди.

Қирим қарағайи Чотқол тоғ тизмаларининг ғарбий этакларида, Сўқоқсой ҳавзасида, чирчиқ ўрмон хўжалигида, Оқтошда Самарқанд вилоятининг Омон-қўтон ўрмон бўлимида 1889-йилдан буён экилиб келинган нусхалари ҳозиргача яхши сақланиб турибди.

Оддий қарағай (*Pinus silvestris* L.) бўйи 30-40 м, диаметри 1 м бўлган дарахт. Қулай шароитларда 600 йилгача яшайди. Танасининг пўстлоғи қалин ва вертикал ёриқли бўлиб остки томони қўнғир, юз томони тўқ сариқ ёки қизғиш рангда. Танасидан ва шохларидан юпқа пўстлоқ ажралиб

туради. Дарахт доира шаклида сийрак шох-шабба ҳосил қилади. Қарағайзорларда пастки шохлари қуриб, тўкилиб кетади. Вояга етган қарағайнинг шох-шаббаси тухумсимон бўлади.



12-расм. Оддий қарағай

Новдалари туксиз, ғишт
ёки сарғиш рангда.

Куртаклари 6-12 мм узунликда, чўзинчоқ тухумсимон, қизғиш, ғишт рангда бўлади. Қишда смола билан қопланади. Қарағай баҳорда ўса бошлаб, икки хил новда чиқаради: улардан бири узун бўлиб, кўнғир ранг тангачалар билан қопланган, иккинчиси танга бўлиб, учидан бир жуфт нинабарг чиқаради, барглари 3-7 см, қаттиқ, чети тишли кул рангда, улар дарахтда 3-6 йил сақланади. Ўсишдан тўхташи биланоқ новданинг учки ва ён қисмларида куртаклар ҳосил бўлади. Нинабаргларида смола ва эфир мойлари бор. Улар дарахтнинг совуққа чидамлигини оширади.

Ёзда ўса бошлаган барглар қўлтиғида эркак ва урғочи куббалар ривожланиб, март-апрел ойларида чангланади. Эркак куббалари микроспорачи барглар йиғиндисидан иборат бўлиб, тухумсимон бошоқ щосил қилади ва новдада спирал шолда жойлашади. Кубба ўзак ва унинг остидан юқоригача спирал шаклда жойлашган тангачасимон микроспорачи барглардан иборат. Ҳар қайси микроспорачи баргнинг остида бир жуфт микроспора жойлашади. Микроспорачи ичида жуда кўп микроспора ёки чанг ҳосил бўлади. Қарағай микроспоралари (чанглари) юмалоқ шаклда бўлиб, ён томонида иккита пуфаксимон бўртма чиқади. Бу эса чангнинг ҳавода тарқалишига ёрдам беради. Урғочи куббалар узун ёш новдалар учидан биттадан ёки иккитадан ҳосил бўлади. Улар ҳам эркак куббаларга ўхшаш ўзак ва тангачабарглардан иборат. Куббада ривожланаётган уруғкуртак тухумга ўхшаш танача бўлиб, унда ҳосил бўладиган архегонийда тухум хужайра ривожланади. Уруғкуртак етилган вақтда унга чанг (микроспора) тушиб, уруғ йўли (микрופили) орқали ўзагига (нуцеллусга) ўтади. Бу ердан микроспора ўсиб чанг найчасига айланади ва ўзакнинг ичига киради. Бу найчанинг антиредий хужайралари бўлиниб генератив ва базал хужайралар ҳосил қилади. Генератив хужайра иккита сперма ҳосил қилади. Улардан бири келгуси йил баҳорда тухум хужайра билан қўшилиб уни уруғлантиради. Уруғланган тухум хужайрадан муртак ҳосил бўлади. Ундан уруғ ривожланади. Шундай қилиб чанглангандан кейин иккинчи йил кузда кубба етилади, бу пайтда унинг бўйи 3-6, эни 2-4 см га етади. Етилган куббанинг уруғлари тўкилиб қанотчали бўлгани учун шамолда тарқалади. Уруғи оқ, қўнғир ва қора рангда, тухумсимон, усти ниҳоятда силлиқ бўлади. 1000 донасининг вазни 6 г келади.

Оддий қарағай фақат уруғдан кўпаяди. Уруғи сепилгандан кейин 15-20 кунда униб чиқади (90%). Қарағайнинг бир ёшли ниҳолларида ўқ илдиз ривожланиб, поясига нисбатан 3-4 марта узун бўлади. Унумдор тупроқда ўқ илдизи ерга чуқур кириб, сўнг ён илдиздан чиқаради. Қарағай 10 ёшдан 40 ёшгача тез ўсади. Яхши иқлим ва тупроқ шароитида 80 ёшлик қарағайнинг

бўйи 30 м гача етади. Қуруқ, сернам ёки ботқоқ тупроқларда, қора тупроқли зонада яхши ўсмайди. У тоғли минтақаларда яхши ўсади. Саян тоғларида денгиз сатҳидан 1500 м денгиз сатҳидан баланд бўлган жойларда кўп тарқалган. У Кавказ ва Крим тоғларида ҳам ўсади.

Қарағайзорларда яна қора қарағай, тилоғоч, кедр ва япроқли дарахтлардан эман учрайди. Нинабарглилар асосан сернам зона ўсимлигидир. Улар Евросиёнинг шимолида ва Шимолий Американинг кўп туманларида, айрим турлари тропик мамлакатларда ҳам учрайди. Оддий қарағай совуққа ва иссиққа чидамли дарахт лекин ҳавонинг қуруқлигидан зарарланади. Шох-шаббасининг сийраклиги унинг ёруғсевар ўсимлик эканлигидан дарак беради. Қарағай ботаника боғида ўстирилганда 10 ёшида бўйи 4,5 м га етган, ҳар йили ўртача 55 см дан ўсган.

Оддий қарағай ўрмон зонасида кўп тарқалган бўлиб, МДХнинг ўзидаёқ 150 млн гектар майдонни ишғол қилади. Тупроқ намини сақлаб қолиш мақсадида қарағайзорлар барпо қилинган ва ихота қаторлари яратилган. Унинг ёғочи пишиқ ва техникавий хоссаси жуда юқори бўлганлигидан халқ хўжалигида муҳим аҳамиятга эга. Ундан кемасозликда, вагонсозликда ва мебел ишлаб чиқаришда ҳамда бочка тахтаси ва фанер ишлашда фойдаланилади. Қарағайдан канифол ва скипидар олинади. Унинг пўстлоғида ошловчи ва гумин моддалар бор. Баргида С витамин бор. Қарағай ҳавони турли микроблардан тозалайдиган фитонцид модда чиқариб туради.

Оддий қарағай ҳавонинг ифлосланишидан қаттиқ зарарланади. Шунинг учун аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштиришда фойдаланиш тавсия этилмайди. Фақат тоғ қияликларини кўкаламзорлаштириш ва ўрмон мелиорациясида фойдаланиш мумкин. Ўзбекистон тоғ ўрмонларида, Чотқол тоғ-ўрмон мелиоратив тажриба станциясида оддий қарағай асосида яратилган қарағайзорлар ўсиши ва ривожланишига кўра Россияда ўсиб турган қарағай ўрмонларидан қолишмайди, шу сабабли ушбу тажрибани тоғли ҳудудларга татбиқ этиш халқ хўжалигига катта фойда келтиради.



13-расм. Оддий қарағайнинг мевали шохи.

Қрим`ёки Паллас қарағайи (*Pinus Pallasiana* Lamb.) бўйи 35 м, диаметри 50 смгача етадиган йирик дарахт. Танасининг пўстлоғи тўқ кул рангда, шохлариники эса қизғиш рангда. Куртаклари конуссимон, учи ўткир, смола билан қопланган. Барглари тўқ яшил, қаттиқ, ялтироқ, учи ўткир, бўйи 15-16 см бўлиб, оддий қарағайникига нисбатан икки марта узун. Улар новдада 2 тадан тўда бўлиб жойлашади. Қуббаси жуда йирик. Май ойида чангланади. Қубба чангланиб уруғлангандан сўнг учинчи йилнинг баҳорида етилади. Етилган қубба сариқ-қўнғир рангда, бўйи 5-10 см, оддий қарағайникига нисбатан йирик бўлади. Уруғи ҳам йирик, узунлиги 6 мм, қанотчали.

Бу қарағай ҳам уруғдан кўпаяди ва очиқ ерларда яхши ўсади. 500-600 йил яшаши мумкин. Ўқ ва ёнлама илдизлари яхши ривожланади. Бу қарағай совуққа ҳам, иссиққа ҳам чидамли. У соясевар бўлиб, оддий қарағайга нисбатан унумдор тупроқни хохлайди, куруқ оҳакли, қумли ва қумлоқ тупроқли ерларда айниқса яхши ўсади. Ёғочи пишиқ, смолали, ўзаги сариқ ёки қизғиш, атрофи сариқ ранглидир. Қарағай халқ хўжалигида катта аҳамиятга эга. Унинг ёғочидан кемасозликда ва турли бинокорлик ишларида фойдаланилади. Унинг смоласидан скипидар ва канифол олинади. Қарағай ихота дарахтзорлари барпо қилиш ва

Сариқ ёки оғир қарағай (*Pinus ponderosa* Dougl.) бўйи 50-70 м га етадиган дарахт. У қулай шароитларда 500 йилгача яшаши мумкин. Шох-шаббаси пирамида ёки конус шаклида. Пўстлоғи тўқ жигаррангда ёки қора.

Шохлари новвоти-ғишт, новдалари эса қизил-ғишт рангда. Туксиз, ялтирок, куртаклари тангачалар билан қопланган, цилиндрсимон, нинабарглари яшил, новдада 3 тадан тўда-тўда бўлиб, жойлашади. Дағал, уч қиррали, шар қайси қиррасида ёриқчалар қатори бор. Қуббалари сариқ рангда, 10 см, ялтирок. Уруғи йирик, узунлиги 7-10 мм, эни 5-6 мм, қўнғир ранг қанотчали, қанотчасининг узунлиги 2,5-3 см, 1000 дона уруғининг вазни 35-36 г. Уруғидан яхши кўпаяди.



14-расм. Қрим қарағайи.

Сариқ қарағай очик ерларда қумлоқ тупроқларда яхши ўсади. Деярли совуққа чидамли. Ёғочи пишиқ ва хидли, хушманзара дарахт. Бу қарағай Шимолий Американинг ғарбий худудларида тарқалган. У Ўзбекистонга кўкаламзорлаштириш мақсадларида интродукция қилинган. Интродукция натижалари бу қарағайни Ўзбекистоннинг тоғли худудларида экиш мумкинлигини кўрсатмоқда.

Беш нинабарглилар секцияси.

Сибир қарағайи ёки Сибир кедри (*Pinus sibirica* Rupr. Mayr) бўйи 20-40 м, диаметри 1 м бўлган дарахт. Шох-шаббаси кенг юмалоқ ёки кенг пирамида шаклида. Танасининг қобиғи тангачасимон бўлиб, катта ёшида

ёрила бошлайди. Бу қарағай қулай шароитда 400 йил яшаши мумкин. Йўғон новдалари тангачасимон барглар ва сарғиш тук билан қопланган. Куртаги ўткир учли бўлиб қизил-қўнғир тангачалар билан қопланган. Нинабарглари тўқ яшил, қаттиқ, дағал, бўйи 6-13 см бўлиб, пояда 5 тадан тўда-тўда бўлиб зич жойлашади. Барглари 3 қиррали, чети тишчали, дарахтда 3-6 йилгача сақланади. Нинабарглари теварагида юпқа қинчалари биринчи йилиёқ тўкилиб кетади.

Сибир қарағайи оддий қарағайдан кейин, яъни май ойида чангланади. Эркак қуббаси қизғиш-новвоти рангда бўлиб новданинг учида жойлашади ва катта бошоқ ҳосил қилади. Урғочи қуббаси гунафша рангда бўлиб 2-5 тадан бўлиб, бошоқ ҳосил қилади ва новданинг охиридаги куртак ёнида жойлашади. Қубба чанглангандан кейин юмалоқ шаклга киради ва келгуси йилнинг май-июн ойларида уруғланади. Бу пайтда қуббанинг бўйи 5-10 см га, эни 4-8 см га етади ва тухум хужайра овал шаклга кириб, учи тўмтоқлашади. Қуббасида смола кўп бўлади. Шунинг учун уни қуш ва хайвонлар емайди. Зич жойлашган тангачалари қаттиқ тук билан қопланган. Ҳар қайси тангача остида қанотчасиз, сарғиш уруғлари иккитадан бўлиб жойлашади. Кеч кузда етилган қуббалари ерга тўкилади. Тўкилиши биланок ерга урилиб ёрилади ва уруғлари сочилиб кетади. Уруғи оғир, қанотчасиз ёки қанотчали, бўйи 1-1,2 см, эни 6-8 мм, сарғиш бўлади.

Сибир қарағайи уруғидан яхши кўпаяди. Кузда сепилган уруғи баҳорда кўкариб чиқади. Баҳорда сепилдиган уруғлари стратификация қилиниши, яъни нам ва совуқ шароитда маълум муддат сақланиши керак, шундагина кўкариб чиқади. 25-30 ёшида ҳосилга киргани кузатилган, қалин ўрмонларда эса 45-60 ёшидагина ҳосилга киради. Ҳосили шар йили ўзгариб туради. 1 га ердаги қарағайзордан 100-1000 кг гача уруғ олиш мумкин. Сибир қарағайи совуққа чидамли ўсимлик. У денгиз сатҳидан 1000-1500 м баланд бўлган сернам, тоғли ҳудудлар ва тоғ дарёлари қирғоқларидаги қумоқ, қумлоқ, нам сақламайдиган тупроқларда яхши ўсади. Унинг ўқ ва ён илдизлари яхши ривожланади, учки попуқ илдизларида эктотроф ва

эндотроф микоризалар бор. Қарағайнинг уруғи ёки ёнғоғи таркибида 60-70% мой, 12% углеводлар, 16% оксил моддалар ва В витамини бор. Унинг уруғидан кунжара тайёрланади. У хайвонлар учун энг яхши озуқа ҳисобланади.

Қарағайнинг ёғочи нихоятда пишиқ бўлганидан зах жойда ҳам чиримайди. осон ёрилади ва яхши пардозланади. Шунинг учун бинокорлик, дурадгорлик ишларида ва чолғу асбоблари, мебель ясашда кўп ишлатилади. Ёғочидан скипидар ва канфол, бальзам ҳамда микроскопда ишлатиладиган иммерсион мой олинади. Қарағайнинг баргларида эфир мойи, С витамин ҳам олинади.

Сибир қарағайи асосан ўрмон зонасида кўп тарқалган бўлиб, МДХ Европа қисмининг шарқи-шимолидан бошлаб, Сибирнинг ҳамма районларида ўсади, яъни МДХ да 30 млн гектар майдонни эгаллайди. Бу қарағай Сибирда яшаш жойларини, саноат марказларидаги кўча ва паркларни кўкаламзорлаштириш мақсадида ҳам экилади. Ўзбекистонга интродукция қилинган, унинг натижалари шуни кўрсатадики, у бу ерда жуда секин ўсиб, ҳавонинг иссиқ ва қуруқ келишидан зарарланади, ёзнинг иссиқ кунларида қуриб қолиш ҳоллари ҳам юз беради.

Европа қарағайи ёки европа кедри (*Pinus cembra* L) сибир қарағайига жуда ўхшаб кетади. Лекин паст бўйли бўлиши, шох шаббаси кенг тузилганлиги, нинабаргларнинг узун ва ингичкалиги, уруғ ва куббачаларининг майдалиги билан ундан фарқ қилади. Бу қарағай Ғарбий Европада, Альп ва Карпат тоғларида денгиз сатҳидан 1300-2500 м баландликларда ўсади. Уруғпаллалари дағал, яшил, пушти рангда. Июнь ойида ўсишдан тўхтади. Ёш ниҳоллари Тошкент шароитида ҳавонинг иссиқ ва қуруқ келишидан зарар кўрмайди.

Корея қарағайи (*Pinus koraiensis* S.et Z.) сибир қарағайига ўхшаш йирик дарахт бўлиб, бўйи 40 м га ва диаметри 1,5-2 м га етади. Лекин шох-шаббасининг қалинлиги, новдаларининг ингичка, сарғиш тукли бўлиши, куртаклари йириклиги, нинабарглари узун (7-15см), ғадир-будур бўлиши

билан сибир қарағайидан фарқ қилади. Нинабарглари дарахтда 2-3 йил сақланади. Қуббалари йирик, цилиндрсимон, кўнғир рангда бўлиб, шохчасида осилиб туради. Уруғи уч қиррали, калин пўстли бўлиб, бўйи 1-1,5 см, сибир қарағайининг уруғидан йирикроқ. Уруғдан яхши кўпаяди, жуда секин ўсади.

Корея қарағайи совуққа чидамли, ёруққа, иссиққа талабчан ва соясевар дарахт. Узоқ шарқнинг жанубий районларида ўсади. Бу қарағай ўрмонида баъзан япроқли дарахтлар ҳам учрайди. У МДХ да 4,5 миллион гектар майдонни эгаллайди. Ёғочи пушти рангда. У бинокорликда, кемасозликда ва бошқа майда буюмлар яшашда ишлатилади. Ёғочи чет мамлакатларга экспорт қилинади., смоласи таркибида терпентин моддаси бор. Уруғи-ёғоғи озиқ-овқат мақсадаларида ишлатилади. Мағзи таркибида 65% мой бор.

Корея қарағайи МДХ нинг Европа қисмида ҳам экилади. У Санкт Петербург шароитларида ҳам яхши ўсиб ривожланади.. Қиш совуғига чидамли бўлган ҳолда, ҳавонинг иссиқ ва куруқ келишига ва ишқорли тупроққа чидамсиздир.

Стлантик кедри (*Pinus pumila* Rgl.) ер бағирлаб ўсадиган дарахтлардан бири ҳисобланади. Шароит қулай бўлса, бўйи 6 м гача кўтарилади. Нинабарглари калта (4-8), қаттиқ. Улар баҳорда ҳаво рангда бўлади. Қуббалари майда, узунлиги 4 см дан ошмайди, юмалоқ, чўзиқ, тухумсимон шаклда бўлиб, тўда-тўда ҳолда жойлашади. Етилгандан сўнг тўкилиши пайтида тангачалар очилиб, уруғи тўп-тўп бўлиб тўкилади ва ниҳоллари ҳам шу тариқа тўп бўлиб ўсиб чиқади. Уруғи сибир қарағайининг уруғидан 2 марта майда ва қорамтир бўлади. Кедр уруғидан яхши кўпаяди, илдизидан бачкилаш хусусиятига эга. Қиш келгач кедрнинг ер бағирлаб ўсаётган шох-шаббаси қор тагида қолади ва шу ҳолда қишлайди. Новадалари сертук ва туклари серсмола бўлиб, Сибирнинг қаттиқ совуқ иқлимига мослашган. Бу унинг ажойиб экологик хусусиятларидан биридир. Бу ёруғсевар ўсимлик бўлиб ботқоқликларда ҳам ўсаверади. Кедр Узоқ

Шарқнинг шимолий худудларида, Охота денгизи қирғоқларида, Сахалин, Камчаткада ўсади. Забайкальеда ва Курил оролларида ҳамда Япониянинг шимолида учрайди. Ер бағирлаб ўсадиган кедр жойларда қум ҳаракатини, шамол учирадиган қор ҳаракатини тўсиш, шунингдек, турли қияликларни кўкаламзорлаштиришда катта аҳамиятга эга. Унинг уруғидан «ёнғоқ сути» олинади. У иссиқдан ва ҳавонинг қуруқлигидан зарарланади.

Веймутов қарағайи (*Pinus strobus* L.) бўйи 35-50 м, диаметри 1,5 м келадиган кенг ва пирамида шаклидаги шох-шаббали йирик дарахт. Танасининг қобиғи ёрилган, тўқ кул рангда. Новдалари ингичка, қўнғир кул рангда, кам тукли. Куртаги елимли тангачалар билан қопланган. Нинабарглари уч қиррали, 5-10 см узунликда, майин, ингичка, зангори рангда, дарахтда 2-3 йил сақланади. Тангачасимон нинабаргларининг қини биринчи йилдаёқ тўкилиб кетади. Ёмғир, қор ёққанда барглари бир-бири билан жуфтлашиб ингичка бойлам ҳосил қилади. Шунинг учун шох-шаббаси сийраклашади, унда қор ва ёмғир сувлари тўхтамайди. Смола йўллари баргнинг эпидермис тўқимаси олдида жойлашади.

Урғочи қуббалари биттадан ёки 2-3 тадан гуруҳ бўлиб жойлашади. Қуббалари иккинчи йили етилади, бу пайтда паст томони букилади ва кўп вақт яшил рангда сақланади. У 8-15 см гача ўсиб, сўнг ёғочланади ва жигар рангга киради. Етилган қуббалари кузда очилади ва уруғи ерга тўкилади. Уруғи 5-7 мм узунликда бўлиб, қанотчали, икки йилгача униб чиқиш хусусиятини сақлайди. У шамол ёрдамида тарқалади. 1000 дона уруғининг вазни 18-23 г келади. Қарағай уруғдан яхши кўпаяди. Биринчи йили ўқ илдизи яхши ривожланиб, сўнг ён илдизлар чиқаради.

Қарағай унумдор ерда, жумладан, қумоқ ва қора тупроқли ерда яхши ўсади. Илдизи ниҳоятда бақувват. Бу қарағай ўрта минтақа ўсимлигидир. У қаттиқ совуққа, қор қопламига чидамли ва деярли соясевар, қурғоқчиликка чидамсиз. Ёғочи ўзакли, енгил, юмшоқ, тиниқ сарғиш рангда. Унинг ёғочи бинокорликда, гугурт саноатида ишлатилади.

Веймутов қарағайи Шимолий Американинг тоғлик ҳудудларида денгиз сатҳидан 300-1600 м баландликда ўсади. Унинг ареали 40-51° ва 53° ҳамда 96° шимолий кенгликдан ўтади. У асосан, Канаданинг шарқидаги тайгада кўп учрайди. Бу ердаги йиллик ўртача ҳарорат 1°C дан 3°C гача бўлиб, қарағай 120 кун давомида ўсади. Бу қарағайзорларда қорақарағай, қайин ва заранг дарахтлари ҳам учрайди.

Веймутов қарағайи Европага 1700 йилда интродукция қилинган, Россияга эса XVIII асрнинг бошларида келтирилган. МДХ нинг ўрмон-дашт ва дашт зоналарида яхши ўсади. У жумладан, Белоруссия, Украина, Молдавия республикаларида кўп экилади. Қарағайнинг энг катта камчиликларидан бири унинг занг замбуруғи билан касалланишидир. Бу касаллик қорақат ва крижовник буталари орқали тарқалади. Шунинг учун Веймутов қарағайи экиладиган жойларда қорақат ва крижовник экилмаслиги керак. Ўзбекистоннинг тоғли ҳудудлардаги ўрмон хўжалигида катта аҳамиятга эга.

Калабрийск қарағайи (*Pinus laricio* L.) бўйи 40-50 м га етадиган дарахт. Шох-шаббаси цилиндрсимон ёки чўзинчоқ - тухумсимон шаклда тузилган. Новдалари қўнғир кул рангда. Нинабарглари букик, эгиловчан, яшил кул рангда, 8-12 см узунликда. Қуббалари 5-7 см, қўнғир кул рангда. Уруғи 4-6 мм, кул рангда. Бу қарағай ер танламайди. Ботаника боғида 8 ёшида 1-2 м гача ўсган. У хушманзара дарахт. Италияда, Сицилияда ва Корсика ороллариининг жануби-ғарбий туманларида тарқалган бўлиб, оҳакли ерларда ўсади. Калибрийск қарағайи XVIII асрдан бошлаб Европа мамлакатларида, жумладан, Франция, Германияда ва Англияда ўстирилмоқда. Россиянинг Қора денгизи бўйларида экилган. Шундай қилиб бу қарағай турлари Республикамизнинг энг муваффақиятли интродукция қилинган қарағай турлари хисобланиб, уларни кўкаламзорлаштириш ва ўрмон хўжалиги сохаларида кенгроқ имкониятларини яратиш лозим.

3.2.Қарағай кўчатларини етиштириш агротехникаси

Қарағай кўчатларини ундириш ва йэтиштириш енг нозик ,мураккаб иш турларидан бири бу-кўчатлар етиштиришдан иборат.Кўпчилик дарахт кўчатларини етиштиришдан ,қаламчадан ва уруғидан фойдаланиб борилади.Нина баргли дарахт кўчатларини етиштиришда асосан уруғидан кўпайтирилади.

Оддий қарағай дарахтнинг уруғи октябр –ноябр ойларида пишиб етилади.Уруғлари териб тўплангач куруқ ва салқин бинода сақланганда унинг кўкриш қобилияти 4-5 йилгача йўқолмайди.1000 дона уруғ 5-9 грамм келади.1000 грамм куббалари 1.2-1.4% чиқади.Қарағайлар уруғини екиш олдидан алоҳида усулда тайёрлашга хожат йўқ,уруғ кўкламда хатто ивитилмай сепилганда ҳам текис униб чивади.Аммо уруғни екишдан олдин 10-12 кун стрификация қилинса,жуда тез(7-10 кунда) ва бехато униб чиқади.

Қарағай уруғи бошқа нина баргли дарахтлар уруғи сингари фузариум алтернария сингари замбуруғ споралари билан ифлосланган бўлади.



3.2-расм .Қарағай кўчатларини етиштириш

Қарағай уруғи екиш қум ва қумоқ тупроқли ер майдонлари тайёрланади. Оғир тупроқли ер бўлса, ундай ер майдонига қум солишга тафсия етилади. Қарағай уруғи айниқса – оғир тупроқли ерларда кузда екилгандан кўра, кўкламда (март охири апрелнинг бошларида) сепилса яхшироқ кўрсаткичда униб чиқади. Қарағай уруғини екишдан аввал 15 см чуқурликда егат олинади. Сўнг уруғ сеполади. Суғоришга шундай еътибор бериш керакки-суб егат марзасини босиб кетмаслиги керак. Суб босса егат тупроғи қотиб қолади. Қарағай уруғи егатини ҳар бир метрига 2 граммдан 1.2 см чуқурликка екилади. Майдоннинг ҳар квадрат метридан кўпроқ кўчат олиш учун марза сиртига 10-15 см кенгликда уруғ сеполади. Бундан уруғни сарфлаш нормаси 3 марта кўпйтирилади. Уруғ устуни қатқалоқ босиб қолмаслиги ва уруғ усти доим бир хилда нам бўлиб туриши учун, марза устига 3-4 см қалинликда ёғоч қипиғи сомон сочиб кўйилади. Уруғ кўкариб чиққунича август ойигача вақти – вақти билан кузатилиб, марза устини шамол очиб кетса, қайтадан қипиқ сочилиб турилади.

Оддий қарағай уруғи Ўзбекистон шароитида улар бир текис униб чиқса ҳам уларни барчасини сақлаб қолиб бўлмайди. Ёзнинг иссиқ ҳаво ҳароратидан уларнинг кўпчилиги куриб кетади. Шунинг учун ҳам кўчатларни ёшлик вақтида яхши парвариш қилиш зарур бўлади, суғоришдан кейин ерни авайлаб юмшатиб, қатор ораларида баланд бўйли екин ўстириб, кўчатларни сояда тутиб туриш керак.

Эгатлар марзаларида доимо намликни сақлаб бориш зарур. Қарағай ниҳолчалари сал ўсиб ривожланса, уларни камроы су-ориб бориш керак.



3.3 расм .Оддий қарағай уруғ кўчатлари

Кўкарган ниҳолчалар икки йилдан сўнг асосий кўчатзорга эҳтиётлик билан кўчириб ўтказилади ва яхшилаб парвариш ишлари олиб борилади

Игна баргли дарахт кўчатларини уруғ сепиш бўлимида этиштириш.

№	Бажарилган ишлар Тартиби	Ўлчов бирлиги	Иш ҳажми	Трактор ва механизмлар	Агрегатлар ва ишқорлар
	1	2	3	4	5
Уруғ сепиш бўлими					
1	Суғориш ариқларини тайёрлаш	Га	1.0	Т-28х4	КРХ-4
2	Вақтинча суғориш шоҳобчаларини тайёрлаш	Км	0.1	ДТ-75-М	КЗУ-0.3
3	Уруғ сепиш олдидан назорат суви бериш (800 куб м/га)	Га	1.0	ДТ-75-М (насосда)	Қўл кучи ёрдамида
4	Уруғсепиш эгатларини 5-7 см чуқурликда тайёрлаш	М	1.0	МТЗ-80 Т-28х4	Қўл кучи ёрдамида
5	Қўл кучи ёрдамида уруғларни ариқларга сепиш	М	1.0		Қўл кучи ёрдамида

6	Қўл кучи ёрдамида уруғ ўсишини яхшилаш	М	1.0		Қўл кучи ёрдамида
7	Ёғоч қипиқларини олиб келиш ва тушуриш	ТН	5.0	Т-16М	
8	Қипиқлар билан ёпиб чиқиш	КМ	16.7	МТЗ Т-40	
9	Ариқларни суғоришга тайёрлаш	Га	6.0	Т-28х4	КРХ-4
10	Суғориш (10 маротабагача)	Га	10.0		Қўл кучи ёрдамида
11	Қатор ораларида култиватсия бериш	Га	6.0	Т-28х4	КРХ-4
12	Икки маротаба минерал ўғитлар бериш	Га	2.0	Т-28х4	
13	Қаторда уч марта кетмон билан чопиш 1 га да 5000м ²	М ²	15000		Қўл кучи ёрдамида
14	Суғориш ариқларига 4 карра ишлов бериш	Га	4	Т-28х4	КРХ-4
15	Қатор ораларида 4 карра култиватсия ишларини бажариш	Га	4	Т-28х4	КРХ-4
16	7 маротаба суғориш	Га	7		Қўл кучида
17	Тупрокни 3 карра юмшатиш ва бегона ўтлардан тозалаш	М ²	1500	Т-28х4	КРХ-4
18	Кўчатларга 3 карра кимёвий моддалар пуркаш	Га	3	Т-28х4	ОВХ-14
19	Икки йиллик кўчатларини казиб олиш	Га	1.0	ДТ-75	ВПН-2
20	Қазилган кўчатларни эгатлардан олиб очиқиб 100м масофага чиқариб тахлаш	Минг дона	350.0		Қўл кучида
20	Кўчатларни саралаб ўлчашга қараб 50 ёки 100 донадан бойлаш				Қўл кучида
21	Кўчатларни вақтинча кўмиб қўйиш				Қўл кучида

3.3.Қарағай кўчатларига шакл бериш усуллари ва муддатлари

Қарағай кўчатлариги шакл бериш усулларида энг оммалашганлари Баланд ва паст пирамидасимон, Мутлоқ классик услуб, Ниваки услуби ва Боғ бонсайи услублари кенг оммалашган.Оригинал услубда қарағайнинг шаклланиши энг яхши анъанавийлашган мамлакат бу- Япония.Қарағай кўчатларига шакл бэришда кўчатларнинг ёшига ахамият бериш асосий вазийфалардан бири хисобланади.Кўчатларга шакл бериш жараёни уларни экилганидан сўнг 5-6 ёшлигида амалга оширилади.Бу босқичда ҳам шакл тўлиқ намоён бўлмайди.Ушбу жараён бошланғич босқич бўлиб,кичик шохчалар келгусида намоён бўладиган шакл вужудга келиши учун керакли томонга шохлатилади.Қарағай шохлари керакли шаклга эришилган бўлса, унинг ўсишини назорат қилиш керак.Ёш кўчатлар шакллантириш жараёнида қуйидаги минерал ўғитлар билан озиклантирилади.

3.3расм .Шакл бериш жараёни



Барча Боғларда ўз-ўзидан ўсадиган дарахт ёки бута топиш қийин. Улар доимий равишда кесилган ва шаклланган. Дарахтлар у ёки бу услубга эга бўлиб, буталар думалок шаклларда кесилади. Кўпгина мамлакатларда дарахтларни гилам усулида экиш тури бор. Усуллар такомиллашган минтақа бу Япониядир. Лекин уларнинг барчаси нозик тарзда кесилган. Япон боғининг услубида яшил майдонларнинг машҳурлиги йилдан-йилга ошиб бормоқда. Ландшафт дизайни бу турнинг ўзига хос хусусияти - фақат табиий асбоблардан фойдаланиш: ўсимликлар, тошлар, кум, дарахтлар, гуллар, буталар ва бошқалар. Мамлакатимизнинг Тошкент вилояти Паркент туманидаги

„ZUXRA—ONA PLYUS” МЧЖ шароитида ҳам етиштирилаётган қарағай кўчатларига шакл бериш жараёни ҳам шулар жумласидан. Ушбу ҳудудда етиштирилаётган қарағай кўчатларига асосан кеч кузда киши ва ерта

баҳорги мавсумларда шакл бериб келинмоқда Шакл берилаётган Қарағай кўчатлари турли хил мавсумий парваришлар асосида аста секинлик билан кўзланган манзарани акс еттирмоқда. Ушбу шакллар мисолида биз кенг оммалашаётган янги ва зомонавий Ниваки ва Бансай усуллари мисолида кўришимиз мумкин. Ниваки" сўзи иккита маънодан иборат: "дарахт" ва "боғ". Кўпчилик "**бонсай боғи**" деган номни эшитган, аммо бу тўғри эмас. "Бонсай" сўзи "Лаганда устидаги дарахт" маъносини англатади ва ҳар доим ўзларининг илдизлари боғ шароитида ўсади. Аммо бонсай ва нивакидан дарахтни шакллантириш тамойиллари кўп жиҳатдан ўхшашлигини айтишим керак.

Боғ бонсайининг шаклланиши

Биринчидан, санитария амалга ошириш керак: нозик, синган, қуруқ ва касал шохларини олиб ташлаш, шохни сийраклаштириш. қолган майда шохчаларлар бироз қисқартирилади. Танланган ўсимликни диққат билан кўриб чиқинг. Энди сиз унинг "юзини" танлашингиз керак - бу энг чиройли кўринадиган томон, бунда магистралнинг эгри чизиқлари аниқ кўриниши мумкин. Магистрал ва майда шохларининг шаклини кўриб чиқинг ва бунга асосланиб, нивакининг шаклланиш услубини танланг. Агар сиз жойни яратишда қўлингизни синашга қарор қилсангиз, унда вазифани энгишингизга ёрдам берадиган бир неча маслаҳатлар мавжуд:

- Ниваки учун бодомга бардош берадиган соғлом кучли ўсимликни танланг
- Бонсай келажакни боқиш учун тўғри вақт баҳорнинг бошланиши, дарахтлар уйғотмагунча
- ҳар қандай баҳор-ёзги даврни янада юмшоқ, тузатувчи қиёфа учун

Боғбонсай тарзи

Япон боғларида анъанавий равишда ишлатиладиган **Ниваки** саккиз турдаги ва шакллари мавжуд: Ёкоҳама - классик текис формада бир текис танаси бор

- **Сёкан (трубкали трук)** - турли баландликларда бўлиши мумкин бўлган икки танаси билан формага ега. Тегиш ли танасига эга бўлган дарахтлар бир

тож ҳосил қилиши мумкин. Магистралнинг бўлиниши дарҳол ердан бошланади ва "В" ҳарфи шаклига эга.

- **Моёки (чуқур магистрал)** - магистралнинг серпантин шакли бўлган ва айни текисликда жойлашган. Ниваки нинг гўзал шакли
- **Кангаи (дроопинг шакл)** - ўсимликнинг шохи пастга ишора қилади ва унинг тагидан паст
- **Сякан (нозик услуб)** - дарахт эр юзасига бурчак остида ўсади. Ҳовузнинг кирғоғига гўзал суюқлик билан қарайди
- **Кёто формасида** - дарахтнинг ўсиб чиққан ўсимталари ўсиб чиққандек кўринади. Бундай нивакалар криптомерия ёки аробадан ҳосил бўлади
- **Котобуки** - Нивакининг шакли иероглифга "бахтиёрлик" га ўхшайди ва сизнинг боғда васий бўлади
- **Монкабури (дарвоза устидаги дарахт)** - Ниваки боғ ёки уйнинг кириш қисмида осилган бир узун горизонтал шохга эга. Бу муваффақият ва омадга рамзи. Бундай ниваки қарағай учун энг яхшиси тавсиялар
- Агар энг гўзал шохларини танлаш имконига эга бўлади, шунинг учун, аста-секин буни, бир вақтнинг ўзида игна билан ёш филиаллари кўп чиқариб олманг
- илдизларидан келиб, барча куртаклар ниш кесиб қилманг
- Ниваки "учбурчак" тамойили бўйича майда шохчалари ҳар бир кўшимча босқичли олдинги камроқ бўлиши керак
- "учбурчак" тамойили ҳар бир филиали шакллантиришда ишлатилади
- Ниваки майда шохлари ўтиб горизонтал ажратиш керак. Зарур бўлса, шохчалари эгилди ва лента ёки сим орқали тузатилади

3.4.Шакл берилган кўчатларни парваришлаш.

Шакл берилган кўчатлари парваришлаш ишлари анчайин эътиборни талаб қиладиган жараён ҳисобланади. Парваришлаш ишларига асосан екишдан кейинги барча жараёнларни ўз ичига олади. Шакл берилган кўчатларнинг келгусида ҳар томонлама ўсиб

ривожланиши ва ўзининг манзаравийлик хусусиятини сақлаб қолиши ҳам айнан парваришlash билан боғлиқ жараён хисобланади. Парваришlash ишларининг дастлабги босқичлари бу кўчат екилгандан кейин бериладиган агротехник тадбирлар билан бошўланади. Кўчатларга шакл бериб, ушбу жараён ўз ниятига йетганидан сўнг парваришlashнинг дастлабки босқичи яъни кўчахонадаги қаторлар оралиғига ишлов беришдан бошланади. Кўчатхонадаги кўчатларнинг нормал ривожланиши ва керакли шаклга ега бўлишлари, ҳар бир кўчатга етarli даражада озика майдонининг йетarli бўлиши ва бошқа агротехник тадбирларни меъёрида амалга ошириш мақсадида кўчатхонадаги кўчатлар 2×1 схемада екилади. Яъни қаторлар оралиғи 2 м, кўчатлар оралиғи 1 м. Қаторлар ораларини суғорилгандан кегин ҳар ойда 3-4 мартадан юмшатилиб борилади. Ёз мавсумида ушбу жараён 12 – 15 мартагача амалга оширилади. Суғориш жараёнлари еса ҳафтасига 2 марта, ойиғи еса 24-30 мартагача давом этади.

Кўчатларга минерал ва органик ўғит бериш жараёни еса тупроқнинг унимлилиқ миқдори, гумус миқдorigа қараб вати – вақти билан бериб борилади. Бундан ташқари кўчатларни турли хил зарarli хашаротлар ва мавсумий касаллиқларга қарши дорилаб турилади. Парваришlash ишларининг кесиш услуби ҳам алоҳида аҳамиятга ега. Кесиш ишлари мақсад ва кўчатлар ҳолатига қараб турличадир. Масалан: санитар мақсадда кесиш танлаб кесиш ёппасига кесиш ва шакл бериш мақсадида танлаб кесиш каби турларига бўлинади. Парваришlash жараёни кўчатхонада шакл

берилган кўчатларни доимий жойига кўчириб ўтказилгуниг қадар изчил давом этади.



3.5.Шакл берилган кўчатларни доимий жойига кўчириб

ўтказиш ва парваришlash.

Кучатлар керакли шаклга келтирилганидан сўнг кейинги масала уларни доимий жойига кўчириб ўтказишдир. Махсус кўчатхоналарда етиштирилган кўчатларни доимий жойига ўтказишдан олдин, уларни қазиб олиш жараёнига алохида эътибор берилиши керак. Кўчат қазиб олиниш жараёнида унинг танасини шикастлантормасдан ва илдиз қисмини ўраб турган тупроқли қисмини авайлаб бутун олиш зарур. Кўчатлар қазиб олинганидан кейин уларни бир бора кўздан кечирган маъқул. Уларни ташиш жараёнида ҳам ехтиёткорлик зарур. Доимий жойига олиб келинганидан сўнг кўчатларни қандай ва қай ҳолатда екиш ландшафт дизайнерининг фантазияси ва буйиртмачининг талаблари ҳисоблари ҳолати ўтказилади. Экиш жараёнида кўчатнинг тагидаги илдиз қисмини ўраб турган қисмидан 1-2 баробар катталиқдаги чуқур қазилади. Қазилган чуқурга кўчат тўғри ва аниқ кўринишга ега ҳолатда қўйилиб тупроқнинг унимдор қисми билан қўмилади. Қўмиш жараёнида илдиз атрофига торфли чиринди Биогумус ёки чириган органик ўғитлардан фодаланиш кўчатнинг келгусида яхши ривожланиши ва илдизининг керакли озуқалар билан тўйинишини таъминлаш демакдир. Кўчат доимий жойига ўтказилганидан сўнг унга алохида эътибор ва парвариш зарур бўлади. Экилган кўчатларги суғориш ва вақти-вақти билан тагини юмшатиш керак. Бундан ташқари мавсумий ва санитар кесиш ишларини амалга ошириш лозим. Кўчатларни турли хил зараркунанда ва мавсумий касалликлардан

асраш мақсадида керак бўладиган пептисидлар ва гербицидлардан фойдаланиб ултра тушадиган касалликларни ва уларни зарарлайдиган хашаротларни йўқ қилиш тадбирларини амалга ошириш керак. Парваришlash жараёнида кўчатларга зарар йэтказмасдан техника хавфсизлик қоидалари ва санитар гигиеник қоидаларга амал қилган холда бажариш зарур. Кўчатларни доимий жойига ўтказиш жараёни якунига йетгач, шаклнинг доимийлигини ва кўчатнинг ўсиш мёёрини сақлаб қоли ва унинг ўсишини ,шаклланишини ривожлантириш асосий масала хисобланади. Кўчатлар доимий жойига ўтказилганидан сўнг парваришlash ишлари ўз ваътида бўлмаслиги ва кўчатлар учун доимий қаровнинг мавжуд емаслиги - кўчатларнинг биологик морфологик физиологик жараёнларининг бузилишига кўчатнинг нобуд бўлишига олиб келади. Кўчатларни доимий жойига кўчириб ўтказилганидан сўнг парваришlash ишларининг ўз ваътида ва мёёрида бўлиши кўчатларнинг шаклланиши ва ривожланишининг ижобий даражада бўлишини таъминлаган бўламиз

Қарағай кўчатларига “Ниваки” услубида шакл бериш да кўчатларнинг ёшига ахамият бериш асосий вазийфалардан бири хисобланади. Кўчатларга шакл бериш жараёни уларни экилганидан сўнг 5-6 ёшлигида амалга оширилади. Бу босқичда ҳам “Ниваки” тўлиқ намоён бўлмайди. Ушбу жараён бошланғич босқич бўлиб, кичик шохчалар келгусида намоён бўладиган шакл вужудга келиши учун керакли томонга шохлатилади. Қарағай шохлари керакли шаклга эришилган бўлса, унинг ўсишини назорат қилиш керак

Бунинг учун бир нечта усул қўлланилади. Улар бошқа турдаги игна баргли дарахтлар турлари учун ҳам амал қилади. Шохни янада шакллантириш бир хил тамойилларга мувофиқ амалга оширилади. Бу бир

неча йил давом этадиган мураккаб ва жиддий жараён ҳисобланади. Бу вақт мобайнида, ҳар бир майда шохчаларга керакли бўлган махсус порваришлш ишлари амалга оширилади. Ниваки услуби бу ўсимликлар билан ташқи ўхшашлик туфайли бонсай боғи деб аталади. Аслида, уларнинг номланишига ҳам хос Ниваки дан Бонсай фарқли ўлароқ, Ниваки сунъий майда шохчалари илдиз ва шох шаклида шакллантириш, боғга бириктирилган шаклида ўстирилади. Шакл беришда алоҳида кетма-кетликка амал қилиш лозим

Биринчидан-боғга ўтказилаётган кўчат боғнинг ҳар томонлама кўзга ташланадиган ва кўчатнинг яхши ўсиб ривожланиши учун қулай нукта танланади. Экилиш жараёнида кўчатнинг боғдаги бошқа кўчат ёки дарахлар билан орлиқ масофасига аҳамият берилади.

Кейин санитария ишларини амалга ошириш керак. Нозик, синган, қуруқ ва касал шохларини олиб ташлаш, шохни сийраклаштириш. қолган майда шохчаларлар биров қисқартириш зарур.

Танланган ўсимликни диққат билан кўриб чиқинг. Энди сиз унинг "юзини" танлашингиз керак - бу энг чиройли кўринадиган томон, бунда магистрал новданинг эгри чизиқлари аниқ кўриниши, магистрал ва майда шохларининг шаклини кўриб чиқинг ва бунга асосланиб, нивакиннинг шаклланиш услубини танланг. Услуб танланганидан сўнг, уни келгусида қандай кўринишга ега бўлишини тасаввур қилган ҳолатда новдаларини керакли ҳолатда шакллантириш ва йўналтириш керак. Нивакиннинг Мамлакатимизнинг Тошкент вилояти Паркент тумани ҳудудидаги "ZUXRA—ONA PLYUS" корхонасининг кўчатхонасида қарағай кўчатларига шакл бериш технологияси анчайин самарали ҳисобланади. Чунки қарағай (*Pinaseae*) оилсининг асосий турлари тоғли ва тоғолди минтақаларида яхши ўсиб ривожланади. Шунинг билан бирга иссиққа ва совуққа чидамлидир. Ушбу тур вакиллари соясевархамдир. Паркент туманининг иқлим ва тупроқ шароити ҳам Қарағай кўчатларининг ўсиб ривожланиши учун қулай минтақа ҳисобланганлиги туфайли, ушбу минтақада яхши ва

алоҳида эътибор билан парваришланган қарағай кўчатларига Ниваки услубида шакл берилса анчайин самарали ҳисобланади. Нивакиннинг бир нечта услублари мавжуд бўлиб, улар қуйидагилардир: Қарағай кўчатларига “Ниваки” услубида шакл беришда кўчатларнинг ёшига аҳамият бериш асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Кўчатларга шакл бериш жараёни уларни экилганидан сўнг 5-6 ёшлигида амалга оширилади. Бу босқичда ҳам “Ниваки” тўлиқ намоён бўлмайди. Ушбу жараён бошланғич босқич бўлиб, кичик шохчалар келгусида намоён бўладиган шакл вужудга келиши учун керакли томонга шохлатилади. Қарағай шохлари керакли шаклга эришилган бўлса, унинг ўсишини назорат қилиш керак

Бунинг учун бир нечта усул қўлланилади. Улар бошқа турдаги игна баргли дарахтлар турлари учун ҳам амал қилади. Шохни янада шакллантириш бир хил тамойилларга мувофиқ амалга оширилади. Бу бир неча йил давом этадиган мураккаб ва жиддий жараён ҳисобланади. Бу вақт мобайнида, ҳар бир майда шохчаларга керакли бўлган махсус парвариш ишлари амалга оширилади. Ниваки услуби бу ўсимликлар билан ташқи ўхшашлик туфайли бонсай боғи деб аталади. Аслида, уларнинг номланишига ҳам хос Ниваки дан Бонсай фарқи ўлароқ, Ниваки сунъий майда шохчалари илдиз ва шох шаклида шакллантириш, боғга бириктирилган шаклида ўстирилади. Шакл беришда алоҳида кетма-кетликка амал қилиш лозим

Биринчидан-боғга ўтказилаётган кўчат боғнинг ҳар томонлама кўзга ташланадиган ва кўчатнинг яхши ўсиб ривожланиши учун қулай нуқта танланади. Экилиш жараёнида кўчатнинг боғдаги бошқа кўчат ёки дарахлар билан орлиқ масофасига аҳамият берилади.

Кейин санитария ишларини амалга ошириш керак. Нозик, синган, қуруқ ва касал шохларини олиб ташлаш, шохни сийраклаштириш. қолган майда шохчаларлар биров қисқартириш зарур.

Танланган ўсимликни диққат билан кўриб чиқинг. Энди сиз унинг "юзини" танлашингиз керак - бу энг чиройли кўринадиган томон, бунда магистрал новданинг эгри чизиқлари аниқ кўриниши, магистрал ва майда

шохларининг шаклини кўриб чиқинг ва бунга асосланиб, нивакининг шаклланиш услубини танланг. Услуб танланганидан сўнг, уни келгусида қандай кўринишга ега бўлишини тасаввур қилган ҳолатда новдаларини керакли ҳолатда шакллантириш ва йўналтириш керак. Нивакининг Мамлакатимизнинг Тошкент вилояти Паркент тумани ҳудудидаги “ZUXRA—ONA PLYUS” корхонасининг кўчатхонасида қарағай кўчатларига шакл бериш технологияси анчайин самарали ҳисобланади. Чунки қарағай (*Pinaseae*) оилсининг асосий турлари тоғли ва тоғолди минтақаларида яхши ўсиб ривожланади. Шунинг билан бирга иссиққа ва совуққа чидамлидир. Ушбу тур вакиллари соясевархамдир. Паркент туманининг иқлим ва тупроқ шароити ҳам Қарағай кўчатларининг ўсиб ривожланиши учун қулай минтақа ҳисобланганлиги туфайли, ушбу минтақада яхши ва алоҳида эътибор билан парваришланган қарағай кўчатларига Ниваки услубида шакл берилса анчайин самарали ҳисобланади. Нивакининг



бирнечта услублари мавжуд бўлиб,улар қуйидагилардир:



3.5 расм Зухра она плюс МЧЖ даги шакл берилган қарағай кўчати

НИВАКИ УСЛУБЛАРИ

Тёкан (классик тўғри шакл) тўғридан-тўғри дарахтдир. Дарахтда битта тўғри шохланган бўлиши керак. Тож юқорига қараб чўзилган учбурчак шаклида шаклланади.




Сокан («иккига ажралга тана») - икки томонлама шохланган дарахт. Ушбу бўлиниш ердан дарҳол бошланиши керак.



1. **Кёто** Бу шакл Кёто шаҳрида юзага келган. Бунда дарахлардан ўтин тайёрлаш мақсадида кесилган жойларидан ёки тўнкаларидан янги новдалар ўсиб чиққан ва ушбу шакл юзага келган. Одатда

криптомерия дарахтида тайёрланади, Европада эса оддий корақарағайдан фойдаланилади.


Киотосская форма



У шундай номланган, чунки Кёто шаҳрида пайдо бўлган. Бундай нивакилар фақат игна билан ишланган криптомерия ўсимликларидан ҳосил бўлади.


Котобуки -иероглифнинг "бахтиёрлик" тасаввурига ўхшаш шакл.Боғда дарахт тумор сифатида экилган. Дарахтнинг пастки новдалари тош ёки тош чироқни қоплаши керак. Ҳозир Японияда бу жуда машҳурдир ва алоҳида

кимматга эга. Парҳининг жуда баланд бўлишига қарамасдан сотиб олиш жараёни яхши. Японлар ушбукўринишда шакл берилган дарахларни тумор дарах хам деб аташади.




Сякан - (қия шакл) — тик танали шаклдан фарқли равишда, дарахт танаси маълум бурчак бўйича қия ўстирилади, лекин текис бўлиши керак. Бундан ниваки одатда сув бўйларига экилади ва сув томонга қия жойлаштирилади. Ер усти бурчагига тўғри бурчак ҳосил бўлади. Кўпинча

сув омборининг қирғоғида бундай дарахтларга шакл берилади.



Моёги (эгри-бугри тана) — нивакининг мураккаб ва жуда чиройли шакли бўлиб, бир хил ўлчамда (одатда синусоид шаклида) эгри-бугри ҳолатда ўстирилади. Бу жуда мураккаб шаклдадир. Дарахт танасининг магистрал новдаси бир текисликда (синус тўлқини сингари) қимирлаши керак. Бундай

дарахтлар таркибнинг асосий элементи сифатида экилган.



2. **Кэнгай (эгилган шакл)** – дарахт танаси, унинг пастки қисмидан ҳам пастроққа эгилиб ўстирилади.. Дарахт танаси пастга қаратилган. У анҳорларнинг ёки каналларнинг баланд қирғоғига чиройли ва ажойиб манзара бериб туриш мақсадида экилган дарахтларга бериладиган шакл

хисобланади.У

сунъий

қоя

осиб

олиши

мумкин.



Монкабури (дарвоза устидаги дарахт) - дарвоза устидаги дарахт. У бир пастки бўлак жуда узун ва боғга киришда горизонтал ҳолда жойлашгади. Қарағайлар бу услубда қулай шаклланади. Монастирлар ва маъбудларда ҳам қарағай дарахтлари катта қуйи қисмдан иборат.



Монкабури услубида қарағай шохларинг шаклланиши



Ниваки япроқ баргли, ва игнабаргли ўсимликлардан ҳосил бўлади. Дарахтнинг ёши қанчалик кўп бўлса, унда ундан ҳам кўпроқ ҳурматга сазовордир. Ниваки турли баландликларда бўлиши мумкин. Кўпинча турли хил баландликдаги ўсимликлар экишади ва улар таркибига киради. Турли белгига эга бўлган ўсимликлар ўртасида уйғунликнинг бўлиши муҳимдир. Боғ йил давомида чиройли бўлиши керак. Гуруҳлардаги дарахтларни экиш учун 3, 5, 7 ёшдаги ўсимликларни олиб боринг. Японияда ноёб маданият жуда қадрланади ва ҳамма нарсада, жумладан, боғлар яратилиши кўзатилади. Япониядаги кўплаб боғлар - жуда кичик майдонларнинг хусусий боғлари, улар яшайдиган уйлар –ўзига хос манзарага эга. Экиш вақтида нафақат боғнинг ўзига хос турларини, балки уйнинг кўринишини ҳам ҳисобга олинг.

Ниваки уйдан тўлиқ кўриниши керак, шунда у рамка ичидаги расмга ўхшайди. Анъанавий япон уйида энг чиройли кўринишлар меҳмон хонасидан бўлиши керак. Бу ерда уйга борадиган йул - бу боғнинг юзи. Япон боғларида ўз-ўзидан ўсадиган дарахт ёки бута топиш қийин. Улар доимий равишда кесилган ва шаклланган. Дарахтлар у ёки бу услубга эга бўлиб, буталар думалоқ шаклларда кесилади. Японияда дарахтлардан гилам усулида экиш тури бор, лекин уларнинг барчаси нозик тарзда кесилган. Япон боғининг услубида яшил майдонларнинг машҳурлиги йилдан-йилга ошиб бормоқда. Ландшафт дизайни бу турнинг ўзига хос хусусияти - фақат табиий асбоблардан фойдаланиш: ўсимликлар, тошлар, кум, дарахтлар, гуллар, буталар ва бошқалар.

Ушбу услубни яратишда алоҳида гуруҳлар ёки алоҳида-алоҳида экилган ёввойи ўтлар билан ишғол қилинади ва уларнинг тожлари ҳайратланарли шаклларга эга. Игнабаргли дарахтлардаги чиройли тожга эришиш жуда қийин ва ландшафт дизайнида унинг шаклланиши санъатига Ниваки дейилади. Худди шу атама кенг маънога эга. Бу-Япон боғларини яратиш учун етиштириладиган игнабаргли ва япроқ баргли ўсимликлар гуруҳининг номи.

Япония маданиятининг ўз боғларида ўзларини синаб кўрмоқчи бўлганлар, барча япон дарахтлари бизнинг иқлимимиз учун мос эмаслигини тушуниш керак. Умуман олганда, дизайнерлар у ердан илҳом олиш учун ўз табиатига эътибор беришни тавсия қилади. Табиийки, Япон боғи учун биржалар тўлиқ атипик бўлади, аммо одатий қарағай ёки навлари бунга жуда мос келади.

У Россиянинг Европа қисмида ва Сибирда кенг тарқалган, шунинг учун қарағай шаклланиши Япон боғини яратишнинг асосий вазифаларидан биридир. Қарағай шохларига керакли шаклдан эришилган бўлса, унинг ўсишини назорат қилиш керак. Бунинг учун бир нечта усул қўлланилади, улар бошқа ибратли дарахтлар турлари учун ҳам амал қилади: Ўчириш. шохда алоҳида (тўлиқ ёки қисман) олиб ташланади, бу эса унинг исталган шаклини олишига тўсқинлик қилади. Чикариш. қарағайнинг ёш куртаклари фақат бир неча сантиметр узунликда очилган шам шаклига эга. Агар сиз шамнинг ярмидан $\frac{2}{3}$ қисмигача кессангиз, игналар ўсмайди ва олдинга силжийди, лекин қирғоқларда тожни янада қалинлашади. Қадимги баҳорда сиқиш тавсия этилади - эрта ёз. Бўлимларни чўзиш. майда шохлар одатдаги ҳолатидан эгилиб, уни тузатиб юборадиган бўлса, бир неча ҳафта ичида янги шаклни олишлари мумкин. Шундай қилиб, шохга керакли шаклни майда шохчаларга зарар этказмасдан ёки кесмасдан берилиши мумкин. Кичик дарахтга қарағай нивакини шакллантиришни бошлаганда, бир неча йил ичида қандай ўсишига тасаввур қилишингиз керак.

Япон боғидаги Ниваки намунаси



Дарахтларни соғлом сақлаш учун, экилгандан сўнг дарахт куртаклари дезинфектсия қилиниши керак. Дезинфектсия қоидалари одамлар учун бир хил, чунки микроблар ва вирусларнинг характери ҳар доим бир хил.

Агар сизда махсус терапия таркиби бўлмаса, кесиш воситасини мунтазам ароқ билан намланг. Аммо майда шохчаларини стимулятор билан

даволаш керак, масалан, *эмистим ёки циркон*. Йилда икки марта, баҳор ва кузда майда шохчаларини қўзиқоринлардан даволаш керак.

Ўсимликларни замбуруғ касалликлари билан курашадиган моддалар. Ниваки ҳосил бўлишининг бошланиши экишдан сўнг 5-6 йилда бўлиши мумкин. Шохни шакллантириш бўйича асосий ишлар шохларни керакли шаклга эга бўлиш учун тузатишдир. Кейинчалик, дарахт ўсганда, у кўпроқ майдонга эга бўлади. Улар аллақачон кесилиши мумкин ва ҳар йили у тез-тез амалга оширилиши керак. Ҳар кузда, баъзи игналар қуриydi ва агар улар олиб ташланмаса, дарахтнинг қолган қисмини касаллантириши мумкин. Кўп дарахтлар каби қарағай, кескин юқорига кўтарилишга интилади ва шохнинг стандарт шакли конусга ўхшайди. Бир тўп шаклини бериш учун ёш куртаклар қисқартирилади ва бундай қарағай "кенгликда" ўсишни бошлайди. Бироқ, унинг нур ва қувват олиб бошқа қарағай дарахтлари билан аралаштириш жуда муҳим аҳамиятга эга. Кичкина мувозанатдаги шох шакли синади ва кейинчалик анъанавий бургер билан кесилган бўлиши керак. Қўшимча инжиқликлари текисликдан шароитида жуда бошқача ўсишни бошлайди, ўсиш даражаси, таъсирчан, шунинг учун сайт эгалари деярли барча майда шохчалари қисқартириш тавсия этилади. Бу дарахтнинг ички метаболик жараёнларини ва унинг ўлимини бузишга олиб келиши мумкин. Барча майда шохчалар бирдан кесилмайди; шохни тўғри шакл бериш зарур бўлса, унда бу жараённи бир неча йил давомида узайтириш керак. Дарахтни ёлғиз қолдиринг ва ўзини ўзи қутқаради. Япон боғларида дарахтларга маълум шакл берилади ва мунтазам равишда кесиб ташланади. Бундай боғ дарахтларига ниваки дейилади. "Ниваки" сўзи иккита маънодан иборат: "дарахт" ва "боғ". Кўпчилик "*бонсай боғи*" деган номни эшитган, аммо бу тўғри эмас. "Бонсай" сўзи "**Лаганда устидаги дарахт**" маъносини англатади ва ҳар доим ўзларининг илдизлари боғ шароитида ўсади. Аммо бонсай ва нивакидан дарахтни шакллантириш тамойиллари кўп жиҳатдан ўхшашлигини айтишим керак.

Нивакини классик услубини яратиш

Оригинал услубда қарағайнинг шаклланиши энг яхши анъанавий Япон дарахтларида амалга оширилади. Бироқ, сиз ушбу қоидаларни одатий қарағайда қилишингиз мумкин, агар сиз бир нечта шарқий қоидаларга амал қилсангиз:



Бўлимлар ҳар бир қатламда ғалати рақам бўлиши учун кесилмоғи керак. Одатда, 3 ёки 5 майда шохчаларини қолдиринг. Бу учбурчакнинг бир турига айланади ва у тўғри бўлиши керак қилиб айтганда, филиал чизикқа,

яъни

"кирғоққа"

ўхшаш

бўлиши

керак.



Шохни янада шакллантириш бир хил тамойилларга мувофиқ амалга оширилади. Бу бир неча йил давом этадиган жиддий жараён. Бу вақт мобайнида, ҳар бир майда шохчалар, керак бўлганда, керакли жойга парваришlash керак.

Агар дарахт ҳали ҳам кичкина бўлса, уни фақат бир бутунлик билан юмшоқ қилиб кесишингиз мумкин. у қуриб қолган шохларини олиб ташлаш ва ёш куртаклар ниш безак учун зарур бўлса, асосий иш, баҳорда амалга оширилади. Ниваки бу ўсимликлар билан ташқи ўхшашлик туфайли бонсай боғи деб аталади. Аслида, уларнинг номланишига ҳам хос Ниваки дан Бонсай фарқли ўлароқ, Ниваки сунъий майда шохчалари илдиз ва шох

шаклида шакллантириш, боғда бириктирилган шаклида ўстирилади. Япония услуби жаннатларида ўсимликлар чекланган микдордаги фойдаланади бери, қобилияти ғайриоддий, ғалати шакли боғманзараси диверсификатсия қилиш ёрдам беради, уларни бериш ва услуби таъкидлашни. Бироқ, фақат Япон боғи бундай ўсимликлар безашни мумкин эмас. Принтсипиал ниваки бошқа услублар боғларида, масалан, Ўрта ер денгизи хавзаларида фойдаланиш мумкин. Ниваки ўсимликлари ёш бўлиши мумкин ва боғбоннинг махорати туфайли катталар тасвирий дарахт сифатида қарашлари мумкин. Бундай намуналарнинг баландлиги 1,5 м дан 5 м гача.

Ниваки учун тез ўсадиган турлар танланг:

- Гинкго билоба (Ginko biloba)
- Норвегия арча (picea abies)
- Ҳимолай кадр (Kedrus)
- Лавсон сарв
- Қора қарағай (Пинус нигра)
- мелкотсветную қарағай (Пинус парвифлора)

4 Кўчатларни етиштириш жараёнинг технологик харитаси.

Т/р	Ишнинг номи	Ишнинг бажарилиш вақти	Агригат таркиби	
			Трактор маркаси	Механизм маркаси
1	Лойихаланаётган майдонни ўрганиш	1-йил август	Инсон	Томонидан
2	Лойихаланаётган майдонни белгилаш	Октябрь	Қўл	Кучи
3	Белгиланган майдонни текисклаш	Ноябрь	Дт -75	Д 603
4	Сув тармоқларини тўғирлаш	Ноябрь	Дт -75	КЗУ -0,3
5	Майдонни юмшатиш	Ноябрь	Т -40М	ЧК -3

6	Майдонни ағдариб хайдаш	Ноябрь	Дт -75	ПЛН-4-35
7	Бороналаш	Ноябрь	Дт -75	МВ- 6
8	Ерни хайдаш	Ноябрь	Т -40М	ГИН-4-31
9	Бороналаш	Ноябрь	Дт -75	БЗТС-1
10	Молалаш	Феврал - мартъ	Дт -75	МВ-6
11	Екиш жойларини белгилаш	Феврал - мартъ	МТЗ-80	1-ПГУ-4
12	Уруғкўчатларни саралаш	Феврал - мартъ	МТЗ-82	КЯУ-100
13	Екишга тайёрлаш	мартъ	Қўл	Кучи
14	Уруғкўчат екиш	мартъ	Қўл	Кучи
15	Техник қабул қилиш	Экилгандан 10 кун сўнг	Қўл	Кучи
16	Хатоларни тўлдириш	2 хафтадан сўнг	Қўл	Кучи
17	Суғориш	Веgetция даврида	Қўл	Кучи
18	Қатор ва кўчатлар оралиғига ишлов бериш	Веgetция даврида	Қўл	Кучи
19	Ўғитлаш	Веgetция даврида	ТМ-40	КРХ-3.6
20	Гербисит сепиш	Веgetция даврида	ТМ-40	ОВХ-14
21	Кўчатларни холатини ўрганиш	Сентябрь	Қўл	Кучи
2-йили				
1	Сув тармоқларини тўғирлаш	Веgetция даврида	Қўл	Кучи
2	Қатор ва кўчатлар оралиғига ишлов бериш	Веgetция даврида	Дт -75	ПЛН-4-35

3	Суғориш	Веgetция даврида	Қўл	Кучи
4	Ўғитлаш	Веgetция даврида	ТМ-40	КРХ-3.6
5	Гербисит сепиш	Веgetция даврида	ТМ-40	ОВХ-14
6	Кўчатларни хoлатини ўрганиш	Ноябрь	Қўл	Кучи
3-5-7-йиллари				
1	Сув тармоқларини тўғирлаш	Веgetция даврида	Қўл	Кучи
2	Қатор ва кўчатлар оралиғига ишлов бериш	Веgetция даврида	Қўл	Кучи
3	Суғориш	Веgetция даврида	Қўл	Кучи
4	Ўғитлаш	Веgetция даврида	Қўл	Кучи
5	Гербисит сепиш	Веgetция даврида	Қўл	Кучи
6	Кўчатларни хoлатини ўрганиш	Веgetция даврида	Қўл	Кучи
7	Кўчатлар оралиғини юмшатиш	Веgetция даврида	Қўл	Кучи
8	Кўчатларга мавсумий шакл бериш	Ноябрь	Қўл	Кучи

**4 Қарағай кўчатларини шакл бериб парваришлашнинг
иқтисодий самарадорлиги.**

Т/р	Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги дона	Умумий суммаси (минг сўм)
1	5 ёшли шакл берилган қарағай кўчатининг	1	500
2	6 ёшли шакл берилган қарағай кўчатининг	1	600
3	7 ёшли шакл берилган қарағай кўчатининг	1	700
4	8-9 ёшли шакл берилган қарағай кўчатининг	1	1.000
5	Турли ёшдаги кўчатларнинг ўртача нархи	4	700
6	1 га кўчатзорда етиштирилган жами шакл берилган кўчатлар сони ва уларни сотишдан келган пул тушуми	5000	3.500.000.

Т.р	Сарф харажатлар	1 йиллик суммаси	Ўртача 5 йиллик суммаси
1	Агротехник тадбирлар учун харажатлар	5.000000	25 млн
2	Иш хақи	12.000.000	60 млн

3	Ўғитлаш ва дорилаш харажатлари	5.000.000	25 млн
4	Уруғкўчатларни сотиб олиш	5.000.000	25 млн
5	Солиқ ва бошқа тўловлар	10.000.000	50 млн

Жами харажатлар

Жами харажатлар	37 млн	185 млн
Соф фойда		
$3.500.000.000 - 185.000.000 = 3.165.000.000$		

Хулоса

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак мамлакатимизда аҳоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштиришва ландшафт дизайнинг замон талабида янгича услубларда ривожланиб бориши ва юртимизнинг ҳар бир минтақасида ушбу ишларнинг тўхтовсиз , жадаллик билан олиб борилаётгани қувонарли ҳолдир.Хозирги кунда Республикаимизнинг вилоят марказларида ва туманларда қурилаётган бино иншоотларнинг атрофи,истирохат боғларининг яшил майдонлари,дам олиш масканлари,парк ва хиёбонлар атрофлари кўкаламзорлаштиришнинг янгича усулларида фойдаланиб яратилмоқда. Ландшафт дизайнинг хозирги кунда замонавий кўриниш ва услублари кишини хайратга солмасдан қолдирмайди албатта.Мен ушбу битирув малакавий ишим давомида юртимизга ендигина янгича услубда кириб келган Ниваки услуби билан яқиндан танишдим ва ушбу услубни Тошкент вилоятининг Паркент туманида жойлашган кўчатхона “Зухра она плюс” шароитида қарағай кўчатларига шакл бериш жараёнинг гувоҳи бўлдим ва амалиётда ўтадим.Жараён бирмунча қийин бўлиб,анчайин вақт талаб қиладиган шакл бериш усулларида хисобланади.Ушбу шаклнинг яққол кўриниши ўртача 5-6 йилда намоён бўлади.Шакл бериш жараёнида кўчатларга алоҳида эътибор ва парвариш зарур бўлади.

Нива баргли дарахт уруғларини тиним муддатини ўз вақтида ўтказиш зарур.

Кўчатлар қиёғос ўнишида жўяк марзаси доимо намлик меъёрида бўлиши зарур.

Кўчатлар тоза ва соғлом бўлиши учун органик ва минерал ўғитларни меъёрида ва ўз вақтида бериб бориш керак

Нихоллар қийғос ўнганда уларни ҳар хил ҳашоратлардан ҳимоялаш зарур. Нихолларда ўз вақтида парваришлаш ишларини олиб бориш ва мавумий парваришлаш ишларини ўз вақтида олиб бори керак. Бугунги кунда ҳар бир соҳада иқтисодий самарадорликка эътибор кучлилиги сабабли бажарилган ишдан олинидиган даромаднинг юқори ёки паслиги бажарилган ишнинг аниқлиги ва сифатига боғлиқ. Кўчат етиштиришнинг ўзига хос иқтисодий самарадорлиги ҳам парваришлаш ва шакл беришнинг меёрида бўлишига боғлиқ. Оддий шакл берилмаган қарағай кўчатларига қараганда шакл берилган кшчатнинг нархи ва иқтисодий самарадорлиги, эстетик завы бериш жараёни ҳам анчайин кстунроқдир. Ниваки ва унинг усуллари кўринишидаги дарахтлар ўзининг ҳар томонлама утунлиги ва авзаллиги билан ажралиб туради ва юқори баҳоланади. Хулоса ўрнида шуни айтиш керакки қарағай кўчатлари кўкаламзорлаштиришда ва ландшафт дизайнида бекиёс ахамиятга. Келгусида кўкаламзорлаштириш ишларида қарағай кўчатларининг юқорида кўрсатилган ва шакллантирилган турлари мамлакатимизнинг барча гўшаларига чирой бахш этиб, кишиларга эстетик завқ улашади. Шундай экан келгусида ушбу шакл берилган кўчатларни янада кўпайтиришва шакллантириш лозим.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. –Т. Ўзбекистон, 2003.
2. Ўзбекистон Республикаси “Ўрмон тўғрисида”ги Қонуни. 15-апрел 1999 йил.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида” ги Қонуни. 9 декабр 1992 йил.
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 7-сентябрдаги 186-сонли “Япон сафораси ва Сохта каштан дарахти кўчатларини экишни кўпайтириш чоралари тўғрисида” ги Қарори.
5. 2012 йил 16 октябрдаги 683-сонли “Лола дарахти ва Қарағайи дарахти кўчатларини экишни кўпайтириш тўғрисида” ги Фармойиши .XI
6. Артаманов В.И. Растения и чистота природной среды. – М: Наука, 1986.
7. Бўриев, Л. А. Абдурахмонов, А. Т. Жононбекова. Гулчилик. Тошкент. 1999.
8. Бобринев В.П. Ускоренное выращивание древесных пород. – Новосибирск: Наука, 1987
9. Гетко Н.В. растения в техногенной среде. – Минск: Наука и техника, 1989.
10. Горышина Т.К. Растение в городе. – Л. Изд-во Ленинградского ун-та, 1991
11. Дошанов М.Б., Молчанова А.И. Ассортимент древесных пород и типы культур для полезащитных лесных полос. Ассортимент древесных пород и кустарников для горных и орошаемых районов Республики Узбекистан. Т. 1974.
12. Досахметов А.О. Кўкаламзорлаштириш. Маъруза матнлари, 2001.
13. Длавкина Т.И. “Декоративное садоводство”. Т.1987.

14. Досахметов А.О., Хошимов К.Х. - Методические указания по озеленению населенных мест, Ташкент, 1993г.
15. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. – Тошкент: ЎзПТИ.
16. Есипова Т.В. Ель колючая, Памятники природы Узбекистана. – Тошкент: - 1980.
17. Есипова Т.В. Повышение грунтовой всхожести семян и сохранности сеянцев интродуцированных видов рода *Picea*, интродукция и акклиматизация растений.- 1986.
18. Есипова Т.В. Сезонный ритм развития видов рода *Picea* в Ботаническом саду АН Интродукция и акклиматизация растений.- 1987.
19. Есипова Т.В. Рекомендация по выращиванию ели колючей и канадской в производственных условиях. – Ташкент, 1988.
20. Кузьмичёв И.Э., Печеницын В.П. Озеленение городов и сел Узбекистана.- Ташкент, 1979.
21. Қайимов А.К., Биогеоценозы лесноаграрного ландшафта орошаемых земель. Т. из-во «Фан». 1993.
22. Қайимов А.К., Экологическая роль лесоаграрного ландшафта. Лесомелиорация в агропромышленном комплексе. Т. 1987.
23. Қайимов А.Қ. Ахоли яшаш жойларини кўкаламзорлаштириш “Фан ва технология”-2012
24. Қайимов А.Қ., Бердиев Э.Т. Дендрология (дарслик). Тошкент, 2012.
25. Қайимов А.Қ. Дендрология (ўқув қўлланма) Тошкент: Илм зиё, 2007.
26. Қаландаров М “Ўрмончилик”.Т.2008.]
27. Ларин В.Б. Культуры ели и кедра. –Л: Наука, 1980.
28. Леухина Г.Н., Ляпина О.А., Веремеева Т.Л. под ред. С.Г. Чанышевой. "Климат Узбекистана", Ташкент: - 1996 г
29. Рахимова Т. Т. Ўсимликлар экологияси ва фитоценологияси. – Тошкент: Университет, 2009.

30. Худжаев Ғ.Х., Бердиев Э.Т. « Қорақарағай (PICEA SPP) туркумидаги турларни тарқалиши, биологияси ва кўкаламзорлаштиришдаги аҳамияти» - Республиканская научно-практическая конференция молодых учёных «Проблемы сохранения агробиоразнообразия, его роли в развитии АПК, Достижения продовольственной безопасности и устойчивости окружающей среды». Самарканд, Узбекистан, 18 мая 2012 год .
31. Яскина Л.В. Дендрология. Ташкент: Ўқитувчи, 1980.

Интернет сайтлари

32. [http:// ru/Wikipedia.org/wiki/Ель](http://ru/Wikipedia.org/wiki/Ель)
33. ru.wikipedia.org/wiki/Ель
34. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ель_обыкновенная
35. flower.onego.ru/conifer/picea.html
36. dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology...
37. les.novosibdom.ru/node/411
38. vgluhova.ru/katalog/chvoynie/el