

**O'ZBEKISTAN RESPUBLİKASI JOQARI HA'M ORTA
ARNAWLI BİLİM MİNİSTRLİĞİ
BERDAQ ATINDAG'I QARAQALPAQ MA'MLEKETLİK
UNİVERSİTETİ
MAGISTRATURA BO'LIMI**

Qol jazba huqıqında

UDK 597.0/5

Kurbaniyazova Aziza Oserbay qızı

**«DAWITKO'L SUW SAQLAG'ISHININ'
AKKLİMİTİZATSİYALANG'AN BALIQLAR PARAZİTLERİNİN'
BİOLOGİYASI HA'M EKOLOGİYASI»**

5A140103 «İxtiologiya hám gidrobilologiya»

Magistr akademiyalıq dárejesin alıw ushın jazılǵ'an

D İ S S E R T A T S İ Y A

MAK da jaqlawǵ'a ruxsat

Magistratura bōlimi baslıǵ'ı:

_____ Gulimov A.

Biologiya kafedra baslıǵ'ı:

b.i.k. V.Davletmuratova

İlimiy basshı:

b.i.d. M.Jumanov

NO'KİS-2018 j.

M A Z M U N I		
	KİRİSİW.....	3
I. BAP.	BALIQ PARAZİTLERİ BOYINSHA ALIP BARILG'AN İLİMİY İZERTLEWLER.....	12
1.1.	Dawıtköl suw saqlaw ıshınıń qısqasha fız-geografiyalıq sıpatlaması ...	12
1.2.	Balıqlardı parazitologiyalıq jaqtan izertlew tariyxı.....	15
II. BAP.	BALIQ PARAZİTLERİN İZERTLEW METODİKASI.....	18
2.1.	İzetrlew materialı, ornı hám usılları.....	18
2.2.	Dawıtköl suw saqlawıshı suwınıń ximiyalıq quramı hám ózgerisi	23
2.3.	Dawıtköl suw saqlawıshı balıqlarınan tabılg'an parazitler sistematikası	25
III. BAP	DAWITKO'L SUW SAQLAG'ISHI AKKLİMİTİZATSİYA- LANG'AN BALIQ PARAZİTLERİNEN ALING'AN NA'TIYJELERI.....	45
3.1.	Dawıtköl suw saqlawıshınan izertlengen balıq parazitleriniń ekologiyalıq faktorlarg'a baylanıslı ózgerisleri.....	45
3.2.	Izertlengen balıqlardıń awqatlıg'ınıń túr quramı.....	50
3.3.	Aq amur hám tolstolob balıqlarınıń parazitler faunasınıń ózgerisine akklimatizatsiyanıń tásiiri.....	61
3.4.	Dawıtköl kóli aqamur hám tolstolob balıqlarınıń parazitleriniń shaqırg'an tiykarg'ı kesellikleri hám aldın alıw ilajları	63
	JUWMAQLAW.....	71
	PAYDALANILG'AN A'DEBİYatLAR.....	73
	QOSIMShA	78

KIRISIW

Magistrlik dissertatsiyası temasının tiykarlanıwı hám onıń aktualıg'ı: Demokratiyalıq rawajlanıw jolında biziń mámleketimizge joqarı mag'lumatlı, hár tárepleme rawajlang'an qánigeler zárur. Respublikamızdıń bilimlendiriw sistemasınıń «Bilimlendiriw haqqındag'ı nızam» hám «Kadrlar tayarlawdıń milliy bag'darlaması» tiykarında didaktikalıq bas uazıypamız jaslardı jetik tárbiyalaw bolıp tabıladı (Barkomol avlod, 1997)¹.

O'zbekistan Respublikası Prezidenti Sh. Mirziyoyev 2017-2021 jıllarda O'zbekistan Respublikasınıń rawajlandırıwdıń bes áxmiyetli bag'darı boyınsha Háreketler strategiyasınıń 3-bántiniń Ekonomikanı rawajlandırıw hám liberallastırıwdı eń áxmiyetli bag'darlarındag'ı 3 bánttiń 3 bōlimindegi Awıl-xojalıg'ın modernizatsiya etiw hám jedel rawajlandırıw degen bōliminde mınaday degen edi:

kesellik hám zıyankeslerge shıdamlı, jergilikli topıraq-ıqlım hám ekologiyalıq shárayatlarg'a iykemlesken awıl-xojalıg'ı eginleriniń jańa selektsiya sortların hámde joqarı ónimdarlıqqa iye haywanat zatların jaratıw hám islep shıg'arıwg'a qollanıw boyınsha ilimiy-izertlew jumısların keńeytiriw haqqında keltirilgen².

Qubla Aral boyı regionlarında sońg'ı jılları darya suwınıń azayıwı menen suw túsip turg'an kōller hám suw saqlag'ıshlar kōlemi bir qansha kemeydi, suwdıń gidroximiyalıq hám gidrobiologiyalıq quramı biraz jaman awhalg'a alıp keldi. Suwda jasaytug'ın balıq hám omırtqasız haywanlardıń jag'dayın tōmenlep hám kúshli ekologiyalıq ózgerislerge ushıradı. Usınday jag'daylarg'a qaramastan balıqshılıq tarawın rawajlandırıw házirgi waqıttag'ı aktual mashqalalardıń biri bolıp tabıladı. Balıqlardıń biologiyasın, ekologiyasın hám balıqlardı parazitologiyalıq jaqtan hár tárepleme úreniwdi talap etedi.

Parazitler kesellikler esabınan V.B.Dubininniń kōrsetiwi boyınsha tábiyiy suwlardag'ı shabaqlardıń 30 protsenti nabıt boladı eken (1949). 1936 jılı sag'aq

¹ "Barkomol avlod yili" davlat dasturi. – T.: O'zbekiston, 2010 – 80 b.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев Тошкент ш., 2017 йил 7 февраль, ПФ-4947-сон «Халқ сўзи» газетасининг 2017 йил 8 февралдаги 28 (6722)-сонида

sorıwshısı - nitchia sturionus paraziti sebebli Aral bakra balıg'ı qırılıp ketti. Onıń zapası hesh tiklenbedi (Dogel, Lutta, 1937). 1951 jılı A'miwdárya deltasındag'ı Sudoche kólinde rafidaskaridoz keselliginen lesh balıg'ı qırıldı (Osmanov, 1953).

Qaraqalpaqstan territoriyasında balıq órshitiw máselesi alg'a ilgerlemekte. Sonıń ushın balıqshılıq tarawında balıq keselligi menen gúresiw jumısların óz ishine qamtıydı. Territoriyamızdag'ı júz berip atırg'an ekstremal ekologiyalıq jag'day suwlardag'ı parazitologiyalıq sharayattı keskin ózgerislerge alıp kelmekte.

Izertlew obekti hám predmeti: Dawıtkól kóldegi akklimitizatsiyalang'an shöp jewshi balıqlar espalanadı. Dawıtkól kólindegi balıqlardıń bioekologiyalıq hám parazitologiyalıq jaqtan izertlewler alıp barıldı. Bul ilimiy jumıslar 2017 jıldıń 15 iyun ayınan 15 iyul aylarınıń aralıg'ında júrgizildi.

Izertlew barısında tolıq parazitologiyalıq usılda 15 dana aq amur hám salıstırmalı analiz turinde 15 dana tolstolob balıg'ı gelmintologiyalıq izertlewden ótkerildi. Barlıg'ı bolıp 30 dana balıq boldı. Dawıtkól kólindegi balıqlardı balıqshılardıń uslang'an awınan aldıq. Kishkenelerin mayda kózli sholpı menen súzip usladıq.

Qıtaydan 1963 jıllırı aq amurdıń mayda shabaqların, bir jastag'ıların O'zbekistang'a alıp kelip, Chirchiq hawız xojalıg'ın karantin jolı menen sınap kórip keyin hawız xojalıg'ında ósire basladı.

Sonday etip, olardı uwıldırıq shashıp kóbeytiw baslangan edi. Qaraqalpaqstanda 1964 jıldan baslap, sol waqıtları (XXII-partsezd degen sovxozg'a) Xojeyli rayonına alıp kelip jasalma jol menen hawızlerde ósirilgen. A'miwdáryag'a hám Aralg'a Turkmenstannıń Qaraqum kanalı hám Qoramatniez hawız xojalıg'ınan tarqalg'an degen túsinikler bar. A'miwdáryada bul aq amur uwıldırıq shashıp kóbeye basladı.

Izertlewdiń maqseti hám wazıypaları: Jumıstıń tiyarg'ı maqseti Dawıtkól kólindegi shöp jewshi balıqlarınıń házirgi bioekologiyalıq hám parazitologiyalıq jag'dayların úyreniwden ibarat. Balıqlar dúnyasına, olardıń ekologiyasına, köldiń gidroximiyalıq hám gidrobiologiyalıq kórstekishlerine hám balıqlardıń

parazitlerdi juqtırıwı hám olardıń shaqırg'an kesellikleri anıqlandı. Balıqlar dúnyasın qorg'aw is-ilajların islep shıg'ıw, parazitler keltirip shıg'arıwshı keselliklerge aldın-alıw profilaktikalıq jumıslardı júrgiziw zárúr. A'miwdárya deltasındag'ı awlanatug'ın balıqlardıń sanınıń hám sapasınıń kemip ketiwine parazitlerde sebep bolatug'ınlıg'ı málim. Sebebi parazitlerdiń ayırım túrleri balıq shabaqlarınıń kōp sanda qırılıp ketiwine sebepshi boladı. Sonıń ushında aq amurdıń parazitler faunasın izertlew alıp barıw kerek. Sebebi kōldiń suwınıń hám ondag'ı tirishilik etetug'ın suw omırtqasız haywanlarıńda ekologiyalıq jag'dayı úlken ózgeriske ushırag'an, bul balıqlardıń parazitler faunasınıń ózgeriwine alıp keledi.

Qubla Aral boyı suw hawızlarındegı parazitleri haqqında kōp jıllıq materialları, ilimpazlar tárepinen jıynalg'an (Dogel, Luta, 1937, Osmanov, 1971). Hár qıylı parazitlerdiń shaqırg'an keselleriniń, awlanatug'ın balıqlardıń zapasınıń kemeyip ketiwine hawız xojalıg'ında bolsın yamasa tábiyg'ıy kōllerde bolsın úlken tásin tiygizedi. 1936 jılı Aral teńizinde Bekire balıg'ınıń sag'ag'ında parazitlik jol menen tirishilik etetug'ın sorıwshı Monogeniya – Nitshiya sturionis, aq amur rafidoskaridoz, karp balıg'ı koktsidioz kesellikler menen qırılıp ketken (Osmanov, 1953, 1965). Sonıń ushın, balıq ónimdarlıg'ın arttırıwda: kōllerde, suw saqlag'ıshlarda, hawız xojalıqlarında, kollektorlarda olardan payda bolg'an kōllerde, qáwipli parazitlerge qarsı gúres júrgiziw kerek boladı. Onıń ushın balıqlardı tereń parazitologiyalıq izertlew hám olardıń shaqırg'an keselliklerine qarsı gúres júrgiziw zárúr.

Balıq keselliklerin hám onıń kesellik shaqırıwshı qáwipli parazitlerin, olardıń adam hám bahalı sharwa mallarına ótiwiniń aldın alıw ushın balıq parazitlerin izertlewdi talap etedi. Sondag'ana biliwge boladı.

Balıq parazitlerin izertlew, onıń qáwipli kesellik shaqırıwshı parazitlerdi bōlip shıg'arıw olardıń aldın-alıw usılların úyreniw azlıq qıladı. Sebebi, suw saqlag'ıshlar kúnnen kúнге ózgerip atır, sonıń ushın balıqlardıń biologiyasın biliw kerek, olardıń jasaw jag'daylarına qarap, parazitlerdiń jug'ıwın esapqa alıw olarg'a ekologiyalıq jag'daydıń túrin biliw zárúr boladı.

A'miwdáryanıń deltasındag'ı jasaytug'ın balıqlardıń parazitlerin biliw kerek. Ol ushin balıqlardag'ı bir suw saqlag'ısthan ekinshi uzaqtag'ı suw saqlag'ıshg'a akklimatizatsiya islegende aldı menen sol balıqtıń jasap atırg'an suwında ol balıqta qanday parazitler bar ekenligin biliw kerek, sebebi parazitler taza suw saqlag'ıshqa barg'anda ol balıqtıń jaqın tuwısı barma ya joqpa bulda úlken ról oynadı. Mısal ushin 30 jıllardıń ayag'ında Kaspiy teńizinen Aral teńizine Sevryuga balıg'ın akklimatizatsiya islegen. Usı sevryuga balıg'ı menene birge Monogenen klasınıń wákili Nitzschia sturonis, 60 jılları Amur dáryasına Orta Aziyag'a aq amur balıg'ı keltirilgen. Usı balıq penen birge O'zbekstang'a Tsestodlar klasınıń wákili Bothriocephalus opsariichthidis keltirilgen. Keyin A'miwdárya deltasına keńinen tarag'an. Bul Gelmint biziń jerimizde óziniń rawajlanıwı ushin qolaylı jag'daydı tapqan.

Balıq parazitlerin izertlew, onıń qáwipli kesellik shaqırıwshı parazitlerdi bōlip shıg'arıw olardıń aldın-alıw usılların úyreniw azlıq qıladı. Sebebi, suw saqlag'ıshlar kúnnen kúnge ózgerip atır, sonıń ushin balıqlardıń biologiyasın biliw kerek, olardıń jasaw jag'daylarına qarap, parazitlerdiń jug'ıwın esapqa alıw olarg'a ekologiyalıq jag'daydıń túrin biliw zárúr boladı.

Dawıtkōl kōlinde balıq ōsiriwdi hám basqa jaqtan balıqlardı, awqatlıq zatlardı (plankton, bentos) hám bulardan da basqa haywanlardı akklimitazatsiya jolı menen alıp kelingeni balıq parazitlernen jıynalg'an parazitologiyalıq materiallarımnan biri boldı.

Dawıtkōl kōli balıqlardı parazitologiyalıq (ásirese házirgi ekologiyalıq suwdıń, gidrologiyalıq rejiminiń ózgergen dáwirinde) jaqtan júdá kem izertlengen.

Sońg'ı jılları Dawıtkōl kōliniń suwınıń ekologiyalıq jag'dayı bir qansha ózgerdi. Sonıń ushında bul kōlde aq amurdıń parazitler faunasın ilimiy jumısım ushin izertlewdi ōz aldına maqset etip qoydım.

Dawıtkōl kōliniń 2017 jılı ilimiy sapar shōlkemlestirip, magistrlik dissertatsiya jumısına tiyisli parazitologiyalıq jaqtan aklimitizatsiyalang'an aq amur hám tolstolob balıqlarınan materiallar jıynaldı.

Dissertatsiya jumısımnıń aldına qoyg'an maqseti aklimmitizatsiyalang'an balıqlar parazitler faunasınıń búgingi ahwalı menen tanısıp hám usı materiallar házirgi parazitologiyalıq jag'day menen buring'ı jaqsı jag'daydag'ı parazitofaunanı salıstırıp úyreniwde úlken áhmiyetke iye boladı.

Dissertatsiya jumısımnıń maqset tómendegilerden ibarat:

- Dawıtkól suw saqlag'ışınıń akklimitizatsiyalang'an balıqları parazitleriniń biologiyalıq túrlerin anıqlaw;
- balıq parazitleriniń ekologiyalıq qásiyetlerin biliw;
- balıq parazitofaunasınıń ózgeriwine tásir etiwshi ekologiyalıq faktorlardı úyreniw;
- akklimitizatsiyalang'an balıqlardıń ekologiyalıq jag'dayda jasap atırǵ'an balıqlarda kesellik payda etiwshi parazitlerdi anıqlaw, olardıń tarqalıwınıń aldın alıw hám ayrımları menen gúresiw ilajların islep shıǵ'ıw.

Izertlewdiń ilimiy jańalıǵ'ı: Dawıtkól suw saqlag'ışı aq amur, tolstolob balıqlarınıń gelmintofaunaların, taza ekologiyalıq jag'dayda úyrenip shıǵ'ıw.

Usı 2 balıqtan tabılǵ'an barlıq gelmintlerdi, túrine deyin anıqlaw, onıń taralıwın qáwipli parazitlerin ayırıw.

Aq amur. Dawıtkól suw saqlag'ışına 15 dana aq amur izertlendi. Olar 6 túr gelmintler menen kesellengen. Bul tabılǵ'an gelmintlerdiń kópshiligi, aq amurdiń awqatlanıwına baylanıslı. Aq amur suw otları hám fiobentos penen awqatlanadı. Usı 6 túr gelminttiń 3 túri (50,0%) aralıq xojeyinde awqatlıq zat ushın jегende juqqan. Bulardıń ishinen Caryophyllaeus fimbriceps aq amurdiń organizminde eresek qurt dárejesine jetisedi. Basqa bentofaglarday aq amur kóldegi tsestodlar menen zıyanlanadı. Caryophyllaeus fimbriceps 60,0% boldı. Rawajlanıw tezligi 1-46 dana. Sonday aq aqamurda tabılǵ'an trematod Diplostomum spathaceum 66,6%. Intensivligi invitsii 1-138 dana boldı. Tsestodlardan Bothriocephalus opsariichthydis (33,3%, jedelligi 2-32 dana). Ulıwma alg'anda barlıq gelmintler balıqlarg'a, sonıń ishinde aq amurg'a awqatlıq zatlar menen ótedi. Tek monogenen hám rak tárizliler, balıqlar bir-birine jaqınlasqanda awırıw balıqtan saw balıqqa ótedi.

Izertlewdiń tiykarg'ı máseleleri hám boljawları. Dawıtkól suw saqlag'ıshı aq amur balıg'ındag'ı qáwipli parazitlerdiń shaqırg'an keselliklerin anıqlaw hám olar menen qarsı gúrestıń metodikası islenip usı ilajlar jardeminde kóldegi balıq ónimdarlıg'ı joqarılawg'a múmkinshilik jaratadı.

Kóldegi basqada balıqlardıń awqatlıq zatına baylanıslı, onıń parazitleriniń de ózgeretug'ın ekologiyalıq jag'daydı qarap shıg'ıp, kóldegi balıqlar parazitleriniń hár túrliligini anıqlanadı.

Izertlew teması boyınsha ádebiyatlar túsindirmesi. Balıq parazitlerin izertlew eń birinshi ret Aral teńiziniń balıqların izertlewden baslanadı. Bul jumıs basqa jumıslar menen qosıp alıp barıladı. Fedchenko degen ilimpaz Chexon balıg'ınan *Piscicola* sp, *Ergasilus* sp degen parazitlerdi Sarı-Shıg'anaq degen jerden kórsetedi. L.S.Berg (1908) jılı balıqlardan *Ligula* sp hám *Azigia lucii* degen gelmintlerdi kórsetken.

V.A.Dogeldiń bassılıg'ında 1930 jılı Aral teńizine ilimiy sapar shólkemlestirip, juwmag'ınan V.A.Dogel hám B.E.Bıxovski (1934) jılı «Fauna parazitov rıb Aralskogo morya»- degen monografiyasın baspadan shıg'aradı. Bul jumısta birinshi ret ápiwayılardıń 14 túrin, monogenen-19 túrin, trematodlardıń 11 túrin, tsestodlardıń 9 túrin, nematodtıń 10 túrin hám piyavkanıń 2 túrin, mollyuskanıń 1 túrin hám shayan tárizlilerdiń 5 túrin kórsetip ótedi³.

Aral teńizine 1951 jılı O'zbekstanlı alım S.O.Osmanov ekspeditsiya shólkemlestirip birinshi ret bul teńizdiń balıqlarınıń gelmentologiyasın izertlep, keyin A'miudárya hám basqada suwsaqlag'ıshların izertlegen. A'miudáryanıń balıqlarınıń parazitini birinshi ret teksergen alım V.A.Yakimov (1917) ılaqa balıg'ınıń qanınan *Cryptobia ninae* Kohl-Yakimovi hám *Haemogregarina turkestanica*-lardı kórsetken. V.Dogel hám Bıxovski (1934) A'miudárya deltasınan *Ostracochelone* balıg'ınan *Ixtyophthirius multifiliis*, diplozop paradoxit, diplostomum spataseum, postodiplostomum cuticola, repilocotil illenze, ergazilis sieboldi - degen parazitlerdi kórsetken. V.T.Ostrumov (1949) Vaxsh dáryasında jasaytug'ın úlken *Lepidion* balıg'ınıń qanınan *Cryptobia*

³ В.А.Догель хэм Б.Е.Быховский Фауна паразитов рыб Аральского моря М.: 1934 200 С.

pseudoscophizhynchi degen ápiwayı parazititi tapqan. Usı dáryadan B.N.Kazantsev (1949) peskar hám gambuziya balıqlarınan *Zernea cyprinacea* S.O.Osmanov (1952) A'miwdárya balıqlarınan 15 túr parazit kórsetken, onıń 8 túri A'miwdárya ushın birinshi ret jazılǵ'an. Usı avtor (1959, 1960) A'miudáryanıń deltasınan 780 balıq izertlep, olar 18 túr bolǵ'an. Utolstolobrdan 73 túr parazit kórsetedi. Olardıń ishinen 52 túri A'miwdárya ushın birinshi ret kórsetilgen. U.D.Djaliev (1966) A'miwdárya basseyinen birinshi ret *Trypanosoma danilewski*, *Tmarkewitschi*, h.t.b. S.O.Osmanov (1966) óziniń hám basqada ilimiy jumıslardag'ı túr parazitlerdi juwmaqlastırıp, A'miwdárya basseyinen 202 túr parazit kórsetedi. Ilimiy jumısımdı tayarlawda tiykarınan 55 ke jaqın ilimiy dereklerden hám internet materiallarınan paydalanıldı.

Izertlewde qollanılǵ'an metodikaniń si'patlamasi. Ilimiy izertlewler V.A.Dogel hám onıń shákirtleri hám dawam etiwshileri tárepinen tiykar salıńǵ'an ekologiyalıq parazitologiya printsipleri negizinde islendi.

Parazitologiyalıq jarıw hám materialdı fiksatsiyalaw, qayta islew V.A.Dogel islep shıqqan hám onıń shákirtleri (Markevich, 1951: Bıxovskaya-Pavlovskaya, 1985 hám t.b.) tárepinen jazılǵ'an hám ulıwma tán alıńǵ'an usıl boyınsha alıp barıldı. Bul usıl sońǵ'ı jılları basqa alımlar tárepinen toltırıldı (Sudarikov, Shigin, 1965; Gusev, 1983; Xotenovskiy, 1974).

Tolıq parazitologiyalıq jarıw ushın ele tiri yamasa jańa uyqıǵ'a ketken denesi kewmegen, awlaw quralları onsha zıyan tiygizbegen balıq alındı. Sırtqı kōrikten ótkeriwden aldın júreктен qan alıp mazok (predmet shiysha jag'ılǵ'an qan) islendi.

Balıqtı sırtqı kōriwden ótkermesten aldın izertlenip atırǵ'an balıqtıń túrin tolıq anıqlap aldıq hám onıń uzınlıǵ'ın, salmag'ın anıqlandı. Bul jumıslardı júdá tez, balıq kewip ketpesten burın islew kerek. Dene uzınlıǵ'ın ulıwma tumsıǵ'ınıń kiyninen quyırq qalashınıń sońına shekem hám qabırshaqlı qabaqtıń qabırshag'ınıń keynine shekem shtangentsirkul, santimetrli sızǵ'ısh yamasa metr ruletkası menen ólshenedi, biyikligin hám qushag'ın denesiniń eń kem ornıda ólshenedi. Aqamurnıń jasın anıqlaw ushın qabırshaq alınadı. Sırtın tolıq kōrip

bolg'annan keyin (teri, sag'aq, murin hám awız boslıg'ı hám ektoparazitlerdi) jıynap alıp bolıp ishki organlardı bōlip anıqlawg'a kirisiledi.

Izertlewlerdiń nátiyjeleri teoriyalıq hám ámeliy áhmiyeti.

Sol territoriyada júz berip atırǵ'an ekstremal ekologiyalıq jag'daylar keltirip shıǵ'arg'an ekologiyalıq faktorlar tásirinde tekserilgen balıqlar parazitofaunası kambag'allasqanı anıqlandı. Biraq *B.opsariichthydis*, *D.spathaceum*, *T.clavata*, *C.microcephalum*, *E.sieboldi* parazitleri joqarı zıyanlanıw protsentin kōrsetti.

Balıqlar parazitofaunası suwdıń temperaturası, xojeyinniń jası, tıǵ'ızlıǵ'ı, awqat spektri hám t.b. biotikalıq hám abiotikalıq faktorlarg'a baylanıslı ekenligi úyrenildi.

Biziń territoriyamızda *D.spathaceum*, monogeneya - *D.vastator*, *D.extensus*, tsestoda - *C.fimriceps*, koktsidiya - *E.carpelli*, *B.opsariichthydis*, trematoda *T.clavata*, nematoda - *C.microcephalum*, raktárizli - *E.sieboldi* qáwipli keselliklerdi qozǵ'awshı parazitler esaplanadı. Biziń materialımızda balıqlar olar menen joqarı dárejede zıyanlang'an.

Kesellik tuwdırıwshı patogen parazitlerdiń keń taralıwınıń aldın alıw hám olar menen qarsı gúres ilajları usınıladı.

Izertlewler nátiyjesinde balıqlardan adamg'a jug'atug'ın epidemiologiyalıq áhmiyetke iye parazitler tekserilmedi. Biraq olardıń territoriyamızda bolmawına isenim joq.

Bul territoriyada házirgi jaman ekologiyalıq jag'dayda balıq parazitofaunasınıń ózgeriwi dawam etpekte. Bul protsessti gúzetiw hám parazitler menen nátiyjeli gúres ilajların islep shıǵ'ıw, olardıń ekologiyası hám biologiyasın tekseriwge baylansılı.

Dawıtkōl suw saqlag'ıshına kōlindegi karp tárizlilerge kōrsetilgen parazitlerdiń ishinde kōbirek qáwipli (patogennıy) túrlerine pitkeriw qánigelik jumısında toqtap, olardıń kesellik shaqırıwshı parazitleri tiykarında kapr balıqınıń keselliklerin (daktilogiroz, botriotsefalez, tsistitserkoz, diplostomotoz, kontratsekomoz) lardı anıqladı hám olarg'a qarsı gúres ic ilajlardı Usı alıng'an tájriybeler tiykarında ámeliyatta fermer, balıqshılıq xojalıqlarında hám ixtiologiya tarawındag'ı qánigelerge kōrsetpe retinde qollanıw múmkin. Sonıń

menen birlikte joqarı oqıw ornı ixtiolog qánigelerine ushın balıq kesellikleri páninen sabaq ótiw maqsetke muwapıq.

Bul jumıstı orınlanıwda kóp jıllıq ilimiy mag'lıwmatlardan paydalanıldı, usı toplang'an mag'lıwmatlar tiykarında Respublikamızdın balıqshılıq hojalıqları, Dawıtkól kóliniń balıq parazitleriniń házirgi jag'dayı hám onıń balıqlarg'a tásir etiw dárejesi haqqında bir qansha mag'lıwmatlar analizlendi.

Jumıstın jazılıwı dawamında avtor tárepinen ilimiy materiallar tiykarında Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferentsiyalarda ilimiy maqalalar baspadan shıg'arıldı.

Jumıstın dúzilisi. Bul jumıstı orınlanıwında kóp jıllıq ilimiy dereklerden paydalanıldı, bul toplang'an mag'lıwmatlar tiykarında Respublikamızdın balıqshılıq hojalıqları sonıń ishinde Dawıtkól suw saqlag'ışına bioekologiyalıq sıpatlamaları suw sapalıq kórsetkishleri, suw mug'darları sapasınıń ózgeriwi haqqında bir qansha mag'lıwmatlar analizlendi.

Dissertatsiya tiykarınan 3 bōlimnen turadı, kirisiw, tiykarg'ı bōlim hám alıng'an nátiyjeleri bōliminen quralg'an, kōlemi 80 bet, 6 keste, 10 súwret hám qosımshalardan turadı.

Jumıstın jazılıwı dawamında avtor tárepinen 2__ ilimiy maqala _4_ tezis baspadan shıg'arıldı.

I. Bap

BALIQ PARAZITLERI BOYINSHA ALIP BARILG'AN ILIMIY IZERTLEWLER

1.1. Dawıtköl suw saqlag'ışınıń qısqaşa fiz-geografiyalıq sıpatlaması

Dawıtköl suw saqlag'ışına qısqaşa fiz-geografiyalıq sıpatlama beriledi. Bul aymaqta material jıynaw ushın statstionar izertlew jumısları alıp barıladı.

A'miwdárya deltası tegis jerlerden hám kewip atırg'an saxralardan ag'adı. Bul tegislikte Qızıljar, Qusqanataw, Porlıtaw biyiklikleri ushırasıp onıń biyikligi 123 m di quraydı. Dáryanıń jag'aları tik jarlıqlardan turadı. Yanvar ayınıń ortasha temperaturası - 7,5°C, tan 29-31°C, ayırım orınlarda -42°C qa jetedi. Jaz ayları júdá qurg'aq ıssı boladı. Ortasha iyul ayınıń temperaturası +26°C. Jıllıq túsetug'ın ıg'allıq 70-110 mm. Qar bolsa 25-30 kúndey erimey jatadı. Ayırım jıllarda qar jawmaydı. Bazı qıstıń qattı suwıq jıllarında jer 50sm hám onnan da kóbirek tońlaydı. Samal barlıq waqıtta esip turadı, klimatı qurg'aq klimat.

A'miwdáryanıń suw tarmaqları: A'miwdáryanıń negizgi ańg'arı, jasalma kanallar, köller, gōne kanallar. Buring'ı kanallardan házir tek Aqdarya qaldı, al Rawshan ang'arı bolsa jasalma kanalg'a aylandı. A'miwdáryanıń deltasında ılaylı jerler, tegislikler, taqırlar, kebirli jerler ushırasadı. O'simligi tog'aylıq hám galofitli.

A'miwdárya deltasınıń haywanlarınan kóbirek shoshqa, shag'al, túlki, laska, xorek, sasıq gúzen, porsıq, jabayı pıshıq, kemiriwshilerden tıshqan, ondatr ushırasadı. Quslardan 231 tur qus (Salixbaev, 1959, Abdreymov, 1971). Deltada 40 túrli balıq jasag'an. Olardıń ishinen awlanatug'ını aq shabaq, aq amur, kōk moyın torta, torta, jerex, sudak, laqa, aq amur, shortan h.t.b. suyretilip júriwshilerden suw jılanı hám jer suw haywanlarınan qurbaqalar bar.

Dawıtköl suw saqlag'ışını. A'miwdárya deltasınıń qubla oń tárepinde, Bozataw territoriyasında jaylasqan, Nōkistiń oń Arqa Batısında 40 km-den aslamıraq aralıqta jaylasqan. Dawıtköl kōp sandag'ı köllerdi biriktirip, sırtın ırash penen qorshap, olardan payda bolg'an. Dawıtköl suw saqlag'ışınıń

ulıwma maydanı 250-300 km². Bulardıń suwınıń qáddi birdey emes, A'miwdáryanıń kelip tusken suwınıń mug'darına baylanıslı. Dawıtkól sistemasına kiretug'ın köller: Andrey köli, Aqbaslı, Bir qazanlı, Biydaykól, Salıoy, Qara aydın, Xojakól, Köksuw, U'lken hám kishi Dawıt. Dawıtkól suw saqlag'ışınıń arqa-batıs bōlegi tábiyiy biyiklikler menen qorshalg'an, yag'nıy gōne Erkindáryanıń ırashı. Basqa jag'ınıń barlıg'ı topıraqtı úyip ırashlardan quralg'an. Irashtıń biyikligi 3-3,5 m, eni 4-6 m. Irashtıń uzınlıg'ı Qızıl úyden gōne Erkindáryanıń gōne ırashına deyin 26 km. Dawıtkól suw saqlag'ışı suwdı Karabekyarmış I hám II, onnan keyin kanal Aqeden hám Erkindárya kanalları, 1988 jılı olar Risoviy kanalı degen kanal arqalı suwlandırıldı. Risoviy kanal A'miwdáryadan sag'a alıp, Dawıtkólge quyadi. Bul kanalǵ'a kollektor suwları, jáne suwg'arıwdan qalg'an artıqsha suwlardı quyadi.

Dawıtkól suw saqlag'ıştıń pasportı boyınsha (1991), onıń uzınlıg'ı 30-32 km, eni 10-15 km. Tereńligi 7 m, ortasha 1,5-2 m. 2000-2003 jılları, suwdıń ortasha jıllıq temperaturası 14,2-15,7°S, eń joqarg'ı temperaturası iyulde (27-28°C) boldı. Suwdıń muz basıp jatıwı 2,5-3 ayg'a tuwra keledi. Dawıtkól suw saqlag'ışınıń suwınıń duzlılıg'ı 2,7 mg/l. Qıs aylarında balıqtıń kalima (zamor) bolıwı sezilgen joq. Dawıtkólde 69 túr fitoplankton tabılg'an, onıń biomassası jıldıń máwsimine qaray ózgeredi, eń azı qıs aylarında (0,785 g/m³) eń kōbi oktyabr aylarında (2,160 g/m³) Fitoplanktonnıń túrleride máwsimge qaray ózgeredi. Qıs aylarında jasıl, báhárde sarıjasıl hám diatomolı h.t.b.

A'miwdáryanıń basseyininde zooplanktonlar keń taralg'an, olardan omırtqasız haywanlardan-kolovratkanıń 8-túri, vetvistousie-6 túri, eskek ayaqlılardıń-10 túri, rakushkovılardıń, mezidlerdiń túrleri ushırasadı. Zooplanktonnıń ulıwma sanı 50 mın dana. Usınıń ishinen 95,9%-ti eskek ayaqlılarg'a tuwra keledi. (Aynazarov, 1972).

Zoobentos-58 turdi quraydı, bular 11 sistematalıq gruppanı quraydı. Zoobentoslar jıldıń máwsimine qarap ózgeredi. Bulardıń ishinen kōbirek ushırasatug'ını xironomidler bolıp esaplanadı. Zoobentoslardıń ortasha jiyililigi 288 ekz/m², onıń biomassası 1209 mg/m². Balıq xojalıg'ın rawajlandırıwg'a kōldegi tábiyiy balıqtıń awqatlıq zatı júdá az.

Dawıtköl suw saqlag'ışında tōmendegi túr balıqlar tirishilk etedi. Bulardan aq shabaq, torta, aq amur, koras, krasnoperka, jerex, shortan, aq amur, tolstolobik, jılan balıq, sudak, chexon, ılaqa, shemaya h.t.b.

Keyingi jılları suw saqlag'ıstıń balıqların, sırttan ákelingen balıqlar menen kōbeytilip atır. 2017 jılı awlanatug'ın balıqlardan kōbirek aq amur, torta, jerex, krasnoperka balıqları ushırastı. Biziń izertlegen dáwirimizde balıqlardıń hám basqada omırtqasız haywanlardıń kesellikler sebepli qırılǵ'anlıǵ'ı sezilgen jok.

Dawıtköl suw saqlag'ışınıń aydınlarında balıqlardıń uwıldırıq shashıwı ushın jaqsı sharayatlar bar, bulardan aq amur, torta, aq shabaq, karas balıqlarınıń mayda shabaqları júdá kōplep ushırasadı. Dawıtköl suw saqlag'ışında balıq jewshi quslardan súńgigir, úyrek, shag'alalar h.t.b. quslar ushırasadı. Dawıtköl suw saqlag'ışında tiykarınan kōldi suwlandırıw júdá jaman júrgiziledi.

Dawıtköl suw saqlag'ışına hár jılı balıqtıń túrlerin qoldan ōsirip, balıq shabaqların jiberip turadı. 1985 jılı karp, aq amur, tolstolobik balıqlarınıń mayda shabag'ın jiberdi. 1987 jılı jiberilgen karp, aq amur balıqlarınıń sanı 962220 dana boldı hám tolstolobiktiń sanı 647780 dana boldı, shabaklardıń ortasha salmag'ı 25 g.

Dawıtköl suw saqlag'ışınıń usınday áhmiyetin esapqa ala otırıp, balıq awlaw, qamıs tayarlaw hám eginlerdi suwg'arıw usag'an jumıslardı kōremiz. Dawıtköl suw saqlag'ışına hár jılı belgili deńgeyinen tōmen túsirmey suw berip turıw kerek. A'miwdáryanıń deltasındag'ı Dawıtköl suw saqlag'ışı balıq ōsiriwde eń perspektivnıy dushshı suwlı suwsaqlag'ısh.

Dawıtköl suw saqlag'ışında ixtiologiyalıq, gidrobiologiyalıq, parazitologiyalıq hám ornitologiyalıq izertlewler keńnen júrgizilgen. Mine utolstolobrdı esapqa ala otırıp, suwı dushshı, bul rayonnan suw haywanların qorg'aytug'ın Qaraqalpaqstan Respublikasındag'ı eń jaqsı rayon bolǵ'anlıǵ'ı ushın qorıq qana shōlkemlestiriwdi usınamız. Házirgi waqıtları kōller turaqsız, búgin bar bolsa, erteń kewip ketedi. O'simlik hám haywanatlardıń turleri jog'alıp baratır, sonıń ushın da olardı qorg'aw búgingi kúnniń eń tiykarg'ı wazıypası bolıp sanaladı dep oylaymız.

1.2. Balıqlardı parazitologiyalıq jaqtan izertlew tariyxı

Aral teńizi balıg'ınıń parazitin birinshi ret izertlegen ilimpaz T.A.Krepkogorskaya (1927), onıń jumısınıń atı «K faune nematod Aralskogo morya». Bunda 4 túr nematod kórsetilip, sonıń ishinde bir turi tolıq túrine deyin anıqlag'an.

V.A.Dogeldiń basshılıg'ında 1930 jılı Aral teńizine ilimiy sapar shólkemlestirip, juwmag'ınan V.A.Dogel hám B.E.Bıxovski (1934) jılı «Fauna parazitov rıb Aralskogo morya»- degen monografiya járiyaladı. Bul jumısta birinshi ret ápiwayılardıń 14 túrin, monogenen-19 túrin, trematodlardıń 11 túrin, tsestodlardıń 9 túrin, nematodtıń 10 túrin hám piyavkanıń 2 túrin, mollyuskanıń 1 túrin hám shayan tárizlilerdiń 5 túrin kórsetedi.

Balıq parazitlerin izertlew eń birinshi ret Aral teńiziniń balıqların izertlewden baslanadı. Bul jumı basqa jumıslar menen qosıp alıp barıladı. Fedchenko degen ilimpaz Chexon balıg'ınan *Piscicola* sp, *Ergasilus* sp degen parazitlerdi Sarı-Shıg'anaq degen jerden kórsetedi. L.S.Berg (1908) jılı balıqlardan *Ligula* sp hám *Azigia lucii* degen gelmintlerdi kórsetken.

1951 jılı S.O.Osmanov Aral teńizine ekspeditsiya shólkemlestirip birinshi ret bul teńizdiń balıqlarınıń gelmentologiyasın izertlegen. Keyin A'miudáryanı hám basqada suwsaqılag'ıshlardı izertlegen. A'miudáryanıń balıqlarınıń parazitin birinshi ret teksergen V.A.Yakimov (1917) ılaqa balıg'ınıń qanınan *Cryptobia ninae* Kohl-Yakimovi hám *Haemogregarina turkestanica*-lardı kórsetken. V.Dogel hám Bıxovski (1934) A'miudáryanıń deltasınan *Ostracochelone* balıg'ınan *Ixtyophthirius multifiliis*, *diplozop paradoxus*, *diplostomum spataseum*, *postodiplostomum cuticola*, *repilocotyl illenze*, *ergasilus sieboldi* - degen parazitlerdi kórsetken. V.T.Ostrumov (1949) Vaxsh dáryasında jasaytug'ın úlken *Lepomis* balıg'ınıń qanınan *Cryptobia pseudoscoleciphynchii* degen ápiwayı parazitti tapqan. Usı dáryadan B.N.Kazantsev (1949) peskar hám gambuziya balıqlarınan *Zernea cyprinacea* S.O.Osmanov (1952) A'miudáryanı balıqlarınan 15 túr parazit kórsetken, onıń 8 túri A'miudáryanı ushın birinshi ret jazılğ'an. Usı avtor (1959, 1960) A'miudáryanıń deltasınan 780 balıq izertlep,

olar 18 túr bolg'an. Utolstolobrdan 73 túr parazit kórsetedi. Olardıń ishinen 52 túri A'miwdárya ushın birinshi ret kórsetilgen. U.D.Djaliev (1966) A'miwdárya basseyinen birinshi ret Trypanosoma danilewski, Tmarkewitschi, h.t.b. S.O.Osmanov (1966) óziniń hám basqada ilimiy jumıslardag'ı túr parazitlerdi juwmaqlastırıp, A'miwdárya basseyinen 202 túr parazit kórsetedi.

Keyingi jılları A'miwdárya basseyinine, basqa jaqtan ákelingen balıqlar qosılıp, balıq túri kóbeytildi. Olardan iri ot-shöp jewshi aq amur, qara amur, aq tolstolobik, shubar tolstolobik, h.t.b. balıqlar. Bular Turkmenstan Respublikasınıń «Karametniyaz» atlı balıqshılıq xojalıg'ına alıp kelinedi. Olardıń mayda shabaqları Qaraqum kanalı arqalı A'miwdáryag'a kelip túsedi. Aq amur, shubar tolstolobik ósiriw ushın Qaraqalpaqstannıń burıng'ı salıgershilik DFX larına ákelingen, (Urazbaev,1973). Usı ákelingen balıqlardıń parazitlerin birinshi ret izertlegen O.N.Bauer hám Yu.A.Strelkov (1961, 1963) avtorlar «Karametniyaz» dan iri ot-shöp jewshi balıqlarg'a 8 túr parazit kórsetedi. Olardıń ishinen ey.ctenoharyngodontis, D.Iamellatus, D.ctenopharingo donis, D.hypophthalmichthys A'miwdárya basseyinine birinshi ret kórsetilgen. S.O.Osmanov, A.Urazbaev, O.Yusupov (1966) Qaraqalpaqstannıń sovxozlarınan ákelingen balıqlardıń parazitlerin izertlep, 5 túr parazit kórsetedi: Trichodina ovaliformis,, D.Iamellatus, D.nobilis, B.gowkongensis diplostomum spataceum.

O'zbekstan ilimler Akademiyasınıń Qaraqalpaqstan filialınıń parazitologiya laboratoriyasınıń bir gruppası ilimpazları 1961-1962 jılları Zarafshan dáryasınıń hám Zarafshan suw saqlag'ışınıń balıqların izertleydi. Iri ot-shöp jewshi balıqlardıń parazitlerin izertlegen ilimpazlar kōp, A'miwdáryanıń deltasında háwiz xojalıg'ınan hám tábiyg'ıy kōllerden izertlegen (S.O.Osmanov (1965), A.Urazbaev, O.Yusupov (1966).

A'miwdáryanıń deltasında ayırım gelmintlerdiń biologiyasın izertlegen K.Ubaydullaev (1961, 1965). Bul ilimpaz trematodlar klassınıń wákili postodiplostomum cuticola, hám Hysteromorpha tilovalardıń tirishilik tsiklin úyrengen. A.Urazbaev (1970, 1973), T.Allaniyazova (1975). Bul ilimpazlar B. Opsariichthydis-tiń biologiyasın izertlep shıqtı.

A'piwayı parazitler tuwralı A'miwdáryanıń deltasında ayırım jumıslar bar. Olardan S.O.Osmanov (1962), «Koktsidioz karpa v Uzbekistane», S.O.Osmanov (1963) «O protozoynıx bolezniyax karpa v tashkentskom prudxoze.» Sol avtor tárepinen (1963) «K poznaniyu paraziticheskix prosteyshix rıb Uzbekistana». S.O.Osmanov (1966) «Novie svedeniya o miksosporidiyax rıb Aralskogo morya», O.Yusupov. A'miudáryanıń deltasınıń balıqların júdá kōp ilimpazlar izertlegen, solardıń ilimiy jumısları monografiya bolıp jazıldı, ilimiy maqalalar solarg'a jámlendi. Olardan S.O.Osmanov (1971) «Paraziti rıb Uzbekistana» (530 bet). S.O.Osmanov, E.Arıstanov, K.Ubaydullaev, O.Yusupov (1976). «Voprosı parazitologi Aralskogo morya», S.O.Osmanov, E.Arıstanov, A.Urazbaev, O.Yusupov «Paraziti rıb i vodnıx bespozvonochnix nizovev Amudari», R.T.Tleuov (1981) «Noviy rejim Arala i ego vliyanie na ixtiofaunu» hám tag'ı basqalar.

Dawıtkōl suw saqlag'ışındag'ı A.I.Qurbanovanıń balıqlardıń kesellikleri hám olardı shaqırg'an, qáwipli parazitleri, sonday aq balıqlardıń parazitler faunası tuwralı ilimiy jumısları jariq kōrdi. A'miwdáryanıń deltasınan izertlegen balıqlardan 108 tur parazit kōrsetken bular tuwralı mag'lıwmatlar A.I.Kurbanova (2002).

II BAP

BALIQ PARAZITLERIN IZERTLEW METODIKASI

2.1. Izetrlew materialı, ornı hám usılları

Izertlewdi Dawıtkól suw saqlag'ıshı balıqlarınan jıynalg'an materiallar tiykarında alıp barıldı.

Jumıstıń metodikası hám izertlew ornın tańlag'anda izertlewdiń tiykarg'ı wazıypası A'miwdárya deltasında aq amurnıń ápiwayı parazitleriniń házirgi waqıttag'ı jag'dayına Dawıtkól suw saqlag'ıshınıń gidrorejminiń ózgeriwi balıq parazitlerine tásirlerin úyreniw esapqa alıng'an.

Izertlew usılında tolıq parazitologiyalıq jarıw usılı boyınsha dala jumısı dawamında Dawıtkól suw saqlag'ıshınan hár qıylı jastag'ı aq amur (15) hám tolstolob (15 dana) balıqları tekserildi. Izertlew ushın materialdı (balıqtı) Dawıtkól suw saqlag'ıshınan jergilikli balıqshılar menen birgelikte awlap alındı.

Aldın ala balıqlarg'a shabaq ushın islengen mayda tor, un gazinen tayarlang'an sachok, shavaqlar ushın arnawlı tral hám soros torınan islengen brenden, suwg'a taslap qoyılatug'ın torlar járdeminde uslanadı.

Izertlew metodikası V.A.Dogel hám onıń shákirtleri hám dawam etiwshileri tárepinen tiykar salıng'an ekologiyalıq parazitologiya printsipleri negizinde islendi.

Parazitologiyalıq jarıw hám materialdı fiksatsiyalaw, qayta islew V.A.Dogel islep shıqqan hám onıń shákirtleri (Markevich, 1951: Bıxovskaya-Pavlovskaya, 1985 hám t.b.) tárepinen jazılğ'an hám ulıwma tán alıng'an usıl boyınsha alıp barıldı. Bul usıl sońg'ı jılları basqa alımlar tárepinen toltırıldı (Sudarikov, Shigin, 1965; Gusev, 1983; Xotenovskiy, 1974).

Jumısta tolıq parazitologiyalıq jarıw ushın ele tiri yamasa jańa uyqıg'a ketken denesi kewmegen, awlaw quralları onsha zıyan tiygizbegen balıq alındı. Sırtqı kōrikten ótkeriwden aldın júrekten qan alıp mazok (predmet shiysha jag'ılğ'an qan) islendi.

Tájriybe maydanında aq amur balıg'ın jarıp kōriw barısı balıqtı sırtqı kōriwden ótkermesten aldın izertlenip atırg'an balıqtıń túrin tolıq anıqlap aldıq

hám onıń uzınlıg'ın, salmag'ın anıqladıq. Bul jumıslardı júdá tez, balıq kewip ketpesten burın islew kerek. Dene uzınlıg'ın ulıwma tumsıg'ınıń kiyninen quyırıq qalashınıń keynine shekem hám qabırshaqlı qabaqtıń qabırshag'ınıń keynine shekem shtangentsirkul, santimetrli sızg'ısh yamasa ruletkamenen ólshenedi, biyikligin hám qushag'ın denesiniń eń kem ornıda ólshenedi. Aq amurnıń jasın anıqlaw ushın qabırshaq alınadı. Sırtın tolıq kórip bolg'annan keyin (teri, sag'aq, murın hám awız boslıg'ı hám ektoparazitlerdi) jıynap alıp bolıp ishki organlardı bólip anıqlawg'a kirisiledi (1-súwret).



1-Súwret. Laboratoriya sharayatında balıqtı jarıp kóriw

Bizler izertlewdiń tómendegishe izbe-izligin qollandıq: júrek, sidik hám ót qaltashası, bawır, may tkanı, qarın, ishek, jınıs bezleri, talaq, búyrekk, kózler, bas miy, bulshıq et, toqımalar hám skelet (súyek).

Hár bir tekseriletug'ın organ dáslep sırtınan kórip shıg'ıldı. Ishki organlardı tekseriwde iri parazitler jıynap taza suw salıng'an Petri atlı chashkag'a

jaylastırıldı. Mayda parazitlerdi tabıw maqsetinde hár bir organdı bōlekshelerge bōlip eki shiysha (9 x 12 sm) arasında qısıw usılı menen binokulyar lupa astında 2^x obektiv va 8^x okulyarlarda kōrip shıǵ'ıldı, mazoklar bolsa mikroskop astında 90^x obektiv va 15^x okulyarlarda úyrenildi (2-súwret).



2-Súwret. Laboratoriya sharayatında balıq parazitlerin túrlerin anıqlaw

Jıynalg'an parazitlerdi qatırmastan (fiksatsiya) burın olarg'a jabısqań silkeyleri hám toqıma bōleklerinen ayırıp tazalap alındı. Ayırım parazitlerdiń bulshıq etlerin bosatıw ushın suwda kōp waqıt uslap turıldı. Barlıq parazitler tiriley qatırıldı.

Parazitlerdi qatırıw usılları olardıń qaysı sistemalıq gruppag'a tiyisli ekenligine hám izertlew wazıypalarına baylanıslı.

Kōp kletkalı parazitlerdiń kōpshiligin qatırıw hám turaqlı saqlaw ushın 70°C lı spirt paydalanıldı. Dōńgelek qurtlar Barbagallo suyıqlıǵ'ında (formalinniń 3%

li eritpesiniń as duzı fiziologiyalıq eritpesi menen aralaspası) qatırıldı hám barqulla saqlanbaqta.

Silekeylerden tazalang'an monogeneyalar glitserin - jelatinde qatırılıp olardan total preparatlar tayarlanadı.

Trichodinidae cemyasına tiyisli infuzoriyalardı úyreniw ushın juqa jabıw shiyshege (18 x 18 mm) toqımaların silekeyinen mazoklar alınıp hawada qurıtıladı. Mazokların bir bólimi Kleyn usılına baylanıslı azot kislotalı gúmistiń 2% li eritpesi menen islendi, al ekinshi bólimin soń Geydengayn boyınsha gematoksilin menen islew maqsetinde Shaudinn suyıqlıg'ı menen qatırıldı. Gúmislengennen soń infuzoriya berkiniw apparatınıń aq ilmekleri hám iliwshi jabısıwshı apparatınıń sızıg'ı anıq kōrinedi.

Laboratoriya sharayatında toqımaların silekeyinen mazoklar alınıw.

Gematoksilin preparatlarında jabısıwshı rozetkası, yadrosı, adoral búrmesi (spiralı) jaqsı kōrinedi.

Silekeyli sporalılardan keleshekte ólshew suwretin sızıw hám túrlerge ajratıw ushın tez glitserin - jelatin preparatlar tayarlap, olar mikroskop astında úyrenildi (3-súwret).

Trematoda hám tsestodalardı kompressor shiyshele (9 x 12 sm) arasında qısıp, 70 % li spirtte qatırıldı. Qatırılğ'an sorg'ısh parazitlerdi hám taspa qurtlardı kvaslı karminniń suwdag'ı eritpesinde boyaldı. Diplostomum semeystvosına tiyisli metatserkariyalar (lichinkalar) keleshekte 1 % li duz kislotalı spirtte ajratıw maqsetinde sirka kislotalı karminli preparatlar tayarlandı. Dimetilftalat preparatında suwsızlantırılğ'an hám ag'artılğ'annan soń balzamg'a qatırıldı. Bul protsesste V.E.Sudarikov hám A.A.Shigin (1965) tárepinen islep shıg'ılğ'an usıl paydalanıldı.

Barbagallo suyıqlıg'ında qatırılğ'an dōńgelek qurtlardı sut kislotasında tındırıldı.

Súlikler denesiniń tábiyiy forması hám pigmentlerin jaqsı saqlaytug'ın formalinniń 2% li eritpesinde qatırıldı. Parazit shayantárizliler hám baqanshaqlardıń (mollyuska) lichinkaları 70% spirtte qatırıldı.

Parazitlerdi kameralıq qayta islew hám túrlerge ajratıw O'zbekstan Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bōlimine qaraslı Tábiyiy ilimler izertlew institutı, Haywanatlar ekologiyası laboratoriyasında hám Tábiyattanıw fakultetiniń biologiya kafedrası laborotoriyalarında ótkerildi. Hár bir gruppа parazitlerining anıqlang'an juwmaqları Biologiya kafedrasınıń dotsenti, biologiya iliminiń doktrı professor M.Jumanov tárepinen tastıyqlap barıldı.

Parazitlerdi túrge ajratıw ushın boyalg'an hám boyalmag'an preparatlardan tısqarı olardıń suwretleri sıızıldı, mikrofotografiyası túsirildi hám sistematikalıq áhmiyetke iye ayırım organları ólshendi. Bul protsesste suwret sıızıw, ólshewde okulyar-mikrometr áspab-úskineleri qollanıldı.

Joqarıda aytılg'an parazitler sistematikasın belgilewde úsh tomalıq «SSSR faunası dushshı suw balıqları parazitleriniń anıqlag'ıshı» (Leningrad 1984, 1985, 1987) kitapları tiykar etip alındı (3-súwret).



3-súwret. Laboratoriya sharayatında balıq shabag'ınıń parazitin anıqlaw

2.2. Dawitkōl suw saqlag'ishı suwınıń ximiyalıq quramı hám ózgerisi

Dawitkōl suw saqlag'ishı suwınıń duzlılıg'ı, og'an túsip turg'an suwdıń quramına tıg'ız baylanıslı. Birinshi izeykeshtiń suwınıń ózinde bir jıldıń ishinde suwdag'ı duzdıń mug'darı 1,5 g/l den 6g/l mug'darına shekem ózgeredi. Bul tiykarınan qaysı egislik jerden qanday suwlardıń túskenine baylanıslı. A'lbette suwg'arıw kanallarınan kelip túsken suw menen izeykesh suwlarınıń arasında úlken ózgeristiń barlıg'ı hám memizge belgili. Biraqta duzlılıg'ınıń mug'darı hár túrli bolg'anı menen de suwınıń ximiyalıq quramı bir tipte-xlorlı sulfatlı yamasa sulfat-xlorlı bolıp, ionlarında natriy, kaliy basım bolıp keledi.

Suwdıń tiykarg'ı deregi egislik jerlerden ag'atug'ın bolg'anlıqtan biogen elementler menen júdá qanıqqan boladı. Olardıń ishinde belgili mug'darda azotlı ammiak duzları hám nitrat formaları, fosfor elementleriniń birikpeleri hám tag'ı basqalar boladı. Suw ximiyalıq quramınıń keyingi ózgerisleri 2005- jılǵı mag'lıwmatı boyınsha suwdıń duzlılıg'ı 2,55 g/l mug'darında bolg'an, ionlıq quramında natriy, kaliydiń, kúirttiń, xlordıń mug'darları júdá az bolg'an. Ulıwma burın dushshı suwlarda duzdıń mug'darı 0,5-1,2 g/l bolatug'ın bolsa, al házir 1 litr suwda duzdıń mug'darı 1,8-5,0 g/l bolg'an duzlı izeykesh suwları menen suwlanatug'ın boldı. Onnan basqada suwda biogen elementler ammiak, azot, fosfor hám pestitsidlerdiń qaldıqları júdá kóp.

Dawitkōl suwınıń turaqlasıp qalıplesiwi keyingi jıllarg'a tuwra keledi hám sol waqıtları suw hám jer astı hám jer ústi suwlar menen támiyinlenetug'ın ortasha duzlı köllerdiń qatarına kiretug'ın edi.

Suwdıń joqarg'ı qabatındag'ı duzdıń mug'darı tōmengi qabatındag'ıg'a qarag'anda bir qansha azlaw, suw túbinde sulfatlı duzlar kōbirek boladı. Suwdıń duzlılıg'ı máwsimge baylanıslıda ózgeredi. Báhar hám jaz aylarında suwdag'ı duz mug'darı gúz hám qıs aylarg'a salıstırg'anda tōmen boladı.

Báhar hám jazda suwdag'ı duzdıń quramı sulfatlı-xlorlı bolsa, al gúz hám qıs máwsiminde xlorlı-sulfatlı boladı.

Suwdag'ı erigen kislorod júdá ózgergish boladı. Joqarıda atap ótkenimizdey duzlılıqtıń máwsim boyınsha ózgerisinbaqlasaq, al suwda erigen kislorodtıń kún dawamında ózgeretug'ınlıg'ın atap ótiwimizge boladı. Mısalı,

jazda bir sutkanın özinde, tüşte suwdag'ı erigen kislorod 129-130% qanıqqan bolsa, keshke taman kún páseyip fotosintez protsessi ázizlegen dáwirde bul kórsetkish 60-64% tómenleydi, al tünde bolsa, sol köldin tap sol jerinde 30-38% ke shekem tómenlep ketedi. Sonlıqtanda suwda erigen kislorod, suwdın júdá özgergish kómpONENTI dep esaplanadı.

P.Xaynishtiń klassifikatsiyası boyınsha suwdag'ı erigen kislorodtı tómendegishe klasslarga böledi. Suwdın temperaturası 20°S bolg'an jag'dayda, erigen kislorodtıń mug'darı tómendegishe boladı.

1. Išetug'ın suwdag'ı kislorod 8,45-8,87 mg/l bul adam ishiwge jaramlı.
2. Az pataslang'an suw, bunda 8,45-7,5 m/l. bul suw mal suwg'arıwg'a jaramlı.
3. Pataslang'an suw, bunda 6,2-4,4 mg/l. mug'darında boladı ol öndiriste paydalanıladı.
4. Júdá pataslang'an suw, bunda kislorod 4,4-2,2 mg/l.
5. Kislorod 2,2-bolg'an suwları tazartpay paydalanıwg'a bolmaydı.

Sonlıqtanda balıqshılıq xojalıg'ında suwdag'ı erigen kislorodtıń mug'darın izertlew júdá úlken áhmiyetli. Suwdag'ı tirishilik etetug'ın organizmlerdiń kislorodtı talap etiwı de hár túrli. Tek balıqlardıń özlerinde de kislorodqa bolg'an talabı hár qıylı. Egerde suwdag'ı erigen kislorodtıń mug'darı 3,0 mg/l den tómenlep ketse, onda olar qalıymag'a ushırap jalpılamay qırılıp ketedi.

Dawıtköl suwında kislorodtıń mug'darı 5,7-12,2 mg/l yamasa 110% qanıqqan mug'darında bolg'an. Al házir taza suw túspey suwdag'ı kislorodtıń mug'darı 5,8-7,8 mg/l yamasa 56-75% qanıqqan.

P.Xaynishtiń klassifikatsiyası boyınsha Dawıtköl suwın II-klassqa yamasa az pataslang'an suwlar qatarına kirip, sharwashılıqta hám basqada maqsetlerge paydalanıwg'a boladı. Al adamlar ushın ishiwge jaramsız, al balıqshılıq xojalıg'ı ushın paydalang'an jag'dayda onıń meliorativlik ahwalın, suw almasıwın, kislorod mug'darın tez-tezden kózden ótkerip turıwı zárúr.

Dawıtköl suwınıń aktivlik reaktsiyası -RN máwsimge qaray ózgerip turadı. Qısta RN tın mug'darı 7,2-7,8, al jazdın kúnleri ayrım jag'daylarda 9-10

mug'darına jetedi. Korbonat angidrid SO_2 gazı, kōbeyip ketse suwda tirishilik etiwshiti organizmlerge qolaysız jag'day tuwg'ızadı. Onıń mug'darı qıstıń kúnleri 40 mg/l, al jazdıń kúnleri 20 mg/l artpawı kerek. Egerde ol 55-73 mg/l bolg'an jag'dayda balıqlardıń dem alıw jag'dayları bir qansha qıyınlasadı. 257 mg/l bolg'an jag'dayda júzip júriwden ayrılıp, qaptallap háreket etedi.

Dawıtkōl kōli átirapında ōsimlikleri hár túrli hám suw otlarınıń barlıg'ı anıqlang'an, al 2002-jılı 73 túri, ulıwma barlıq izertlengen dáwirde 37 túrdıń bar ekenligi anıqlang'an. Solardıń ishinde eń kōbi diatom suw otları bolıp 52,6% qurag'an, al kōk-jasıl suw otları 24,7%, jasıl -14,4%, evglenalılar 6,2%, perifitliler 2,1% quraydı.

2.3. Aqamur balıg'ınan tabılg'an parazitler sistematikası haqqında

Dawıtkōl kōlinen izertlengen aq amur hám tolstolob balıqlarınan tabılg'an parazitlerge ulıwma sıpatlama berilgen. Parazitlerdi úyrengende belgili bir sistemag'a salıp jazıw kerek. Bul bōlimdi jazıwda men dala materialların ōzimniń kúndeligimdeki mag'lıwmatlardan paydalandım. Onda parazitlerdiń sistematikalıq jaylasıwı, xojeyini, parazitlik qılatug'ın ornı (lokalizatsiya), tabılg'an ornı teoriyalıq hám ámeliy áhmiyeti sebepli parazitlerdiń ayırım túrleriniń úlken-kishiligi berilgen. Ulıwma parazitlerdiń zıyanlanıw protsenti (%) hám jedelligi (intensivnost) haqqında tolıq mag'lıwmatlar keltirilgen.

A'piwayılar yarım patshalıg'ı. Omırtqasızlar zoologiyasına kiretug'ın barlıq tipler ekige bōlinedi:

- 1) bir kletkalı.
- 2) kōp kletkalı.

Bir kletkalılarg'a tek ápiwayılar tipi kiredi. Bir kletkalı jániwarlarg'a **Protoaza**, kōp kletkalı jániwarlarg'a **Metaza** dep ataladı.

A'piwayılar tipine kiretug'ın jániwarlardıń hámмесiniń denesi bir kletkadan turadı. Bul kletka morfologiyalıq jaqtan kōp kletkag'a tuwra keledi. Fiziologiyalıq jaqtan hár qıylı boladı. Hár qıylı funktsiyanı atqaradı. Olardıń denesi júdá mayda bolıp, tek mikroskop arqalı kōrinedi. Basqa tiplerge

salıstırğ'anda bul tip júdá kesh ashılğ'an, sebebi bul tip mikroskop payda bolğ'annan keyin tabıla baslag'an. Birinshi ápiwayı jániwarlar XVII ásirдің ekinshi yarımnan keyin payda bolğ'an. Birinshi ret ápiwayılardıń denesi bir kletkadan turatug'ınlıg'ı XIX-ásirдің ortalarında Kelliker hám Zibold degen ilimpazlar tárepinen tabıldı.

A'piwayılardıń deneleri hár qıylı, bıraq barlıq organları bir kletkag'a ornalasqan. A'piwayılardıń denesi eki komponentten turadı. Birinshisi, tsitoplazma, ekinshisi - yadro. Qısqarıwshı hám awqat pisiriwshı vakuolları boladı. Yadrolar bir yamasa bir neshe boladı.

A'piwayı jániwarlardıń kletkaların tirishilik tsikli kóp kletkalı jániwarlardıń barlıq kletakaları, tek jınıs kletkalarınan basqası tirishilik tsikline iye emes.

Al ápiwayılardıń kletkaları tirishilik tsikline iye. Mine usınıń menen kóp kletkalardan pariq etedi. Tsikl aldı menen zigota dáwirinen baslanadı. Zigota bir yamasa bir neshshe böliniw dáwirin ótkeredi. A'piwayılardıń tag'ı bir ózgesheligi tsista payda etedi.

A'piwayılardıń jasaw ornı. Bir kletkalı organizmler dúnya júzinde kóp taralg'an. Kópshiligi dushshı hám teńiz suwında bentosta, planktonda jasaydı. Ayırım túrleri topıraқта jasaydı, shegedede tirishilik etedi. 3,5 mıńnan aslamı úy haywanlarında, adamda tirishilik etedi. Suwda jasaytug'ın ápiwayılar, bakteriyalardı hám basqada mikroorganizmlerdi jeydi, al ózide suwda jasaytug'ın balıqlardıń lichinkasına awqat boladı.

Al ayrımları jer sharınıń tropikalıq zonalarında awır bezgek keselliklerin adamlarda taratadı. Jıl sayın Indiyada hám basqa Aziyanıń, Afrikanıń tropikalıq bölimlerinde onlag'an million adam usı kesel menen awıradı. Bul keseldi payda etetug'ın bir kletkalı parazit sporalar tipine kiredi. Sarkomastigofotoralar tipine kiretug'ın parazit Oraylıq Aziyada uyqı keselligin payda etedi. Koktsidiyalar, tripanosomalar úy haywanlarında túrli keselliklerdi payda etip, malsharwashılıg'ına úlken zıyan keltiredi.

Solay teip, meditsina, veterinariya hám awıl xojalıg'ında paydası hám zıyanlarında bar. Qamshılılarg'a kiretug'ın ápiwayı organizmlerde tirishilik tsiklinıń kópshilik dáwirinde qamshısı bolıp, ol qozg'alıw, al geyparalarında

awqat uslaw jumısın atqaradı. Qamshılar deneniń aldı betinde ornasıp bir, eki, al geybirewlerinde kōp boladı. Qamıştı tsitoplazmanıń jipekke yamasa lentag'a usag'an ōsimshesi boladı. Barlıq qamshılardıń denesi sırttan pellikula menen oralg'anlıqtan dene belgili formag'a iye boladı.

Kōbeyiwi jınıssız hám jınıslı jol menen. Jınıssız kōbeyiwinde dene teń eki bōlekke uzınına bōlinedi. Jınıslı kōbeyiwi barlıq qamshılılarda tek bir g'ana jol menen ōtpeydi. Geypara qamshılılar jınıslı kōbeyiwinde birdey jınıs gametalar payda bolıp, olarg'a izogametalar delinedi. Soń bul gametalar ōz-ara qotolstolobdı, bunday qosılıwg'a izogomiya delinedi. Qamshılılardıń bir qatarında kōbeyiwi dáwirinde payda bolg'an jınıs kletkaları birdey bolmay birewi úlkenlew, al ekinshisi kishilew boladı. U'ikenlew jınıs kletkasında makrogameta, al kishilew jınıs kletkasına mikrogameta delinedi. Bul eki kletkanıń qosılıw protsessine «anizogomiya» delinedi. Volvokslarda haqıyqıy aktiv qozg'alatug'ın spermatozoidlar hám máyek kletkalardı payda boladı. Spermatozoidtıń hám máyek kletkalarınıń qosılıw protsessine ogamiya delinedi.

Tōmende: 7 tip, 9 klass, 15 otryad, 20 semeystvo, 26 tuwısqa iye 32 túr parazitler úyrenildi.

2.1. Myxobolus mulleri Butschli, 1882

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: bawır

Tabılg'an jeri: Dawıtkōl kōli

Túrdiń sıpatlaması (biziń mag'lıwmatımız): Bul túr parazit tsistasınıń úlkenligi 0,87 mm quradı. Oval sporalarında interkapsulyar shaqı anıq bilinip turadı. Onıń úlkenligi 9,8-11,5 x 8,8 mkm, kapsulalardıń uzınlıg'ı 4,8, olardıń diametri 2,1 mkm.

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Bul túrdiń bir sporası 20 protsent aqamur balıg'ınan tabıldı.

Tip: Kirpikliler - **Ciliophora Doflein, 1901**

Klass: Perdeawızlılar - **Hymenostomata Delage et Heranard, 1896**

Otryad: **Tetrahymenida faure - fremiet, 1956**

Semeystvo: **Ophryoglenidae Kent, 1882 emend Kohl, 1932**

TuwiS: **Ichthyophthirius fouwuet, 1876**

Tip: Sporalılar - **Sporozoa Leuckart emend. Krylov, Dobrovolsky, 1980**

Klass: Koktsidiyalar - **Coccidiomorpha Doflin, 1901 emend Krylov, 1980**

Otryad: **Coccididae Labbe, 1889 emend Krylov, 1980.**

Semeystvo: **eimeridae Leger, 1911**

TuwiS: **Eimeridae Schneider, 1875**

2.2. Eimeria carpelli Leger et Stankovitsh, 1921

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: ishek diywalı

Tabılg'an jeri: Dawıtköl kōli

Túrdiń sıpatlaması (biziń mag'lıwmatımız): Bul koktsidiya ootsistaları dōńgelek formada bolıp, ol 4 sporadan ibarat. Al sporaları bolsa máyektárizli formada boladı. Hár bir sporada 2 qurtsıyaqlı sporozoit bor. Spora orayındag'ı sporozoitlar arasında bōlek dúziliske iye qaldıq dene bar. Ootsistalardıń diametri 5-12 mk, sporaları 3,5-6,0 x 2,5-4,9 mk. Sporalar uzınlıg'ı enine qaraqanda 1:1,1 den 1:1,7 ge shekem jetti.

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Aqamurnıń zıyanlanıw dárejesi 60,0% quradı, gezlesiw jedelligi - 1 tsista (mikroskoptıń obektiv 40^x va okulyar 15^x úlkenliktegi bir kōrinis maydanında).

Tip: Knidosporidiyalar - **Cnidosporidia Do%lein, 1901 emend. Schulman et Podlipaev, 1980**

Klass: Silekeyli sporalılar yamasa Miksosporidiyalar - **Myxosporidia Butschli, 1881**

Otryad: **Bivalvulea Schulman, 1959**

Semeystvo: **Myxobolidia Thelohan, 1892**

TuwiS: **Myxobolus Butschli, 1892**

2.3. Myxobolus pseudodispar Gorbunova, 1936

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: bulshıq etler

Tabılg'an jeri: Dawıtköl suw saqlag'ıshı

Túrdiń sıpatlaması (biziń mag'lıwmatımız): Vegetativ basqıshı (stadiyası) dumalaq yamasa máyektárizli (oval) tsistalardan ibarat bolıp, olardıń úlkenligi 0,511 x 0,213 mm. Sporasınıń uzınlıg'ı 10-12, eni 6,5-8,0, qalınlıg'ı 5,2-6,0 mkm, olardıń diametri joqarıdag'ıg'a muapıq 3,3-3,9, 2,6 va 2,7 mkm.

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Tekserilgen aqamur balıg'ınıń 5,8 % bul sporalılar wákili menen zıyanlang'an, olardıń gezlesiw jedelligi onsha kóp (2 tsista) emes.

2.4. Ichthyophthirius multifiliis fouwuet, 1876

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: terisi hám sag'ag'ı

Tabılg'an jeri: Dawıtkól suw saqlag'ıshı

Túrdiń sıpatlaması (biziń maálıwmatımız): Dene dōńgelek yamasa máyek tárizli, aldıńg'ı tárepinde tar iri infuzoriya esaplanadı. U'ikenligi 0,4-0,7 mm.quraydı. Kishkene dōńgelek awzı (tsitostom) uzınshaq kirpikler menen qaplang'an. Denesiniń barlıq ústi meridional qatar jaylasqan kirpiksheler menen qaplang'an. Qalın hám qısqa taqatárizli makronukleusi denesiniń ortasında jaylasqan. Denesiniń ústine jaqın jaylarda kóp sandag'ı mayda qısqarıwshı vakuollar ashılğ'an.

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Tekserilgen 34 balıqtıń úshewinen (8,8%) tabıldı. Hár balıqtıń 1-4 dana infuzoriya ushradı.

Klass: Peritricha Stein, 1819

Otryad: Peritrichida T. Stein, 1959

Semeystvo: Trichodinidae Claus, 1874

TuWıs: Trichodina Ehrenberg, 1831

2.5. Trichodina luciopercae Lom, 1970

Xojeyini: tolstolob

Lokalizatsiya: sag'ag'ı

Tabılg'an jeri: Dawıtkól kōli

Túrdiń sıpatlaması (biziń mag'lawmatımız): Jasıratug'ın disktıń diametri 28,2-37,0 tıń sırtqı ōsimsheleriniń sheti venchiktıń diametri 24,8-32,8, tis

konusınıń orayı boyınsha venchik diametri 18,4-22,4, tistiń sırtqı ōsimshesiniń uzınlıg'ı 4,0-5,6, tistiń ishki ōsimshesiniń uzınlıg'ı 4,8-7,2 mkm. Venchiktegi tisler sanı 22-24 dana, jasırınıw diski ilmeginiń sanı 7-8 dana, shetki perdesiniń eni 3,6-4,0 mkm quraydı.

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Izertlengen tolstolob balıqlarınıń 8,3 % zıyanlang'an hám olarda 2-5 (2,9) infuzoriya kōrildi.

Tuwıs: **Trichodinella Sramek - Hysek, 1953**

2.6. Trichodinella epizootica (Raabe), 1950

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: sag'ag'ı

Tabılg'an jeri: Dawıtkōl kōli

Tūrdiń sıpatlaması (biziń mag'lıwmatımız): Bul tūr infuzoriyanıń denesi qalıń qalpaqsha formasında boladı, diametri 25,5 x 45,5 mkm. Onıń jasırınıw diskiniń diametri 13,5 x 29,5, venchiktiń diametri 6,5 x 22,5 mkm. Tisleriniń sanı 18-30 quraydı. Olardıń sırtqı ōsimshesi tuwrı jaylasqan hám venchikke radial bag'darlang'an ishki ōsimshesi bolmaydı. Tistiń oraylıq bōliminiń ishki tárepi azg'ana ishke qaray shıg'ıp turadı. Hár bir tiske jasırınıw diskiniń 4 dana ilmegi tuwra keledi. Makronukleustıń diametri 12,5-22,5, mikronukleustıń uzınlıg'ı 2,6-4,9 mkm quradı.

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Tekserilgen aqamur balıg'ınıń 5,8% te 5 infuzoriyalar ushrastı.

2.7. Trichodinella subtilis Raabe, 1962 (7-súwret).

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: sag'ag'ı

Tabılg'an jeri: Dawıtkōl kōli

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Izertlew ushın jarılg'an aqamur balıg'ınıń 32,3 % zıyanlang'an, hár bir zıyanlang'an balıqta ortasha 4 dana infuzoriya ushrastı.

Tip: Qurtlar - **Plathelminthes**

Klass: Monogeneyalar - **Monogenea (Van Beneden, 1858) Bychowsky, 1937**

Otryad: **Dactylogyridea Bychowsky, 1937**

Semeystvo: **Dactylogyridea Bychowsky, 1933**

Tuwıs: **Dactylogyrus Diesing, 1850**

Trichodinella subtilis. Aqamur balıg'ının sag'ag'ınan aling'an (4-súwret).



4-Súwret. Aq amur balıg'ının sag'ag'ındag'ı parazitlerdi tekseriw

2.8. **Dactylogyrus anchoratus (Dujardin, 1845)**

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: sag'aq japraqları

Tabılg'an jeri: Dawıtköl kōli

Túrdiń protsenti hám jedelligi: Daktilogiruslardıń bul túri tekserilgen aqamur balıg'ının 67,6% ten tabıldı. Zıyanlang'an balıqlarda bul qurt 4 ten 18 danag'a (9,5) shekem ushrastı

2.9. **Dactylogyrus extensus Muller et Van Cleave, 1932**

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: sag'aq japraqları

Tabılg'an jeri: Dawıtköl kōli

Túrdiń sıpatlaması (biziń mag'lıwmatımız): Bul túr iri daktilogiruslardan esaplanıp, biziń materialda úlkenligi 1,5 x 0,30 mm shekem jetti. Jasırınıw diski jaqsı rawajlang'an. Ortańg'ı ilmekleriniń ulıwma uzınlıg'ı 0,057-0,069 mm, olardıń tiykarg'ı bōliminiń uzınlıg'ı 0,049-0,057 hám ushınıń uzınlıg'ı 0,011-0,014 mm boldı. Ortańg'ı ilmekleriniń ishki ōsimsheleriniń uzınlıg'ı 0,023-0,029 mm, al sırtqı ōsimsheleriniki 0,011-0,014 mm quraydı. Shetki ilmekler bir

qıylı uzınlıqqa iye emes (0,025-0,029). Jabısıw diskinde tek bir biriktiruwshi plastinkası bar. Onıń eki ushı keńeygen bolıp keledi. Kopulyativ organı (0,069 mm) qıysayg'an nay hám strejenge uqsas tayanış dúzilmesinen quralg'an.

D. extensus evrigalin hám evriterm parazit esaplanadı. Bul túr kislorodtıń mug'darına júdá sezilerli. Aqamur hám karp balıqlarınıń hár qıylı jastag'ılarda hám parazitlik eteberedi. Onıń balıqlarda kesellik tuwdırırwshi uqıplılıg'ı kúshli, yag'nıy patogen forma.

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Tekserilgen aqamur balıg'ınıń 85,3 % usı túr menen zıyanlang'an, olarda 2 den 175 danag'a ushrasqan (ortasha 92,5 danadan tuwra keldi).

2.10. *Dactylogyrus vastator* Nybelin, 1924

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: sag'aq japraqları

Tabılg'an jeri: Dawıtkıl suw saqlag'ışı

Túrdiń sıpatlaması (biziń maqlıwmatımız): Bul túr daktilogirus da iri (0,56 mm), bıraq **D.extensus** tan sál kishirek. Ortańg'ı ilmekleriniń ulıwma uzınlıg'ı 0,057 mm, tiykarg'ı bōlimi -0,032 mm, ushı - 0,004 mm. Ortańg'ı ilmeklerdiń ishki ōsimshesi (0,016 mm) sırtqısında (0,009 mm) uzınıraq. Biriktiruwshi plastinka ushlarına qaray keńeygen hám onıń eni 0,031-0,033 mm. Shetki ilmeklerdiń uzınlıg'ı 0,036 mm ge shekem jetedi. Balıqlar tiykarınan shabaqlar ushın qáwipli túr boladı.

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Izertlengen aqamur balıg'ınıń 11,7% sol daktilogirus menen zıyanlang'an. Zıyanlang'an balıqlarda parazit az mug'darda (1-3 dana) ushrastı.

2.11. *Dactylogyrus minutus* Kulwieci, 1927

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: sag'aq japıraqları

Tabılg'an jeri: Dawıtkıl kōli

Túrdiń sıpatlaması (biziń mag'lıwmatımız): Bul túr alding'ılarg'a salıstırğ'anımızda mayda, onıń úlkenligi 0,45 x 0,09 mm. Ortańg'ı ilmeklerdiń ulıwma uzınlıg'ı 0,033-0,042 mm, tiykarg'ı bōlimi 0,028-0,030, ishki

ōsimshesiniń uzınlıg'ı 0,013-0,015, al sırtqısınlıqı - 0,005, ushı 0,013-0,015 mm, biriktiriwshi plastinkasınıń eni 0,016-0,017, kopulyativ organnıń ulıwma uzınlıg'ı 0,029-0,030 mm quraydı.

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Izertlengen aqamur balıg'ınıń 32,3% **D.minutus** menen zıyanlang'an. Zıyanlanıw jedelligi 2-8 dana (4,7) qurttı quraydı.

Semeystvo: **Ancyrocephalidae Bychowsky, 1937**

Tuwıs: **Ancyrocephalus Creplin, 1839**

2.12. **Ancyrocephalus paradoxus Creplin, 1839**

Xojeyini: tolstolob

Lokalizatsiya: sag'aq japraqları

Tabılg'an jeri: Dawıtkōl kōli

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Bul túr tekserilgen tolstolob balıg'ınıń 58,1% nen tabıldı, jedelligi 1-19 (13,4) dana qurttı quradı.

Bul gelmintti birinshi ret V.Dogel hám B.Bıxovskiylar (1934) Aral teńizinde tolstolob balıg'ınan kōrsetkenler hám olar qızıqlı mag'lıwmatlardı jazg'an: bul parazit jabısg'an sag'aq japraqları epiteliyasında keskin ōzgeris payda boladı hám bazı bir waqıtları onnan qan ag'adı. Balıq sag'ag'ına parazit qattı jasırınıp alıp, onı zıyanlamay alıw qıyın ekenligin xabarlaydı. Bul mag'lıwmat **A.paradoxus** tıń patogen forma ekenliginen derek beredi.

Otryad: **Gyrodactylidea Bychowsky, 1937**

Semeystvo: **Gyrodactylidea (Van Beneden et Hesse, 1863, Cobeold, 1864)**

Tuwıs: **Gyrodactylus Nordmann, 1893**

2.13. **Gyrodactylus medius Kathariner, 1893**

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: terisi

Tabılg'an jeri: Dawıtkōl kōli

Túrdiń sıpatlaması (biziń mag'lıwmatımız): Bul Tuwıstıń wákılleri tiri tuwatug'ın qurtlardan boladı. **G. medius** tıń denesi arqadan qarınǵa qısılg'an hám onıń úlkenligi biziń materialda 0,25-0,30 x 0,08-0,10 mm. Jasırınıwshı disk jaqsı rawajlang'an hám onıń úlkenligi 0,08 x 0,081-0,10 mm quradı. Ol 16

shetki ilmek (0,021-0,023 mm) hám 2 ortańǵ'ı ilmek (0,041-0,45 mm) ler menen qurallang'an. Biriktiruwshi plastinkasınıń eni 0,017-0,019 mm quradı.

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Tekserilgen 8,8% aqamur balıǵ'ı tek 2 dana qurt menen zıyanlang'an.

2.14. Gyrodactylus elegans Nordmann, 1832

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: terisi

Tabılǵ'an jeri: Dawıtkıl kóli

Túrdiń sıpatlaması (biziń mag'lıwmatımız): Biziń materialımızdag'ı **G. elegans** tıń denesi úlkenligi 0,75-0,80 mm. Jasırınıwshı apparatı jaqsı rawajlang'an hám ol ulıwma denesinen ajıralıp turadı. Ortańǵ'ı ilmeginiń ulıwma uzınlıǵ'ı 0,082 mm shekem jetti. Ushınıń uzınlıǵ'ı 0,035 mm. Tiykarg'ı biriktiriwshi plastinkası úlkenligi 0,008-0,009 x 0,033-0,036 mm. Shetki ilmekleriniń uzınlıǵ'ı 0,041-0,043 mm.

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Tekserilgen aqamur balıǵ'ınıń 17,6% tı usı **G. Elegans** túri menen zıyanlang'an. Jedelligi onsha kóp emes (1-3 dana qurt).

Tuwıs: **Eudiplozoon Khotenovsky, 1984**

2.15. Eudiplozoon nipponicum Goto, 1891 (suuret 3)

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: sag'ag'ı

Tabılǵ'an jeri: Dawıtkıl kóli

Túrdiń sıpatlaması (biziń mag'lıwmatımız): Biziń materialımızda bul qurttıń dene uzınlıǵ'ı 4,5-5,5 mm, eniniń keń jayı 0,6-0,8, aldınǵ'ı tárepiniń keyingisine qarag'anda 1,4:1, awız boslıǵ'ındag'ı sorg'ışınıń diametri 0,155-0,163 mm. Ortańǵ'ı ilmeklerdiń tiykarı bóliminiń uzınlıǵ'ı 0,018 mm. Jasırınıwshı klapanlar bir qıylı.

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: U'yrenilgen aqamur balıǵ'ınıń 32,3% bul qurt menen zıyanlang'an, jedelligi 2-8 (3,6) dana gelmintti quradı.

Tuwıs: **Paradiplozoon**

2.16. Paradiplozoon homoion homoion (Bychowsky et Nagibina, 1959)

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: sag'ag'ı

Tabılg'an jeri: Dawıtköl köli

Zıyanlanıw prtsenti hám jedelligi: Izertlengen aqamur balıg'ınıń 38,2 % **P.homoion homoion** menen zıyanlang'an. Jedelligi 2-16 (11,3) dana gelmintti quraydı.

Klass: Taspa qurtlar - **Cestoda Rudolphi, 1808**

Otryad: **Caryophyllidae Van Beneden in Carus, 1863**

Semeystvo: **Caryophylleidae Leuckart, 1878**

Tuııs: **Caryophyllaecus Muller, 1787**

2.17. Caryophyllaecus fimbriceps Annenkova - Chlopina, 1919

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: ishek

Tabılg'an jeri: Dawıtköl suw saqlag'ışı

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Izertlengen aqamur balıg'ınıń 14,7 % ti mına taspa qurt menen zıyanlang'an. Olarda parazittiń ushrasıw jedelligi 1 den 6 danag'a shekem (4,2) boldı. Kariofilleustiń bul túri patogen (kesellik payda etiwshi uqubına iye) esaplanadı.

Otryad: **Pseudophyllidea Carus, 1863**

Semeystvo: **Bothriocephalidae Blanchard, 1849**

Tuııs: **Bothriocephalus Rudolphi, 1808**

2.18. Bothriocephalus opariichthydis Yamaguti, 1934

(sinonim: **B. gowkongensis Yeh, 1955**)

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: ishek

Tabılg'an jeri: Dawıtköl köli

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Izertlengen 20,5 % aqamur balıg'ınan usı taspa qurt tabıldı. Onıń jedelligi 1-5 (3,7) dananı quradı.

1963 jılı **B. opariichthydis** Amur dáryası hám Qıtay suw hawızlerinen alıp kelingengen aq amur balıg'ı menen biziń territoriyamızg'a tosattan kelip qalg'an (Osmanov, 1963). Ol parazit házir Aral teńizi hawızinde hár qıylı semeystvog'a

tiyisli 27 túr balıqda parazitlik etiwi ayılg'an. A.Urazbaev (1970) A'miwdáryanıń tōmengi ag'ımında onıń rawajlanıw tsiklin úyrendi hám itimallıq xojeyin bolatug'ın tsiklop túrlerin anıqladı. Ol patogen túr bolıp, kōpshilik balıqlarda kesellik payda etedi.

Otryad: **Cyclophyllidae Braun, 1900**

Semeystvo: **Dilepididae Railliet et Hehry, 1909**

Tuwıs: **Cyclophynchus (Nordmann, 1832)**

2.19. Gryporhynchus pusillum (Nordmann, 1832)

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: ishektiń silekey perdesi

Tabılg'an jeri: Dawıtkōl kōli

Túrdiń sıpatlaması (biziń mag'lıwmatımız): Bul túrdiń lichinkası balıqlarda parazitlik etedi. Lichinkasınıń denesi almurttárizli bolıp, onıń úlkenligi 0,3-0,4 x 0,25-0,28 mm. Bası tōrt sorg'ısh menen qurallang'an, olardıń diametri 0,10-0,11 mm. Joqarıdag'ı qatar ilmeklerdiń uzınlıg'ı 0,043-0,045 mm, al tōmendegisiniki 0,028-0,030 mm.

Eresek qurtlar balıqshı quslardıń qotannıń isheginde parazitlik etedi. A.Turemuratov (1964) biziń territoriyamızda onı kúl reń qotannan tapqan. S.O.Osmanov (1959) Aral teńizinde bul parazitti balıqlardan birinshi bolıp tapqan. Soń bolsa bmr qatar izertlewshiler Aral háviziniń hár qıylı uchastkalarınan kōrsetken (Jalilov, 1966; Allamuratov, 1966; Yusupov, 1980).

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Izertlengen aqamur balıg'ınıń 14,7% zıyanlang'an. Hár bir tekserilgen balıqda 1-6 (4,5) dana gelmint ushrastı.

Klass: Trematodalar - **Trematoda Rudolphi, 1808**

Otryad: **Bucephalidida Odening, 1960**

Semeystvo: **Bucephalididae Poche, 1907**

Tuwıs: **Bucephalus Baer, 1827**

2.20. Bucephalus polymorphus Baer, 1827

Xojeyini: tolstolob

Lokalizatsiya: ishek

Tabılg'an jeri: Dawıtkōl kōli

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Tekserilgen 62,5% tolstolob balıg'ı usı trematoda menen zıyanlang'an. Onıń ushrasıw jedelligi og'ada kōp (4 ten 235 (105,8) danag'a shekem) mug'dardı quradı. Aral hám A'miwdárya hawızlerinde onı birinshi ret S.O.Osmanov (1971) shortan, tolstolob hám alabug'a balıqlarınan tawg'an.

Tuwıs: **Rhipidocotyle Diesing, 1858**

2.21. Rhipidocotyle companula (Dujardin, 1845)

(cinonim: Rh.illense (Zeigler, 1883))

Xojeyini: tolstolob

Lokalizatsiya: ishek

Tabılg'an jeri: Dawıtkōl kōli

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Bul gelminttiń eresek forması tolstolob balıg'ınıń 29,1% tabıldı, ushrasıw jedelligi 5-51 (33,3) dananı quradı.

Semeystvo: **Gorgoderidae Looss, 1901**

Tuwıs: **Phyllodistomum Braun 1899**

2.22. Phyllodistomum elongatum Nybelin, 1926

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: bōteke

Tabılg'an jeri: Dawıtkōl kōli

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Bul trematoda úyrenilgen aqamur balıg'ınıń 23,5% ten tabıldı. Tekserilgen balıqlarda 2-7 (2,6) dana parazit esapqa alındı.

Aral hawızine birinshi ret V.Dogel hám B.Bıxovskiylar (1934) tárepinen kōrsetilgen. Soń bolsa S.O.Osmanov (1971) onı bul hawızdiń hár qıylı uchastkalarınan tapqan. Bul parazitiniń tserkariyasın (lichinkasın) E.Aristanov (1986) A'miwdáryanıń quyar ag'ımındag'ı **Anodonta piscinalis** atlı shıg'anaqtan (mollyuska) taptı.

Otryad: **Fasciolida Scrjabin et Schulz, 1937**

Semeystvo: **Diplostomatidae Poirier, 1886**

Tuwıs: **Diplostomum Nordmann, 1832**

2.23. Diplostomum spathaceum (Rudolphi, 1819)

Xojeyini: aqamur hám tolstolob

Lokalizatsiya: kōz qarashıg'ı

Tabılg'an jeri: Dawıtkōl kōli

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Izertlengen 47,0 % aqamur (jedelligi 2-27 (19,1) dana) hám 66,1 % tolstolob (jedelligi ortasha 7,6 dana) balıqları bul tır menen zıyanlang'an.

D. spathaceum nıń metatserkariyası balıqlarda, tserkariyası **Lymnea stagnalis** atlı baqanshaqtan (Aristanov, 1986), al eresek úlken qurtlar bolsa chaykadan (Turemuratov, 1964) tabıldı.

Tuwıs: **Tylodelphys Diesing, 1850**

2.24. **Tylodelphys clavata Nordmann, 1832**

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: kōzdiń shiysha tárizli denesi

Tabılg'an jeri: Dawıtkōl kōli

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Bul tylodelfis menen tekserilgen 8,8 % aqamur (jedelligi 1 den 10 g'a shekem (5,7)) hám 50,0 % tolstolob (jedelligi 2 den 24 (14,7) ge shekem balıqları zıyanlang'an.

Bul lichinkanıń quslarda parazitlik etetug'ın eresek dáwrin **Tylodelphys conifera (Mechlis, 1864)** dep ataladı. Tserkariyasın **Cercaria C.latifera Tuhrmann, 1916** A'miwdárya quyar ag'ımındag'ı baqanshaqlardan (E.Aristanov, 1986), eresek úlken parazitti A. Turemuratov (1964) poganka qusınan kōrsettiler.

Aral teńizinde onı balıqlardan birinshi ret V.Dogel hám B.Bıxovskiylar (1934) tárepinen tabılg'an, al S.O.Osmanov (1971) bul parazitti 23 tır balıqtan kōrsetken.

Tip: Nematgelmintler - **Nemathelminthes**

Klass: Nematodalar yamasa dōńgelek qurtlar - **Nematoda Rudolphi, 1808**

Otryad: **Trichocephalida (Skrjabin et Schulz, 1928)**

Semeystvo: **Capillariidae Neveu-Lemaire, 1936**

Tuwıs: **Capillarif Leder, 1800**

2.25. **Capillaria tomentosa Dujardin, 1843**

Xojeyin: aqamur

Lokalizatsiya: ishek

Tabılg'an jeri: Dawıtköl kōli

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: U'yrenilgen aqamur balıg'ınıń 38,2% zıyanlang'an. Olarda parazittiń ushrasıw jedelligi 1 den 15 ke shekem (11,5) boldı.

2.26. Raphidascaris acus (Bloch, 1779)

Xojeyini: tolstolob

Lokalizatsiya: ishek diywalı

Tabılg'an jeri: Dawıtköl kōli

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Bul nematoda lichinkası 8,3 % tolstolob balıg'ınan tabıldı. Parazittiń ushrasıw jedelligi ortasha 1,5 dana. Bul dōńgelek qurttıń dáslepki hám tiykarg'ı aqırg'ı xojeyini shortan balıg'ı esaplanadı. Onıń aralıq xojeyini wazıypasın oligoxetalar, xironomid lichinkaları hám aqbas (mokrets) qurtlar oynaydı.

R.acus birinshi ret Aral teńizinen T.A.Krepkogorskaya (1927), soń V.Dogel hám B.Bıxovskiylar (1934) tárepinen kōrsetildi. A.I.Agapova (1962), M.N.Kolesnikovalar (1965) Sırdárya háwizinen taptılar.

1951 jılı A'miwdárya deltasındag'ı Sudoche kōlinde bul parazit keltirip shıg'arg'an kesellik sebepli lesh balıg'ı qırıldı (Osmanov, 1953). Sol sebepli ol patogen formag'a tiyisli boladı.

Tuwıs: **Contracaecum Railliet et Henry, 1912**

2.27. Contracaecum microcephalum (Rudolphi, 1809)

Xojeyini: aqamur hám tolstolob

Lokalizatsiya: dene boslıg'ı

Tabılg'an jeri: Dawıtköl kōli

Túrdiń sıpatlaması (biziń mag'lıwmatımız): Bul nematoda balıqlarda inelik hám xironomidler lichinkasında parazitlik etedi. Parazit eresek dáwrinde quslarda (qotan, birqazan hám b.) tirishilik etedi (Turemuratov, 1964). Onıń aralıq xojeyini tsikloplar esaplanadı. Aqamur balıg'ınan alıng'an lichinkanıń denen uzınlıg'ı 2,12-2,56 mm, eni 0,11-0,14 mm. Onıń aldınğ'ı tárepinde

embrional tisi boladı. Qızılōnesh ōsimshesiniń ulıwma uzınlıg'ına teń boladı. Ishek ōsimshesi qızılōneshten eki ret qısqa boldı.

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Izertlengen 82,3% aqamur (jedelligi 1-4 (1,5) dana) hám 25,0% tolstolob (jedelligi 2-5 dana) balıqları usı nematoda menen zıyanlang'an. Aral háwizinde onı birinshi bolıp V.Dogel hám B.Bıxovskiylar (1934) tapqan. Soń S.Osmanov (1971), A.I.Agapova (1962), A.Urazbaev (1973), O.Yusupov (1980) lar Aral háwizindegi kōp balıqlardan kōrsetken.

Otryad: **Spirurida Chitwood, 1933**

Semeystvo: **Camallanidae Railliet et Henry, 1915**

Tuwrıs: **Camallanus Bajlis et Daubney, 1922**

2.28. *Lernaea cyprinacea* Linne, 1758

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: terisi

Tabılg'an jeri: Dawıtkōl suw saqlag'ışı

Túrdiń sıpatlaması (biziń mag'lıwmatımız): Eresek urg'ashı parazitniń denesi uzınshaq, tsilindrsıyaqlı bolıp, keyingi bōlimi az-maz keńeygen boladı. Basındag'ı ōsimsheleri (qolları) atanaqsıyaqlı jaylasqan. Máyek qaltaları aqırında tarayg'an boladı. Parazitniń dene uzınlıg'ı 8,1-9,7 mm, al máyek qaltalarınıń uzınlıg'ı dene uzınlıg'ınıń úshten bir bōlimin quradı. Bul parazit jıllılıqtı súyiwshi bolıp, balıqlardı negizinen jaz aylarında kōbirek zıyanlantıradı.

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Izertlengen aqamur balıg'ınıń 14,7% (jedelligi 1-3 (1,5) dana) usı túr parazit menen zıyanlang'an.

Bul parazit B.N.Kazantsev (1949), D.S.Aliev (1955), S.O.Osmanov (1964), B.Allamuratov (1966), A.Urazbaev (1967), O.Yusupov (1980) Aral háwizinen tapqan.

Otryad: **Branchiura Thorell, 1864**

Semeystvo: **Argulidae Muller, 1785**

Tuwrıs: **Argulus Muller, 1785**

2.29. *Argulus foliaceus* Leinne, 1758

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: terisi

Tabılg'an jeri: Dawıtköl kōli

Túrđıń sıpatlaması (biziń mag'lıwmatımız): Bul ráktárizliniń denesi jalpaq hám quwatlı sorg'ıshsıyaqlı organları bar. Usı organlar járdeminde xojeyinniń denesine bekkem jabısıp aladı hám onı jeńil qoyıp jiberedi.

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Bul parazit tekserilgen aqamur balıg'ınıń 11,7% ten tabıldı. Olardıń hár birinde 1-2 dana parazit ushrastı.

A. foliaceus raktárizliler ishinde eń kōp taralg'an parazit. Aral teńizinde ol A.P.Markevich (1931), V.Dogel hám B.Bıxovskiylar (1934) tárepinen birinshi ret kōrsetilgen. Al soń Aral teńizi, A'miwdárya, Vaxsh, Surxandárya hám Sırdárya hawızlerinen S.O.Osmanov (1971), A.I.Agapova (1962), B.Allamuratov (1966), A.Urazbaev (1973), Yu.Yusupov (1980) lar kōrsetken.

2. 30. Camallanus truncatus (Rudolphi, 1814)

Xojeyini: tolstolob

Lokalizatsiya: ishek

Tabılg'an jeri: Dawıtköl suw saqlag'ışı

Túrđıń sıpatlaması (biziń mag'lıwmatımız): Kamallanus denesiniń úlkenligi 6,3-7,1 x 0,21-0,24 mm. Awız kapsulasınıń uzınlıg'ı hám eni teń bolıp, onıń úlkenligi 0,072-0,075 mm. Qızıl õneshtiń bezli bōlimi (0,511-0,605 mm), muskulli bōliminen (0,491-0,498 mm) uzınıraq. Vulva denesiniń ortasında jaylasıp erinleri kúshli rawajlang'an hám aqırg'ı ushında 2 konustárizli õsimshesi bar. Spikulaları teń emes. Jınsıy qalashları bar.

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Tekserilgen tolstolob balıg'ınıń 41,6% usı nematoda menen zıyanlang'an. Zıyanlang'an balıqlarda 1-2 (1,5) dana qurt ushrastı.

Aral teńizinde ol birinshi ret T.A.Krepkogorskaya (1927) tárepinen tabılg'an. A'miwdárya (Osmanov, 1971) hám Sırdárya hawızlerinde (Agapova, 1962, Kolesnikova, 1965) 11 túr balıqta parazitlik etedi.

Tip: Saqınalı qurtlar - **Annelida**

Klass: Zulukler - **Hirudinea Lamark, 1818**

Otryad: **Rhynchobdella Blanchard, 1894**

Semeystvo: **Piscicolidae Johnston, 1865**

TuwiS: **Piscicola Blainville, 1818**

2.31. **Piscicola geometra (Linne, 1761)**

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: terisi

Tabılg'an jeri: Dawıtköl köli

Bul balıq súligi Aral háwizinde keń taralg'an parazitlerden bolıp, ol xojeyin qanı menen awqatlanadı. Onnan tısqarı balıq súligi kriptobioz hám tripanozomoz keselliklerin qozg'atıwshılardıń aralıq xojeyini hám juqtırıwshısı esaplanadı.

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Izertlengen aqamur balıg'ınıń 5,9% zıyanlang'an. olarda 2 hám 3 dana zulik tabıldı.

P.geometra nı biziń territoriyamızda birinshi ret V.Dogel hám B.Bıxovskiylar (1934) tapqan. A'miwdárya, Sırdárya hám Aral teńizinen S.O.Osmanov (1971), A.Agapova (1962), M.N.Kolesnikovalar (1965) kórsetken.

Tip: Buwınayaqlılar - **Arthropoda**

Klass: Raktárizliler - **Crustacea Lamarck, 1801**

Otryad: **Copepoda M.Milne - Edwards, 1834-1840**

Semeystvo: **Ergasilidae Thorell, 1859**

TuwiS: **Ergasilus Nordmann, 1832**

2.32. **Ergasilus sieboldi Nordmann, 1832**

Xojeyini: aqamur

Lokalizatsiya: sag'ag'ı

Tabılg'an jeri: Dawıtköl köli

Túrdiń sıpatlaması (biziń mag'lıwmatımız): Bul raktárizliniń denesi almurt sıyaqlı bolıp, onıń aldınıg'ı tárepi keńeyip, artqı bólimi júdá tarayg'an boladı. Onıń úlkenligi 0,85-0,97 mm quraydı. Sistematikalıq áhmiyetke iye besinshi jup ayag'ı bir buwınlı barmaqtarızli ósimshe formada boladı. Onıń joqarısında 2 qılshıq, tiykarında bir qılshıq bar. Jınsıy segmentte hám qarın segmentiniń qarın tárepiniń aqırg'ı shetinde qatar-qatar tikenler bar.

Erkek raktárizliler urg'ashísınan bir qansha kishiligi, úsh buwınlı jag' ayaqları hám názik rawajlang'an II antennalardıń barlıg'ı menen ajıraladı. Bul tır Aral hawızinde keń taralg'an hám qáwıpli parazitlerden esaplanadı.

Zıyanlanıw protsenti hám jedelligi: Bizler teksergen aqamur balıg'ınıń 23,5% (jedelligi 1-18 (12,4) dana) hám tolstolob balıg'ınıń 29,1% (jedelligi ortasha 8,6 dana) usı raktárizli menen zıyanlang'an.

Aral teńizinde onı birinshi ret A.P.Markevich (1931), V.Dogel hám B.Bıxovskiylar (1934) kórsetken. Olardı teńizdiń tuzlı bōliminde kōbirek tapqan. Aradan 20 jıl ōtken soń S.O.Osmanov (1971) teńizdiń dushshı bōliminen usı parazitte sol mug'darda taptı. Bul izertlewler tiykarında **E.sieboldi** nı evrigalin formadag'ı parazit dep esaplaydı.

III Bap.

DAWITKO'L SUW SAQLAG'ISHI AKKLIMITIZATSIYALANG'AN BALIQ PARAZITLERINEN ALING'AN NA'TIYJELERI

3.1. Dawitköl kölinen izertlengen balıq parazitleriniń ekologiyalıq faktorlarga baylanış özgerisleri

Birinshi xojeyin tiri organizm, ekinshisi onı qorshap turg'an sırtqı jag'day (onıń özgerisi). Olay bolatug'ın bolsa parazitniń tirishiliginiń saqlanıwı xozyaynniń ömiri hám onı qorshap turg'an sırtqı jag'dayg'a tikkeley baylanışlı ekeni málim. V.A.Dogel bul jag'daydı «parazitofauna» degen termini menen túsindirildi.

E.N.Pavlovskiy (1934) parazitlerde tiri organizm bolg'anlıg'ı ushın, sırtqı (ekologiya) jag'daydıń özgerisi, bularg'ada tásir etedi, yag'nıy parazitler öz aldına tirishilik etpey xojeyinniń esabınan jasaydı, olay bolsa ekinshi parazitniń xojeyinniń sırtqı jag'dayg'a beyimlesiwi yamasa beyimlese almawı parazitkede tiyisli. Sonlıqtan bul ilimpaz, ekologiyalıq (sırtqı) jag'day parazitke eki ret tásir etedi degen edi. E.N.Pavlovskiy «parazitosenoz» degen termindi ilimge kirgizdi.

Hár bir balıqtıń parazitofaunası, onı qorshap turg'an sırtqı jag'dayg'a baylanışlı (suw saqlag'ışhıń xarakterine, suwdıń T^0 na, duzlılıg'ına hám zazovıy rejimine, ondag'ı haywanatlarg'a, hám t.b.). Onnan keyin parazitlerdiń xojeyinniń organizmine (morfologiyalıq hám fiziologiyalıq jag'daynı).

V.A.Dogel (1958) diń kórsetiwi boyınsha parazitofaunag'a tábiyatta köplegen faktorlar bolıp, olardıń bári birigip yamasa öz aldına bōlek faktor bolıp tásir qıladı. Ms: xojeyinniń jası balıqtıń migratsiya islewı, suwdıń t^0 sınıń tásiri, awqatlanıwı h.t.b.

Dawitköl kölniń aqamur balıg'ınıń parazitler faunasın izertlegen waqtımızda men tek bir ekologiyalıq faktorg'a yag'nıy aqamurnıń parazitler faunasınıń awqatlanıwına qaray özgeriwine kōbirek áhmiyet awdardım. Parazitler basqa erkin xalında tirishilik etetug'ın haywanlarga salıstırg'anda

sırtqı jag'dayg'a kōbirek g'árezli boladı. Sebebi 2 túrli boladı. Bug'an sırtqı jag'daydıń tásirine g'árezliginiń birinshi podryadkası (xojeynniń organizmi), ekinshi poryadka (sırtqı jag'day). Bul eki poryadkanı birinshi ret (Pavlovskiy, 1934) ilimge jańalıq retinde kirgizgen. Birinshi ret sırtqı jag'day parazitke ōziniń tásirin tiygizedi. Ekinshi jag'ınan sırtqı jag'daydıń ōzgeriwı, parazittiń xojeynniń organizmine ōzgeriwine ōziniń tásirin tiygizedi. Xojeynniń denesiniń fiziologiyalıq jag'dayına baylanıslı boladı, al parazittiń jaqsı tirishilik etiwı ushın xojeynniń denesi awqatlanıwı ushın kerek.

Dissertatsiya jumısımnıń bul bōliminde tek g'ana balıqtıń awqatlanıwına qaray parazitler faunasınıń ōzgerisi tuwralı túsinik beriwge tıristım, bunı Dawıtkōl kōlindegi aqamur balıg'ınıń mısasında kōremiz. Bul mag'lıwmatlardı Dawıtkōl kōline dissertatsiya jumısım ushın shıqqan ilimiy sapar dáwirinde jıynadım. Onı ōzimniń kúndeligime jazıp bardım.

Bizge ilimiy ádebiyatlardan belgili, kōpshilik parazitler, balıq organizmine awqatlıq zatlar menen ōtedi. Balıqtıń awqatlanıwına qaray parazitler faunasınıń ōzgeriske ushıraytug'ını tuwralı máseleni birinshi ret ilimge kōrsetken.

Tiykarında gelmintler, bulardıń ishinen aktivno ōtetug'ın metatserkariylerden basqası balıqqa aralıq xojeyindi jew (awqatlıq zat retinde) arqalı ōtedi. Awqatlanıw xarakteri bul ekologiyalıq faktorlardıń ishindegi tiykarg'ısı bolıp sanaladı, sebebi usı arqalı balıqtıń denesine parazit ōtedi. Mısal ushın balıqtıń awqatlıq zatı sırtqı jag'dayg'a baylanıslı ōzgerse, ayırım awqatlıq zatlardıń túri azaysa, balıq májbúri basqa zatlar menen awqatlanadı. Bunday jag'dayda, balıqtıń parazitleriniń túrinde májbúri ōzgeredi. Sebebi bul aralıq organizmler, parazitlerge aralıq xojeyin bolıp sanaladı.

Hár bir túr balıqtıń ōziniń jeytug'ın awqatı boladı. Usıg'an baylanıslı balıqlardıń awqatlanıwı 4 gruppag'a bōlinedi. a) Jırtqısh balıqlar b) Plankton menen awqatlanıwshı balıqlar v) bentos awqatlanatug'ın balıqlar s) fitoplankton menen awqatlanıwshı balıqlar toparı. Usı 4 gruppag'a kirgen. Balıqlardıń awqatlanıwı ōzleriniń xarakteri menen toparlanıp turadı. Sırtqı jag'daydıń yag'ınıy ekologiyalıq ōzgerwine baylanıslı balıqlardıń awqatlanıwında májbúri (zárúr) ōzgeredi. Mine usıg'an baylanıslı olardıń parazitlerine ōzgeriske

ushıraydı. Sebebi bul gruppanıń awqatlıq zatlarında parazitlerdiń aralıq xojeyine bolıp sanaladı. Uńken jastag'ı aqamurg'a bentoslar menen awqatlanatug'ın gruppag'a jatadı. G.V.Nikolskiydiń (1940) jıl kórsetiwi boyınsha A'miwdáryanıń deltasında jasawshı aqamur balıg'ı mollyuskalar menen awqatlanadı, olardıń túrleri (Adacna Dreissena), bokoplav hám xironomid lichinkalar (Chironomidae). Al mayda shabaqları aqamurnıń uzınlıg'ı 2 sm balg'anları plankton menen awqatlanadı. V.Ya.Pankratov (1935), G.V.Nikolskiy (1940) lardıń kórsetiwi boyınsha mayda shabaqlardıń uzınlıg'ı 5-7 sm hám onnanda úlkenirek bolg'andada awqatlıq zatlarınıń sostavınıń ózgermegenligi kórsetedi.

Aq amur- Bul túr dúnyada keń taralg'an balıqlardan esaplanadı. Aqamur hár qıylı ekologiyalıq jag'dayg'a shıdamlı balıqlardan bolıp, ol awqatlıq spektri boyınsha hám balıqlar arasında tiykarg'ı orındı iyeleydi. Sol sebepli aqamur tekseriw ushın dıqqatg'a ılayıq obekt. Dawıtkól kólinen tekserilgen aqamur balıqlar parazit menen 100 protsentke zıyanlang'an edi. Balıqdag'ı bul parazitler V.Dogel islep shıqqan tolıq parazitologiyalıq jarıw usılı menen izertlendi. Aqamur balıg'ınan sporalılar, knidosporalılar, kirpikliler, jalpaq qurtlar, dōńgelek qurtlar, saqıynalı qurtlar hám buwınayaqlılar tiplerine kiretug'ın túrler hám monogeneyalar, tsestodalar, trematodalar tabıldı (Keste 1).

Aqamur balıg'ınan tabılğ'an parazit túrleriniń kōpshiligi aralıq xojeyinniń qatnasısız rawajlanadı, solardan bir kletkalı parazitler, raktárizliler hám t.b. Tsestoda, trematoda hám nematoda wákilleri quramalı rawajlanıw tsikline iye. Olardıń rawajlanıw tsiklında zooplankton, zoobentos hám quslar, ayırım waqıtları haywanlar hám adamlar da qatnasadı.



5-súwret. Aq amur balıg'ı Cteno-pharyngodon idella

Keste 1

Aqamur balıg'ınıń parazitofaunası

Parazit túriniń atı	Zıyanlanıw protsenti (%)	Zıyanlanıw jedelligi (dana)
Dactylogirus.minutus	32,3	2-8 (4,7)
D.extensus	85,3	2-175 (92,5)
Gyrodactylus elegans	17,6	1-3 (2)
G. medius	8,8	2
Paradiplozoon homoion homoion	32,3	2-8 (3,6)
Eudiplozoon nipponicum	38,2	2-16 (11,3)
Caryophyllaesus fimbriceps	14,7	1-6 (4,2)
Bothriocephalus opariichthydis	20,5	1-5 (3,7)
Gyporhynchus pusillum	14,7	1-6 (4,5)
Phyllodistomum elongatum	23,5	2-7 (2,6)
Diplostomum spathaceum	47,0	2-27 (19,1)
Tylodelphys clavata	8,8	1-10 (5,7)
Contracaecum microcepholum	38,3	1-4 (1,5)
Capillaria tomentosa	38,2	1-15 (11,5)
Piscicola geometra	5,9	2 xam 3
Ergasilus sieboldi	23,5	1-18 (12,4)
Lernaea cyprinacea	14,7	1-3 (1,5)
Argulus foliaceus	11,7	1-2 (1,5)
Eimeria carPELLi	60,0	1

Myxobolus pseudodispar	5,8	2
M. mulleri	20,0	1
Ichthyophthirius multifiliis	8,8	1-4
Trichodinella epizootica	5,8	5
T.subtilis	32,3	4
Dactylogyrus anchoratus	67,6	4-18 (9,5)
D.vastator	11,7	1-3 (1,5)

Sporalılardan **Eimeria carpelli**, monogeneyalardan **Dactylogyrus** tuqımınıń wákilleri, **Gyrodactylus medius** hám **G.elegans** cazan balıg'ı ushın spetsifik túrler esaplanadı. hám balıqlar olar menen joqarı % te zıyanlang'an.

S.O.Osmanov, A.Urazbaev, O.Yusupov (1966) lar A'miwdárya deltasındag'ı aqamur balıg'ı parazitleri haqqında biraz mag'lıwmatlar keltiredi. S.O.Osmanov (1963) A'miwdárya hám onıń tarmaqlarındag'ı (Vaxsh, Surxandárya) aqamur balıg'ınan 30 túr parazititi taptı. U.Jalilov (1966) Vaxsh dáryasınıń quyır jerinde 16 túr, B.Allamuratov (1966) Surxandáryada 46 túr, B.Babaev (1966) Qaraqum kanalı boyındag'ı suw háwizlerinen 15 túr parazititi tawıldı. Buring'ı izertlengenlerdiń hámmesini házirgi degradatsiya júz berip atırǵ'an waqıttag'ı menen salıstırsaq aqamur balıg'ı parazitofaunası biraz kambag'allasqan. Bul protsesstıń tiykarg'ı faktorlarınıń biri suwdıń ximiyalıq quramı jaman tárepke ózgerip kōp ektoparazitlerdiń, negizinen knidosporidiyalar, kirpikliler, raktárizlilerdiń jog'alıp ketiwine sebepshi boldı. Quramalı rawajlanıw tsiklına iye parazitlerdiń aralıq xojeyini wazıypasın atqaratug'ın suwdag'ı omırtqasızlardıń (eskekayaqlılar, nasekomalardıń lichinkaları, oligoxeta h. t. b.) túr quramınıń azayıp ketiwi hám olardıń biomassasınıń azayıwı tiykarg'ı faktorlardan boladı. Olar menen bir qatar parazitlerdiń taralıwında balıqlardıń tıǵ'ızlıǵ'ı da úlken áhmiyetke iye. Balıqlardıń uwıldırıq shashatug'ın maydanınıń qısqarıwı, olardıń zapasınıń azayıwına yag'nıy siyreklesiwine alıp keldi⁴.

Bunday qolaysız ekologiyalıq jag'daylar ayırım parazitler ushın tosıq bola almaydı. Mısalı, sag'aqdag'ı daktilogiruslar, kōzde parazitlik etiwshi

⁴ Алламурастов Б. 1966. Паразиты рыб бассейна реки Сурхандарьи. Автореферат канд. дисс., Киев.

diplostomumlar hám ishekte jasaytug'ın kontratsekumlar házirgi antropogen faktorlar tásirinde payda bolg'an ekstremal ekologiyalıq jag'dayda hám özlerin jaqsı sezip atır hám joqarı zıyanlanıw protsentine iye bolıp atır. Olar balıqda kesellik tuwdırıwshı parazitler toparın quraydı.

3.2. Izertlengen balıqlardıń awqatlıg'ınıń túr quramı.

Izertlengen dáwir ishinde yag'nıy 2015-2017 jıllar aralıg'ında karp tuwıslas balıqlardıń ishekliginen 40 túrli plankton hám bentos organizmleri tabıldı (2-keste).

Hár túr balıqlarda bul awqatlıq organizmlerdiń qatnası hár qıylı. Salıstırma túrde awqatlıq organizmlerdiń túr quramı jag'ınan hár qıylılıq birinshi náwbette aq shabaqta-38, tortada-31, marqada-19 anıqlansa, al aq tolstolobik hám aq amur balıqlarınıń ishekliginen tabılǵ'an awqatlıq organizmlerdiń túr quramı azlaw yag'nıy 9 hám 7. Ulıwma awqatlıq organizmler ishinde túr jag'ınan eń kōbi shıbın-shirkeylerge tuwra keledi, yag'nıy 28 túr, sonıń ishinde kōp túrliligi boyınsha kōzge túsetug'ını xironomid lichinkaları (18 túr) bolıp esaplanadı, al eń azı tōmen dárejeli shayan tárizlilerden shaqa murtlılar (2 túr), eskek ayaqlılar (4 túr).

**A'miwdárya quyarlıg'ındag'ı balıqlardıń awqatlıg'ınıń túr quramı.
(ushırasıw jıylıgı % esabında 2015-2017 jj.)**

Awqatlıq organizmler	Aq tolstolobik	Aq amur
CLADOCERA		
Alona sp.	17,7	-
Daphnia sp.	13,4	11,6
COPEPODA		
Cyclops vicinus	25,0	25,0
Nauplii	17,7	-
Harpacticoida gen.sp.	13,1	3,4
Copepoda sp.	13,1	8,7
Ostracoda sp.	-	-
Joqarı dárejeli ósim.	24,3	100,0
Suw otları	-	18,8
Pisip ketken awqatlıqlar	-	-
Detrit	18,4	13,4

Karp tuwıslas balıqlardıń ishekligindegi awqatlıq zatlarınıń ushırasıw jıylıgı boyınsha xironomid lichinkaları, shaqa murtlı, eskek ayaqlı shayan tárizliler, suw piteleri hám nasekomalardıń qaldıqları kóp ushırasadı.

Aq tolstolobik tiykarınan detrit hám tómen dárejeli shayan tárizliler, suw otları menen awqatlang'an. Aq amur balıg'ı xironomid lichinkaları hám tómen dárejeli shayan tárizliler jánede ósimlikler menen awqatlang'an, belgili mug'darda awqatlıq quramında qum hám ılay ushırastı. Marqa balıg'ı bolsa, tiykarınan balıqlar menen hámde shıbın-shirkeyler hám xironomid lichinkaları menen awqatlang'an.

Aq amur balıg'ınıń awqatlıg'ınıń tiykarın joqarı dárejeli ósimlikler qurag'an hámde az mug'dardı tómen dárejeli shayan tárizliler hám detrit penen awqatlang'an⁵.

Solay etip, A'miwdáryanıń quyarlıg'ında joqarı dárejeli ósimlikler menen aq amur, az mug'darda aq tolstolobik hám aq amur awqatlang'an.

⁵ Берг Л.С. 1948-49. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. т. I-III, М-Л. Изд-во АН.

Amudarya quyarlıg'ındag'ı karp tárizli balıq shabaqlarınıń ortasha awqatlıq quramı 2015-2017 jj. (massası boyınsha % esabında).

Awqatlıq organizmler	Aq tolsto-lobik	Aq amur
	Balıq uzınlıg'ı, sm	
	3,1 - 13,0	3,1 - 14,0
Tōmen dárejeli shayan tárizliler	2,4	5,3
Shaqa murtlılar	1,1	2,0
Eskek ayaqlılar	1,3	3,3
Joqarı dárejeli ōsim.	-	94,7
Suw otları	7,0	-
Detrit	88,1	-
Qum	2,5	-
Ishekliktiń tolıw indeksi (%)	92,41	112
Balıq sanı	33	33

Detrit-aq tolstolobik aq shabaq, torta hám marqa balıqlarınıń awqatlıg'ında aytarlıqtay rol oynag'an, al qum aq amurda.

Balıqlardıń hár qıylı jıllardag'ı awqatlanıwı.

A'miwdárya quyarlıg'ındag'ı aq tolstolobik hám aq amur balıqlarınıń awqatlanıwı boyınsha 2 jıllıq hám 1994 -jılǵ'ı ádebiy mag'lıwmatqa iyemiz, 2015-2017 jj.

Amudarya quyarlıg'ındag'ı aq tolstolbik, aq amur shabaqlarınıń hár qıylı jıllardag'ı awqatlıq quramı (massası boyınsha % esabında).

Awqatlıq organizmler	Aq tolstolobik			Aq amur		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
	Balıq uzınılg'ı, sm					
	7,3-9,1	3,1-8,5	4,5-11	7,2-14	4,1-12,1	3,1-4,6
Tōmen dārejeli shayan árizliler	0,7	1,4	0,48	1,8	24	1,99
Shaqa murtlılar	0,2	0,6	0,14	0,9	1,4	0,99
Eskek ayaqlılar	0,5	0,8	0,34	0,9	1,0	1,0
Joq dāreje ōsim				98	97,6	98,0
Suw otları	40	37,2	75	-	-	-
Jasıl	10,0	1,2	11	-	-	-
Kōk jasıl	9,0	4	16	-	-	-
Diatom	21,0	32	48	-	-	-
Detrit	59,3	61,4	24,6	-	-	-
Qum	-	-	-	-	-	-
Ishek. tolıw indeksi (%)	114,47	164,76	176,84	115,3	112,41	111,74
Balıqlar sanı	35	41	49	34	39	19

4-keste kōrip turg'anımızday 1994-jılı aq shabaq balıg'ınıń awqatlıg'ınıń tiykarın xironomid lichinkaları 64,8 % qurag'an, shıbın-shirkeyler menen tōmen dārejeli shayan tárizlilerde aytarlıqtay orın alg'an.

A'miwdárya quyarlıg'ında aq tolstolobik balıg'ı hár qıylı jıllarda da bir qıylı suw otları menen awqatlang'an. 2015 -jılı ol tiykarınan diatom, jasıl suw otları, detritler menen awqatlang'an bolsa, al az mug'darda zooplanktonlar menen awqatlang'an 2015-jılı tiykarınan detrit penen awqatlang'an, yag'nıy 61,4 % qurag'an. Qalg'an awqatlıq komponentleriniń áhmiyeti, ásiyese jasıl suw otları aytarlıqtay tōmenlegen. 2017 -jılı tiykarınan diatom suw otları (48 %) hám detritler (24,6 %) menen awqatlang'an, al qalg'an awqatlıq obektlerdiń (tōmen dārejeli shayan tárizliler) roli tōmenlegen.

2015-jılı aq amur balıg'ınıń awqatlıg'ınıń tiykarın joqarı dārejeli ōsimlikler quradı, yag'nıy ulıwma awqatınıń 98% tin iyelegen. 2015-2017 jıllarda onıń awqatlıq spektori ōzgeriske ushıramag'an, yag'nıy keńeymegen, ol tiykarınan


joqarı dárejeli ósimlikler menen (98 %) awqatlang'an.

Atap aytsaq 2016- jılı tómen dárejeli shayan tárizliler awqatlıg'ınıń 2,4 % qurag'an bolsa, al 2017- jılı 1,99 % tuwra keldi. Qalg'an bólimi joqarıda atap ótkenimizdey joqarı dárejeli ósimliklerge tuwra keledi.

A'miwdáryanıń quyarlıg'ında aq tolstolobik hám aq amur balıqlarınıń tórt razmerlik topardag'ı wákilleriniń awqatlanıwı úyrenildi. (4- súwret, qosımshada 4-keste).

Aq tolstolobik balıg'ınıń 3,1-7,0 sm uzınlıqtag'ı wákil-leriniń awqatlıg'ınıń tiykarın yag'nıy 57,3 % suw otları quradı, bunnan basqa belgili dárejede detrit (39,1 %) orın alg'an. Tómen dárejeli shayan tárizliler 2,6 % qurag'an.

Uzınlıg'ı 7,1-9,0 hám 9,1-11,0 santimetrlik aq tolstolobiklerdiń awqatlıq quramın da tómen dárejeli shayan tárizlilerdiń áhmiyeti tómenlegen, onıń esesine suw otlarınıń mug'darı artqan. Uzınlıg'ı 11,1-13 santimetrli qurawshı aq tolstolobik wákilleriniń awqatlıq quramında suw otlarınıń mug'darı jánede kóbeygen, yag'nıy 85 % tuwra kelgen, al tómen dárejeli shayan tárizliler bul uzınlıqtag'ı wákilleriniń ishekligenen tıımadı (6- súwret).



6-сúwret. Aq amur balıg'ı shabag'ı Cteno-pharyngodon idella.

Solay etip, aq tolstolobik balıg'ınıń uzınlıqqa ósiwi menen yag'nıy 3,1 santimetrge shekemgi aralıqta olardıń awqatlanıwında tómen dárejeli shayan tárizliler 2,6 % ten 0 ge túsken, al suw otları bolsa 57,3 % ten 85 % ke shekem kóterilgen.

Aq amur balıg'ınıń barlıq razmerlik toparları wákilleriniń awqatlıg'ınıń tiykarın joqarı dárejeli ósimlikler quradı. Solayda 3,1-8 sm hám 8,1-10 sm uzınlıqtag'ılarınıń awqatlıg'ında tómen dárejeli shayan tárizliler aytarlıqtay áhmiyetke iye bolg'an, yag'nıy 18 % ten 11,8 % ke shekem orın alg'an. Al 10,1-12,0 hám 12,1-14,0 sm uzınlıqtag'ılarınıń awqatlıg'ında tómen dárejeli shayan tárizlilerdiń roli tómenlegen (0,5 % ke shekem).

Bul izertlengen balıqlardıń awqatlıq spektori uzınlıqqa ósiwi menen ózgeredi. atap aytsaq tómen dárejeli shayan tárizliler 5,1-8,0 sm, aq shabaqtıń, 3,1-7 sm, aq tolstolobiktiń 3,1-10 sm, aq amur balıqlarınıń awqatlanıwında aytarlıqtay áhmiyetke iye. Olardıń áhmiyeti balıq razmeriniń ósiwine baylanıslı tómenlep baradı. nasekomalardıń roli aq shabaq balıg'ınıń úlken razmerlerinde artadı, al kerisinshe xironomidtiń áhmiyeti tómenleydi. Bizlerdiń hám bizlerden aldınıg'ı izertlewshilerdiń (Shamshetov, Sagitov, 1977) mag'lıwmatları boyınsha shōp jewshi balıqlar ertede de hám házirde shōp awqatlıqları menen awqatlang'an, al ishekliginiń ulıwma tolıw indeksi salıstırma tómen. Bul tiykarınan A'miwdáryanıń quyarlıg'ında fitoplanktonlardıń hám joqarı dárejeli ósimliklerdiń köllerge salıstırğ'anda azlıg'ı menen dálillenedi. Bul shōp jewshi balıqlardıń da razmeriniń ósiwi menen awqatlıq quramında tómen dárejeli shayan tárizlilerdiń roli de tómenleydi.

Bunday tómen dárejeli shayan tárizlilerdiń izertlengen balıqlardıń awqatlıq quramında azayıwına qálegen túr balıq ushın tán (tek zooplankton menen awqatlanıwshılardı qospag'anda). Sebebi suw ortalıg'ında jas shabaqlar ushın birinshi (razmeri jag'ınan da kishi) zat bul shayan tárizliler bolıp esaplanadı.

Kölge quyatug'ın kanalalardıń balıqlarınıń awqatlanıwı.

2016-2017 jillardıń báhár hám jaz aylarında kollektor hám salı atızlarındag'ı balıqlardıń awqatlanıwın úyrengenimizde, olardıń awqatlıq quramı tōmendegishe boldı (5-keste). Karp tuwıslas balıqlardıń ishekliginen hár qıylı qatnasta 30 g'a shamalas plankton hám bentos organizmleri tabıldı. Sonnan tūr boyınsha eń kōbi taban balıg'ınıń shabag'ına tuwra keledi (30), onnan keyin aq tolstolob. Eń az tūr aq amur balıg'ınıń ishekliginen tabıldı.

Bul awqatlıq organizmler ishinde eń kōbi nasekomalarg'a tuwra keledi, onnan soń xironomid lichinkaları, az mug'darda eskek ayaqlı, shaqa murtlı shayanlar ushırastı.

**Balıq shabaqlarının awqatlıg'ının túr quramı
(ushırasıw jıylıgı % esabında 2017 j).**

№	Awqatlıq organizmler	Aq tolstolob	Aq amur
Cladocera			
1	Alona rectangula	65	—
2	Daphnia sp.	25	—
Copepoda			
3	Cyclops sp.	10	—
4	Nauplii	—	—
5	Harpacticoidae gen. sp.	—	—
6	Ostracoda	—	—
7	Mysidacea	—	—
Amphipoda			
8	Dikerogammarus aralensis (Uljanin)	—	—
Polycheta			
9	Nereis diversicolor O.F.Muller	—	—
Mollusca			
10	Cardium	—	—
11	Hudracarina (keneler)	—	—
Hemiptera			
12	Hemiptera sp.	—	—
Coleoptera			
13	Coleoptera sp.	—	—
14	Anıqlanbag'an nasekomalar qaldıg'ı	—	—
15	Chironomidae sp.		-
Tendipedinae			
16	Tanytarsus ex. gr. gregarius Kieff	—	—
17	T. ex. gr. maneus	—	—

18	T. ex. gr. exiguus Jon	—	—
19	T. sp.	—	—
20	Chyptochironomus ex. gr. defectus Kieff	—	—
21	Ch. ex. gr. parastralus Lenz	—	—
22	Ch. ex. gr. vulneratus Zett	—	—
23	limnochironomus ex.gr. nervosus	—	—
24	Chironomus f.l. plumosus h.	—	—
25	Cricotopus ex. gr. silvestris F.	—	—
26	Chironomidae harvae	—	—
27	Joqarı dárejeli õsimlikler	—	100
28	Pisip ketken awqatlıq	—	—
29	Diatom suw otları	80	-
30	Kök jasıl suw otlar	60	—
31	Jasıl suw otlar	70	—
32	Evglenalı suw otlar	10	—
33	Detrit	80	—
34	Qum hám mineral bۆleksheler	20	—

Izertleniw dáwirindegi balıqlardıń awqatlanıwınıń ortasha sıpatı-massasına protsent esabında

Shabaqlardıń awqatlıq quramınıń ortasha kۆrsetkishi (-keste) kۆrsetilgenindey taban balıg'ınıń awqatlıg'ınıń tiykarın 35 % nereis qurtı, sonday-aq tۆmen dárejeli shayan tárizli plankton organizmler, nasekoma qaldıqları hám xironomid lichinkaları qurag'an, bunnan basqa detritte aytarlıqtay orın alg'an.

Bizlerdiń izertlewimizde aq tolstolob balıg'ınıń jegen suw otlarınıń massası boyınsha mag'lıwmatımız joq bolg'anlıqtan, suw otlarınıń ushırasıwın 4 ballı shkala boyınsha bahaladıq.

Aq tolstolob balıg'ınıń awqatlıg'ınıń tūr quramı jıl máwsimine baylanıslı ۆzgeredi. Báhargi izertlew nátiyjesi boyınsha aq tolstolob balıg'ınıń

awqatlıg'ının tiykarın detrit quradı. Detritten tısqarı mineral bōlekshelerdiń hám suw otlarınıń ushırasıwı, olardıń suw túbi ılayınıń ústingi qatlamı menen awqatlang'anlıg'ınan derek beredi.

Aq amur balıg'ının ishekligi tek g'ana joqarı dárejeli ōsimlikler menen tolg'an. Olardıń ishinde eń kōbi yamasa derlik awqatlıg'ının barlıg'ın shalań tutadı.

Hár qıylı uzınlıqtag'ı balıqlardıń awqatlanıwı. Izertlengen balıqlardıń awqatlanıwı olardıń uzınlıg'ına baylanıslı ōzgeretug'ınlıg'ı málím boldı. Aq tolstolob balıg'ının awqatlanıwında eki uzınlıqtag'ı toparlardada tiykarınan bir qıylılıq kōrinedi. Sebebi, aq tolstolob balıg'ının shabag'ı eń úlken jastag'ıları bolsın, bári kishi kōlemdegi fitoplanktonlar menen awqatlanadı.

6- keste


Balıqlardıń awqatlıg'ının quramı (massası boyınsha % esabında)

№	Awqatlıq organizmler	Aq tolstolob	Aq amur	Taban
1	Shaqa murtlı shayanlar	—	0,8	0,25
2	Eskek ayaqlı shayanlar	—	0,4	0,13
3	Baqanshaqlı shayanlar	—	—	1,0
4	Mizid	—	—	3,0
5	Nereys	—	—	6,7
6	Mollyuska	—	—	4,07
7	Iyneliktıń lichinkası	—	—	1,8
8	Padenoktıń lichinkası	—	—	2,0
9	Suw qońızı	—	—	7,6
10	Rucheynik lichinkası	—	—	4,1
11	Anıqlanbag'an shıbın-shirkey-ler qaldıg'ı	—	—	31,0
12	Xironomid lichinkaları	—	—	26,5
13	Joqarı dárejeli ōsimlikler	—	96	—
14	Pisirilip ketken awqatlıq	—	3,0	1,1

15	Detrit	80 %	—	8,3
16	Suw otları	2	—	—
17	Kök jasıl	4	—	—
18	Diatom	1	—	—
19	Jasıl	1	—	—
20	Evglenalı	—	—	—
21	Qum	—	—	2,7

Eskertiw: 1 - júdá siyrek, 2 - siyrek, 3 - az, 4 - kōp.

Aq amur balıg'ının shabaqları da eki uzınlıqtag'ı toparg'a bōlindi (9- súwret, qosımshada 6 - keste). 7- súwrette kōrip turg'anımızday aq amur balıg'ının ishekligenen shayan tárizlilerdiń ushırasıwı jáne bir ret qálegen túr balıqtıń shabaqları ushın dáslepki awqatlıq zatlar quramında zooplankton organizmlerdiń bolatug'ınlıg'ın dálilleydi.



7- súwret Al ekinshi uzınlıqtag'ı aq amurlardıń ishekligi 100 % joqarı dárejeli õsimlikler menen tolǵ'an.

3.3. Aq amur hám tolstolob balıqlarınıń parazitler faunasınıń ózgerisine akklimatizatsiyanıń tásiiri

Bbalıqlardıń parazitler faunasın V.A.Dogel akklimatizatsiyanıń tásiiri haqqındag'ı ulıwma nızamların islep shıqtı (1938-1939). Haywanlar bir jerden ekinshi jerge akklimatizatsiya qılǵ'an waqtında onıń parazitler faunasınıń kemeyip ketetug'ınlıǵ'ı ásirese alıp barg'an rayonda jaqın bir áwladtıń balıǵ'ı bolmasa yaki aralıq xojayını menen kóbeyetug'ın túrler áwelli tásir etiwın kórsetedi. Akklimatizatsiyanıń tásiiri tuwrısında jańa parazitologik materiallardı tamamlap V.A.Dogel (1954) jazdı. Sońǵılıqta bul materiallardı Dogeldiń shákirtleri (Petrushevski, 1954, 1958, Petrushevskiy hám Bauer, 1953 hám basqalar) tolıqtırg'anlıǵ'ı bizge usınday ádebyatlardan málim.

O'zbekistang'a akklimatizatsiya etip keltirilgen balıqlardıń parazitler faunasın kóbeyiwge alımlar teksergen. Olardan V.A.Dogel hám A.S.Lutta (1937), S.O.Osmanov (1971), S.O.Osmanov, A.Urazbaev, O.Yusupov (1966), S.O.Osmanov, O.Yusupov (1967), A.I.Qurbanova (2002).

Akklimatizatsiyalang'an balıqlardıń parazitler faunasınıń ózgeriwine suwdıń gidrologik, gidroximiyalıq ózgeshelikleri hám plankton, bentos, ixtiofauna hám quslar quramınıń qanday ekenligine baylanıslı boladı. Sonday aq akklimatizatsiyalang'an balıqlardıń jası hám úlken orın tutadı⁶.

O'zbekistan suw hawızlerinde 17 túr balıq akklimatizatsiya etilip keltirildi. Usı balıqlardıń hámмесinde de parazitler faunasınıń keltirilgen jańalıqlarına baylanıslı kemeyip ketkenligi bizge ádebiyatlardan belgili.

Eger bazı bir máselelerdi keltirip ótetug'ın bolsaq Salaka óziniń watanında (Baltika teńizi) spetsifik xarakterdegi 9 túr parazit (Puteshevskiy, 1957) bolg'an, salakanı Aral teńizine keltirgende (akklimatizatsiya jolı menen), birde parazit tabılmag'an (onıń tuxumlang'an ikrasınan alıp kelip jibergen) (Osmanov, 1962).

Joqarıdag'ı salakanıń misalınan bizge málim urıqlang'an ikranı akklimatizatsiya jolı menen basqa jerlerge alıp kelgende parazitler alıp kelingен

⁶ Османов С.О. 1963. К познанию паразитических простейших рыб Узбекистана. Журн. Вестник КК ФАН, N 4.

balıqlar menen kelmeydi eken, tek ilimde málim bekire semeystovasına tiyisli balıqlardıń ikrasında júdá qáwipli parazit bar. Akklimatizatsiya etilgen balıqlar menen onıń parazitleride birge keledi, sonıń ushın alıp keliwden áweli olardıń watanında parazitologik kōrikten ótkizip alıp kelgen maqsete muwapıq boladı.

Egerde alıp kelingен balıq túrleriniń sanı az sanda bolsa, onda da onıń parazitleriń birge keliwi qıyınlasadı. Baltik tenizinen Aral teńizine alıp kelingен lesh, aterina, jılanbas, bichok sıyaqlı balıqlardıń watanında olardıń spetsifik túr parazitleri kōp bolg'an, bizge bolsa birde parazit jetip kelmegen (Osmanov, 1971).

Bazbir alıp kelingен balıqlardı kōrsetip ótsek: qara amur, lesh, chipor tolstolob, sudak, bichok bularda da birge kelgen parazitler júdá az bolg'an. Sevryuga, jılanbas, aq amur, karas, aq tolstolob penen de parazitler az keltirilgenligin bizler bilemiz. Aral tenizine Sevryuganıń úlken jastag'ı balıg'ınıń alıp kelip jiberгенinde onıń jabrasında **Nitzshia sturionis** degen monogeniyanıń birge kelgenin bilemiz (Dogel va Lutta, 1937). Barlıq bekireler áwladına tán bolg'an spetsifik parazitler Polypodium hydriforme va Cystoopsis acipenseris (Osmanov, 1959) keltirildi. Bul joqarıdag'ı kōrsetilgen parazitler sevryuga balıg'ı menen keltirilgen, biraq Aral tenizinde parazitologiyalıq izertlewler nátiyjesinde sevryugadan tabılmadı. Ol parazitler sevryuga semeystovasınıń bekire balıg'ına ótip, Aral tenizine keńnen tarqalıp ketti. Bul bekireniń jabrasına ótip, nitsshioz keselligin keltirip shıg'aradı. Akklimatizatsiya tuwrısında materiallar júdá kōplep tabıladı.

Iri balıqlardan shōp penen azıqlanıwshı gruppası (aq amur, tolstolob hám t.b). 1963 jılları Qıtaydan O'zbekstang'a alıp kelindi. Olar birge kōplegen spetsifik parazitler alıp kelindi, biraq watanındag'ıdan bir qansha kem. Aral tenizine A'miwdárya, sonday aq kōllerge aq amur keńnen tarqalıp jergilikli balıqlardanda bir qansha parazitti juqtırg'anı bizge málim.

3.4. Dawıtkōl kōli aqamur hām tolstolob balıqlarınıń parazitleriniń shaqırǵ'an tiykarg'ı kesellikleri hām aldın alıw ilajları

Bul bōlimde aqamur balıǵ'ınıń tiykarg'ı kesellik shaqırıwshı parazitlerine toqtap otemiz. Bul parazitler biziń material jıynag'an dáwrimizde óziniń belgili qáwipli tárepleri menen belgili boldı. Sonıń ushında bul parazitlerdiń túrlerin bōlip óz aldına qarap shıǵ'ıwdı maqset etip qoydıq.

Qıtaydan, Amur dáryasınan bizge akklimatizatsiya qılıp ákelingennen keyin *B. opsariichthydis* - te payda boldı. 1961, 1962, 1963 jılları, O'zbekstannan basqa jaylarg'a, onnan da burınraq aq amur, tolstolobikler Tashkenttegi balıqshı háwiz xojalıǵ'ına keltirilgende aq amurdıń isheginde usı tsestodta keltirilip, kelgennen keyin birinshi aralıq xojeyini Tsiklop, ekinshi aralıq xojeyini balıqlar bolıp, bul tsestod tez pát penen rawajlanıp, A'miwdáryanıń deltasında shama menen 16-20 túr balıqlarda parazitlik qıladı. Barlıq balıqlardıń mayda shabaqları tsiklop penen awqatlanadı. Sol sebepli bul gelmint ásirese balıqlardıń shabag'ına kōbirek qáwip tuwdıradı. *B. opsariichthydis* balıqlardıń isheginde parazitlik jol menen tirishilik etedi, balıqtıń esabınan awqatlanadı. Bas bōliminde kúshli rawajlang'an botriosı eki qaptalda úlken oyıqshası bolıp, balıqqa jabısadı. Usı jabısqan jerin tastap, ekinshi bir jerge ótse, onıń ornınan jara payda boladı hām ol jerdiń sebebinen balıqta anemiya keselligi payda boladı.

Dúnya kōleminde kōpshilik parazitler balıqlarda kesellik tuwdırǵ'anlıǵ'ı ádebietlardan belgili. Bug'an tek ózimizdiń territoriyamızda júz bergen mısallardı atap ótiw jeterli.

Tōmende Dawıtkōl kōlinde aqamur balıǵ'ınan izertlewler nátiyjesinde ushırasqan, balıq xojalıǵ'ına óziniń belgili zıyanın tiygizetug'ın (patogen) parazitlerdiń, sıpatlamasın hām onıń shaqırǵ'an keselliklerine toqtaymız, sebebi bul parazitler jıldıń qaysı máwsiminde bolsa da ózlerine qolaylı jag'day bolsa kōp sanda rawajlanıp, ásirese balıqtıń mayda shabaqların qırǵ'ıng'a ushıratadı. Balıqlarg'a qáwipli kesellik tuwdırıwshılar (koktsidioz, miksobolioz, ixtioftirioz, trixodinioz, daktilogiroz «A», daktilogiroz «B», giTuwısaktiloz,

kariofillez hám t.b.). Biz teksergen aqamur hám tolstolob balıqlarınan tabılǵ'an parazitler ishinde kesellik payda etiw itimalı bar túrlerge ayırıqsha toqtalıp ótiwdi lazım kórdik. Bul parazitler házir kesel keltirip shıǵ'armag'anı menen ertege qolay jag'day tuwıp qalg'an waqıtta álbette keselliktiń sebepshisi boladı. Olar payda etetug'ın kesellikler hám olar menen gúresiw ilajların aytıp ótiwdi maqul kórdik.

Koktsidioz. Bul sporalı parazit (**Eimeria carPELLi Leger et Stankovitsh**) enterit keselligin payda etedi. Ol kletka ishinde parazitlik qıladı. Ishek silekeyli epitekiyasında jasadı. Tiykarınan ishektiń aldınǵ'ı bōliminde jedel ushrasadı. Bawırda hám ót qaltasınıń diyhalında siyrek tirishilik etedi. Koktsidiyalar silekeyli epiteliya pútinligin buzadı. Zıyanlanıw joqarı jedellikte bolg'anında parazit awır kesellik túsin aladı. Kesel balıqlarda ishek epiteliyası qabat-qabat bolıp túse baslaydı, qarnında suw jıynaladı., kōzleri jayınan shıǵ'ıp ketedi, qabırshaqları túse baslaydı. Kesel balıqlar bosasadı hám onıń hárezetleri páseyedi hás áste aqırınlıq penen óledi. Bizler Dawıtkōl suw saqlag'ishında aqamur balıǵ'ınıń joqarı dárejede zıyanlang'anınıń guwası boldıq.

Háwiz xojalıǵ'ı jag'dayında koktsidioz keselligi menen gúresiw ushın úlken hám mayda balıqlardı bōlek-bōlek háwizlerde órshitiw kerek, organizmnıń ózi gúresiwi ushın balıqlardı jaqtolstolobp awqatlanırıw kerek, háwizlerdi jazda qurıtıw, tońlatıw hám dezinfektsiyalaw shárt. Sırttan aqamur balıǵ'ınıń háwizlerge kiritpew ushın suw alıp keletug'ın kanallarg'a filtr ornatiw maqsetke muwapıq boladı.

Koktsidiozdan dawalaw ushın báhár hám kúzde jemge qosıp furazalidon dárisin beriw kerek. 3 kún ishinde 1000 balıqqa 300 mg preparat sarıplanadı. Eki ret berilse 1 balıqqa 2 mg dári isletiledi.

Miksoboloz. Silekeyli sporalılar balıqlarda miksoboloz keselin payda etedi. Bul parazit balıqlardıń sag'ag'ı hám terisinde jasad, olardı jaraqatlaydı. Miksoboluslardıń hár qıylı túrleri hár qıylı organlarda parazitlik etip, olardıń zıyanı da hár qıylı dárejede boladı. Bizniń materialımızda aqamur balıǵ'ında **M.pseudodispar** hám **M.mulleri** miksosporidiyaları ushrastı. Birinshi túr

kōbinshe balıqlardıń bulshıq etlerinde jasaydı hám awır kesellik tuwdıradı. Bul keselliklerdiń aldın alıwda zıyanlang'an balıqlar awlap joq etiliwi lazım.

Ixtioftirioz. Infuzoriya (**Ichthyophthirius multifiliis**) balıqlarda ixtioftirioz keselligin shaqıradı. Ol balıqlardıń terisi ishinde hám sag'aqlarında parazitlik etedi. Kōp zıyanlang'an balıqlarda olardıń terisi hám sag'aqları un sewip qoyg'anday kōrinedi. Infuzoriya teri hám sag'aq epiteliyasın buzadı. Onıń jaqsı rawajlanıp ōsiwi ushın eń tiykarg'ı faktorlardan biri suwdıń temperaturası esaplanadı. Bul infuzoriya ushın eń qolay temperatura 25-26⁰S. Bul kōrsetkishten joqarı bolsa ōsiw toqtaydı, al eger tōmenlep ketse protsess páseyedi (Bauer, 1959). Parazittiń qıysda da rawajlang'anı gúzetilgen. Bul parazit Qaraqalpaqstan ushın da qáwipli formalardan esaplanadı.

Biziń materialımızda bul infuzoriya aqamur balıg'ınıń 35,3% zıyanlag'an. Eger qolay jag'day tuwılıp qalsa, ol tezde rawajlanıp awırw payda etiw qáwpi bar. Bul parazit kōbinshe taban hám mayda awlanbaytug'ın balıqlar juqtıradı. Hávizlerde bul kesellik menen gúresiw ushın uvildiriq shashpastan aldın ana balıqlar ag'ın suwlarda juwılıp, parazitlerden tazalanadı. Hár qıylı jastag'ı balıqlardı bōlek-bōlek hávizlerde ōrshitiw kerek. Báharde hám gúzde balıqlardı awlaw waqtında dári salıng'an vannalarda shomıltırıw kerek.

Ixtioftiriustı birotala joq etiw ushın jasıl malaxit preparatı qollanıladı. Betonlang'an hávizlerde 1 kub metr suwg'a 0,5 g. dári salınadı. Balıqtı vannada 4-5 saat uslap turıw kerek, soń ag'ın suwda juwıw lazım (Avdosev, 1962). A.Urazbaev (1973) ammiaktıń suwdag'ı eritpesinde shomıltırılğ'an balıqlarda ixtioftiriustıń azayg'anlıg'ın ōz tájiriybesinde gúzetti.

Trixodinioz. Kirpikli infuzoriyalardıń (**Trichodinella epizootica**) bul túri hám basqaları trixodinioz keselligin qozg'atadı. Olardıń ishinde **T.epizootica** kishkene bolıwına qaramay kesellik payda etiw uqıbına iye. Bul infuzoriya tiykarınan arıq balıqlarda kōp sanda ushrasadı. Bul parazit hávizde ōrshitiletug'ın balıqlardıń qısqı jayında olardıń tıg'ızlıg'ınan tez kōbeyedi hám kesellik keltirip shıg'aradı.


Bul infuzoriyalardı 5% as tuzınan islengen vannada 5 minut juwıw arqalı joq etemiz.

Daktilogiroz «A». Bul kesellikti daktilogirus (**Dactylogyrus vastator**) aqamur hám karp balıqlarında keltirip shıg'aradı. **D. vastator** sag'aq japraqlarınıń ushında parazitlik halında jasaydı. Onıń tásirinde kóp mug'darda silekey ajıralıp shıg'adı hám qan ag'adı. Zıyanlang'an organ áste-aqırınlıq penen óledi hám buzıladı. Shabaqlardıń sag'ag'ında 80-100 parazit bolsa olar nabıt boladı. Kesellengen balıqlar suw betine shıg'ıp, hawa jetispewinen óledi.

D. vastator uzınlıg'ı 7 sm ge shekem shabaqlardı qattı zıyanlaydı. Bul parazittiń ósip rawajlanıwına suwdıń temperaturası úlken tásir etedi. Parazittiń máyek qoyıwı 4-7,5 °S temperaturada da gúzetilgen. Onıń 22-26 °S temperaturada tez pát penen máyek qoyıwı tastıyıqlandı (Bauer, 1959).

Balıq ushın qolaysız kislorodtıń jetispewshiligi parazitke onsha tásir etpeydi. Bizler onı bir jıllıq aqamur balıg'ında onsha kóp mug'darda ushratpadıq (12-súwret). Sebebi ol mayda balıqlardı zıyanlaydı. Bul túr biziń territoriyamız ushın qáwipli túr esaplanadı.

D. vastator dı joq etiw ushın eń jaqsı usıl as duzınıń 5% eritpesinen islengen vannada 5 minut uslanadı. Jáne biziń territoriyamızda ammiaktıń 0,1% vannasınıń da jaqsı nátiyje beriwın A.Urazbaev (1973) óz tájiriybesinde tastıyıqlag'an.




8-súwret. (*Dactylogyrus vastator*).

Daktilogiroz «B». Bul kesellikti daktilogirus (**Dactylogyrus extensus**) aqamur hám karp balıqlarında payda etedi. **D. extensus** aldıńg'ı túrden denesiniń úlkenligi hám patogen áhmiyeti menen ajıralıp turadı. Ol sag'aq japraqlarınıń orta bōliminde jasaydı. Bul parazit hár qıylı jastag'ı balıqlarda parazitlik etedi. Olardıń sag'aqların jaraqatlap, dem alıw funktsiyasın buzadı.

Ol aldınǵ'ı túrden parqı tōmenirek temperaturada kōp máyek qoyıwı gúzetildi, bıraq olardıń kōpshiligi tirishilik etiwge uqıpsız dep tabıldı (Bauer, Nikolskaya, 1954).

D. extensus kislorod jetispewshiligine shıdamsız bolıp, onıń mug'darı azaysa sag'aq japaqlarınıń ushına shıǵ'ıp aladı hám sol jerde áste-aqırın óledi. Bul túr evrigalin forma bolıp, ashshı hám dushshı suwlarda da jasay beredi.

Biziń materialımızda **D. extensus** kōp mug'darda (88,2%) jedelligi 2-135 danag'a shekem ushrastı. Aqamur balıǵ'ında daktilogirustıń **D.anchoratus** hám **D.minutus** túrleri ushrastı. Olar da balıqlarda kesellik tuwdıradı. Tolstolob balıǵ'ında spetsifik **Ancyrocephalus paradoxus** paraziti tekserildi 9-súwret.



9-súwret. (*Dactylogyrus extensus*)

D.extensus dı nabıt etiw ushın balıq 0,2% ammiak eritpesinde 1 minut dawamında uslap turıladı (suw temperaturası 10⁰S).

Dactylogyrus. Bul kesellikti **Dactylogyrus** (Gyrodactylus elegans) bul túri hám basqaları balıqlarda payda etedi. Bul parazit balıqlardıń terisinde, qalashlarında hám sag'aqlarında epiteliya kletkaları menen awqatlanadı. Zıyanlang'an jaylarda nekroz payda bolıp, tkanlar buzıla baslaydı.


Biziń materialımızda aqamur balıǵ'ınan **G. elegans** hám **G. medius** túrleri tabıldı. Olar jıllılıqtı súyiwshi formalar esaplanadı. Bul parazitler balıqlar bir-

birine tiygen waqıtta jug'adı. **Dactylogyruslar** menen gúresiw ilajları daktilogiruslarg'a usaydı. Bul eki túr **Dactylogyrustan** basqa sag'aqta parazitlik etiwshi monogeneyalardan **Eudiplozoon nipponicum** hám **Paradiplozoon homoion homoion** tabıldı. Olar da balıqlarg'a úlken zıyan keltiredi.

Kariofillez. Bul kesellikti taspa qurt (**Caryophyllaeus fimbriceps**) aqamur hám karp balıqlarında shaqıradı. Onıń birinshi aralıq xojeyini wazıypasın az túkli qurtlar atqaradı. Al eresek qurtlar bolsa karp hám aqamur balıqlarınıń isheginde parazitlik etedi. Bir jıllıq aqamur balıg'ı 70-100 parazit, al onıń shabaqları 20-40 dana qurt bolsa óledi (Ivasik, 1952; Bauer, 1959). Bul tsestoda menen joqarı dárejede zıyanlang'an balıqlardıń qanındag'ı gemoglobin mug'darı azayadı, eritrotsitlerdiń shōgiwi kōteriledi.

Balıqlardıń bul tsestoda menen zıyanlanıwı qısqı hawızlerde 3-4⁰S temperaturada da júz beredi. Aqıbetinde balıqlar arıqlap óledi. Bizler **C.fimbriceps** tı aqamur balıg'ında onsha kōp mug'darda ushratpadıq. Qaraqalpaqstan jag'dayında onıń ōsip rawajlanıwı ushın qolay jag'day bar. Sol sebepli ol biziń territoriyamız ushın qáwipli parazit esaplanadı.

Hawızler jag'dayında qurıtıw hám ōshirilmegen hák menen dezinfektsiya etiw arqalı parazittiń aralıq xojeyinlerin joq etiw usınıladı. Og'an antgelmintlik sıpatında kamala hám qurıtılğ'an paportnik tamırı hám baslang'ısh japıraqlardan islengen undı kúnjara menen aralastırıp balıqqa beriledi (Kanaev, 1956).



10-súwret. (Bothriocephalus opsariichthydis)

Botriotsefalez. Bul kesellikti tsestodanıń (**Bothriocephalus opsariichthydis**) túri keltirip shıg'aradı. Bul parazit aq amur balıg'ı menen Amur dáryası hám Qıtay hawızlerinen alıp kelindi.

B.opsariichthydis balıqtıń isheginde parazitlik etedi. Silekeyli epiteliyge skoleksdegi sorg'ısh shuqırshalar járdeminde jabısıp aladı hám olardıń shirelerin sorıydı. Karp balıg'ınıń 2-3 háptelik shabaqları 80-100 parazit bolsa óledi. S.O.Osmanov, A.Urazbaev, Yu.Yusupovlar (1966) Qaraqalpaqstan hawızlerinde aqamur balıg'ında botriotsefalez keselin gúzetken. Botriotsefalezdi emlegende kamala preparatı jaqsı nátiyje beredi. Kópshilik balıqlardı degilmintizatsiya etiw ushın kamalanı maydalang'an qurg'aq jemge aralastırıp awırlıg'ı 25-30 g bul jılǵ'ı bir karp balıg'ına 100 mg beriledi. Bul usıl arası bir kúnnen eki ret qaytalanadı.

Griporinxoz. Bul keseldi tsestodanıń mına (**Gryporhynchus pusillum**) lichinkası payda etedi. Ol kóp balıqlardıń isheginde parazitlik etedi. Joqarı dárejede zıyanlang'an balıqlardı uzaq múddetli ashlıqtan arıqlap ketiwine alıp keledi. **G. pusillum** nıń aralıq xojeyin wazıypasın atqarıwshı eskekayaqlı raktárizliler, aqırǵ'ı xojeyin rolin qotanlar atqaradı. Biziń materialımızda bul parazit az sanda ushrastı, bıraq territoriyamızda og'an rawajlanıw ushın qolay jag'day bar. Tábiyiysuwlarda bul parazit menen gúresi w balıqshı quslardıń sanın sheklew hám zıyanlang'an balıqlardı awlap joq etiw usınıladı.

Saprolegnioz daryalarda, köllerde, hawızlerde hár kıylı patogen zamarrıklar menen zárerlengen balıqlar ushıraydı. Olar kesellik qozdıruwshılar bolıp, olarg'a «mikoz» delinedi. Dushshı suw balıqlarında mikozlardan eń kóp ushıraytug'ın saprolegnioz. Olardıń qozdırushıları— plis zamarrıqları Saprolegnia tuwısına kiretug'ın turi tabiyatta keń tarqalg'an. Birinshi ret bul kesellikti ádebiyatlarg'a 1877 jılı kiritilgen. Sol waqıtları onıń tarqalıwı hám payda bolıwı boyınsha heshqanday pikir joq edi. Hazirgi kúnge shekem tolıq izertlenbegen. Saprolegniozdiń rawajlanıwına suw qáddiniń páseyiwi, gaz hám duzdıń quramı, auqatlıq zatlarınıń jetispewi x.t.b. Hár kıylı travmalardıń tásirinde boladı. Balıqlar jasaytug'ın hámme suwsaqlag'ıshlar saprolegnioz zamarrıqları ushın judá qolaylı ortalıq esaplanadı.

Biraq, kópshilik jag'dayda bular kesellik shakırmaydı. Kesellik paida bolıwı mumkin eger suwsaklag'ıshta saprolegniyalık zamarrıqlardıń patogen shtammları bolg'an jag'dayda yamasa balıq hálisirep qalg'an hám ol

infektsiyag'a gurese almag'anda. Bul kesellik tawlı suwıq daryalarda kem ushıraydı, al jıllı hám turıp qalg'an suwlarında bul kesellik massalıq xarakterge iye boladı. Caprolegnioz benen zárerlengen balıqlarda terisinde, qalashlarında, sag'ag'ında, kózlerinde yamasa murın tesiklerinde paxtag'a uqsas aqshıl, sarılaw, kulreń yamasa qońır turdegi qabıq payda boladı, olar shaqalanıp ketken õz-ara õrlegen zamarrıqtıń jipshelerinen – giflerden turadı. Gifler waqıt õtiwi menen teri astına õtip, odan uwıldırıqqa õtedi zamarrıqtıń balıqtıń denesinde parazitlik etiw protsessinde, denede bioximiyalıq õzgerisler payda boladı, keyin tkanlar õledi.

Kesel balıq xálsireydi hám sırtqa qozdıruşılarg'a reaksiya bermeydi. Caprolegniya keselligine ushırag'an balıq denesiniń ustinde paxtag'a uqsas zatlardıń bolıwı nátiyjesinde, suwdıń betine shıg'adı sol sebepten ol jırtqıshlarg'a ańsat jem boladı.

JUWMAQLAW

Magistrlik dissertatsiya jumısı ushın material 2017 jılı Dawıtköl suw saqlag'ışınan jıynaldı hám kōlden tolıq parazitologiyalıq usılda 2 túr balıq izertlendi (Aq amur 15 dana, Tolstolob 15 dana) barlıg'ı bolıp 30 dana.

Ekologiyalıq jag'dayda júz berip atırğ'an antropogen tásirlerdiń nátiyjesini biliw ushın parazitologiyalıq izertlewge aq amur hám tolstolob balıg'ı izertlendi.

1.Parazitologiyalıq izertlew júrgiziwde V.A.Dogel islep shıqqan «tolıq parazitologiyalıq jarıw» usılı qollanıldı. Ayrım parazitlerdi bōlek úyreniw ushın jeke usıllar (Sudarikov, Shigin, 1965; Xotenovskiy, 1974; Gusev, 1985 hám t.b.) paydalanıldı.

Parazitler sistematikasına dushshı suw balıqları parazitleriniń anıqlag'ışı (Leningrad-1984, 1985, 1987) atlı 3 tomlıq kitaplardı tiykar etip alındı.

Dawıtköl suw saqlag'ışındag'ı házirgi jaman ekologiyalıq jag'dayda balıq parazitofaunasınıń ózgeriwi dawam etpekte. Bul protsessti gúzetiw hám parazitler menen nátiyjeli gúres ilajların islep shıg'ıw, olardıń ekologiyası hám biologiyasın tekseriwge baylansılı.

2. Dissertatsiya jumısımnıń sistematikalıq bōliminde, ózimniń Dawıtköl suw saqlag'ışınan izertlewler nátiyjesinde jıynalg'an 15 túr parazitke sıpatlama berdim. Olar Dactylogyrus Vastator, Dactylogyrus crucifer, Dactylogyrus extensus, Tetrainchus monenteron, Caryophyllaeus fimbriceps+, Bothriocephalus opsariichthydis +, Ligula intestinalis +, Rhipdocotyle campanula, Diplostomum spathaceum, Clinostomum complanatum+, Posthodiplostomum cuticola, Contracaecum spiculigerum, Rhaphidascaris acus, Ergasilus sieboldi, Lernaea elegans parazitleriniń bioekologiyası úyrenildi.

3. Izertlengen aq amur hám tolstolob balıqlarınıń ulıwma parazitler menen zárerleniwi 68,6-100% ke deyin boldı, solardıń ishinen eń joqarg'ı dárejede zárerlengenleri: monogenen (100%), trematodlar (82,0%), tsestodlar (61,6%), nematodlar (74,2%). Onnan pásirek zárerlengenleri shayan tárizliler (43%).

4. Aqamur hám tolstolob balıg'ınan kólden tabılǵ'an 15 túr parazittiń ayırım túrleri qáwipli parazitler bolıp, olardıń shaqırǵ'an kesellikleri (daktilogiroz, A hám B, kariofillez, botriotsefalez, Ligulez, diplostomoz, postodiplostomoz, rafidaskaridoz hám Lerneoz) hám bul keselliklerge qarsı gúres jolların berilgen.

5. Dawıtkól suw saqlag'ışınan izertlengen balıqlardıń awqatlanıwına qarap, gelmintofaunasınıń ózgergenligin kórsetip ol ekologiyalıq faktorlardıń biri bolıp esaplanadı. Ilimiy mag'lıwmatlarg'a súyengen halda hám házirgi ekologiyalıq ózgerislerdi esapqa alıp qarag'anda aqamurdıń parazitleri hám tolstolob balıg'ınıń parazitleri 2 eseden 3,5 esege deyin kemeyip ketti. Ayırım parazitler tez pát penen ósip, rawajlanıp, balıqlardıń shabaqlarına qáwip tuwdırmaqta.

6. Izertlew tiykarında aq amur balıqlarınan tabılǵ'an parazitler haywanlardıń 26 Tuwıs, 20 semeystvo, 15 otryad, 9 klass hám 7 tipke tiyisli. Olardıń ishinen 64,3 % ápiwayı, al qalg'an 36,7 % i xojeyin almastırıw jolı menen rawajlanadı.

Kesellik tuwdırıwshı patogen parazitlerdiń keń taralıwınıń aldın alıw hám olar menen qarsı gúres ilajları usınıladı.

-Balıqlar parazitofaunası suwdıń temperaturası, xojeyinniń jası, tıǵ'ızlıǵ'ı, balıqlardıń awqatlanıw túr quramı hám awqat spektri hám t.b. biotikalıq hám abiotikalıq faktorlarg'a baylanıslı ekenligi úyrenildi.

Balıqshılıq xojalıqların rawajlandırıwda parazitlerdiń kóbeyiwine qarsı gúres sharaları hám usı ilimiy izertlew jumıslarında keltirilip ótilgen.

Awıl-xojalıǵ'ındag'ı balıq fermer xojalıqlarında hám joqarı hám orta arnawlı kásip-óner kollejleri talabaları ushın ixtiologiya, parazitologiya hám zoologiya sabaqlarında alıng'an materiallardan kórsetpe retinde paydalanıwdı usınıladı.

PAYDALANILG'AN A'DEBIYATLAR DIZIMI

I. Normativ hu'jjetler:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF-4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda
2. O'zbekistan Respublikasi Konstitutsiyasi. T., O'zbekistan 2018
3. O'zbekistan Respublikasining "Bilimlendiriw haqqindag'ı nızamı T.,1997
4. O'zbekistan Respublikasining Kadrlar tayarlaw milliy da'stu'ri T.,1997
5. Ministrlar Ka'binetining 36-Qararı menen 2015-jıl 2-martta tastıyıqlang'an "Magistratura haqqındag'ı nızam T., 2015.

II. O'zbekistan Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevtin'

shig'armalari:

- 1.SH.M.Mirziyoyev. "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi" mavzusidagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. – T.: "O'zbekiston". 2017. – 48 b.
- 2.SH.M.Mirziyoyev Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining ku'ndalik qoidasi bo'lishi kerak. Toshkent: O'zbekiston. – 2017.
- 3.M.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: "O'zbekiston". 2017. – 488 b.
- 4.SH.M.Mirziyoyev. "Jismoniy va ma'naviy etuk yoshlar – ezgu maqsadlarimizga etishda tayanchimiz va suyanchimizdir" mavzusida "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqi. Xalq so'zi. 2017 yil
- 5.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH. Mirziyoev Toshkent sh.,2017 yil 7 fevral,PF-4947-son
- 6.«Xalq so'zi» gazetasining 2017 yil 8 fevraldagi 28 (6722)-sonida

Arnawli a'debiyatlar:

- 1.Agapova A.I. 1962. Parazitı rıb verxnego i srednego techeniya Sır-dari. Tr. In-ta zool. AN Kaz t. XVI.

2. Aristanov E.A. 1986. Lichinki trematod i parteniti molluskov del'ty Amudari i yuga Aralskogo morya. Tashkent, Izd-vo «FAN»Uz
3. Allamuratov B. 1966. Paraziti ryb basseyna reki Surxandari. Avtoreferat kand. diss., Kiev.
4. Aristanov E.A. 1986. Lichinki trematod i parteniti molluskov del'ty Amudari i yuga Aralskogo morya. Tashkent, Izd-vo «FAN»Uz
5. Berg L.S. 1948-49. Ryby presnykh vod SSSR i sopredelnykh stran. t. I-III, M-L. Izd-vo AN.
6. Bauer O.N. 1959. Ekologiya parazitov presnovodnykh ryb. Izv. VNIIORE, t. XIX.
7. Bauer O.N., Strelkov YU.A. 1963. Zabolevaniya i paraziti molodi dalne vostochnykh ryb vo vremya karantinizatsii Ashkhabad, Izd-vo AN Turk. SSR.
8. Bixovskiy B. (Bychovsky B) 1931. Neue Dactylogyrus - Arten aus dem Aral Sea. Zool. Band 95, 9\10.
9. Gusev A.V. 1983. Metodika sbora i obrabotki materialov po monogeneyam, parazitiruyushim u ryb. Izd-vo «Nauka», Leningrad.
10. Dogel V.A. 1933. Problemy issledovaniya parazitofauny ryb Tr. Leningradsk. Ob-va estestvoispytateley, 62 (3).
11. Dogel V. i Bixovskiy B. 1934. Fauna parazitov ryb Aralskogo morya Parazitolog. sb. ZIN AN, t 4, M-L, Izd-vo AN.
12. Dogel V.A. 1962. Obshaya parazitologiya (Pererabotano i dopolneno YU.I. Polyanskim i E.M. Xeysinim) Izd-vo LGU.
13. Ivasik V.M. 1952. Nekotorye dannye o patogennosti gvozdnika *Caryophyllaeus fimbriceps* Annenkova -Chlopina, 1919 dlya karpa, Tr. NII prud. i ozerno-rechn. hoz-va Uk, vyp. 9
14. Markeevich A.P. 1951. Parazitofauna presnovodnykh ryb Ukraina. Kiev, Izd-vo AN.
15. Osmanov S.O. 1964. Paraziti i bolezni osnovnykh promyslovnykh ryb Arala. V sb. «Rybnye zapasy Aralskogo morya i puti ikh ratsionalnogo ispolzovaniya», Tashkent, Izd-vo AN RUz.

- 16.Osmanov S.O. 1965. Parazitlari i bolezni prudovix ryb Uzbekistana, Tashkent, Izd-vo «Nauka».
- 17.Osmanov S.O. 1971. Parazitlari ryb Uzbekistana Tashkent, Izd-vo «FAN» UzSSR.
- 18.Sudarikov V.E., SHigin A.A., 1965. K metodike raboti s metatserkariyami trematod otriyada Strigeidida. Trudi GeLAN, tom 15.

Ilimiy jurnallardagi maqalalar:

- 1.Osmanov S.O. 1953. Rafidaskaridoz lesha v delte Amudari. j. «Rybnoe xozyaystvo», N 8.
- 2.Osmanov S.O. 1959. O zabolevaniyax ryb Aralskogo morya, Tr. Karakalpakskogo kompleksnogo nauchno-issled. in-ta AN Uz, vyp I, Nukus, Karakalpak. gos. izd-vo.
- 3.Osmanov S.O. 1963. K poznaniyu paraziticheskix prosteyshix ryb Uzbekistana. j. Vestnik KK FAN, N 4.
- 4.Osmanov S.O. 1964. Novye dannye o gelmintax ryb Uzbekistana, Vestnik KK FAN, N 2.
- 5.Suxenko G.S. (i dr.). 1966. Rastvorı malaxitovogo zelenogo i formalina dlya borby s ixtioftiriozom karpov. j. «Veterinariya», N 6.
- 6.Osmanov S.O., Urazbaev A., YUsupov O. 1966. Parazitarnoe sostoyanie karpa i rastitelnoyadnix ryb v prudax risovodcheskix xozyaystv Karakalpakii. j Vestnik KK FAN RUz, N 2
- 7.Dogel V.A. 1935. Ocherednye zadachi ekologicheskoy parazitologii, Tr. Petergorsk. biol. In-ta, N 15, vyp. 2.
- 8.Xotenovskiy I.A. 1974. Metodika izgotovleniya preparatov iz diplozoonov. Zoologich. jurnal, t. 53, vyp 7.
- 9.Kanaev A.I. 1956. O lechenii karpov, zarajennix gvozdichnikom j «Rybnoe xozyaystvo», N 4.
- 10.Engashev V.G. 1964. O biologii vozbuditelya rafidaskaridoza ryb j. «Rybovodstvo i rybolovstvo» №2.

Ilimiy da'reje aliw ushin jazilg'an dissertatsiya avtoreferatlari:

1. Turemuratov A.T. Gelmintı rıboyadnıx ptits basseyna Aralskogo morya. Avtoref. kand. diss. M.
2. Urazbaev A.N. 1970. K izucheniyu sikla razvitiya Bothriocephalus gowkongensis Yeh, 1955 v usloviyax nizovev Amudari. Tezisi dokl. konf. «Biol. osn. rıbn xoz-va Sr. Azii i Kaz-na», Balxash.
3. Urazbaev A.N. 1973. Parazitı rıb v prudax Karakalpakii. Avtoref. kan. diss. Tashkent.
4. YUsupov O.YU. 1980. Parazitı rıb promıslovıx rıb vodaemov Karakalpakii. avtoref. kand. diss., Tashkent.
5. I.M. Mirabdullaev, U.T. Mirzaev, A.P. Kuzmetov, Z.O. Kimsanov Baliqlar aniqlag'ishi Toshkent, 2011. -108 b.
6. Babaev B. 1966. Parazitı mestnıx i akklimatiziruemıx rıb suw saqlag'ishov Karakumskogo kanala. Avtoref. kand. diss., Ashxabad.
7. Kolesnikova M.N. 1965. Parazitofauna rıb basseyna nizovev reki Sırdari. Avtoref. kand. diss., Kiev.
8. Djalilov U. 1966. Parazitofauna rıb reki Vaxsh i poymennıx ozer Avtoref. kand. diss., L.

Ilmiy konferensiya jurnallardag'ı maqalalar ha'm tezisler:

1. Berdaq atindag'i Qaraqalpaq Ma'mleketlik Universitetinin' Xabarshisi
Dawitko'l suw saqlag'ishinin' gidrorejimi o'zgeriwinin' baliq parazitlerine ta'siri
2. O'zbekistan Respublikasi ilimler akademiyasi Qaraqalpaqsatan bo'liminin' Xabarshisi 2017-jil
Sovremennoe sostoyanie rıbnogo xozyaystva Karakalpakstana
3. Magistrlardan' ilimiy miynetleri toplami 2017-jil
Baliqlarda ushirasatug'in trematodlar
4. "Janubiy Orol bo'yi tabiiy resurslarini oqilona foydalanish" 6-respublika ilimiy-amaliy konferenciyasi 2017y
Miksosporidiyalar (Myxosporidia)
6. "Janubiy Orol bo'yi tabiiy resurslarini oqilona foydalanish" 6-respublika ilimiy-amaliy konferenciyasi 2017y

Baliqlarda xilodonelloz ha'm ixitiofitirioz keselliklerin shaqiriwshi parazit kirpikliler

6.Akademik A'min Baxievtin' 80-jilliq yubileyine bag'ishlap o'tkerilgen "O'miri o'rnek alim"atli ilimiy-a'meliy konferenciya 2017-jil

Dawitko'l suw saqlag'ishinin' baliqlar parazitlerinin' ha'zirgi jag'dayi

Internet saytlari

<http://zoohistory.ru>

<http://www.ebio.ru>

<http://www.seaworld.org/animal>

<http://www.zin.ru>

QOSIMShA

O'zbekistan Respublikasi ilimlar akademiyasi Qaraqalpaqstan bo'limi Tabiiy ilimlar ilim izertlew instituti «Haywanlar ekologiyasi» laboratoriyasida baliq parazitlarini aniqlash ustide (A,B,V,G,D,E sur'etler).



