

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI O'RTA VA OLIY TA'LIM
VAZIRLIGI**

BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI

TABIIY FANLAR FAKUL'TETI



O'simliklarni oziqlanishi va o'g'itlar

fanidan laboratoriya mashg'ulotlarni uchun

USLUBIY QO'LLANMA

BUXORO-2018

Ushbu qo'llanma Oliy ta'lim muassasalarining 5141000 – Tuproqshunoslik, 5620100 – Agrokimyova agrotuproqshunoslik, 5410200 – Agronomiya, 5410300 – O'simliklar himoyasivakarantini, 5410200 – Kasbiy ta'lim (Agronomiya) ta'lim yonalishlarining 2017-2018 o'quv yili namunaviy o'quv rejalari asosida laboratoriya ishlarini bajarish ushun mavzulari, test va yakuniy nazorat savollaritavsiya etiladi.

TUZUVCHILAR;

M.HAMIDOV - Tuproqshunoslik va geografiya kafedrasi dosenti
S.S XAYRIEV - Tuproqshunoslik va geografiya kafedrasi dosenti

TAQRIZCHILAR:

H.T.Ortikova - Tuproqshunoslik va geografiya kafedrasi dosenti
E.D.Niyozov - kimyo kafedrasi dosenti

BUXORO -2018
O'simliklarni oziqlanish va o'g'itlar fanidan laboratoriyamashg'ulotlarida o'tiladigan mavzularni nomi, mazmunini bahajmi.

№	Mashg'ulot mavzularining nomlanishi
<i>I. O'simliklar tahlili</i>	
1	Kirish. Laboratoriyada ishlaganda asosiy xavfsizlik texnikasi. Eritmalar. O'simlik namunasini olish va analizga tayyorlash
2	O'simlik tarkibidagi quruq modda, gigroskopik namligini va «xom kul» chiqishini aniqlash
3	O'simlik tarkibidagi moyini «quruq qoldiq» usulida aniqlash
4	O'simliklarda nitratli azot miqdorini disulfofenol kislotasi yordamida aniqlash.
5	K. Ginzburg usulida o'simlik kuli hosil qilish va undan azot, fosfor va kaliyni aniqlash
6	O'simlik tarkibidagi oqsil azotini Barnshteyn usulida aniqlash
<i>II. Tuproq tahlili</i>	
7	Daladan tuproq namunasini olish uni tahlilga tayyorlash. Tuproq suvli so'rimidan quruq qoldiqni aniqlash. Tuproq (pH) ni N.I. Alyamovskiy usulida aniqlash. Tuproq ishqoriyligini aniqlash.
8	Tuproq tarkibidagi nitratli azot miqdorini Granvald-Lyaju usulida aniqlash.
9	Singdirilgan ammoniy shaklidagi azotni Nessler reaktivida aniqlash.
10	Karbonatli tuproqlar tarkibidagi harakatchan fosfor va almashinuvchan kaliyni B.P. Machigin usulida aniqlash.
11	Tuproqdagi yalpi N, P, K miqdorini (bir namunadan) aniqlash.
<i>III. O'g'it tahlili</i>	
12	Mineral o'g'itlarni sifat reaksiyalari yordamida turini aniqlash.
13	Selitra tarkibidagi azotni ishqoriy muhitdagi aralashmadan Devard usulida aniqlash.
14	Go'ng tarkibidagi N, P, K miqdorini aniqlash
Jami	

KIRISH.
O'SIMLIKLARNIOZIQLANISHIVAO'G'ITLARLABORATORIYASIDAIS
hLAGANDAASOSIYXAVFSIZLIKTEXNIKASI. ERITMALAR.
O'SIMLIKNAMUNASIOLISHVAANALIZGATAYYORLASH

Mashg'ulotning maqsadi. O'simliklarnioziqlanishivao'g'itlaramaliyvalaborat
oriyamashg'ulotlarifaniningasosiy maqsadi agrokimyoviy tekshirishlar uslublarinio'r
gatishdan iborat.

Talaba amaliy darslarda fanning ahamiyati,
uning boshqafanlar bilan munosabatini va qishloq xo'jaligida gimohiyatini o'rganadi.
Mashg'ulotda laboratoriyatahlillar o'tkazish vaqtida xavfsizlik texnikasigari o'zaro
, elektrostatik zaryadlaridan foydalanish,
kimyoviy moddalar bilan ishlash va turlari maqsadiga tahlillar uchun namuna olish qoidala
rini o'rganadi.

O'SIMLIKLARNI OZIQLANISHI VA O'G'ITLARFANINING
ASOSIY VAZIFALARI

1. Tuproq tahlili orqali shu tuproqda meliorativ tadbir o'tkazish kerak yoki
yo'qligini aniqlash.

2. O'simlikni sifat va kimyoviy jihatdan tahlil qilib kimyoviy tarkibini
o'rganish.

3. Qishloq xo'jalik ekinlarining qay darajada oziq elementlariga talabini
aniqlash.

4. O'simliklarni biologik, xo'jalik xususiyatlariga qarab o'sish davrining
barcha fazalarida yetarlicha oziq elementlari bilan ta'minlash.

5. O'g'it tarkibini va xususiyatlarini o'rganish.

6. Olingan tekshirish natijalari asosida, o'g'itning xususiyatlarini bilgan
holda ma'lum tuproq – iqlim sharoiti va rejalashtirilgan hosil uchun o'simlik turiga
qarab maqbul o'g'it me'yori belgilash va oziqlantirishni deffensiallash vazifasini
bajaradi.

1. AGROKIMYO LABORATORIYASIDA ISHLAGANDA ASOSIY
XAVFSIZLIK QOIDALARI

• 1. Ushbu instruktsiya bilan tanishmasdan turib talabalar, aspirantlar va ilmiy
xodimlarga laboratoriyada ishlashga ruxsat berish qat'iy ta'qiqlanadi.
Xodimlarning instruktsiyadan o'tganligi xavfsizlik texnikasi laboratoriya jurnaliga
imzo qo'yish bilan qayd qilinadi.
Laboratoriya rahbari javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

• 2. Laboratoriyada ish bajarish vaqtida tozalik, tartib va xavfsizlik texnikasi qoidalarigari o'zaro
Chunki tartibsizlik, shoshqaloqlik yoki ishdagi partishlikko'pincha oqibatiga o'irbo'lgan baxtsiz hodisalar ga olib keladi.

• 3. Laboratoriyada suv ichish, ovqatlanish va chekish qat'iy ma'n qilinadi.

• 4. O'qituvchi bilan ish rejasini kelishib olmasdan talabalarni ishga kirishishi
ma'n qilinadi.

- 5. Hamma kimyoviy reaktivlarni faqat maxsus moslashgan etiketkalangan idishlarda saqlash kerak. Qattiq yoki suyuq bo'lishidan qat'iy nazar bir soat ham etiketkasiz yoki yozuvsiz saqlanishi mumkin emas.
- 6. Gaz, suv va elektr asboblarni ishlatish tugashi bilan tezlikda foydalanilgan jo'mraklarini yoping, elektr asboblarni o'chiring. Laboratoriyadan chiqaturib kimyoviy jarayonlarni tugaganligini stollarda, mo'rili shkafda, keyin tashqaridagi elektr tokini, gaz va suv o'chirilganligini tekshirib ko'ring.
- 7. Xavfsizlik qoidalarini buzgan shaxslar ma'muriyat tomonidan javobgarlikka tortiladi.

KISLOTA VA QAYNOQ MODDALAR BILAN ISHLASH QOIDALARI

1. Sulfat kislotani suyultirish suvga kislotani quyish yo'li bilan o'tkaziladi. Bu ish faqat issiqqa chidamli va chinni idishlarda olib boriladi. Chunki bunda ancha miqdorda issiqlik ajralib chiqadi.
2. Kuchli nitrat, sulfat va xlorid kislotalarini bir idishdan ikkinchisiga quyish faqat ishlayotgan mo'rili shkafda bajarilishi kerak. Shkaf eshiklari imkon boricha yopilgan bo'lishi kerak.
3. Kuchli kislotalar bilan ishlashda himoya ko'zoynaklarini taqish kerak. Tutun chiqib turadigan nitrat kislota hamda olium bilan ishlaganda ko'zoynaklardan tashqari uzun rezina fartuk (etak, peshband) taqib olish kerak.
4. Etil spirti, efir, benzol, asetonsirka, etil efiri, ayniqsa uglerod sulfidi, nitrol efir va boshqa yoqilg'i va oson yonuvchi suyuqliklar (OYOS) bilan ishlashda ochiq olov, ochiq alanga, kuchli qizdirilgan yuza yaqinida (misol uchun elektr plitkada) qizdirish o'kazish qat'iyan ta'qiqlanadi.

KUYISH VA ZAHARLANISH HOLLARIDA LABORATORIYADA

KO'RSATILADIGAN BIRINCHI YORDAM

1. Termik kuyishda tezlik bilan kuygan joy bir necha marta taninning spirtli eritmasi bilan ho'llanishi kerak (kaliy permanganat yoki etil spirti bilan ham namlash mumkin) va kuyishga qarshi bo'lgan maz (moy), sulfidin emulsiyasi (qorishmasi) surtiladi.
2. Kislotalardan kuyganda oldin kuygan joy yaxshilab suv bilan, keyin natriy bikarbonat eritmasi bilan yuviladi.
3. O'yuvchi ishqorlar bilan kuyganda, kuygan joyni yaxshilab suv bilan, keyin suyultirilgan sirka kislotasi bilan yuviladi. Ishqorlar va ammiak eritmasini ko'zga tushishi ayniqsa havfli, qattiq ishqorlarni maydalashda albatta ko'zoynak taqish kerak.
4. Xlor yoki brom bug'lari yutilgan xollarda spirt bug'lari bilan nafas olish kerak. Keyin esa toza, ochiq xavoga chiqish kerak.
5. Laboratoriyada ishlaganda asosiy e'tiborni ko'zni himoya qilishga qaratish kerak. Ko'zga har hil kimyoviy reaktivlar tushgan hollarda tezlikda og'riqqa e'tibor bermagan xolda, ko'zni 3-5 minut davomida ko'p miqdordagi suv bilan

yuvish kerak. Keyin agar ko'zga tushgan modda kislotalar reagent bo'lsa bor kislotasi eritmasi bilan yuvish kerak. Birinchi yordamni bunday tadbirlaridan keyin vrachga murojaat qilish kerak.

2. NAMUNA OLISH VA UNI TAHLILGA TAYYORLASH.

Laboratoriyada tekshiriladigan barcha tahlillar uchun atigi 100-150 gr miqdordagi analitik namunadan foydalaniladi. Shu hosil qilingan kam miqdordagi namuna ko'p miqdordagi maydon yoki yig'ishtirilgan hosil to'plamini o'zida harakterlay olishi kerak.


Shuning uchun namuna maxsus ishlab chiqilgan qoida, standart asosida olinadi. O'simlik turi va ekilish sxemasiga qarab namuna olinadi. Olinadigan namuna tahlil maqsadiga qarab ham olinadi. Boshlang'ich namuna miqdori qanchalik ko'p bo'lsa tajribaning aniqligi shunchalik yuqori bo'ladi.

Donli ekinlardan boshlang'ich namuna 0,25 m maydonchanning to'rt tomonidan diagonal bo'ylab ikki qo'shni qatordagi o'simlik hammasi ildizi bilan sug'urib olinadi. Olinadigan o'simlik o'rtacha bo'lishi shart. Kartoshka, kungaboqar, makkajo'xori, silosbop ekinlardan o'rtacha namuna olishda paykalning diagonal bo'ylab 10 tadan tipik o'simlik, qand lavlagidan 20-40 tadan o'simlik tanlanadi.

Boshlang'ich namunalar to'planib doni, poxoli, ildizi alohida aralashtirilib o'rtacha namuna hosil qilinadi. Silos, senaj uyumlarining o'rta qismidan bir marta namuna olinadi. Avtomashina, vagon yoki omborxonalarda o'simlik saqlanayotgan bo'lsa, bunda maxsus shup yordamida turli qatlamlaridan namuna olish zarur.

Olingan boshlang'ich namunalar laboratoriya jurnaliga yozilib etiketka, variant raqami yozilishi shart. Boshlang'ich namuna yaxshilab aralashtirilib, ma'lum vaqtda kvadrat yuzaga to'kilib, diagonal buyicha 4 bo'lakka bo'linadi va 0,5-1,0 kg miqdorda o'rtacha namuna hosil qilinadi, o'rtacha namuna laboratoriyada quritilib begona jinslardan tozalanib, maxsus moslama bilan maydalanib, 1 mm li elakdan o'tkazilib, elanib, aralashtirib 100-150 gr miqdorda paketga solinadi, etiketka yozilib analitik namuna hosil qilinadi. Analitik namuna tahlil uchun foydalaniladi.

Dukkakli don, don va moyli ekinlar urug'idan boshlang'ich o'rtacha namuna 150-250 gr olinadi. 15-18 soat davomida 70-80°C da quritilib maydalaniladi. Maydalash qalin devorli kosada yoki kofe yanchgich yoki laboratoriya tegirmoni yordamida bajariladi, elak bilan elanadi.



1-rasm. Diogonal usulida quruq o'simlik namunasini olish

Boshlang'ich o'rtacha namuna meva va sabzavotlardan ekin turiga qarab olinadi. Misol uchun: ildizmeva, pomidor, bodring, qalampir, olma, nok, uzum, danakli mevalarning ustki po'sti tozalanmasdan tahlil uchun olinadi. Poliz ekinlarining po'sti tozalanib tashlanadi. Karam boshining 1/4 qismi kesib analiz qilinadi. Qovun, tarvuzni yerga tegib turgan tomoni hisobga olinib, teng ikkiga uzunasiga bo'linadi, bir qismi analizga olinadi. Olingan o'rtacha suvli namuna kosachada ezilib usti doka bilan yopiladi. 10 minutdan so'ng shamollatgichli termostatda namligi aniqlash uchun quritiladi.

Olinishi va ishlatish maqsadlariga ko'ra namunalar quyidagi turlarga bo'linadi:

- 1.Individual
- 2.O'rtacha
- 3.Laboratoriya
- 4.Analitik

REAKTIVLAR.

Agrokimyoviy laboratoriyalarda ishlash uchun albatta turli kimyoviy reaktivlar zarur bo'ladi.

Ishlatilishiga ko'ra reaktivlar ikki guruhga bo'linadi:

- umumiy ishlatish uchun;
- maxsus reaktivlar.

Umumiy ishlatish uchun reaktivlar har bir laboratoriyalarda mavjud bo'lib, ularga kislota (sulfat, xlorid, azot kislotalari), ishqorlar(natriy va kaliy, ammoniy eritmalari), kalsiy va bariy oksidlari,bir qator anorganik tuzlar, indikatorlar (fenolftalein, metil qizil va h.k), misol bo'ladi.

Maxsus reaktivlar faqat ayrim tahlillarda foydalanish uchun zarur.

Tozalik darajasiga ko'ra reaktivlar quyidagi guruhlarga bo'linadi:

- kimyoviy toza (x.ch.)
- tahlil uchun toza (ch.d.a.)
- toza (ch.)

Bundan tashqari reaktivlar turli kondisiyali bo'lishi mumkin:

- texnik (tex.)
- tozalangan (ochim.)
- o'ta toza (os.ch.)
- yuqori darajada toza (v.och.)
- spektral toza (sp.ch.)

Laboratoriyada ishlaganda ushbu reaktivlarning asosiy xossa va xususiyatlarini bilish zarur. Reaktivlarning besamar ishlatilishini oldini olish uchun eritmalarni tayyorlash va ularni saqlash qoidalariga amal qilish lozim.

ERITMALAR.

Eritmalar ikki va undan ortiq komponentdan iborat bir jinsli gomogen sistemalaridir. Eritmani tashkil etuvchi komponentga bog'liq ravishda gazsimon, qattiq va suyuq turlarga bo'linadi. Agrokimyoviy tahlillarda asosan suyuq eritmalaridan foydalaniladi.

Suvli eritmalar undagi moddaning miqdoriga ko'ra to'yingan va to'yinmagan, tayyorlanish aniqligiga ko'ra esa aniq va chamali guruhlarga bo'linadi.

Chamalangan, ya'ni aniqlashtirilgan eritmalar tarkibidagi moddalarning konsentrasiyasi foiz, molyar, molyal, normal konsentrasiyalar va titrlarda o'lchanadi.

Foizli eritmalar – eritma 100 hissasida ma'lum miqdor (massa yoki hajm o'lchovi) da modda saqlaydi.

Molyar konsentrasiyali eritma – 1l da moddaning erigan gramm-mol miqdoriga teng bo'lgan eritmadir.

Molyal konsentrasiyali eritma – hajmi 1l emas balki 1kg qilib olinadi va hisob kitoblar xuddi molyar konsentrasiya kabi o'tkaziladi.

Normal eritmalar - 1l hajmda moddaning 1 gr/ekv miqdorini saqllovchi eritmalaridir.

Titrlangan eritmalar - o'ta aniq molyar va normal eritmalar bo'lib, tahlillar uchun asosiy eritmalar hisoblanadi.

IDISHLARGA YOZISH.

Laboratoriyada ishlash davomida anglashilmovchilik yuz berishini oldini olish uchun idishlarga raqam qo'yilib boriladi. Shisha idishlar stakan va kolbalarning maxsus joylariga qalamda raqamlar qo'yiladi. Yuqori haroratda qo'llaniladigan idishlar(tigel) temir(III) xlor eritmasi bilan raqamlanadi. Agar idishlar ilgari raqamlangan bo'lsa qayta raqamlash shart emas.

O'LCHOV KOLBASINI TEKSHIRISH.

O'lchov kolba xromli aralashma, distillangan suv bilan yaxshilab yuviladi va termostatda quritiladi, shundan so'ng analitik tarozida tortib, belgisigacha distillangan suv quyiladi. Kolbadagi suv xona temperaturasiga moslanguncha ushlab turiladi va yana tarozida tortiladi. Buning farqi–20° temperaturada 100 ml hajmdagi distillangan suvning massasi 99,716 g bo'lsa, 50 ml li kolbada 48,958 g

bo'ladi.

Agar 20° haroratda suvning massasi R bo'lsa, hajmi x bo'ladi:

$$x = \frac{100 \cdot R}{99,716} \text{ ml, tuzatmasi} = \frac{100(99,716 - R)}{99,716} \text{ ml bo'ladi.}$$

Eslatma: Jadvalda suvning havoli joydagi massasi va hajmi berilgan. Agar bo'shliq (havosiz joyda) bo'lsa, uning massasiga 0,00106 qo'shilib, hajmidan 0,00106 ayriladi.

1-jadval

Ammiak va kislotalarning foizli eritmalarini tayyorlash uchun ulardan kerak bo'ladigan boshlang'ich miqdori.

(foizli eritmaning 1 litrga ml hisobida)

Dastlabki modda	15°C dastlabki moddaning solishtirma massasi	Dastlabki moddaning massa foizi	25%	20%	10%	5%	2%	1%
HCl	1.19	37.23	634.8	496.8	236.4	115.2	45.5	22.6
H ₂ SO ₄	1.84	95.6	167.7	129.9	60.6	29.3	11.5	5.6
HNO ₃	1.40	65.5	313.0	243.6	115.0	56.0	22	10.8
CH ₃ COOH	1.05	99.5	247.8	196.7	97.1	48.2	19.2	9.5
NH ₄ OH	0.91	25.0	1000.0	814.0	422.0	215.4	87.2	43.7

2-jadval

Suvning massasi va hajmining haroratga qarab o'zgarishi.


Harorat, C°	1ml suvning massasi, g	1g suvning hajmi, ml	Harorat, C°	1ml suvning massasi, g	1g suvning hajmi, ml
10	0,9987	1,0013	18	0,9976	1,0024
11	0,9986	1,0014	19	0,9974	1,0026
12	0,9984	1,0015	20	0,9972	1,0026
13	0,9983	1,0017	21	0,9970	1,0030
14	0,9982	1,0018	22	0,9967	1,0033
15	0,9981	1,0019	23	0,9965	1,0035
16	0,9979	1,0021	24	0,9963	1,0037
17	0,9977	1,0023	25	0,9960	1,0040

IDISHLARNI YUVISH.


Tajribaning aniqligi qo'llaniladigan idishlarning tozaligiga ham bog'liq. Idishlar yangi bo'lsa ular bug'da yoki distillangan suvda yuvilib, termostatda quritiladi. Agar ular toza bo'lmasa, dastlab vodoprovod suvida, so'ngra distillangan suvda yuviladi, tozalanmasa xromli aralashma bilan yuvish shart (xromli aralashma tayyorlash uchun 10% li $K_2Cr_2O_7$ konsentrlangan H_2SO_4 solingan chinni kosachada suv hammomida eritiladi). Asbob xromli aralashma bilan yuvib bo'lingach, 2-3 marta issiq suv so'ngra distillangan suv bilan chayiladi.

Agar idishlarda yog' yuqi yoki mineral moddalarning qoldig'i bo'lsa, bunday idishlar 30–40% li ishqor, sovun yoki poroshok eritmasida yaxshilab yuviladi va 2-3 marta issiq suv bilan yuvilib, distillangan suv bilan 1-2 marta chayiladi. Termostatda quritiladi.

Agar idishda kaliy permanganat dog'lari bo'lsa, bunday idishlar temir sulfat yoki oksalat kislota bilan yuvilib, issiq suv va distillangan suv bilan chayiladi.



3-rasm. Taroziturlari



4-rasm. Eksikator.

MARUZA - 2

O'simlik tarkibidagi quruq modda, gigroskopik namligini va «xom kul» chiqishini aniqlash

Gigroskopik namlikni aniqlash.

Taxlilning mohiyti. Odatda, agrokimyoviy taxlil natijalari mutloq quruq moddaga nisbatan aniqlanadi, qaysiki, o'simlik namunasi tarkibidagi gigroskopik namlikni aniqlashni taqozo etadi. Taxlil namunani qizdirish asosida tarkibidagi gigroskopik suvni yoqotish va quruq moddani tarozida tortishga asoslangan.

Ishning borishi. Diametridi 3,5-5,0 sm bo'lgan shisha byukslar olinadi va ularning stakan shilifi hamda qopqog'iga bir xil raqanlar qo'yiladi. Qopg'og'i ochiqholda termostatda 30-40 daqqa quritiladi va massasi aniqlanadi.

2-4 g atrofida o'simlik namunasi byukslarga solinadi va analitik tarozida massasi aniqlanadi. Qopg'og'ini ochib, termostatga qo'yiladi va 100-105° S haroratda 6 soay quritiladi, so'ngra qisqich yordamida termostatdan

olinadi, eksikatorda quritiladi, tarozida tortiladi.

Byukslar shu harorattida yana 1,5-2,0 soat quritiladi va massasi aniqlanadi. Massalar orasidagi farq sezilar-sezilmas bo'lsa, uchunchi marta takrorlashga hojat qolmaudi. Ayrimmualliflar 17-18 soat davomida 85-90° S da, so'ngra 1 soat davomida 105° S da quritib, bir marta tortishni tavsiy qiladilar.

Gigroskopik namlik quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$\Gamma = (a-b) \cdot 100 / b - A; \text{ bu erda:}$$

a —byuksvanamunaning quritishgacha va quritishdan keying massalari, g; A —quruq byuksning massasi, g.

Material va asbob-jihozlar: analitik tarozi, termostat, eksikator, qisqich, 3,5-5,0 sm diametrli shisha byukslar, steklograf, xona haroratida quritilgan o'simlik namunalari.

Quruq modda miqdorini aniqlash

Taxlilning mohiyati. O'simlik maxsulotlari tarkibidagi quruq modda miqdorini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Quruq modda miqdorini aniqlash uchun og'irligi ma'lum bolgan yangi o'simlik materiali 100-105° S haroratda, massasi o'zgarmay qolguncha quritiladi va qayta tortiladi.

Ishning borishi. Toza quruq byuksga 10 g chamasida toza kvars qum va uchi to'mtoq shisha tayoqcha solinadi. Byuks qopqog'i ochiq holda (ichidagilari bilan birga), yemostatda 100-105° S haroratda 30-40 daqiqa quritiladi va eksikatorda quritilgach, texnik tarozida 0,01 g aniqlikda tortiladi.

Byuksni quritish jarayonida quruq moddasi aniqlanadigan maxsulotning namunasi tayyorlanadi. Kartoshka tuganaklari, karambosh va sabzavotlar o'q chizig'i bo'ylab ikkiga bo'linadi va bir bo'lari yana ikkiga bo'linadi hamda uning bir bo'lari mayda bo'lakchalarga ajratiladi. Aniqlanadigan maxsulotning namunasi tayyorlanadi. Kartoshka tuganaklari, karambosh va sabzavotlar o'q chizig'i bo'ylab ikkiga bo'linadi va bir bo'lari yana ikkiga bo'linadi hamda uning bir bo'lari mayda bo'lakchalarga ajratiladi.

Olma, nok, behi kabilarning urug'lariva urug' joylari, olcha, gilos va olixo'ri kabilarning danaklari, shuningdek, barcha meva va sabzavotlarning po'sti va pardasi olib tashlanadi. Maydalangan maxsulotdan keraklimiqdorda olib (olinadigan miqdor maxsulotning barcha qisimlarini o'z ichiga olishi kerak), qaychi, qirg'ich yoki gomogenizatorda maydalanadi va taxtacha ustiga yoyiladi. Undan taxminan 5-6 g namuna olib, byuksga solinadi va shisha tayoqcha yordamida qum bilan aralashtiriladi hamda og'irligi shu tarozining o'zida aniqlanadi. Termostatda, qopqog'ini ochib, 100-105° S haroratda 6 soat quritiladi va vaqti bilan byuksdagi aralashma shisha tayoqcha bilan aralashtirib turiladi. Byuksning qopqog'i yopiladi, eksikatorda sovutiladi va tarozida tortiladi. Byukslar shu taxlit yna 1 soat quritiladi va tortiladi. Massalar orasidagi farq 0,02 g dan ortiq bo'lsa, yna 0,5 soat quritiladi.

Quruq modda miqdori quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$X = (c - a / b - a) \cdot 100; \text{ buy erda:}$$

a —idishning massasi, g

b—namuna solingan idishning boshlang'ich massasi, g,
c—idishning namuna bilan birgalikda so'ngi massasi, g.

3-jadval

Olingan natijalarni qayd etish jadvali

Sa na	Nam una turi va raqa mi	Byuks ning raqami	Idishning(ta yoqcha va qumbilan)	Yngimaterialsoling anidishning	Namuna bilanquri tilgan idishning	Quriq moddamiq dori,%
				massa, g		

Material va asbob-jixozlar:yngi o'simlik namunalari, pichoq, qirg'ich, gomogenizator, taxtacha, byukslar, kalta shisha tayoqchalar, toza kvars qum, termostat, eksikator, texno-analitik tarozi.

MAVZU-3

O'SIMLIK TARKIBIDAGI MOYNI ANIQLASH.

Mashg'ulotning maqsadi: O'simlik tarkibidagi moyni Sokslet apparatida quruq qoldiq usulida aniqlashdan iborat.

Kerakli jihoz, reaktiv va asbob uskunalari: O'simlik namunalari, yog'sizlantirilgan filtr qog'oz, Sokslet yoki Yeremenko apparati, etil efiri

Adabiyotlar: 8,9,10,11,13

Moylar tirik organizmlarda muhim ahamiyatga ega bo'lgan biologik birikma hisoblanadi. Tabiatiga ko'ra moylar uch atomli spirt $C_3H_5(OH)_3$ gliserinning moy kislotalari bilan hosil qilgan murakkab efirlaridir.

O'simliklarning vegetativ massasida o'rta hisobda 0,1-0,5%, urug'larida esa 2-60 % moy to'planishi mumkin. Moy olish uchun ekinlardan O'zbekistonda kunjut, zig'ir, mahsar, g'o'za yetishtiriladi. Ushbu ekinlar tarkibida va ayniqsa urug'ida moyni aniqlash muhim.

Uslubning mohiyati Moy va moysimon moddalar etil efiri, xloroform, benzin, benzol va boshqa organik erituvchilarda eriydi. Quruq qoldiq usulida moyni aniqlash uning etil efirida erib, namuna yog'sizlanishiga va uning massasi kamayishini tortib aniqlashga asoslangan. Quruq qoldiq usulida moy aniqlanganda etil efirida moy kislotalaridan tashqari fosforidlar, mumlar va shunga o'xshash boshqa organik moddalar ham eriydi. Shuning uchun bu usulda aniqlangan moy «xom moy» deb ataladi.

Quruq qoldiq usulida «xom moy» Sokslet yoki Yeremenko apparatida aniqlanadi. Apparat uch qismdan:

1. Efir solinadigan ekstraksion kolba
2. Ekstraktor
3. Sovutgichdan iborat.

Ishni bajarish tartibi. Yog'sizlantirilgan filtr qog'ozdan yasalgan paket massasi o'lchanadi. Paketga tajriba o'tkazayotgan talaba o'z nasabini va olingan namuna nomini oddiy qalamda yozib qo'yadi. Paketga 1gr o'simlik namunasi tortib olinadi. So'ng paket Sokslet apparati ekstraktoriga solinib, apparat ishga tushiriladi. Ekstraksiyalash ekstraktor efir bilan to'lib, sifon orqali qaytib tushish sikli 8-12 marta qaytarilgach tugatiladi. Paket olinib ochiq havoda yoki mo'rili shkafda efir hidi yo'qolguncha shamollatiladi va 105°C haroratda 1,5 soat quritiladi. Eksikatorida sovutilib massasi aniqlanadi.

Natijani hisoblash:

Hisob-kitobda quyidagilardan foydalaniladi.

- a - paketning massasi, g;
- b - paketning namuna bilan massasi, g;
- $v = b - a$ - namuna massasi, g;
- d - paket bilan namunaning yog'sizlantirishdan keyingi massasi, g;
- $b - d = y_e$ - moyning massasi, g;

Moyning % miqdori quyidagi formula bilan topiladi.

$$X = \frac{Y_e \cdot 100}{v}$$

Nazoratsavollari

1. Moyni tirik organizmlardagi ahamiyati va tarkibi.
2. O'simliklartarkibidamoynimiqdori.
3. Moynianiqlashqaysiuslubgaasoslangan
4. Yeramenko va Sokslet apparatining tuzilishi va ishlash tartibini aytib bering.

MAVZU–4

O'SIMLIKLARDA NITRATLI AZOT MIQDORINI DISULFOFENOL KISLOTASI YORDAMIDA ANIQLASH.

Mashg'ulotning maqsadi: O'simliklar tarkibidagi nitrat azotini disulfofenol kislotasi yordamida aniqlashdan iborat

Kerakli jihoz, reaktiv va asbob uskunalar: O'simlik namunalari, 100, 250 ml ulchov kolbalari, disulfofenol kislotasi, Disulfofenol kislotasi 30 gr fenol, 200 ml sulfat kislotasi (zichligi 1,84) 500 ml li kolbaga solinib og'zi teskari sovutgichli shisha qopqoq bilan yopilib suv hammomida 6 soat qizdiriladi, 10% li NaOH,

KNO₃ ning namuna eritmasi. 0,1631 gr KNO₃ suvda eritilib hajmi 1 l ga yetkaziladi.

Adabiyotlar: 8,9,10,11,13

O'simliklar mineral oziqlanishda azotni asosan nitrat va ammoniy ionlari shaklida o'zlashtiradi. Nitrat ionlari shaklida o'zlashtirilgan azot o'simlik tarkibida kechadigan fiziologik jarayonlar ta'sirida ammiakgacha qaytariladi. Ammiak o'z navbatida oqsil hosil bo'lish jarayoni va organik moddalarga sarflanadi.

O'simliklar tarkibida tashqi oziq muhiti yetarli darajada qulay bo'lganda o'simlikda nitratlar kam to'planadi. Ammo azotli o'g'itlar noto'g'ri, oshirilgan me'yorda qo'llanilishi qishloq xo'jalik mahsulotlarining tarkibida nitrat ko'p to'planishiga olib keladi. Nitratlar ayniqsa nitritlarning tashqi muhitdan oshiqcha o'zlashtirilishi o'simlikda nitrozoaminlar hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin. Nitrozoaminlar kanserogen modda hisoblanib, organizmlar uchun xavfli hisoblanadi.

Hozirgi paytda ayrim toksik moddalar, nitratlar uchun organizm uchun xavfli bo'lmagan cheklangan miqdori yangi gigiyenik me'yori ishlab chiqilgan.

Nitrozoaminlar turli muhitlarda nitritlar va ikkilamchi ionlardan sintezlanishi mumkin va ular biologik obyektlar uchun supermutagenlar hisoblanadi.

Mineral o'g'itlar, ayniqsa azotli o'g'itlar qo'llashning oshishi mahsulot tarkibida nitratlar miqdorini aniqlab, sifatini baholashda juda muhim ekanligini ko'rsatmoqda.

4-jadval

O'simlik mahsulotlari tarkibida nitratlarning cheklangan miqdori,
1kgmahsulotdamghisobida.


T/R	Mahsulot turi	Cheklangan miqdori, mg-kg NO ₃	
		Ochiqmaydon	Himoyalanganmaydon
1.	Kartoshka	250	-
2.	Oqboshkaramertagi	900	-
	Kechki	500	-
3.	Sabziertagi	400	-
	Kechki	250	-
4.	Pomidor	150	300
5.	Bodring	150	400
6.	Oshlavlasi	400	-
7.	Boshpiyoz	80	-
8.	Ko'kpiyoz	600	600
9.	Qovun	90	-
10.	Tarvuz	60	-
11.	Chuchukqalampir	100	400
12.	Qovoqcha	400	400
13.	Xo'rakiuzumnavlari	60	-
14.	Olma	60	-
15.	Nok	60	-

5-jadval

Chorva mollari oziqasida nitrat va nitritlarning cheklangan miqdori.

T/r	Oziqaturi	NO ₃ ⁻	NO ₂ ⁻
1.	Xashakilavlagi	800	10
2.	Silos, senaj	200	10
3.	Parrandauchunomuxtayem	200	5
4.	Qoramollaruchunomuxtayem	500	10
5.	Yashiloziqa	200	10
6.	Pichan, somon	500	10
7.	Oziqadonlar	300	10

Uslubning mohiyati Nitratlarning disulfofenolkislotasida aniqlashuning nitratbi lanishqoriymuhitdasariqranglibirikmahosilqilishgaasoslangan.



disulfofenolkislotasi



sariqranglinitrofenolbirikma

Eritmarangiintensivligimahsulotdaginitratlarmiqlorigabog'liq.

Bu uslub eng ko'ptar qalgan, aniqligi yuqori hisoblanadi, ammoko'pmehnattalabqiladi.

Ishnibajarish tartibi. o'simlik namunasini qirg'ichdayoki pichoqdamay dalanib 5-10 g tortib olinadi. Gomogenizatorida, agar u bo'lmasa hovonchada 25-50 ml distillangan suv bilan birgalikda maydalanib sig'imi 200 ml li kolbaga o'tkaziladi. Belgisigacha suv qo'shib aralashtiriladi. So'ng sig'imi 100 yoki 200 ml li kolbaga filtrlanadi. Kolba belgisigacha distillangan suv bilan to'ldiriladi. Pipetka yordamida filtratdan 50 ml so'rim olinib chinni kosachaga solinadi va suv hammomida quriguncha bug'latiladi. Chinni kosacha sovutilib, quruq qoldiq ustidan 1 ml disulfofenol kislotasi tomizilib, shisha tayoqchasi yordamida qoldiq to'liq eritiladi. 10 minut o'tgach 10 ml distillangan suv quyiladi va 10%li o'yuvchi ishqor (NaOH) bilan sariq rangga o'tguncha neytrallanadi.

So'ng aralashma 100 ml li o'lchov kolbasiga o'tkaziladi, chinni kosacha chayilib, chayindi ham kolbaga solinadi va belgisigacha distillangan suv bilan to'ldiriladi. Kolba aralashtirilib kalorometrda tekshiriladi. Nitratlar miqdori kalibrlangan grafikdan topiladi.

Kalibrlangan grafik tuzish uchun 1 ml da 0,01g NO₃ saqllovchi namuna eritmasidan 1,5,10,15,20,25,30,40,50 ml olinib chinni kosachada suv hammomida bug'atiladi. Bu kosachalarda tegishli 0,01; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; mg NO₃ bo'ladi. Barcha jarayonlar tekshirilayotgan namunalar kabi bajariladi. Kalorometrdan o'tkazilib, kalibrlangan grafik tuziladi.

Natijani hisoblash: Natija quyidagi formula bilan aniqlanadi.

$$X = \frac{a \cdot V \cdot 1000}{N \cdot V_1}$$

bu yerda:

X - NO₃ miqdori mg-kg mahsulotda

a - NO₃ ning kalibrlangan grafikdagi miqdori mg-100 ml da

V - so'rimning umumiy miqdori, ml

V₁ - bug'latish uchun olingan so'rim miqdori, ml

N - namuna massasi, g

Eritmadan 100 ml 1 l o'lchov kolbasiga quyiladi va belgisigacha suv bilan to'lg'aziladi. Bueritmani 1 mlda 0,01 mg NO₃saqlaydi.

Nazoratsavollari:

1. O'simliklartarkibidaginitratazotinimiqdori
2. Nitratlarningcheklanganmiqdori (PDK)
3. Nitritlarning cheklangan miqdori.

MAVZU – 5

K. GINZBURGUSULIDA O'SIMLIKKULIHOSILQILISH VA UNDA AZOT, FOSFOR, KALIYNI ANIQLASH.

Mashg'ulotning maqsadi: K.

Ginzburgsulida O'simlikkuli hosil qilish va undan azot, fosfor, kaliyni aniqlashdan iborat

Kerakli jihoz, reaktiv va asbob uskunalar: Kul hosil qilish uchun:

1. Konsentrlangan sulfat kislota sol. massa 1,84 va 57% li HClO₄ 1:10 nisbatdagi aralashmasi tajriba oldidan tayyorlanadi.

Azotni aniqlash uchun:

1. 50% li o'yuvchi ishqor eritmasi 500 g NaOH 1l suvda eritiladi
2. 0,02n sulfat kislota
3. 0,02n o'yuvchi ishqor, fiksandalan tayyorlanadi.
4. metil qizil indikator
5. fenolftalein yoki lakmus qog'ozi.

Fosfor aniqlash uchun:

1. Suyultirilgan sulfat kislota, zichligi 1,84 bo'lgan konsentrlangan sulfat 10 ml kislota 700 ml suvda 150 ml hisobida eritilib 1l hajmga yetkaziladi.
2. Kislotali muhitdagi ammoniy molibdati 20 gr ammoniy molibdat tuzi distillangan suvda eritilib, hajmi 1l ga yetkaziladi
3. Qalay xlorid eritmasi 2 gr qalay xlorid 30-40 ml konsentrlangan vodorid xloridda suv hammomida quriguncha qizdiriladi. Qoldiq 10 ml suyultirilgan sulfat kislota bilan eritiladi. Bu 20%li qalay xlorid eritmasi 1-2 oy saqlanadi. 1%li eritma tayyorlash uchun 1 ml 20% kalay xlorid

eritmasi 5 ml suyultirilgan sulfat kislota bilan qo'shilib, 20 ml hajmga distillangan suv bilan yetkaziladi.

4. 0.1%li beta-dinitrofenolning suvdagi eritmasi

5. 0,1%li fenolftaleinning spirtli eritmasi

6. 10%li NaOH

7. 10% li HCl

Adabiyotlar: 8,9,10,11,13

O'simliklar oziqlanishida eng muhim ahamiyat kasb etuvchi elementlarga azot, fosfor va kaliy kiradi. Ularning o'simlikdagi miqdorini aniqlash, o'simliklar tomonidan olib chiqilishini o'rganish, fazalar bo'yicha ularga bo'lgan talabni hisobga olgan holda mineral o'g'itlar qullash tadbirlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu maqsadda o'simlik namunalari ho'l usulda kuydiriladi. Ho'l usulda kuydirishning afzalligi shundaki, bunda ayrim elementlar, jumladan fosfor, kaliy, oltingugurt yo'qolishini oldi olinadi.

Uslubning mohiyati K.Ginzburg usulida kul hosil qilish o'simlik organik moddalarining 10:1 nisbatda olingan sulfat va xlorid kislotalari aralashmasida gidrolizlanib, oksidlanishiga asoslangan.

Ishni bajarish tartibi. Maydalangan o'simlik namunasidan 0,2 gr (aniqligi 0,0002 gr) analitik tarozida tortib olinadi. 50- 100 ml hajmli Kyeldal kolbasiga solinadi. Kolbaga 5,5 ml konsentrlangan sulfat va xlorid kislota aralashmasidan quyiladi. Aralashma 10:1 nisbatda tajriba oldidan tayyorlanadi. Kolba 30-60 minut sovuq joyda saqlanadi. Dastlab 5-7 minut qo'ng'ir bo'tqasimon massa hosil bo'lguncha past olovda qizdiriladi. So'ngra olov kuchaytirilib rangsizlanguncha qizdirish davom ettiriladi. Qizdirish davomida kolba chayqatilib turiladi. Odatda aralashma 15-25 minutda rangsizlanadi. Agar shu vaqt davomida eritma rangsizlanmasa 1-2 tomchi xlorid kislota tomizilib, qizdirish davom ettiriladi. Rangsizlangan, sovutilgan eritma 100 ml li o'lchov kolbasiga quyiladi. Kyeldal kolbasi bir necha marta distillangan suv bilan chayilib kolbaga quyiladi va belgisigacha distillangan suv bilan to'ldiriladi. Shu kolbadagi eritmada azot, fosfor, kaliy aniqlanadi.

Azotni aniqlash. Azotni aniqlash mikrokeldal apparatida ammiakni haydash va yig'gich kolbada 0,02n sulfat kislota bilan biriktirib olish va uni titrlashga asoslangan.

Azotni mikrokyel'dal apparatida aniqlash uchun sig'imi 250 ml bo'lgan konussimon kolbaga 0,02n sulfat kislotadan 20-25 ml solib unga 3-4 tomchi metil qizili tomiziladi. Yig'gich kolba kyeldal apparati tagiga qo'yiladi. Tekshirilayotgan eritmada 25 ml pipetka bilan o'lchab olib haydov kolbasiga solinadi, ustidan 3-5 ml distillangan suv quyiladi. Suv bilan 1 tomchi fenolftalein eritmasi tomiziladi. Ustidan 5-7 ml 50%li NaOH eritmasi qo'shiladi va ammiak haydaladi. Reaksiya nihoyasiga yetganligi lakmus qog'ozi yoki Nessler reaktivi yordamida tekshirilib ko'riladi. Sovutgichdan tushayotgan tomchi qizil lakmus qog'ozni ko'kartirmasa, yoki bir necha tomchi oqib tushayotgan suyuqlikka bir tomchi Nessler reaktivi tomizilganda sariq rangga o'tmasa reaksiya tugaganligidan dalolat beradi. Tajriba oxirida yig'gich kolbadagi eritma 0,02n ishqor eritmasi bilan sariq rangga o'tguncha titrlanadi.

Natijalarni hisoblash:

Natija quyidagi formula bilan hisoblanadi.

$$X = \frac{(a \cdot T_1 - b \cdot T_2) \cdot 0,0028 \cdot 100 \cdot V}{H \cdot V_1}$$

bu yerda:

X = azotning miqdori

a = yig'gich kolbadagi 0,02n sulfat kislota miqdori, ml

T₁ = 0,02n H₂SO₄ eritmasi tuzatish koeffitsiyenti

b = titrlashga sarflangan 0,02n NaOH miqdori, ml

T₂ = 0,02 n NaOH eritmasi tuzatish koeffitsiyenti

0,0028 = 1 ml 0,02n H₂SO₄ biriktirib oladigan azot miqdori, g

V = eritmaning umumiy hajmi, 100 ml

V₁ = haydash uchun olingan eritma hajmi, ml

N = analiz uchun olingan namuna massasi, g


Fosforni aniqlash. o'simlik namunasi tarkibidagi umumiy fosfor Malyugina – Xrenova usuli buyicha aniqlanadi. Bu usul fosforni kislotali muhitda ammoniy molibdat bilan qalay xlorid katalizatorligida havo rangli kompleks birikma hosil qilishiga asoslangan.

Ishni bajarish tartibi. Fosforni aniqlash uchun 100 ml li o'lchov kolbasidagi eritmadan 20 ml olib, ikkinchi 100 ml li o'lchov kolbasiga quyiladi va belgisigacha distillangan suv bilan to'ldiriladi. Aralashtirilib 10 ml eritma uchinchi 100 ml li kolbaga pipetka yordamida quyiladi va 20-30 ml distillangan suv bilan suyultiriladi. Ustidan 5 tomchi betadinitrifenol eritmasi qo'shib, och sarg'ish rangga o'tguncha 10%li ishqor (NaOH) eritmasi bilan neytrallanadi. Ishqoriy muhit neytrallanishi uchun 1-2 tomchi HCl ning 10% li eritmasidan tomiziladi. Bunda sariq rang yo'qoladi. So'ng 10 ml suyultirilgan H₂SO₄ (2,0ml) kislotali muhitdagi ammoniy molibdat eritmasi va 20 ml distillangan suv solib chayqatiladi. 0,5 ml qalay xlorid eritmasi qo'shib kolba belgisigacha suv quyib 10-15 minutdan so'ng kolorimetrlanadi. Truoga-Meyer uslubi buyicha bajarilganda rangsizlantirilgan eritmaga 4 ml molibden reaktivi va 3-6 tomchi 2,5 % li qalay xlorid eritmasi qo'shiladi. Kolorimetrlashda to'lqin uzunligi 740 nm, qizil yorug'lik filtridan foydalaniladi. Kolorimetrlarning sezgirlik darajasi 3 ga teng bo'lishi lozim.

Tajriba natijasini hisoblash uchun standart eritmalar shkalasi tayyorlanadi va optik zichligi aniqlangandan so'ng kalibrlangan grafik tuziladi. Buning uchun sig'imi 100 ml li o'lchov kolbasi 1 dan 10 gacha raqam bilan belgilanadi. №1 kolbaga 5 ml; №2 10 ml; №3 kolbaga-15 ml; №4-20 ml; №5-25 ml; №6 30 ml; №7 35 ml; №8-40 ml; №9-45 ml; №10-50 ml standart eritma solinadi. 1 ml standart eritma 0,002 mg P₂O₅ saqlashi e'tiborga olinsa, kolbalarda tegishli 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1 mg P₂O₅ bo'ladi. Har bir kolbaga 60-70 ml gacha suv, so'ng 10 ml suyultirilgan sulfat kislota 10 ml

kislotali muhitdagi ammoniy molibdat eritmasi hamda 0,5 ml qalay xlorid eritmasi qo'shiladi va belgisigacha suv quyilib kalorimetrlanadi. Eritmalarning optik zichligi o'lchangach, millimetrlil qog'ozda kalibrlangan chiziqli chiziladi.

O'simliklar tarkibidagi fosfor miqdorini aniqlash uchun kalibrlangan grafik.



100 ml eritmada mg xisobida P_2O_5 miqdori

100 ml tekshirilayotgan eritma tarkibidagi P_2O_5 ning mg dagi miqdori kalibrlangan grafikdan topiladi. o'simlik tarkibidagi umumiy fosfor miqdori ushbu formula bilan aniqlanadi.

$$X = \frac{a \cdot V_2 \cdot V_4 \cdot 100}{H \cdot V_1 \cdot 1000}$$

bu yerda:

X = P_2O_5 miqdori, %;


a = P_2O_5 ning kalibrlangan grafikdagi miqdori, mg-100 ml da

V_1 = kul hosil qilingan kolbadagi eritma hajmi, 100ml

V_2 = suyultirish uchun olingan eritma hajmi, 20 ml

V_3 = suyultirilgan eritmaning umumiy hajmi, 100 ml

V_4 = suyultirilgan eritmada olingan eritma hajmi, 10 ml



7-rasm. Fotoelektrokolorimetr KFK-2.

Kaliyni aniqlash. Kaliy yolg'inli fotometrda aniqlanadi. Bu usul kaliy atomlari elektron qavatlarining asitilen yoki propan-butan alangasida yorug'lik nuri sochishini o'lchashga asoslangan.

Ishni bajarish tartibi. Kaliyni aniqlash uchun sig'imi 100 ml li o'lchov kolbasidagi eritmadan 15 ml olinib penisillin shishasiga solinadi va yulqinli fotometrda o'tkaziladi. Fotometr ko'rsatgichi yozib olinadi.

Kaliy miqdorini o'lchash uchun kalibrlangan egri chiziqli chiziladi. Buning uchun 1 l hajmli kolbada 1,5826 KCl eritilib, belgisigacha distillangan suv bilan to'ldiriladi. Bu eritmaning 1 ml 1 mg K₂O saqlaydi. 1 dan 10 gacha belgilangan 100 ml li o'lchov kolbasiga 0; 0,1; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 ml standart eritma solinadi. Belgisigacha distillangan suv bilan to'ldiriladi. Fotometrda o'tkazilib kalibrlangan grafik tuziladi.

Natija quyidagi formula yordamida aniqlanadi.

$$x = \frac{a \cdot V_1 \cdot V_2 \cdot 100}{H \cdot V_3 \cdot 1000};$$

bu yerda:

- X - K₂O miqdori, g;
- a - kalibrlangan grafikdagi K₂O miqdori, mg/100 ml
- V₁ - eritmaning umumiy hajmi, ml
- V₂ - eritmaning hajmi, ml
- V₃ - suyultirilgan eritma hajmi, ml
- H - namuna massasi, g
- 1000 - 1 ml dagi K₂O miqdori
- 100 - foizga o'tkazish koeffitsiyenti

Nazorat savollari

1. K. Ginzburg sulfinimaga asoslangan
2. O'simlikliqanday hosil qilinadi
3. Azot, fosfor va kaliyni aniqlashning asoiy maqsadi

MAVZU –6

O'SIMLIK TARKIBIDAGI OQSIL AZOTINI

BARNShTEYN BO'YICHA ANIQLASH.

Mashg'ulotning maqsadi: O'simlik tarkibidagi oqsil azotini barnshteyn bo'yicha aniqlashdan iborat

- Kerakli jihoz, reaktiv va asbob uskunalar:***
1. 6,0% mis kuporosi. 60 gr CuSO₄·5H₂O 1 l suvda eritiladi
 2. 1,25% li NaOH. 12,5 gramm natriy gidrooksid 1 l suvda eritiladi
 3. Konsentrlangan sulfat kislota s ol. massa 1,84
 4. Selen
 5. 2% lik H₃BO₃. 20 g H₃BO₃ qaynoqsuvda eritilib 1 l gayerkaziladi
 6. 10% BaCl₂

7. Groaka indikator: 0,2 metil qizili va 0,1 metil ko'ki spirtli eritmalarda bir xil hajmda olinib tayyorlanadi

8. 40% li NaOH. 400 g NaOH 1 l suvda eritiladi

0,01 n yoki 0,02 n sulfat kislotasi va natriy gidrooksidlari fiksanaldan tayyorlanadi.

Adabiyotlar: 8,9,10,11,13

Ko'pchilik qishloq ho'jalik ekinlari va mahsulotlarining oziqlik ahamiyati ularning tarkibidagi oqsil miqdori bilan uzviy bog'liq. Donli ekinlar tarkibida 7-28%, dukkakli ekinlarda 20-35% oqsil bo'ladi. Moyli ekinlar urug'ida esa oqsil miqdori eng kam miqdorda uchraydi. O'simliklar tarkibidagi azotning asosiy qismi oqsilga to'g'ri keladi. O'simlik oqsilida azot ulushi turli ekinlarda turlicha bo'lib, 14,7 – 19,5% oraliqda o'zgarib boradi.

Shu tufayli o'simlik tarkibidagi oqsil miqdorini aniqlash seleksiya ishlarida navlarni tasviflash, chorva mollari rasionini belgilash, mineral o'g'itlarni mahsulot sifatida ta'sirini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ko'pchilik hollarda «Xom protein» miqdori aniqlanadi. Bu holda oqsilni cho'kmaga tushirishga hojat qolmaydi. Ammo bunda olingan natijalar oqsil miqdorini to'g'ri aks ettirmaydi.

Uslubning mohiyati Oqsil azotini aniqlash uslubi oqsillarni umumiy mahsulot tarkibidan ajratib olib konsentrlangan sulfat kislotasida kuydirish, hosil bo'lgan $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ni kysel apparatida haydash va aniqlangan azot miqdorini oqsilga hisoblashga asoslangan. Namuna tarkibida oqsillar mis sulfatning asosli tuzi $\text{CuSO}_4 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$ orqali cho'kmaga tushiriladi.

Ishni bajarish tartibi. Maydalangan, xona sharoitida quritilgan o'simlik namunasi (urug' – 0,5 gr, somon, poxol, poya – 1 gr) analitik tarozida tortib olinadi. Quritilmagan o'simlik namunasi tarkibida 20–40 mg azot bo'lishini mo'ljallab olinadi. Bunda namuna massasi 4–6 grammni tashkil etish zarur. Olingan namuna sig'imi 150–200 ml bo'lgan kimyoviy stakanga solinadi.

Bir vaqtning o'zida shisha byuksga 3–5 gramm namuna gigroskopik namlikni aniqlash uchun o'lchab olinadi.

Stakandagi namuna ustiga 50 ml distillangan suv solib qaynaguncha qizdiriladi. Agar namuna kraxmalga boy o'simlikdan olinsa qizdirish suv hammomida 40–50°C haroratida 10 minut saqlash bilan almashtiriladi. Sovutmasdan turib 25 ml mis kuporosi – (CuSO_4) eritmasidan qo'shiladi. So'ngra shisha tayoqcha bilan aralashtirib turgan holda porsiya – porsiyaga ajratib 25 ml o'yuvchi ishqor (NaOH) quyiladi. Bunda oqsillarni biriktirib cho'kmaga tushiruvchi mis sulfatning asosiy tuzi $\text{CuSO}_4 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$ hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan aralashma 1–1,5 soat tinch qoldiriladi. Bu paytda filtrlash uchun tayyorgarlik ko'riladi.

Sig'imi 250–300 ml bo'lgan konussimon kolbaga voronka o'rnatilib, qalin filtr qog'ozdan tayyorlangan burmali filtr joylashtiriladi. Filtr voronka qirrasidan 0,5–1 sm pastroq bo'lishi lozim. So'ng cho'kma ustidagi tiniq suyuqlik shisha tayoqcha orqali filtrga quyiladi. Cho'kma qaynoq distillangan suv bilan o'tayotgan filtratda sulfat kislota ionlari qolmaguncha yuviladi. (Bir necha tomchi filtrga BaCl_2 eritmasidan bir tomchi qo'shilganda loyqasimon cho'kma hosil bo'lmasligi

lozim). Cho'kma ustida suyuqlik qolmagach filtr voronka bilan birgalikda quritish shkafida 50–60°C haroratda bir ikki soat davomida, ya'ni filtr voronkadan yengil olinguncha quritiladi.

Qurtilgan filtr cho'kmasi bilan birgalikda shar shaklida o'ralib, 250–500 ml li kyel'dal kolbasiga solinadi, 10–15 ml konsentrlangan sulfat kislota va 0,1 n selen katalizatori qo'shilib, kolba chayqatiladi. Bunda cho'kma va filtr sulfat kislota bilan namlanishiga erishish zarur. Aralashma 5–6 soat tinch qoldiriladi. So'ng 1–2 ml 30% H₂O₂ qo'shiladi, mo'rili shkafda sekin qaynatiladi. Qaynatish eritma tiniq rangsizlanguncha davom ettiriladi.

Rangsizlangan eritma ustiga sovutilgandan so'ng 3–5 ml distillangan suv quyiladi va sovutiladi. Sovutilgan eritma 100 ml li o'lchov kolbasiga bir necha marta distillangan suv bilan chayib o'tkaziladi va belgisigacha yetkaziladi.

Ammiakni xaydash kyel'dal mikroapparatida amalga oshiriladi. Apparat bug' hosil qilish kolbasi kyel'dal kolbasi jo'mrakli voronka, sovutgich, yig'gich kolba, ishlatib bo'lingan aralashmani chiqarish idishi va qisqichlardan iborat. (8-rasm).

Apparat ishga tushirilishidan oldin yig'gich kolbaga (200–250 ml li stakan yoki konussimon kolba) 10–15 ml 4% li bor kislotasi quyilib 3-5 tomchi kombinirlashgan Groaka indikatorini tomiziladi. Yig'gich kolba sovutgich tagiga o'rnatiladi. Bunda sovutgich naychasi bor kislotasiga botib turishi lozim. So'ng distillash kolbasiga tekshirilishi lozim bo'lgan (№1 raqamli kolba) kolbadan 10–20 ml li eritma quyiladi. Bunda bug' hosil qilish kolbasi qisqichi yopiq turishi kerak. Voronka 3-5 distillangan suv bilan yuvilib 20–30 ml 40% li o'yuvchi ishqor qo'shiladi (NaOH yoki KOH) hamda voronka distillangan suv bilan chayiladi. Jo'mrak yopilib voronkaga 5–10 distillangan suv quyiladi. Bug' hosil qilish kolbasi ishga tushirilib ammiak haydaladi.

Distilliyasiya kolbasidagi aralashma qaynay boshlashidan 5–6 minut o'tgach yig'gich kolbadagi bor kislotasi rangi siyoh rangdan to'q yashil rangga o'tgandan so'ng kolba sovutgich naydan 2–3 sm pastga tushiriladi. So'ng haydash yana 2–3 minut davom ettiriladi.

Tahlil tugatilgandan so'ng yig'gich kolbasidagi eritma 0,01 normal sulfat kislota ishtirokida to'q yashil rangdan och pushti rangga o'tguncha titrlanadi.

Natija quyidagi formula orqali hisoblanadi.

$$X = \frac{(a \cdot T_1 - b \cdot T_2) \cdot 0,0014 \cdot V \cdot K}{H \cdot V_1} \cdot 100$$

bu yerda:

X – oqsil miqdori, %

a - titrlashga sarflangan 0,01 n H₂SO₄ miqdori, ml

b – nazoratdagi yig'gich kolbasini titrlashga sarflangan 0,01 n H₂SO₄ miqdori, ml

T₁-T₂- tegishli kislotalar titriga tuzatishlar

0,0014 – 1 ml 0,01 n sulfat kislotasi biriktirib olishi mumkin bo'lgan azot miqdori, g

V – eritmani umumiy miqdori, 100 ml
 V₁ – haydash uchun olingan eritma miqdori, ml
 N – namuna massasi, g
 K – azotni oqsilga aylantirish koeffitsiyenti:
 O'simlik vegetativ massasi uchun o'rtacha 6,25
 Makkajo'xori uchun - 6,0
 Bug'doy, arpa uchun – 5,7
 G'o'za, zig'ir, kungaboqar uchun – 5,30
 Sholi uchun – 5,95
 Yeryong'oq uchun – 5,46
 100% ga aylantirish

Aksariyat agrokimyoviy laboratoriyalarda oqsil azotini aniqlashda ke'l'dal makromodifikasiyasi qo'llaniladi va yig'gich kolbaga 0,01n H₂SO₄ olinib, metil qizil indikator ishtirokida sariq rangga o'tguncha 0,01 n NaOH bilan titrlanadi.

Natija quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$X = \frac{(a \cdot T_1 - b \cdot T_2) \cdot 0,0014}{H} \cdot 100 \cdot K$$

bu yerda:

X – oqsil miqdori, %
 a – yig'gich kolbadagi 0,01 n H₂SO₄ miqdori, ml
 B – titrlashga sarflangan 0,01 n NaOH miqdori, ml
 T₁-T₂ – tegishli kislotalar titrga tuzatish koeffitsiyenti
 K – azotni oqsilga aylantirish koeffitsiyenti
 H – namuna massasi, g

Absolyut quruq modda holiga o'tkazish uchun natija $\frac{100}{(100 \cdot y)}$ ga ko'paytiriladi.

Bu yerda: y – gigroskopik namlik miqdori

Yig'gich kolbaga 0,02 normal sulfat kislota olinsa, 0,02 normal ishqor bilan titrlanadi.

Nazorat savollari

1. Makro va mikrokyel'dal apparatining tuzilishini aytib bering.
2. Osimliklar tarkibidagi oqsil azoti miqdori.
3. O'simlik namunasini kaysi yul bilan quydiriladi

MAVZU – 7

DALADAN TUPROQ NAMUNASINI OLISH UNI TAHLILGA TAYYORLASH. TUPROQ SUVLI SO'RIMIDAN QURUQ QOLDIQNI ANIQLASH. TUPROQ (pH) NI N.I. ALYAMOVSKIY USULIDA ANIQLASH. TUPROQ ISHQORIYLIGINI ANIQLASH.

Tuproq namunalarini olish

Mashg'ulotning maqsadi. Agrokimyoviy tajribalar olib borishni, vegetasion (maxsus idishlarda), laboratoriya va dala tajribalari qo'yishni o'rganish. Laboratoriya ishlarida tuproq tarkibi, undagi oziq elementlari, tuproq eritmasining reaksiyasini (ishqoriylik yoki kislotalik) aniqlash uchun daladan tuproq namunalarini olishni o'rganishdan iborat.

Kerakli jihoz, reaktiv va asbob uskunalar: Tuproq namunalari, distillangan suv, tarozi, filtr qog'oz, chinni piyola

Adabiyotlar: 8,9,10,11,13

Ishni bajarish tartibi. Qishloq ekinlari ekiladigan maydonlarga agrokimyoviy baho berish uchun tuproq namunalari ma'lum bir daladan olinadi. Almashlab ekish dalalarida bitta aralashtirilgan namuna 3-5 gektardan, tuproq unumdorligi kam farqlanadigan cho'l zonalarida 8-10 gektardan olinadi. Poliz sabzavot almashlab ekiladigan dalalardan namuna 1-2 gektardan olinadi.

Qator oralariga ishlov beriladigan ekin dalalaridan namuna olishda uning bir qismi jo'yaklar yonidan va tepasidan, ikkinchi qismi esa jo'yak tepasidan olinadi. Tuproq namunalarini dalaga o'g'it berilgandan keyin, uchastkaning atroflaridan, go'ng yoki o'g'itlar to'plangan joylardan olish tavsiya etilmaydi.

Tuproq namunasi uning genetik qatlamiga ko'ra olinadi. Tuproqqa asosiy tavsif berish uchun namuna (bahorda, yozda, kuzda) olinadi.

Tuproqning asosiy kimyoviy xossalari o'zgarishini o'rganishda (almashlab ekish dalalarida, o'g'itlarning ta'sirini va meliorativ holatini aniqlashda) olinadigan namuna yerning haydov va pastki qatlamidan 0-5, 5-25 va 25-30 sm chuqurlikdan olinadi.

Sug'oriladigan yerlarga solingan o'g'it tuproq qatlamlarida bir xil tarqalmaydi, shuning uchun olinadigan namuna ekin qator orasidan yaxlit olinishi kerak. Buning uchun qator orasining ko'ndalang tomonidan 10 sm kenglikda 30 sm chuqurlikda chuqurcha qaziladi. Undan chiqqan tuproqning hammasi olinadi.

Namuna olishda har xil burg'ulardan foydalaniladi. Olingan namunalar maxsus xaltalarga yoki qutilarga solinib unga etiketka yoziladi. Etiketkada namuna olingan joy (viloyat, tuman, xo'jalik, dala kontur raqami), qaysi qatlamdan qachon va kim tomonidan olinganligi yoziladi.

Tuproq namunasini tekshirishga tayyorlash ko'zda tutilgan tajribaning maqsadiga bog'liq. Masalan, tuproq tarkibidagi nitrat va ammoniy holdagi azot aniqlanishi kerak bo'lsa, tuproq qurib qolmasdan tezda analiz qilinishi kerak, agar namuna qurib qolsa, tuproq tarkibidagi ammiak oksidlanib, nitratlarga aylanib

ketishi mumkin.

Boshqa turdagi tajribalar uchun tuproq salqin joyda quritilib maydalanadi (bunda tosh va ildiz qoldiqlari olib tashlanadi) va tuproq teshikchalari 1 mm bo'lgan elakdan o'tkaziladi.

Bir joydan olingan tuproq namunasi individual namuna deyiladi. Hamma individual namunalarni qo'shishdan hosil bo'lgan namuna umumiy namuna deb ataladi. O'rtacha namuna olish uchun umumiy namuna toza qog'oz yoki karton ustiga yoyilib krest usulida to'rt bo'lakka bo'linadi va shu bo'laklardan ikkitasi qoldiriladi. Qolgan ikki bo'lagi esa tashlanadi. Bunday operatsiya bir necha marta davom etkaziladi va laboratoriyaga 300-400 gr tuproq olib kelinadi. Laboratoriyada tuproq ildiz, tosh va va boshqa qoldiqlardan yaxshilab tozalanib, maydalanadi va elakdan o'tkaziladi. Shundan so'ng namuna paketlarga solinadi. Bu namuna laboratoriya namunasi deyiladi. Har bir analiz uchun olingan namuna analitik namuna deyiladi.

Tuproq namunasi suv va ammiak parlari yo'q joylarda quritilishi kerak. Namlikni ammoniy va nitrat holdagi azotni aniqlaganda tuproq namunalari olib kelingandan keyin birdan analiz qilish kerak.

Tuproq suvli so'rimida oson eruvchan mineral birikmalar va qisman organik birikmalar bo'ladi. Suvli so'rimdan tuproq pH muhiti nitratlar, nitritlar, kalsiy, kaliy, organik moddalar miqdorini o'zgarib borishini aniqlashda foydalanish mumkin.

Suvli so'rimdan sho'rlangan tuproqlarda tuzlar miqdori Cl^- , SO_4^{2-} , HCO_3^- konsentratsiyasini aniqlash mumkin.

MAVZU – 8

«TUPROQ TARKIBIDAGI NITRAT AZOTI MIQDORINI GRANVALD-LYAJU USULI BO'YICHA ANIQLASH».

Mashg'ulotning maqsadi: Tuproq tarkibidagi nitrat shaklidagi azotni Granvald – Lyaju usulida aniqlashdan iborat.

Kerakli jihozlar, reaktivlar va asbob uskunalar: tuproq namunalari, ulchov kolbalari, chinni piyola, suv hammomi, Alyuminiyli achchiqtosh $\text{MgAl}(\text{SO}_4)_3 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$, disulfofenol kislota, NaOHning 10 % li eritmasi, lakmus qog'oz.


Adabiyotlar:6,7,8,9,11

Tuproq tarkibidagi nitratlar, asosan tuproqda organik birikmalarning chirishi (mikroorganizmlar yordamida) yoki yerga solingan mineral o'g'itlarga bog'liq.


Tuproq tarkibidagi nitratlar suvda yaxshi eriydi, tuproqning singdirish kompleksiga kirmaydi, ya'ni tuproqqa singmaydi. Nitratlar eruvchan bo'lgani uchun tuproqning pastki qatlamiga ko'tarilishi mumkin.

Uslubning mohiyati: Tuproq tarkibidagi nitratlar kolorimetr yordamida Granvald-Lyaju usuli bilan aniqlanadi. Bu usul ishqoriy muhitda disulfofenol kislota ta'sir ettirish yo'li bilan suyuqlikni cho'kmaga tushirishga asoslangan. Buning uchun ma'lum miqdorda suvli so'rim tayyorlanib, so'ngra u bug'latiladi.

Qolgan quruq qoldiqqa disulfofenol kislotasi ta'sir ettiriladi. Natijada nitratlar bilan disulfofenol trinitrofenolga aylanadi. Bunda quyidagicha reaksiya boradi:



Keyinchalik trinitrofenol ishqoriy muhitda asta-sekin sariq tusga kiradi.



sariqnitrobirikma

Eritmaningrangi qanchako'psarg'aysa nitrat miqdorishunchako'pbo'ladi.

Ishtartibi: Tuproq tarkibidagi nitrat nianiqlash uchun suvliso'rim tayyorlanadi.

Buning uchun (tuproq bilan suv 1:5 nisbatda olinadi) 1
ml suvelakdano'tkazilgan tuproqdan 30

grnitarozidatortibolibkonussimon kolbagasolinadi.

Ungajuda oziq dordaa yu miniyliachchiqtoshqo'shiladiva ustiga 150

ml suvsolib besh minut qaynatib keyin filtrlanadi. Filtratdan 10 mlo'lchabolib,
chinnikosachaga qo'yiladi.

Chinnikosachadasuv hammomiga qo'yib filtrat bug'latiladi chinnikosachasovutiladi,
kosachaga 18 - 20 tomchidi sulfofenol kislotatomiziladi. Uning ustiga 15
ml suv qo'yiladiva aralashmaning rangi sariqtusgaki ringunga qadar

(yoki eritmagategizilgan qizillak musko'karguncha) oz-ozdan ishqortomiziladi.

Shundanso'ngaralashma 100

ml lio'lchovkolbagasolib kolbaning belgisigachasuv qo'yiladi.

Kolbayaxshilabaralash tiriladiva kalorimetri yordamida tekshiriladi.

Agar aralashmato'qsariqrangdabo'lsa,

uni suyuqlatib so'ngi kalorimetrdano'tkazish kerak.

Tajribanati jasi quyidagicha hisoblanadi:

$$X = \frac{a \cdot \text{so'rimning umumiy miqdori} \cdot 1000 \text{ mg/kg}}{\text{namuna uchun olingan so'rim miqdori} \cdot \text{tuproq massasi}}$$

x – NO₃ miqdori, mg/kg tuproqda;

a – NO₃ miqdori, egri chiziqdagi ko'rsatkich; mg/100 ml da.

1 gektar yerdagi nitrat miqdorini hisoblash uchun analizdan chiqqan sonni 4000000 ga ko'paytirib (1 ga yerning haydov qatlami tuproqning massasi) so'ngra 1000000 ga bo'linadi (mg ni kg aylantirish uchun)

Ma'lumki, 1 ga yerning sathi S=10000 m², o'rtacha haydov qatlami 0-30 sm olinadi, 1 m³ tuproqning solishtirma massasi 1,200 kg ga teng, bularning hammasini bir-biriga ko'paytirib chiqqan 3600 tonna yoki 3600000 kg ni yaxlitlab, 4000000 kg hosil qilinadi.

Nazorat savollari

1. Tuproq tarkibidagi nitrat azoti haqida tushuncha.
2. Nitrat azotini aniqlash uslubi nimaga asoslangan
3. Nitratlarning tuproqdagi tarqalish gradasiyasi (kam, o'rtacha, yuqori)
4. Tuproq tarkibida 22 mg/kg nitrat bo'lsa 1 ga maydondagi miqdori

MAVZU- 9


«SINGDIRILGAN AMMONIY SHAKLIDAGI AZOTNI NESSLER REAKTIVIDA ANIQLASH»

Mashg'ulotning maqsadi: Nessler reaktivi yordamida singdirilgan ammoniy shaklidagi azotni aniqlashdan iborat.

Kerakli jihozlar, reaktivlar va asbob uskunalari: Tuproq namunalari, chinni piyola, tarozi, ulchov kolbalari KCl ning 1% li eritmasi, Segnet tuzining 50% li eritmasi, Nessler reaktivi

Adabiyotlar: 5, 6, 8, 9, 11, 12

Tuproq tarkibidagi ammiak organik moddalarning chirishi natijasida hosil bo'ladi va u tuproqqa singib boradi. Bu singdirilgan ammiak kaliy xlorid tuzi bilan ajratiladi. Ajratilgan ekstraktdagi ammiak kolorimetr usulida Nessler reaktivi bilan aniqlanadi:



Ishtartibi. 10 grtuproq nitarozidatortibolib, 150 ml likonussimon kolbagasolinadi, uning ustiga 1% li KCl eritmasidan 100 ml quyib 5 minut aralashtiriladi va 18-20 soat tinch qoldiriladi. Shunda so'ng chayqatilib va filtrlanadi. Filtratdan pipetka yordamida 5-10-20 ml yoki 40 ml o'lchab olib, 100 ml o'lchov kolbasiga solinadi, unga 2 ml segnet tuzi eritmasidan quyiladi (segnet tuzi qo'shilmasa eritmadagi kalsiy va magniy tuzlar icha o'kmagatushishim mumkin), unga o'lchov kolbaning 3/4 qismigacha suv va 2 ml Nessler reaktivi qo'shiladi, o'lchov kolbasining belgisigacha suv to'ldiriladi, kolba biroz chayqatilib va kolorimetr orqali ko'riladi.

Natijani hisoblash:

$$X = \frac{a * \text{umumiy so'rimning miqdori} - 1000 \text{ mg/kg}}{\text{olingan so'rim miqdori} * \text{tuproq massasi}};$$

bunda:

X - namunadagi NH_4 miqdori, mg/kg tuproqda;

a - NH_4 miqdori, kalibrlangan egri chiziq bo'yicha, mg/100 ml da

Bir gektardagi NH_4 miqdorini hisoblash uchun (bir gektardagi tuproq haydov qatlamining massasi) 4000000 ga ko'paytirilib, 10000000 ga bo'linadi (mg ni kg ga aylantirish uchun).

Ma'lumki, bir ga yerning sathi $S = 10000 \text{ m}^2$, o'rtacha haydov qatlami 0-30 sm olinadi, 1 m^3 tuproqning solishtirma massasi - 1,200 kg ga teng, bularning hammasini bir-biriga ko'paytirib chiqqan 3600 tonna yoki 3600000 kg ni yaxlitlab, 4000000 kg hosil qilinadi.

Nazorat savollari

1. Tuproq tarkibidagi ammoniy shaklidagi azotni miqdori
2. Azotli o'g'itlar qo'llashning ammoniy azotni miqdoriga ta'siri
3. Tuproq tarkibidagi ammoniy azot 20 mg/kg bo'lsa, 1 ga maydonda qancha bo'ladi.

MAVZU–10

KARBONATLI TUPROQLAR TARKIBIDAGI HARAKATCHAN FOSFORNI VA ALMASHINUVCHI KALIYNI

B. P. MACHIGIN USULIDA ANIQLASH.

Mashg'ulotning maqsadi: Machigin usuli bo'yicha karbonatli sho'rlangan tuproqlar tarkibidaga harakatchan fosfor va almashinuvchi kaliyni aniqlashdan iborat.

Kerakli jihozlar, reaktivlar va asbob uskunalari: tuproq namunasi, distillangan suv, filtr qog'oz, ammoniy karbonat eritmasi, qalay xlorid

Adabiyotlar: 4,6,8,10,11,12

Uslubning mohiyati: Bu usul asosan harakatchan fosforli birikmani 1% li ammoniy karbonat eritmasi yordamida ajratib olishga asoslangan. Aniqlash ma'lum darajada fosfat kislotaning molibden angidrid va qalay xlorid bilan havo rangli murakkab birikma $(\text{MoO}_2 \cdot 4\text{MoO}_3)_2 \cdot \text{H}_3\text{RO}_4 \cdot 4\text{N}_2\text{O}$ hosil qilishga asoslangan.

Ish tartibi. Texnik tarozida tortilgan 5 gr tuproq (1mm li elakdan o'tkazilgan) 200-250 ml li konussimon kolbaga solinadi. Ustiga 1% li ammoniy karbonat $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ eritmasidan 100 ml quyiladi. Kolba 5 minut chayqatiladi va 18-20 soat tinch qoldiriladi. So'ngra filtrlanadi va filtratdan 10 yoki 20 ml olib kolbaga o'tkaziladi (100 ml li o'lchov kolbaga), unga 2 tomchi betadinitrofenol tomiziladi; ustidan 10% li sulfat kislotadan kuchsiz och sariq rangga o'tguncha quyiladi va 2 ml molibden reaktividan quyib, o'lchov kolbasining belgisigacha suv to'ldiriladi, hamda qalay xlorid eritmasidan 0,5 ml tomiziladi. 5 minutdan so'ng aralashma qizil rangli svetofiltr orqali kalorimetrlanadi.

Agarda filtrat rangli bo'lsa, filtratdan 10-20 ml olib 100 ml li o'lchov kolbaga o'tkaziladi, unga 2 ml 15:100 nisbatdagi sulfat kislota quyiladi va 4 ml 0,5n kaliy permanganat eritmasidan solinadi, so'ng suyuqlik 2-3 minut qaynatiladi. Organik modda yuqori haroratda kislotali muhitda kaliy permanganat ta'sirida parchalanadi (kislorod ajralib chiqib, eritma rangsizlanadi):



Ortiqcha kaliy permanganatni neytrallash maqsadida qaynoq eritmaga glyukozaning 10% li eritmasidan 1 ml quyiladi. So'ngra aralashma sovutiladi. Sulfat kislotani neytrallashda sovutilgan eritmaga 3 tomchi indikator betadinitrofenol tomiziladi, so'ngra och sariq rang hosil bo'lguncha sodaning 10% li eritmasidan qo'shiladi. Keyin unga 2ml molibden reaktivi qo'shib, o'lchov

kolbasining belgisigacha suv to'ldiriladi hamda qalay xlorid eritmasidan 0,5 ml tomiziladi, aralashma havo rangga bo'yaladi. Aralashma kalorimetrda tekshiriladi.

Natija quyidagicha hisoblanadi:

$$X = \frac{a * \text{umumiy so'rim xajmi} * 1000 \text{ mg/kg}}{\text{analiz uchun olingan so'rim} * \text{olingan tuproq massasi}};$$

bu yerda:

X - P_2O_5 mg/kg tuproqda;

a - kalibrlangan egri chiziqdagi P_2O_5 miqdori, mg/100 ml eritmada.

Almashinuvchan kaliyni aniqlash. Fosforni aniqlashda tayyorlangan filtratdan 5-10 ml olib, 50 ml li stakanga solamiz va alangali fotometrda o'tkazamiz.

Nazorat savollari

1. Karbonatli tuproqlar haqida tushuncha bering.
2. Machigin B.P. usulining asosiy mohiyatini ta'riflang
3. Almashinuvchan kaliyni aniqlash yo'llari
4. Fosfor va kaliyni foydalanish koeffisiyenti

MAVZU– 11

TUPROQDAGI YaLPI N, P, K MIQDORINI (BIRNAMUNADAN) ANIQLASH.

Mashg'ulotning maqsadi:
fosforva kaliyni aniqlashdan iborat.

Birnamunadanyalpi azot,

Kerakli jihozlar, reaktivlar va asbobuskunalar: Tuproq namunasi, filtr qog'oz, elektr plitka, ulchov kolbalari, 10 qism H_2SO_4 (solishtirmamassasi 1,84) va 1 qism (60%) xlorid kislotalar aralashmasi; 50% NaOH eritmasi; Nessler reaktivi; Segnettuzi; 10% liammiakeritmasi; Molibden reaktivi; Qalay (II) - xlorid eritmasi


Adabiyotlar: 2,4,8,9,10,11

Ishni bajarish tartibi: 0,25 mm li elakchadan o'tkazilgan tuproq namunasidan tarozida 2 gr tortib olib, 250 ml hajmli konussimon kolbaga solinadi va unga 5 ml sulfat va xlorid kislotalar aralashmasidan quyiladi. Taxminan 30 minutdan so'ng kolbaning og'ziga voronka qo'yib, kolba elektr plitkada ichidagi aralashma oqargunicha qaynatiladi (qizdirish mo'rili shkafda olib boriladi). Agar aralashmaning rangi o'zgarmasa unga 3 tomchi xlorid kislotalar tomizib, yana qaynatiladi. Shundan so'ng kolba sovutiladi va unga 30-40 ml suv quyiladi. So'ngra kolbadagi aralashma 100 ml li o'lchov kolbaga quyilib, uning belgisigacha suv to'ldiriladi, hosil bo'lgan aralashma filtrlanadi. Filtratdan azot, fosfor va kaliy aniqlanadi.

Azotnianiqlash. Filtratdan 2-3 ml olib, 50 ml o'lchov kolbasiga solinadi va uning ustiga 2 ml segnettu eritmasidan qo'shiladi (Segnettuziqo'shishdan maqsadkeyinchalik Nessl er reaktiviqo'shgandacho'k matush masligidir). Taxminan 10 minutdan keyin o'lchov kolbasiga 35-40 ml suv qo'yiladi va 5 % li NaON bilan eritmaneytral holatgakeltiriladi.

(Lakmusqog'ozbilansinalgandako'klakmusqizarishikerak). Neytrallashda ishqorni ortiq qo'shib yubormaslikkerak, chunki kuchli ishqoriy muhit suyuqlikni xiralashtiradi. So'ngra aralashmaga 2 ml Nessler reaktiviqo'shiladi,

bunda ammoniy tuzlarimerkurammoniy yodid hosilqilib sariqrang beradi:



Hosil bo'lgan aralashmayaxshilabaralashtiriladi va o'lchov kolbasining belgisiga achasuv qo'yibsvetofiltr - N₄ dakolometrlanadi.

Tajribanati jasiqo'yidagichahisoblanadi:

$$X = \frac{a \cdot \text{umumiysuyuqlik hajmi} \cdot 1000 \text{ mg/kg}}{\text{analiz uchun olingan so'rim} \cdot \text{tuproq massasi}};$$


X = N – NH₄ mg/kg hisobida

a - egri chiziqdagi ammoniy miqdori, mg

Fosforni aniqlash. Filtratdan 10 ml olib, 100 ml hajmli o'lchov kolbasiga quyiladi va uning ustiga 40 - 50 ml suv solinadi, aralashma och pushti rangga kiringuncha 10 % li ammiak eritmasi bilan neytrallanadi (fenolftalein yordamida ko'riladi). o'lchov kolbasining belgisigacha suv to'ldiriladi.

Neytrallangan eritmadan pipetka yordamida 10 ml o'lchab olib, 50 ml hajmli o'lchov kolbasiga solinadi. Unga 20-25 ml suv quyiladi va molibden suyuqligidan 2 ml qo'shib, o'lchov kolbasining belgisigacha suv to'ldiriladi, 0,5 ml qalay xlorid solib, yaxshilab aralashtiriladi.

Eritma xavo rangga bo'yaladi. Aralashmaning tarkibi quyidagicha:



Besh minutdan so'ng eritma kolorimetrda tekshiriladi. (Svetofiltr 7).

Kaliyni aniqlash. Filtratdan 5-10 ml olib, 50 ml hajmli stakanga quyiladi va kaliy alangali fotometrda aniqlanadi.

Tajriba natijasi quyidagicha hisoblanadi:

$$X = \frac{a \cdot 1000 \text{ mg/kg}}{\text{tuproq massasi}};$$

x - K₂O miqdori, mg/kg;

a - egri chiziqdagi K₂O, mg hisobida.

(Tayyorlanadigan standart suyuqlik 1 l hisobida tayyorlangan bo'lgani uchun hisoblashda tuproq massasi 2 gr emas, 20 gr olinadi).

Nazoratsavollari

1. Tuproqtarkibidagiazotningumumiymiqdorihaqidatushuncha
2. Tuproq tarkibidagi fosforning umumiy miqdori haqida tushuncha
3. Tuproq tarkibidagi kaliyning umumiy miqdori haqida tushuncha
4. Azot, fosfor va kaliyni aniqlash usullari haqida nima bilasiz

MAVZU–12

MINERAL O'G'ITLARNI SIFAT REAKSIYALARI YORDAMIDA ANIQLASH.

Mashg'ulotning maqsadi: Sifat reaksiyasi yordamida mineral o'g'itlarni aniqlashdan iborat.


Kerakli jihozlar, reaktivlar va asbob uskunalar: O'g'it namunalari, probirkalar, distillangan suv, Turli o'g'itlardan namunalar, distillangan suv, bariy xlorid 2-5% li eritmasi, ishqor eritmasi 8-10% li, xlorid kislota 1% li eritmasi yoki 1:10 nisatdagi sirka essensiyasi, Ko'mir cho'g'i, kumush nitrat 1-2% li eritmasi.

Adabiyotlar:5,6,8,9,11,12,


Xo'jaliklarda mineral o'g'itlarni noto'g'ri saqlash oqibatida ularning tarkibi o'zgarishi hollari ham uchraydi. Shuning uchun ularni qo'llashdan oldin sifatini tekshirib, so'ng me'yorini belgilash kerak.

Sifat reaksiyasini aniqlash uchun probirka (biror kichkina shisha idishcha) suv (distillangan) va ko'mir cho'g'i zarur.


Bulardan tashqari **BaCl₂, NaOH, AgNO₃** reaktivlari ham kerak bo'ladi. Agar o'g'it tarkibida Cl bo'lsa, kumush nitrat bilan reaksiyaga kirishadi oq cho'kma hosil bo'ladi.




Kumush nitrat fosforli o'g'itlar bilan reaksiyaga kirishganda sariq cho'kma hosil bo'ladi:



o'g'it tarkibida SO₄ bo'lsa, u BaCl₂ bilan reaksiyaga kirishib, sutsimon cho'kma hosil qiladi:



o'g'it tarkibida ammiak bo'lsa, u ishqor bilan reaksiyaga kirishib, ammiak ajratib chiqaradi (albatta, probirkani chayqatish kerak).



Tajribaniboshlashdan oldin paketdagi o'g'itning yarmisini yoki taxminan 0,5-1,0 gramni probirkaga solib, ustiga 6-8 ml distillangan suv quyiladi.

Probirkaniyaxshilabchayqatibo'g'itning erishdarajasaniqlanadi. Odatda o'g'itlarsuvdayaxshieriydigan, qisman eriydigan va erimaydigan bo'ladi. Agar o'g'itsuvda eris hosil bo'lgan eritma uchta probirkaga bo'lib quyiladivaularning har qaysisiga 2-3 tomchidan $BaCl_2$, va $AgNO_3$ eritmalaridanta'sirettiriladi. Suvda eriydigan o'g'itlarning quruqdonasi, yuqorida qaydetilganidek, ko'mircho'g'idek shiriladi. Masalan, selitracho'g'da portlagangao'xshabyonadi, ammiaklio'g'itlari esabo'linib tutunchi qaradiva ammiak hidini beradi. Kaliyli o'g'itlari esasachraydi. (qandayo'zgarish bo'lsadaftargayoziladi).

Agar o'g'itsuvda erimasa, u holda eritma biroz tindirilgach, undan 3-4 ml olib, ikkinchi probirkaga solinadiva ungakumush nitrat ($AgNO_3$) ta'sirettiriladi. Suvda erimaydigan o'g'itlarko'mircho'g'iyordamidek shirilmaydi.

SUVDA ERIYDIGAN O'G'ITLARNI ANIQLASH.

Tekshirilayotgan o'g'it namunasidan uchta probirkaga olib, ularni har qaysisiga alohida-alohida $BaCl_2$, $AgNO_3$ va $NaOH$ ta'sirettirilganda hyech qandayo'zgarish bo'lmasdan, faqatishqorta'sirettirilganda probirkada ammiak hidini bersa, bu o'g'it ammiakli selitra (NH_4NO_3) bo'ladi.

Buo'g'it namunasi uchta reaktivda o'zgarish bermasakaliyyokinatriyli selitra (KNO_3) bo'ladi. Agarko'mircho'g'idabina fsharang bo'lsa, kaliyli selitra (KNO_3) bo'ladi. Agarko'mircho'g'idasariqalangabersanatriyli selitra ($NaNO_3$) bo'ladi.

Ko'mircho'g'ida o'g'itdonalaribo'linib, sachramasdan ammiak hidini berishimukinyokiprobirkadagieritmagashqor ($NaOH$) ta'sirettirilganda ammiak hidini hosil bo'lsa, ammiaklio'g'it bo'ladi.

$AgNO_3$ qo'shilgan probirkada oqcho'kma, $BaCl_2$ qo'shilgan probirkada esaloyqahosil bo'lsa, bu o'g'it ammoniylorid bo'ladi.

$AgNO_3$ qo'shilgan probirkada loyqahosil bo'lib, $BaCl_2$ qo'shilgan probirkada sutsimonoqcho'kmahosil bo'lsa, ammoniysulfato'g'it bo'ladi.

$AgNO_3$ qo'shilgan probirkadasariqcho'kmahamda $BaCl_2$ qo'shilgan probirkada oqcho'kmahosil bo'lsa ammofos ($NH_4H_2PO_4$) va diammmofos ($(NH_4)HPO_4$) o'g'itlaribo'ladi.

Buo'g'itsuvdasekin eriydigan bo'lgani uchun unisuvda tekshirilayotgandako'proqcha yqatishkerak bo'ladi.

$NaOH$ qo'shilgan probirkada ammiak hidibo'lmasa, bu probirkada o'g'it mochevina [$CO(NH_2)_2$] bo'ladi.

Ko'mircho'g'idadonalaribo'linib sachraydivatutunchi qarmaydi. Bunday o'g'itlarkaliyli o'g'itlardahisoblanadi.

Agar o'g'ithar-hilrangdabo'lsasilvinito'g'it bo'ladi. ($mKCl * nNaCl$)

Agar o'g'itningko'rinishioshtuzigao'xshashhamda unga ayrimranglik kristallara ralashgan bo'lsa, kaliytuzio'g'it bo'ladi. Uning formulasim $mKCl * nNaCl$.

$AgNO_3$ qo'shilgan probirkada hyech qandayo'zgarish bo'lmasdan, faqat $BaCl_2$ ta'sirettirilgan probirkadasutgao'xshashoqcho'kmahosil bo'lsa, bundayo'g'itkaliysulfat bo'ladi. (K_2SO_4)

SUVDA ERIMAYDIGAN O'G'ITLARNI ANIQLASH.

Agar o'g'it suvda erimasa, ubiroztindirilgach, undan 3-5 ml olib, ikkinchi probir kagaqo'yiladi va faqat ***AgNO₃*** ta'sirettiriladi.

Agar ***AgNO₃*** ta'sirettirilganda tez dasariq hosil bo'lsa, superfosfato'g'it bo'ladi ***Ca(H₂PO₄)₂***.

Agar ***AgNO₃*** ta'sirettirilganda probir kaning pastki qismida sekin-astasariq rang hosil bo'lsa, presipitato'g'it bo'ladi. ***CaHPO₄*2N₂O***.

Agar ***AgNO₃*** ta'sirettirilganda probir kaning pastki qismida sekin-astasariq rang hosil bo'lsa, prepitato'g'it bo'ladi. ***CaHPO₄*2N₂O***

Agar ***AgNO₃*** ta'sirettirilganda ammiak hidipaydobo'lsa, tomasshlako'g'it bo'ladi. ***(Ca₄P₂O₉)***.

Agar ***AgNO₃*** ta'sirettirilganda ammiak hidipaydobo'lmasa, kalsiy sianamidi ***(CaCN₂)*** bo'ladi.

6-jadval

O'g'itlarning o'zigaxos xarakterli reaksiyalarini yozish uchun quyidagi jadvaldan foydalanish mumkin:

№	o'g'itning tashqi ko'rinishi va rangi	Suvda eruvchanligi	ko'mir cho'g'i da	Reaktivlar			o'g'itning formulasi	o'g'itning nomi
				NaOH	BaCl ₂	AgNO ₃		
1.	Oqdonador	eriydi	bor				NH ₄ NO ₃	Ammiakli selitra
2.								
3.								
4.								

MUHI MINERAL O'G'ITLARNI ANIQLASH.

Mineral o'g'itlar kristall va amorf hollarda bo'ladi.

Kristall holatdagi o'g'itlar suvda yaxshi eruvchan, amorf o'g'itlar esa kam eriydigan yoki erimaydigan bo'ladi.


Kristall holatdagi o'g'itlarga hamma azotli (kalsiy sianamiddan tashqari) kaliyli o'g'itlar (toshko'mir kuli va kalimagdan tashqari) hisoblanadi. Murakkab o'g'it ammos ham kristall holatdagi o'g'itlarga kiradi.

Fosforli va ohakli o'g'itlar hamda kalsiy sianomid va kalimag o'g'itlari amorf holatdagi o'g'itlar jumlasiga kiradi.

Shunday qilib, o'g'itlar eruvchanligiga ko'ra ikki gruppaga, ya'ni kristall holatdagi azotli va kaliyli o'g'itlar, amorf holatdagi fosforli va ohakli o'g'itlarga bo'linadi.


Azotli o'g'itlardan ammiakli selitra (NH_4NO_3). Uning tarkibidagi azot ammoniy va nitrat holida bo'ladi. Hozirgi vaqtda bu o'g'it maydonda donador shaklda chiqarilmoqda. Bu o'g'itdan tashqari natriy ($NaNO_3$) va kaliy (KNO_3) selitrasi ishlatiladi, kaliyli selitra murakkab o'g'it hisoblanadi. Bu o'g'itlarni faqat ko'mir cho'g'ida ajratish mumkin. Bunda sariq alanga bersa $NaNO_3$ va binafsha alanga bersa KNO_3 o'g'itlari bo'ladi. NH_4NO_3 ishqor eritmasi tomizilganda ammiak hidi ajraladi.

Bunda quyidagicha reaksiya boradi:




Natriyva kaliyliselitradabunday bo'lmaydi, ya'ni ammiak hidi ajralmaydi.

Ammoniy sulfat (NH_4) $_2$ SO $_4$ ko'mir cho'g'ida suyuqlanadivaoqtutun hosil qilib, ammiak ajratib chiqaradi:



Ammoniy sulfatni ammiakli selitradan ajratish uchun eritmaga 2-3 tomchi VaCl (bariy xlorid) eritmasi tomizilsa, oq cho'kma hosil bo'ladi.



Hosil bo'lgan oq cho'kma sirkayokixlorid kislotata'sirida eritmasi ammoniy sulfat o'g'it bo'ladi.

Mochevina CO(NH $_2$) $_2$ keng tarqalgan azotli o'g'itdir. Bu o'g'it ko'mir cho'g'ida ammiak hidini beradi, ishqor ta'sirida esa ammiak hidini bermaydi.


MDH va o'zbekistondagi asosiy kaliyli o'g'itlar quyidagilar:

kaliy xlorid (KCl), 40% li kaliy tuzi - KSl+mKC+nNaCl, silvinit - mKCl + nNaCl, kaliy sulfat - K $_2$ SO $_4$ va boshqalar. Kaliyli o'g'itlarning hammasi ko'mir cho'g'ida parchalanib, sachraydi. Ularni shu xususiyatiga ko'ra azotli o'g'itlardan farq qilish mumkin.


40% li kaliy tuzi oq va qizg'ish pushti kristallardan iborat.

Kaliy xlorid odatda mayda oq kristall yoki donador holatda bo'ladi.

Agar kaliyli o'g'it tarkibida xlor bo'lsa, bunday o'g'itga kumush nitrat eritmasidan 2-3 tomchi tomizilganda oq cho'kma hosil bo'ladi:



Kaliy sulfat oq yoki sarg'ish tusli kukun. Kaliy sulfat suvda eritilib, unga 2-3 tomchi bariy xlorid eritmasi (BaCl $_2$) tomizilganda oq cho'kma hosil bo'ladi.



Bariy sulfat sirka va kuchsiz xlorid kislotalarda erimaydi. Kaliy sulfat va ammoniy sulfat bariy xloridda bir xilda oq cho'kma hosil qiladi. Bularning farqini bilish uchun eritmaga 2-3 tomchi ishqor eritmasidan tomizilsa ammoniy sulfat ammiak hidi keladi, kaliy sulfatdan esa ammiak hidi kelmaydi.

Kainit, kalimag va kalimagneziya o'g'itlarni ham bariy xlorid ta'sirida oq cho'kma hosil qilsa, kumush nitratda hiech qanday o'zgarish bo'lmaydi.

Ammofos o'yuvchi natriy yoki o'yuvchi kaliy ta'sirida ammiak hidini, kumush nitrat ta'sirida esa sariq rang hosil qiladi.

Odatda azotli va kaliyli o'gitlar aniqlab bo'lingach, fosforli hamda ohakli o'gitlar aniqlanadi. Buning uchun sinalayotgan o'g'itdan tarozida 0,5-1,5 g tortib olib, unga 3-4 tomchi sirka yoki xlorid kislota eritmasidan tomiziladi. Bu reaksiyani chinni likopchada yoki temir qoshiqlarda bajarish mumkin. Agar sinalayotgan o'g'itga sirka yoki xlorid kislota eritmasidan tomizilganda o'g'it qaynasa, u ohakli yoki tomasshlak o'g'iti bo'ladi, chunki uning tarkibida tarkibida ohak ko'p bo'lganli uchun u qaynaydi. Fosforli o'gitlarning qolganlari esa sirka yoki xlorid kislota eritmasi ta'sirida qaynamaydi, ular faqat kumush nitrat ta'sirida sariq rang hosil qiladi.

Fosforit uni - qoramtir sarg'ish tusli, hidsiz, mayda og'ir kukun.

Presipitat - oq tusli hidsiz o'g'it.

Superfosfat - oqish yoki sariq tusli, o'ziga xos hidli fosforli o'g'it. o'g'itni probirkada eritib, bir oz tingandan keyin ko'k lakmus qog'ozini tekkizilsa, u qizaradi.

Suyak uni - och sariq tusli bo'lib, tarkibida fosfor va qisman azot bordir.

Kalsiy sianamid - qora tusli kukun, suvda erimaydi. Kalsiy sianamidning suvli eritmasiga qizil lakmus qog'oz tushirilsa, eritmaning muhiti ishqoriy bo'lgani uchun qizil lakmus qog'oz ko'karadi. Bu o'g'it ko'pincha defoliant sifatida ya'ni g'o'zaning bargini to'kish uchun ham ishlatiladi.

7-jadval

Turli o'gitlar 1m³ hajm massasi va 1 tonna hajmi.

№	o'g'itlar	1m ³ massasi (t)	1 tonnasi hajmi, (m ³)
1.	Oddiy superfosfat	1,1	0,9
2.	Presipitat	0,8	1,2
3.	Ammoniy sulfati	0,8	1,2
4.	Ammiakli selitra	0,8	1,2
5.	Kaliy sulfati	1,3	0,8
6.	Kaliy xloridi	0,95	1,1
7.	Yangi mol go'ngi	0,4-0,7	1,4
8.	Chirigan ot va mol go'ngi	0,9-1,0	1,0
9.	Yarim chirigan ot va mol go'ngi	0,7-0,8	-
10.	Go'ng shaltog'i	1,0	1,0
11.	Gips	0,75	1,3
12.	Maydalangan ohak	1,7	0,6

MINERAL O'GITLAR ANIQLAGICHI

1. a) O'g'itsuvdayaxshieriydiyokideyarlito'liqeriydi.----- 2
b) O'g'itsuvdayaxshierimaydi -----12
2. a) O'g'itningsuvlieritmasidanishqorta'siridaammiak(NH_3)ajraladi.----- 3
b) O'g'iteritmasidanishqorta'siridaammiakajramaydi----- 6
3. a) O'g'itningsuvlieritmasikumushnitrat(AgNO_3)bilanoqcho'kmahosilqiladi-----4
b) Oqcho'kmahosilqilmaydiyokioqrangliloqyahosilqiladi----- 5
4. a) Cho'kmaoqrangda – o'g'itquruq, ranglioqyokisariqsimonbo'lsa, -----
AMMONIYXLORID (NH_4Cl)
b) Cho'kmasariqrangda -----**AMMOFOS ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$), DIAMMOFOS ($(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$)**
5. a) O'g'iteritmasigabariyxlorig(BaCl_2)ta'sirettirilgandaoqcho'kmahosilbo'ladi -----
o'g'itquruq,ko'mircho'g'idaammiakajraladi ----- **AMMONIYSULFAT ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$)**
b) O'g'iteritmasigabariyxlorigda'sirettirilgandacho'kmahosilbo'lmaydi.
Kumircho'g'idaqaynaydivaammiakajraladi -----
AMMIAKLISELITRA(NH_4NO_3)
6. a) O'g'iteritmasigakumushnitrat(AgNO_3)ta'sirettirilgandaoqcho'kmahosilbo'ladi--.-7
b) Cho'kmahosilbo'lmaydi, loyqahosilbo'lishimumkin-----8
7. a) O'gitquruq, maydakristalsimonoqyokiapel'sinrangdagi aralashma -----
KALIYXLORID (KCl)
b) O'g'it ok yoki kristall kirmizi -----**KALIY TUZI.**
v) O'g'it oq, kirmizi va ko'k rang kristall aralashmalaridan iborat -----**SILVINIT ($\text{KCl} \cdot \text{NaCl}$)**
8. a) O'g'it eritmasi oksalat kislotasining ammoniyli tuzi ta'sirida oq cho'kma hosil qiladi -----
----- **OHAKLI SELITRA ($\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$)**
b) O'g'it eritmasi oksalat kislotasining ammoniyli tuzi ta'sirida oq cho'kma hosil qilmaydi, loyqa bo'lishi mumkin ----- 9
9. a) O'g'it quruq,ko'mir cho'g'ida ammiak ajraladi -----**KARBAMID ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$)**
b) Quruq o'g'it, qizdirilganda ko'mir cho'g'ida ammiak ajralmaydi -----10
- 10.a) O'g'it eritmasi bariy xlorid (BaCl_2) ta'sirida oq cho'kma hosil qiladi -----**KALIY SULFAT (K_2SO_4)**
b) O'g'it eritmasi bariy xlorid eritmasi ta'sirida cho'kma hosil qilmaydi-----11
- 11.a) O'g'it quruq, mayda kristall ko'mir cho'g'ida binafsha alanga berib yonadi --**KALIY NITRAT (KNO_3)**
b) O'g'it kristall, nam, ko'mir cho'g'ida sariq alanga berib yonadi---- **NATRIY NITRAT (NaNO_3)**
- 12.a) Probirkadagi quruq o'g'itga xlorid kislota (HCl) yoki sirka kislota (Ca_3COOH) eritmasi tomizilganda qaynaydi va ko'piradi -----13
b) Qaynamaydi, ko'pik hosil bo'lmaydi-----14
- 13.a) O'g'it oq rangda yoki loysimon va kukun holda ----- **OHAK**
O'g'it quruq, oq rangli-----15
b) O'g'it oq rangli emas-----16
- 15.a) O'g'it eritmasiga kumush nitrat (AgNO_3) ta'sir ettirilganda – oq cho'kma hosil bo'ladi.
Cho'kmaning ustki qatlami sarg'ish rangda ----- **PRESIPITAT ($\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)**
b) Cho'kmaning ustki qatlamida sariq rang bo'lmaydi -----**GIPS**
16. a) O'g'it to'q-kul rangda, kukunsimon yoki granulasimon, muhiti kislotali -----
-----**SUPERFOSFAT ($\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O} + 2\text{CaSO}_4$)**
b) O'g'it kul rangda, malla rangdagi aralashmadan iborat va tuproqsimon kukun holatda -----
-----**FOSFORUNI ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$)**

IZOH: Tekshirilayotgan o'g'it namunasi aniqlagich bo'yicha to'g'ri aniqlanmasa, demak siz xatolikka yo'l qo'ydingiz. Tahlil kaytadan qilinish kerak.

Nazoratsavollari

1. Mineralo'g'itlarhaqidatushuncha
2. Sifatreaksiyasihaqidatushunchabering
3. Azotlio'g'itlarnianiqlashnusullari
4. fosforlio'g'itlarnianiqlashusullari
5. Kaliylio'g'itlarnianiqlashusullari
6. Murakkab o'g'itlarning aniqlash usullari

MAVZU-13

SELITRA TARKIBIDAGI AZOTNI ISHQORIY MUHITDAGI ARALASHMADAN DEVARD USULIDA ANIQLASH.



Tajribaning maqsadi. O'g'it tarkibidagi azotni aniqlashdan maqsad, birinchidan o'g'itning me'yorini belgilash, ikkinchidan o'g'itni saqlashda uning tarkibidagi azotning o'zgarishini kuzatishdan iborat.

Kerakli asbob uskunalar, reaktivlar: Devard aralashmasi, 0,2n o'yuvchi natriy eritmasi, 30-40% li o'yuvchi natriy eritmasi, sulfat kislota eritmasi, indikatorlar


Adabiyotlar: 5,6,8,9,10,11,12

Tajribada nitrat ammiakkacha qaytariladi. Buning reaksiyasini, albatta, Devard aralashmasi yoki qotishmasi (mis, rux va alyuminiy) bilan ishqoriy muhitda olib boriladi. So'ngra Kyeldal apparatida ammiak haydash yo'li bilan aniqlanadi. Bunda yig'gich kolbadagi sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishgan ammiak miqdori bilan azot aniqlanadi.


Nitratning ammiakkacha qaytarilish reaksiyasi quyidagicha:



yoki umumiy holda quyidagicha yoziladi:



Reaksiyada ajralib chiqqan ammiak yig'gich kolbadagi sulfat kislota bilan quyidagicha reaksiyaga kirishadi:



Bunda 2g-atom 1g-mol N_2SO_4 yoki 2 g-ekv N_2SO_4 to'g'ri keladi.

1g-atom N_2 1g-ekv H_2SO_4 ni biriktiradi

14 g N_2 taxminan 1000 ml 1n H_2SO_4 ni biriktiradi

0,014 N_2 1 ml 1n H_2SO_4 ni biriktiradi

0,28 N_2 1 ml 0.2n H_2SO_4 ni biriktiradi.

Ishni tartibi. Maydalangan o'g'itdan o'rtacha namuna olinadi. Agar olingan o'g'it namunasi KNO_3 va NaNO_3 bo'lsa 4 g yoki NH_4NO_3 bo'lsa 2 g tarozida

tortib olib, 250 ml hajmli o'lchov kolbasiga solinadi. Kolbaning yarmisigacha (yoki 100-150 ml) distillangan suv quyib, o'g'it eriguncha chayqatiladi. So'ng kolbaning belgisigacha suv to'ldiriladi. Bunda agar hosil bo'lgan aralashma loyqa bo'lsa u filtrlanadi. Filtratdan pipetka bilan 25 ml olib, Kyel'dal kolbasiga solinadi va uning ustiga 25-30 ml distillangan suv quyiladi.

Yig'gich kolbaga eritma tayyorlash uchun 250-300 ml sig'imli konussimon kolba olib, byuretkadan 100 ml 0,2n sulfat kislota (N_2SO_4) solinadi, ustiga 3-5 tomchi indikator, metil qizili yoki metilqirmizi eritmasidan quyiladi, hamda kolba apparatga tutashiriladi. So'ngra o'g'itli eritmaga solingan kolbaga silindr orqali 25 ml (30-40%) ishqor eritmasidan qo'yib, uning ustiga 2- 2,5 g Devard aralashmasidan solinadi va kolbaning og'zi tezda yaxshilab beriktiladi (apparatga birlashtiriladi). So'ngra bug' hosil qiluvchi kolba ulanadi.

Apparatda haydash prosessi ammiak tamom bo'lguncha davom etadi. (haydash prosessi nihoyasiga yetgan-yetmaganligi lakmus qog'oz yordamida tekshirib turiladi). So'ngra yig'gich kolbadagi pushti rangli eritma to'q sariq rangga o'tguncha 0,2 n NaOH eritmasi bilan titrlanadi.

O'g'it tarkibidagi azot miqdori quyidagi formulaga ko'ra hisoblanadi

$$X = \frac{(a \cdot f_1 - b \cdot f_2) \cdot 0,0028 \cdot 100}{H};$$

Bunda:

x - o'g'it tarkibidagi azot miqdori, foiz hisobida;

a - yig'gich kolbadagi 0,2n H_2SO_4 miqdori, ml hisobida;

f_1 - va f_2 - kislota va ishqor tuzatmasi

0,0028 g 1 ml 0,2n N_2SO_4 ga to'g'ri keladigan azot miqdori;

100 – foizga aylantirish ko'paytmasi;

N - 25 ml eritmadagi o'g'itning massasi, bunda:

4 g - 250 ml

x - 25 ml

yoki 2 g o'g'it olingan bo'lsa, u holda:

2 g - 250 ml

x - 25 ml

25 x 2

$x = \frac{250}{25 \times 2} = 0,2 \text{ g}$

250

25 x 4

$x = \frac{250}{25 \times 4} = 0,4 \text{ g}$

250

Nazoratsavollari

1. Selitratarkibidagiazotningmiqdori
2. Ishqoriy muhit aralashmasi va Devard usuli haqida tushuncha bering
3. O'simliklaroziqilanishidaselitraningahamiyati

MAVZU-14


GO'NGTARKIBIDAGI N,P,K MIQDORINIANIQLASH.

Tajribaning maqsadi. Go'ng, go'ngsharbati, xo'jalikvasanoatchiqindilari, qushlarchiqindisi, ipakqurtchiqindisikulvashungao'xshashlarorganiko'g'itlardir. Organiko'g'itlartarkibida azot, fosfor, kaliy, mikroelementlar vasuvbo'ladi hamda ular har hil nisbatda uchraydi. Organiko'g'itlartuproqning biologik faoliyatini tezlashtiradi, tuproq strukturasini yaxshilaydi, tuproqdagi oziq elementlarni o'simlik o'zlashtirishini yaxshilaydi. Shuning uchun organiko'g'itlardan o'g'ri foydalanish, ularni saqlash yo'llarini o'rganish va ularni tarkibidagi oziq elementlarni aniqlash katta ahamiyatga ega.

Kerakli reaktivlar, asbob-kusurlar va jihozlar: Fenol sulfat kislotasi, ruh qirindisi yoki kukuni, simob metalli, selen (yoki $\text{SiO}_4 \cdot 5\text{N}_2\text{O}$), fenolftalein, o'yuvchining 30% li eritmasi, sulfat kislotaning 0,1neritmasi, indikator-kongoqiz yoki metilqiz yoki metiloranj, Nessler reaktivi, o'yuvchining 0,1neritmasi, distillangan suv. Texnik tarozi va uning toshlari, go'ng, filtr valak musqog'oz, Kyeldal kolbasini va konusimon kolbalar (250-300 ml), chinnikosachay yoki shishayoki pergament qog'oz, silindr, byuretkalar.

GO'NGTARKIBIDAGI UMUMIY AZOTNI IODLBAUER BO'YI CHA ANIQLASH.




Tajribaning mohiyati. Azot konsentrlangan sulfat kislotaga o'shib qizdirilganda (katalizatori simob, selen va boshqalar ishtirokida) butunlay ammiakka aylanadi. So'ngra sulfat kislotasi bilan reaksiyaga kirishib ammoniy sulfat hosil qiladi.





Ishtartibi. Tekshiriladigan go'ng dastlab maydalanadi. So'ngra chinnikosachay yoki shishayoki pergament qog'ozcha (moyvanamo'tkazmaydigan yuqqa qog'oz) qo'yib 10 g tortib olinadi. Tarozi dastlab tartiblangan go'ngni filtr qog'ozga o'rnatib, 200-500 ml hajmli Kyeldal kolbasiga solinadi. Kolba gapipetkayoki silindr orqali 30 ml fenol sulfat kislotasi quyiladi.

Bunda kolba qiziydigan uchun unibiroz sovutish kerak. Kolba chayqatiladi va unga 2-3 g rux kukunidan solib avval sekinroq, keyin esa kuchli qizdiriladi. Agar eritma qizarsa unga katalizatorlardan 2-3 tomchi simob yoki 0,1g selen yoki 0,5g $\text{SiO}_4 \cdot 5\text{N}_2\text{O}$ solib yana 30-35 minut qizdiriladi. So'ng kolba sovutiladi. Unga 100 mg ga yaqin distillangan suv quyiladi va ammiakni ajratish uchun Kyeldal apparatiga quyiladi. Kolba bir necha marta distillangan suv bilan yuviladi, kolbadagi aralashmaning miqdori 300 ml gacha bo'lishi kerak. Buning ustiga 2-3 tomchi fenolftalein va yana 120 ml o'yuvchi natriyning 30% li eritmasidan

quyiladi. Bu eritmani qo'shishdan maqsad kolbada ishqoriy muhit hosil qilishdir. Aralashmaga 1-2 g ruh qirindisi solinadi. Bunda aralashma tarkibidagi simob amid birikmalarini parchalaydi. Agar katalizator sifatida selen yoki $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ishlatilgan bo'lsa, ruh qirindisi ishlatish ortiqchadir.



Tayyorlangan eritmani yig'ish uchun asbob tayyorlanadi. Buning uchun 250-300 ml hajmda konussimon kolbaga 25 ml 0,1n N_2SO_4 eritmasidan va 2-3 tomchi indikatoridan solinadi. Bu eritma tayyor bo'lgandan so'ng Kyeldal apparatida ammiak haydala boshlaydi. Haydash dastlab kuchsiz aylanganda amalga oshiriladi keyinroq esa qaynatiladi. Bunda kolbadagi eritmaning hajmi 2/3 qismi qolguncha yoki 3 soat davomida qaynatiladi. Aralashmaning to'liq haydalgannini bilish uchun Kyeldal apparatida tushayotgan eritmada 1-1,5 ml olib, unga Nessler reaktivi ta'sir ettiriladi, bunda sariq rang hosil bo'lmasa eritma to'liq haydalgan bo'ladi. Nesseler reaktividan tashqari qizil lakmus qog'ozdan foydalanish mumkin, bunda qizil lakmus g'og'oz ko'karmasligi kerak. Haydalgandan keyin kolbada qolgan sulfat kislota 0,1n o'yuvchi natriy eritmasi bilan titrlanadi. Titrlash vaqtida indikatorga qarab eritmaning rangi o'zgaradi. Masalan metil qizili bo'lsa, qizilidan tashqari tilla ranggacha metiloranj bo'lsa ko'kdan qizilgacha o'zgarishi mumkin.



Go'ng tarkibidagi umumiy azot miqdori quyidagi formula asosida hisoblanadi:

$$X = \frac{(a \cdot T_1 - b \cdot T_2) \cdot 0,0014 \cdot 100}{H};$$

bunda:

a- 0,1n N_2SO_4 miqdori, ml hisobida

T_1 - 0,1n N_2SO_4 tuzatmasi

b- titrlash uchun sarflangan 0,1n NaOH miqdori, ml.

T_2 - 0,1n NaOH tuzatmasi

N - go'ngning massasi, g

100- foizga aylantirish ko'paytmasi

0,1 n N_2SO_4 ning xar bir millilitridagi bog'langan ammiak 0,0014 g azotga to'g'ri keladi.

GO'NG TARKIBIDAGI UMUMIY FOSFORNI ANIQLASH.

Tajribaning mohiyati. Tekshirish uchun oldindan tortib olingan go'ng quruq yoki ho'l usulda kuydiriladi. Natijada bu eritmalar kolorimetr yoki hajmiy usullarda tekshiriladi. Go'ng tarkibidagi fosforni quruq yoki ho'l kuydirish usullari o'simlik tarkibidagi fosforni aniqlash mavzusida yozilgan.

Go'ng tarkibidagi namlikni aniqlash. Buning uchun tarozida 3-5 g go'ng tortib olib, alyumin yoki shisha stakanchaga solinadi va termostatda 100-105°S

haroratda 3-4 soat davomida massasi o'zgarmaguncha quritilib tortiladi. Namlikni esa quyidagi formula yordamida hisoblash mumkin.

$$U = \frac{(a-b) * 100}{a};$$

bunda:

a- go'ngning qurimasdan oldingi massasi, g hisobida

b- go'ngning qurigandan keyingi massasi, g hisobida

100- foizga aylantirish ko'paytmasi.

Go'ngni analizga tayyorlash. Buning uchun oldindan yaxshilab aralashtirilgan va maydalangan go'ng olinadi. Go'ng quruq bo'lsa 2g yoki ho'l bo'lsa 5g olib toza, quruq probirkaga solinadi va tarozida tortiladi. Tortilgan go'ng 500 ml hajmli Kyeldal kolbasiga solinadi. Probirkani qaytadan tortib, go'ngning aniq massasi aniqlanadi.

Kuydirish. Kyel'dal kolbasi ichidagi aralashmasi bilan mo'rili shkafka quyiladi, unga konsentrlangan sulfat va nitrat kislota, aralashmasidan 20-25 ml quyiladi. Kolbadan qora tutun chiqa boshlashi azot oksidining ajralib chiqishidan dalolat beradi. Bunday xolatda kolba qattiq qaynamasligi uchun asbest to'rdan foydalanish kerak. Kolbani qattiq qaynatmaslik zarur. Unga vaqt-vaqti bilan 1-1,5 ml dan konsentrlangan nitrat kislota quyib turiladi. Bundan maqsad nitrat kislota havoda tezda uchib ketadi. Agar kuydirish vaqtida faqat sulfat kislota bo'lsa, go'ngning usti qorayib, kuydirish muddati sekinlashadi. Har safar nitrat kislota kuyishda kolba bir oz sovutiladi. Kolbadagi eritma rangsizlangach kuydirish nihoyasiga yetgan bo'ladi. Shundan so'ng kolbadagi aralashma sovutiladi, uning ustiga 100 ml distillangan suv quyib qaynatiladi. Bu vaqtda eritmada qolgan nitrat kislota havoga uchib ketadi. Eritma qaynagandan so'ng kolbadagi aralashma sovutiladi, uning ustiga 100 ml distillangan suv quyib qaynatiladi. Bu vaqtdagi eritmada qolgan nitrat kislota havoga uchib ketadi. Eritma qaynagandan so'ng filtrlanadi. Filtrlanganda eritmaga silikat kislota, gips, qum va boshqa elementlardan tozalanadi. Kolba tagida qolgan cho'kma esa qaynoq distillangan suv bilan bir necha marta yuviladi. Hosil bo'lgan eritmaning hammasi 250 ml li o'lchov kolbasiga solinadi va kolbaning belgisigacha distillangan suv quyiladi. Eritmani aralashtirib, uning yarmisidan kaliyni aniqlashda foydalanish mumkin.

Eritmani analiz qilishdan oldin 10 marta suyultirish kerak, buning uchun tayyorlangan aralashmadan 25 ml olib, 250 ml hajmli o'lchov kolbasiga solinadi va kolbaning belgisigacha distillangan suv quyiladi. Bu tayerlangan eritmadan 20 ml olib, 50 yoki 100 ml hajmli o'lchov kolbasiga solinadi. Uning ustiga 2 ml molibden reaktivi va 8-10 tomchi kaliy eritmasidan qo'shiladi hamda kalorimetrlanadi.

Go'ng tarkibidagi umumiy fosfor miqdorini Betchera-Vagner va Shefer usullarida ham aniqlash mumkin. Buning uchun suyultirilmagan eritmadan Shefer usullari asosida bajariladi.

GO'NG TARKIBIDAGI UMUMIY KALIYNI ANIQLASH.

Tajribaning mohiyati go'ng tarkibidagi umumiy fosforni aniqlashdagi kuydirishga o'xshashdir. Bunda kaliy, natriy, kobalt ishtirok etadi. Ya'ni 1 ml 0,2n kalsiy permanganatga 0,711 ml kaliy yoki 0,856 ml K_2O to'g'ri keladi.

Ish tartibi. Go'ng tarkibidagi umumiy fosfor aniqlanadigan eritmadan 100 ml ni chinni kosacha solib, qurigunicha suv hammomida bug'latiladi. Qurigandan so'ng 3-4 ml 10% li sirka kislota eritiladi va kulsizlantirilgan filtr orqali filtrlanadi. Chayindi eritma 10 ml qolgunicha suv hammomida bug'latiladi. So'ngra buning ustiga tomchilatib 10 ml natriy kolbaltning eritmasidan quyiladi.

Analizning davomi, hisoblash, kerakli reaktiv va asboblari kaliyli o'g'itlar tarkibidagi kaliyni kobaltni nitrat usulida aniqlashga qarab ishlanadi.

8-jadval

Mahalliy o'g'itlar.(%)					
O'g'ituri	Namlik,(%)	N	P_2O_5	K_2O	SaO
<u>Somon to'shamali go'ng:</u>					
yarim chirigan aralash	75,0	0,50	0,25	0,60	0,35
ot go'ngi	71,3	0,58	0,28	0,63	0,21
qoramol go'ngi	77,3	0,45	0,23	0,50	0,40
qo'y qiyi	64,6	0,83	0,23	0,67	0,33
cho'chqa go'ngi	72,4	0,45	0,19	0,60	0,18
<u>Qushlar axlati:</u>					
kaptarlar	52	1,2-	1,7-2,2	1,0-2,2	-
tovuqlar	56	2,4	1,5-2,0	0,8-1,0	-
o'rdaklar	57	0,7-	1,5	0,4	-
g'ozlar	82	1,9	0,5	1,1	-
<u>Go'ng shaltog'i:</u>					
otxonalardan	-	0,6	0,08	0,58	-
fermalardan	-	-	0,12	0,38	-
cho'chqa xonalardan	-	0,39	0,06	0,36	-
<u>Kul:</u>					
bug'doy somoni	-	0,31	6,40	13,6	5,9
javdar somoni	-	-	4,7	16,2	8,5
go'ngkuli	-	-	5,0	11,0	9,0
		-			
		-			

Nazoratsavollari

1. Go'ngtarkibidagi azotni aniqlash
2. Go'ngtarkibidagi fosforni aniqlash
3. Go'ngtarkibidagi kaliyni aniqlash
4. Go'ngning tuproq unumdorligi va o'simliklarning oziqlanishiga siri

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. B.S. Musayev. Agrokimyo. Toshkent. 2001.y.
2. Agrokimyo (akad. B.A.Yagodin taxriri ostida) M. 1987.y
3. Agroximicheskiye metody issledovaniya pochv Izd. "Nauka". Moskva, 1975 g.
4. Boboxo'jayev I. Uzoqov P. Tuproqning tarkibi, xossalari va analizi. T. "Mehnat" 1990 y.
5. Voskresenskiy P.I. Texnika laboratornyx rabot. Izd. "Ximiya". Moskva. 1970 g.
6. MiraxmedovH. vaMiryunusovM. Tuproqshunoslikdanamaliymashg'ulotlar. T. o'qituvchi. 1976 y.
7. NiyozaliyevI.N., OtabekovN.A., KonV.M.,ToirovT.Z., B.B. Rajabov. Agroximiyadanamaliymashg'ulotlar. T. "Mehnat". 1989 y.
8. Peterburgskiy A.V. Praktikum po agronomicheskoy ximii. M. "Kolos"1968 g.
9. Praktikum po agroximii. A.S. Radov tahriri ostida. M. "Kolos" 1971 g.
10. Praktikum po agroximii. B.A. Yagodin tahriri ostida. M. "Agropromizdat" 1987 g.

ILOVA

5141000 – Tuproqashunoslik, 5620100 – Agrokimyovaagrotuproqshunoslik, 5410200-Agronomiya, 5410300 – O'simliklarhimoyasivakarantini, 5410200 – Kasbiyta'lim (Agronomiya) ta'limyonalishlarining 2017-2018 o'quvyilinamunaviyo'quvregalariacocidalaboratoriyaishlarinibajarishushunmavzulari, testvayakuniynazoratsavollaritavsiyaetiladi.

«O'simliklarni oziqlanishi va o'g'itlar»fanidan yakuniy nazorat savollari

1. Agrokimyo - dehqonchilikni kimyolashtirish va Agrokimyoviy xizmatni to'g'ri tashkil etishning ilmiy asosi sifatida. O'simlik-tuproq-o'g'itning biologik va kimyoviy xususiyatlari, o'zaro ta'siri. O'simliklarning oziqa moddalarga talabi. Jaxonda, MDX da va O'zbekistonda mineral o'g'itlar ishlab chiqarishning hozirgi ahvoli.
2. Tuproq azoti, uning asosiy shakllari va o'zgarishi. Tuproqdagi azot umumiy miqdori. Mineral va organik azot. Ammonifikasiya, nitrifikasiya, denitrifikasiya, immobilizasiya. Biologik azot. Tuganak va erkin yashovchi azot to'plovchi bakteriyalar
3. Go'ng. Go'ngning tuproq unumdorligi va o'simlik hosildorligini oshirishdagi roli, Go'ng turlari. To'shamali go'ng. Tarkibi, olinishi, saqlash usullari, saqlashda organik modda, azot yo'qolishi oldini olish choralari. Kuzgi shudgor bilan, oziqlantirishda va "sharbat" usulida qo'llash
4. Tuproqning biologik singdirish qobiliyati. Tuproq mikroorganizmlari. Azotni tuproqda singdirilishida mikroorganizmlar ahamiyati. Biologik singdirishning ijobiy ta'siri va undan samarali foydalanish yo'llari
5. Murakkab-aralash o'g'itlar, olinishi xossalari qo'llanilishi. Murakkab -

aralash o'g'itlar turlari. Sulfatli, sulfat kislotali, fosforli nitrofoska. Nitroammofos-ammofos asosida olingan murakkab aralash o'g'it. Karboammofos va karboammofoska, oziqa moddalarining nisbati va miqdori.

6. Agrokimyo fani va uslublari. Agrokimyo fani haqida D.N.Pryanishnikov, V.A.Mineyev ta'riflari. Agrokimyo fani asosiy vazifasi. Agrokimyo fanining uslublari. Biologik uslublari, kimyoviy uslublari.

7. Amidli azotli o'g'itlarning tuproqda o'zgarishi. Amidli o'g'itlar turlari. Mochevinaning tuppokda o'zgarishi. Ureaza fermenti ahamiyati. Nitrifikasiya jarayoni kechishi. Ureaza va nitrifikasiya jarayonini susaytirish

8. To'shamasiz Go'ng olinishi, tarkibi, xossalari, yarim suyuq va suyuq go'ng. To'shamasiz go'ng tarkibi. To'shamasiz go'ngni saqlash. Saqlash davomida oziqa moddalari yo'qolishi. To'shamasiz go'ng qo'llash usullari. Asosiy o'g'itlash va oziqlantirish

9. O'g'it qo'llashning ekologik muammolari. O'g'it hosildorlikni oshiruvchi muhim faktor. O'g'it tarkibidagi ballast moddalar: gips, ftor va h.k. Moddalarning tuproq, suv, sizot suvlar qishloq xo'jalik mahsulotlari tarkibida cheklangan miqdori (PDK) Tuproq grunt suvlari, qishloq xo'jalikmahsulotlarining ifloslanishi oldini olish, ekologik sof mahsulot ishlab chiqarish

10. Tuproq muhiti reaksiyasi-rNning O'simlik uchun ahamiyati. Tuproq muhiti reaksiyasi - rN haqida tushuncha. Bo'z tuproqlarda muhit reaksiyasi. Aktual Potensial, almashuvchan, gidrolitik kislotalik. Tuproqning asoslar bilan tuyinish darajasi. Oxak solish. Har xil o'simliklarning neytral, kislotali va ishqorli rN muhitiga munosabati

11. Tuproq singdirish kompleksi, tarkibi va to'zilishi. Singdirish kompleksining K.K.Gedroys bergan ta'rifi. Tuproq kolloidlari. Organik mineral va organomineral kolloidlar. Kolloid zarralar turlari, to'zilishi va zaryadining tuproq muhitiga bog'liqligi

12. Suvda eruvchan fosforli o'g'itlar. Fosforli o'g'itlar ishlab chiqarish uchun asosiy xom ashyo. Fosforli o'g'itlar klassifikatsiyasi. Superfosfat, olinishi, tarkibi, xossalari. Qo'sh superfosfat. Superfosfatni qo'llash usullari, me'yorlari va muddatlari. Ammoniyashtirilgan superfosfat va uni xossalari

13. Kompleks o'g'itlar va ularni qo'llash istiqbollari. Klassifikatsiya. Murakkab o'g'itlar, murakkab aralash va aralash o'g'itlar. Ularning afzalliklari. Ammofos misolida murakkab o'g'itlarga tavsif berish

14. Tuproq singdirish qobiliyati va uning o'simlik oziqlanishidagi ahamiyati. Tuproq singdirish qobiliyati haqida tushuncha K.K.Gedroys ishlari. Biologik, mexanik, fizik, fizik-kimyoviy va kimyoviy singdirish qobiliyatlari,

15. Ammoniyli o'g'itlar. Ammoniyli o'g'itlar turlari, qattiq va suyuq ammoniyli o'g'itlar TKSga ammoniyni singdirilishi. Tuproq nitrifikatsiya jarayonini va uni susaytiruvchi moddalar (ingibitorlar, ATG, KMP boshqalar)

16. O'simliklar tarkibida oziqa moddalar miqdori nisbati va tuproqdan olib chiqilishi. O'simliklar uchun kerakli va shartli kerakli elementlar haqida tushuncha.. O'simliklarning elementlarni o'zlashtirishi. Xo'jalik, biologik, qoldiq olib chiqish. Olib chiqilgan elementlarning o'simlik hosili tarkibidagi nisbati.

17. Suyuq azotli o'g'itlar. Suyuq azotli o'g'itlar turlari. Suvsiz ammiak,

ammiakli suvning olinishi, xossalari tarkibi, saqlashning o'ziga xos jihatlari. Suyuq azotli o'g'itlarni tuproqqa qo'llash usullari, qo'llash chuko'rligining azot yo'qolishi miqdoriga bog'liqligi. Azotning tuproqda o'zgarishi.

18. Bo'z tuproqning agrokimyoviy tavsifi. Och tusli, tipik to'q tusli bo'z tuproqlar. O'tloq- bo'z va o'tloq tuproqlar chirindi umumiy va harakatchan oziqa moddalari miqdori. Tuproqlar singdirish sig'imi, singdirilgan kationlar tarkibi

19. Aralash o'g'itlar va ularga qo'yiladigan talablar. Aralash o'g'itlar olishning ikki yo'nalishi haqida. Aralashtiruvchi o'g'itlarning fizik-kimyoviy xususiyatlariga qo'yiladigan talablarning aralashtirish hajmi, tayyorlash uslubi va vaqtiga bog'liqligi. Ilgaridan va bevosita qo'llash oldidan tayyorlash. Mutlaqo aralashtirish mumkin bo'lmagan o'g'itlar

20. O'simliklar tomonidan o'zlashtiriladigan oziqa moddalari shakllari. NO_3 va NH_4 asosiy shakldagi azot elementi. N_2RO_4 , NRO_4 , RO_4 , $-\text{RO}_4$ shakldagi fosforli birikmalarni o'zlashtiruvchi ekinlar.

21. Ammiakli-nitratli azotli o'g'it. Olinishi, xossalari, tarkibi fizik xossasini yaxshilash yo'llari. Sifatiga qo'yiladigan talablar. Tuproqda o'zgarishi, qo'llash usullari, muddatlari, me'yorlari.

22. Organik va mineral o'g'itlarning o'simliklar hosildorligini oshirish qishloq xo'jalik intensivlashtirishdagi roli. O'g'itlar-o'simliklar hosildorligini oshiruvchi omil ekanligi. Mineral o'g'itlarga bo'lgan talab (dunyoda, MDHda va O'zbekiston misolida)

23. O'simliklar tomonidan kaliy o'zlashtirish denamikasi. Kaliyning o'simlikdagi shakli. Xujayradagi kaliy miqdori. Kaliyning o'simlikdagi bajaradigan funksiyasi. g'o'za, bug'doy o'simliklari o'sish va rivojlanish fazalari bo'yicha (shonalash, gullash va x.k) kaliyni o'zlashtirish.

24. Tuppok tapkibi, uning o'simlik oziqlanishidagi ahamiyati. Tuppoqning tapkibi haqida tushuncha, tuproq havosi. Tuproq eritmasi va qattiq qismining oziqlanishidagi ahamiyati. Tuproq qattiq qismining o'rtacha kimyoviy tarkibi. Tuproq mineral va organik qismi haqida tushuncha.

25. O'simliklar uchun azotning ahamiyati, azot yetishmasligi belgilari. Azotning asosiy manbalari. Azotning O'simlikda o'zgarishi. Aminlanish, qayta aminlanish jarayoni. Nitratlar reduksiyasi. O'simliklarda azot bajaradigan funksiyalar. Azot yetishmaslik belgilari. Ortiqcha berilganda o'simlikdagi o'zgarishlar.

26. Ammofos va diammmofos asosida olinadigan murakkab aralash o'g'itlarning xossalari, tarkibi, xususiyatlari. Ammofos va diammmofos, ammofoska va diammmofoska o'g'itlarini qo'llash.

27. Fizik-kimyoviy yoki almashinuvchan tuproq singdirish qobiliyati. Fizik-kimyoviy singdirish mexanizmi, uning ekvivalent miqdorda boshqa kation siqib chiqarilishi bilan birga borishi. Fizik-kimyoviy singdirilgan kationlarning o'simlik tomonidan yengil o'zlashtirilishi.

28. O'simliklar uchun fosforning ahamiyati. Fosforli birikmalarni fiziologik roli. ATF-energiya manbai. O'simlikda fosfor reutilizasiyasi. (ilgari ishlatilgan fosforni qaytadan ishlatilishi). O'simlik uchun fosfor manbai. Fosfor

yetishmasligi belgilari. Uning oldini olish.

29. Kaliyli o'g'itlar olinishi, xossalari, qo'llanilishi. Asosiy kaliy saqlovchi minerallar. Kaliyli o'g'itlar ishlab chiqarish usullari galurgik, flotasion, konsentrlashgan va xom kaliy tuzlari. Kaliyning tuproqda o'zgarishi va kaliyli o'g'itlar qo'llash.

30. Tuproq singdirish sig'imi, singdirilgan kationlar tarkibi. Tuproq singdirish haqida tushuncha, uning birligi, Singdirish sig'imiga zarrachalar diametri, mineralogik tarkib, chirindi miqdori, tuproq muhiti reaksiyasi rN ta'siri. Bo'z tuproqlar singdirish sig'imi, singdirilgan asoslar tarkibi haqida.

31. O'g'it qo'llash usullari, uslublari, muddatlari, texnikasi. Asosiy, qator orasiga va oziqlantirishda o'g'itlar qo'llash uslublari. Kuzda, bahorda yozda qo'llash muddatlari. Sochma, lokal, lenta, usulida o'g'it qo'llash usullari. texnikalari.

32. Agrokimyoviy xaritanoma. Agrokimyoviy ko'rsatkichlardan o'g'itlarni to'g'ri qo'llashda foydalanish. Agrokimyoviy katrogrammalar haqida tushuncha. Harakatchan fosfor va almashinuvchan kaliy bo'yicha tuproq guruhlanishi. Tuproq ta'minlanish darajasiga ko'ra o'g'it me'yoriga tuzatish kiritish koeffitsiyentlari.

33. Makro va mikroelementlar, ularning o'simlikdagi miqdori. Makroelement va mikroelement haqida tushuncha. O'simlik uchun kerakli va shartli kerakli elementlar. O'simlikda azot, fosfor, kaliy miqdori. Mikroelementlar (V, Mp, MO, Zp, Su, So) ning o'simlikdagi miqdori. Makro va mikroelementlarni o'simlik uchun ahamiyati haqida qisqacha tushuncha.

34. Ko'kat o'g'itlarning tuproq unumdorligini oshirishdagi foydalanilishi. Ko'kat o'g'it to'g'risida tushuncha, Ko'kat o'g'it sifatida foydalaniladigan o'simliklar. Siderasiya. Dukkakli sideratlar. Siderasiyaning tuproq unumdorligini oshirishdagi ahamiyati.

35. Tuproq fizik singdirish qobiliyati. Fizik singdirish haqida tushuncha. Fizik singdirishning tuproq zarrachalari umumiy yuzasiga bog'liqligi. Ijobiy molekulyar adsorbsiya, salbiy molekulyar adsorbsiya. Ularning o'g'it qo'llashdagi o'simliklar oziqlanishidagi ahamiyati.

36. Agrokimyoviy xizmatni tashkil etish. Loyixa qidiruv Agrokimyoviy laboratoriyalar faoliyati. Bozor iqtisodiyoti sharoitida Agrokimyo-servis xizmatini tashkil etish. Tuproq kartasi tuzish, katrogrammalar tashkil etish namuna olish. Laboratoriyada turli oziqa moddalar tahlili. Ulapni xaritaga kiritish. O'g'itlash tizimi uchun tavsiya berish.

37. Tuproq singdirish qobiliyati. O'g'it qo'llashda almashinuvchan singdirish qobiliyatini ahamiyati. Turlari. Fizik-kimyoviy yeki almashinuvchan singdirish manfiy zaryadlangan kolloid zarralarning eritmasidan turli kationlarni singdirish Tuproq singdirish kompleksida ketadigan jarayonlar. Fizik-kimyoviy singdirishning tuproq xossalari va O'simlik oziqlanishidagi ahamiyati.

38. Tashqi muhitning o'simlikka oziqa moddalari o'tishiga ta'siri. Tashqi muhit faktorlari turlari haqida tushuncha. Oziq eritmasi konsentrasiyasi. Ildizning eritmadan oziqa o'zlashtirish xususiyatlari. Turli o'suv davrida o'simliklarning tuproq eritmasi konsentrasiyasiga munosabati.

39. Sapropel - chuchuk suv havzalari loyqasini o'g'it sifatidagi ahamiyati. Sapropel -loyqa paydo bo'lishi, tarkibi tashqi ko'rinishi xossalari. Sapropeldan o'g'it tayyorlash texnologiyasi. O'g'it sifatida qo'llash xususiyatlari. sinergizmi. Ionlar antogonizmi. Ionlar reutilizasiyasi.

40. Tuproq kimyoviy singdirish qobiliyati. Uning o'g'it va tuproq o'zaro ta'siridagi roli. Tuproq kimyoviy singdirishi reaksiyalari. Bir va ikki valentli anionlarning kimyoviy singdirilish mexanizmlari. Qora va bo'z kislotali tuproqlarda fosfor singdirilishi.

41. Nitratli azotli o'g'itlar ularni qo'llash xususiyatlari. Natriyli selitra olinishi, tarkibi, xossalari, qo'llanilishi. Kalsiyli selitra olinishi, tarkibi, xossalari,

42. Tuproq unumdorligi haqida tushuncha. O'g'itlarning tuproq unumdorligini oshirishdagi ahamiyati. Unumdorlik turlari. Unumdorligini oshirishda bilvosita va bevosita ta'sir ko'rsatuvchi vositalar. Mineral, organik va ko'kat o'g'itlar-tuproq unumdorligini oshiruvchi asosiy omillardan biridir.

43. Tuproq biologik singdirish qobiliyati. Biologik singdirish qobiliyati haqida tushuncha. Rizosfera mikroorganizmlari. Azotli birikmalar o'zgarishida mikroorganizmlar roli. Biologik singdirish qobiliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.

44. Superfosfat, qo'shsuperfosfat olinishi, xossalari, tarkibi, qo'llanilishi. Fosfor xom ashyosi: appatit, fosforit. Superfosfat olish texnologiyasi. Kukunsimon, donador, konsentrlashgan superfosfat: olinishi, tarkibi, xossalari. Erkin kislotalikni yo'qotish.

45. Ammiakatlar olinishi, xossalari, qo'llanilishi. Ammiakat - mochevina, ammiakli selitraning suvli ammiakdagi eritmasi. Olish texnologiyasi. Fizik xossalari, tarkibi, qo'llash

46. Azotli birikmalarning o'simlikda o'zgarishi. Aminlanish. Nitratlar reduksiyasi. qayta aminlanish. Dezaminlashish. Azotli birikmalar o'zgarishini o'rganishda D.N.Pryanishnikov ishlari.

47. Xlor saqlovchi kaliyli o'g'itlar. Kaliy saqlovchi minerallar. Xlor saqlovchi o'g'itlar: kaliy xlorid, xlor-kaliy elektrolit, olinishi, xossalari, tarkibi, tuproqda o'zgarishi. Xlorga sezgir o'simliklar. Xlorli shurlanish sharoitida qo'llash jihatlari.

48. Fizik-kimyoviy singdirilishning asosiy qonuniyatlari. Kationlar almashuvi reaksiyasi qaytar jarayon. Kationlar almashuvi tezligi. Turli kationlar singish tezligi va energiyasi. Kationlar singish kattaligiga ko'ra kationlar qatori. Fizik-kimyoviy singdirilishning ahamiyati.

49. Aralash o'g'itlar, ularni qo'llash. Aralash o'g'it tayyorlashning ikki yo'nalishi. Aralash o'g'itga qo'yiladigan talablar. Avvaldan va qo'llash oldidan tayyorlash. o'g'itlarni aralashtirish mumkinligi. Aralash o'g'itni qo'llash jihatlari.

50. Go'ng sharbati, olinishi. Go'ng sharbati miqdorini saqlash usuliga bog'liqligi. Go'ng sharbati tarkibi. Undan azot yo'qolishi oldini olish. Go'ng sharbatini ishlatish asosiy o'g'it, oziqlantirish, kompostlarga qo'shish.

51. Qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligini oshirishdagi ahamiyati. Oziqa moddalar olib chiqishi. Oziqa elementlari balansi. O'g'it qo'llash iktisodiy samaradorligini oshirish yo'llari, maqbul, o'g'it turi, me'yori, mineral o'g'it va organik o'g'itlarni birga qo'llash, Agrokimyoviy kartogrammadan foydalanish.

52. Oziqa eritmalari, O'simliklarni oziqa eritmasida o'stirish. Hidroponika. Oziqa eritmalariga talablar. Hidroponika o'stirish muhiti va eritmalari.

53. To'shamali va to'shamasiz go'ngni saqlash usullari. To'shamali go'ngni hayvonlar tagida saqlash, zich, yarim zich, zichlanmasdan saqlash. To'shamasiz go'ngni saqlashning 2 usuli.. Saqlash davomida oziqa moddalari yo'qolishini oldini olish choralari.

54. Suyuq kompleks va suspenziyalashtirilgan o'g'itlar. Suyuq kompleks o'g'it olish sxemasi. Termik va ekstraksion fosfor kislotalari. 10-34-0, 8-24-0, 11-37-0 bazis 12-40-0 suspenziyalashgan o'g'it bazis eritmasi. Suyuq kompleks o'g'itlar afzalliklari, ishlatilishi, qo'llash texnikasi.

55. O'simliklar turli o'suv davrlarida oziqlanish sharoitlariga munosabati. oziqlanishning davriyligi. Oziqlanish kritik, maksimal davrlari. Asosiy qishloq xo'jalik ekinlari (g'o'za, bug'doy, kartoshka)ning azot, fosfor va kaliyga munosabati

56. Tuproqda fosfor shakllari, fosforli birikmalarning tuproqda o'zgarishi, fosfatlardan foydalanish ko'ffisientini oshirish yo'llari. Tuproqdagi umumiy zahirasi. Mineral va organik fosfor. Oson o'zlashtiriluvchan, suvda eruvchan, harakatchan, kislotada eruvchan fosfor birikmalari, ularning o'g'itdan foydalanish ko'ffisientini oshirishdagi roli.

57. Xlorsiz kaliyli o'g'itlar. Kaliy sulfati, kalimagneziya, kalimagneziyali konsentrat sement changi, potash, olinishi, xossalari, tarkibi, qo'llash me'yorlari, usullari, muddatlari, tuproqda o'zgarishi.

58. Tuproq tarkibi uning o'simlik oziqlanishidagi ahamiyati. Tuproq xavosi, eritmasi, qattiq fazasi tarkibi, o'simlik oziqlanishidagi ahamiyati eritma tarkibidagi anionlar va kationlar. Tuproq qattiq fazasi mineral va organik faza.

59. O'g'it qo'llash usullari, uslublari, muddatlari ularni agrokimyoviy jihatdan baholash. Asosiy (ekishdan oldin, kuzda, ekish oldidan) ekish bilan birga, oziqlantirishda o'g'it qo'llash. Yoppasiga, bir joyga (uyalab, qatorlab, lokal) kultivator bilan, boronalashda, kuzgi shudgorda o'g'it qo'llash.

60. Fiziologik nordon, ishqoriy, neytral azotli o'g'itlar. Ularning turlari, olinishi xossalari. Ushbu o'g'itlarni qo'llash sharoitlari.

61. Yorug'lik, issiqlik va muhit reaksiyasining o'simliklar oziqlanishiga ta'siri.. Asosiy ekinlar uchun minimum, optimum, maksimum harorat. Fotosintez faolligi rN muhitining oziqlanishiga ta'siri. Ishqoriy muhitda, kislotali muhitda yaxshi o'zlashtiriluvchi oziqa moddalari.

62. Tuzlarning fiziologik reaksiyasi. Fiziologik nordon, ishqoriy va neytral tuzlar. O'g'itlarning nordonlik, ishqoriyli xususiyatlari. Ushbu xossalarning o'simlik oziqlanishidagi ahamiyati.

63. Moddalarning cheklangan miqdori haqida tushuncha (PDK). Sabzavot ekinlari, poliz va yem-xashak ekinlari tarkibida nitratlar va og'ir metallarning cheklangan miqdori. nitratlar, og'ir va radioaktiv moddalar bilan ifloslanishi yo'llari, ularning oldini olish.

64. Tuproq mikroorganizmlarining o'simliklar mineral oziqlanishiga ta'siri. avtotrof va geterotrof mikroorganizmlar. Nitrifikasiya. Denitrifikasiya. Ammonifikasiya. Tuganak va erkin yashovchi azot to'plovchi bakteriyalar.

65. Ammiakli selitranning ishlatilishi. Olinishi, xossalari, tarkibi, o'g'itga qo'yiladigan talablar. Tuproqda o'zgarishi. Qo'llash usullari va muddatlari.

66. Ko'kat o'g'itlar. Ahamiyati, afzalligi va kamchiligi. Ko'kat o'g'itlar yetishtirish. Ko'kat o'g'it shakllari. Dukkakli sideratlar, yetishtirishning jihatlari, qo'llash samaradorligi.

67. Suyuq kompleks o'g'itlar qo'llash istiqbollari, assortimenti. Suyuq kompleks o'g'itlar olishning prinsipial sxemasi. Ularning asosiy afzalliklari, kamchiliklari. Suyuq kompleks o'g'itlarning ortofosfor va polifosfor kislotasi asosida olinishiga tavsif berilgan.

68. Azotning dehqonchilikda aylanishi. Azotning tuproqqa tushish manbalari. Tuproqdan yo'qolishi (yuvilish, denitrifikasiya, eroziya). O'simliklar o'zlashtirishi. Biologik azot. tuproqda azot miqdorini oshirish yo'llari.

69. Ammoniy sulfati. Olinishi, tarkibi, xossalari. Sintetik va koksoximik ammoniy sulfati farqi. Tuproqdagi o'zgarishi, qo'llanilishi.

70. Tuproq organik qismi - azot va boshqa oziqa moddalari manbai. Tuproq organik moddalari guruhlari. O'simlik qoldiqlari, ildizlari, tuproq organizmlar qoldig'i. Gumus moddasi. Gumin va fulvo kislotalari guminlar, ularni roli.

71. Tuproq muhiti reaksiyasining o'simlik oziqlanishiga ta'siri. Bo'z tuproqlar muhiti reaksiyasi. Unga bo'lgan o'simliklar munosabati. Turli muhit reaksiyasida ekinlar yetishtirish.

72. Mochevina - amid shakldagi azotli o'g'itning olinishi, xossalari, biuret va uning miqdori, mochevinaning tuproqda o'zgarishi, ureaza aktivligi, nitrifikasiya. Mochevinaning qo'llanilishi.

73. Kompost - mahalliy o'g'itlar qo'llashning samarali usuli. Kompost haqida tushuncha, tayyorlash texnologiyasi, turlari, qo'llash usullari, me'yorlari. Organik, organik-mineral kompostlar.

74. Tuproq eritmasi haqida tushuncha. Tuproq tarkibi. Eritma tarkibidagi anionlar va kationlar. Suvda eruvchan organik moddalar va gazlar. Eritmada makro va mikro elementlar nisbati, ionlar sinergizmi va antagonizmi.

75. Suyuq azotli o'g'itlar. Suyuq azotli o'g'itlar turlari. Fizikaviy xossalari, tashish va saqlash. Suyuq azotli o'g'itlarni qo'llash jihatlari

76. Ko'kat o'g'itlar: Ko'kat o'g'itlarni o'simliklar hosildorligi va tuproq unumdorligiga ta'siri. Ko'kat o'g'it yetishtirish texnologiyasi, qo'llash usullari. Sidepasiya va uning tuplari.

77. Mineral o'g'itlar: Mineral o'g'itlar klassifikatsiyasi: olinishiga ko'ra, tabiati va kelib chiqishiga ko'ra. Mineral o'g'itlar sifatiga qo'yiladigan talablar. Saqlash davomida bilish zarur bo'lgan ko'rsatkichlar.

78. Turli ekinlar hosili bilan olib chiqiladigan oziqa moddalar haqida tushuncha. O'simliklarning azot, fosfor va kaliyga talabi. Oziqlanishning kritik va maksimal davri. 10 s mahsulot bilan olib chiqiladigan oziqa moddalari miqdori (g/o'za, bug'doy, kartoshka misolida).

79. Kaliy sulfat va kalimagneziya o'g'iti, ulardan foydalanish. Kaliyli o'g'itlar guruhlari. Kalsiy sulfati. Kalimagneziya, kalimagneziyalik konsentrat olinishi, xossalari tarkibi. Kaliy sulfati va kaliy magnezini ishlatilishi.

80. Bo'z tuproqlar agrokimyoviy tavsifi. Och tusli, tipik, to'q tusli bo'z tuproqlarda chirindi, azot, fosfor va kaliy miqdori. Harakatchan oziqa moddalari, singdirish sig'imi, singdirilgan asoslar tuproq muhiti reaksiyasi.

81. To'shamali go'ng qo'llanilishi. To'shamali go'ng olinishi. Saqlash usullari, tarkibi.. Turli chirish darajasi. Qo'llash usullari.

82. O'suv davri mobaynida o'simliklar kimyoviy tarkibini o'zgarishi. O'simlik kimyoviy tarkibi. O'suv davrida azot, fosfor va kaliy o'zgarishi. Biologik olib chiqish. Xo'jalik olib chiqish. Qoldiq o'zlashtirilishi.

83. O'simlik uchun azot manbai. Tuproqdagi umumiy azot. Organik va mineral azot. organik moddaning parchalanishi. Ammonifikasiya. Nitrifikasiya. Biologik azot.

84. Ammoniy va kaliy polifosfati. Olinishi, tarkibi, xossalari. Polifosfatlarning tuproqda gidrolizi. Polifosfat tipidagi o'g'itlar fosfat komponenti o'zgarishi. Polifosfatlarni qo'llash istikbollari.

85. To'shamali go'ngni saqlash usullari. Go'ngni xayvonlar tagida saqlash. Zich saqlash, yarim zich va g'ovak saqlash usullari. Turli usullarda saqlanganda oziqa moddalari yo'qolishi.

86. Kompleks o'g'itlar klassifikatsiyasi. Asosiy vakillari, olinishi, tarkibi, xossalari, qo'llash istikbollari.

87. Go'ng qo'llash. Go'ng va mineral o'g'itdan foydalanish koeffitsienti. Go'ngni asosiy o'g'itlashda qo'llash. Go'ng bilan oziqlantirish. Go'ng va mineral o'g'itdan o'simlik tomonidan birinchi va keyingi yillarda o'zlashtirilishi. Foydalanish koeffitsientini oshirish.

88. Kaliy xlorid - konsentrlangan o'g'it. Kaliy xom-ashelari. Silvinitdan kaliy xlor olinishi: flotasion, galurik usul. KSl - tarkibi, xossalari, qo'llanilishi.

89. Azotli o'g'itlar samaradorligini oshirish yo'llari. Azotdan besamar foydalanish. Tuproqda azot o'zgarishi va yo'qolishi. Eroziya, denitrifikasiya. Yuvilish. Nitrifikasiya jarayonini susaytiruvchi moddalar. Bu soxada O'zbekiston olimlari bajargan ilmiy ishlar.

90. Tashqi muhit sharoitining o'simlik oziqlanishiga ta'siri. Eritma konsentratsiyasi. Oziqa eritmasida makro va mikroelementlar nisbati. Sinergizm va antogonizm, namlik, aerasiya, issiklik, yorug'lik tuproq muhiti reaksiyasi.

91. Ammoniyli azotli o'g'itlar. Ammoniy sulfat, ammoniy xlor, ammoniy karbonat, olinishi, tarkibi, xossalari, tuproq bilan o'zaro ta'siri, qo'llanilishi.

92. Dehqonchilikda fosfor aylanishi. Tuproqdagi fosfor miqdori va shakllari. Tuproqqa fosfor tushish manbalari, o'zlashtirilmaydigan shaklga o'tishi, uning oldini olish choralari.

93. O'g'itlarning tuproq unumdorligini oshirish va madaniylashtirishdagi roli. Tuproq unumdorligi, madaniylashtirilganligi haqida tushuncha. Mineral o'g'itlarning ta'siri. Organik o'g'itlar ta'siri. Mineral va organik o'g'itlarni birga qo'llash.

94. O'simlik uchun fosfor manbalari. N_2RO_4 , NRO_4 , RO_4 o'zlashtirish darajalari. RO_4 -o'zlashtiruvchi ekinlar xususiyati. Organik fosfor, shakllari, o'zlashtirish darajasi.

95. Ammiakli selitra. Olinishi, tarkibi, xossalari. Uning tuproq zarrachalari

bilan o'zaro ta'siri. Ammiakli selitrani qo'llanilishi.

96. Fosfatlarning tuproqda kimyoviy singdirilishi. Singdirilish mohiyati. Korbanatli tuproqlarda, kislotalik tuproqlarda singdirilish. Kimyoviy singdirilishni kamaytirish yo'llari.

97. O'simliklar uchun azotning ahamiyati. O'simlikda azotli birikmalar o'zgarishi. Aminlashish. Dezaminlanish. Qayta aminlanish. Aminokislota va oqsil sintezi. Turli organlarda azot miqdori.

98. Xom kaliy tuzlari. Kaliyli o'g'it olish uchun xom ashyo. Kaliyli o'g'itlar klassifikatsiyasi. Silvinit, kainit, karnallit, olinishi, xossalari, tarkibi, qo'llanilishi, tuproqda o'zgarishi.

99. Kompostlar - mahalliy o'g'itlar olishning samarali usuli. Kompost komponentlari, tayyorlanishi. Kompost turlari, qo'llanilishi.

100. Ammoniyli va nitratli o'g'itlarning qiyosiy tavsifi. O'g'itlar klassifikatsiyasi, tarkibi. Fiziologik reaksiyasi. Tuproqda o'zgarishi. Nitratlar to'planishi. Ammiakli zaharlanish. Ammoniyli va nitratli o'g'i

Test savollari

1. Quruq qoldiq usulida moyini aniqlashda qaysi apparatlardan foydalaniladi?

Yeremenko va Sokslet apparatlaridan
Mufel pechi va gorelkadan
Quritish shkafidan
Fotoelektrokolorimetrdan

2. Oqsil azotini Barnshteyn usulida aniqlashda qabul qilish kolbasiga kuyiladigan reaktiv va eritmani belgilang.

10-15 ml 4% bor kislotasi va Groaka indikator

20-30 ml 40% va NaOH fenolftalein
30-45 ml kons H_2SO_4 va selen
Trilon B

3. Suvli so'rim tayyorlash uchun tuproq va suvning nisbati qancha bo'lishi kerak?

1:5
2:1
10:1
1:1

4. Kim birinchi bo'lib o'simliklarni laboratoriya sharoitida mineral oziqlar yordamida o'stirish mumkin ekanligini isbotlab berdi.

Knop va Saks.
Bussengo va Saks.
Libix va Gelrigel.
Knop va Libix.

6. Boshokli don urug'idagi oqsil moddasining miqdorini ko'rsating.

7-20
15-30
20-30
3-7

7. Dukkakli ekinlar sifati qaysi modda bilan baholanadi.

Oqsil miqdori bilan
Aminokislotalarni to'planish kattaligi bilan
Yog' miqdori bilan
Uglevodlar miqdori bilan

8. Soya urug'ida yog'ning o'rtacha miqdori qancha %.

25.
10.

50.

30.

9. Oqsil nimalardan tuzilgan.

20 aminokislota va 2 amiddan

20ta aminokislotalardan

16 aminokislota va 2 amiddan

22 aminokislotalardan

10. Monosaxaridlarga qaysi uglevodlar kiradi.

Glyukoza fruktoza

Glyukoza klechatka

Fruktoza kletchatka

Kraxmal gemosellyuloza

11. Qanday elementlar makroelementlar deb ataladi.

O'simlik organizmlarda miqdori butun sonli foizda bo'lgan elementlarga aytiladi

O'simliklarda miqdori 0,01 dan to butun sonli foizgacha bo'lgan elementlarga aytiladi

O'simlik organizmlarda miqdori 0,00001 dan 0,001 foizgacha bo'lgan elementlarga aytiladi

O'simlik organizmlarda miqdori 0,000001 dan 0,00000001 foizgacha bo'lgan elementlarga aytiladi

12. Qaysi ekinlar Rizobium avlodidan bo'lgan mikroorganizmlar bilan simbiozda yashaydi.

Dukkakli ekinlar

Tomat ekinlar

Tropik ekinlar

Qovoqdoshlar

13. O'simliklar azotni qaysi shaklda o'zlashtiradi.

$\text{NH}_4\text{NO}_3\text{N}_2$

$\text{NN}_3 \text{ K}_2\text{O NO}_2$

$\text{NH}_4 \text{ K}_2\text{O NO}_2$

$\text{NH}_2 \text{ RO}_4\text{NO}_3$

14. Tuproqning qaysi qismida ionlar antagonizmi kuchli yuzaga keladi.

Tuproq eritmasida

Tuproqning qattiq fazasida

Tuproqning havo qismida

Tuproq mineral qismida

15. Havo haroratining necha gradusdan past bo'lish ekinlarga mineral elementlarni o'zlashtirilishiga asosiy qishloq xo'jalik ekinlariga calbiy ta'sir qiladi.

10

5

8

20

16. Tipik bo'z tuproqlar haydov qatlamidagi chirindi miqdorini ko'rsating?

1.5-2

8-1.2

2-4

0.2-0.4

17. Bo'z tuproqlarda qaysi kationlar [TSK] da eng ko'p singdirilgan

Sa, Md

Al, Fe

Na, K

Na, Mg

18. Tuproq kimyoviy singdirish qobiliyati nima?

Bu qobiliyat tuproqda ayrim eruvchan tuzlar o'rtasidagi o'zaro kimyoviy reaksiyalar natijasida erimaydigan yoki qiyin eriydigan birikmalarning hosil bo'lishi bilan bog'liq

Tuproqning eritmadan har xil moddalarning ion va molekulalarini yutish va ularni ushlab turish qobiliyati

O'simlik ildizi va mikroorganizmlar tomonidan elementlarni tuproq eritmasidan yutilishi


Tuproqning har qanday g'ovak jism kabi suvdagi muallaq va u orqali filtrlanayotgan mayda qattiq zarrachalarni ushlab qolish qobiliyati

19. O'g'itning fiziologik ishqorligi nima?

O'simlikka asosan anionlarni o'zlashtirilishi hisobiga o'g'itning muhit reaksiyasi ishqoriyligini oshirish xususiyati

O'g'it tarkibidan kationlarni o'zlashtirilishi hisobiga o'g'itning muhit reaksiyasi kislotaligini oshirish xususiyati

- Mineral o'g'it tarkibidagi erkin kislota miqdori
O'g'it tarkibidagi fosforning oksidlangan birikmalari miqdori
- 20. 1 tonna qoramol go'ngida necha kg azot bor**
4.5-5
1.9-2.8
4-7.0
7-9
- 21. Qoramolning to'shamali go'ngni namligi qancha (%)**
75
100 gacha
95 dan yukori
10-15
- 22. Qaysi ekinlar siderat sifatida o'stiriladi**
Shabdar, bersim, raps, xantal, perko
Arpa, lavlagi, javdar, kanop,
Beda, tamaki, tariq, batat
Makkajo'xori, kartoshka, kungaboqar, zig'ir
- 23. Amidli azotli o'g'itlar**
Karbamid, kalsiy sianamid
Natriyli selitra, kalsiyli selitra
Kaliy sulfat, ugleammiakatlar
Ammiakli selitra, ohakli-ammiakli selitra, kaliy nitrat
- 24. Ammoniy sulfat tarkibidagi ta'sir etuvchi modda miqdori**
20-21
45-46
46
42-50
- 25. Suvsizammiaktarkibidagita'siretuvchimoddamikdori**
82.2
13-15
46
28-35
- 26. Fiziologik neytral o'g'itlar.**
Kaliy nitrat, ammoniy nitrat
Kaliy sulfat, ammoniy sulfat, ammoniy xlor, kaliy xlor suyuq ammiak
Kalsiy nitrat, natriy nitrat, kalsiy sianamid, kaliy karbonat
Presipitat, marten fosfatshlagi, ftorsizlantirilgan fosfat, fosfarit uni
- 27. Ammoniyli azotli o'g'itlar**
Ammoniy sulfat, ugleammiakatlar, suvsiz ammiak, ammiakli suv
Natriyli selitra, kaliy sulfat
Ammiakli selitra, ohakli-ammiakli selitra
Karbamid, kalsiy sianamid
- 28. Ammafosning kimyoviy formulasi**
 $\text{NH}_4\text{H}_2\text{P}_0_4$
 Ca_3P_0_4
 NaNO_3
 KNO_3
- 29. Marganes sulfatning kimyoviy formulasi**
 $\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$
 $\text{Si}_5\text{O}_4 \cdot 5\text{N}_2\text{O}$
 $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$
 MoR_2O_5
- 30. R ni o'zlashtirish ketma-ketligi**
 $\text{N}_2\text{R}_0\text{4-} > \text{NR}_0\text{4--} > \text{R}_0\text{4}$
 $\text{K}_2\text{O---} > \text{NR}_0\text{4--} > \text{N}_2\text{R}_0\text{4}$
 $\text{NR}_0\text{4--} > \text{NO}_\text{Z} \text{---} > \text{N}_2\text{R}_0\text{4}$
 $\text{R}_0\text{4---} > \text{N}_2\text{R}_0\text{4-} > \text{CaN}_2\text{R}_0\text{4}$
- 31. Qo'sh superfosfatning ximiyaviy formulasi**
 $\text{Sa}(\text{N}_2\text{R}_0\text{4}) \cdot \text{N}_2\text{O}$
 $\text{Sa}(\text{N}_2\text{R}_0\text{4}) \cdot \text{H}_2\text{O} \cdot 2\text{CaSO}_4 + \text{NH}_4\text{NO}_3$



32. Kaliy xloridning kimyoviy formulasi

KS1
 $\text{CaS1}_2 + \text{NaCl} \rightarrow \text{KS1}$
 KNO_3
 $\text{K}_2\text{S0}_4 + \text{MgS0}_4 + 6\text{N}_2\text{O}$

33. To'shamali go'ngni saklash usullari.

Issiq, yarim issiq, sovuq,
 Issiq, iliq
 Sovuq, muz
 Yarim issiq, sovuq, qizdirib

34. To'shamasiz go'ng turlari.

Suyuq, yarim suyuq, go'ng oqovasi
 Suyuq, qattiq
 Yarim suyuq, yarim qattiq
 Go'ng okovasi, qattiq, yumshoq

35. Kompleks o'g'itlarni ko'rsating

Murakkab, murakkab – aralash va aralashtirilgan
 Murakkab, oddiy
 Oddiy va murakkab – aralash
 Aralashtirilgan, oddiy

36. Fosforli o'g'itlar ishlab chiqarish uchun xom ashyo qaysi.

Appatit va fosforit
 Silvinit
 Kainit va karnalit
 Azot kislotasi

37. O'simlik tarkibidagi moyini aniqlash usulini belgilang.

Quruq qoldiq usulida
 Presslash orqali
 Kuritish shkafida
 Mufel pechida

38. O'simlik oqsili tarkibidagi azotning ulushini belgilang.

14,7-19,5%
 23-25%
 70-75%
 90-95%

39. O'simlikdagi shakar miqdorini aniqlashning Bertran uslubi nimaga asoslangan?

Monosaxaridlar aldegid va keton guruhlari Fellin suyuqligidan misni kaytarishga asoslangan
 Monosaxarid, klechatka va polisaxaridlarning suvda erishiga asoslangan
 Fotoelektrokolorimetrdan aniqlashga asoslangan
 Saxarozaning xlorid kislotada parchalanib monosaxarid hosil qilishiga asoslangan

40. Tuproq ishqoriyligini aniqlashda qaysi usul ko'llaniladi?

Titrlash
 Kolorimetriya
 Fotometriya
 Xromotografiya

41. Tuproq singdirish qobiliyati haqidagi teoriyani kim yaratdi.

Gedroys.
 Sabinin.
 Pryanishnikov.
 Lomonosov.

42. Boshqoli don urug'idagi kul moddasining miqdorini ko'rsating.

3.5- 5.0
 1.5 - 35
 2 - 5
 5.0 -8.0

43. Azot moddasini asosiy qismini o'simliklar qayerdan oladi.

Tuproq qattiq fazasi va eritmasidan
 Tuproq qattiq qismidan, tuproq havosidan

- Tuproq eritmasidan, atmosferadan
Atmosferadan
- 44. Kunjut urug'ida yog'ning o'rtacha miqdori qancha %.**
45-50.
10-15.
15-20.
5-10.
- 45. Nonni sifatli pishirishda qaysi modda miqdori ahamiyatli**
Quruq kleykovina miqdori
Oqsil miqdori va qand
Qand miqdori va uglevodlar
Yog' miqdori
- 46 Disaxaridlarni ko'rsating.**
Saxaroza
Glyukoza, polisaxarid
Fruktoza, glyukoza
Mamtoza, laktoza
- 47. Faqat eng kerakli mikroelementlar vakili bo'lgan gruppani ko'rsating.**
B Mn Zn Cu Mo Co
BMnPZnCu
BH Zn Mo So
B C Mn Zn So Mo
- 48. Oziq moddalar tuproqdan o'simlikka asosan qaysi ko'rinishda o'tadi.**
Ionlar ko'rinishida
Molekula ko'rinishida (shaklida)
Komplekslar ko'rinishida
Kation va musbat ko'rinishida
- 49. O'simlikka qaysi elementlar kationlar holatida o'tadi.**
Ca K MgCu Fe Zn
B Mo K MgCNO₃
Mp Sa K MgBCuCl
C S1 K B Mo SiPO₄
- 50. Ionlar antagonizmi nima.**
Qandaydir bir ionning ikkinchi bir ionni ildiz xo'jayrasiga ortiqcha kirishiga qarshilik qiladi
Bir ionning yutilishi boshqa ionlarning yutilishini yaxshilanishiga olib keladi.
Ionlarning navbat bilan yutilishi
Tuproq eritmasidan bir ionni boshqa ion bilan siqib chiqarilishi.
- 51. Dehqonchilikda go'ngni ahamiyati.**
Dehqonchilikdagi moddalar almashinuvini boshqarishda chirindini saklash va oshirish tuproq biologik
aktivligini va fizik xususiyatini yaxshilaydi.
Tuproq ishqoriyligini oshiradi va buferligini oshiradi.
Ishqorlikni neytrallaydi singdirilgan kationlarni tarkibiga ta'sir qiladi
Kislotalikni oshiradi va singdirilgan kationlar tarkibini o'zgartiradi.
- 52. Bo'z tuproqlarda muhit reaksiyasi rN qanday.**
7.2-8
5.2-6
5.2-7,6
8.2-9
- 53. Tuproq singdirish qobiliyati nima?**
Tuproqning eritmadan har xil moddalarning ion molekularini yutish va ularni ushlab turish qobiliyati
O'simlik ildizi va mikroorganizmlar tomonidan elementlarni tuproq eritmasidan yutilishi
Tuproqning har qanday g'ovak jism kabi suvdagi muallaq va shu orqali filtrlanayotgan mayda qattiq
zarrachalarni ushlab qolish qobiliyati
Har xil moddalarning bir butun molekularini tuproq zarrachalari manfiy adsorbsiyalanishi
- 54. O'g'it ta'sir etuvchi moddasi nima**
O'simlikka o'zlashtiriladigan oziq elementni o'g'itga hisoblaydigan oziq modda miqdori
O'g'it tarkibidagi asosiy oziq elementi
O'g'itdan o'simlikka o'zlashtiriladigan ion
Mineral o'g'it tarkibidagi erkin kislota miqdori
- 55. Qoramoldan yaqinda olingan go'ngda necha % azot bor**
0.45-0.50

64-77

21-25

19-28

56. 1 tonna qoramol go'ngida necha kg fosfor bor

1.9-2.8

4.5-5

5-7.0

7-9

57. Kator orasi ishlanadigan ekinlarga kuzda go'ng qanday optimal chuqurlikda beriladi (sm)

25-30

5-7

12-14

20-22

58. Dukkakli sideratlar

Shabdar, bersim, kuzgi vika, kuzgi nuxat

Raps, javdar, perko, xantal, kungboqar

Moyli turp, xashaki, bryukva, lavlagi

Bug'doy, arpa, sul, soya

59. Natriyli selitra tarkibidagi tasir etuvchi modda miqdori %

15-16

46

90-91

40-45

60. Ammoniy xlor tarkibidagi ta'sir etuvchi modda miqdori

24-25

45-46

46

2,0-2,1

61. Azotobakterin nima

Tarkibida azot to'plovchi bakteriyalari bor bakterial o'g'it ular tuproqda erkin yashaydi

Tarkibida azot to'plovchi bakteriyalari bor bakterial o'g'it ular dukkakli ekinlar bilan simbioz hayot kechiradi

Tarkibida sporali bakteriyalari bor bakterial o'g'it ular fosforli organik birikmalarni parchalaydi

Chirindini parchalovchi mikroorganizmlar majmuidan iborat bakterial o'g'it

62. Fiziologik ishqorli o'g'itlar

Kalsiy nitrat, natriy nitrat, kalsiy sianamid, kaliy karbonat

Kaliy sulfat, ammoniy sulfat, ammoniy xlor

Kaliy xlor, ammoniy nitrat, oxak, ammiakli selitra

Suyuq ammiak, suvli ammiak, ammiakli selitra

63. Ammiakli-nitratli azotli o'g'itlar

Ammiakli selitra, oxakli-ammiakli selitra, sulfat-nitrat ammoniy

Natriyli selitra, kaliy sulfat

Ammoniy sulfat, ugleammiakatlar

Karbamid, kalsiy sianamid

64. Kaliy selitraning formulasi

KNO_3

NH_4NO_3

$(\text{NH}_2)_2\text{HPO}_4$

$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$

65. Mis sulfat mikroo'g'itining formulasi

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

$\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

$(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

MoP_2O_5

66. Fosfor o'g'iti tasir etuvchi moddasi

P_2O_5




NO_2

NH_4

P

67. Ammofosning ximiyaviy formulasi

$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$



68. Kaliyli o'g'itlar olish usullarini ko'rsating.

Galurgik, Flotasion, Gidrosiklon

Galurgik

Flotasion

Gidrosiklik

69. Harakatchan fosfor miqdori juda kam bo'lgan tuproqlar guruhini aniqlang (P_2O_5 , mg/kg).

0 – 15

16 – 30

31 – 45

46 – 60

70. Harakatchan fosfor miqdori kam bo'lgan tuproqlar guruhini aniqlang (P_2O_5 , mg/kg).

16 – 30

0 – 15

31 – 45

46 – 60

71. Harakatchan fosfor miqdori o'rtacha bo'lgan tuproqlar guruhini aniqlang (P_2O_5 , mg/kg).

31 – 45

0 – 15

16 – 30

46 – 60

72. Harakatchan fosfor miqdori yukori bo'lgan tuproqlar guruhini aniqlang (P_2O_5 , mg/kg).

46 – 60

0 – 15

16 – 30

31 – 45

73. "Xom kul"ni aniqlashda mufel pechi haroratini belgilang.

500-525 °S

60-80°S

100-105 °S

1000 °S

74. O'simliklarda nitrat azotini aniqlash usullarini belgilang.

Grandval – Lyaju, ionometrik, sulfanil kislotasi yordamida

Tyurin usulida

Kachinskiy

Shmuk

75. Oqsil azotini aniqlashda ammiak qaysi apparatda aniqlanadi.

Kyeldal apparatida

Sokslet apparatida

Yeremenko apparatida

Fotometrda

76. Tuproq muhiti reaksiyasini aniqlash usullarini belgilang.

N.I. Alyamovskiy usulida, Mixaelis asbobida, potensiometrik usulida

Grandval – Lyaju, ionometrik,

Sulfanil kislotasi yordamida, Tyurin usulida

Kachinskiy, shmuk

77. Asosiy qishloq xo'jalik ekinlarining vegetativ organlaridagi suv miqdorini ko'rsating.

70-95 %.

40-45 %.

30-50 %.

50-65 %.

78. Qand lavlagi sifati qaysi modda bilan baholanadi.

Saxarozani miqdori bilan

Fruktozani miqdori bilan

Glyukoza miqdori bilan

Proteinni miqdori bilan

79. Aminokislotalarda azot qaysi shaklda bo'ladi.

Aminogruppa shaklida

Nitrat shaklida

Ammoniy shaklida

Amid shaklida

80. Kungaboqar urug'ida yog'ning o'rtacha miqdori qancha %.

24-50.

10-15.

15-20.

5,0-6,0.

81. O'simliklarda uglevodlar qaysi moddalar holida uchraydi.

Qandlar polisaxaridlar

Monosaxaridlar, klechatka

Qandlar, fruktoza

Polisaxaridlar, glyukoza

82. Polisaxaridlarni ko'rsating.

Kraxmal kletchatka lektin moddasi

Glyukoza fruktoza

Saxaroza

Maltoza

83. Qaysi ekinlar Rizobium avlodidan bo'lgan mikroorganizmlar bilan simbiozda yashaydi.

Dukkakli ekinlar

Tropik ekinlar

Qovoqdoshlar

Donli ekinlar

84. Pinositoz deganda nimani tushunasiz.

Xo'jayraning suyuqlik tomchilarini yutishi

Xo'jayraning anionlarni yutishi

Xo'jayraning kationlar yutishi

Xo'jayrani qattiq zarrachalarni yutishi

85. Tuproqni qaysi qismlarida o'simlik uchun kerak bo'lgan oziq moddalar bo'ladi.

Tuproq eritmasida havosida va qattiq qismida (mineral va organik qismida)

Tuproq eritmasida

Qattiq mineral fazasida

Gaz fazasida

86. Ionlar sinergizmi nima.

Ionlarning navbat bilan yutilishi bir ionning yutilishi boshqa bir ionning yaxshi yutilishiga olib kelishi

Har bir ion boshqa ionning ildiz xo'jayrasiga ortiqcha kirishiga o'zaro qarshilik qiladi

Tuproq eritmasidan bir ionni ikkinchi bir ion bilan surib chiqarilishi

Ionlarning yashash uchun ko'rashi

87. Bo'z tuproqlar haydov qatlamidagi chirindi miqdorini ko'rsating.

1-3

4-12

40-50

20-60

88. Tuproq qaysi fazalardan tashkil topgan.

Qattiq suyuq va gaz fazalardan

Qattiq va gaz fazalardan organik va mineral qismlardan

Suyuq faza xamda organik va mineral qismlardan

Mineral va organik fazalardan xamda tuproq eritmasidan

89. Tuproq biologik singdirish qobiliyati nima?

O'simlik ildizi va mikroorganizmlar tomonidan elementlarni tuproq eritmasidan yutilishi

Tuproqning eritmadan har xil moddalar ion va molekulalarini yutish va ularni ushlab to'rish qobiliyati

Tuproqning har qanday g'ovak jism kabi suvdagi muallak va u orqali filtrlanayotgan mayda qattiq zarrachalarni ushlab qolish qobiliyati

Har xil moddalarning bir butun molekulalarini tuproq zarrachalari bilan musbat yoki manfiy adsorbsiyalanishi

90. O'g'itning fiziologik kislotaligi nima

O'g'it tarkibidan kationlarni o'zlashtirilishi hisobiga o'g'itning muhit reaksiyasi kislotaligini oshirish xususiyati

Mineral o'g'it tarkibidagi erkin kislota miqdori

Nitrifikasiya hisobiga o'g'itning muhit reaksiyasi kislotaligini oshirish xususiyati

O'simlikka asosan anionlarni o'zlashtirilishi hisobiga o'g'itning muhit reaksiyasi ishqoriyligini oshirish

xususiyati

91. Qoramoldan yaqinda olingan go'ngda necha % fosfor bor

0.19-0.28
64-77
21-25
45-83

92. 1 tonna qoramol go'ngida necha kg kaliy bor

5-7.0
45-50
19-28
7-9

93. Donli ekinlarga kuzda go'ng qanday optimal chukurlikda beriladi (sm)

20-22
5-7
12-14
3-4

94. Nitragin nima?

Tarkibida azot to'plovchi bakteriyalari bor bakterial o'g'it, ular dukkakli ekinlar bilan simbioz xayot kechiradi

Tarkibida azot to'plovchi bakteriyalari bor bakterial o'g'it, ular tuproqda erkin yashaydi

Tarkibida sporali bakteriyalari bor bakterial o'g'it, ular fosforli organik birikmalarni parchalaydi.

Tarkibida kaliy to'plovchi bakteriyalar bor o'g'it, ular kaliyli organik birikmalarni parchalaydi.

95. Mochevina tarkibidagi ta'sir etuvchi modda miqdori %

46
15-16
20-21
24-25

96. Ammiakli selitra tarkibidagi ta'sir etuvchi modda miqdori

34.6
13-15
46
20-21

97. Fosforobakterin nima

Tarkibida sporali bakteriyalari bor bakterial o'g'it ular fosforli organik birikmalarni parchalaydi

Tarkibida azot to'plovchi bakteriyalari bor bakterial o'g'it ular dukkakli ekinlar bilan simbioz xayot kechiradi

Tarkibida azot to'plovchi bakteriyalari bor bakterial o'g'it ular tuproqda erkin yashaydi

Chirindini parchalovchi mikroorganizmlar majmuidan iborat bakterial o'g'it

98. Nitratli azotli o'g'itlar

Natriy nitrat, kalsiy nitrat

Ammoniy sulfat, ugleammiakat

Ammiakli selitra, oxakli-ammiakli selitra, sulfat-nitrat ammoniy

Karbamid, kalsiy sianamid

99. Kaliy magneziyaning kimyoviy formulasi

$K_2SO_4 * MgSO_4 * 6H_2O$

KS1

$KCl + NaCl * KCl$

$KCl * NaCl$

100. Ammoniy nitrat o'g'itining formulasi

NH_4NO_3

$NH_4NO_3 + CH_3PO_4 * 2H_2O + Sa(N_2RO_4)_2 * 2N_2O$

$(NH_2)_2HP_4$

$NH_4H_2PO_4$

101. Bor kislotasini kimyoviy formulasini ko'rsating

N_2VO_z


$Si_5O_4 * 5N_2O$

$MnSO_4 * 4H_2O$

$(NH_4)_6Mo_7O_{24} * 4H_2O$

102. Superfosfat formulasi

$Sa(N_2RO_4)*H_2O*2CaSO_4$



103. Kaliy sulfatning kimyoviy formulasi



104. Harakatchan fosfor miqdori juda yukori bo'lgan tuproqlar guruhini aniqlang (P2O5 , mg/kg).

60 <

0 – 15

16 – 30

46 – 60

105. Almashuvchan kaliy miqdoriga ko'ra juda kam ta'minlangan tuproq guruhini aniqlang. (mg/kg K_2O).

0 – 100

101 – 200

201 – 300

301 – 400


ILOVA

Asosiy qishloq xo'jalik ekinlari uchun muqobil tuproq reaksiyasi (pH)

Ekinlar	Tuproqreaksiyasi (pH)	Ekinlar	Tuproqreaksiyasi (pH)
Suli	5,0 – 7,7	Kartoshka	5,0 – 5,5
Kuzgijavdar	5,5 – 7,5	Qandlavlagi	7,0 – 7,5
Bahoribug'doy	6,0 – 7,5	Beda	7,0 – 8,0
Kuzgibug'doy	6,3 – 7,6	Sebarga	6,0 – 7,0
Arpa	6,8 – 7,5	Donnik	6,5 - <
Makka-jo'xori	6,0 – 7,0	Lyupin	4,5 – 6,0

Tariq	5,5 – 7,5	Timofeyevka	5,6 - <
Grechixa	4,7 – 7,5	Karam	6,7 – 7,4
Gorox	6,0 – 7,0	Xo’rakilavlagi	6,8 – 7,5
Soya	6,5 – 7,1	Pomidor	6,3 – 6,7
Gorchisa	7,0	Rediska, sholg’om	5,5 - <
Zig’ir	5,9 – 6,5	Sabzi	5,5 – 7,0
Kungaboqar	6,0 – 6,8	Bodring	6,0 – 7,9
Nasha	7,1 – 7,4	Salat	6,0 – 7,0
Choy	4,8 – 6,2	G’o’za	6,5 – 9,0

Mineralo'g'itlarningsifatreaksiyasiyordamidaturinianiqlash



МАЪЛУМОТНОМА

Хамидов Махмуд



2016 йил 5 апрелдан:

Бухоро давлат университети Табиий фанлар факультети
Тупроқшунослик ва география кафедраси доценти вазифасини
бажарувчи

Туғилган йили:
08.05.1949

Туғилган жойи:
Бухоро вилояти, Ғиждувон тумани

Миллати:
ўзбек

Партиявийлиги:
йўқ

Маълумоти:
олий

Тамомлаган:
*1972 й. Тошкент қишлоқ хўжалик
институтини*

(ҳозирги ТошДАУ) кундузги

Маълумоти бўйича мутахассислиги: **олим агроном агрохимик - тупроқшунос**

Илмий даражаси:
қишлоқ хўжалик фанлари номзоди

Илмий унвони:
катта илмий ходим (доцент)

Қайси чет тилларини билади:
рус, ингилиз тиллари

Давлат мукофотлари билан тақдирланганми (қанақа):
йўқ

**Халқ депутатлари республика, вилоят, шаҳар ва туман кенгаши депутатими ёки
бошқа
сайланадиган органларнинг аъзосими (тўлиқ кўрсатилиши лозим):**
йўқ

МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИ

1962-1967 йй. - Бухоро вилояти Ғиждувон тумани жамоа хўжалиги аъзоси

1967-1972 йй. - Тошкент қишлоқ хўжалик институтини талабаси

1972-1993 йй. – Тошкент ш. Ўзбекистон ФА қарашли Ўсимлик моддалари кимёси илмий
текшириш институтини катта лаборанти, кичик ва катта илмий ходими

1993-1995 йй. – Бухоро давлат университети Агрохимё ва тупроқшунослик кафедраси
доценти

1995-2005 йй. – Бухоро давлат университети Табиёт ва Аграр факультети Агрономия
кафедраси мудири

2005-2011 йй. - Бухоро давлат университети Табиёт ва Аграр факультети декани ўқув
ишлари бўйича ўринбосари

01.09.2011- 05.04. 2016 йилларда нафақада – пенционер.

**05.04.2016 й. - Бухоро давлат университети Табиий фанлар факультети
Тупроқшунослик ва география кафедраси доценти вазифасини
бажарувчи**

02.09.2016 й. - Бухоро давлат университети Табиий фанлар факультети декани ўқув
ишлари бўйича ўринбосари, dosent.

M u n d a r a j a

1. Kirish. Laboratoriyada ishlaganda asosiy xavfsizlik texnikasi. Eritmalar. O'simlik namunasini olish va analizga tayyorlash.....
2. O'simlik tarkibidagi quruq modda, gigroskopik namligini va «xom kul» chiqishini aniqlash
3. O'simlik tarkibidagi moyini «quruq qoldiq» usulida aniqlash.....
4. O'simliklarda nitratli azot miqdorini disulfafenol kislotasi yordamida aniqlash.
5. K. Ginzburg usulida o'simlik kuli hosil qilish va undan azot, fosfor va kaliyni aniqlash
6. O'simlik tarkibidagi oqsil azotini Barnshteyn usulida aniqlash.....
7. Daladan tuproq namunasini olish uni tahlilga tayyorlash. Tuproq suvli so'rimidan quruq qoldiqni aniqlash. Tuproq (pH) ni N.I. Alyamovskiy usulida aniqlash. Tuproq ishqoriyligini aniqlash.
8. Tuproq tarkibidagi nitratli azot miqdorini Granvald-Lyaju usulida aniqlash.
9. Singdirilgan ammoniy shaklidagi azotni Nessler reaktivida aniqlash....
10. Karbonatli tuproqlar tarkibidagi harakatchan fosfor va almashinuvchan kaliyni B.P. Machigin usulida aniqlash.
11. Tuproqdagi yalpi N, P, K miqdorini (bir namunadan) aniqlash.....
12. Mineral o'g'itlarni sifat reaksiyalari yordamida turini aniqlash.....
13. Selitra tarkibidagi azotni ishqoriy muhitdagi aralashmadan Devard usulida aniqlash.....
14. Go'ng tarkibidagi N, P, K miqdorini aniqlash.....