

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI JOQARI HÁM ORTA ARNAWLÍ
BILIMLENDIRIW MINISTRILIGI
ÁJINIYAZ ATÍNDAGÍ NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALÍQ
INSTITUTÍ**



**MAGISTRATURA BÓLIMI
5A110401-Anıq hám tábiyy pánlerdi oqıtıw metodıkası (Biologiya)**

qániygeligi pitkeriwshısı 2-kurs magistrantı

ABDULLAEVA JAMILYA KEÑESBAEVNA

Magistr akademiyalıq dárejesin alıw ushın jazılǵan

DISSERTACIYASI

**TEMA: «Qaraqalpaqstanda ósiwshi soralar tuqımlasınıń wákillerin izertlew
hám nátiyjelerin mektep oqıwshılarına bilim beriwde paydalanıw jollari»**

MAK da jaqlawǵa ruxsat

Magistratura bólimi başlıǵı:	p.i.k., doc. M.Allamberganova
Magistrant:	J.Abdullaeva
Ilimiy basshı:	b.i.k., dots. Q.A. Qosnazarov
Kafedra başlıǵı:	b.i.k., dots. F.T.Otenova

**Kafedra májilisiniń 2019-jıl 17-may sánesindegi
№10 protokoli menen qorǵawǵa ruxsat berildi**

Nókis-2019

MAZMUNI	bet
Kirisiw.....	3
I-bap.Ádebiy maǵlıwmatlarǵa sholiw.	9
1.1.Soralar (Chenopodiaceae Vent.) tuqımlasınıń wákillerin izertlew isleriniń tariyxı.....	9
II-bap.İlimiy-izertlew isleriniń ornı hám usılları.....	12
2.1. İlimiy-izertlew ornınıń hawa rayına ulıwma sıpatlama	12
2.2.Geologiyalıq hám gidrologiyalıq sharayatı.	17
2.3.Qaraqalpaqstannın` topıraq-meliorativlik jag`daylarına sıpatlama . .	21
2.4. İlimiy-izertlew islerinin metodları ja`ne usılları.	22
2.5.Qaraqalpaqstannın shorlı sho`listan aymaǵınıń fiziko-geografiyalıq sıpatlaması.....	23
III-bap.Tiykargıbo`lim. İlimiy-izertlew isleriniń nátiyjeleri.....	26
3.1. Qaraqalpaqstanda o`siwshi soralar tuqımlasınıń tiykargı edifikatorlarına qısqasha bioekologiyalıq sıpatlama.	26
3.2. Soralar tuqımlasınıń (galofitlerdiń) ekologiyalıq hám biologiyalıqo`zgeshelikleri...	27
3.3. Qaraqalpaqstanda ósiwshi bir jıllıq soralar tuqımlasınıń tiykargı edifikatorlarına bioekologiyalıq sıpatlama.	30
3.4. Qaraqalpaqstanda ósiwshi puta soralar tuqımlasınıń edifikatorlarına qısqasha bioekologiyalıq sıpatlama.	38
3.5. Qaraqalpaqstanda ósiwshi soralar tuqımlasınıń klassifikatsiyası hám olardıń sıpatlaması.....	39
3.6. Qaraqalpaqstanda ósiwshi shorlı sho`listan soralar tuqımlasınıń formatsiya hám assotsiatsiyalarınń klassifikatsiyası.	41
3.7.Qaraqalpaqstanda ósiwshi bir jıllıq soralar tuqımlasınıń formatsiya hám assotsiatsiyalarına sıpatlama (Halopoia)	51
3.8.Qaraqalpaqstanda ósiwshi galofitli ósimliklerdiń fito indikatsiyası	58
3.9. Qaraqalpaqstannın shorlı sho`listanında ósiwshi soralar tuqımlasına kiriwshi o`simliklerdiń indikatsiyalıq áhmiyeti.	71
3.10. Soralar tuqımlasınıń mádeniy wákilleri haqqında.	73
IV-bap. Qaraqalpaqstanda ósiwshi soralar tuqımlasınıń wákillerin awıl xojalıǵında paydalanıw hám qorgaw.....	77
4.1.Soralar tuqımlasınıń ayırım wákillerin introduktsiyalaw máselesi hám onıń áhmiyeti. .	77
4.2. Qaraqalpaqstannın tábiyiy jag`dayların jaqsılaw jolları	80
4.3. Qaraqalpaqstannın shorlı sho`listan o`simliklerin qorgaw.	82
4.4.Geypara soralar tuwısına tiyisli o`simliklerdi introduktsiyalaw ma`seleleri.	83
4.5.Soralar tuqımlasınin geypara azıq-qwqatlıq jabayı turleri ham olardı paydalanıw haqqında.	86
V-bap. Alınǵan nátiyjelerdi orta bilim beriwshi oqıw orınlarında botanika sabaǵın oqıtıwda paydalanıw jolları.....	88
5.1. Klassta sabaq oqıtıw.....	89
5.2. Klasstan tısqarı jumislardı orınlaw	103
5.2.1.Ekuskursiyalarǵa aparıw.	104
5.2.2. Botanika do`gereklerin o`tkeriw.	104
Juwmaqlaw.....	108
Paydalanılǵan ádebiyatlar.....	110
İnsan xızmeti qawıpsızlıǵı.	116
Qosımshalar	123

KIRISIW

Jumistń aktuallıǵı: Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.M.Mirziyoev óziniń shıǵıp sóylegen sózlerinde ekonomikamızdıń jetekshi tarmaǵı bolǵan awıl xojalıǵın rawajlandırıw hám modernizatsiyalaw boyınsha aldımızǵa úlken wazıypalar turıptı, sonıń ishinde mal sharwashılıǵın rawajlandırıwda bekkem otshóp bazası menen támiyinlewde keń maydandı jaylawlardan paydalanıwımız tiyis dep kórsetken edi [1].

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2017-jıl 7-fevraldaǵı “Ózbekstan Respublikasınıń elede rawajlandırıw boyınsha Háreketler strategiyası haqqında”ǵı PF-4947-sanlı Pármanı, 2017-jıl 20-apreldegi “Joqarı bilimlendiriw sistemasınıń elede rawajlandırıw is-ilajları haqqında”ǵı PQ-2909-sanlı Qararları hám basqada normativ-huqıqıy hújjetlerde belgilengen wazıypalardı ámelge asırıwda usı pitkeriw qánigelik jumısında belgili dárejede xızmet etedi [2,3].

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev óziniń sóylegen sózlerinde Aral boyı regionınıń rawajlandırıwda Aral teńizi qurıwı aqıbetinde dúzlanıw hám jerlerdiń degradatsiyasına qarsı gúres, qorshaǵan átiraptı salamatlastırıw, regionda ekologiya hám klimat ózgerisiniń qolaysız tásirin kemeytiriw hám ekologiyalıq jaǵdaydı jaqsılaw boyınsha qurǵaqshılıq hám shorǵa shıdamlı ósimliklerdi tabıw, úyreniw hám eńgiziw kerekligin ayıp ótpekte.

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń aymaǵında ósetuǵın Chenopodiaceae Vent. tuqımlasınıń wákilleriniń házirgi kündeǵı ulıwma awhalın, ushırasatuǵın hám xalıq xojalıǵında qollanılatuǵın orınların anıqlaw, zárurli túrlerin introduktsiyalaw, olardıń kóp túrliligini saqlap qalıw, awıl-xojalıǵında jaylawlardı, otlaqlardı payda etiwde paydalanıw hám alınǵan nátiyjelerdi orta bilim beriwshi mekteplerde botanika páninen bilim beriwde jańa pedagogikalıq texnologiyalardı tiykarlanıp oqıtıw búgingi kúnniń eń aktual mashqalalarından esaplanadı.

-İzertlewdiń maqseti: Qaraqalpaqstan Respublikası aymaǵında o'siwshi Chenopodiaceae Vent. tuqımlasına tiyisli o'simliklerdiń túrlerin anıqlaw, olardı klassifikatshiyalaw, geypara o'simlik túrlerin introduktsiyalaw jolların kórsetip beriw, xalıq xojalıǵında jaylawlardı, otaqlardı bina etiw hám basqada paydali táreplerin anıqlaw. İlimiy-izertlew natıyjelerinen alınǵan maǵlıwmatlardı botanika pánin oqıtıwda zamanagóy jańa pedagogikalıq texnologiyalardan paydalanıw arqalı ámelge asırıw.

- İzertlewdiń wazıypaları: Joqarıda aytıp o'tilgen baslı maselelerdi nátiyjeli sheshiw. Úlkemizdeki o'simlikler dúnyasınıń biohárturlılıǵın saqlap qalıw, geypara turlerin introduktsiyalaw, olardıń sanın jáne sıpatın jaqsılaw arqalı bayıtıwdıń ıqshamlı jolların ámelge asırıw. İlimiy-izertlew isleriniń nátiyjelerin botanika pánin oqıtıw protsessinde paydalanıw.

- İzertlew obekti hám predmeti: İlimiy-izertlew isleriniń obekti etip Qaraqalpaqstan respublikasınıń barlıq aymaqları belgilendi. Al onıń izertlew predmeti bolıp usı aymaqta o'setuǵın Chenopodiaceae Vent. tuqımlaslacınıń wákıllerin izertlew isleri qabıl etildi.

- İzertlew metodları:İzertlew jumısları 2017-2019 jıllar ishinde júrgizildi. İzertlewlerdiń ob`ekti bolıp Qaraqalpaqstan Respublikasınıń barlıq aymaqları belgile İlimiy-izertlew isleri ulıwma qabıl etilgen metodikalar menen usıllar tiykarında dala sháriyatında yarım statsionar hám marshrutlı jurisler arqalı alıp barıldı.

Ulıwma izertlew jumıslarında geobotanika, ekologiya ilimlerinde qollanılatuǵın metodlardan keńnen paydalanıldı. Bul metodologiyalıq ko'rsetpeler tiykarınan tómendegi ádebiyatlarda ko'rsetilgen (Polevaya geobotanika (1959-1976), Kratkoe rukovodstvo geobotanicheskix issledovaniy (1952). Ámiwdáryanıń to'meninde o'siwshi soraların biologiya hám ekologiyasın úyreniwde ayırım ádebiyatlardaǵı metodologiyalıq usıllardı biziń jergilikli jaǵdayımız ushın belgili o'zgerislerdi qollanıw arqalı paydalanıldı.

İlimiy izertlewde «Oprelitel Vısshix rasteniy Sredney Aziy» (1972, 1974, 1983, 1993) , O.A.Bondarenko (1964) « Oprelitel vısshix rasteniy Karakalpakii», S.E.Erejepov «Flora Karakalpakii, ee xozyaystvennaya xarakteristika, ispolzovanie i oxrana (1977), D.Seydemetov, U.Pratov hám B. Sarbaevlarding «O'simlikler anıklađışı» N. «Bilim»., 1990,-112 b, B.Sherbaev « Flora i rastitelnost Karakalpakii» (1988)., O'simliklerdiń shiyki zatlarınıń qorların anıqlawda Fedorov (1948) keńnen paydalanıldı hám o'simliklerdiń tuwısı, turleri, sortları h.t.b.qásiyetleri anıqlandı.

O'simliklerdiń fenologiyalıq jađdayların baqlawda: İ.F.Momotov (1973), İ.N.Beydeman (1974), İ.G.Serebryakov (1964), Yu.K.Novoselov hám basq. (1983), O.N.Korovina hám basqalar (1982,1983) tiykarında ámelge asırıldı. Bularğa qosımsha, Arncher Banch (1955), Vernik hám basqa (1973), Allaniyazov hám basqalar (1984), Koshkarev (1988)., Attakurov (1995), Kamalov hám basq. (1995), V.A.Tetyurev (1955) h.t.b. usıllarınan hám kórsetpeleri keńnen qollanıldı.

O'simliklerdi tolıq hám anıq tastıyqlaw ushın, O'zbekistan İlimler Akademiyası Qaraqalpaqstan bo'liminiń birlesken Tábiy ilimler institutında saqlanıp kiyatırılğan ósimliklerdiń gerbariy kolleksiyalarına salıstırılıp ko'rıldı hám puxtalıq penen uyrenildi.

Alınğan mađlıwmatlardı matematikalıq qayta islew isleri Dospexovtıń disperissionlıq tallaw usılı hámde EEM da kompyuter dástúrleri tiykarında orındandı hám juwmaq shıǵarıldı.

Solay etip, ulıwma ilimiy juwmaqlardı shıǵarıwda hárqıylı zárurli bolğan ilimiy derekler, ádebiyatlar, ilimiy-texnikalík esabatlar hám baskada zárurli materiallar paydalanıldı. Álbette, qániygelerdiń bahalı keńesleri tolıq itibarğa alındı.ndi.

- **İlimiy jańalıǵı:** Soralar (Chenopodiaceae Vent.) tuqimlasına jer ju`zinde 1500 ge shamalas tu`r, 100 tuwis kiredi. Connan, G`MA florasında 350 ge

shamalas tu`r, 50 tuwis ushirasadi. Soralar tuqimlasinin` ko`pshilik wákilleri O`rta Aziya, Tu`slik Batis, Arqa Amerika, Tu`slik Afrikanin`, Orayliq Avstraliyanin` jerlerinde ushirasadi. O`zbekistan Respublikasi aymag`ında 57 tuqimlastin` 470 ten artiq tu`ri bar.

Soralar (Chenopodiaceae Vent.) tuqimlasina kiritilgan o`simlik tu`rlarinin` ko`pshiligi bir, eki ha`m ko`p jilliq sho`pler bolip, solardin` arasında aziraq sanda pu`ta, yarim pu`ta ha`m ag`ash tu`rleinde gezlesedi. Qaraqalpaqstan florasında soralar tuqimlasinin` 140 tu`ri, 40 tuwisi ushirasadi ha`m olardin` ko`pshiligi Qaraqalpaqstannin` duzli kebirli topiraqli jerlerinde ken`nen tarqalg`an 400 tu`qimlasqa tiyisli 12000 g`a jaqin tu`rdegi o`simliklerden turadi.

Qaraqalpaqstannin` aymag`ında soralar tuqimlasinin` wákillerinen introduktsiyalanip jergilikli o`simlik tu`rlarinin` qatarinan kinoa (Chenopodium quinoa) o`simligi tu`raqli tu`rde qaraqalpaqstan aymag`ında iykemlesip o`sti hám paydali tur sipatında esapqa alindi. Sonliqtan, keleshekte ko`p g`ana o`simlik tu`rlarin` introduktsiyalaw islerin` ken` masshtabta sho`lkemlestiruwimiz lazim. táminlewge imka`niyat jaratadı.

Ulwma orta bilim beriwshi mekteplerde, akademiya litseyler menen ka`sip o`ner kolledjlerinde oqıwshılarg`a soralar tu`qimlasinin` wákilleri haqqında tolıq mag`lıwmatlardı beriw mu`mkinshiligi joq. Olar 6-klassta soralar tu`qimlasinin` wákilleri tuwralı azg`ana baslang`ish tu`siniklerge iye boladı. Al, oqıwshılardıń tolıq mag`lıwmatlardı alıwın ta`minlew tiykarınan klasstan ha`m sabaqtan usqari jumislardı orınlaw barısında g`ana a`melge asırılıwı mu`mkin.

Biologiya do`gereklerin, biologiyalıq ha`r qıylı keshelerdi, ushırasıwları, pa`n boyınsha olimpiadalardı o`tkeriw, fakul`tativ sabaqlar o`tiw, seminarlardı sho`lkemlestiriw, olardı ilimiy izertlew jumislarin` alıp barıwg`a qatnastırw ha`m basqada ko`p qosımsha islerdi orınlatiw, ma`selen, bulardıń qatarına, biologiyadan diyalı gazetalardı, fotostendlerdi shıg`arıw, o`z-betinshe jumislardı orınlatiw ha`m olardı tapsırıwdı sho`lkemlestiriw, ilimiy maqalalar, referatlar, konspektler jazıwdı u`yretiw, bayanatlar jasatiw usag`an jumislardı orınlatiw oqıwshılardıń bilim da`rejelerin` teren`lestiriwge mumkinshilik jaratadı.

Biologiyadan (botanikadan) sabaq oqıtıwda yamasa klasstan ha`m sabaqtan tısqarı ju`mıslardı orınlaw barısında ilimiy-izertlew islerinen alıng`an mag`lıwmatlardı paydalanıw waqıtında jan`a pedagogikalıq texnologiyalardı qollanıw ( ma`selen, oqıtıwdın` interaktiv metodları: «Aqılıy hu`jim», «O`z ornın`dı tap», «Menyu», «Kishi toparlarda islew», «Devatlar», «Munazara» ha`m basqalardı qollanıw, krossvordlar menen test sorawların sheshiw h.t.b.) ha`r bir jan`a temalardı an`sat o`zlestiriwge alıp keledi ja`ne oqıwshılardıń materialistlik ilimiy ko`z qaraslarınń rawajlanıwın toliq táminleydi.

- **Jumıstıń ilimiy hám ámeliy áhmiyeti:**Bul aling`an natıyjelerdi oındiriske endiriw o`simliklerdin` bioha`rıylılıg`ın ko`plep saqlap qalıw menen bir qatarda go`zzal makanımızdın` a`jayıp ta`biyatın asırap qalıwda ja`ne olardı keleshek a`wladlarımızg`a inam etiwde u`lken a`hmiyetke iye. Solay ilimiy izertlew jumıslarınıń na`tiyjeli jetiskenliklerin xalıq xojalıg`ı tarmaqlarınıń tu`rli tarawlarına endiriw (xalıq xojalıg`ına, jaylawlar, otlaqlar payda etiwde, azıq-awqat, dári-dárman hám basqada zárurliklerdi aqılga muwapiq sheshiwde) usınday paydali jumıslardıń sapa ko`rsetkishlerinin` artıwın táminlewge imka`niyat jaratadı.

Ulıwma orta bilim beriwshi mekteplerde, akademiyalıq litseyler menen ka`sip o`ner kolledjlerinde oqıwshılarg`a soralar tu`qımlasınıń wa`killeri haqqında toliq mag`lıwmatlardı beriw mu`mkinshiligi joq. Olar 6-klassta soralar tu`qımlasınıń wákilleri tuwralı azg`ana baslang`ısh tu`siniklerge iye boladı. Al, oqıwshılardıń toliq mag`lıwmatlardı alıwın ta`minlew tiykarınan klasstan ha`m sabaqtan tısqarı jumıslardı orınlaw barısında g`ana a`melge asırılıwı mu`mkin.

Biologiya do`gereklerin, biologiyalıq ha`r qıylı keshelerdi, ushırasıwları, pa`n boyınsha olimpiadalardı o`tkeriw, fakul`tativ sabaqlar o`tiw, seminarlardı sho`lkemlestiriw, olardı ilimiy izertlew ju`mısların alıp barıwg`a qatnastırıw ha`m basqada ko`p qosımsha islerdi orınladıw, ma`selen, bulardıń qatarına, biologiyadan diyualı gazetalardı, fotostendlerdi shıg`arıw, o`z-betinshe ju`mıslardı orınladıw ha`m olardı tapsırıwdı sho`lkemlestiriw, ilimiy maqalalar, referatlar,

konspektler jazıwdı u`yretiw, bayanatlar jasatıw usag`an jumıslardı orınladıw oqıwshılardıń bilim da`rejelerin teren`lestiriwge mumkinshilik jaratadı.

Biologiyadan (botanikadan) sabaq oqıtıwda yamasa klasstan ha`m sabaqtan tısqarı ju`mıslardı orınlaw barısında ilimiy-izertlew islerinen alıng`an mag`lıwmatlardı paydalanıw waqıtında jan`a pedagogikalıq texnologiyalardı qollanıw ( ma`selen, oqıtıwdıń interaktiv metodları: «Aqılıy hu`jim», «O`z ornın`dı tap», «Menyu», «Kishi toparlarda islew», «Devatlar», «Munazara» ha`m basqalardı qollanıw, krossvordlar menen test sorawların sheshiw h.t.b.) ha`r bir jan`a temalardı an`sat o`zlestiriwge alıp keledi ja`ne oqıwshılardıń materialistlik ilimiy ko`z qaraslarınń rawajlanıwın toliq táminleydi.

- **Jumıstıń dúzilisi hám kólemi:** Dissertatsiya 118 komp`yuter betinen turıp: kirisiw, 5 bap, juwmaqlaw hám paydalanılǵan ádebiyatlar diziminen, onda 9 keste, 43 suwret orın alǵan. Ádebiyatlar dizimi 54 atamadan ibarat bolıp, onda 32 rus tilindegi hám 1 internet materiallarınan paydalandıq.

Magistrlik dissertatsiya boyınsha nátiyjelerdiń járiyalanıwı. Dissertatsiya jumısı boyınsha 1 ilimiy maqala hám 4 tezis shet ellik hám respublikalıq ilimiy jurnallarda baspadan shıqtı.

Magistrlik dissertatsiya jumısınıń dúzilisi hám kólemi. Dissertatsiya 118 komp`yuter betinen turıp: kirisiw, 5 bap, juwmaqlaw hám paydalanılǵan ádebiyatlar diziminen, onda 9 keste, 43 suwret orın alǵan. Ádebiyatlar dizimi 54atamadan ibarat bolıp, onda 32 rus tilindegi hám 1 internet materiallarınan paydalandıq.

I-Ádebiy maǵlıwmatlarga sholiw.

1.1.Soralar (Chenopodiaceae Vent.) tuqımlasınıńwákillerin izertlew isleriniń tariyxı .

Bul tuqımlasqa 1500 ge shamalas tu`r, 100 tuwis kiredi. Connan, G`MA florasında 350 ge shamalas tu`r, 50 tuwis ushirasadi. Soralar tuqımlasiniń barlıq wa`killeri jer sharında ushirasadi, tiykarinan qurg`aq klimatlı subtropikalıq jerlerde ayırıqsha ko`p ushirasadi. Oniń ko`pshilik tu`rleri Orta Aziya, Tu`slik Batis, Arqa Amerikanıń, Tu`slik Afrikanıń, Oraylıq Avstraliyanıń jerlerinde bar. Qaraqalpaqstan florasında soralar tuqımlasiniń 140 tu`ri, 40 tuwisi ushirasadi ha`m olardıń tu`rleriniń ko`pshiligi Qaraqalpaqstanniń dúzli kebirli topıraqlı jerlerinde ken`nen tarqalg`an [19-130, 49,544, 53.208.].

Soralar tuqımlasiniń gu`lleri ju`da` mayda, onıń ag`zalari shen`ber boyınsha yamasa spiral` ha`m shen`ber tu`rinde ushirasadi. Simmetriyalı bes ag`zalı qos jinisli yamasa ayırım jinisli bolıp keledi. Gu`l do`geregi a`piwayı gu`l kese japirag`i ta`rizli atalıq gu`llerinde reduktsiyalanadı. Atalıg`i a`dette 5, ginetsiy a`piwayı 2-3-4-5 miywa japiraqtan payda boladı. Analıq tu`yneksheı joqarı (la`blebide yarım astqı) bir uyalı.. Miywesi bir tuqımlı g`oza siyaqlı gu`l kese japirag`i menen oralg`an.

Soralar tuqımlasınan qarabaraq, sarısazan, potashnik, qızıl sora tuqımlaslarınıń túrleri Qaraqalpaqstannıń galofit o`simlikleriniń qalıpleıwinde úlken rol atqaradı. Jiyi-jiyi edifikatorlar bolıp esaplanadı. Solay etip házirgi dúnyada galofitlerdiń 2500 túri bar. Sońgı 25-30 jıl ishinde dúnya ilimpazlarınıń kewlinde galofitlerdiń tábiyiy florasın izertlew, hám olardıń mádeniy egisliklerin ko`plep keńeytiw máseleleri tur. Olardıń tiykarǵı maqseti, ekinshi shorlang`an jerde onıń galofit plantatsiyasın payda etpekte. Bul máselelerdi sheshiwde Ámiwdáryanıń to`menindegi sora o`simliklerin onıń birlespelerin hám o`zgeriwleri házirshe az úyrenilgen. Sonıń menen birge shorlı jerlerdi o`zlestirgende adamlar birinshi gezekte sol máseleler menen gezlesedi. Sol sebepli usı aymaqtıń tábiyatın qorg`aw máselelerin sheshiwde shorlı sho`listanlardıń eńáyyemgi maydanlarınıń sora o`simliklerin úyreniw birinshi dárejeli áhmiyetke iye boladı.

Sora o'simligini (galofil) tipinde edifikatorlıq rol atqaratuğın hár qıylı shorlı jasaw orınları menen baylanıslı bolğan o'simlik birlespeleri kiredi. Soralar ayrıqsha o'zine tán shorlı topıraqtıń jasawshısı bolıp, kontsentratsiyalanğan topıraqtıń duzlı eritpesin uqıplı paydalanadı[50.172, 51.192.].

Galofitizm máseleleri ko'plegen ilimpazlardı qızıqtırıp kelmekte. Sońǵı jılları bul mashqalalargá bir qatar ilimpazlardı[Genkel 1950]; [Shaxov 1950, 1956]; [Strogonov 1962] h.t.b.jumısları arnalğan. Bul miynetlerde galofitlerdiń tábiyatı, olardıń duzǵa shıdamlılıǵınıń fiziologiyalıq tiykari anıqlanılgan.

Qaraqalpaqstanniń to'meniniń ayırım rayonlarınıń o'simliklerine arnalğan jumıslarda galofitlerdiń ko'birek tarqalğan túrleri haqqında bir qatar maǵlıwmatlardı tabıwǵa boladı.

Solardan XIII ásirdiń basında Aral Kaspiy sho'listanlıǵın izertlewshi Aleksandr-Bekovich Kaspiy Qaraqum bet oypatlıǵı átirapındaǵı galofit o'simlikleri tuwralı azı-kem maǵlıwmatlardı keltiredi. Odan keyin Danil Ruxovinde Barsakelmes atlı duzlı oypatlıqtıń do'geresindegi seksewilden payda bolğan toǵaylıklar tuwralı da ayırım maǵlıwmatlar beredi. Al Eversman bolsa Ústirttiń shıǵısında iytsiygektiń surannıń soranıńhám qızılsoranıń (solerostıń) keń tarqalğanların atap ko'rsetedi. 1848- jılı G.Yu.Baziner Ústirt sho'listanında sazlı topıraqlarda efermerler menen birge seksewildiń, iytsiygektińhám basqa da sho'p galofitlerdiń ko'p ushırasatuǵınlıǵı tuwralı maǵlıwmat beredi. [Viktorov 1971]. 1926 jılı Ústirtte geobotanikalıq jumıslar baslanıp, onıń juwmaqları [I.P.Gerasimovtıń 1930], [D olenkonıń 1930], [Ívanovtıń 1930], [F.N.Rusanovtıń] h.t.b. jumıslarında keńnen sáwlelenedi. Odan keyingi jılları Ústirtte[1945-1950]. E.P.Korovinniń bassılıǵında Ústirttiń túslik shıǵısındaǵı jaylaw izertlengen. Onıń juwmaqları 1949 jılı «Ústyurt Karakalpakskiy ego priroda i xozyaystvo» atlı jumıslarında járiyalanğan. Bul jumısta da sol regionnıń galofitleri tuwralı da tiyisli maǵlıwmatlar keltirilgen. Bunda o'simliklerdiń gelofilli tipin ayrıqsha ko'rsetedi.

Orta Aziyanıń ayırım rayonlarına arnalǵan jumıslarında da galorofil o'simlikleriniń taralıwı haqqında so'z etiledi. [Rusakov, Afanasev 1936], Túslik Batis Qızılqumda Granitov 1967, Momotov 1973]. Ámiwdáryanıń to'menindegi [Vernik, Maylun, Momotov, 1964] O'zbekstannıń o'simlik qatlamı atlı jumısta A[Akjigitova, 1973] shorlardıń gipsli orınlardıń galofit o'simlikleri boyınsha maǵlıwmatlar keltiriledi. [U.Turemuratovtıń 1978], [S.Erejepovtıń 1978] jumıslarında da galofitlerdiń, edifikatorları, formatsiyaları hám xalıq xojalıǵındaǵı áhmiyeti boyınsha maǵlıwmatlar berilgen.[A.Baxievtiń 1979-1985] jumıslarında galofitlerdiń indikatsiyalıq áhmiyeti boyınsha arawlı keń materiallar keltirilgen. [N.İ.Akjigitovanıń 1982] jumısı Orta Aziyanıń galofitlerine hám olardıń indikatorlıq qásiyetlerine arnalǵan. Sońǵı waqıtları soralar tuqımlarınıń (Chenopodiaceae) wákilleri ko'pshilik shet el hám Respublikalardıń ilimpazların ko'plep qızıqtırmaqta. Olardıń qatarında [V.N.Bochantsevtiń 1953, 1956],[T.A.Adılovtıń 1970], [U.Pratovtıń (1970,1972,],[O.Xasanovtıń h.t.b. 1995];[T.Raximovtıń 2008],[A.Baxievtiń, S.E.Treshkiniń N.K.Mamutovtıń 2008] jumıslarında Ámiwdáryanıń to'meniniń soraları boyınsha birqansha áhmiyetli maǵlıwmatlardı ko'riwge boladı. Ulıwmalap aytqanda sońǵı waqıtları soralardı izertlewge hám olardı paydalanıwǵa úlken dıqqat awdarılmaqta.

II-bap. Ilimiy-izertiew isleriniń orni hám usillari.

2.1. Ilimiy-izertlew orniniń hawa rayına ulıwma sipatlama.

Qaraqalpaqstan Respublikası Amudaryanın` to`mengi jag`ında jaylasqan. Shıg`ıs ha`m tu`slik jag`ınan Qızılqum sho`li qorshap tur. Batıs jag`ında O`zbekistan Respublikasınıń Xorezm ua`liyatı, Tu`rkmenstan ha`m Qazaqstan Respublikası menen arqasında Aral ten`izi menen shegaralanadı.

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń territoriyasınıń ulıwma maydanı 167,1 kv km. bolıp ol O`zbekistan Respublikasınıń 40,0% ke jaqın maydanın iyeleydi.

Qaraqalpaqstannın` barlıq territoriyası bir qıylı tegisliklerden ibarat. Ayırım jerlerinde tu`yıqlanıp qalg`an oypatlıqlar da gezlesedi [4.160, 8.4-7, 31.256].

Ko`pshilik territoriyası Aral ten`izine qaray azlaw uklon berip jaylasadı. Ten`iz betinen qa`ddi, Qaraqalpaqstannın` jaylasqan jerinde 76 metrdi qu`raydı. Orta Aziyanın` agrotopıraqlıq bo`liniwinde Qaraqalpaqstan Respublikası arqa sho`listanlıq rayonına jatadı.

Ba`ha`rde temperaturanın` salıstırmalı tu`rde to`men bolıwı, ba`ha`rdin` jaz ayı menen almasıwı, qu`rg`aq ha`m ıssı jaz ayı keliwi az mug`dardag`ı jawın shashın ıg`allıg`ı basqada ha`r qıylı ta`biiy faktorlar topıraq qu`ramındag`ı du`zdın` tez eriwshen`ligi, bull territoriyada o`zine ta`n bolg`an sho`listanlıq topıraqtın` belgilerin payda etip jatad. [12.190, 14.808, 22.96, 30.64, 39.120.].

Qaraqalpaqstan o`zinin` geomorfologiyalıq ha`m gidrogeologiyalıq belgileri boyınsha Turan provintsiyasınıń esktoraridlik, tegislik podkrovlitsiyasında jaylasqan. Bul territoriya to`mengi Amudar`ya, Qızılqum, Ustyurt ha`m Aral boyı okrugı dep o`z ishinde bo`linedi. [Babushkin, Dalimov, Kogay(1961)], [Matmuratov 1964].

Qaraqalpaqstannin` topırag`ı sho`l taqır, qu`mılı ha`m sho`listanlıq bolıp bul eski allyuviallıq topıraq. Qızılqumnın` topırag`ı sho`l-qumlı, qum qaldıq tawlarında qon`ır ren`li, jer betine shıg`ıp qalg`an u`nemligin da`wir jatqızıg`ında sho`gindi jımslardın` 6etinde bor da`wirdin` jatqızıqları bar. Ustyurtin` topırag`ı-sur qon`ır ha`m qumlı topıraq. Ayırım jerlerinde taslı-shebenlerde ushırasadı. Bor

da`wirinin` jatqızıqları da ko`plep gezlesedi. Aral boyı okrugının` topırag`ı batpaqlı, otlaqlı-batpaq, otlaqlı ha`m duzlı topıraq bolıp tabıladı [3.192, 5.130].

Qaraqalpaqstannın` barlıq topırag`ında qunarlılıq (gumus) kem, strukturası bay emes ha`m barlıg`ında karbonatlılıq gezlesedi [Gerasimov, Chikaev 1931, Shuvalov 1949, Kalashnikov 1956, Gusenov 1961, Klyupakov 1969].

Barlıq okruglerdin` topırag`ı duzlı, ayırım jerlerinde az duzlı, og`ada duzlı, du`zlı ka`nlerdide ko`riwge boladı. Duzlılıg`ı ko`pshilik jag`daylarda xlorlı sul`fat tu`rinde bolıp keledi. Qaraqalpaqstan Respublikasının` Amudar`ya alabında ha`m Aral ten`izi jag`alarında jer astı suwının` qa`ddi 0,5-1 m teren`likte, al Ustyurtte 20-30-60 m teren`likte bolsa, Qızılqum bo`liminde 6-10m ha`m onnanda teren`likte boladı.

Jazda egislikler suwg`arılatus`ın uaqıtta, jer astı suwının` qa`ddi egislik jerlerde o`simliktin` tamır sistemaları alatug`ın da`rejege shekem ko`teriledi. Qıstın` ku`ni 3-6 m. teren`likke shekem bo`linip tu`sip ketedi. Usıg`an baylanışlı egislik bolatus`ın jerlerdi gu`zde ha`m qısta suwg`aradı. Suwg`arılıw sisteması tekte to`mendegi Amudar`ya okruginde ju`rgiziledi. Al, qalg`an jerlerde ol ju`rgizilmeydi. Qaraqalpaqstannın` klimatına ta`n na`rse-jazdın` ıssı qurg`aq bolıwı, qıstın` suwıq, az bulılılıq, jawın shashının` og`ada az mug`darda bolıwı, joqarı da`rejede suwdın` parlanıwı bolıp esaplanadı. Bul territoriyanın` klimatı bir so`z benen aytqanda-keskin kontinentallıq klimat dep ataladı.

Ko`p jıllıq baqlawdın` mag`lıwmatı boyınsha Qaraqalpaqstannın` ha`r qıylı rayonlarında hawanın` ortasha temperaturası yanvarda minus 4,5 og`an 9,8<sup>0</sup> shekem o`zgeriste bolsa, al iyul` ayında plyus temperatura 25,2 den 28,4<sup>0</sup> qa shekem terbeliste boladı (Keste- 1). hawanın` temperaturası ayırım jıllarda jumsaq bolıwına qaramastan Amudar`yag`a jaqın jerler menen Aral ten`izinin` akvatoriyasına hawanın` temperaturasının` jıllıq amplitudası joqarı da`rejede boladı. Bul Qaraqalpaqstannın` klimatının` joqarı derejedegi kontinentallıq klimatqa iye ekenligin ja`ne bir ret tastıyıqlaydı [4.160, 6.192.].

En` joqarı temperatura tu`slik rayonlarda (To`rtku`lde) +47⁰ al, arqa rayonlarda – 42⁰ (Moynaq, Aqtumsıqta) boladı (Keste-1).

Qıslap shıg`atug`ın ko`p jıllıq gu`zlik yamasa qısta qıslap qalatug`ın ma`deniy o`simliklerge to`men temperatura ku`shli ta`sir etedi. Respublikanın` tu`slik rayonlarında 33⁰ temperatura (Mang`ıt) - -38<sup>0</sup> arqa rayong`a (Churuk, Shopanqazg`an) boladı. Ko`p jıllıq baqlawlardıń mag`lıwmatı sonı ko`rsetedi. Qıstın` uzaqlıg`ı 3-4,5 ayg`a sozıladı. Tu`slik rayonlarda ha`m Amudar`yanın` to`mengi bo`liminde qıs 29-30 oktyabr`den baslanadı. Arqa ha`m Aral boyı okruglerinde qıs 5-7-10 ku`n erte, Ustyurt ha`m Qızılqumda qıs 13-15 ku`n erte baslanadı. Qıs arqa rayonlarda 12-15 ku`n keyin tamam boladı, Ustyurtte ha`m Aralboyı okruglerinde qıs 12-25 ku`n keshirek tamam boladı. Qıstın` uzaq turıwı tu`slikten arqag`a qarap o`sip baradı. Tu`slik rayong`a qıstın` uzaqlıg`ı 85-90 ku`n bolsa, arqa 119-126 ku`n dawam etedi (Keste-2) [4.160, 7.84, 23.139-142.].

Ortasha sutkalıq temperaturag`a o`tiw +50ta boladı. Bunday temperaturada o`simliklerde vegetatsiya da`wiri baslanadı. O`simliklerdin` vegetatsiyası to`mengi Amudar`ya okruginin` tu`slik rayonlarında martın` ortalarında baslansa arqa rayonlarında keyinirek III dekadasında baslanıp noyabr`din` 1-dekadasında tamamlanadı. Qızılqum ha`m Ustyurt, Aral boyı rayonlarında vegetatsiya da`wiri o`simliklerdin` tu`slik rayonlarg`a qarag`anda 5-6 ku`n kemlew baslanıp, 10-15 ku`n keshirek tamamlanadı. O`simliklerdin` vegetatsiya da`wirinin` uaqtı tu`slikten arqa ja`ne arqa rayong`a qarap barg`an sayın qısqarıp baradı. Tu`slik rayonlarda vegetatsiya da`wirinin` uaqtı 234-240 ku`n bolsa, bul ko`rsetkish arqa rayonlarda 205-216 ku`nge sozıladı (Keste-2).

Ortasha sutkalıq temperatura 00 tu`slik rayonlarda aprel` ayının` 1-dekadasında bolsa, arqa rayonlarda II-dekadanın` aqırı III-dekadanın` basında boladı. Barlıq rayonlarda vegetatsiya uaqtı oktyabr` ayının` ekinshi yarımında tamam boladı. Ulıwma vegetatsiya 6-6,5 ayg`a sozıladı. Tu`slik rayonlarda (To`rtku`l, Mang`ıt) birinshi suwıq urıw 19-20 oktyabrde, al arqa rayonlarda 7-10 ku`n keshirek, Ustyurte 16-25 oktyabrde ha`m Aralboylarında 10-15 oktyabrde, suwıqlıq ku`n tu`slikten arqag`a qarap qısqarıp baradı. Qısta sutkalıq hawanın` ıg`allıg`ı jeterli da`rejede joqarı bolıp barlıq territoriya ushın 75-85 [Babushkin

1969].Jazda hawanın ıg'allıg'ı ku'shli to'menlep ketedi. A'sirese may-iyun` aylarında (13-33) ku`n ortasında (3-7) [23.139-142, 24.143-146, 47.56.].

Keste-1

Qaraqalpaqstan Respublikasının` rayonları boyınsha hawanın` temperaturasının` ortashası ja`ne joqarılıg'ı haqqındag'ı mag`lıwmatlar.

Meteo stantsiya	Biyiklik m	Ortasha temperatura °C			Jilliq	Absolyut temperayura	
		Jilliq	yanvar	iyul`		max	min
Amudar`ya alabi`							
To`rtku`l	100	12,5	-4,5	28,3	32,9	47	-31
Mang`it	84	11,7	-5,2	27,2	32,4	46	-33
No`kis	78	10,8	-6,4	27,1	33,5	46	-32
Qon`irat	60	9,9	-6,7	25,3	32,0	44	-30
Shimbay	65	9,8	-7,0	25,4	32,4	44	-31
`Qizilqum rayoni							
Chabankazg`an	64	10,5	-8,8	28,4	32,2	47	-38
Ustyurt rayoni							
Karakalpakiya	124	8,4	-9,8	26,2	26,0	46	-38
Jasliq	125	8,8	-6,8	26,0	34,8	45	-36
Aral boyi rayoni							
Moynaq	68	9,8	-7,1	25,9	33,0	42	-26

Ortasha jıllıq jawın shashının` mug`darı 70-110 mm. aralıg`ında boladı.Jıl dawamında onın` tarqalıwı birqıylı emes.Jıllıq jawın shashının` yarımı (40-50 mm) ba`ha`r aylarında jawadı, qısta (20-35 mm) 15 mm. gu`zde, 0-5 mm jazda jawadı. Quyp jawg`an jawın shashın bul japıraq qa tolıq sin`beydi, jekke topıraq betinde qabıqtı payda etip o`simliklerdin` o`sip rawajlanbawına keri ta`sir jasaydı. Jawın shashının` tu`siwi menen ekinshi jılı turaqlı bolmaydı. Geypara jılları qısta jawın shashın siyrek ushırasadı algeypara jılları bolsa ayırım uaqıtta og`ada ko`p jawın jawıp, onnan keyin hesh qanday jawın shashın bolmayda qaladı. Ba`ha`rde temperaturanın` ısıwı menen hawada ıg`allıqtın` kemiwi ju`z beredi ja`ne japıraqtag`ı awısıq (zapas) ıg`allıqtın` parlanıp ketiwine napreldin` basında topıraqta qurg`aqshılıq payda boladı [4.160, 6.192.].

Keste-2

Ortasha sutkalıq hawa temperaturasının` ortasha o`tiw ku`nleri 0+5⁰ +10⁰ S

Meteostant siya	0°S arqalı		Ku`nlerdin` uzaq da`wiri	0°S arqalı		Ku`nlerdin` uzaq da`wiri	0°S arqalı		Ku`nlerdin` uzaq da`wiri
	gu`zgi	ba`harg i		gu`zgi	ba`harg i		gu`zgi	ba`harg i	
To`mengi Amwdar`ya rayonu									
Turtkul	30. XII	22 II	85	14.III	10 XI	240	1 IV	20 X	203
Mangit	29. XI	26 II	90	18.III	8 XI	234	5 IV	20 X	197
Nukus	23. XI	6 III	10 4	21.III	5 XI	228	8 IV	17 X	191
Kungrad	25. XI	10 III	10 6	25.III	4 XI	223	11 IV	15 X	186
Chimbay	22. XI	9 III	10 8	25.III	1 XI	220	10 IV	17 X	189
Qızılqum rayonu									
Chabankaz gan	19. XI	9 III	11 1	25.III	31 XI	219	8 IV	17 X	191
Ustyurt rayonu									
Karakalpak iya	16. XI	24 III	12 6	1. IV	24X	205	18 IV	9X	173
Jashık	20. XI	24 III	11 9	31.III	28X	210	16IV	11 X	177
Aral`boyları rayonu									
Aktumsuk	6. XII	22II I	10 7	9.IV	6 XI	210	28 IV	19 X	183
Muynak	4. XII	16 III	10 3	6.IV	9 XI	216	20 IV	20 X	182

Qar jawg`aninan keyin ortasha 25-30 ku`n saqlanadı, alayırım jılları 8-10 ku`nnen artıq saqlanbaydı. A.N.Babushkinnin` (1959) mag`lıwmatı boyınsha qardın` qalın`lıg`ı yanvarda 2,5 sm, fevralda 4,6 sm geypara jılları en` qalın` qar 25-30 sm den aspag`an.

Qısta temperaturanın` turaqsızlıg`ı menen qardın` tu`siwi ne qarap, topıraqtın` ton`lawı dausı faktorlarg`a baylanışlı. Qarjawmag`an jılı topıraqtın` ton`lawı 50 sm teren`lik ke shekem bolıp, ko`p jıllıq o`simliklerdin` o`lip qalıwına alıp keledi.

Qaraqalpaqstanda samaldın` esiwi tez-tez bolıp turatug`ın qubılıs. Samal ko`bine gu`zde, qısta, ba`ha`rde jiyi-jiyi bolıp, olardın` basım u`stemligi arqa shıg`ıstan tu`slikke qaray esip, sekundına 3 m/s. Ha`mmesi 10-15 m/s. boladı. Ku`shli samal hawanın` temperaturasın joqarılalıp, topıraqtı ku`shli kewdirip, o`simliklerdin` jas na`llerinin` ko`gerip shıg`ıwına zıyan keltiredi.

2.2.Geologiyalıq hám gidrologiyalıq sharayatı.

Ámiwdárya deltasınıń geologiyalıq dúzilisin izertlew A.İ. Smolkonnıń roli úlken. Ol 1932-jılı Ámiwdárya deltasında bolıp, Ústirt, Aqtumsıq hám Sultan Wáyis tawlarınń geologiyalıq dúzilisi boyınsha, ásirese Aral teńiziboyındaǵı paleogen sho`gindilerinde nefttiń belgileri barekenligi tuwralı maǵlıwmatlar beredi. Bul ilimpaz Qaraqalpaqstan Respublikası erritoriyası aymaǵınıń neft hám gazge qazılma baylıqlarǵa bay ekenligin birinshiler qatarında ilimiy túrde dáliyllep berdi [7.84,23.139-142,143.-146.].

1944-46jıllarda Respublikamız aymaǵında geologiyalıq súwretke túsiriw baslandı. Bunda A.D. Arxangelskiydiń, N.P. Lupovtıń, A.L.Yanshinniń roli oǵada úlken. Bul ilimiy ekspeditsiya maǵlıwmatlarında Xojeli, Qızıl jar hám Moynaq rayonu territoriyasındaǵı por dáwiri qatlamlarınıń qaldıqları bolǵan bálentliklerdiń Ural menen Tyan-Shandı bir waqıtları tutastırıp turǵan tawbelgileri ekenligi ko`rsetildi.

1948-jıldan baslap Respublikamız aymaǵında keń ko`lemde geologiyalıq jumislardıń alıp barılıwı nátiyjesinde por, paleogen hám neogen dáwirlerdiń sho`gindileri menen neft hám gazge keleshek ko`z-qarasınan tekserip ko`rdi. Ol Aqtumsıq, Oraylıq Ústirt, Barsakelmes, Aseke awdan hám Sarıqamıs sho`kpeleri mısasında geologiyalıq ko`z qarastan tastıyqlandı.

Respublikamız Turan platformasında jaylasqan bolıp, ol mezozoy erasına shekem júdá háreketshen geosinklinallar zonası sharayatında jaylasqan. Qurǵaqlıqtıń payda bolıwı waqtınan baslap-aq jer beti jemiriliw, úgiliw hám juwılıw protsessleri ne ushırıp kem-kemnen tegislene bergen. Hátteki onıń ayırım

jerleri sho'gip, teńizbasqan. Nátiyjede áyemgi paleozoy sho'gindi leriniń ústin de mezozoy hám kaynozoy erasındaǵı sho'gindileri, taw jınısları hár jerde hár qıylı qalıńlıqta toplanǵan. Sonlıqtanda geologlardıń anıqlawına qaraǵanda fundamenttiń tereńligi úlkemizdiń aymaqlarında bir tegis emes. Trias dáwirinde Ústirt sho'ge basladı hám ol jerde qızıl reńli qum, tas hám saz ılaylı qatlamlar payda boldı. Bul sho'giw Ústirt hám Ámiwdárya eteklerinde yura dáwirindede dawam etti. Bul dáwirdegi sho'gindiler (qızıl hám qońır reńli qum, ılay hám mergel) aymaǵımızda bir tegis jaylaspaǵan, Moynaq, Qızıl jar hám Xojelide bul qatlam jer betine shıǵıp jatır. Paleogen dáwirinde teńizdiń jasıl reńli ılay sho'gindileri barlıq aymaqlarǵa keń tarqalǵan. Al, neogen dáwirindegi sho'gindilerde hák tastıń ko'p ushıraytuǵının ko'remiz. Neogen dáwiriniń aqırında respublikamızdıń aymaǵı birden ko'teriliwi nátiyjesinde juwılıw protsessi kúsheyip, oraylıq Ústirtte, Qızılqumda hám Ámiwdárya eteklerinde paleogen sho'gindileri juwılıp, hátteki olar ayırım jerlerde joq bolıp ta ketken.

Respublikanıń aymaǵı mezozoy, kaynozoy eralarında teńiz astında bolǵanlıǵı ushın ko'pshilik orınlar sho'gin di jınıslı qatlamlar menen qaplanǵan. Biraq, bul qatlamlardıń qalıńlıǵı barlıq jerde birdey emes. olar ayırım orınlarda 300-500 mden 5000-6000 mge shekem jetedi. Geypara territoriyalarda bul sho'gindi jınıslar joq, áyyemgi fundament jerbetine shıǵıp atır.

Respublikamızdıń deltaı rayonınıń ishinde hám jerde ataw sıyaqlı átirapındaǵı tegislikler bo'leklenip turǵan páskeltek tawlardı da ushıratamız. Olar geologiyalıq dáwirdiń hár basqışında payda bolıwı menen bir-birinen ajırılıp turadı. Misalı, Sultan Wáyis tawı, Qubataw, Qızıljar, Qusxanataw, Bo'rshitaw, Porlıtaw, Qırantaw hám Jumırtawlar áyyemgi bir pútin Ural-Tyan-Shantaw sistemalarınıńa jıralmas bir bo'legi bolıp esaplanadı.

Ámiwdárya deltası o'z inesay gidrogeologiyalıq sharayatlarǵa iye. Territoriyanıń úlken bo'limi allyuvial hám qumlı taqırlardan ibarat. Jer astı zey suwları, Ámiwdárya suwınıń gidromorfik háreketi, territoriyanıń tegis bolıwı,

region gidrogeologik sharayatına úlken tásir ko'rsatedi. Ámiwdárya deltasınıń gidrogeologik sharayadı bul jerdegi territoriylarınıń rawajlanıwına tikkeley tásir ko'rsatedi. Jerbetiniń tegis bolıwı izey suwlarınıń aǵıp ketiwin qıyınlastıradı, aqıbette jerlerdiń shorlanıw dárejesi biraz kúsheydi [23.139-142, 24.143-146.].

Ámiwdárya deltasınıń tiykarǵı suw deregi Ámiwdárya dáryası bolıp esaplanadı. Dáryanıń deltadaǵı jıllıq ortasha suw sarpı tabiiy dáwir bolıp, ol 1060 - 2090 m³/sek qa shekem jetedi.

XX-ásirdiń 1960-1970-jılları 850-1000 m³/sek qa kemeydi (1960-jıl katastrofalı ko'p suw kelip, suwaǵı mıldeltada 20-90m³/sekti quradı). 1980-1990-jıllarında dáryada suw az dáwir boldı. 1990-jıldıń basında deltada dárya suwı 10-15% keo'sti. 2000-2001-jılları dárya suw aǵımı keskin qısqardı. Aytarlıq tay suwǵarıw sistemaları qurılısı 1960-jıllardan baslandı. 1970-jıldıń basında Qubla Aral boyında suwǵarıw sistemaları arqalı jılına 3,6 -4,3 km³ suw dan paydalanıldı. Bunda kollektor-drenaj tarmaqlarınıń jıllıq suwa ǵımı 0,7-1,3 km³ti quradı. 1970-1995-jılları deltadaǵı drenaj tarmaqlarınıń aǵımı 1,5-2 esege o'sti. Ámiwdárya deltasında dárya aǵımınıń qısqarıwına baylanıslı ko'ldiń hám de jer astı suwlarınıń rejimi o'zgerdi. 1970-jıldıń ortasında dárya suwınan toyınıwshı ko'plep ko'ller bar edi. Bul ko'llerge suw quyıw 1974-jıldan baslap toqtadı. [Rafikov, 1982-j].

L.G. Konstantinovanıń (1987-j) maǵlıwmatı boyınsha 1975-jılları 25 úlken hám 62 mayda ko'ller qurıdı, olardıń ulıwma maydanı 100 mın hektardı quraydı. 90-jıllardan baslap ko'ldiń ulıwma maydanı 3-4 mın km²ti quraydı. Deltanıń suw sarpı sońǵı 30 jıl ishinde 5 ese ge qısqardı. Bir waqıttıń o'zinde kollektor-drenaj tarmaqları suwınıń salmaǵı o'sti. Bul oz nábetinde jer astı suwlarına kúshli tásir ko'rsetti. Eger 60-jıllarda Ámiwdárya suwınıń mineralizatsiya svegetatsiyalıq dáwirde 300-400- mg/ ldi quraǵan bolsa, ol suw az jılları 500 mg/lge jaqınlasıp, 80-jıllardıń ortasında 1,5 -2,2 g/lgeo'sti. (3-keste).

3 -keste

Samanbay postında (No'kiste) Ámiwdárya suwınıń ortasha aylıq hám jıllıq minerallasıwı (SANİİRİ Qaraqalpaqstan bo'limi maǵlıwmatı boyınsha, mg/lde).

Aylar	Jıllar					
	1950-63	1986	1993	1996	2000	2003
Yanvar	670	1030	1183	990	1353	1218
Fevral	675	1582	1344	1120	1113	1029
Mart	715	1740	1690	1375	1287	1056
Aprel	677	1689	2105	1530	1806	960
May	565	2192	1663	1260	1452	974
İyun	453	1342	1228	900	930	940
İyul	338	625	790	720	701	710
Avgust	333	696	697	585	755	690
Sentyabr	363	1187	1060	785	988	780
Oktyabr	464	1586	1218	790	976	860
Noyabr	545	1776	1250	970	1355	1010
Dekabr	596	1575	1218	1290	1018	1124
Ortashajıllıqmi nerallasıwı	533	1419	1287	1026	1145	

Deltanıń batıs bo'liminde grunt suwları ko'ldiń filtrleniwi arqalı, yamasa kanal hám kollektor tarmaqları arqalı filtrlenedi. Bul jerde jer astı suwları 2-5 mg shekemgi tereńlikte ushırasadı. Deltanıń oraylıq bo'liminde jer astı suwları Qazaqdárya, Qıpshaqdárya, Aqdárya hám kanallar, suwǵarılatuǵ injerler arqalı toynadı. Deltanıń bul bo'liminde grunt suwlarınıń shuqırlıǵı 3-5 m hám onnanda paste ushırasadı. Deltada 60-jılları grunt suwları dushshı hám de az dárejede minerallasqan edi. Házirgi waqıtta grunt suwları kúshli dárejede minerallasqan[Xakimov, 1989 j, Atrof muhit muhofazasi, 1993-j].

Deltaniń qurıǵan bo'liminde jer astı suwlarınıń mineralizatsiyası 30-100 g/l, deltaniń arqa bo'liminde 30-50 g/l di quradı[Rafikov, 1997-j]. Bunday joqarı dárejede minerallasıw duzların rawajlanıwına alıp keldi. Grunt suwları qáddiniń páseyiwi hám onıń minerallasıw o'lishemi, topıraqtıń shorlanıwına. Aǵın suwınıń o'zgeriwi, jerastı suwları rejiminiń o'zgeriwi nátiyjesinde topıraqtıń o'zgeriwi, suwda duzlar migratsiyasınıń o'siwi, bulardıń hámmesi o'z náwbetinde Ámiwdárya deltasındaǵı tábiyyiy ortalıqtıń o'zgeriwine alıp keldi.

2.3.Qaraqalpaqstannıń` topıraq-meliorativlik jag`daylarına sıpatlama.

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń` aymaqlarındaǵı topıraqlar payda bolıwına qaray, ular hawa rayına, suwg`arıw dizimlerinin` tu`rlerine, ju`rgizilip aturg`an xojalıq islerine, agrotexnikalıq islerdin` o`tkeriliwine yamasa o`tkerilmewine ha`m basqada antropogenlik ja`ne tu`rli ta`biyy faktorlarga` tıǵız baylanıslı boladı.

Bul jerlerde diyxansılıqqa en` qolaylı topıraqlar tiykarınan, suwg`arılıp egiliwshi otlaqlı dala zonası bolıp, ular ko`binese duzları ju`da` kem ha`m juwılıwshan` sazlı ja`ne siyreklew jag`daylarda ılaylı topıraqlardan ibarat bolıpkeledi.

Barlıq topıraqlardıń` quramında karbonatlardıń` bolıwı, to`men strukturalılıǵı, duzlanıwg`a qolaylılıǵı, organikalıq zatlarga` gedeyligi ha`m o`nimdarlıǵının` to`men dárejelerde bolıwı menen bul topıraqlar O`zbekistannıń` basqa bo`limlerin degi topıraqlardan keskin ajralıp tu`radı.

Topıraqlardıń` u`stin`gi gorizontında ulıwma azot ortasha 0,06-0,1 %, fosfor 0,11-0,13 % ti g`ana kuraydı. Su`rilip egiliwshi jerlerdin` 75-85 % -i nen aslamı ha`rqlı da`rejede duzlang`an ha`m tu`raqlı tu`rde juwıp-shayıp suwg`arıwdı talap qıladı.

Respublika boyınsha suwg`arıw sisteması yarım avtomatlastırılǵan. İzeykeshlerdin` ko`pshiligi tez-tezden ha`m tu`raqlı turde qayta rekonstruksiyalawdı talap etedi. Sebebi, ayrıqsha joqarı duzlılıqtag`ı jer astı izey suwlarınıń` jer u`sti bo`limlerine jaqın jaylasqan orınlarında, topıraq qabatlarındaǵı kapilliyar tu`tiksheler arqalı suwda eriwshen` zıyanlı duzlar

uziliksiz joqari ko`terilip, topiraqlardın` ekilemshi duzlanıwların intensivli tu`rde a`melge asıradı. Joqarıda atap ko`rsetilgen usınday baslı sebeplerden ha`mde bug`an qosımsha basqada faktorlarga baylanıslı ko`plegen egislik aylanısındag`ı jerlerdin` isten shıg`ıp atırg`anlıg`ının` gu`wası bolamız. Bunday awır mashqalalardı sheshiw din` tiykarg`ı ha`m baslı jollarınan biri, bul, egislik jerlerdi ha`r jılı jergilikli organikalıq to`ginler menen azıqlandıırıwdı ja`ne ha`r qıylı toksik duzlardan juwıp- shayıp suwg`arıwdı talap etedi. Sonlıqtanda, Respublikamızdın` ekologiyalıq jag`daylarında ko`birek du`shshı suw resurslarınan` ko`birek mug`darları talap etiledi [34.156, 35.187, 36.132, 37.412, 39.120, 16. 351.].

2.4. İlimiy-izertlew islerinin metodları ja`ne usılları.

İlimiy-izertlew islerinde ulıwma qabıl etilgen izertlew usıllarınan paydalanıw arqalı o`simliklerdin` tuwısın, twrin, sortların h.t.b.qa`siyetlerin anıqlawda «Opredelitel` Vısshıx rasteniy Sredney Aziy» (1972, 1974, 1983, 1993) , O.A.Bondarenkonın` (1964) « Opredelitel` vısshıx rasteniy Karakalpakii», S.E.Erejepovtın` «Flora Karakalpakii, ee xozyaystvennaya xarakteristika, ispol`zovanie i oxrana (1977), Korovina O.N, Baxiev A, Tadjitdinov M.T, Saribaev B. İllyustrirovannıy opredelitel` vısshıx rasteniy Karakalpakii i Xorezma. t.I, II. S. Semeystva Bobovıx po semeystvo Astrovıx. Tashkent, İzdatel`stvo «Fan» Uzbekiskoy SSR. 212 s. D.Seydemetov, U.Pratov ha`m B. Sarbaevlardin` «O`simlikler anıqlag`ıshı» N. «Bilim»., 1990,-112 b, B.Sherbaevtın` « Flora i rastitel`nost` Karakalpakii» (1998)., O`simliklerdin` shiyki zatlarınan` qorların anıqlawda Fedorovtın` (1948) usıllarınan paydalanıldı.

O`simliklerdin` fenologiyalıq jagdayların baklawda: İ.F.Momotov (1973), İ.N.Beydeman (1974), İ.G.Serebryakov (1964), Yu.K.Novoselov ha`m basq. (1983), tiykarındaju`rgizildi. Sondayak qosımsha Arncher Banch (1955), Vernik ha`mbasq. ( 1973 ), Allaniyazov ha`mbasq. (1984), Koshkarev (1988)., Attakurov (1995), Kamalov ha`mbasq. (1995), V.A.Tetyurev (1955) x.t.b. usılları ha`m ko`rsetpeleri ken`nen qollanıldı [14.808, 47.56, 30.64, 39.120].

O`simliklerdi tolıq biliw ushın O`zbekistan İlimler Akademiyasının`

Qaraqalpaqstan bo`limi birlesken Ta`biy ilimler kompleksli institutının` gerbariy kolleksiylarına salıstırılıp ko`rildi ha`m puxtalıq penen izertlendi.

O`simliklerdi dala sha`riyatında izertlew isleri: marshrutlı ju`risler arqalı statsionar, yarım statsionar jagdaylarında ju`rgizildi.

Aling`an mag`lıwmatlardı matematikalıq qayta islew isleri Dospexovtın` (1979) disperissionlıq tallaw usılı ha`mde EEM da komp`yuter da`stu`rleri tiykarında o`tkerildi ha`m ulıwma juwmaq shıg`arıldı.

İlimiy juwmaq shıg`arıwda ha`rqiylı za`rurli bolg`an ilimiy derekler, a`debiyatlar, ilimiy-texnikalıq esabatlar ha`m baskada mag`lıwmatlar paydalanıldı. A`sirese, qa`niygelerdin`bahalı ken`esleri ayrıqsha itibarg`a alındı.

2.5.Qaraqalpaqstannın shorlı sho`listanaymaǵının fiziko-geografiyalıq sıpatlaması.

Sońǵı jılları Aral teńizi hám onıń átirapları ko`plegen ilimiy jobalawshı – izertlewshi sho`lkemlerdiń úyreniw obekti bolıp qalmaqta. Soǵan baylanıslı házirgi waqıtta Qaraqalpaqstannın` tábiyiy ortalıǵın kompleksli izertlewler Qaraqalpaqstannın suw rejimin retlewı hám teńizdiń, dárejesiniń to`menlewı (27mge) nátiyjesinde bul regiondaǵı ekosistemalardıń jedelli o`zgeriwleriniń gúwası bolmaqta. Bul o`zgeriwlerdiń ulıwma baǵdarı hám tábiyiy komplekslerdiń shorlı sho`listanǵa aylanıwı (aridizatsiyalanıwı) bolıp esaplanadı. Gidromorflıq hám avtomorflıq sho`listanlıq sıpatqa iye bolmaqta barlıq orınlarda topıraqtıń shorlanıwı jer astı suwlarınń minerallasıwı dawam etpekte. Qurǵaqqa, duzǵa shıdamlı o`simlik birlespeleri, samal erroziyası protsessleriniń basım bolıwları, releftiń evolyutsiyalıq qumlı formaları keńnen tarqalmaqta. Biraq tábiyiy komplekslerdiń quramalılıǵınan hám dúzilisleriniń hár túrliliginen olardıń rawajlanıwıda júdá hár qıylı. Sonıń nátiyjesinen duzlardıń jedelli toplanıwı shorlanıwdıń o`sip barıwı yamasa landshaft lardıń tezirek payda bolıwları kútilmekte. Ámiwdáryanıń tarmaqlarınıń quyar jerinde alıslanıw dárejesinen, delta tárepinen shorlangan jer astı suwlarınń aǵısınan, quramalı metodologiyalıq hám

geomorfologiyalıq dúzilisiniń quramalıǵına baylanıslı teńizdiń suwdan bosáǵan ultanınıń bo'limindegi tábiyyiy kompleksler hár qıylı. Bir qatar maydan lar ádettegi dúzli yamasa evolyutsiya komplekslerden al basqaları salıstırmalı túrde az shorlanıwı menen bir-birinen parıq qıladı.

Qaraqalpaqstannıń tábiyyiy kompleksleriniń usı ko'rsetilgen barlıq hár túrliligi teńizdiń dárejesiniń to'menlewiniń dawam etip atırǵan jaǵdayında qolaysız protsesslerdiń aldın alıw boyınsha ámeliyi lajlardı o'z waqtında qollanıw, eń aqırında geokomplekslerdiń tábiyyiy resursların, olardıń rawajlanıw baǵdarına ǵárezli túrde planlastırıw maqsetinde olardı izertlewdiń kerekligin keltirip shıǵaradı.

Usı joqarıda ayılǵan o'zgerislerdi esapqa ala otırıp tiykarǵı izertlew rayonu bolǵan Qaraqalpaqstannıń fizika-geografiyalıq jaǵdayın sıpatlaw maqsetke muwapıq boladı.

Qaraqalpaqstannıń tiykarǵı relifi bolıp Ámiwdáryanıń hárekettegi hám quwrap qalǵan ańǵarları. O'zekleri go'ne ańǵarlarınıń depresiyaları dárya boyı qashıları buringı hám házirgi ko'llerdiń oypatlıqları búgin gi suwaǵatuǵın Qızketken hám Súwenli kanalları olardıń tarmaqları bolıp esaplanadı. Olardan basqa túslik Aral jaǵalawlarındaǵı ko'plegen ko'ldiń páskeltek tawlar: Qusqanataw, Qızıljar, Beltaw, Sultanwais, Qırantaw, Toqpaqatah.t.b. ushırasadı.

Hawanıń temperaturasınıń ortasha amplitudası $32-37^{\circ}$ qa suwǵarılatuǵın orınlarda absolyutlıq $-75^{\circ}-80^{\circ}$ Sqa . Respublikanıń sho'listanlı jaylaw rayonlarında $80-85^{\circ}$ qateń. Aral teńizi jaǵalarında onıń o'limshi tásirinen bul $65-70^{\circ}$ qa deyin azayadı. Yanvar ayında Qosbulaqta (arqada)- 80 , Shımbayda (arqazona)- $7,60$ hám To'rtkúlde (tualinzona) $4,90$. Absolyut minimal (to'men) temperatura Aral jaǵaları rayonlarında -28° , Tamdıda $-3,1,0$, Ústirtte -37° S. Olar suwǵarılatuǵın rayonlarda turaklı bolıp -290 tan -32° deyin o'zgeredi. İyul ayında ortasha temperatura $26,8^{\circ}$ (Qosbulaq) tan hám -260 (Shımbay) 30° qa deyin (Tamdı) o'zgeredi.

Suwǵarılatusın zonada onı qorshaǵan sho'listan menen salıstırǵanda temperatura to'men. Misalı iyulde ortasha temperatura To'rtkúlde $28,2^0$, Úrgenishte $27,3^0$ suwǵarılatusın rayonlardıń temperaturalıq rejimine Aral teńizi elede jumsartıw shı tásin tiygizedi. Suwsız máwsimniń uzaqlıǵı hawa rayınıń jaǵdayına baylanıslı arqada -155 kúńge, Orayda 156-173 kúńge hám túslikte -173-177 kúńge deyin kemeyiwi múmkin.

Túslik Aral átirapları Orta Aziyanıń ko'birek qurǵaqshılıq rayonlarına kiredi. Bul regionda jıl dawamında 80 mmden 122 mm deyinıǵallıq (jawın –shashın) tiykarınan qısta (29%) hám báhárde (40%) tusedi. Qısta qar qatlamı júdá az, al geyde shamal menen 20-30 kúndey saqlanadı. Bul regionda jawın-shashın jıl boyına to'mendegishe bo'listiriledi: No'kiste-32 mm, Shımbayda- 87 mm hámTexnik awılda 106 mm.

Joqarıda keltirilgen maǵlıwmatlarǵa baylanıslı Ámiwdáryanıń to'menine hawanıń joqarı qurǵaqshılıǵıtán. Misalı: hawanıń ortasha salıstırmalı ıǵallılıǵı No'kiste -43,7% ke, Texnik awılda -71,4% ke, Shımbayda- 55,4% ke teń. Yanvar ayında bul orınlarda hawanıń salıstırmalı ıǵallılıǵı 81% ti, aprelde-No'kiste -57%, Texnik awılda -66% ti quraydı [4.160, 14.808, 31.256, 30.64.].

III-bap. Tiykargı bo'lim. Ilimiy-izertlew isleriniń nátiyjeleri

3.1.Qaraqalpaqstanda o'siwshi soralar tuqimlasiniń tiykargıI edificatorlarına qısqasha bioekologiyalıq sıpatlama.

Soralar (galofitler) báhárde, jazda, gúzde vegetatsiya dáwirin ótkeretuǵın o'simliklerge jatadı.

Ko'plegen sukkulentli soralar- 7-8 ay dawamında vegetatsiyalaydı. Olar ásten rawajlandı. Báhárde ko'geredi gúllewı jazda baslanadı, al gúzde tuqımlaydı. Tekǵana ko'plegen soralarǵa vegetatsiyalanıwınıń qısqarǵan dáwiri tán bolıp, olar jazdıń basında yamasa ortasında tamamlaydı.

Shorlangan topıraqtıń tásiiri bul o'simliklerde ayrıqsha qásiyetlerdiń islenip shıǵıwına alıp kelgen hám, dúzilisinde, formalarında hám zat almasıwın da bir qatar o'zgerisler tuwdırǵan. Soralardıń dúzilisinde olardıń topıraqlarınıń qısqarıwı qara seksewildey, qarabaraqtay, sarısazanday, ejevniktiń potashniktiń solerostıńh.b. ko'pshiliklerinde baqlanadı. Basqa túrlerge japıraqtıń to'mengi bo'limi paqalǵa jabısıp o'skeni baqlanadı. O'simliklerdiń dúzilisinde de bul ayırmashılıqlar o'simliktiń translyatsiyalı qústiniń qısqarıwına baǵdarlanıwı ko'plegen soralarǵa tán.

Duzdıń tásirinen payda bolatuǵın tán bolǵan dúzilislik o'zgerisler, paxaldıń shireligi hám etli gionda ǵı suw o'tkeriwshi parenximanıń payda bolıwına baylanıslı bolıp esaplanadı. Sukkulentli, galofilli o'simlikler yamasa galosunkulentler Gekkel (1962) boyınsha -84 ten -91% kedeyingi úlken sondaǵı suwdı jutadı. Algalokserofitler, mısalı bassiya, svedaprostrotalardıń tkanlarındaǵı suwdıń muǵdarı 67-82% ten artpaydı.

Galofitlerkserofitlerdiń ayrıqsha túri dep qaraladı, olar joqarı temperaturaǵı shıdamlı.

Shorlı topıraqta o'siwi ushın galofitlerdiń hár qıylı biyimlesiwleri islep shıǵılǵan. Olar to'mendegishe ayırmashılıqqa iye boladı: a) o'ziniń kletka plazmalarında úlken sandaǵı duzlardı o'tkeredi hám olardıń o'zleriniń tkanlarında saqlawshı galofitler-sunkulentlertoparı; b) o'zleriniń kletkalarınıń plazmalarında duzlardı jaqsı o'tkeriwshi biraq duzlardı sırtqa bo'lip shıǵarıwshı galofitlar; v) o'zleriniń tamır spermalarındaǵı kletka plazmalarında duzlardı az sińdiretuǵıng alofitler; g) arnawlı dúziliske biyimlesken organında duzlardı toplawshı galofitler. Oǵan aqsora tuwısınıń túrleri kirip, olar shorlangantopıraqta o'sedi [3.192, 5.130, 8.47, 12.196,14.808 .].

3.2. Soralar tuqimlasiniń (galofitlerdiń) ekologiyalıq hám biologiyalıq o'zgeshelikleri.

Birinshi topardaǵı galofit o'simlikler úlken duzǵa shıdamlılıǵı menen ayrıladı. Olar joqarı kúshli duz toplawshı galofitlerge kiredi. Bul ko'p taralǵan túrler qaraseksewil, qarabaraq (1-Suwret)., sarısazan (2-Suwret)., potashniktiń (3-Suwret)., solerostiń (4-Suwret)., klimakopteranıń (5-Suwret)., hám svedanıń (alaputa) (6-Suwret)., túrleri.



1-Suwret. Qarabaraq o'simliginin' uliwma ko'rinisi.



2-Suwret. Sarsazan o'simliginin' uliwma ko'rinishi.



3-Suwret. Potashnik o'simliginin' uliwma ko'rinishi.



4-Suwret. Soleros o'simliginin' uliwma ko'rinisi.



5-Suwret. Klimakoptera o'simliginin' uliwma ko'rinisi.



6-Suwret. Sveda (alaputa) o'simliginin' uliwma ko'rinisi.

Ekinshi topardağı galofitlerdi kletka plazmalarında duzdı joqarı o'tkeriwshilikke iye. Biraq olardı sırtqa bo'lip shıǵarıwshılar quraydı. Mısalı: jıńǵıl, renmloria, kermek,, ajırıqh.t.b. Joqarıda atap o'tken galofitlerdiń shor topıraqta o'siwi biyimlesiwshilikleri hám áhmiyetleri olardıń tariyxıy rawajlanıw protsesslerinde islep shıǵılǵan. Galofit o'simliklerdiń (soralardıń) tarqalıwın anıqlawshı faktor bolıp topıraqtıń suw, duz rejimi esaplanadı[3.192, 19.130, 35,187, 36.132,].

3.3. Qaraqalpaqstanda o'siwshi bir jıllıq soralardıń tiykarǵı edifikatorlarına bioekologiyalıq sıpatlama.

1. Chenopodium album-aqsora.Galokserofilli o'simlik boyı 10-300 sm., paqalı shaqalanǵan bolıp tik o'siwshi o'simlik, japıraǵı Retpe-ret jaylasqan sabaqlı hár qıylı formada, gúli japıraqlanǵan masaqta jaylasıp, iri kúshli shaqalı yamasa qısqarǵan qoltıǵında gúl toplamı jaylasqan gúli eki jınıslı. Ádettegi otaq sho'p. Ol keń tarqalǵan barlıq eginlerde ushırasadı, jo boylarında toǵaylarda partaw jerlerde o'sedi.

Onı jaqsı hám qurǵaq túrinde túyeler jaqsı jeydi. Sonday-aq may da shaqlı iri shaqlı qaramallarda unatıp jeydi. Jarma túrinde untap qaynatıp mal awqatlıq zat tayarlanadı. Onıń massivlerin jazǵı gúzgi jaylaw retinde awıl xojalıq mallarına paydalanıwǵa boladı.

Odan basqa aq sora boyaw ushın, dári awqat retinde paydalanıladı. May ayınan baslap gúzdiń aqırı na deyin gúlleydi hám tuqımlaydı. Tuash ko ko'beyiwi uzakqa sozılıp mart-aprel aylarınan baslanadı. Bas tamırınıń túbi juwan, diametri 1 sm. tik baǵdarda 65 sm tereńlikke deyin rawajlanǵan. Úlken tükli beriwshilik ke iykemlesip bir o'simligi 100000 ǵa deyin tuqım beredi.

2. Ch.rubrum- qızıl sora-birjıllıq, kseromezofilen o'simlik, boyı 1 mgedeyino'sedi. Paqalıtkiyamasajayıptao'sedi. Shaqalanǵanjıltır, qızıl túskeiye, ádetteqırıljapıraǵıetli, sabaqshalı 11 smdeyingiuzınlıqtaboladı.

Ámiwdáryanıń to'meninde hám alabında keń taralıp, taslandı hám shorlı topıraқта o'sedi.

Túyeler hám iri shaqlı mallar ushın sonday-aqqoy-eshkilerge jaqsı awqatlıq o'simlik xalıq meditsinasında olardan jaralanganda hám mayıpbolǵanda paydalanıladı[3.192, 19.130, 35,187, 36.132,].

3. Bassia hyssopifolia-bassiya ilmek sora.

Galokserofilli bir jıllıq boyı 10 smden 100 sm ge deyin ketedi. Paqalı tik hám azıraq ko'terilip turadı. Qızǵıshlaw japıraǵı retpe-ret jaylasqan qısqa sabaqlı lantset formalı. Shorj erlerde sazlı qumlarda hám taslandı orınlarda o'sedi. Bul o'simlikti mallar jemeydi yamasa júdá az jeydi. Tuqımı mal jegennen keyin bir jıl dawamın da jaqsı, bir tegis ortasha 05% ke deyin ko'gerip shıǵadı. Jip tárizli bas tamırı tik o'sip 60-65 sm ge deyin topıraqqa kiredi.

4. Agriophyllum-latifolium-keń japıraklı aq tiken kúshli shaqlı 15-50 sm biyikliktegi bir jıllıq o'simlik, japıraǵı enli, keń tikenli mayda gúl jasıl japıraqlı. Vegetatsiyalawı mart-aprel aylarında baslanadı, iyunda gúlleydi, iyulde quwray baslaydı. Al oktyabr ayında o'sedi. Alkoloidlı o'simlik ol gipslengen qarıklı to'bishik-bar oanlı jıljımalı qumlarda o'sedi. Ko'binese qoyan súyekler menen hám qaraseksewil menen birge ushırasadı.

5. A. arenarum- qumarchigi- bir jıllıq o'simlik bolıp boyı 20 sm-100 sm aralıǵında boladı. Japıraǵı uzın, muktset formalı, mart ayında vegetatsiyalaydı, iyun da gúlleydi, avgusta tuqımlaydı, oktyabrde o'ledi. Topar-topar bolıp barxanlı to'bishik qumlar arasında ushırasadı. Alkoloidlıo'simlik.

6. Atriplex tatarica- almaputa jazǵı bir jıllıq boyı 20-120 sm. galomezofilli o'simlik. Shorlarda, toǵaylarda, suw almalı orınlarda keńt aralǵan.

Martta- aprelde tuqımınan ko'gerip shıǵadı.

Iyunnan baslap gúzdiń aqırına deyin güllep tuqımlaydı. Tuqımı to'men temperaturada, sonday-aq joqarı temperaturada bir tegis ko'gerip shıǵadı. Alaputa

sorasına onıń ekologiyalıq diapozonı, onıń ıǵıllı sonday-aq qurǵaq orınlarda jasawına múmkinshilik beredi.

Paqalı túbinen baslap shaqalanǵan japıraǵı izbe-iz jaylasqan sabaqlı, úshmúyeshli yamasa uzın máyek tárizli. Bul o'simlikti mal dın jewshiligi ele tolıq anıqlanbaǵan. Ko'plegen maǵlıwmatlar barlıq awıl xojalıq mallarınıń onı jaqsı jeytuǵınlıǵın tastıyıqlaydı. Duzǵa shıdamlılıǵı qanaatlandırarlıq dárejede bolıp, onı shorlardı jaqsılawda fitomeliorant retinde paydalanıwǵa múmkinshilik beredi.

7. Ceratocapus utriculosus-qaltahebelek. Bir jıllıq kserofilli o'simlik, boyı 3 smden 40 smge biyiklikte. Bul o'simlik qalıń tókli, juldızsha tókshelerden payda bolǵan, paqal túpten baslap kúshli shaqalanǵan, shor formadaǵı shaqlı japıraǵı izbe-izqarama-qarsı jaylasqan. Qumlarda shorjerlerde geyde jar tawlarda, jol boyların da keń taralǵan.

Tuqımınan ko'binese marta o'sipshıǵadı, maydın aqırında gúlleydi, iyun-avgustta tuqımlaydı. Tuqımı 6-12⁰ Stemperaturada jaqsı ko'geredi. Oleń jaqsı mal awqatlıq sho'p bolıp esaplanadı. Onı jıl dawamında qaramal dan basqa, barlıq awıl-xojalıq malları jeydi. Sonıń menen birge ol dári-dármaq o'simligi bolıp esaplanadı.

8. C.arenarius kumebelegi-bir jıllıq mezokserofillitókli o'simlik. Boyı 5-30 sm paqalınıń túbinen baslap shaqalarǵa tarmaqlanǵan, shor formalı japıraǵı qattı izbe-iz jaylasqan, shaqaları túpten baslap qarama-qarsı jaylasqan. Qızıl qumınıń eteklerinde shorlar da qurǵaq kanal boyların da hám bos jerlerde o'sip rawajlanadı. Ol mal awqatlıq sho'p ke jatadı. Onı mayda shaqlı mallar báhárde jazda jaqsı jeydi. O'nimdarlıǵı gektarına 3-3,5 ts gejetedi. Ko'binese o'nimi gektarına 1-2 ts den aspaydı.

9. A. niters- alaputa bir jıllıq mezokserofilli o'simlik boyı 60-150 sm paqalı ápiwayı yamasa shaqalanǵan japıraǵı sabaqlı úshmúyeshli máyek tárizli yamasa lontset formalı. Gúli masaq tárizli topgúl. Ámiwdáryanıń deltasında hám alabında

ushirasadi. Ol qanaatlandirarliq dárejedegi mal awqatliq sho'p. Oni tek qaramal hám jılqılar jemeydi.

10. A.haftata-oqjaydın oǵiformalı alaputa.Galomezofilli bir jıllıq sho'p, boyı 20-100 sm. Paqalı shaqalangán qısqa sabaqlı úshmúyeshli, japıraqlı Ámiwdáryanıń deltasında hám alabında taralǵan, siyrek túrde shorda hám taslandı orında o'sedi. Jaqsı mal awqatlıq o'simlikretinde sıpatlanadı. Odan da ol dáridármaq bolıp esaplanadı. [Erejepov 1978].

11. Cirgencohnia ofositiflora- saǵansirgeksoniyası bir jıllıq kserofilli o'simlik boyı 10-50 sm. Paqalı qattı. Shaqalı sargısh jasıl reń de kebir jerde, shıyrshıq taslı sazlı hám shegeleń topıraqta o'sedi.

Aprelde gúlleydi, sentyabr-oktyabr tuqımlaydı odan keyin o'lip qaladı. Ádebiyatlarda mal awqatlıq sho'p retinde (ortashasapalı) belgili. Tiykarınan qoylar eshkiler hám túyeler arqalı jaqsı jelinedi. Eń jaqsısı jıl jımalı qumdı bekitedi hám alkaloidli o'simlik bolıp esaplanadı [Erejepov 1978].

12. Horomnovia ulicina- Garakinovich sarıtikenli (qara-qız) peatsiofilli bir jıllıq o'simlik boyı 15 smden 50 sm gejetedi. Túbinen baslap jatıńqı hám ko'terińki shaqalı o'simlik. Japıraǵıqarama-qarsı jaylasqan sına tárizli ushı tikenli domalaq shar formalı, gúl toplamın payda etedi. Qaraqalpaqstanda qaramaldan basqa mallardıń túri jaqsı jeydi. Sho'listanda bekingen hám barkanlı qumlar o'simligi.

13. Halimocnesnis karclirik buzawbas-galokserofilli.Bir jıllıq tik o'siwshi o'simlik. Biyikligi 3-25 sm túp ten baslap ko'p bolıp shaqalangán dáslepki waqıtları qalıń túksheleri boladı keyinirek túksheleri túsip qaladı. Japıraqlarısızǵısh sıyaqlı ushı topır uzınlıǵı 20-30 sm ortasha 6-15 sm japıraǵınıń uzınlıǵı 2-4 ss gúlgorganı japıraǵı besew atalıǵı besew iyun ayında gúllep iyul ayında miywalaydı. Taqırlarda gipsli topıraqlarda qumlı taslı topıraqlarda qumlarda shor jerlerde tegisliklerde o'sedi. Qaraqalpaqstannıń barlıq rayonlarında keń tarqalǵan o'simlik.

Onı mayda shaqlı mallar hám jılqılar jeydi. Báhárde hám jazda onıń quramın da kúldiń sanı ko'p bolǵanlıqtan mallar jemeydi.

14. Seleroferma- Domalatpa-bir jıllıq qattı miyweli galokserofilli o'simlik biyikligi 5-30 sm túpten baslap shaqalanǵan dáslepki waqıtları qalıq túkler menen qaplanǵan. Sońın ala túkler túsip qaladı. Japıraǵınıń uzınlıǵı 3-5 mm jumsaq. Gúlgorǵanjapıraǵı 3-4. Atalıǵı 4 iyun ayında gúllep, sentyabr ayında miywalaydı. Taqırlarda, gipsli topıraqlarda. Taslı qumlı topıraqlarda ushırasadı. Mayda shaqlı mallar (qoy? Eshki) túyeler ushın eń jaqsı ot jemlik o'simlik.

15. H.Villosa- qalıń túkli buzawbas-bir jıllıq golokserofilli o'simlik, boyı 3-25 sm shaqalanǵan qalıńt úkli, japıraǵısız ǵısh tárizli ushlı. Topıraǵı sheberli, qumlı sazlı tirishilik orınlarında o'sedi. Onı gúzde hám qısta qoylar hám túyeler jaqsı jeydi. Qurǵaq túrinde jılqılar da súysinip jeydi onıń miyweleri hám japıraqları qoylar hám túyeler ushın semirtkish, awqat bolıp esaplanadı [Larinh.b. 1951].

16. Halogetan glomerotus- buyrasora- bir jıllıq galokserofilli o'simlik tüksheleri joq, biyikligi 3-40 sm túpten baslap shaqalanǵan. To'mengi shaqası uzın tik o'sken. Japıraǵı ret pe-ret qalıń uzınlıǵı 3-12 mm jumsaq gúl qorǵan japıraǵı perde sıyaqlı. Atalıǵı besew jipsheleri birigip ketken. Ekew yamasa úshewden miywası domalaq yamasa sopaq law domalaq uzınlıǵı 1,25-1,75 mm iyul ayında gúllep sentyabr ayında miywalaydı. Shorlarda taqırlarda, taslaqlarda mayda shıyrshıq taslı topıraqlarda, qumlar da o'sedi [12.].

Qaraqalpaqstanda ko'p tarqalǵan o'simliktiń biri bolıp esaplanadı. Qurǵaq túrinde mayda shaqlı mallar (qoy, eshki) jeydi [Larinh.b. 1951].

17. Petrosimonia sibirica- torǵayotu, bir jıllıq golokserofilli o'simlik, boyı 10-50 sm ko'p bo'limi túkli yamasa geyde jıltır shaqası hám japıraǵı qarama-qarsı ornalasqan, japıraǵı sabaq tárizli ushlı, shorlarda hám kebirlerde o'sedi. Onı gúzde túyeler hám qoyeshkiler jaqsı jeydi. Onıń o'nimdarlıǵı gektarına 70 tsge deyin jetedi. O'ndirislik qurǵaqo 'nimli gektarına 5,5 tsden 22 ts ge jetedi.

18. Suaeda prostrata- qarasora bir jilliq galokserofillio'simlik, boyi 10-75 sm, paxalitik, qizg'ish jiltir yamasa topg'ullik jaqin jeri tukli. G'ulleri japirag qoltig'inda jaylasqan. Japirag'sizg'ish tarizli topirlaw. Tuqimi mayda top g'ulli jinishke po'peksiyaqli avgustayinda g'ullep, oktyabr ayinda tuqim beredi. Saz jerlerde, taslandi orinlardin aralarinda o'sedi Araldin tuslik atirapinda ken tarqalgan.

19. Suaeda.salsa- shorsora- galokserofilli bir jilliq o'simlik boyi 25 ten 100 sm ge deyin o'sedi. Paqali tik, tupten baslap shaqalang'an, japiragi qalin etli, yarim obal formalı top g'ulli, birqansha bolip, shar formalı gul qasi japiragi bar. Teniz jag'alarinda, suw alma atizlarda ortasha shorda o'sedi.

20. S.heteraphela- japiragi har qiyli sora bir jilliq galokserofilli o'simlik. Biyikligi 10-80 sm. Paqali tupten baslap shaqalang'an jasil re'nde, so'nin ala Sari yamasa qizg'ilt re'nge do'nedi. Japiragi jinishke ushi topirlaw boladi. G'ulleri eki jinisli gul qorgan japiraqlari dara-dara erkin jaylasqan. Tuqimi tigine yamasa qiya ornalasqan. Eni 1 mm, qara qonir re'nde usti tegis. Iyul ayinda g'ullep, sentyabr ayinda miyweleydi. Japsalmalardin, kanallardin boylarinda suwgarilip egiletugin shorlaw jerlerde igalli shorlarda o'sedi jaqsı mal awqatlıq ham darilik o'simlik.

21. S.altisyina-biyik qara sora.

Bir jilliq golokserofilli ruderalıq o'simlik. Boyi 20-200 sm. Paqali tik shaqalang'an jiltir japiragi shireli sabaqshalı. Topg'uli piramida formada sipse tarizli, g'ulli japirag sabaqshasında jaylasqan. To'gaylarda shorlı jerlerde jap-salma boylarındağı igalli orinlarda o'sedi. Oni tuyeler eshkiler guzde suysinip jiydi.

22. S.acuninata- jinishke japiraqli qara sora- galokserofilli bir ıllıq o'simlik boyi- 10-75 sm. Tupten baslap shaqalang'an, paqaliquzg'ishlaw, jiltir, japiragi jinishke ushli. Gul eki jinisli, japirag qoltig'inda jaylasqan. Shorlarda, to'gaylarda, suwgarılatugin rayonlarda, taslandi orinlarda o'sedi. Jasil turde tuyeler onı jaqsı jemeydi. Qısta paqali quwrag'annan keyin qoy eshkiler, tuyeler jiydi.

23. S.linufolia- kendir japıraqlı qarasora, golokserofilli bir jıllıq o'simlik boyı 10-75 sm paqalı geyde tek top gúlli, japırağı sıızgısh tárizli, jalpaq o'tkir ushlı, juqa etli, paqalğa jabısıp jaylasqan, gúli eki jınıslı masaqqa jıynalğan, gúljapırağıjoq. Toğaylarda, partawlarda, egislikte, jap-salmako'ljağalarındağıjaylawlıshorlıtopıraqtahámkebirjerlerdeo'sedimallarjiytuğın mal awqatlıq sho'p. Gúzde hám qısta, qoy eshkiler jaqsı jiydi [Larinh.b. 1951].

24. Salsola panlsenii- qańbaq-psammomezo-kserofilli bir jıllıq o'simlik boyı 15-60 sm. Paqalı túpten baslap kúshli shaqalanğan, kelte tókler menen qalıń jabılğan. Japırağıi retpe-iret ornalasqan, uzın sıızgısh formalı túbinen keńeygen, ushı tikenek qanbaq mal awqatlıq o'simlik, onı túyeler jaylawda jaqsı jiydi. Japırağında hám tuqımında alkaloidlar ko'p [Massagetov 1947]iyulde gú lleydi hám sentyabrde tuqımlaydı.

25. S.nitraria- shorputa- galomezokserofilli o'simlik, boyı 10-40 sm. Paqalı ko'p shaqalanğan joqarısı qıysıq bolıp bağdarlanğan. Japırağı izbe-iz jaylasqan qısqa etli, topır tez túsip qáladı.

Gúl toplamı sipse formal taqırda, shorda, qumaralarında hám partawlardao'sedi. Malawqatlıqo'simlik, Gúzden baslap báharge deyin miywelerin qoy eshkiler jiydi [Larinx.b. 1951].

26. S.foliosa- qaramayza- galokseroffilzofilli bir jıllıq o'simlik boyı 15-80 sm. Paqalı túpten baslap shaqalanğan, eń to'mengi shaqası uzın, basqa shaqaları kelte. Japıraqları iretlesip jaylasqan miywesi jemis sıyaqlı avgust ayında gúllep sentyabr ayında tuqım beredi. Shor jerlerde taqırlarda gips li topıraqlarda shorqaqlı qumlarda o'sedi. Bul o'simlikti soda o'ndiriw de paydalanıwğa boladı.

27. Clemacoptera brachiata- torğay ot- bir jıllıq galokserofilli o'simlik boyı 10-30 sm. Shaqları qarama-qarsı jaylasqan tóksheler menen qalıń jabılğan. Japıraqları qarama-qarsı jaylasıp, qalıń tóksheleri bar. Gúl qaptalı japıraqları retlesip jaylasqan. İyun aylarında gúllep, sentyabr ayında miywe beredi. Shor

jerlerde, taqırlarda ushırasadı. Qaraqalpaqstanda onı qálegen túrde túyeler jiydi. Al qısta qoylar jaqsı jiydi. Sho'listandı o'zlestiriwde eń keleshegi bar o'simlik.

28. C.lanata- balıq ko'z- galokseromezofilli bir jıllıq o'simlik, túpten baslap shaqalanǵan, shaqaları izbe-izjaylasqan, byiikligi 10-60 sm, tókler menen qaplanǵan. Joqarǵı suwlı tsilindr sıyaqlı gúlleri toplanıp jaylasqan. Miyweli qızǵısh qońır reńli iyul ayında gúllep, sentyabr ayında tuqım beredi. Sho'plerde saz jerlerde o'sedi. Respublikanıń barlıq rayonlarında keń taralǵan. Balıq ko'z gúzgi- qısqı bahalı jaylaw o'simligi bolıp esaplanadı. Qolaylı jıllarda gektarına 10-15 ts qurǵaq o'nim beredi. Onı tek ǵana túye, qoy, eshkiler jiydi. Jıl jımalı qumlar dı bekitiwshi eń jaqsı fitomeliorant bolıp esaplanadı.

29. C.crassa- etli balıq ko'z galokseromezofilli bir jıllıq o'simlik boyı- 5-50 sm paqalı túpten baslap shaqalanǵan. Qaptal shaqaları negizgi paqal menen teń, tóksheler menen qaplanǵan japıraǵı jumsaq iretlesip jaylasqan, topırlaw iyun ayında gúllep sentyabr ayında tuqımlaydı. Shor jerlerde, taqırlarda, qumlardıń eteginde o'sedi. Bul o'simlikti túyeler jaqsı jiydi. Qaramallar onı jemeydi.

30. Alexandra Leamani- LemannaAleksandırı. Galokseromezofilli bir jıllıq o'simlik, boyı 10-50 sm. Paqalı sargısh-jasıl reńli, jiltir shireli, tik o'sedi. Gúli top-top bolıp japıraq qoltıqlarında jaylasqan. Sho'listan zonanıń qabırshaqlı hám ıǵallı shorlı orınlarında o'sedi.

31. Solicornia luropaca-qızıl sora. Galomezofilli hám gidrofilli sukkulentli bir jıllıq o'simlik. Ol kserofit hám golofit bolıp topıraqtıń duzlı joqarǵı eritpe sine shıdaydı. Boyı 10-15 sm. Shaqaları qarama-qarsı jaylasqan. Japıraǵı reduktsiyalangan (qısqarǵan). buwınlarǵa bo'lingen. Gúlleri úsh-úshten toplanıp jaylasqan. İyun ayında gúllep, avgust ayında tuqım beredi. Izǵarlı saz jerlerde, dárya, ko'l hám teńiz jaǵalarında o'sedi. Onıń quramında duzdıń eritpesiniń asa ko'p bolǵanı ushın gúzge deyin mallar jemeydi. Suwıq túskennen keyin onı

túyeler jaqsı jeydi. Al qoy, eshkiler jaman jeydi [3.192, 5.130,6.192,10.303, 19.130, 35,187, 36.132].

3.4. Qaraqalpaqstanda ósiwshi puta soralar tuqımlasınıń edifikatorlarına qısqasha bioekologiyalıq sıpatlama.

32. Haloxylon aphyllum- qara seksewil-1,5-5 m biyiklik tegis horlı sho'listan ağashı. O'resi 50-70 sm, aldiametri 24-28 sm. O'miriniń uzaqlıǵı 50-70 jılgeyde 100 jılǵa deyin jasaydı. [Heraeba 9 bē1973]. Shorlı sho'ldiń ağash o'simlikleriniń toparınan ayqın ko'rinetuǵın edifikator.

Qara seksewil hár qıylı ekologiyalıq jaǵdaylarda o'sip rawajlanadı. Onıń ko'pshiliginde hám tirishilik forması dep sonıń menen anıqlanadı. Onıń tamırı kúshli rawajlangan. Jer astı suwına jetedi (4 m) [Petrov 1935].

Qara seksewil tábiyatta generativlik fazasına 5-6 jıllıq jasında, al qoldan egilgende 7-8 jıldan keyin kiredi. Onıń ağashı qımbat baha menen bahalanadı. Qaraseksewildiń qolaylı jaǵdayda ağashınıń ulıwma o'nimdarlıǵı gektarına 20-25 tonnaǵa jetedi [15.132 b.].

33.Tamarix hispida- Ermanı jıńǵıl. Biyikligi 6 m ge deyin jetetuǵın iri puta. Jıńǵıldın bul túriı ǵalǵa júdá talapshań. Onıń tuqımı kúshli ıǵallı topıraқта ko'geredi. Ol kesh gúlleydi. Gúllewi iyuldan baslanıp oktyabrge deyin dawam etedi. Náli ekinshi jılı gúllep tuqım beredi.

Tamır sisteması jip formada bolıp 10 mge deyin tereńge ektedi. Jıńǵıl dıń basqa túri menen salıstırǵanda suwıqqa shıdamlı keledi [Rusanov 1949]. Ol toǵaylarda qumlarda hám shor jerlerde ko'plep ushırasıp hár túrli birlespelerdi payda etedi.

34. Tamarix laxa- Úrpek bas jıńǵıl. Boyı 2 mge jetetuǵın puta. Úrpek bas jıńǵıldıń basqa alaplar da o'setuǵın túrlerinen ayırmashılıǵı sonda, ol sho'listan taqırlarınıń, qumlarınń kebirleriniń shetlerinde, shoqasaqlarda o'sip rawajlanadı. Onıń joqarıda ko'rsetilgen orınlardıń ıǵallı jerinde báhárde tuqımları ko'geredi.

Onıń nálleri tez o'sip rawajlanıp jer astı tamırları, jer ústi shoqalarınan 20-30 ese úlkenirek boladı.

35. Halostachys caspica- Qarabaraq-boyı 1-2 mge jetetuǵın iri sukulentli puta bolıp soralar tuqımlasına kiredi. Ámiwdáryanıń to'meninde hám Aral teńiziniń suwdan bosaqan ultanında keńnen tarqalǵan. Ol ko'binese qalıń qalıńlardı payda etedi. Sonday-aq suwgarılatuǵın orınlarda ıǵallı hám qabırshaqlı kebirlerde de keńnen taralǵan. Ol ko'binese shorlı shoqalaqlardı payda etedi. Tamır sisteması 150 smge deyin tereńge ketedi. Tiykarınan tuqımı arqalı ko'beyip rawajlanadı.

36. Halochenum strebilarium-Carı sazan soralar tuqımlasanı kiretuǵın boyı 30-40 sm sukkulentli puta. Ol tar ekologiyalıq ampletutaǵa iye bolıp, azıǵallı hám kúshli shorlangan jer astı suwları menen baylanısqa. Shorlı ko'llerdiń jaǵalarında hám Aral teńiziniń suwdan bosaqan orınlarında keńnen taralǵan. Vegetativ jol menen hám tuqımı arqalı ko'gerip rawajlanadı. Tamır sisteması jer ústine jaqın jaylasıp 10-35 sm tereńge jetedi.

37. Salsola dendreides- Kargan-soralar tuqımlasına jatatuǵın úlken bolmaǵan yarım puta bolıp, boyı 1 mden aspaydı. Ámiwdáryanıń to'menindegi burınǵı hám házirgi allyuviallı deltalar da taza birlespeni payda etedi. Ol tiykarınan shorlı, taqırlı topıraqqa beyimlesken. Ol jerde jer astı suwı 8-10 m tereńlikte jaylasqa. Tiykarınan tuqımınan ko'gerip rawajlanadı.

3.5. Qaraqalpaqstanda o'siwshi soralar tuqımlasınıń klassifikatsiyası hám olardıń sıpatlaması.

Soralardıń tirishilik formaları Ámiwdáryanıń to'meniniń shorlı sho'listanınıń o'simlikler qatlamına hár túrli tirishilik formalarına kiretuǵın hám sho'listannın baslı tiplerinde tarqalǵan o'simliklerden payda boladı. Bul jaǵınan qattı ıssı sho'listannıń tirishilik formaları menen bir qatar ulıwma uqsaslıǵı tuwralı aytıwǵa boladı. Biraq o'simliklerdiń anaw yamasa mınaw sho'listannıń tipiniń ortalıǵını

o'zine tán jaǵdayına iykemleniw protsessindegi belgili hám qásiyeti retinde o'zleriniń hár qaysısınıń ayırmashılıǵı ko'rinedi.

Tirishilik formaları jer ústi dúzilisiniń uqsas belgilerine iye bolıwı menen o'simlikler qatlamında hár qıylı sandaǵı o'z-ara qatnasına iye boladı. Egerde kúshli sho'listanda putalar basım bolsa, al gipsli sho'listanda sho'pler basım boladı.

Sho'listan hám yarım sho'listan o'simlikleriniń tirishilik formaların klassifikatsiyalaw máselesine [L.E.Rodinniń 1948, 1963], [E.P.Korovinniń 1954], [I.I.Granitovtıń 1964]; [L.Ya.Kurochkinanıń 1966]h.b. jumıslarında kewil bo'lingen. Galofil (soralar) tipinde to'mendegi tirishilik formaları bo'lip ko'rsetilgen. Sho'listan aǵashları sho'listan putaları: a) kserofilli; b) galofilli; sho'listannıń yarım putashaları: a) kserofilli; b) galofilli; ko'p jıllıq sho'pler a) jip tárizli tamırlar, b) tamır túyneksheleler, v) barmaq tárizli tamırlar; g) kornevisheliler, bir jıllıq sho'pler: a) uzaq waqıt jasawshılar; b) salıstırmalı qısqa waqıt jasawshılar; (gúzde-qısta-báhárde) [Melnikova, 1973].

Shorlı sho'listannıń aǵashlı ekobiomorfaǵa qaraseksewil hám qırseksewil jatadı. Galofil o'simlikleriniń birlespelerinde seksewildiń usı túrleri bir retten yamasa úlken bolmaǵan topar túrinde gipsin sur qońır topıraqlarda ushırasadı.

Putashalar kserofillerge hám galofillerge bo'linedi. Kserofilli putashalar tegis topıraqqa iye boladı. Gipsli sho'listanǵa ko'binese úsh tán boladı: aq bilek, partek hám Spinoza atranaxpen. Sońǵı eki túr fakultativlik gipsofilge kirip, olar Ústirtte gipsli sho'listan topıraǵında o'sedi. Gipsli sho'listannıń putashalarınıń ekinshi toparın japıraqlı sukkulentli galofitler-gipsofitler quraydı. Olardıń birinshisi qumlı, sazlı hám shańda shıyrshıq taslı topıraqlarda taralǵan.

Shorlı sho'listannıń yarım putashaları ko'p sanda hám yuioekologiyalıq ayırmashılıǵı boyınshada hár túrli.

Ko'binese kserofilli hám galofilli yarım putashalar bir birinen keskin ajıraladı. Kserofilli yarım putashalar arasında qáde boyınsha birinshi orın sho'listan o'simlik qatlamında úlken rol atqaratuǵın Seriphydium yarım tuwısınan juwsanlarǵa tiyisli.

Olar formatsiyalardıńhám ko'plegen assotsiyalardıń edifikatorları bolıp esaplanadı. Sho'listanda ko'birek úsh túr keń taralǵan: aq juwsan, turan juwsanı, tarbaq shaqalı juwsan. Bul toparǵa jánede kúshli gipslengen topıraqta jasaytuǵın tereskendi de kirgiziwge boladı.

Galofilli yarım putashalardı eki toparǵa bo'liwge boladı: 1) aǵash tárizli yarım putashalar; biyurgun, tasbiyurgun, getır, xiywa sorası; 2) japıraklı sukkulentler (joqarǵı bo'limi kaudegis túrindegi); biyurgun, braxlata iytsiygegi, Túrkiстан iytsiygegi. Usı barlıq yarım putalar galofitler, gipsofitler bolıp esaplanadı [21.213].

Ko'p jıllıq sho'pler. Bul toparǵa kiretuǵın o'simliklerdiń ko'pshiligi ko'ǵbinese vegetatsiyasınıń tolıq tsikli jazdıń baslanıwına deyin tamamlanatuǵın efemerondlar. Qıslawǵa iykemlesiwshi forması hám xor jıynawshı organlarınıń ayırmashılıǵı boyınsha o'simliklerdiń bul toparın to'mendegi kishi toparlarǵa bo'liw múmkin: jip tárizli tamırlılar, tamır túynekliler, barmaq tárizli tamırlılar, pyazshalılar. Bul túrlerdiń barlıǵı Ústirttińhám Qızılqumınıń surqaqır shorlı- gipsli topıraqlarında o'sedi.

Bir jıllıq sho'p o'simlikler rawajlanıw tsikli hám ekologiyalıq qásiyetleri boyınsha ayırıladı. Bir toparları shorlı topıraqta hám taqırda o'siwshi báhárgi-jazǵı-gúzgi soralardıń túrleri (*Halimocnemis longifolia*, *H.Karelini*, *H.ilielosa*, *Climacoptera lanata*, *C.turcomanica*, *Cramanthus gamocarpus*) [21.213, 25. 215-217, 24. 215-217, 26. 343-344].

3.6. Qaraqalpaqstanda o'siwshi shorlı sho'listan soralarınıń formatsiya hám assotsiatsiyalarınıń klassifikatsiyası.

Qaraqalpaqstanniń shorlı topıraqlarında golofitlerdiń (soralarınıń 100 den ko'p túri yamasa Qaraqalpaqstanniń florasınıń 8% ke jaqını esapqa alınǵan. Galofitler hár qıylı tuqımlaslardıń arasında ushırasadı. Galofitlerdiń eń ko'p túrin hám tuwısın *Chenopodiaceae* (51 túr), *Poaceae* (12 túr), *Tamariceae* (9 túr) tuqımlasları iyeleydi. Al *Chenopodiaceae* tuqımlaslarınıń wáqilleri sanı boyınsha eń baslı orındı iyeleydi.

Qaraqalpaqstanniń shorlı sho'listan o'simliklerin klassifikatsiyalawda K.Z. hám P.K.Zakirovlerdiń (1972) tipologiyası hám nomenklaturası tiykar etip alındı. Sonıń tiykarında Ámiwdáryanıń to'mengi quyar ayaǵınıń o'simliklerin A.Baxiev (1985) klassifikatsiyalaǵan. Ol toksonlardıń birinshi qatarına klimatitlerdi soǵan sáykes gidroterminalıq jaǵdaydı bo'lip qorsetken.

Bunda klimatip-bul jıllılıq hám ıǵallıqtıń birikkeninen payda bolǵan o'simlikler tipleri. Barlıǵı bolıp úsh klimatipke- termomezofit, termokserofit hám termogigrofitlerge bo'linedi.

Qaraqalpaqstanniń shorlı sho'listan o'simliklerin klassifikatsiyalawda edafotiplerge de bo'linedi, yaǵnıy edafikalıq jaǵdayǵa sáykes. Edafotip dep o'zine tán bolǵan belgili topıraq-jer astı suwı jaǵdayında qalıplesken o'simlik birlespeleri ayıladı. Ámiwdáryanıń to'meniniń o'simliklerin úsh edafotipke bo'liwge boladı: Suwǵarılatuǵın jerlerdiń (toǵay) o'simlikleri, shorlı sho'listan o'simlikleri, batpaqlıq o'simlikleri. Olardıń hár biri edafikatorlardıń tirishilik formalarına qarap tsenotiplerge, soǵan sáykeslenip formatsiya klassifikatsiyasına bo'linedi. Eń aqırında to'mendegi tsenotiplerge bo'linedi: aǵashlı toǵay, putalı toǵay, shorlı jerlerdiń puta o'simlikleri hám batpaqlıqtıń sho'p o'simlikleri. Formatsiya-birlesikte basım bolǵan edifikatorlarǵa qarap bo'linedi. Usı joqarıda ko'rsetilgen tipologiyaǵa baylanıslı ámiwdáryanıń to'meniniń o'simliklerin to'mendegishe klassifikatsiyalawǵa boladı: shorlı sho'listannıń aǵash evkserofitlik o'simlikleri (Halodenolra), puta evkserofitlik o'simlikleri (Halothamna) yarım puta evkserofit o'simlikleri (Halohenithamniscas), sho'p evkserofit o'simlikleri (Halopoia) (1-keste).

Qaraqalpaqstanniń galofil o'simlikleri aǵıssız oypatlıqlarda jámlengen. Ásirese Ústirttiń keń depressiyasında hám az muǵdarda qızılqumda, Áyyemgi allyuviallı deltaı Jańadárya tegisliginde jámlengen.

Sunday-aq shorlanıwǵa hám duzlanıwǵa ushıraǵan Ámiwdáryanıń quyar jerinde, Araldıń suwdan bosaǵan ultanında keńnen taralǵan.

Galofitlerdiń (Soralardıń) formatsiyaların sıpatlawda biz 4-kestede ko'rsetilgen klassifikatsiyadan bir qansha shegine otırıp, galofil o'simliklerinińformatsiyalarınıń shorlanıw sharayatları menen baylanısınıń dárejesine hám sıpatına dıqqat awdara otırıp, duzǵa bir qansha shıdamlı edifikatorlardı sıpatlawǵa o'temiz.

Galofitler arasında bir qansha duzǵa shıdamlı formatsiyalardıń biri sarsazan formatsiyası bolıp esaplanadı.

Sarsazan formatsiyası

Sarsazan formatsiyası aǵıssız oypatlıqlardıń ultanınıńústińgi betinde aytarlıqtay úlken alaplardı payda etedi.

Olar oypatlıq orayın qorshap turıwshı o'simliklerden ayrılǵan, duz qatlamı menen qaplanǵan poyas dúzedi. Solay etip sarsazan ele sho'p shıqpaǵan ko'pshilik shorlardıń birinshi o'simligi. Oypatlıqtıń orayınan, onıń oraydan qashıq jerlerine shekemgi aralıqta sarsazan quramı ádettegishe nızamlı túrde o'zgeredi. Oypatlıqtıń ultanınan shegarasına jaqınlaǵan sayın sarsazan formatsiyasında basqa o'simlikler payda boladı, olar tiykarınan gipsofitler. Demek, sarsazan formatsiyasın eki toparǵa bo'liwge boladı: tek sarsazanlıklar hám gipsofitler menen aralas sarsazanlıqlar.

Tek sarsazanlıqlardı bir qansha mayda taksonomiyalıq birliklerge bo'liw geobotanikalıq belgiler boyınsha oǵada qıyın. Biraq bul bir qatar landshaftlıq-sırtqı ko'rinsine qarap sıpatlama beriwge boladı.

Kebirli o'simlikler toparın bayanlawda paydalanılatuǵın terminlerdi qollaniwhám modifikatsiyalaw (túrin o'zgerte) otırıp, basqa izertlewshiler tárepinen, tek sarsazanlıqlarǵa, ıǵallı shordaǵı sarsazanlıqlarǵa ajiratadi.

**Qaraqalpaqstanda o'siwshi soralardıń golofitleriniń formatsiya hám
assotsiatsiyanıwınıń klassifikatsiyası**

Klimatı	Edafotip	Tsenotip	Formatsiya	Assotsiatsiya
1	2	3	4	5
Termome zofitler	Shorlısho' listan o'simlik leri	Shorlısho'listan nıń Evkserofitliǵa sho'simlikleri	Qara Seksewil	Qaraseksewillik, iytsiygekli- qaraseksewillik
		Shorlısho'listan nıńevkserofillip utao'simligi	Ermanijıńıl	Ajırılıq-ermanijıńıllıq, Aqbaslı- ermanijıńıllıq, Ermanijıńıllıq, Birjılıqsoralı- ermanijıńıllıq, qarabaraqhermanijıńıllı q
			Qarabaraq	Qamıslı-qarabaraqılıq, Aqbaslı-qarabaraqılıq, Ermanijıńıllı- qarabaraqılıq, qarabaraqılıq
		Shorlısho'listan nıńkserofitliput alıgalofitleri	Selitryanka	Selitryankalıq, potashnikli-ıq selitryankalıq
			Potashnik	Qarasseksewilli— potashniklik, Biyugunli-potashniklik
			Sarsazan	Sarsazanlıq, svedoli- sarsazanlıq, jantaqlı- sarsazanlıq, juwsanlı- sarsazanlıq
		Shorlısho'listan nıńevkserofitlis ho'po'simlikler i	Aqsora	QamıslıaqSORalıq
			Bassiya	Bassiyalıq
			Alaputa	Qamıslı-alaputalıq, alaputalıq
			Ebelekgerge nsoniya	Balıqko'zli- ebelenlikgirsensoniyalıq
			Qarasazan	Qaraqızlıq
			Buzawbas	Ebelekli-hárqıylısho'pli- buzawbaslıq, keyretsikliizenlibuzawbas

				liq
			Buyrasora	Buyrasoralıq
			Torǵayotı	Torǵayotlılıq
			Qarasora	Qarasoralıq, soleroslı-qarasoralıq, aqsoralı-qarasoralıq
			Qañbaq	Qañbaqlıq, hárqıylısho'pli-qañbaqlıq, qoshpalıqañbaqlıq, jıńǵıllıqañbaqlıq
			Balıqko'z	Balıqko'zlik, hárqıylısoralı-balıqko'zli, qaraseksewillıbalıqko'zlik
			Soleros	Soleroslıq (qızılisoralıq

Kebirli mayda shoqalaqta o'setuǵın sarsazanlıqlarǵa bo'lingen [28.89, 14.808].

Iǵallı shordaǵı sarsazanlıqlar tegis jerlerde, ıǵallı kebirlikler diń artıqsha ıǵallanǵan jerinde rawajlanǵan. Sarsazan siyrek túrde o'sedi hám shaqaları kebirliktiń ústinde jatatuǵın iri tar baqshaqalı nusqalardı payda etedi. Onıń reńi toyǵın- ko'k, aǵashqa aylanbaǵan barlıq bo'limleri oǵada shireli, ıǵallı shordaǵı sarsazanlıqlar tikkeley oypatlıq orayınıń duzlı qatlamınıń shetinde jaylasadı hám azlap oypatlıq orayında ushırasadı.

Orpań kebirli jayda shoqalaqta o'sken sarsazanlıqlar oypatlıqtıń orayınan bir qansha alıslawda ıǵallı shordaǵı sarsazanlıqlar dan keyin jaylasqan. Bul jerlerdiń beti az ıǵallı, orpań kebir duz bo'lekleriniń aralaspalarınan dúzilgen, mayda topıraqlı hám qumlı, duzlı jalǵan qum dep atalıwı múmkin. Jalǵan qumlar ayrıqsha shoqalaqta sarsazan landshaftın dúziw shi sarsazan túpleriniń átirapında onsha úlken bolmaǵan fitogenli mayda shoqalaqlar túrinde jámlengen. Shoqalaq arasındǵı topıraq tıǵızlanǵan hám az ıǵallı, shoqalaq lı ústi bolsa, qurǵaq hawa rayında orpań hám jalǵan qumlar derlik jıljımalı espe qumǵa aylanadı. Sarsazan jalǵan qumlardıń ko'miliwleri nátiyjesinde zıyanlanǵan: onıń nusqaları mayda, shaqaları onsha jayılmagan, reńi solǵın, geybir o'simlikler quwraǵan.

Igallı shordağı sarsazannan orpań kebirli mayda shoqalaqtağı sarsazanlarǵa o tiwi, kebirliktiń qurǵawı, duzdıń kristallanıwı hám topıraqtıń unırawına baylanıslı áste-aqırınlıq penen júredi.

Aralas sarsazanlıqlar, sarsazan qalınlıǵına gipsofitler: japıraqlı potashnik (sarqańbak), kaspiypotashnigi, yarım putalı kermek hám ermanı jıńǵıl, putalır eomyuris, tetrlardıń kiriwi nátiyjesinde payda boladı. Aralas sarsazanlıqlardıń quramına ajırıq, túkli iyt taban (saygaksho'p), qádingiiyttaban, qotırsora (jalpańqulaq) sursora, suran, qarabaraq, aqtiken, qaramıq, ushırasadı. Keyingi o'simliklerdiń úsh túri túslikte de usharasadı. Barlıq túrlerdiń muǵdarı az.

Aralas sarsazanlıqlardıń ayrıqsha variantı –ermanı jıńǵıllı shoqalaqtağı sarsazan bolıp tabıladı. Olar jumsaq kebirli shoqalaqtağı sarsazanlıqlar menen jiyyi qatnasta boladı hám olar menen genetikalıq emes baylanısta bolıwı múmkin. O'siw protsessinde sarsazan shoqalaqları ústingi bo'limleri menen túsedi hám bir- biri menen baylanıslı toparlardı payda etedi. Jalǵan qumlardıń bunday toparı átirapında jámleniwi kúsheyyedi hám úlken o'lsheimde gi shoqalaq payda boladı. Olarda tek ǵana sońǵı golofitler (Sarsazan) o'sip qoymastan sonıń menen birge duzǵa shıdamlı o'simliktiń hár qıylı túrleri (ermanıjıńǵıl, aqtiken, qaramıq, qaraseksewil) ushırasadı. Bul o'simliklerdiń do'gereginde shoqalaqlar payda boladı. Olar ko'binese, jerastı suwlarınıń tereń emes ornalasqan jerlerinde rawajlanadı. Shoqalaqtağı sarsazanlıqlar do'ńlikler arasında shoqalaqtıń payda bolıwında qatnaspaytuǵın, biraq jer astı suwlarınıń jaqınlıǵın ko'rsetiw shifreatofitler jiyyi gezlesedi. Mısalı Barsa kelmes aynalasındaǵı sarsazanlıqlar da shoqalaqlar arasında bir qansha zıyanlanǵan jantaqtıń, qamıstıń jaqsı rawajlanǵan ko'psanlı nusqaları hám qalınlıqları júzege kelgen. Taza sarsazanlıqlar dıń topıraqları ushıp sulfatlarǵa qaraǵanda xloridler basım bolıwı tán, lekin bunda ıǵallı shordağı sarsazanlıqlardıń baǵdarı anıqlanıldı. Taza tek sarsazan qalınlıqlawınıń

topıraqlarındağı duz muğdarınıń jámi 1,5 % ten 15% ke shekem gıaralıq ta boladı, alaralas sarsazanlıq topıraqlarında 5-6% ten artpaydı.

Potashnik formatsiyası

Bul formatsiyanıń wákılleri iri alaplardı payda etpeydi. Bul formatsiyada potashniklerdiń úsh túri ushırasadı: jalńashlı potashnik, Kaspiy potashnigi, shrenka potashnigi. Birinshi eki túri aralas qalıńlardı payda etedi. Keyingi sitaza formada. Biraq siyreklew túrinde siyrek ushırasadı [Allaniyazov, Viktorov, Pelt, 1984]. Olardıń ishinen eki topardı anıqlaw múmkin: bir yamasa bir neshe potashnik túrleriniń xalıq hám Biyurgunli potashnik birlespeleriniń toparın. Olardan birinshisi, qara hám ko'kshil gipsin sazlardıń shıǵatuǵın ornınıń arqa hám batıs tárieplerinde ushırasadı. Olardıń bir qansha úlken maydanlar Qarın jarıq oypatlıǵında esapqa alıńǵan [Viktorov, 1971]. Usıǵan uqsas subektorlarda 3 túr degi potashniklerdiń barlıǵı birge hám ayırım-langan túrde o'sedi. Bul qalıńlıqlar sazlarda o'simliklerdiń ornalasıwınıń birinshi basqısı bolıp esaplanadı. O'simliklerdiń bul o'siw ornında basqa túrlerdiń: galitoknemis, Karelinanıń túyetabanı, iri japıraqlı túyetabanlar ushırasadı.

Biyurgunli- potashnikler birlespeleri oypatlıqtıń ústingi betinde tarqalǵan. Olar bir túrden ekinshi túrge o'tiwdi payda ete otırıp, oypatlıqtıń ultanın iyelewshi birlespeler arasında jaylasadı. Bul jerlerde potashniklerden: japıraqlı potashnik, Kaspiy potashnigin ushıratıwǵa boladı. Tegislikten oypatlıqtıń ultanına shekem, onıń jan bawırında biyurginliklerdiń, biyurgunli-potashniklerdiń birlespesi menen almasıw protsesslik, bunnan bılay potashnikli- sarsazanlıqlar hám aqırayaǵında tek sarsazanlıqlardıń jaylasqan qatarın baqlawǵa boladı.

Biyurginli potashnik toparlarda, dominantlardan basqa qarabaraq, aqtiken, chogon, yarım putalı kermek, qaramıq. Mayda japıraqlı qara sora jiy ushırasadı. Albiyurginli-potashniklik toparlarda ko'kpek, suran, kampo-rosema, qotır sora ushırasadı. Ásirese balıq ko'z, petrosimoni shámsvedanıń túrleri bar.

Bul farmatsiyanıń túrleri mol bolıp, natriyxloridi hám kaltsiy sulfatınıń hár qıylı úylesimindegi lekin kaltsiy sulfatınıń basımıraq bolıwındağı, kúshli

duzlanıwdan keskin kúshli duzlanıwǵa o'tiw jaǵdayların sıpatlaydı. Tiykargı substrakt-samal tásirinde ushıraǵan jumsaq qırtısı menen yamasa teńizdińıǵallı jabısqa kılaylı qatlamları menen qaplangan gispili sazlar bolıp tabıladı.

Qara baraq formatsiyası

Bul formatsiya Ámiwdáryanıń to'meninde, qızılqumnıń shetlerinde hám jańa dárya tegisliginde sheklengen túrde tarqalǵan, biraq teńiz boyındaǵı suwdan baslaǵan orınlarda jeke siyrek túrde keńnen tarqalmaqta. Sıpatlanıp atırǵan formatsiya ekologiyalıq jaqtan, sarsazan hám potashnik formatsiyasına uqsas. Bunda eki birlespeni atap o'tiwge boladı: 1) putalı toǵay qarabaraqlıqları hám 2) galofit sho'pli mayda kebirli qarabaraqlıqlar. Birinshi birlespe toparı ekinshi dárejeli sodolinant retinde ermanlıjıńıǵıllı, qara seksewil, qamıs, sheńgel toparlarına, toǵaylıq hár túrli sho'plerge (sora, aqbas, túye taban h.t.b.) iye. Buǵan ańǵarlardıń qaptalına hám onıń quwraǵanultanına, toǵayalaplarınıń qaldıqlarınatán. Ekinshi toparaǵıssız kebirli oypatlıqlardıń do'gereginde júzege kelgen hám dúzilisi boyınsha mozaykalı bolıp saleros, qarasora, balıq ko'z, ajırıq qusaǵan sho'p golofitlerdiń qatlamınan ibarat.

Bunnan tısqarı, bul topar duzlı bulaqlardıń do'gereginde esapqaalınǵan. Bayan etilip atırǵan toparlardı bir qansha mayda taksonlarǵa bo'liw házirgi waqıtta múmkin emes, o'ytkeni toǵaylardaǵı ko'p sanlı o'rtlerdiń saldarınan, birlespelerdiń pútinligi (ásirese toǵay qarabaraqlarınıń) keskin qanaatlandırarsızlıq jaǵdayda. Usı sebepke baylanıslı, ermanlıjıńıl hám aqsarformatsiyasın sxematikalıq túrde sıpatlaw menen shekleniwge tuwra keledi. Bul eki túr burın kebirlik toǵaylardıń dominantı bola otırıp [Viktorov, 1973]. Házirgi waqıtta burınottan zıyanlangan toǵaylarda hám janǵannan keyin o'simliklerdi qayta tiklew baslangan orınlarda saqlanǵan, yaki sho'pli golofitlerdiń toparı, yaki qamıslıq, yaki oǵada siyrek sarsaqan, potashnik, qarabaraq toparları menen orın almasadı [3.192, 6.192, 8.47. 26.343-344].

Qara seksewil formatsiyası

Bul formatsiya Qızıl qum shetlerinde Ámiwdáryanıń to'meninde, jańa dárya tegisliklerinde jiyi-jiyitarqalǵan. Kara seksewil Ústirt keńliginde eki formada ko'rsetilgen: iri aǵash tárizli hám pás boyly qara seksewil.

Qara seksewillerdi otın retinde joq etiw hám birlespeleriniń siyreklesiwi onıń toparların ayqınanıqlawǵa múmkinshilik bermeydi. Sonlıqtanda biz bir qansha saqlanıp qalǵan birlespelerdi ǵana bo'lip ko'rsetemiz. Mısalı toǵay seksewillikleri ayırıp ko'rsetilgen. Bunday qara seksewilliklerdiń onsha úlken bolmaǵan maydanlarǵa ayırılmalapları Ámiwdáryanıń házirgi waqıttaǵı deltasında, Aybúyir oypatlıǵında, Qabaqlıata, Qazaqdárya, sonday-aq Qarawımbet hám Sudache ko'lleriniń aynalasında, Ámiwdáryanıń deltasınıń áyyemgi allyuvial tegisliklerinde esapqaalıńǵan.

Házirgi waqıtta, izertlenip atırǵan aymaq tuńshinde qara seksewil oǵada az, o'ytkeni o'sip kiyatırǵan jasaǵashınıń barlıǵı otın retinde qollanıлмақта. Bunnan tısqarı, keyingi jılları, qara seksewil qalıńlıqlarına iye eski suwǵarılatuǵın jerlerdi súrip jiberetuǵın boldı. Sazlı do'ńliklerde U.Turemuratov (1978) tárepinen bayan etilgen toǵay sho'pli qara seksewillik hám shoxlı qara seksewillik toparları tarqalǵan. Bul toparlar túrlik quramınıń jarılıǵı menen ajralıp turadı.

Sho'pli – ermanlı jıńǵıllı qara seksewil birlespesi mayda do'ńgelekli reliefke iye tegislengen qumlardıń maydanları ushın, quwraǵan arnalardıń ultanı hám ko'l oypatların atán. Birinshi yarusı- siyrek ermanlı jıńǵıllı hám sheńgelli qara seksewillikten quralǵan, alekinshi yarus- qaltalı ebelek, ko'p soradan ibarat. Toǵay o'simlikleriniń túrлерinen qamıs, boyan, aqbas, túyetaban qatnasadı, biraq olara yırım bo'leklengen topar túrinde tarqalǵan. Bir qansha tereń oypatlıqlardıń ultanında qarabara qushırasadı. Odan basqa súılmek ko'p ushırasadı.

Moxlı-qara seksewil birlespe sifloralıq quramınıń jarılıǵı menen sıpatlanadı

(tiken túrli qoyan jún, shogırlangán galogeton. Olar qumlı to'beliklerdiń qaytar arasındaǵı jaypawıt janbawırlarınıń to'mengi ortasha bo'limlerine hám qarıqlar asarısndaǵı oypatlıqlarına tuwra keledi. Toparıqtıń mox penen jabılıwı 15-26% ti quraydı.

Ámiwdáryanıń to'meninde qara seksewildiń eki toparı tarqalǵan: qara seksewilliktiń o'zi hám iytsiygekli qara seksewil toparları. Bular dáryanıń tásiiri astınan qashan aq shıqqan maydanı sheklengen áyyemgi allyuvin altaqırlı jerlerde taralǵan.

Qara seksewil toparı Qazaqdárya aymaǵınıń áyyemgi allyuvial tegisliklerinde Qabaqlı atamazarınıń do'gereginde, sonday-aq Dárwaza qumınıń eteginde esap qaalıǵan. Onıń qaldıqları Ústirttede, deltada da hám Q ızılqumda da jiyitaralǵan. Burın bul jerlerde Qara seksewildiń qalıń qaldıqlıqları bolǵan, biraq házirgi waqıtta seksewillerdi shawıp alıw nátiyjesinde, olar oǵada jábirlengen jaǵdayında qalmaqta. Atmosferalıq ıǵallıq jámlengen jerde 2-3 jıllıq seksewil nállerin ushıratıwǵa boladı.

Bul topar ekiyarustan turadı. Joqargı yarusta 100-160 sm biyiklik tegiqarabaraq, ermanlı jıńǵıl, aqsar o'sedi; to'mengi 10-30 sm biyiklik tegiyarusta soralar payda etedi. Sho'pli qatlamnıń, topıraqtı jabıwshılıǵı 60% ke shekem jetedi.

Dominant bolǵan qara seksewilden tısqarı (Sp' molshılıǵında) aqsar, keńirek, túkli balıq ko'z oǵada jiyiqatnasadı. Sonday-aq, ko'p japıraqlı sora bárqulla qatnasadı. Bul topardıń ayrıqsha sıpatlamalarınıń biri ermanı jıńǵıldıń hám qarabaraqtıń qatnasıwı bolıp esaplanadı. Bul, usı jerlerde qara seksewildikler payda bolmastan burın, golofit (soralardıń) o'simliklerdiń o'skeninen dárek beredi.

3.7.Qaraqalpaqstanda ósiwshi bir jıllıq soralar tuqımlasınıń formatsiya hám assotsiatsiyalarına sıpatlama (Halopoa).

Bir jıllıq soralar formatsiyaların ayırıqsha seriyasın payda etedi. Olardıń payda etken birlespeleri Orta Aziyanıń tegislikleriniń barlıq bo'limlerinde keńnen taralǵan. Olar sho'listannıń barlıq tiplerinde ushırasıp shorlarda, shorlıta qırlarda rawajlanadı.

Sıpatlanatuǵın birlespeler to'mendegi formatsiyalardan ko'rinedi: balıq ko'z formatsiyası (Edifikatorı balıq ko'z tuwısınıń túrleri, donashur formatsiyası, buzawbas formatsiyası (buzawbas tuwısınıń túrleri), qoyanjún formatsiyası, qara soraformatsiyası, solerosformatsiyası.h.b.

Joqarı atap o'tilgen formatsiyaların edifikatorları- keń taralǵan bir jıllıq sho'p galofitler (soralar) bolıp ko'pshilik bo'limi tarekologiyalıq amplitudaǵa iye. Bir Qatar bir jıllıq golofitler keńge ografiyalıq aymaq tataralǵan. Mısalı ádettegi ıǵallı shor jerdiń wákili soleros (qızılsora) dúnya júziniń bárin de tarqalǵan.

Biziń sho'listanımızda taralqan túrlerden Suedasalesa, S.prostra ǵah.b. teńiz jaǵalarında hám continent ishinde taralǵan. Teńizdiń qurǵaq bo'liminde, sonıń menen kontinentallı bo'liminde, atap aytqanda biziń shorlı sho'listanımızda o'setuǵın balıq ko'z tuwısınıń wákileri: Climacopteracrassa, C.lanata, C.aralensis, C.Korshinskyt, C.tur comanica o'setuǵın áyyemgi jer orta teńiziniń barlıq oblastlarında taralǵan.

Bir jıllıq soraların assotsiatsiyaların dúzilisi ádette ápiwayı bolıp- bir, eki, siyrek túrde úsh yaruslı assotsiatsiyalar bolıp esaplanadı. Bir jıllıq soraların formatsiyaların o'simlikleri o'ziniń jaylawlıq áhmiyeti, túrge baylıǵı, sho'p qatlamınıń qalınlıǵı boyınsha júdá birgelkili. Mısalı solerostıń birlespesiniń túr quramı j údá jarlı, balıqko'zdi ki ádewir bay. Balıq ko'zdiń fitotsenazı hám qoyanjún formatsiyası qalıńs ho'p qatlama menen, donashur birlespesi hám buzawbas qalınlıqları ko'binese siyrekklengen túrde ushırasadı.

Aqsoraformatsiyası (Chemopodiumalbum)-Ámiwdáryanıń to'meniniń barlıq territoriyasınıń taslandı orınlarında, jol boylarında, á sirese taslap ketken qurılıs orınlarında hám taspar taw jerlerde o'sip jetilisedi.

Formalıq quramında 9 o'simliktiń túri ushırasadı. Topıraqtıń proektivlik tabılıwı 60%-95% ke deyin jetedi. O'ndirislik o'nimdarlıǵı gektarına 1,1 ts-3,5 ts Ge jetedi. Bul formatsiyanıń subedifikatorı qamıs hám basqa o'simlikler.

Formatsiyada úsh assotsiatsiya ko'birek esapqa alıńan. Olardan qamıslı-aq soralıq shorlı qumlı topıraq tarqalǵan. Sho'p qatlamınıń tiykargı bo'limin aq sora hám qamıs iyeleydi. Jeke túrde seliptryanka, ermanı jıńǵıl ushırasadı. Proektivlik tabılıwı 30-90%. O'ndirislik o'nimi gektarına 1,1 tsdenaspaydı. Sho'pqatlamıqoy, eshkilerge jaylaw retinde jaramlı.

Bassiya (ilmeksora) formatsiyası (Bassiahyssopifolia)-pıtırańqı yamasa toparlasıp ushırasıp, onıń birlespeleri qıs qawaqıtlı, shorlı hám kebir li topıraqqa tuwra keledi.

Formatsiyanıń figuralıq quramı 27 túrdi quraydı, onıń 13-4 bir jıllıq o'simlik. Proektivlik tabılıwı 20% ten 100% ke deyin jetedi. O'ndirislik o'nimdarlıǵı gektarına 10,7 ts den 38,6 ts di quraydı. Formatsiyanıń subedifikatorına qamıs, qustarısı, ajırıq, qaluen h.b. kiredi.

Ámiwdáryanıń deltası ushın ko'birek taza bassiya assotsiatsiyası tán. Ol teńizdiń suwdan bosalǵan ornın da hám Ámiwdáryanıń áyyemgi deltasında ushırasadı.

Assotsiatsiyanıń túrlik quramında 15 túr o'simlik ushırasıp, olardan ko'birek taralǵanı: kermek, ajırıq, qaluen, qustarısıh.b. Proektivlik tabılıwı 20% ten 30% kejetedi. O'nimdarlıǵı gektarına 10,7 ts-32 ts qurǵaq massadan turadı.

Alaputa formatsiyası- (Atriplex tatarica)-Ámiwdáryanıń to'menindegi shorlarda, shorlı jıljımalı qumlarda, Araldıń suwdan bosalǵan jerinde tez-tezden ushırasadı. Bul formatsiyanıń astındaǵı topıraq az shorlangan bos jıljımalı, iri dánesheli qumlıq. Formatsiyanıń túrlik quramı putalardan, putashalardan, ko'p

jıllıq hám bir jıllıq sho'plerden ibarat. Topıraqtıń proektivlik tabılıwı 40-100%. Onıń o'nimdarlıǵı joqarı bolıp, gektarına 8,8 ts -36 ts gejetedi.

Túslik Aral átirapına ko'birek qamıslı alaputalı hám taza putalı assotsiatsiyatán. Alaputalıq birlespesinde ko'binese qamıs, alaputanıń o'zi, siyrek jerde qańbaq, qaltalıábelek, Sofiyadi kuraptsiyası ushırasadı. Topıraqtıń proektivlik tabılıwı 40-50% titutadı. Assotsiatsiyanıń o'nimdarlıǵı gektarına 8,4 ts. Bul birlespeler iri shaqlı qaramallar ushın, túyelerge jaylawǵa qolaylı.

Alaputanıń taza assotsiatsiyasınıń yarusı onsha bilinbeydi, proektivlik tabılıwı 10-15 %, túrlik quramı jarlı. Tiykargı dominant d aq túrinde ushırasadı, ko'pshilik orınlarda birtegis taralǵan. Komponentlerine: qarasora, qaraseksewil, túyuqarın, qańbaq.b. [Baxiev, 1995].

Qaltahebelekformatsiyası. (Ceratocarpusutriculosus)- ko'birek sho'listanda ushırasadı. Onıń kelip shıǵıwı hám rawajlanıwı adamlardıń xojalıq háreketlerine baylanıslı. Ádewir maydandı onıń o'ziniń qalınlıǵı iyeleydi. Qalǵan bo'limleri elatlı punktlerde, jaylawlı orınlarda ushırasadı.

Formatsiyanı dúziwge 16 subedifikator qatnasadı. Túrlik quramına: aǵashputa, putashalar, ko'p jıllıq hám bir jıllıq sho'pler (32 túr) kiredi. Topıraqtıń proektivlik tabılıwı 25% -90% kejetedi. O'nimdarlıǵı gektarına 0,7 ts 3,5 ts qurǵaq massanı quraydı.

Ámiwdáryanıń to'menine tán bolıp ko'birek gezlesetuǵın balıq ko'zli-ábelekli assotsiatsiya esaplanadı. Onıń sho'plik quramı 19 túrden quralǵan. Olar danábelek gezlesedi. Topıraqtıń tabıwshılıǵı 60-65%. Bul formatsiyanıń birlespelerin mayda shaqlı qoy eshkilerge hám túyelerge báhargi-gúzgi jaylaw retinde paydalanıwǵa boladı. Qurǵaq massasınıń o'nimdarlıǵı gektarına 1,4 ts Ge teń, al qum ebeleginiń o'nimi gektarına 3-3,5 ts diquraydı. (qurǵaq massası).

Girgenonus formatsiyası (Gigensoniaoffositifolia)- túslik Aral átirapında shor jerlerde, kebirli, shıyır shıqtaslı, sazlı hám shegeleń topıraqlarda ushırasadı.

Ol kishkene formatsiyanı quraydı. Onıń birlespeleri kishigirim maydanlardı iyeleydi.

Formatsiyanıń floralıq quramı 16 túrden ibarat bolıp, olardıń ishinde 5 túrli bir jıllıq sho'pler bar. Topıraqtı proektivlik qaplawı 20-80%. O'nimi gektarına 3,9 ts qurǵaq massanı quraydı. Bul formatsiyanıń subedikatorı bolıp osok, papitnik hám qaltalı ábelekler esaplanadı [3.192, 6.192, 8.47. 26.343-344].

Girginsoniyanıń taza o'ziniń assotsiatsiyası sur- qonır shegeleń topıraqtı keń taralǵan. Onıń topıraqtı jabıwshılıǵı 5060%. O'nidrislik o'nimi, gektarına 3,9 ts ge teń (qurǵaqtúrinde). Onıń sho'p qatlamı túyeler hám qoylar ushın báhárgi-gúzgi jaylaw bolıp esaplanadı.

Qara qız formatsiyası (Horaninovialicina) –to'beshekli qumlarda, olardıń túserliginde, to'beshek aldı tegisliklerde bekingen qumlarda hám shegeleń, taslı tegislerde ushırasadı. Bul formatsiyada tek ǵana qaraqızdıń o'ziniń assotsiatsiyasına tap ko'rsetiwge boladı. Onıń floralıq quramı júdá jarlı: bolıp hám me waqıtta qaraqızdıń o'ziniń qalınlıǵı esaplanadı. Qaraqızdan basqa geyde qaraseksewil ushırasadı. Jánede to topıraqtıń júzgún gezlesedi. Ayırım orınlarda qańbaq, martuk, buzawbash.b. esapqa alınǵan. Topıraqtı jabıwshılıǵı 30-50% ten aspaydı.

Buzawbaslar formatsiyasınıń (Halimocnemisvillosae, H. longifoliah.b.) assotsiatsiyaları sazlı shegeleń orınlardıń tán bolıp esaplanadı.

Formatsiyanıń túrlik quramı 22 túr o'simlikten ibarat. Tiykarınan olar ko'p jıllıq hám bir jıllıq sho'plerden ibarat. Ulıwma topıraqtı jabıwshılıǵı 35% ten 45% aralıǵında boladı.

Bul formatsiyadan eki assotsiatsiyanı ayırıp ko'rsetiwge boladı: ábelekli hár qıylı sho'pli- buzawbaslıq hám keyretsikli- izenli- buzawbaslıq. Olardan ábelekli- hár qıylı áyyemgi allyuviallı deltadaǵı qumlı taqırǵa tuwra keledi. Topıraǵı sazlı- shegeleń. Assotsiatsiyada 16 túr o'simlik ushırasadı. Olardıń ko'pshiligi bir jıllıq

hám ko'p jıllıq sho'pler. Bul assotsiatsiyanın birlespeleri qoylar hám túyeler ushın jazǵı –gúzgi jaylawǵa paydalanıwǵa boladı. O'nimdarlıǵı gektarına 1,2 ts-2,0 ts.

Keyreuik li izenli- buzawbas assotsiatsiyası ko'binese qumlı sho'p o'sip ketken taqırda ushırasadı. Topıraǵı sazlı- shegeleń, joqarısı shaqlı. Assotsiatsiyada 14 túro'simlikesapqaalıńǵan. Sonın ishinde bir jıllıqları 57% tutadı. Assotsiatsiyanın birlespelerin jazǵı-gúzgi qısqı jaylawǵa paydalanıladı.

Buyra sora formatsiyası (Halogetonglomeratus)-shıyırshıq taslı shorlı topıraқта, siyrek túrde shorlarda, qatqanqumshıqlı shegeleń topıraқта ushırasadı.

Foratsiyada tek ǵana bir assotsiatsiyanı-buyra sora assotsiatsiyasına yııp ko'rsetiwge boladı. Bul assotsiatsiyanın floralıq túr quramı júdá jarlı. Ol tek ǵana bir o'simlik, ol da bolsa buyra soranın sho'p qatlamınan turadı. Siyreklew túrde bireń sarań biyurgun, sarsazan, balıqko'zdiń túrleri ushırasadı. Topıraqtı jabıwshılıǵı 10-40% kejetedi.

Torgayotformatsiyası (Petrosimoniasibirica)-shortopıraқта, kebirde ushırasadı. Formatsiyanın floralıq quramı ádewir bay. Olardan bir jıllıq sho'pler 10 túr den ibarat.

Topıraqtı jabıwshılıǵı 25-100%. Onın barlıq assotsiatsiyaları azǵantay maydanlardı iyeleydi, biraq Aral teńizi átirapının sho'l zonasında keń tarqalǵan. Onın tek peptrosimoniya dan dúzilgen assotsiatsiyası salıstırmalı túrde sho'l zonanın qabırshaqlı kebirinde hám shor topıraǵında keń taralǵan. Ko'binese onın sho'p qatlamı qalıń taza bolıp molshılıǵı sor, geyde sho'p qatlamında jeke sheńgel, qaramıq, ajırıq hám balıqko'zdiń túrleri ushırasadı. Proektivlik jabılıwı 25-80%. Bul assotsiatsiyanın birlespelerin gúzgi jaylaw retinde qoy. Eshkilerge hám túyelerge paydalanıwǵa tolıq boladı.

Qarasora formatsiyası (Suaedasalsa)- birlespeleri tiykarınan Aral teńiziniń suwdan bosaǵan jaǵaların ıǵallı jarlarında taralǵan, jeke siyrek Ámiwdárya deltasınıń taqırlarında ushırasadı. Kishkene maydanlardı iyeleydi, biraq jiyyi-jıyyi ushırasadı.

Bul formatsiyanıń úsh assotsitsiyası: Qarasoralıq, soleroslı-qarasoralıq, aqsoralı- qarasoralıq. Bul assotsiatsiyalardıń o'simlik qatlama júdá qalıń, topıraqtı jabıwshılıǵı 80-90%. Biraq túrlik quramı júdá jarlı bolıp, tatar sorası, qamsı hám ermanı jıńǵıl dan turadı. Usı túrlerdiń hámmesi bir yarustı quraydı, boyı 20-30 sm [Baxiev, 1985].

Qańbaq formatsiyası (Salsolapanlsenii)-fitotsenozlarına tán bolǵan tirishilik orınları, sho'listanlı jaylawlar, jıńǵıllıq toǵaylar, Ámiwdáryanıń suwalması, Aral teńizi jaǵaları. Formatsiyanıń túlik quramı 22 o'simliktiń túrinen dúzilgen. Formatsiyada assotsiatsiyanı ayırıp ko'rsetiwge boladı: Qańbaqlıq. Hár qıylı sho'pli-qańbaqlıq, qamıslı-qańbaqlıq, jıńǵıllı-qańbaqlıq.

Olardan qańbaq assotsiatsiyası kewip qalǵan o'zek, kanallardıń boyındaǵı sho'listanlı orınlardaǵı, burıńǵı qamışıqlar taralǵan. Topıraǵı shorlangan. Floralıq quramı jarlı. Topıraqtı jabıwshılıǵı 50-60% .

Hár qıylı sho'pli- qańbaqlıq-jaylawlı shorlarda o'sip, sazlı sho'listanda taralǵan. Onıń fitotsenozlarına tán bolǵan jasaw jaylawlı shor, ko'l jaǵaları hám partawlar. Assotsiatsiyanıń túrlik quramı 17 o'simlik túrlerinen ibarat. Ulıwma proektivlik jabıwshılıǵı 30-35%. Onıń basım ko'pshiligin (82%) bir jıllıq sho'pleri yeleydi.

Qamıslı- qańbaqlıq assotsiatsiyası quwrap qalǵan ko'l jaǵalarındaǵı burıńǵı qamışıqlar ornında payda bolǵan. Topıraǵı shegeleń, shorlı-gipsli. Túrlik quramında 9 túr o'simlik esapqa alınǵan. Topıraǵınıń jabılıwı 65-70%.

Jıńǵıllı-qańbaq assotsiatsiyası qurǵaqshılıqqa aynalǵan jıńǵıl toǵaylarında ko'plep ushırasadı. Floralıq quramı 11 túrdi quraydı, olar tiykarınan golofitler. Topıraqtı jabıwshılıǵı 50-60%. Qańbaqlı jaylaw mal awqatlıq orın bolıp esaplanadı (Turemuratov, 1978).

Balıqko'z formatsiyasınan (Climacopteralanata)-tiykarınan 2 assotsiatsiyanı ko'rsetiwge boladı: hár qıylı soralı- balıqko'zlik, qaraseksewilli-

balıqko'zlik. Formatsiyanıń túrlik quramı 25 túr o'simlikten turıp, olardıń 13 túri bir jıllıq o'simlik. Ádette bul formatsiyanıń birlespelerin de siyrek túrde qaraseksewil, elleniya, keyreuk hám basqada yarım putalar ushırasadı. Ásirese sho'p qatlamında 1 jıllıq o'simlikler aktiv túrde rol atqaradı.

Formatsiyaulıwma topıraqtı jabıwshılıǵı 30-45%.

Hár qıylı soralı- balıqko'z assotsiatsiyası shorlı tegisliklerdiń oypatlarına, olardıń túserliklerine, qatqan qumlı to'beshiklerde ushırasadı. Túrlik quramı 18 túr o'simlik bolıp, sonıń 10 túri bir jıllıq shorlar. Topıraǵısazlı- shegeleń, shorlı. Assotsiatsiyanıń birlespelerin túyeler qoy eshkiler ushın paydalanıwga boladı, mal awqatlıq massası hektarına 1,2-2,2 ts di quraydı.

Qaraseksewilli-balıqko'z assotsiatsiya ulısınıń taralıwı sheklengen. Onıń fitotsenozları bekingen to'beshikli qumlardıń túserligine tuwra keledi. Topıraǵısazlı- shegeleńsazlı. Onıń o'simlik qatlamı júdá siyrek, ásirese qaraseksewillik. Floralıq quramı 13 túr den ibarat, onıń 15-4 bir jıllıq sho'pler.

Topıraǵı sazlı- shegeleń, sheńgel qumshıqlaw. Ulıwma proektivlik jabıwı 30-35% [Turemuratov, 1978].

Balıqko'z formatsiyasınıń (C.araecnsis) birlespeleri úlken ko'lemde jiym-jiyiushırasadı. Jasaw ornı tiykarınan Aral teńiziniń suwdan bosaqan ornı. Jáne de suwǵarılatuǵın jerlerde egislikler aralarında bos orınlarda ko'plep ushırasadı. Topıraǵı kúshli rawajlangan.

Floralıq quramı júdá jarlı, barlıǵı bolıp 6 túr o'simlikten quralǵan. Olardıń báride bir jıllıq golofitler. Onıń birlespesi Aralbalıqko'zi hám basqada bir jıllıq soralar (qarasora, túrkmentorası) quraydı, geydeqamıs, ermanı jıńǵıllar aralasıp o'sedi.

Bul formatsiyada ko'birek ushırasatuǵın balıqko'zdiń jeke o'ziniń assotsiatsiyasın ko'rsetiwge boladı.

Assotsiatsiya tiykarınan bir yaruslı bolıp, biyikligi 10-35 sm. Ayırım orınlarda qarabaraq penen ermanı jıńǵıldıń nusqaları ushırasadı (120-130 sm

biyikligi). Sho'p qatlamı júdá qalın, proektivlik jabıwshılıǵı 90% ke jetedi. Onıń komponentliginen qamıstı, ermanı jıńǵıldı, qarabaraqtı, bir jıllıqlardan qara soranı, túrkmen sorasın atap o'tiwge boladı.

Qızıl soraformatsiyası (*Salicorniaenropaea*)-artıqsha shorlangan jasaw orınların atán. Onıń tiykarǵı qalıńları Aral teńiziniń suwdan bosagán orınlarında, suwǵarılatuǵın maydanlarda, ko'l jaǵalarında ko'plep keń masshtabta ushırasadı. Formatsiyanıń túr quramı, barlıǵı bolıp 7 túrden ibarat.

Qızılsoralıq, qarasoralı-qızılsoralıq, qızılsora balıqko'zli- qızıl soralıq assotsiatsiyaların payda etedi. Olardıń ishinen eń ko'p taralǵanı qızıl sora assotsiatsiyası. Ol tiykarınan ıǵıllı shorǵa tuwrı keledi. Topıraǵı ápiwayı shorlı. Qızıl soranıń qalıńlıǵı biryaruslı, boyı 20-30 sm. Proektivlik jabıwshılıǵı 60-80%. Floralıq quramı jarlı, barlıǵı bolıp 7 túr o'simlikten turadı [Baxiev, 1985].

3.8.Qaraqalpaqstanda ósiwshi galofitli ósimliklerdiń fito indikatsiyası.

Qızılsora formatsiyasınıń birlespeleriniń fitoindikatsiyası.

Qızılsora artıq shorlangan jasaw orınıranı tán bolǵan o'simlik. Sonıń arqasında onıń qalıńlıqları Aral teńiziniń suwdan bosagán ultanlarında úlken maydanda taralǵan. Siyrek túrde egisli jerler arasında, ko'l jaǵalarında ushırasadı. Ol jerlerde jer astı suwı topıraq ústine jaqın jaylasqan.

Qızılsora Qaraqalpaqstanda hám Aral teńiziniń túsliginde basqa golofitler menen birgelikte úsh topar birlespesin dúzedi: qızıl soralıq, qarasoralı- qızıl soralıq hám ko'kpekli-qızıl soralıq. Olardıń ishindegi eń ko'p hám keń taralǵanı qızıl soranıń tek ǵana o'ziniń birlespesi.

Qızıl sora birlespesi ko'binese ıǵallı shorǵa tuwrı keledi. Onıń qalıńlıǵı bir yaruslı bolıp qalın o'sken, boyı 20-30 sm. Topıraqta jabısıwshılıǵı 60-80%. Floralıq quramı oǵada jarlı bolıp barlıǵı 5 túrden artpaydı. Ko'binese tek ǵana qızıl soranıń o'zi qalıńraqtı payda etedi. Degen menen geyde oǵan qarasora,

ko'kpek (tatar sorası) hám qamıs aralasadı. Usınıń menen birge bul túrlerdiń qalıńlıqta bo'listiriwi de tegis emes. Qamıs ko'birek ıǵallı orında, al qara sora hám tatar sorası, quwraǵan topıraqta ornasadı. Sonıń ushında qalıńlıqlar mozaykalı formada ko'rinedi, onnan tısqarı bul mayda kompleksler joqarǵı qatlamnıń ıǵallanıw dárejesin sáwlelendiredi.

Qızılsoranıń astınıń topıraǵı shorǵa jatadı. Ádette bul shorlar epitatsion tısqarında jaylasıp kem-kemnen teńiz torına o'tedi. Bul jerler delta ishinde, aldı ko'l jaǵalarında, duzlı balshıqlarda da gezlesedi.

Qızıl soranıń qalıńlıǵınıń topıraǵı ılaylı yamasa oǵada awır sazlı.

Jer astı suwı 80-150 sm tereńlikten ashılǵan, onıń shorlanıwı 16,50 den 23,42 g/l ge jetip, shorlanıw tipinde xlorlı natriy basım boladı. Solay etip bul suwdı duzlı sherbe dep atawǵada boladı.

Topıraqtıń shorlanıwıda kúshli 1,3% ten 3% ke deyin jetedi.

Usılardıń tiykarında qızılsoranı ústińgi qabatınıń shorlanıwınıń indikatori dep qarawǵa boladı.

Aqbas formatsiyalarınıń birlespeleriniń fitoindikatsiyası.

Aqbas formatsiyası Qaraqalpaqstanda ko'birek ápiwayı hám keń taralǵan birlespelerdiń birinen bolıp esaplanadı. Ádette aq bas ko'plegen toǵay hám suwalma o'simlikleriniń o'siwi ushın jaǵdaydıń to'menlegen ornına jaylasadı. Bul manda jer astı suwınıń háddi to'menleydi, al suw tasıǵanda yamasa suwǵarganda da suwlar ádewir siyrek túsedı. Keleshekte bul jerde, basqa golofitlerinen birge aqbasta ústemlik etedi.

Qaraqalpaqstanda aqbastıń qatar birlespeleri esapqa alınǵan, olardıń ishinde maydanı boyınsha jantaqlı- aqbaslıq, ermanı jıńǵıllı- aqbaslıq hám kermekli- aqbaslıqlar basım boladı.

Jantaqlı- aq baslıq birlespesi Qaraqalpaqstannıń ko'birek biyik orınların iyeleydi hám partaw jerlerdiń o'simlikleri arasında keń tarqalǵan.

Uliwma topıraqtıń jabıwshılıǵı 60-80% onıń aqbastıńúlesine 40-50% tiyisli.

Birlespeniń dúzilisi derlik bir yaruslı. Onıń floralıq quramı 16 túrdi quraydı. Birlespeniń ko'biyek turaqlı qatnasıwshıları ajırıq, qamıs, qızıljıńǵıl, partıldawıq, kermek, chaypashek, qarabaraq, siyrek túrde tatar sorası ushırasadı.

Birlespeniń astınıń topıraǵı jaylawlı-taqırlı, jeńil saz, yamasa shegeleń, ádewir tereńlikte sazlı qatlam to'selgen.

Jer astı suwı 3 m tereńlikte jaylasqan. Onıń shorlanıwı 2 nan 3,2 g/l deyingi aralıqta boladı. Duz quramında natriy sulfatı basım keledi.

Joqarǵı gorizontlardıń shorlanıwı ádewir joqarǵı yarım metrlik tereńlikte 2-2,60%). Tereńlew menen 0,4-1,0% ke deyin to'menleydi.

Aqbas birlespesi Qaraqalpaqstanda partaw hám jas egilmey qalǵan jerler menen baylanıslı.

Topıraqtıń ulıwma jabıwshılıǵı 70-90%, 0 dan 50-70% aqbastıńúlesine kiredi. Birlespeniń floralıq quramı ádewir jarlı. Onda turaqlı túrde jantaq, qamıs, palatı, ajırıq hám tekesaqal hám qus tarısı gezlesedi. Bul manda qamıs jábirlengen, derlik to'selip o'sedi, gúlleydi. Onıń ko'pshilik nusqası quwrap qalǵan. Birlespe eki yaruslı. Birinshi yarusta aqbas basım bolıp, biyikligi 70-80 sm, ekinshi yarusta ajırıq, qamıs, 20 sm boyı. Topıraǵı jaylasıwı- taqırlı, shegeleń- sazlı, hár qıylı dárejede shorlı yamasa kebirli. Jer astı suwı 195-263 sm tereńlikten shıqan. Onıń shorlanıwı keskin túrde hár qıylı (0,94 g/l den 9,6 g/l Ge deyin).

Birlespeniń florılaq quramı bay bolıp 10 túrden quralǵan. Bul manda aqbastıń boyı páskeltek, az gúllegen, miywelerinde jaman. Topıraqtıń shorlanıwı ádewir bolıp, barlıq razrez boyınsha azlı, ko'pli bir tegis 0,35% ten 2,5% aralıǵında.

Kermekli aqbaslı birlespe suwǵarılatuǵın jerlerde, toǵaylardıń shetinde, kanal, jap boylarında ushırasadı. Topıraqtıń jabıwshılıǵı 70% tiykarınan aq bastıń esabınan. Floralıq quramı jarlı, oǵan edifikatordan basqa jantaq, qamıs, aq Sar kiredi. Sho'p qatlamı bir túsli biyikligi 50-70 sm. Topıraǵı jaylawlı- taqırlı, shorlı, ortasha sazlı bolıp shegeleń –qumlı allyuvialdan qalıplesken.

Jer astı suwı 70-100 sm tereńlikten shıqqan, shorlanıwı litine 9-10 g/l, topıraqtıń shorlanıwı 3-3,4%.

Ermanı jıńǵıllı-aqbas birlespesi jaqında quwrap qalǵan ańǵar, buringı ko'l jaǵalarında ushırasadı, topıraǵı jaylawlı-taqırlı yamasa takır- allyuviallı qatlamlı qayır. Birlespeniń o'simlik qatlamı ádewir qalıń, topıraqtıń jabıwshılıǵı 70-80%. Birlespe eki yarushı. Birinshi yarusta ermanı jıńǵıl, qamıs.

Qızıl kendir jaylasıp biyikligi 150-180 sm, ekinshi yarusta aqbas hám onıń basqa komponentleri, boyı 100 sm. Birlespeniń túr quramı jarlı. Ko'binese aqbas, ermanı jıńǵıl, jantaq, qarabaraq, qızıl kendir.

Topıraǵı jaylawlı- taqırlı, oǵada hár túrli qatlamlı allyuviya. Jer astı suwı 40 sm den 2 m ge deyingi aralıqta jaylasıp, shorlanıwı 1,82 g/l den 6,9 g/l aralıǵında bolǵan. Solay etip ko'pshilik jaǵdayda jer astı suwınıń qáddi aqbastıń hár túrli birlespesiniń astında 2-3 m tereńlikte bolıp, oǵada turaklı boladı. Aq bas ko'pshilik jaǵdayda to'mengi gorizonttıń shorlanıwınıń ko'rsetkishini bolıp esaplanadı.

Ajırıq formatsiyasınıń birlespesiniń fitoindikatsiyası.

Ajırıq suwalmalı shorlı topıraқта hám shorda birinshi reet ornasqan o'simliklerdiń qatarına kireldi. Ol joqarılǵan maydandaǵı shordıń qalıplesiwi baslanıp atırǵan orında qalıńlıǵın payda etedi. Bul jerde ol kúshli rawajlanıp, basqa o'simliklerdi birlespeden qısıp shıǵaradı.

Ol patrawda keń taralıp, jánede suwǵarılatuǵın atızlar arasında ajırıqtıń ádewir maydanın bo'lip ko'rsetiwge boladı. Ol kúshli rawajlangan tamır sistemasına hám jer ústinde jatıp o'siwshi paqalına iye bolıp qalıń qatlam payda etiwge uqıplı.

Qaraqalpaqstanda onıń formatsiyasınıń úsh birlespesin ayırıp ko'rsetiwge boladı. Olar bir-birinen iyelegen maydanları menen hám jiyi-jiyi ushırasatuǵınlıǵı menen salıstırmalı túrde ayrılardı. To'mende olarǵa sıpatlama beremiz.

Qamışlı ajırıqlı birlespe ko'l tárizli oypatlıqlarda hám partaw jerlerde ushırasadı.

Bul birlespeniń maydanı qalın sho'p qatlamı menen sıpatlanadı hám topıraqtı jabıwshılıǵı ko'bine 100% ke jetedi. Birlespeniń dúzilisi eki yaruslı. Birinshi yarustı 150-200 sm biyiklikte qamıs penen sheńgel payda etedi, ekinshi yarus 20-30 sm ajırıq hám dominanttıń basqada komponentleri quraydı.

Birlespeniń túrlik quramı ádewir bay bolıp 17 túrden turadı. Bunda golofitli o'simlikler basım bolıp kúshli shorlanıwın ko'rsetedi. Olardan ko'birek gezlesetuǵınlıǵı sheńgel, qamıs, kekre, kermek, jantaq, chay pashek, ko'kpek, qızılsora, Aqsora hám qarasoralar. Al júdá azlarını ermanı jıńǵıl, urıq, partıldawıq h.b. kiredi.

Topıraǵı shorlı, qaldıqlı batpaqlı, sazlı, ıǵallı. Olar awır sazdan baslap ılayǵa deyin qatlamlanǵan, arasında juqa kúshli qatlamda ushırasadı.

Jer astı suwı 100-250 sm tereńlikte jaylasıp tiykarınan duz sherebeli (shorlanıwı 12,8-13 g/l). Topıraǵında ádewir shorlanǵan (joqarǵı gorizontınıń 1,0-1,98 % ke deyin). Duzdıń quramında sulfat natriy basım keledi. Biraq tereńlesken sayın (400 sm ge deyin) shorlanıw 0,3% den 0,4% ke deyin páseyedi. Ajırıq birlespesi aldınǵı birlesken jerlerge uqsas ekologiyalıq jaǵdayda rawajlanadı. Onıń sho'p qatlamı ajırıqtıń tıǵız qalınlıǵınan turadı. O'simlikler menen japıraqtıń jabıwshılıǵı, ayırım orınlarda 100% ke jetedi. Floralıq quramı oǵada o'zgermeli. Edifikatorlardan basqa turaqlı túrde birge o'setuǵın o'simliktiń hesh bir túri joq. Basqazan go'ri sheńgel, jantaq, aq bas bireń sarań ushırasadı. Oǵada siyrek, az sanda ermanı jıńǵıl qarabaraq, kermek, chay pashek, boyan, urıq, partıldawıq, qaluen, ajırıq, qarasora, qızılsora, jeken, at shoqay, qus tarısı. Tiykarǵı fondı ajırıq payda etedi, ol ekinshi yarustı quraydı, al birinshi yarusta siyrek túrde qızıljıńǵıl hám sheńgel o'sedi. Topıraǵı shorlı hám jaylawlı- shorlı, sazlı hám shegeleń.

Jer astı suwı hár qıylı tereńlikte 62 sm den 137 sm deyin jaylasqan. Onıń shorlanıwı tiykarınan 1,5-4,96 g/l bolıp, onıń quramında natriy sulfatı basım keledi. Jer astı suwınıń joqarında jaylasqan ornında (63 sm) dushshı suw ushırasqan

(0,86 g/l). Bul maydanda birlespeden qarabaraq túsip qalıp, onıń ornına qoluen qamıs, jekenler payda bolǵan. Solay etip topıraqtıńhám jer astı suwınıń shorlanıw dárejesi birlespeniń túrlik quramına kúshli tásir etedi. Mısalı, shorlanıw 4,96 g/l ko'teriliwinen, sho'p qatlamında golofitlerdiń sanı ko'beye baslaydı h.t.b.

Aqbaslı- ajırılıq birlespe Qaraqalpaqstanda partıw hám egislikten shıǵıp qalǵan jas jerlerde rawajlanadı. Onıń maydanları mayda. Topıraǵı jaylawlı, suwalmalı, ıǵallı, kúshli shorlanǵan, jeńil mexanikalıq quramǵa iye. Topıraqtı o'simliklerdiń jabıwshılıǵı 80% ten, sonıń 50% i ajırılıqqa tiyisli. Sho'p qatlamınıń dúzilisi tiykarınan bir yaruslı. Turlik quramı jarlı, tiykarınan alıs onı shorlı topıraqtıń edifikatorları aq bas, ajırılıq. Ermanı jıńǵıl, qarabaraqlar quraydı.

Jer astı suwı 58 sm tereńlikten shıqqan. Onıń shorlanıwı 5,76 g/l. Duzdıń shorlanıw tipii xlorlı natriy. Topıraqtıń joqarǵı gorizontınıń shorlanıwı 1,17%.

Ermanı jıńǵıl formatsiyasınıń birlespeleriniń fitoindikatsiyası.

Ermanı jıńǵıl formatsiyası releftiń unamsız formasınan baslap hár qıylı genezisten bir qatar antropogenlik jasalma formalarına deyin, mısalı oy-shuqır, karer, pitpey qalǵan suwǵarıw sistemaları menen baylanıslı. Odan basqada onıń ko'pshilik maydanları oazisler arasındaqı izeykeshlerdiń aymaqlarında ushırasadı. Al jıńǵıldıń duzdı súyiwshi birlespeleri shorlardıń shetinde, teńiz jaǵalarınıń qumlı kotlovanlarında (shuqırlarda), ashshı ko'l boylarında, Aral teńizi jaǵalarında ushırasadı.

Bul formatsiyanıń eń ko'birek tarqalǵan birlespesi ajırılıq-ermanı jıńǵıllıq, aqbaslı- ermanı jıńǵıllıq hám qarabaraqlı- ermanı jıńǵıllıq esaplanadı.

Ajırılıq- ermanı jıńǵıllıq birlespesi toǵay o'simlikleri arasında, suwǵarılatuǵın jerlerdegi iri suwǵarıw kanallarına jaqın partawlarda, ko'l ultanlarında ushırasadı. Topıraǵı jaylawlı –taqırlı, kúshli shorlanǵan, geyde topıraǵı taqır, shegeleń-sazlı, ortasha shorlanǵan. Birlespeniń sho'p qatlamı ádewir qalıń ayırım orında, proektivlik jabıwshılıǵı 90% ke jetedi.

Floralıq quramı 20 túrden ibarat, olardıń barlıǵı golofitler (soralar).

Birlespe eki yaruslı. Birinshi yarusta ermanı jıńǵıl basım bolıp, biyikligi 150-200 sm, to'mengi yarus basqa túrler menen quralıp, onıń basım ko'pshiligi golofitler. Olardıń ishindegi turaqlısı aqbas, qamıs, jantaq esaplanadı. Siyrek túrde qızıl sora aq sora, qarasora, mıńbas, polatı, ko'kpek, qaluen h.b.

Topıraǵı jaylawlı- shorlı- taqırlı. Ústińgi qatlamında sazlı qatlam to'meninde awır saz hám qum qatlamı jaylasqan. Topıraqtıń derlik barlıq gorizontlarında duzlardıń uyası ushıraydı. Jer astı suwı 60-360 sm tereńlikte jaylasqan. Shorlanıwı 1,04 ten 24, 21 g/l. Shorlanıw tipii xlorlı natriy. Eń joqarǵı shorlangan maydanda ko'kpek, aqsora, qarasora, sveda o'sedi.

Topıraqtıń joqarǵı gorizontındaǵı shorlanıwı jer astı suwınıń shorlanıwı menen baylanıslı. Jer astı suwı ornında topıraqtıń joqarǵı yarım metrlik qalıńlıqta shorlanıw 0,47%, al qalǵan maydanlarda 1,74% ten 2,62% ke jetedi. Al ko'birek tereń gorizontlarda shorlanıw 0,1-0,3% ke deyin to'menleydi.

Ermanı jıńǵıl birlespesi soralardıń shetinde, kishi ko'llerdiń jaǵalarında tirishilik etedi, jánede Aral teńiziniń jaǵalarında shoqalaqlardı payda etedi, bir qatar maydanlardı Ámiwdáryanıń to'menindegi suwalmalardıńústińgi betlerine tuwra keledi.

O'simlik qatlamı ádewir qalıńhám bir qatar orınlarda, topıraqtıń o'simliklerinen jabılıwı 100% ke jetedi. Birlespeniń dúzilisi eki yaruslı: birinshi yarusta ermanı jıńǵıl boyı 150-180 sm, ekinshide dominantlıq birge o'setuǵın o'simlikleri.

Túrlik quramı 13 túrden turadı. Olardıńhámmesi qádimgi duzǵa shıdamlı túrler. Olar sheńgel, qarabaraq, sarsazan, kermek, aqsar h.b. Siyrek túrde jigildik o'sedi. Birlespeniń o'simlikleri mazayka túrinde taralǵan. Topıraqtıńústi ıǵallı, shorlı bolǵan maydanlarda to'selip o'siwshi forması jiyi ushırasadı. Bul manda qızılsoranıń da birlespesi qatnasadı. Birlespeniń biyik orınlarında sheńgel saqlanıp, onıń boyı 100 sm. Topıraǵı hár qıylı mozaykalı jaylawlı, shorlı hám kebir. Topıraq

gorizontlarında qum hám sazlar bir tegis bo'listirilgen. Qumı o'gada ılaylangan, námli. Barlıq razrezlerde duzlar uya bolıp toplan'gan.

Jer astı izey suwı 80-100 sm tereńlikten ashıl'gan. Onıń shorlanıwı kúshli 17,97 den 27,95 g/l. Bul sherebe, onda xlorlı natriy basım keledi.

Aqbaslı-ermanı jıń'ılı birlespe házirgi háreket etip atır'gan ań'ar, kanal hám ko'llerdi jolaqlarına, jánede releftiń joqar'ğı elementlerine tuwra keledi.

O'simlik qatlamı ádewir qalıń. Ko'birek topıraqtı 80-90% ke deyin jabadı. Birlespeniń dúzilisi eki yarushlı. Joqar'ğı yarusta ermanı jıń'ıl, biyikligi 170-200 sm. To'mengi yarusta basqa komponentleri quraydı. Ko'birek turaqlı hám mol túrde qamıs, ajırıq, jantaq ushırasadı. Siyrek biraq mol túrde sheńgel, qaramıq, kermek, aqsora, qarasora, ko'kpek gezlesedi. O'gada siyrek túrde boyan, mıńbas, ushırasadı. Topıra'ğı jaylawlı-shorlı, shorlanıwı o'sip baratır'gan, sazlı, sheńgeleń, eń aqırında ıgallı qum ushırasadı.

Jer astı suwı ádewir tereńde jaylasqan (160-340 sm). Jer astı suwı tereńlew menen onıń shorlanıwı 0,12-0,36% ke to'menleydi. 310-340 sm de shorlanıw 0,12% ke teń. Bul manda qarabaraq ushıraspaydı, al ermanı jıń'ıl hám mıńbas qatnasadı.

Qarabaraqlı- ermanı jıń'ıl birlespesi Ámiwdáryanıń to'meniniń suw'garılatu'gın zonasınıń arasındaqı qaldıqlı, qádimgi kebirliklerdi, jánede Aral teńizi ja'gaların jabadı.

O'simlik qatlamı ko'binese ttasqan, yarusları anıq ko'rinedi. Birinshi yarusta ermanı jıń'ıl, biyikligi 150-200 sm. Ekinshi yarusta- qarabaraq boyı 100-120 sm, to'mengi yarus basqa o'simliklerden turadı. Topıraqtı jabıwshılı'ğı 70-80%.

Birlespeniń túrlik quramı derlik golofit o'simliklerden turadı: sheńgel, aqbas, kermek, ajırıq. Shordı qálemeytu'gın túrlerden kaltsiy, siyrek jantaq qatnasadı.

Topıra'ğı shorlaw, ústi qabırshaqlı, tompay'gan, sazlı qatlam. Jer astı suwı 42-200 sm tereńde jaylasqan. Onıń shorlanıwı 4 g/l den 34 g/l. Bolıp quramında xlorlı

natriy basım boladı. Topıraqtıńústıńgi qatlamınıń shorlanıwı 1,50 den 4,5% ke deyin jetedi.

Karabaraq formatsiyasınıń birlespeleriniń fitoindikatsiyası.

Qarabaraq Ámiwdáryanıń to'menine tán o'simliklerdiń birinen esaplanadı. Onıń fitotsenozı deltada ádewir maydandı iyeleydi. Onıń boyı 1-2 m bolıp hár qıylı oypatlarda lagunlarda, quwrağan hám yarım quwrağan ko'llerde, karerde, shorlı topıraq ústingilerinde, taslandı suwǵa jaqın orınlarda, qumlardıń arasındaǵı oylarda o'sedi. Ko'birek taralǵan hám tiykarǵı birlespeleri: qamıslı –qarabaraqılıq, aqbaslı- qarabaraqılıq ermanı jıńǵıllı qarabaraqılıq hám qarabaraqılıqlar jatadı.

Qamıslı qarabaraqılı birlespe tiykarınan quwrağan ko'llerdiń, oypatlıqlardıńhám to'men releflerde, partawlarda, suwgarılatuǵın zonalarda, delta ishindegi qumlardıń aralarındaǵı ko'llerdiń jaǵalarında ushırasadı.

Bul birlespeniń o'simlikleri toǵay tipiniń bir qatar belgilerin o'zinde saqlaǵan. Biraq olardıń progressivlik elementi qarabaraq bolıp esaplanadı hám topıraqtı jabıwshılıǵı 75-80%. Túr quramı jarlı hám 7 o'simlikten turadı, olardıń ishinde edifikatorlardan basqa ermanı jıńǵıl, sheńgel, qaramıq, jantaq, ajırılıqlar qatnasadı. Olardıń toǵay tipindegi o'simlik túrleriniń vegetativ kúshliligi to'men hám ko'pshiligi gúllemeydi. Birlespe eki yarushlı. Birinshi yarusta qarabaraq o'sedi, siyrek túrde sheńgel, qaramıq, ermanı jıńǵıl 100-180 sm. biyiklikte, al qamıs basqa túrler menen birge to'mengi yarustı iyeleydi.

Kúshli shorlanıw sebebinen qamıs penen bir qatar, hátte golofit ajırıq jábirlengen halda ushırasadı. Qamıs qáde boyınsha tek ǵana to'selip o'siwshi formada. Ajırıq do'ńgelik to'beshiklerdi payda etedi.

Jer astı suwı 105-109 sm tereńlikte jaylasqan. Onıń shorlanıwı joqarı 10,9-12,55 g/l. Shorlanıw tipii xlorlı magnitli. Topıraqtıń shorlanıwı (joqarısı 0,5 m) ayrıqsha kúshli (3,24-4,82%), shorlanıw tipii xlorlı natriyli.

Ermanı jıńǵıllı- qarabaraq birlespesi, onıń edifikatorı ermanı jıńǵıl bolǵan jıńǵıllı toǵayǵa tán. Odan basqada ol suwǵarılatuǵın egislik aralarında, suwalmanıń suwgarılmaytuǵın orınlarında ushırasadı.

Bul birlespege siyreklegen o'simlik qatlamlı tán. Proektivlik jabılıwı 30-40% ten ko'p emes. Siyrek túrde 60% ke jetedi. Floralıq quramı jarlı. Onda turaqlı túrde tek ǵana qamıs, ajırıq, kermek, aqbas qatnasadı. Birlespeniń dúzilisi eki yaruslı. Birinshi yarus ermanı jıńǵıl hám qarabaraqtan turadı, biyikligi 100-150 sm. To'mengi yarusta tiykarınan sho'p o'simlikleri jaylasqan.

Topıraǵı jaylawlı- shorlı, kúshli shorlanǵan. Joqarısında ádettegidey saz jaylasadı, keyin ala shegeleń saz hám ılay1 ushırasadı. Topıraq astınıń barlıq gorizontları kúshli shorlanǵan hám ıǵallanǵan.

Jer astı suwy 105-320 sm tereńde ushırasadı. Shorlanıwı kúshli (15-60 g/l). Shorlanıw tipii hár qıylı.

Topıraqtıń kúshli shorlanıwınan ermanı jıńǵıldan hám qarabaraqtan basqası o'lip qaladı. Jer astı suwınıń shorlanıwınıń joqarılawı menen (60 g/l) hátte ermanı jıńǵılda jábirlengen halda ushırasadı. Onıń biyikligi 80 sm quraydı, al qarabaraqtıń boyı 40 sm deyin qısqaradı.

Topıraqtıń shorlanıwı júdá ullı. Ústińgi yarım metrlik qabatta, ol 3,20-12,46: aralıǵında boladı. Eń astıńgi to'seliwshi jınısta 100-150 sm de 2,75 % kedeyin to'menleydi.

Qarabaraq birlespesi kewip qalǵan ko'l oypatlıǵında hám lagunlarda, Aral teńiziniń shorlanǵan orınlarındaǵı shorlı jerlerde qalıplesedi. O'simlik qatlamlı ádewir tutasqan, topıraqtı jabıwshılıǵı 40-60%. Birlespe bir yaruslı. Onıń túrlik quramında turaqlı komponentler derlik joqtıń qasında. Basqalardan ko'birek ermanı jıńǵıl qatnasadı. Turaqsız hám az túrde sheńgel, aqsar, aqbas, ajırıq, palatı hám balıqko'z ushırasadı.

Topırağı shor, torsiýǵan yamasa ıǵallı, gorizontlarǵa bo'linbeydi. Bul topıraq emes, al ultan gruntları, bul jerde topıraq payda bolıwdıń baslanǵısh basqısı. Ol sazlı, shorlı shegeleń qatlam.

Jer astı suwı 210-275 sm tereńlikte jaylasqan. Onıń shorlanıwı joqarı 27,85 teń 57,24 g/l. Duzdıń quramında xlorlı natriy basım bolǵan.

Topıraqtıńústi shorlı, joqarı yarım metrlik qabatta 1,49 dan 7,0% ke deyin jetedi. Quramında turaqlı túrde xlorlı natriy basım boladı.

Tereńlesiw menen shorlanıw to'menleydi, 0,51-2,50% shegarasında boladı. Aqbaslı qarabaraqlıq birlespe siyrek túrde go'ne partaw jerlerde ushırasadı. Onıń astınıń topırağı jaylawlı, kúshli shorlanǵan, sazlı, ılay.

O'simlik qatlamı siyreklegen, topıraqtı jabıwshılıǵı 60%.

Birlespeniń túrlik quramı hár túrli, bul manda jaylawlı topıraqlarda tán bolǵan o'simlikler o'sedi. Oǵan ermanı jıńǵıl, qamıs, kermek, ajırıq, boyan, jantaq, súılmek kiredi. Birlespe eki yaruslı: birinshi yarustı qamıs, siyrek túrde ermanı jıńǵıl payda etedi. Biyikligi 200 sm, ekinshi yarus qarabaraqtan hám basqada sho'p o'simliklerden quralǵan, boyı 100 sm.

Jer astı suwı 110 sm tereńlikte jaylasqan hám júdá shorlanǵan 1,86 g/l. Shorlanıw tipii xlorlı sulfatlı, onnan sulfat basım boladı.

Birlespeniń o'simlik qatlamında eki ekologiyalıq topardaǵı o'simlikti ushıratamız: qarabaraq, ermanı jıńǵıl-shordıńhám aq bas qádimgi shorlı kebirli topıraqtıń indikatorı, ulıwma aytqanda Ámiwdáryanıń deltasında qarabaraq formatsiyasınıń birlespeleri turaqlı túrde xlorlı- natriy tipiniń indikatorı bolıp esaplanadı.

Sarsazan formatsiyasınıń birlespeleriniń fitoindikatsiyası.

Sarsazan birlespeleri o'ziniń taralıwı boyınsha oǵada sheklengen. Qaǵıyda boyınsha Ámiwdárya deltasında siyrek ushırasadı, sonday-aq ashshı ko'l jaǵalarında hám Aral teńizi jaǵalarında da. Sarsazanniń tarqalıwı shorlanǵan,

jaqın jaylasqan jer astı suwı menen baylanıslı. Sonday az aǵıp turatuǵın hám kúshli shorlanǵan jer astı suwı, ádette dáryanıń quyar ayaǵındaǵı aypatlarǵa tán.

Ádewir maydandaǵı sarsazan toparları mayda shoqalaqlar menen baylanıslı. Ko'plegen ilimpazlar sarsazan ajırıq penen, qızılsora menen, potashnik penen, qarabaraq penen, jıńǵıl menen, kermek penen h.b. golofitler menen birlespelerdi payda etiwge uqıplı dep ko'rsetedi. Al Ámiwdárya deltasında hám Aral teńiziniń túslik jaǵalarında tek ǵana sarsazan birlespesi esapqa alınǵan.

Sarsazan birlespesiniń o'zine tán jasaw ornı soraldıń shetleri, sorlı oypatlıqlar, dárya alaplarınıń ayırım shorlı maydanları hám Aral teńizi jaǵaları.

O'simlik qaplamı, ko'pshilik jaǵdayda bir yarushlı 70 sm boyı, olda dominanttan payda bolǵan. Onıń birlespesinde japıraqtıńhám qaratoranıń jeke jarım nusqaları esapqa alınǵan. Ko'pshilik orında sarsazan bir ret kermek penen, qarabaraq penen, semitryanka menen hám potashnik penen o'sken. Sarsazan birlespesiniń bunday jarlıǵın topıraqtıńúlken kontsentratsiyasınan dep túsindiriwge boladı. Oǵan joqarıda ko'rsetilgen golofitlerdiń ayırımları iykemlesken.

Jer astı suwı 78-124 sm tereńlikten ashılǵan. Onıń shorlanıwı 11,9 dan 155,5 g/l aralıǵında boladı. Duzdıń eń joqarǵı kontsentratsiyası sarsazan qalınlıǵı astındaǵı suwdan baqlanǵan.

Al sarsazannıń jantaq penen o'sken variantında jer astı suwınıń to'men shorlanıwı baqlanǵan (11,93 g/l). Bul maydanda sarsazan oǵada siyrek lengen hám jábirlengen túste. Topıraqtıńústińgi shorlanıwı 2,1 den 6,9% ke deyingi aralıqta bolǵan. Duzdıń quramında xlorlı natriy basım boladı [5.130,7.84, 8.47,46.352, 45.96].

5.Keste

Qaraqalpaqstanniń topıraǵınıń shorlanıwınıń fitoindikatsiyası [Baxiev, 1992].

Birlespeler	Shorlanıwı % te	
	Joqari	To'men

Qızılsoralıq	7,086	1,200
Qarabaraqılıq	9,240	1,35
Ermanı jıńǵılıq	2,182	0,644
Qarabaraqılı-ermanı jıńǵılıq	4,020	2,612
Sarsazanlıq	24,400	2,056
Urıqlıq	0,340	0,06
Urıqlıq-qızıl jıńǵılıq	0,964	0,058
Qızıljıńǵılıq	1,408	0,442
Qamıslıq-qızıljıńǵılıq	6,680	0,520
Isqalı- boyanlıq	1,324	0,328
Ajırıqlı- boyanlıq	0,680	0,520
Boyanlıq	4,590	0,050
Qarabaraqılı- boyanlıq	1,816	0,050
Torańǵılıq	3,5	0,650
Ajırıqlı- jiydelik	2,780	0,598
Qamıslıq	1,19	0,122
Biydayıqlı- sheńgellik	4,5	0,410
Hár túrli sho'pli sheńgelliky	10,5	0,080

6.Keste

Qaraqalpaqstanniń gidro (suw) indikatsiyası [Baxiev, 1992].

Birlespeler	Jer astı suwınıń tereńligi		Shorlanıw g/l	
	Joqarısı	To'meni	Joqarısı	To'meni
Qızılsoralıq	4,0	1,0	102,38	14,73
Qarabaraqılıq	3,1	0,76	60,20	6,88
Ermanı jıńǵılıq	3,6	0,9	24,21	12,09
Qarabaraqılı-ermanı jıńǵılıq	1,2	0,75	34,16	10,12

Aqbaslı- ermanı jıńǵıllıq	3,6	1,3	5,8	1,04
Sarsazanlıq	1,2	0,8	155,52	11,93
Urıqlıq	1,33	0,30	1,89	0,10
Qızıljıńǵıllıq	2,44	0,76	3,96	0,55
Qamıslı-qızıl jıńǵıllıq	2,0	0,83	4,54	1,65
Urıqlıq-boyanlıq	1,46	1,13	1,96	0,46
Isqalı- boyanlıq	2,0	0,9	0,80	0,48
Ajırıqlı- boyanlıq	2,4	0,5	4,92	1,04
Aqbaslı –boyanlıq	3,0	0,9	4,68	1,71
Qarabaraqlı- boyanlıq	2,1	1,1	1,71	1,46
Torańǵıllıq	4,70	2,16	2,60	0,54
Qamıslıq	4,40	0,64	20,45	0,73
Bıydayıqlı- sheńgellik	2,05	0,65	4,16	0,75
Hár túrli sho'pli-sheńgellik	2,77	0,65	4,68	2,05

3.9. Qaraqalpaqstannıń shorlı sho'listanında ósiwshi soralar tuqimlasına kiriwshi o'simliklerdiń indikatsiyalıq áhmiyeti.

Qaraqalpaqstannıń shorlı sho'listanında ósiwshi soralar tuqimlasına kiriwshi o'simliklerdiń birlespelerin topıraqtıń duzlılıǵın, jer astı suwınıń minerallasıwın, olardıń mexanikalıq quramın, jer astı suwınıń jaylasıwınıń qáddilerin anıqlaw ushın keńnen qollanıwǵa boladı (5-6 kesteler). Kúshli shorlanıwdıń indikatori bolıp ajırıq, soleros, sarsazan, qarabaraq hám ermanı jıńǵıllardıń formatsiyaları esaplanadı.

Solerostıń basım bolǵan birlespelerin tek ǵana tereńligi 0,5 m bolǵan indikatsiya ushın paydalanıwǵa boladı. Bul formatsiyanıń o'sip turǵan topıraǵınıń duzlılıǵı 1% ten 7% aralıǵında boladı. Al topıraqtıń mexanikalıq quramı duzlı qum menen sazlı topıraq aralıǵında boladı. Bul o'simlik birlespeleri samoletten baqlawdan jaqsı ko'rinip pur-purlıq yamasa qızǵısh aranjevıy túske iye boladı [Baxiev h.b. 1990]

Ajırıqtıń birlespeleri qálegen mexanikalıq quramdaǵı topıraqtıń joqarǵı gorizontınıń ortasha hám kúshli shorlanıwınıń ko'rsetkishi bolıp esaplanadı. Odan basqa shorlaq jerlerde ajırıqtıń payda bolıwı, sol jerdegi duzlardıń samal menen ushıwınıń toqtaǵanın ko'rsetedi. [9.68,12.190, 23.].

Sarsazan formatsiyası

Túslik Aral jaǵalawlarında 0,3 taralǵan hám tiykarınan o'ziniń taza qalıńlıqlarınan turadı. Sol sebepten sarsazan formatsiyasınıń birlespeleri joqarǵı 2 m tereńliktegi, ulıwma joqarǵı shorlanıwdıń indikatori bolıp xızmet etedi. Bul jerlerde shorlanıwdıń dárejesi 3% ten 10% aralıǵında bolǵanı menen, 2% ke deyin to'menlewi yamasa 25% ke deyin joqarılawı múmkin.

Jer astı suwlrı 1,5 m bolıp (ko'binese 2 m den 4 m ge deyin jetedi) hám rassol hám topıraq astınıń jınıslarınıń mexanikalıq quramı júdá o'zgermeli bolıp onıń, indikatsiyalanıwı onsha isenimli emes [Baxiev, h.b. 1990]. Sarsazannıńindikatsiyalıq ko'rsetkishligi joqarı bolıp , onıń o'siw formaları jer ústi hám samolet arqalı baqlawlarda jaqsı ajıraladı.

Ermanı jıńǵıl formatsiyası

Túslik Aral átirapında hámÁmiwdáryanıń to'meninde keńnen taralǵan. Onıń birlespeleriniń tereńligi 5 m den tereń bolmaǵan kúshli shorlangan jer astı suwlarınıń indikatori bolıp esaplanadı. Odan basqa onıń qalıńlıqları arqalı topıraqtıńhám topıraq astı tınıslarınıń duzlanıwında boljawǵa boladı. Onıń birlespeleriniń o'sip turǵan jerindegi jer astı suwlarınıń shorlanıwı 1-3 g/l tártibinde boladı.

Qarabaraq formatsiyası

Ámiwdáryanıń to'menindegi ıǵallı, puxlyanlı kebir jerlerinde, ashshı ko'l jaǵalarında, teńizdiń suwdan bosaǵan ultanlarında, sonday-aq suwgarılatuǵın eginshiliklerden qalǵan jerlerde keńnen taralǵan. Qarabaraq birlespeleri jalpılamay túrde o'skende jer astı suwlarınıń 5 m tereńge ketpeytuǵınlıǵınıń ko'rsetkishi bolıp

esaplanadı. Bul jerlerdiń topıraǵı kúshli shorlangan, ıǵallı, puxiyaklı kebir bolıp esaplanadı. Jer astı suwları 1-1,25 m tereńlikte bolıp, onıń itnerallasıwı 1,49% ten 7% ke deyin jetedi.

Bulardan basqa jiyde formatsiyasınıń birlespeleri menen jigildik jiyde aralasıp o'skende, ol jerde jer astı suwınıń 4 m to'men bolmaytuǵınlıǵı anıqlanǵan. Jer astı suwınıń shorlanıwı júdá joqarı bolǵan.

Solay etip Ámiwdáryanıń to'meniniń shorlı sho'listan o'simlikleriniń soralarınıń indikatorlıq áhmiyetin tallay otırıp, bul regionnıń ko'pshilik orınlarında shorlı sho'listannıń payda bolıw protsessii kúshli rawajlanıp atırǵanlıǵınıń gúwası bolamız.

3.10.Soralar tuqimlasiniń mádeniy wákileri haqqında.

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń aymaǵında joqarida aytıp o'tilgen jabayı túrlerden tisqari mádeniy turdegi wákillerinen tek lablebiler tuwisinan 3-turi egislik láblebi (*Beta vulgaris*), Qant láblebi- *B. Vulgaris* var. *Esculenta* hám ot-jemlik láblebi- *Beta vulgaris* L. o'sedi. Soralar túqımlasınan ekonomikalıq jaqtan hámmeden zárúrli úákili egislik láblebi (*Beta vulgaris*) esaplanadı (7.Suwret.) [25.215-217,26. 343-



344.].

7.Suwret. Ápiwayı láblebi (egislik láblebi)-Beta vulgaris L.

Batis Evropadan Atlantika okeanınıń qúrgaqlıǵı boylap hámde olardıń qıyalıǵında sozılǵan hám Jer Orta teńizi boylarında, Shıǵıs Zakavkaze menen Qaraqúmda jabayı túrinde o'setuǵın jabayı láblebi (*Beta perennis*) den kelip shıqqan dep esaplaydı. Jabayı o'setuǵın usı o'simlikti adamlar sonshelli o'zgertip jibergen hám egiletuǵın mádeniy túrlerin jaratqan desekte boladı.

Ulıwma láblebigе joqarıda ayıp o'tilgen gúl dúzilisi tipi xarakterli, onıń gúlleri bes aǵzalı, túyinshesi ortada túradı, sonıń menen onıń atalıqlarınıń jipleri bir-biri menen qosılıp, diska tárizli bezshe payda qıladı. Miyuesinde aǵashlanatuǵın miyue qaptalı bar, gúlleri bir-birine jaqın túrǵanlıǵınan sol miyueni 2- 3 ten bo'lip qosılıp o'sedi hám búrisip turatuǵın ǵáleti top miyuelerdi payda etedi. Láblebi túqımı o'nip shıqqanda eki, úsh nálsheniń bir jerde túrıwı soǵan baylanıslı. Láblebi eki jıllıq o'simlik; birinshi jılı tamır miyueniń jabıwshı japıraq shıǵaratuǵın joqarǵı bo'limi juwanlasqan epikotil bolsa, qalıń orta bo'limi gipokotil, onıń qaptal tamırlar menen qaplangan eń to'mengi bo'limi tamırlardan payda boladı, birqansha, jıńishke bolatuǵın usı bo'limi topıraqqa birqansha tereń, hátte 1,5 metr tereńge kirip túradı. Ekinshi jılı tamır miyueden gúl paqal o'sip shıǵadı. Biraq láblebiniń birinshi jılда gúllewi ko'p ushırasadı.

Láblebiniń tamır miyuesi saxınaǵa uqsap dúzilgen, onıń usınday dúzilgenligi kese kesiminde anıq ko'rinip turadı. Soǵan baylanıslı, qalıńlasıw protsessinde parenxima izbe-iz o'sedi hám jańa o'tkiziwshi talshıqlar parenximada saxina-saxina bolıp júzege keledi. Eki pálleliler ushın anomal bolsada, oq organı sonshelli qalıńlasıwı múmkin, bul jaǵday soralar túqımlasında ko'p ko'riledi.

Láblebiniń japıraǵı hám tamır miyueleri paydalanıladı. Kaloriyalıǵı 100 grammında 37 kkal.

Láblebiniń qúramında uglevodlar, biriktiriwshi toqımalar, K,R, Sa, Mg, Fe, Zn zatları, S, V1, V5, V6, RR, E vitaminleri, foliy kislotası, A provitaminleri boladı. Kaltsiy elementiniń láblebi qúramında ko'p muǵdarda bolıwına baylanıslı,

láblebini jew arqalı insan hám hayuanatlardıń súyekleri menen tisleri bekkemlenedi.

Uglevodlar, C vitamini, kaliy hám foliy kislotasınıń siyrek gezlesetuǵın birikpeleriniń bolıwı organizmdi tazalaydı, sharshaǵandı shıǵaradı, kem qanlıqtıq aldın aladı hám rak keselliklerinen qorǵaydı.

Egiletuǵın láblebi eki genje túrge: B. Vulgaris var. Esculenta (qant láblebi, ot-jem bolatuǵın láblebi hám awqatqa isletiletuǵın láblebi) hám B. Vulgaris var. cicla (japıraqlı láblebi) bo'linedi.

Qant láblebi-jaqın arada egilip baslandı (8.Suwret.). Al, láblebiler bolsa XVII-ásirdiń aqırında, yaǵnıy bunnan 150 jıl aldın egilip kelmekte. Shamamenen usı gezleri qant zavodları da iske tústi. Sebebi, ol dáwirde Napolen 1 Angliya Evropa qurǵaqlıqların urıs múnásiybeti menen qamal etip qoydı, nátiyjede tropikalıq koloniyalardan qant qamısları kelmey qaldı.



8.Suwret. Qant láblebi- B. Vulgaris var. Esculenta.

1940 jılı burınǵı awqamda 1,5 million gektarǵa láblebi egildi. Qant láblebisi házirgi kúnde, pútkil Evropada egiliwde. Túslikte Tbilisiyege shekem, shıǵısta Volgadan arman o'tip, Sibir, Qazaqstan, Qırǵızstan, Uzaq Shıǵısta da egilip

kiyatır. Qant láblebi urıs jıllarında ǵana O'zbekistanda uaqıtsha egildi. O'zbekistanda hám Qaraqalpaqstanda ǵárezsizlikti jeńip alǵanıımızdan sońǵana qant láblebilerin egiw isleri qolǵa alındı.

XIX-ásirdiń baslarında láblebidegi qant múǵdarı 7% ti qúradı, al házir onıń múǵdarı 18-20% ke jetedi.

Batis Evropada 1 ga jerden 300 ts láblebi alıńǵan bolsa 1930 jıllardıń o'zin daq Qırǵızıstanda (buringı Frunze qalasında) 620-640 ts/ga láblebi alındı. Keyin ala Qırǵızıstannıń basqa rayonlarında hám Qazaqstanda jánede joqarı zúraát alıwǵa (1320-1410 ts/ga) erisildi. Bul jetiskenlikler tiykarınan joqarı agrotexnikalıq jumıslardı o'tkeriw , jańa sortlardı jetilistiriw hám basqalar menen tıǵız baylanıslı.

Respublikamız aymaǵında ot-jemlik lablebi awıl-xojalıǵı mallari ushin ot-jem maqsetinde keńnen egilegi (9.Suwret.).



9.Suwret. Ot-jemlik láblebi- *Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris* var. *crassa*.

Ulıwma láblebiler soralar túqımlasına tiyisli insan ushın kerekli bolǵan eńáhmiyetli azıq-awqatlıq, ot-jemlik, dári-dármanlıq hám basqada paydalı qásiyetlerge iye mádeniy túrлерinen esaplanadı [25. 215-217, 26. 343-344, 27. 25-29, 28. 89-91, 29. 158-159].

IV-bap.Qaraqalpaqstanda o'siwshi soralar tuqimlasiniń wákillerin awıl xojalıǵında paydalanıw hám qorǵaw.

4.1. Soralar tuqimlasiniń wákillerin introduksiyalaw máselesi hám onıń áhmiyeti.

Tábiyiy o'simlikler Qaraqalpaqstan Respublikasınıń 90% ten ko'birek aymaǵın iyeleydi hám onıń o'z-o'zinen qayta tiklenetuǵın tábiyiy resurslardıń birin quraydı.

Geobotanik, florit, resursoved qaniygelerdiń kúshi menen Qızılqum, Ústirit keńisliginiń hám Aral teńiziniń qubla átirapı birqansha izertlenilgen. Sol jumislardıń nátiyjesinde jaylawlardıń zúráátliligi, o'nimdarlıǵı, olardıń qorı hám sıyımlılıǵı anıqlanılǵan. Olardan basqada jaylawlardıń mal awqatlıq o'nimdarlıǵın joqarılátıw hám jaqsılaw boyınsha da bir qansha tájiriybeler o'tkerilmekte.

Ámiwdáryanıń to'meniniń ulıwma sho'listan (qumlı, shorlı, gipsli) o'simliklerin –soraların xojalıq ta paydalanıwdı tiykarınan eki baǵdarda: jaylaw hám indikatsiyalıq maqset te alıp barıwǵa boladı.

Bugingi künde, Aral teńiziniń quǵaǵan ultanlarında hár turli o'simlikler egilip atır. Solardıń ishinde soralar tuqimlasiniń wákilleride bar. Bul birinshiden aymaǵımızdaǵı o'simlikler duniyasiniń ko'pturliligin saqlap qaliwda ulken áhmiyetke iye boladı.

Sonliqtan, ilimpazlarımız benen toǵay xojalıǵınıń xizmetkerleri sirt ellerden hár turli o'simliklerdi alıp kelip qurǵaǵan Aral teńiziniń shorlı topiraqlarına egiw isleri menen shuǵıllanıp atır. Bul sawaplı islerdi toliq amelge asiriw qurǵaǵan Aral

teńiziniń ultanlarinan k o'terilgen duzlı-shańlardı irkip qaliwda tez arada o'ziniń jaqsı nátiyjelerin beredi. Bizin Ana jurtimiz ele juda sulıw hám shiraylı bolıp duniyanıń g o'zzal makanına aylanadı [8.47, 9.68, 23. 139-142,24. 143-146, 25. 215-217, 26. 343-344, 27. 25-29, 28. 89-91.].

Qaraqalpaqstannıń jer maydanınıń 50% ten ko'biREGI jaylaw ushın ajratılıp 9387,7 mın gektardı quraydı [Medetullaev,1974] Qániygelerdiń bahalawı boyınsha Qaraqalpaqstannıń jaylawı hár qıylı bolıp, tábiyiy ko'rsetkishleri boyınsha bir-birinen kúshli ayırıladı. Biraq ulıwma alǵan da bahalı mal awqatqa paydalanatuǵın jerge jatadı.

Ámiwdáryanıń to'mengi sho'listannıń qızıl qum bo'limi basım ko'pshiliginde qarako'l qoyların hám túyelerdi saqlaw hám jaylaw ushın, jánede mal awqatlıq sapası boyınsha ayırıqsha qolaylı bolıp esaplanadı. AlÚ stirt sho'listanı da qoylar ushın júdá qolaylı boladı.

Solay etip Ámiwdáryanıń to'meni 90% ten ko'biREK maydanı jaylaw ushın o'riske jaramlı bolsa, al onıń $\frac{3}{4}$ bo'limi jazı- qısı paydalanıw ushın qolaylı bolıp, olardıń $\frac{2}{3}$ maydanında aǵash – puta birlespeleri taralıp, qıs dáwirinde de paydalanıwǵa boladı. Sebebi bul jerde gi aǵashlar, putalar mallardı kúshli samaldan qorǵasa, alshaqaları mallarǵa jeńil túrdegi qolaylı awqat boladı. (7-keste).

7-keste.

Qaraqalpaqstannıń qızıl qum sho'listanınıń eń áhmiyetli jaylawlarındagı jelinetuǵın ósimliklerdiń qurǵaq massasınıń o'nimliliǵı (ts/ gektar) (Tájimuratov, Xalmuratov, 2004 j.).

Jaylawdıńatları	Báhár	Jaz	Gúz	Qıs
Aralassho'pliseksewillik	1,4	1,8	2,2	1,6
Ayǵırjallıq	1,2	1,4	15	1,0
Júzgúnlik	2,0	2,2	2,3	1,1
Keyrsuiklik	1,4	1,8	1,9	1,6
Qaracherkezlik	2,7	2,9	3,2	2,4
İlaqlıq	0,7	0,8	0,9	0,6
Juwsanlıq	1,9	2,3	3,4	2,3

Túslik Aral átirapınıń bul iri qumlı sho'listanınıń qurǵaq mal ushın awqatlıq o'simlikleriniń ulıwma o'ndirislik qorı 2,19 mln. Tonnanı quraydı. Bul 1,275 mın

bas qoydı saqlawǵa múmkinshilik tuwǵızadı [Turemuratov, 1978]. Sho'listannıń bul rayonında 1958 jıldan baslap, onıń qos truba, Bipan, túye bayatlı maydanlarında birinshi reetinjenerlik tiptegi o'zinen -o'zi aǵatúǵın artezion qudıǵıq urılǵan. Solskvajinalardıń tiykarında olardıń átirapında bir qatar úlken-kishi ko'ller, suwatlar payda bolıp, bul orınlarda mal awqatlıq o'simliklerdiń maydanlarınıń keńeyip, olardıń o'nimdarlıǵı arta baslaǵan. Sonday-aq bul orınlardıń mikroklimatları da jaqsılانǵan [Turemuratov, 1978]. Mısalı sol aymaqlardaǵı tiykarǵı mal awqatlıq gipsofitlerdiń, golofitlerdiń- juwsannıń , ilaktıń. Biyurgunniń o'nimdarlıǵı ko'beyip, maydanları keńeyip baslaǵan.

Tilekke qarsı házirgi waqıtta Aral teńiziniń quwrıwına baylanıslı, bul orınlardaǵı skvajinalardıń suwınıń azayıwına ko'pshiliginiń birotala isten shıǵıp qalıwları ko'plep baqlanbaqta. Olardan basqa bul jerlerdiń suwatları menen jaqsı támiyinleniwi ne baylanıslı bul orınlarda ko'plegen elatlı orınlr payda bolǵan. Soǵan baylanıslı bul jerdegi jaylawlar mallardıń o'risine sheksiz artıq túrde paydalanılmaqta. Odan basqada puta o'simlikleriniń jer ústi bo'limlerin (paxalların) adamlar otın ushın shawı padalanlǵan. Nátiyjede bul jaylawlarda mal awqatlıq qa qatnası boyınsha az bahalı o'simliklerdiń ko'beyiwi ne alıp kelmekte. Solar dıń nátiyjesinde jaylawdıń bahasın hám sapasın to'menletiwshi partek, qurtqa shash hám ádiraspan qusaǵan uwlı o'simliklerdiń birlespeleriniń payda bolıwı esaplanadı. Odan basqada Aral teńizi átirapındaǵı I qızılqumda mallar ushın o'ristiń azayıwı, bul aymaqtıń mal awqatlıq itimallarınıń to'menlewine sebep shi bolmaqta. Bul jerlerde « mox basıwı» baqlanıp sho'listan moxınıń tıǵız gilem túrinde keń taralıp topıraqtıń ústin tolıǵı menen shawıp putalardıń hám bahalı mal awqatlıq sho'plerdiń qayta tikleniwine tosqınlıq jasalmaqta. Jánede pilleshilikte pille oraw ushın juwsanlardı, astragollardı, parteklerdi hám kerliklerdi (iytsiygeklerdi) ko'plep shabıwlar jaylawlarga úlken zıyan keltirmekte. Sonday-aq jaylawdıń sıyımlılıǵınıń to'menlewide mal baǵıwdıń azayıwınan kelip shıǵadı.

Putashalarda hám yarım putashalarda jıllıq o'simlik ayırım bo'limi ko'birek aǵashlanadı, al generativlik bo'limi-gúl toplamı qatıp qaladı. Mal baǵılmasa kelesi jılı olar o'simliktiń o'zinde qaladı. Sonlıqtan juwsanlardıń putalarında usı jıldıń jasıl jumsaq shaqalarına salıstırǵanda, geyde o'tken jılı aǵashlangan pobeglerin ko'riwge boladı. Olardıń barlıǵınıń o'simliktiń jewshiligin jamanlatıwı hám jaylawdıń sıyımlılıǵın to'menletetuǵınlıǵı hámme ge málím.

Jaylawlardı oǵada tolıq hám bir tegis paydalanıwǵa baǵdarlangan ilajlardıń biri, olardı suwlandırıw bolıp esaplanadı. Sonday-aq túslik Aral átirapınıń sho'listanlarında alıstaǵı jaman paydalanılıp atırǵan máselelerine jollar salıwda bul jerdegi jaylawdı jaqsılawǵa tolıq múmkinshilik beredi. Sonnan basqa sho'listan jaylawın únemli paydalanıw boyınsha ilajlar arasında jaylawdı aylanbalı paydalanıw hám mallardı aydap baǵıw sistemasın iske asırıwda úlken nátiyjelerge alıp keledi. Usı joqarıdaǵı ko'rsetilgenlerdi esapqa alǵan halda Aral teńizi átirapındaǵı sho'listan jaylawların jaqsılaw ushın, mashina jollarınıń bir qansha tarmaqları salınbaqta, ol jerlerde jańa elatlı orınlar, fermalar qurılmaqta. Bul jaylawlardıń siyreklegen jerlerine qoldan mal awqatlıq sho'plerdi egiwde ámelge asırılmaqta. Solay etip Ámiwdáryanıń to'menindegi sho'listannıń paydalanatuǵın jaylawlarınıń ulıwma mal awqatlıq bahalılıǵı 99678 mın awqatlıq birlikke deyin o'siwi, olardıń sıyımlılıǵın 2620 mın bas qoyǵa jetedi-dep anıqlawǵa boladı [23. 139-142, 24. 143-146, 12.190, 9.68, 39.120.].

4.2. Qaraqalpaqstannıń tábiyiy jaylawların jaqsılaw jolları.

Qarako'lshilikti bunnan bılayda keńeytiw hám qarako'l qoylarınıń bas sanın ko'beytiw ushın respublikada ádewir úlken múmkinshilikler bar. Olardıń tiykarında sho'listan jaylawınıń rezervin ko'birek tolıq hám únemli paydalanıwlar jatadı. Sonıń menen birge sho'listan jaylawlarınıń o'nimdarlıǵın joqarılatıwǵa hám bayıtıwǵa tiykarlangan mal awqatlıq bazasın bekkemlewdiń basqada jolların paydalanıw kerek.

Házirgi waqıtta o'ndirislik sho'lkemlerdiń ıqtıyarında sho'listan jaylawınıń hár qıylı tiplerin fitomelioratsiyalaw (jaqsılaw) boyınsha isenimli usınıslar payda bolmaqta. Mısal ushın to'mende gipsli sho'listan jaǵdayına ılayıqlanǵan usıllarınıń ayırımların atap o'tiwge boladı.

Statsionarlardıń hám tayanış orınlarınıń ko'p jıllıq tájiriybe jumıslarında sho'listan jaylawların jaqsılaw ushın sho'listannın qurǵaqshılıq jaǵdayına jaqsı iykemlesken hám ko'p jıllıq jasalma jaylawdı do'retiwdi támiyinleytuǵın, tárbiyalaw da quramalı ilajlardı talap etpeytuǵın ko'p jıllıq yarım puta o'simliklerin qollanıwdıń kerekligi ko'rsetilgen [Buǵın, 1952].

1961-62 jıllarda O'zbekstannıń awıl xojalıq wázirliginiń jaylaw meliorativlik tresti menen birgelikte O'zbekstan ilimler akademiyasınıń Qaraqalpaqstan bo'liminiń xızmetkerleriniń qatnasıwında jaylawdı jaqsılaw ushın o'simliklerdi egiw jumısları o'tkerilgen. Olar o'z waqtında jaqsı nátiyjelerge eriskken. 1965 jılı Ústirt sho'li stanıstantsiyasında arnawlı islep shıǵılǵan joybar boyınsha tájiriybe jumısları baslanǵan. Tájiriybeler unamlı nátiyjeler Bergen hám Ústirt sho'listanıń awıl xojalıǵına o'zlestiriw boyınsha bir qatar múmkinshilikler ko'rsetilgen.

Egiw hám o'simlik nállerin otırǵızıw ushın jergilikli floranıń 30 ǵa jaqın túrleri sinap ko'rilgen hám o'ndiriske usınılǵan. Oǵan ayqın mısal bolıp keyreukti lishaynikli- biyurgunliktiń tábiyiy birlespesine aralastırıp egiw arqalı, onıń o'nimdarlıǵın (2-4 esge) ko'teriw boyınsha tájiriybe xızmet etedi. (Tájimuratov, 1986). Ústirttegi biryugunli jaylaw eń to'men (0,3-1,2 ts/ga) o'nimdarlı bolıp esaplanadı. Tájiriybe maydanında házirgi egilgen (6 jıllıq) keyreuktiń o'nimdarlıǵı jıldan jılǵa ko'beymekte. Mısalı 1-shi jıl ol gektarına 0,92 tsdi, al 6 jılı, gektarına 6 tsentnerge jetken.

Gúzgi- qısqı jasalma jaylawdı payda etiw ushın sho'listan mal awqatlıq o'simliklerin tolıq (polosa) jolı menen egiw usılı qollanıлмақта. Sho'listanda mal awqatlıq o'simlikleri egilgen sholańlardıń (qızılqumda) 2-3 jılı 2-3 esege ko'beygenligi hám jaylawdıń jaqsılanǵanlıǵı anıqlanılǵan. Z.Sh.Shamsutdinovtıń

(1965) maǵlıwmatı boyınsha Karnab sho'lda egilgen seksewil gektarına 4-7 (10) ts, chogon 7 ts-10 ts, izen 8-9 ts keyreuik 4-8 ts o'nim bergen.

4.3. Qaraqalpaqstannıń shorlı sho'listan o'simliklerin qorǵaw.

Qaraqalpaqstannıń shorlı sho'listan o'simliklerin (soraların) izertlewdiń eń keleshektegi áhmiyetlisi onı qorǵawdıń geobotanikalıq tiykarın islep shıǵıw bolıp esaplanıladı. Bunday izertlewge bay materialdı flornetlerdiń jumısın hám birlespelerdiń ekologiyasın úyreniw beredi. O'simliklerdi qorǵawdı rawajlandırıwdıń sheshiwshi jaǵdaylarınıń biri, múmkinshiligi bolǵanınsha hár qıylı túrlerdiń hám birlespelerdiń antropogenlik tásirlerge sanlıq turaqlılıǵın bahalaw bolıp esaplanadı. Hár qıylı antropogenlik faktorlar ushın turaqlılıq differentsiyallı túrde bahalanıwı kerek, sebebi bir túrdiń o'zi adamlardıń tásir etiw usılına hár qıylı tásirleniwine gúman joq. Bir waqıtta barlıq o'simliklerdiń túrine tásirlerdiń barlıq formaların izertlewdi iskea sırw múmkin emes. Sonıń ushın birinshi adımda antropogenlik faktorlardı ko'birek qáwipli unamsız tásir etetuǵın o'simlikler, túrler hám birlespelerdiń edifikatorın birinshi gezekte qorǵawdı talap etetuǵın túrlerine antropogenlik tásirlerdiń aqıbetin izertlewge belgilengen anıq joybardı dúziw kerekligi hámme ge belgili.

Ulıwma Qaraqalpaqstannıń o'simlikleriniń hár túrliligi ullı bolıp, qatlam hár túrli, kompleksli, ekologiyalıq hám biologiyalıq jaqtanda birdey emes. Bul aymaqta 50 ge jaqın ekobiomorfanı, o'simliklerdiń bir neshe tiplerin júzlegen fitotsenozlardı bo'lip ko'rsetiwge boladı. Bulardıń hámmesi ekosistemalardaǵı kishkene protsesslerge tez tásirlenedi. Sonıń menen birge túr dárejesinde qorǵaw obekti birinshi gezekte endemikler, reliktlar, mádeniy o'simliklerdiń jabayı tuwısqanları, jánede tez joq etiletuǵın yamasa olardıń jasaw orınlarınıń o'zgeriwi menen baylanıslı joǵalıp baratırǵan o'simlikler.

Qaraqalpaqstannıń florasınan A.Baxiev, S.V.Viktorov, B.N.Sagirovlar [1990] 176 endemikalıq, 15 reliklik hám mádeniy o'simliklerdiń 33 jabayı tuwısqanların bo'lip ko'rsetedi.

Ústirttiň gipsli isho'listanında endemniň eki túri (ejevník bespritsvetnichkoviy, Xiywa sorası); al sho'listan sorası Ústirtte hám Sultan uais babada o'sedi. Joqarıda ko'rsetilgen túrler siyrek túrde ushırasıp, gipsli shorlangan yamasa mayda shağıltaslı túserliklerde, janbawırlarda o'sedi. Endemlerdiň usı barlıq túrleri o'zlerin hám o'setuğın jerlerin tolıq túrde qorğawdı talap etedi.

Relikt túrlerdiň (19 túr) basım ko'pshiligi Ústirt keńisliginde hám Arqa batis Qızılqumniň páskeltek qaldıq tawlarında jámlengen. Olarğa qanshiye, elek júzgin, türkmen túye tabanı, ko'p paxallı devyasiller jatadı.

Olardan basqada ko'p legen túrlerdiň araları qısqarğan. Oğan mısıl retinde tikenli gunyavnikti, noekleotasın, iri japıraqlı túyetabandı, türkmen túyetabanın, eyxvalda túyetabanın, chay sho'pti, toprip japıraklı tselnolientnikti, juwsan japıraqlı zosimanı ko'rsetiwge boladı. Usı ko'rsetilgen túrlerdiň hámmesi taslı, gipsli, qurğaq topıraqlarda o'sip rawajlanbaqta.

Solay etip túr dárejesinde qorğaw obekti birinshi gezekte endelikler hám relikter, jánede ko'birek joq etilgen hám jasaw orınlarınıń o'zgeriwi menen joğalıp baratırğan túrler bolıp esaplanadı [9.68, 12.190, 39.120.].

4.4.Geypara soralar tuwisina tiyisli o`simliklerdi introduktsiyalaw ma`seleleri.

Son`g`ı gezlerde Qaraqalpaqstan Respublikasınıń aymağında ko'p ǵana ma`deniy hám jabayi o`simliklerdi introdukchiyalaw isleri ámelge asirilmaqta (máselen, qoy noxat. – *C. arietinum* L., jer jan`g`aq (araxis) -*Arachis hypogaeae* L., ssp. *Vulgaris* L., Soya- *Glycine max* (L.) Merr. I.Tu`r. S.madeniy.- *Qlycina hispida* Maxim, Amorfa - *Amorfa* L, Gledichiya – *Gleditsia*, Yapon soforası (tuxumak). - *Sophora japonica* L uqsag`an o`simlikler). Bul o`simlikler Qaraqalpaqstan aymag`ında jergilikli o`simlik tu`rlerinin` qatarınan tu`raqlı tu`rde orın almaqta. Keleshekte basqada ko`p ǵana o`simlik tu`rlerin introduktsiyalaw isleri jobalastirilğan.

2017- jili báhárden baslap respublikamizdiń aymaǵında ilimpazlarimiz tamaninan soralar tuwisiniń azıq-awqatlıq wákillerinen kinoa (Chenopodium quinoa) o'simligin Moynaq, Shimbay; 2018-2019 jillardan baslap No'kis rayonlarında hám bizler No'kis qalasında o'siriw islerin ámelge asirdiq. Solay etip izertlew isleriniń na'tiyjelerin xalıq xojalıǵınıń tarawlarına endiriw bul xalqımızdı azıq-awqat o'nimleri menen táminlewge imka'niyat jaratiwdaúlken ahmiyetke iye.

10-Suwrette kinoa (Chenopodium quinoa) o'simliginiń uliwma ko'rinisleri ko'rsetilgen.Kinoa (Chenopodium quinoa) o'simliginiń jalǵan dáninen jarma (11 - Suwret.),den sawlıqqa paydali kinoa uni (12 -Suwret.) alinadi [29. 158-159.].

Kinoa ovoshlar menen, shesnok,zamarriqlar, diyetiykaliq osimlikler ham taza ovoshlar menen aralastirilip turli salatlar tayarlawda (13,14,15,16 suwretler)qollaniladi.



10-Suwret. Kinoa (Chenopodium quinoa) o'simliginiń uliwma ko'rinisleri.



11-Suwret. Kinoa jarmasi



12-Suwret. Den sawliqqa paydali kinoa uni



13-Suwret. Kinoa ovoshlar menen zamarriq penen aralastirilgan salat



14-Suwret. Kinoa shesnok haim



15-Suwret. Kinoa — diyetikaliq o'simlik **16-Suwret. Kinoa taza salati. penen**
 Kinoa(*Chenopodium quinoa*) quinoa) gulli o'simlikler bo'limi, eki ulesliler
 klassi, amorantlilar tuqimlasinin marlar (soralartuwisina kiredi.
 gvozdiyka gulliler tartibi,

Bul ko`rsetilgenislerdin` a`melge asiriliwı o`simliklerdin` bio ha`rqiylılıg`ın ko`plep saqlap qalıw menen bir qatarda, go`zzal makanımızdin` a`jayıp ta`biyatın asırıp qalıwga ja`ne olardı keleshe ka`wladlarımızg`a inam etiwde u`lken a`hmiyetke iye [29. 158-159.].

4.5.Soralar tuqimlasinin geypara azıq-qwqatlıq jabayi turleri ham olardi paydalaniw haqqında.

Sora tárizliler tuqimlasına kiretuğın shpinat tuwisinińO`zbekistanda 2 túri o`sedi. Olardıń biri jemisli shpinat (17-Súwret.) bolıp, ol iyisli o`simlik qatarında egiledi, paqalı hám japiraqları awqatqa paydalaniladi. EkinshiTurkstanshpinati (18-Súwret.). Ol bir jıllıq, eki úyli jabayi sho`p o`simligi. Bul o'simliklerdi xalqimiz erte báhárde vitaminli awqat esabında paydalanadi.



17-Súwret. Jemis shpinati.

Keleshekte, Qaraqalpaqstan Respublikasınıń aymağında azıq-awqatlıq sora tárizliler tuqimlasına kırıwshi jabayi turlerinen Jemis shpinati, Turkestan shpinati hám kinoa (*Chenopodium quinoa*) o`simliklerin mámleketlik dárejede ko`plep mádeniylestirip o`siriwdi qolga aliwimiz zárur. Bul o`z nábewinde xalqımızdıń

aziq-awqatqa degen zárurligin maq'setke muwapiq sheshiwde áhmiyetli rol oynaydi [50.172, 53. 208, 54. 304.].



18-Súwret. Turkestan shpinati.

V-bap. Alingan ilimiy-izertlew natijelerin botanika panin oqitiwda paydalaniw

Botanika panin oqitiw pedagogikalıq protsesslerdin ajralmas quramı sıpatında oqıwshı shaxsti tárbıyalawǵa xızmet qıladı. Ulıwma biologiya tiri tábiyat, onıń kelip shıǵıwı, hár túrliligi, rawajlanıwdıń barlıq basqıshları haqqındagi pánler jıyındısınan ibarat. Ulıwma orta bilim beriwshi mekteplerde biologiya táliminiń roli jámiyettiń rawajlanıwındaǵı áhimiyeti menen belgilenedi. [13.152,32.68,33.6.02.02,20.159,40.14-18,52.142.].

Respublikamızdın ǵárezsizlikke erisken dáslepki jıllarınan aq tálim-tárbıya tarawın rawajlandırıw natıyjesinde toplanǵan tájriybeler, shıǵarılǵan bir qatar ko`rsetpeler biologiyanı oqıtıwdıń talap dárejesinde bolıwı kerekligin tástıyıqlawda.

Oqıwshı – jaslarımızǵa O`zbekistan Respublikası mámleketlik tálim standartı talaplarına juwap beretuǵın dárejede bilim beriw hár bir o`qitiwshı-pedagog qániygeniń ádiwli waziypası bolıp tabıladi.

6-klasslar ushin arnalǵan botanika oqıwlıǵı 142 betten ibarat. Onda kirisiw hám 52 paragraf, 85 reńli suwretler bar. Oqıwlıq joqarı sapalı aq qaǵazǵa shıǵalırǵan hám sulıw suwretler menen bezetilgen. Hár bir paragrafta botanika atamaları, o`simliklerdin atları, reńli háripler menen ajratıp berilgen. Tekstler oqıwshılar ushın túsinikli etip jazılǵan.

6-klassta Biologiya (botanika)- 68-saat, ha`ptesine 2-saattanoqıtıladi: O`zbekistanda botanika panin rawajlanıwta`riyxı-1 saat, gu`l-6-saat, miyuetu`qımlar-8-saat, O`simlik –anıq organizm-2 saat, o`simlikler sistematikası-41-saat, O`zbekistannın o`simlik baylıǵı-3-saat, o`simlikler ha`mqorshag`anortalıq-4 – saat, jerde o`simliklerdu`n`yasının rawajlanıw temalarına -3 saata ajratılǵan.

5.1.Mektep oqıwshıların botanika sabag`ında soralar tu`qımlası haqqında jan`a pedagogikalıq texnologiyalardan paydalanıp oqıtıw jolları

Mekteplerimizde oqıtılutug`ın pa`nlerdin` qa`legen ha`r biri to`mendegi tiykarg`ı uazıypalardı a`melge asıradı:

- a) Okıwshılarg`a usı pa`n tiykarlarınan ta`lim beriw.,
- b) ta`limnin` mazmunı arqalı oqıwshılarg`a ta`rbiya beriw.,
- v) ha`mme qu`rallardan paydalanıp olardıń jeke o`zlerin rawajlandırıw uazıypaların orınlaw maqsetinde oqıtılıw lazımlıg`ı tirishilikke baylanıslı kelip shıg`adı.

Sabaqoqıtıwprotsessi-biologiyanoqıtıwdın`tiykarg`ıformasiesaplanadı ha`mbizlerQaraqalpaqstanRespublikasının`paytaxtıNo`kisqalasıorayındajaylasqan №-14-shiortamekteptin` 6-klassında Biologiya (botanika)-sabag`ınansabaqoqıtıwprotsessinde 34§.Sora tárizliler tuqimlasitemasın ( bug`an 1-saatsabaqsaatıajıratılğ`an.)

oqıtıwda`wirindeoqıwshılardıjan`apedagogikalıqtexnologiyalardıńto`mendegishej ollarınanpaydalanıpoqıttıq:

Sabaq teması: 34§. Sora tárizliler tuqımlası. O.Pratov, A.S.Toxtaev, F.O.Azimova. Botanika. (6-klass ushın sabaqlıq) «O`zbekistan». Tashkent. 2005. 144 b. 88-90 betler [11.303].

I-Sho`lkemlestiriw etapı

Oqıwshılar menen sa`lemlesemen, oqıw o`jiresinin` (klasstın`) tazalıg`ın ko`zden o`tkeremen, por, klass taxtası tazalıg`ın, onı sıpırıwshı shu`berek-materiallardın` suwlang`anlıg`ın, jan`a ha`m u`iy tapsırması boyınsha ko`rsetpe qu`rallardıń. sabaqqa kerekli basqada zatlardın` barı-joqlıg`ın tekserip shıg`aman, olarg`a kritikalıq ko`z qarastan baha beriw menen na`zer taslayman. Klass oqıwshılarının` sabaqqa qatnasın barlayman ha`m taza temanı o`tetug`anlıg`ımdı eskertip onı klass taxtasına jazıp qoyaman. Buğan qosımsha proektor arqalı da temanıń atamasın hám rejesin ekrangá uzataman (2-3 minut).

II-taza temanı o`tiw etapı:

Sabaq temasi: 34§. Sora tárizliler tuqımlası. O.Pratov, A.S.Toxtaev, F.O.Azimova. Botanika. (6-klass ushın sabaqlıq) «O`zbekistan». Tashkent. 2005. 144 b. 88-90 betler. (18-20 minut)

Sabaqtın` maqseti:

**1.Sabaqtın` bilim beriwdegi maqseti:** oqıwshılarg`a biologiya (botanika pa`ninen taza sabaqtın` maqseti, wazıypaları, payda bolıwı, rawajlanıw tariyxı, biologiyalıq pa`nler sistemasındag`ı ornı, basqa biologiyalıq pa`nler (yag`nıy genetika, mikrobiologiya, kletka biologiyası ha`m basqalar) menen baylanıslılıg`ı, pa`ndi u`yreniwde qollanılatusın metodlar, pa`nnin` a`hmiyeti haqqında teren` teoriyalıq bilimler beriw.

**2.Ta`rbiya beriwdegi maqseti:** oqıwshılarg`a bilim beriw arqalı olardıń sanasında ilimiy-materialistlik ko`z-qarastı qa`liplestiriw, Ana Watandı, tuwılǵan Ana jerdi, onıń ta`biyatın suyiwge, milliy qa`diriyatlarg`a hurmet penen qarawg`a, miynetti ha`m ka`sipti suyiwge ha`m basqa da unamlı ta`rbiya ko`nlikpelerin alıwg`a ta`rbiyalaw.

3. Rawajlandırıwshılıq maqseti: oqıwshılarg`a bilim beriw protsessinde olardıń o`z betinshe erkin logikalıq oylanıp, a`shkaralıq sın ko`z-qaras penen teren` pikir juritiwge ha`m du`rıs juwmaqlar shıǵarıwg`a u`yreti.

**4. Sabaqtın` metodları:** Ko`rsetpeli-demonstratsiyalı-gu`rrin`lesiw.

**5. Sabaqtın` usılları:** « O`z ornın`dı tap», «Aqiliy hujim», «Menyu» hám t.b. interaktiv usıllardan paydalanıp o`tiw.

**6. Ko`rsetpeli qurallar ha`m a`sbap-uskeneler:** proektor, kodoskop, epidiaskop, komp`yuter, SD-diskler, mul`timediyalar, slayd ko`rinisleri, tarqatılıwshı materiallar, gerbariylar, ren`li suwretler, kesteler, diagrammalar, grafikler h.t.b.

Sora tárizlilertu`qımlasına barlıq kontinentlerdiń sahra hám sho`llerde, qumlarda hám shor topiraqlı jerlerde o`setuǵın 100 den artıq tuwısqa tiyisli 1500 túr ağashlar, putalar, ko`p jıllıq hám bir jıllıq sho`pler kiredi. O`zbekistanda bul tuqımlasqa tiyisli 44 tuwısqa tiyisli 200 ge jaqın túr o`simlik kiredi. Bul ardiń ko`pshiligi sho`llerde o`sedi.

Bul o'simlikler ko'binese etli-suwli boladi. Japiraqlari ápiwayi, qaptal japiraqsiz, izbe-iz yamasa qarama-qarsi jaylasqan. Japiraq júdá kishireyip ketken yamasa pútkilley joǵalip ketken boliwida múmkin. Gúlleri mayda, jasil yamasa reńsiz, tuwiri yamasa qiysiq, eki jinisli, geyparalarinda ayirim jinisli, masaq siyaq siyaqli yamasa pánje siyaqli top gúlge ornalasqan. Gúl qorǵani ápiwayi, kese siyaqli, túbi bir-birine birikken 5 jasil yamasa reńsiz perde siyaqli japiraqshalardan quralǵan yamasa gúlgorǵani pútkilley joǵalip ketken. Ataliqlari 2-5. Analıǵı 2-5 miywe japiraǵiniń birigiwinen payda bolǵan. Miywesi tiykarinan ǵozasha.

Sora tárizliler tuqimlasiniń keń tarqalǵan wákilleriniń biri ápiwayi láblebi (19-súwret). Ápiwayi láblebi – láblebi tuwisina kiretuǵın eki jilliq o'simlik. Ol tuqimnan shiqqan birinshi jili uzin sabaqshali iri japiraqlar hám aziqliq zatlarǵa bay, juwan tamir (tamir miywe) payda qiladi. Ekinshi jili onda mayda japiraqli, biraz uzin, ushi topgúller menen tamamlaniwshi paqal payda boladi. Ol may ayinda gúlleydi. Gúlleri mayda. Gúlgorǵani ápiwayi, bes japiraqshali, atalıǵı 5.



19-Súwret. Ápiwayi láblebi.

Analıǵı 3 miywe japiraǵiniń birigiwinen payda bolǵan. Láblebiniń miywesi sentyabrde pisedi. Miywesi ǵozasha. Láblebilerdiń 3-turi : 1. Ápiwayi láblebi, 2- Qant laiblebi (20-Súwret.) hám Ot-jemlik laiblebi(21- Súwret.) bar.



20-Súwret. Qant laiblebi.



21-Súwret. Ot-jemlik laiblebi.

Sora tárizliler tuqimlasina kiretuġin shpinat tuwisiniń O`zbekistanda 2 túri (Qaraqalpaqstanda da) o'sedi. Olardıń biri jemisli shpinat(22- Súwret.) bolip, ol iyisli o'simlik qatarında egiledi, paqali hám japiraqlari awqatqa paydalaniladi. Ekinshi Turkstan shpinati (23- Súwret.). Ol bir jilliq, eki úyli jabayi sho'p o'simligi.



22-Súwret. Jemis shpinati.



23-Súwret. Turkestan shpinati.

Qumli sho'llerde seksewil tuwisina tiyisli aq hám(24- Súwret.) qara seksewil (25- Súwret.) o'sedi. Bulardiń ekewi de onsha iri bolmaǵan aǵash bolip esaplanadi. Japiraqlari júda mayda. Seksewiller marttiń aqiri- apreldiń basinda o'se baslaydi hám gúlleydi.



24-Súwret. Aq seksewil.



25-Súwret. Qara seksewil.

Sentyabrđıń ekinshi yariminab baslap seksewiller miyweleydi. Miyweniń o'siw dáwirinde 5 gúlqorgani japiraqshalarinan juqa perdege uqsas qanat o'sip shıgadi [20.159.].

Seksewildiń japiraqlariniń derlik joǵalip ketiwi hám bir jilliq shaqalariniń bir bo'liminiń to'giliwi oniń issi hám qurǵaq sho'l jaǵdayında jasawǵa beyimleskenliginiń belgisi.

Seksewildiń paqali qimbat bahali otin, bir jilliq shaqalari hám miyweleri juǵimli ot-jem esaplanadi.

Bunnan tisqari, seksewiller ko'shpe qumlardi bekkemlewde keń qollaniladi.

Sora tárizlilerdiń ko'pshilik túrleri gipsli sho'l hám shorli sho'l otlaqlardaǵı tiykarǵı ot-jem o'simlikler qatarina kiredi. Misali, teresken, ebelek, saǵan, izen, baliqko'z, shuraq, qoyanjún, donasho'r tuwislarina tiyisli o'simliklerdi túyeler hám qarako'l qoylari gúzde ishteyli jeydi. Iyzen, shogun hám keyrewikti mádeniy ot-jem o'simlikler qatarina kirgiziw ústinde O'zbekstan Ilimler Akademiyasiniń «Botanika ilimiy-oındirislik orayında institutında ilimiy-izertlew jumislari alip barilmaqta. Sherkezdiń japıraǵı hám miywesinen alinatugın dári meditsinada qan basimin paiseyttiriw ushin qollaniladi [15.132.].

Iytsiygekten alinatugin záhárli zat anabazin awıl gojalıǵına ziyan keltiretuǵın jánliklerge qarsi gúresiwege qollaniladi [15.132.].

O'zbekstanda sora tárizliler tuqimlasina kiretuǵın 44 tuwisqa tiyisli 200 ge jaqin túr o'sedi (62-suiwret)[34.156, 38.231, 41.146, 42.203, 43.207, 44.144, 44.144.].

Bul tuqimlasqa kiriwshi 8 túr Respublika «Qizil kitabi» na kirgizilgen.

III-u`yge tapsırmanı soraw etapı (12-13 minut):

Uyge tapsırma 33§. Kapusta tárizliler tu`qımlası. O.Pratov, A.S.Toxtaev, F.O.Azimova. Botanika. (6-klass ushın sabaqlıq) «O`zbekistan». Tashkent. 2005. 144 b. 86-88 betler.

1.soraw. Kapusta tárizliler tu`qımlasında qansha tuwis hám tur bar?

Juu`ap: 350 tuwis, 3000 ǵa jaqin tur kiredi.

2.soraw. O`zbekistan Respublikasında bul tuqimlasqa kiretuǵın qansha tur hám tuwis bar?

Juwap: 200 ge jaqin tu`r hám 76 tuwis ushirasadi.

3.soraw. Kapusta tárizliler tu`qımlasınıń wákılleri qanday o'simlikler? Juwap: bir jilliq, ko'p jilliq sho'pler bolip esaplanadi.

4.soraw. Kapusta tárizliler tu`qımlasınıń tamirlari qanday?

Juwap: oq tamir.

5.soraw. Kapusta tárizliler tu`qımlasınıń o`simlikleriniń gu`lleri qanday?

Juwap: Gu`lleri tuwiri shashaq topgúlde ornalasqan. Gúl qorǵanı quramalı, gúlkese hám gúl japıraǵınan turadı. Gulkese to`rt bir-biri menen qosılmaǵan gúlkese japıraqtan, gúl japıraǵında to`rt erkin túrdegi japıraǵınan quralǵan. Gúlinde bir analıq hám altı atalıǵı bar.

Oqıwshılarg`a aldın ala du`zip kelingен to`mendegishe test sorawların beriw arqalı da olardıń bilimlerin reyting sistemasında bahalap baraman.

Test-1.

1-soraw. Kapusta tárizliler tu`qımlasınıń miyueleri qanday?

A. sobıq (boyı enine 3 ese hám onnan da uzın) yamasa sobıqsha (boyı eni menen teń yamasa 2 ese uzın) túbinen eki japıraqqa bo`linip ashiladı.

V. 1-2 uyalı, g`orek yamasa bir tu`qımlı ju`da` ko`p miyueshelerge bo`linetug`ın top miyue.

S. 6-7 uyalı, g`orek yamasa bir tu`qımlı ju`da` ko`p miyueshelerge bo`linetug`ın top miyue.

D. 8-10 uyalı, g`orek yamasa bir tu`qımlı ju`da` ko`p miyueshelerge bo`linetug`ın top miyue.

Test-2

2-soraw. Kapusta tárizliler tu`qımlasına kırıwshi o`simlikti belgilen`.

A. sora V. la`blebi S.shopán qalta D.erik

Test-3

3-soraw. O`zbekistan Respublikası aymag`ında kapusta tárizliler tuqımlasına kiretug`ın . . . . . tu`r o`simlik o`sedi?

A. 110 tuwısqa tiyisli 36 000 tu`r V. 76 tuwısqa tiyisli 200 ge jaqın tu`r

S. 330 tuwısqa tiyisli 144000 tu`r D. 660 tuwısqa tiyisli 288 000 tu`r

Test-4

4-soraw. O`zbekistan da shopanqalta tuwisına tiyisli tek ǵana ... turi o`sedi.?

A. alma V. qabaq S. átirgúl **D. shopanqalta**

IV-Bekkemlew etapi (8-9 minut):

Sabaqtı bekkemlew etapında bu`gingi o`tilgen taza tema boyınsha oqıwshılarg`a jan`a pedagogikalıq texnologiyalarg`a tiykarlang`an tapsırmalar beremen, olardan test, krossvord ha`m basqada kartoteka formalarındag`ı tarqatpa materiallardı yamasa shınıg`ıwlardı, ma`selelerdi, krossvordlardı h.t.b. sheshiwdi talap etemen.

Krossvordlardı yamasa test sorawların sheshiw ha`r bir oqıwshılardıń logikalıq oy o`risinin` rawajlanıwına unamlı ta`sir jasaydı. Olardıń botanika pa`nine degen qızıg`ıwshılıg`ın ha`mde miynet etiwge bolg`an qa`biletlerin rawajlandıradı. Oqıwshılar o`tilgen oqıw materialların tez ha`m tolıq o`zlestirip aladı ja`ne jan`a ilimiy tu`siniklerge iye boladı. Suwret-26 de Kapusta ta`rizliler hám sora tárizliler tu`qımlasının` wa`killerin aniqlawg`a arnalg`an krossvordti sheshiw oqıwshılarg`a usinildi. [13.152, 32.68, 33.6.02.02, 20.159, 40.14-18, 52.142].

KAPUSTA TÁRIZLILER TU`QIMLASI HÁM SORA TÁRIZLILER TÚQIMLASI TEMALARI BOYINSHA KROSSVORDTI ShESHİW.

							9	S	A	G`	A	N							
							2						4						
							K						R						
				1			A			3			E			5			
				S			P			Sh			D			S			
				H			U			A			I			H			
				O			S			L			S			U			
				G`			T			G`			K			R			
			8	O	S	M	A			A		10	A	L	M	A			
				N						M						Q			
					6									7					
				11	S	H	O	P	A	N	Q	A	L	T	A				
					E									E					
					K									R					
					S									E					
12	K	E	Y	R	E	W	I	K		13	I	Y	T	S	I	Y	G	E	K
					W									K					
					I									E					
					L									N					

Suwret-26. Kapusta ta`rizlilerhám sora tárizliler tu`qımlasının` wa`killerine arnalg`an krossvordtıń ko`rini.

Tiginen:

1.Mádeniyot-jemo'simliklerqatarinakirgiziwúshinizertlenipatirgano'simlik.

2. Kapusta tárizlilertu`qımlasının` wa`kili.
3. O`zbekistanda kapusta tárizlilertu`qımlasınakiriwshiovosheginini.
4. Kapusta tárizlilertu`qımlasınakiriwshiovoshegininińbiri.
5. Gipslisho`lhámshorlisho`lotlaqlardaǵıtiykargiot-jemo`simlik.
6. Soratárizlilertúqimlasinińwákili.
7. Soratárizlilertúqimlasinińtiykargiot-jemo`simliklerinińbiri.

Ko`ldeneńnen:

8. Boyaw beretugin o`simlik.
9. Ot-jemlik o`simlik.
10. Mádeniy miywe o`simligi.
11. Quramında C hám K vitaminleri, alma, limon kislotaları bar. Erte báhárde to`mendegi túp japıraqlarınan ko`k pelmen, ko`k somsa usaǵan awqatlar tayarlanatúǵın o`simlik.
12. Mádeniy ot-jem o`simlikler qatarına kirgiziw úshin izertlenip atırǵan o`simliklerdiń biri.
13. Záhárli zat anabazin aliniwshi o`simlik.

Bekkemlew etapında Kapusta tárizliler tu`qımlasınıń yamasa Sora tárizliler túqimlasiniń quramına kiriwshi o`simlik tu`rlerinin` suwretlerinen paydalanıp olardıń qaysı o`simlik ekenligin tabıwdı talap etiw arqalı oqıwshılardıń teren` bilimdi o`zlestiriwine jol ashıp beriledi. Mısalı: oqıwshılarg`a to`mendegi suwretlerde qaysı o`simlikler berilgen ha`m ko`p tochkalar qoyılǵan jerlerge sol o`simliktin` atın jazın` degen pishindegi sorawlar beriledi. (Suwret-22).

2. To`mende ko`rsetilgen suwret qaysı o`simliktin` ko`rinisi?

Du`rıs juwabın belgilen`:



Pekinkapustasi

Suwret-27. Pekinkapustasinińulwma ko`rinisi.

2. To`mende ko`rsetilgen suwret qaysı o`simliktin` ko`rinisi?

Du`rs juwabin belgilen`:



Ápiwayi kapusta

Suwret-28. Ápiwayi kapusta o`simliginin` ulwma ko`rinisi.

3.To`mende ko`rsetilgen suwret qaysı o`simliktin` ko`rinisi?

Du`rs juwabin belgilen`:



Shpinat

Suwret-29. Shpinat o`simliginin` ulwma ko`rinishi.

3.To`mende ko`rsetilgen suwretler qaysi o`simliklerdiń ko`rinishi?

Du`rs juwabın belgilen`:



Aq seksewil

Suwret-30. Aq seksewil o`simliginin` ulwma ko`rinishi.



Qara seksewil

Suwret-31. Qara seksewil o`simliginin` ulıwma ko`rinisi.

4.To`mende ko`rsetilgen suwretler qaysı o`simliklerdiń ko`rinisi?

Du`rs juwabın belgilen`:



Teresken

Suwret-32. Teresken o`simliginin` ulıwma ko`rinisi.

5.To`mende ko`rsetilgen suwretler qaysı o`simliklerdiń ko`rinisi?

Du`rs juwabın belgilen`:



Keyrewik

Suwret-33. Keyrewik o`simliginin` uliwma ko`rinisi.

Uliwma bekkemlew etapında taza tema menen u`y tapsırmaları boyınsha oqıwshılardıń bilim da`rejelerin bahalaw, olardıń temalardı o`zlestiriw da`rejesin biliw maqsetinde olarg`a awız eki sorawlar beriw ha`m og`an juwaplar alıw, test sorawların sheshtiriw yamasa krossvordlardı sheshiwdi talap etiw uqsag`an tapsırmalar beriledi.

Bul etapta interaktiv oynlardan paydalanıwımız mumkin. Ma`selen, klass oqıwshılardıń kishi 2-3 toparlarg`a bo`lip to`mendegi kestedeki ko`rsetilgen tuwıslarg`a tiyisli o`simliklerdi sol tuwıstıń astına jazıp toltırıw kerekligi aytiladı. Bunda, to`mendegi kestedeki berilgen juwaplardı o`z ornına qoyıp juwap beriw a`melge asırıladı. Klassta mu`g`a`llim basshılıg`ında ja`ne klass sardarı ha`m klass aktivlerinen ja`ne bir oqıwshı alınıp u`sh adam quramında oqıwshılardıń juwapların bahalawshı to`reshiler saylanadı. Tapsırmanı orınlaw qatan` ta`rtipte uaqıt belgilenip qaysı topar burın ja`ne du`ris sheship bolıwı ko`rsetkishleri esapqa alınadı ha`m to`reshiler ta`repinen a`dil tu`rde bahalanadı.

1-soraw: To`mendegi o`simliklerdi tiyisli tu`qımlaslar qatarına du`ris orınladı: lobıya, kartoshka, bu`rshaq, qu`lpınay, shpinat, seksewil, baklajan, la`blebi, shipovnik, shiye, tu`ymegu`l, jon`ıshqa, temeki, da`rilik alıy, paxta. (Keste-8).

Sobiqlilar	G'awasha gu'lliler	Sora ta'rizliler	A'tir gu'lliler	Iytju'zimler
bu'rshaq	paxta	seksewil	qu'lpinay	kartoshka
Lobiya	tu'ymegu'l	la'blebi	shipovnik	baklajan
jon'ishqa	da'rilik altey	shpinat	shiye	temeki

Uliwma bul etapta joqaridag'i shınıg'ıw tu'rleri boyınsha oqıwshılardan juwaplar alınadı ha'm olardıń bilimleri reyting sisteması boyınsha bahalanadı. Jiberilgen qa'telikler du`zetiledi. al, erisilgen jetiskenlikler bolsa marapatlanadı, ha'mmege ashıqtan-ashıq bayan etiledi.

V-U`yge tapsırma beriw ha'm juwmaqlaw etapı

Oqıwshılarg'a u`yde: 34§. Sora tárizliler tuqimlası. O.Pratov, A.S.Toxtaev, F.O.Azimova. Botanika. (6-klass ushın sabaqlıq) «O`zbekistan». Tashkent. 2005. 144 b. 88-90 betlerdi oqip keliwdi ha'm bularg'a qosımsha o`zlerinin` testler yamasa krossvordlar du`zip keliwleri kerekligin aytaman (5-7-minut). Taza tema boyınsha internet materialları menen tanısıp barıńlar dep eskertip o`temen.

5.2. Botanika páninen sora tárizliler tuqimlasiniń o`simlikleri haqqında sabaqtan ha'm klasstan tisqari ju`mislardı orınlaw.

Uliwma orta bilim beriwshi mekteplerde, akademiyalıq litseyler menen ka'sip o`ner kolledjlerinde oqıwshılarg'a sabaq oqitiw processinde sora tárizliler tuqimlasiniń o`simlikleri haqqında tolıq mag`lıwmatlardı beriw mu`mkinshiligi joq. Sebebi, 6-klassta sabaq oqitiw barısında sora tárizliler tuqimlasiniń o`simlikleri haqqında tek g`ana baslang`ısh tu`siniklerdi g`ana berip úlgeremiz. Oqıwshılarg'a tolıq mag`lıwmatlardı beriw tiykarınan klasstan ha'm sabaqtan tisqari jumislardı orınlaw barısında g`ana a`melge asırılıwı mu`mkin. Bunday jumıs tu`rlerine biologiya do`gerekleri, biologiyalıq ha`r qıylı kesheler, ushırasıwlar, pa`n boyınsha olimpiadalar o`tkeriw, fakul`tativ sabaqlar, seminarlar sho`lkemlestiriw, ilimiy izertlew ju`mısların alıp barıwg'a qatnastırıw ha'm basqada ko`p qosımsha islerdi orınlaw arqalı a`melge asırıladı. Sonday aq ,

biologiyadan diyualı gazetalardı, fotostendlerdi shıǵarıw, o`z-betinshe ju`mıslardı orınlaw ha`m olardı tapsırıwdı sho`lkemlestiriw, ilimiy maqalalardı ha`m referatlardı jazıwdı u`yretiwdı, konspektler menen bayanatlar jazdırıw usag`an jumıslardı orınladıw isleride kiredi. To`mende bizler olardıń ayırım tu`rlerine toqtap o`temiz.

5.2.1. Ekskursiyalarǵa aparıw.

Sabaqtan ha`m klasstan tısqarı ju`mıslarǵa ekskursiyalar (bir saatlıq ekskursiya, bir ku`nlik ekskursiya, ko`p ku`nlik ekskursiyalar ) bolıp ol oqıwshılardı tiri organizmlerdin` du`zilisi ha`m organlardın` funktsiyalarındag`ı o`zine ta`n qa`siyetlerdi jasaw ortalıǵına baylanıslı halda u`yreniliwdi a`melge asıradı. Biologiyalıq nızamlılıqlardı «ta`biyat-insan-ja`miyet» qatnasların, o`zlerinin` ko`z qarası teoriyasınan u`yreniwge imka`niyat jaratiladi. Bunda oqıwshılar ta`biyattag`ı o`zgerislerdi natural tu`rde o`z ko`zleri menen ko`redi, qolları menen uslaydı ha`m anıqlap natural jag`dayda tolıq bileidi.

5.2.2. Botanika do`gereklerin o`tkeriw.

Botanikadan do`gerek isleri oqıw jılının` basınan baslap rejelestiriledi ha`m og`an mektep oqıwshıları qabıl etiledi. Do`gerek ju`mısı onıń rejesi boyınsha ha`r ayda bir ret za`ru`rli temalar boyınsha o`tkeriledi. Mısalı bizler to`mendegishe do`gerek rejelerin du`zdik (Keste-9):

Keste-9.

Botanika do`gereklerin o`tkeriw boyınsha reje (2018-2019 oqıw jılı ushın)

q/s	Orınlanatug`ın ju`mıstın` temaları	Juwapker adamlardıń : F.İ.Sh.	O`tkerilet ug`ın uaqıtı	Eskertiw
1	Gu`l ham onıń tu`rleri. Tu`qımlanıw , miyueler ha`m tu`qımlar haqqında	pa`n oqıtıwshısı. do`gerek ag`zası oqıwshı Allamberganova A. 6 ^A - klass.	Sentyabr` 2018 jıl	orınladı
2	Eki ha`m bir tu`qım u`lesli o`simlikler haqqında. Bakteriyalar ha`m zamarrıqlar. Bir ha`m ko`p kletkalı suw	pa`n oqıtıwshısı. do`gerek ag`zası oqıwshı Qálimbetov G. L. 6 ^B - klass.	Oktyabr` 2018 jıl	orınladı

	otları haqqında			
3	Moxlar, qırıqbuwınlar ha'm qırıqqulaqlar (paportonikler) haqqında.	pa`noqıtwshısı. do`gerekag`zası oqıwshı Karimov Q.7A -klass.	Noyabr` 2018 jıl	orınlandı
4	A`tirgu`ller, kapusta ha'm soralar haqqında ulıwma tu`sinik	pa`n oqıtwshısı. do`gerek ag`zası oqıwshı Jumanjv F. 7 ^B -klass.	Dekabr` 2018 jıl	orınlandı
5	G`awasha gu`lliler ha'm sobıqlılar tu`qımlası haqqında tu`sinik	pa`noqıtwshısı. do`gerekag`zası oqıwshı Kurbanazarov M. 6 <sup>B</sup> - klass.	Yanvar` 2019 jıl	orınlandı
6	İytju`zimler ha'm ju`zimler tu`qımlası haqqında tu`sinik	pa`noqıtwshısı. do`gerekag`zası oqıwshı Atanazarov T.6 <sup>A</sup> -klass.	Fevral` 2019 jıl	orınlandı
7	Asqabaqlar ha'm zire ta`rizliler tu`qımlası haqqında tu`sinik	pa`noqıtwshısı. do`gerekag`zası oqıwshı Jumataev J. 6 ^B -klass.	Mart 2019 jıl	orınlandı
8	Sarıgu`lliler ha'm bir tu`qım u`lesliler klassı, lalalar, piyaz ta`rizliler tu`qımlası haqqında	pa`n oqıtwshısı. do`gerekag`zası oqıwshı Tursinbaev M. 6 ^V -klass.	Aprıl` 2019 jıl	orınlandı
9	Bıyday ta`rizliler tu`qımlası. Sho`l a`ne tog`ay o`simlikleri.	pa`n oqıtwshısı. do`gerek ag`zası oqıwshı Embergenov G. 7A - klass.	May 2019 jıl	orınlandı
10	«Qızıl kitap» qa kirgizilgen o`simlikler.	pa`n oqıtwshısı. do`gerek ag`zası oqıwshı Mergenbaev M. 7 ^B - klass.	İyun` 2019 jıl	orınlandı
Du`zgen № 14 mekteptin` botanika do`geregi baslıg`ı :			Tatlimuratov F.	

Sabaqtan tısqarı ju`mıslardıń qatarına diyualı gazetalar shıg`arıw, botanikadan olimpiadalar o`tkeriw, ushırasıw keshelerin alıp barıw, ha`r qıylı jarıslar sho`lkemlestiriw h.t.b. kiredi. Bunday merelerdi o`tkeriw oqıwshılardıń bilim da`rejesin ko`teriwde ha`mde olardıń sapalı teren` bilim alıwında og`ada za`ru`rli a`hmiyetke iye boladı.

Botanikadan sabaq oqıtw protsessinde yamasa oqıwshılardıń klasstan ha`m sabaqtan tısqarı ju`mıslardı orınlaw barısında jan`a pedagogikalıq

texnologiyalarg`a tiykarlanıp du`zilgen testlerden, krossvordlardan ha`m ko`rgizbe qu`rallardın` ha`r qıylı tu`rlerinen paydalanıw oqıwshılardıń o`tilgen temalar boyınsha bilimlerdi 10-15% ko`birek o`zlestiriwine ha`mde sana seziminin` a`dewir da`rejede rawajlanıwına mu`mkinshilik tuwdıradı.

Ha`mmemizge ma`lim janlı ta`biyatti o`simliklersiz ko`z aldimizg`a keltire almaymız. Qu`lpırıp o`sken Jasil o`simlikler barlıq tiri maqluqlar ushin tirishilik deregi bolıp esaplanadı. Olardan, birinshi orında adamlar, quslar, haywanlar, shibin-shirkeyler, topıraq ha`m suwda jasawshi haywanlarg`a shekem azıqlıq retinde paydalanadı.

O`simliklerdin` insan o`mirindegi tutqan orni ju`da` u`lken. Olar adamlar ushin kiyim-kenshek, qurılıs materiallari, u`y-ruzgershilik buyımlari, da`ri-da`rman, vitaminlerdi, makro ha`m mikro elementlerdi ha`m en` baslisi azıq-awqat o`nimlerin beredi.

O`simliklerdin` o`siwi ha`m rawajlanıwin teren` u`yreniw, ma`deniy o`simliklerge durıs ta`rbiya islew, olardan joqari o`nim aliw mu`kinshiliklerin beredi. Bul o`z gezeginde bizin` den sawlıg`ımızdin` bekkem, keleshek a`wladlarımızdin` saw-salamat bolıwına alıp keledi.

«Den sawlıq – teren` baylıq» dep ata-babalarımız biykarg`aaytpag`an, haqıyqatında da deni saw adamnin` kewili ko`terin`ki, shad, ruwhi joqari ha`m yoshlı boladı. Ol insan, qanday jumis islemesin (aqiliy, ilimiy, fizikalıq) jumisti kewyldegidey etip, o`z waqtında pitkerip, kerekli tabislarg`a erisedi. Islengen jumisinin` na`tiyjeleri, onin` o`z xojalıg`ının` ekonomikasın ko`teriwine g`ana emes al xalıq ushında u`lken payda keltiredi.

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń territoriyasında 1110 nan aslam tu`r o`simlikler ushırasadı ha`m ol o`zine ta`n o`zgesheliklerge iye.

Qaraqalpaqstanda o`setug`ın o`simliklerdin` ishinde sobıqlılar tuqımlasınin` wakilleri ken` tarqalg`an. Bul tuqımlastin` ag`ash deneli, puta deneli, ko`p jıllıq sho`p deneli, bir jıllıq sho`p deneli wakilleri tiykarg`ı orındı iyeleydi. Bul tuqımlastin` ma`deniy ha`m jabayi halında o`setug`ın tu`rlerin mektep oqıwshılarına tu`sindiriw ju`da` a`hmiyetli. Soralardıń mektep jani ha`mde u`y

qaptali uchastkalarida qaysi tu`rlerinin` ushirasatug`inlig`in, olardin` biologiyaliq, ekologiyaliq jag`daylarin, o`zgesheliklerin, da`slep sol 5-6 klasslardin` botanika pa`ni oqitiwshilari u`yrenip alip, sabaq ha`m sabaqtan tis waqitlarinda, ha`r qiyli do`gerekelerde u`yretiwi u`lken a`hmiyetke iye. Bizler 5-6-klasslarda botanika pa`ninen mektep oqıwshılarına bilim sırların u`yretiwi barısında sobıqlı o`simlikler tu`qımlasına kiretugin jabayi ha`m ma`deniy o`simliklerdin` tu`rlerin u`yretiwi, olarg`a biologiyaliq ja`ne ekologiyaliq sipatlamalar beriwge ha`reket ettik. İlimiy-izertlew islerimizde alıng`an na`tiyjelerdi sabaq protsessinde sonday aq. oqıwshılarg`a sabaqtan ha`m klasstan tısqarı jumıslardı orınlatıw barısında ken`nen paydalandıq.

Juwmaqlaw

1. Qaraqalpaqstan Respublikasiniń aymag`ında hawa rayına ha`m barlıq jag`daylarına beyimlesip o`setug`ın, suwsızlıqqa ja`ne du`zlı topıraqlarda o`siwge shıdamlı, azıq-awqatlıq, ot-jemlik, da`ri-da`rman, kiyim-kenshek, qu`rılıs materialı ha`m basqada paydalı qa`siyetlerge iyesoralar (Chenopodiaceae Vent.) tuqımlaslarınıń wákilleriniń tu`rlerin anıqlaw, paydali turlerin saylap alıw ja`ne jetilistiriw, xaliq xojalıgında jaylawlardı, otlaqzarlardı bina etiwde paydalaniw, olardıńbizde joq eńáhmıyetli turlerin shet ma`mleketlerden alıp kelip introduktsiyalaw islerin a`melge asırıw, alıńan nátiyjelerdi jaslarǵa bilim beriw protsessinde keńnen paydalaniw bu`gingi ku`nnin` en` aktual mashqalalarınan esaplanadı.

2.Soralar (Chenopodiaceae Vent.) tuqımlasına jer ju`zinde 1500 ge shamalas tu`r, 100 tuwis kiredi. Connan, G`MA florasında 350 ge shamalas tu`r, 50 tuwis ushirasadı. Soralar tuqımlasiniń ko`pshilik wákilleri Orta Aziya, Tu`slik Batis, Arqa Amerika, Tu`slik Afrikanin`, Oraylıq Avstraliyanin` jerlerinde ushirasadı. O`zbekistan Respublikası aymag`ında 57 tuqımlastıń 470 ten artıq tu`ri bar.

3. Soralar (Chenopodiaceae Vent.) tuqımlasına kiriwshi o`simlik tu`rlerinin ko`pshiligi bir, eki ha`m ko`p jıllıq sho`pler bolıp, solardıń arasında azıraq sanda pu`ta, yarım pu`ta ha`m ag`ash tu`rleindegezlesedi.Qaraqalpaqstan florasında soralar tuqımlasiniń 140 tu`ri, 40 tuwisi ushirasadı ha`m olardıń ko`pshiligi Qaraqalpaqstannin` duzlı kebirli topıraqlı jerlerinde ken`nen tarqalg`an 400 tu`qımlasqa tiyisli 12000 g`a jaqın tu`rdegi o`simliklerden turadı.

4. Qaraqalpaqstanniń aymag`ında soralar tuqımlasiniń wákillerinen introduktsiyalanıp jergilikli o`simlik tu`rlerinin qatarınan kinoa (Chenopodium quinoa ) o`simligi tu`raqlı tu`rde qaraqalpaqstan aymag`ında iykemlesip o`sti hám paydali tur sipatında esapqa alindi. Sonliqtan, keleshekte ko`p g`ana o`simlik tu`rlerin introduktsiyalaw islerin ken` masshtabta sho`lkemlestiriwimiz lazım. Bul ko`rsetilgen islerdin` a`melge asıwı o`simliklerdin` bioha`rquylılıg`ın ko`plep saqlap qalıw menen bir qatarda go`zzal makanımızdın` a`jayıp ta`biyatın asırıp

qalıwda ja`ne olardı keleshek a`wladlarımızg`a inam etiwde u`lken a`hmiyetke iye. Solay ilimiy izertlew jumislarini`na`tiyjeli jetiskenliklerin xalıq xojalıg`ı tarmaqlarınin` tu`rli tarawlarına endiriw (xalıq xojalıg`ına, jaylawlar, otaqlar payda etiwde, azıq-awqat, dári-dárman hám basqada zárurliklerdi aqılga muwapiq sheshiwde) usınday paydali jumislardıń sapa ko`rsetkishleriniń artıwın táminlewge imka`niyat jaratadı.

6. Ulıwma orta bilim beriwshi mekteplerde, akademiyalıq litseyler menen ka`sip o`ner kolledjlerinde oqıwshılarg`a soralar tu`qımlasınıń wa`killeri haqqında tolıq mag`lıwmatlardı beriw mu`mkinshiligi joq. Olar 6-klassta soralar tu`qımlasınıń wa`killeri tuwralı azg`ana baslang`ısh tu`siniklerge iye boladı. Al, oqıwshılardıń tolıq mag`lıwmatlardı alıwın ta`minlew tiykarınan klasstan ha`m sabaqtan tisqari jumislardı orınlaw barısında g`ana a`melge asırılwı mu`mkin.

7. Biologiya do`gereklerin, biologiyalıq ha`r qıylı keshelerdi, ushırasıwları, pa`n boyınsha olimpiadalardı o`tkeriw, fakul`tativ sabaqlar o`tiw, seminarlardı sho`lkemlestiriw, olardı ilimiy izertlew ju`mısların alıp barıwg`a qatnastırıw ha`m basqada ko`p qosımsha islerdi orınladıw, ma`selen, bulardıń qatarına, biologiyadan diyualı gazetalardı, fotostendlerdi shıg`arıw, o`z-betinshe ju`mislardı orınladıw ha`m olardı tapsırıwdı sho`lkemlestiriw, ilimiy maqalalar, referatlar, konspektler jazıwdı u`yreti, bayanatlar jasatıw usag`an jumislardı orınladıw oqıwshılardıń bilim da`rejelerin teren`lestiriwge mumkinshilik jaratadı.

8. Biologiyadan (botanikadan) sabaq oqıtıwda yamasa klasstan ha`m sabaqtan tisqari ju`mislardı orınlaw barısında ilimiy-izertlew islerinen aling`an mag`lıwmatlardı paydalanıw waqıtında jan`a pedagogikalıq texnologiyalardı qollanıw ( ma`selen, oqıtıwdıń interaktiv metodları: «Aqılıy hu`jim», «O`z ornın`dı tap», «Menyu», «Kishi toparlarda islew», «Devatlar», «Munazara» ha`m basqalardı qollanıw, krossvordlar menen test sorawların sheshiw h.t.b.) ha`r bir jan`a temalardı an`sat o`zlestiriwge alıp keledi ja`ne oqıwshılardıń materialistlik ilimiy ko`z qaraslarınin` rawajlanıwın tolıq táminleydi.

Paydalanilgan ádebiyatlar

- 1.Sh.M.Mirziyoyev. «Xalkimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir» 2-jild, T.: «Uzbekiston» NMİU,2018, 508 b.
- 2.Sh.M.Mirziyoyev. «Kritikalıq analiz, qatań tártip-intizam hám jeke juwapkershilik hár bir basshınıń kundelik qaǵıydası bolıw kerek». T.: «O'zbekiston» -2017. 106 b.
- 3.Акжигитова Н.И. Галофильная растительность Срeней Азии и её индикационные свойства. Т.: «Фан», 1982. 192 с.
- 4.Бабушкин Л.Н, Когай Н.А, Закиров Ш.С. Агроклиматические условия сельского хозяйства Узбекистана.М.:Мехнат. 1985.-160 с.
- 5.Бахиев А.Б. Растительные индикаторы засоления почв и грунтовых вод в дельте Амударьи. Ташкент: Изд-во ФАН, 1979. - 130 с.
6. Бахиев А.Б. Экология и смена растительных сообществ низовьев Амударьи. Ташкент: ФАН, 1985.- 192 с.
7. Бахиев А.Б., Бутов К.Н., Таджитдинов М.Т. Динамика растительных сообществ Юга Приаралья в связи с изменением гидрорежима Аральского бассейна. Ташкент: ФАН, 1977. - 84 с.
8. Бахиев А.Б., Викторoв С.В. Природные условия Каракалпакии // Флористические и эколого-геоботанические исследования в Каракалпакии. Т. 1. - Ташкент: Фан, 1987. - С. 4-17.
- 9.Бахиев А., Новикова Н.М., Мамутов Н. Пастбища и сенокосы низовьев Амударьи. Нукус: Каракалпакстан, 1989. - 68 с.
- 10.Бондаренко О.Н. Определитель высших растений Каракалпакии. - Ташкент: Изд-во: Наука Узбекской ССР, 1964. 303 с.
- 11.Верзилин Н.М., КорсунскаяМ. «Биология ўқитишнинг умумий методикаси»,Т.: «Ўқитувчи» 1983 й.
- 12.ГансВилс и др. Комплексные дистанционное и наземные исследования осушенного дна Аральского моря. Т.: 2008. НИИТс. МКВК.ISBN 9965-32-616-S. 190 с.

- 13.Гофуров А.Т, Толипова Ж, Файзуллаев С.С.. Азимова И.Т, Ахмадалиева агрометриологи и опасниеБ.Биологияни ўқитишнинг умумий методикаси. (ўқув – методикқўлланма) Т.: Низомии номидаги ТДПУ, 2005.-152 б.
- 14.Грингоф И.Г., Кличенко А.Д. Основы сельскохозяйственной метрологии. Том I. Потребность сельскохозяйственных культур в агрометриологических условиях и опасние для сельскохозяйственных культур в агрометриологических условиях и опасние для сельскохозяйственного производства погодные условия. Обнинск: ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД», 2011. – 808 с.
- 15.Dawletmuratov S.D, Uteniyazov K.U, Xalmuratov P.X. Xalıq meditsinasında qollanılatusın Qaraqalpaqstanınıń mádeniy hám jabayı ósimlikleri. N.: «Bilim», 1992.-132 b.
- 16.Доспехов В.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования). 5-еизд., доп. и перераб.- М.: Агропромиздат. 1985.-351 с.
17. Ережепов С.Е. Дикорастущие кормовые растения Каракалпакии и их использование. Н.: «Каракалпакстан», 1974, -292 с.
- 18.Ережепов С.Е. Флора Каракалпакии, ее хозяйственная характеристика, использование и охрана. Т.: Фан.-1978.-300 с.
- 19.Жоллыбеков Б. Изменение почвенного покрова приморской дельты амударьи при аридизации». Редактор Н.Таджибаев Н.: «Билим» 1991.- 130 с.
20. Зикийев А. Биологиядан русча-ўзбекча изоҳли луғот. Т.: Qomuslar Bosh tahririyati-1993.-159 б.
- 21.Коровина О.Н., Бахиев А, Таджитдинов М.Г., Сарибаев Б. Иллюстрированный определитель высших растений Каракалпакии и Хорезма. Том 2, Т.: «Фан» 1983. С.213.
22. Косназаров К.А., Разаков Р.М. Процессы солеобразования и эолового переноса в Приаралье. Н.: «Каракалпакстан». 1991. 96 с.
23. Косназаров К.А., Сапарниязов Ж. и др. Изучение состояния

Популяции растительного мира Южного Приаралья в условиях антропогенной трансформации ландшафта, изучение социальной популяции растительного мира Южного Приаралья в условиях *sostoyaniya populyatsi I rastitelnogo mira Yujnogo Priaralya v usloviyax antrogennoy transformatsii landshafta*. Aspiranti soiskatel. Rossiya, Moskva. ZSSN. 1608-9014.5 2007. S.139-142.

24. Косназаров К.А., Сапарниязов И.идр. Особенности экосистемы современная технология использования пустынных пастбищ Южного Приаралья. Россия, М.: .ZSSN. 1608-9014.5 2007. S.143-146.

25. Косназаров К.А., Косназаров А.К., Абдуллаева Ж.К. Жанубий Орал буйлари экстремал–экологик шароитларда ем-хашак экологик шароитлари да ем-хашак ўсимликларидан мўл хосил етиштиришнинг янги йуналишдаги йуллари. «Табиий пánlerdi oqıtıw hám izertlew máseleleri» atamasında Respublikalıq ilimiy-teoriyalıq konferentsiya materialları toplamı. No'kis. NMPİ baspaxanası. 2017 j. 430 bet. B.215-217.

26. Kosnazarov K.A., Abdullaeva J.K. Seksewil o'simligi hám onıń fitotsenozları haqqında. «Табиий пánlerdi oqıtıw hám izertlew máseleleri» atamasında Respublikalıq ilimiy-teoriyalıq konferentsiya materialları toplamı. No'kis. NMPİ baspaxanası. 2017 j. 430 bet. B.343-344.

27. Kosnazarov. K.A., Abdullaeva J.K. Beta L.-odin iz predstaviteley podsemeystva Shenopodiaceaei o eë vidax v yujnom Priarale. J-l. Molodoy uchëny. Mejdunarodniy nauchniy jurnal. № 34 (220) 2018.- S.25-29.

28. Qosnazarov Q.A., Abdullaeva, J.K. Soralar túqımlasınıń (CHENOPODIACEAE) wkillerinen láblebiler (beta) hám olardıń túrleri haqqında. «İlim hám tálim-tárbiyanıń áhmiyetli máseleleri» atamasında Respublikalıq ilimiy-teoriyalıq hám ámeliy konferentsiya materialları toplamı. 5-bo'lim No'kis. NMPİ baspaxanası. 2018 j. 154 bet. B. 89-91.

29. Kosnazarov. K.A., Abdullaeva J.K. Kinoa (Chenopodium quinoa) ósimligi hám onıń áhmiyeti. «Qubla Aral boyı biologiyalıq hártúrliligin saqlaw, qayta tiklew hám qorǵawdıń ekologiyalıq máseleleri» atamasında Xalıq aralıq

ilimiy-teoriyalıq konferentsiya materialları toplanı.II-bólim. No'kis. NMPİ baspaxanası. 2018 j. 322 bet.B.158-159.

30.МатчановА.Т., КосназаровК.А. и др. Современные рекомендации по предотвращению отрицательных влияний пыле-солевого выпадения на биотические и абиотические объекты в Южном Приаралье» Н.: «Билим» 2005 г. С.64.

31.Матмуратов Дж. Агроклиматические условия Себеро-Западного Узбекистана. Н.:»Каракалпакстан». 1989.-256 с.

32. МавлановХ. Биоэкологическиеособенности янтака и пути повышение продуктивности его зарослей. Т.:Из-во. «ФАН» 1988.-68 с.

33. MannapovaT. «Samarodorliknianiqlashmezonlari» «Ma`rifat « gazetasi, 6-fevral` 2002 yil.

34.MustafaevS. M. AxmedovW. A. Botanika. 3-nashr. Qarshi – 2010.156 b.

35.Методыагрохимических анализов почв и растений Средней Азии. (издание 5-едополненное). Т.:1977.-187 с.

36.Методы агрохимических исследований почв Средней Азии. (Издание 4-е, дополненное) СоюзНИИХИ, Т.:1973.-132 с.

37.Методы полевых экологических исследований : учеб. пособие / авт.

Коллектив: О.Н. Артаев, Д.И. Башмаков, О.В. Безина [идр.] ; редкол.: А. Б. Рушин (отв. ред.) [идр.]. – Саранск : Изд-воМорозов. Ун-та, 2014. – 412 с.

38. НабиевМ. вабошқалар. Қизиқарли ботаника.Т.: «Ўзбекистон»,1975.-231 б.

39.НТО.ХД-7. «Изучение экологического состояния водоёмов Южного Приаралья и мероприятия по их оздоровлению, улучшению состояния прилегающих территории и фитоценозов» (заключительных). Заказчик: Научно-производственное Государственное Предприятие(НППП) «Экология водного хозяйства» при Государственном комитете по охране природы Республики Узбекистан. Научный руководитель, к.с-х.н. с.н.с.: К.А.Косназаров. Н.: 2016. С.120.

40. PaxratdinovA`. Jan`a pedagogikalıq texnologıyanın` mazmunı ha`m tu`rleri. «Qaraqalpaqstan mu`g`a`llimi» 2000 № 1-2. B.14-18.

41. Pratov U., Jumaev K. Yuksak usimliklar sistematikasi. (Ukuvkullanma). T., "UAJBNT" Markazi, 2003, 146 b.
42. Pratov U., Xudoyberganov X.M. "Botanika darsliklarida qullaniladigan usimliklar sistematikasiga oid kategoriya va taksonlar" (qullanma). T.: 2004. 203 b.
43. Pratov O'.P., Nabiev M.M. O'zbekiston yuksak o'simliklarini zamonaviy tizimi. Bo'lim, ajdod, qabila, oila, turkumlarning o'zbeksha, ilmiy va ruscha nomlari I kitob. «Oqituvchi» NMIU. T.: -2007. 207 b.
44. Pratov O'va boshq. Biologiya (Botanika) /6-sinf uchundarslik / T.: - O'zbekiston NMIU. 2017. – 144 b.
45. Пугачёва, И. Г. Методы экологических исследований: курс лекции. – Горки: Белоруссия государственная сельскохозяйственная академия, 2011. 96 с.
46. Работников Т.А. Фитоценология: Уч. Пос.-3-изд., перераб. и доп.-М.: Изд-во МГУ, 1992.-352 с.
47. Сапарниязов Ж, Салиев Ж. Қарақалпақстанның арқа-батыс қызыл кумының от-шөби ҳәм оны қорғау. Н.: «Қарақалпақстан», 1985.-56 б.
48. Uzbekiston Respublikasining «Qizil kitobi» 1-jild: Wsimliklar; F.W.Hasanovning umumiy tahriri ostida. «Shinor ENK» ekologik – noshirlik kompaniyasi.- 000 b.- Tit. v zbek,rus va ingliz tillarida. T.: 2016. 356 b.
49. Хржановский В.Г. Курс общей ботаники. (систематика растений): Учебник для сельхозвузов.-2-изд., перераб. и доп.-М.: Высшая школа, 1982.-544 с.
50. Хожиматов К.Х, Хожиматов О.К, Собиров У.А. Сборник правил пользования объектами лекарственных, пищевых и технических растений. Т.: «Yangiavlodi» 2009.-172 с.
51. Holikov S., Pratov U., Fayziev A. Wsimliklar aniqlagichi. Maktab wquvchilari uchun qullanma. T.: «Uqituvchi» 1995. 192 b.
52. Қодиров А. Биологиядан педагогик практика ўтказиш. Т. «Ўқитувчи» 1981-142 б.

53. Ҳайдаров Қ.Н, Ходжиматов К.Х. Ўзбекистон Ўсимликлари. (Ўрта мактабларнинг биология ўқитувчилари учун қўлланма).Т.: «Ўқитувчи», 1976.-208 б.
- 54.ШербаевБ.Ш. Флора и растительность Каракалпакии. Н.: «Каракалпакстан», 1988.-304с.
- 55□□□□. <https://www.nastroy.net/.../dikorastuschie-rasteniya-vidyi-nazvaniya-otliche-ot-kultur>.

ÓMIR QÁWIPSIZLIGI

Ózbekstan Respublikasi Ministrler Keńesiniń 19.07.2011j. №208 sanlı «Xalıqtı jer silkiniwler aqibetinde payda bolatuǵın ayırıqsha jaǵdaylarda (tábiiy hám texnogen túrdegi) háreket etiwge tayarlaw kompleks dástúrin tástıqlaw hákında»ǵı qararı, Joqari hám orta arnawlı bilimlendiriw ministrliginiń 22.07.2011j. №310 sanlı buyrıǵın basshılıqqa alınıp hám orınlaw maqsteinde Ájiniyaz atındaǵı Nókis Mámleketlik pedagogika instituti rektoratı buyrıǵı (25.12.2012j. №601 D/1) tiykarında «Ómir qáwipsizligi» pání barlıq tálim baǵdarları boyınsha talabalarǵa oqıw protsessinde úyretiw ushin, magistrlik dissertatsiya jumisi hám bakalavr qánigelik pitkeriw jumislarin orınlawda pánniń huqıqiy tiykarları kirgizildi.

“Jámiyette puxaralardıń huqıqları hám erkinliklerin qorǵaw támiyinlengende ol haqıqiy, huqıqiy puxaralıq jámiyet boladı. Hár bir adam óz huqıqlarin anıq biliwi olardan paydalana aliwi, óz huqıqı hám erkinliklerin qorǵay aliwi lazim. Buniń ushin dáslep mámleketimiz xalqiniń huqıqiy mádeniyatin asiriw zárúr” (I. Karimov. Ózbekstan XXI ásirge umtilmaqta, 31 – bet).

XX ásirdiń 60 – jıllarınan baslap is júrgizip kelgen puxaralıq qorǵanıw sistemasiniń tiykarǵı waziypası tinishliq dáwirinde hám uris jaǵdayında mámleket xalqın jalpı qırǵın quralları hám basqa xújim qurallarınan qorǵaw, uris jaǵdayında xalıq xojalıǵı obektleriniń turaqlı islewin támiyinlew hámde apatshılıq oshaqlarında qutqariw hám tiklew jumislarin óz waqtında nátiyjeli ámelge asiriwdan ibarat edi.

Biraq xalıq ómirine tek jalpı qırǵın quralları emes, bálkim basqa qáwip – qáterlerde qáwip salmaqta, olardı názerden shette qaldiriw hasla múmkin emes. Bular tábiyiy, texnogen hám ekologiyalıq qásiyetli ayırıqsha jaǵdaylar bolıp tabiladı.

1990–jıllarǵa kelip yadro urisi qáwıpi kemeyip, biologiyalıq qurallardan paydalaniw sheklep qoyıldı, jańa – zamanagóy qural túrleri oylap tabıldı, olar adamlar ushin qáwıplı bolmay, bálki ekonomikalıq obektlerdi isten shıǵarıwǵa qaratılǵan edi. Bulardıń barlıǵı puqaralıq qorǵanıw sistemasi ornında jańa bir sistema dúziliw kerekligin dálillep berdi.

Puqaralıq qorǵanıw ornın iyelewi múmkin bolǵan iri kólemdegi ayırıqsha jaǵdaylarǵa áwelden tayarlıqtı támiyinlewshi jańa arnawlı mámleket sistemasi iyelewi, ol tinishliq hámde uris dáwirinde xalıqtı hám aymaqlardı ayırıqsha jaǵdaylardan qorǵawı lazım edi. Bul sistema xalıqtı ayırıqsha jaǵdaylardan qorǵaw hám qutqariw jumislarin ótkerip qoymay, basqa áhmiyetli ilajlardı: tábiyiy apatlardan qáwıplı aymaqlar kartaların dúziw, seysmikalıq bekkem bina hám imaratlardı quriw, qisqa, orta hám uzaq múddetli boljaw jumislarin shólkemlestiriwi hám xalıq tayarlıǵın ámelge asiriwi lazım edi.

Usı orında jáne bir máseleni aydinlastirip alıwǵa tuwra keledi. Ayırıqsha jaǵday degen ne, onnan xalıqtı hám aymaqlardı qorǵaw degende neni názerde tutiwimiz kerek?

Ayırıqsha jaǵday – adamlar qurban boliwi, olardıń den sawlıǵı yaqı qorshaǵan ortalıqqa ziyan tiyiwi, materiallıq shıǵınlar keltirip shıǵılıwi hámde adamlardıń turmis sharayatınıń izden shıǵıwına alıp keliwi múmkin bolǵan yaqı alıp kelgen avariya, apatshılıq, qáwıplı tábiyǵiy hádiyse yaqı basqa tábiyiy apatshılıq nátiyjesinde belgili bir aymaqta júzege kelgen jaǵday.

Xalıqtı hám aymaqlardı ayırıqsha jaǵdaylardan qorǵaw – ayırıqsha jaǵdaylardıń aldın alıw hám olardı saplastiriw ilajları, usılları, qurallar sistemasi, háreketler birlesigi.

Ayırıqsha jaǵdaylardıń aldın alıw – aldın ala ótkerilip, ayırıqsha jaǵdaylar júz beriwi qáwıpin múmkinshiligi bolǵansha kemeytiwge, bunday jaǵdaylar júz bergen táǵdirde bolsa adamlar den sawlıǵın saqlaw, qorshaǵan tábiyiy ortalıqqa

tiyetuġin ziyan hám materialliq shiġinlar muġdarin kemeytiwge qaratilġan ilajlar kompleksi.

Ayriqsha jaġdaylardi saplastiriw – ayriqsha jaġdaylar júz bergende ótkerilip, adamlar ómiri hám den sawliġin saqlaw, qorshaġan tábiyyiy ortalıqqa tiyetuġin ziyan hám materialliq shiġinlar muġdarin kemeytiwge, sonday – aq ayriqsha jaġdaylar júz bergen zonalardi sheńberge alip, qáwipli faktorlar tásirin toqtatiwġa qaratilġan avariya – qutqariw jumislari hám basqa keshiktirip bolmaytuġin basqa jumislar kompleksi.

Xaliqti hám aymaqlardi ayriqsha jaġdaylardan qorġaw tarawında qoyilġan eń tiykarġı jumislardıń biri–dáslep Qorġaniw ministrligi qasında puqaralıq qorġaniw hám ayriqsha jaġdaylar basqarmasiniń, soń usi basqarma tiykarında Ózbekstan Respublikasi Prezidentiniń 1996 jil 4-marttaġı PF–1378 Buyrġı menen Ayriqsha jaġdaylar ministrliginiń dúziliwi boldi.

Ministrlik is júrgize baslaġannan soń xaliqti hám aymaqlardi ayriqsha jaġdaylardan qorġaw tarawiniń huqiqiy tiykarin dúziwshi bir qatar nizam hám qararlar qabil etildi.

Ózbekstan Respublikasi nizamlari:

Xaliqti hám aymaqlardi tábiyyiy hám texnogen qásiyetli ayriqsha jaġdaylardan qorġaw haqqında (1999 jil 20-avgust) 5 bólim hám 27 stat`yadan ibarat. Nizam xaliqti hám aymaqlardi tábiyyiy hám texnogen qásiyetli ayriqsha jaġdaylardan qorġaw tarawındaġı sotsial múnásibetlerdi tártipke saladı hám ayriqsha jaġdaylar júz beriwi hám rawajlanıwiniń aldin aliw, ayriqsha jaġdaylar keltiretuġin shiġinlardi azaytiw hám ayriqsha jaġdaylardi saplastiriwdi maqset etip qoyadı.

Puxaralıq qorġaniw haqqında (2000 jil 26-may) 4 bólim hám 23 stat`yadan ibarat. Usi nizam puxaralıq qorġaniw tarawındaġı tiykarġı waziypalardi, olardi ámelge asiriwdiń huqiqiy tiykarların, mámleket organlariniń, birlespe hám

shólkemlerdiń wákilliklerin, Ózbekstan Respublikasi puxaralariniń huqıqlari hám májbúriyatların, sonday – aq puxaralıq qorganiw kúshleri hám qurallarin belgileydi.

Adamniń immunitet jetispewshiligi virusi menen keselleniwiniń aldın aliw haqqında (1999 jıl 19-avgust) 13 stat`ya. Nizamda AIJS keselliginiń aldın aliw tarawındaǵı mámleketlik támiyinlew, keselliktiń aldın aliw boyınsha jumislardi qarji menen támiyinlew, puxaralardıń hám májbúriyatlarına tiyisli máseleler kórsetilgen.

Gidrotexnika inshaatlariniń qáwipsizligi haqqında (1999 jıl 20-avgust) – 15 stat`ya. Usi nazimniń maqseti gidrotexnika inshaatların joybarlastiriw, quriw, paydalaniwǵa tapsiriw, olardan paydalaniw, olardı rekonstruksiya qiliw, tiklew, konservatsiyalaw hám tamamlawda qáwipsizlikti támiyinlew boyınsha iskerligin ámelge asiriwda júzege keletuǵın minásibetlerdi tártipke saliw bolip tabiladi.

Awıl xojalıq ósimliklerin ziyankesler, kesellikler hám jabayi ot - shóplerden qorgaw haqqında (2000 jıl 31-avgust) 28 stat`ya. Usi nazimniń maqseti awıl xojalıq ósimliklerin ziyankesler, kesellikler hám jabayi ot - shóplerden qorgawdi támiyinlew, ósimliklerdi qorgaw qurallariniń adam den sawlıǵına, qorshaǵan tábiyyı ortalıqqa zıyanlı tásiriniń aldın aliw menen baylanisli qatnaslardi tártipke saliwdan ibarat.

Radiatsiyalıq qáwipsizlik haqqında (2000 jıl 31-avgust) 5 bólim hám 28 stat`yadan ibarat. Nizamniń maqseti radiatsiyalıq qáwipsizlikti, puxaralar ómiri, den sawlıǵı hám mal – múlki, sonday – aq, qorshaǵan ortalıqtı ionlastiriwshi nurlaniwdiń zıyanlı tásirinen qorgawdi támiyinlew menen baylanisli qatnaslardi tártipke saliwdan ibarat.

Terrorizmge qarsi gúres haqqında (2000 jıl 15-dekabr) 6 bólim hám 31 statyadan ibarat. Usi nizamniń maqseti terrorizmge qarsi gúres tarawındaǵı qatnaslardi tártipke saliwdan ibarat. Nizamniń tiykargı waziypalari shaxs, jámiyet

hám mámlekettiń suverenitetin hám aymaqlıq pútinligin qorgaw puxaralar tinishligi hám milliy tatiwliqti saqlawdan ibarat.

Qáwıplı islep shıǵarıw obektleriniń sanaat qáwipsizligi haqqında (2006 jıl 28-sentyabr`) 23 stat`ya. Nizamniń maqseti qáwıplı islep shıǵarıw obektleriniń sanaat qáwipsizligi tarawındaǵı qátnaslardı tártipke salıwdan ibarat.

Ózbekstan Respublikası MK (1997 jıl 27-dekabr`) №558 sanlı qararı «Ózbekstan Respublikasında ayırıqsha jaǵdaylardıń aldın alıw hám olarda háreket etiwde mámleketlik dizimi haqqında»ǵı qararı menen biykar etilip bul qarar qaytadan 2011 jıl 24-avgustta Ózbekstan Respublikası MK №242 sanlı «Ózbekstan Respublikasında ayırıqsha jaǵdaylardıń aldın alıw hám olarda háreket etiwdiń mámleketlik dizimi jumislarin bunnan bilay jetilistiriw» haqqında qararı menen toliqtirilip qayta shıqtı.

Ózbekstan Respublikası (2011 jıl 19-iyul`) №208-sanlı qararı «Xalıqtı jer silkiniwler nátiyjesinde payda bolıw múmkin bolǵan ayırıqsha jaǵdaylarda (tábiiy hám texnogen) háreket etiwge úyretiwdiń kompleks dástúrin tastıyıqlaw» haqqında qararı tiykarında barlıq orınlarda ayırıqsha jaǵdaylarda háreket etiyadiń kompleks dásturleri islenip shıǵılıp, oqıw mashqulatlari alıp barılmaqta.

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń qararı:

Tasqınlar, sel aǵımlari, qar kóshiw hám jer kóshkisi hádiyseleri menen baylanisli ayırıqsha jaǵdaylardıń aldın alıw hám olardıń aqibetlerin toqtatiw barisındaǵı – ilajlar haqqında (2007 jıl 19-fevral, PQ – 585 sanlı). Tasqınlar, sel aǵımlari, qar kóshiw hám jer kóshki hádiyseleri menen baylanisli jumislardi óz waqtında hám nátiyjeli shólkemlestiriw, sonday – aq olardıń aqibetlerin tezlik penen toqtatiw maqsetinde qabil etilgen.

Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń qararlari:

Ózbekstan Respublikası Ayırıqsha jaǵdaylar ministrliginiń jumisin shólkemlestiriw máseleleri haqqında (1996 jıl 11-aprel, 143 sanlı). Qararǵa

«Ózbekstan Respublikasi Ayriqsha jaǵdaylar haqqida»ǵı Nizam qosimsha etilgen. Ayriqsha jaǵdaylar ministrliginiń tiykarǵı waziypalari, huqıqlari keltirilgen.

Ózbekstan Respublikasi Ayriqsha jaǵdaylarda olardıń aldın aliw hám háreket etiw mámleketlik sistemasi haqqında (1997 jıl 23-dekabr, 558 sanlı). Qarar menen Ózbekstan Respublikasi Ayriqsha jaǵdaylarda olardıń aldın aliw hám háreket etiw mámleketlik sistemasi (AJMS) haqqındaǵı Nizam hám onıń dúzilisi tastiyıqlanǵan, ministrlik hám idaralardıń xalıq hám ayaqlardı ayriqsha jaǵdaylardan qorǵaw boyınsha funktsiyalari keltirilgen.

Ózbekstan Respublikasi xalqın ayriqsha jaǵdaylardan qorǵawǵa tayarlaw tártibi haqqında (1998 jıl 7-oktyabr 427 sanlı). Qarar mámleket xalqın hám ayaqların tábiyy hám texnogen qásiyetli ayriqsha jaǵdaylardan qorǵaw sistemasin rawajlandiriw maqsetinde qabil etilgen. Qararǵa qosimsha keltirilgen «Xalıqtı ayriqsha jaǵdaylardan qorǵaw tarawında tayarlaw tártibi haqqında»ǵı Nizam Ózbekstan Respublikasi xalqın ayriqsha jaǵdaylardan qorǵaw tarawında, sonday – aq ayriqsha jaǵdaylarda háreket etiwge tayarlıqtan ótip atırǵan xalıq toparların tayarlawdıń tiykarǵı waziypaların, túrleri hám usılların belgileydi.

Tábiyy, texnogen hám ekologiyalıq qásiyetli ayriqsha jaǵdaylardıń sipatlamasi haqqında (1998 jıl 27-oktyabr, 455 sanlı). Qarar menen tastiyıqlanǵan sipatlamaǵa muwapiq ayriqsha jaǵdaylar júzege keliw sebeplerine kóre texnogen, tábiyy hám ekologiyalıq qásiyetli, usı jaǵdaylarda ziyan kergen adamlar sanına, materiallıq ziyanlar muǵdarına hám kólemlerine qarap lokal, jergilikli, respublika hám transsšegaralı túrlerge bólinedi.

Ózbekstan Respublikasında adamlar hám haywanlardıń qutiriw keselligine qarsi gúresti kúsheytıw ilajları haqqında (1996 jıl 18-yanvar, 32 sanlı). Adamlar hám haywanlardıń qutiriw keselligine qarsi gúres ilajlarınıń nátiyjeligin asiriw,

sonday – aq xaliq jasaw orinlarinda iyt, pishiq hám basqa úy haywanlarin tártipke saliw maqsetinde qabil etilgen.

Galaba xaliqliq ilajlardi ótkeriw qağıydalarin tastiyqlaw haqqında (2003- jil 13-yanvar, 15 sanli). Ózbekstan Respublikasi aymağında galaba xaliqliq ilajlar ótkeriliwi waqtında jamaát qawipsizligin tamiyinlew hám tartibin qorgaw maqsetinde qabil etilgen.

Ayriqsha jagdaylardi boljaw hám aldın aliw Mámleket dástúrin tastiyqlaw haqqında (2007-jil 3-aprel, 71 sanli). Ayriqsha jagdaylardıń aldın aliw hám aqibetlerin saplastiriw tarawında alip barilip atırǵan jumislar ónimliligin asiriw maqsetinde qabil etilgen. Joqarida kórsetilgen huqiqiy hújjetler tiykarında oqiw protsessinde talabalarǵa “Ómir qawipsizligi” pániniń barliq baǵdarlari boyınsha keń mániste túsinipler berildi.

Qosimshalar

Forma-3.3.

Ўзиниёз атиндағи Но'кис Мамлекетлик педагогикалиқ институти, «Ботаника, экология һәм оқиғи методикаси» кафедраси қанийеллиғи: 5А110401 – Аниқ һәм табиий пәнлерди оқиғи методикаси (биология) магистратура талабаси: Абдуллаева Жамалия Кенесбаевнанин 2017-2018, 2018-2019 жилларда баспада жарияланған илимий миynetleri.

№	Илимий мақала атамаси	Баспа табақ қол жазба	Журнал, toplam (жil, номер, бетleri), баспаси yamas авторлиқ guwaxnamasi nomeri	Баспа табақ yamas бетleri sani.	авторlasardi н fамилийalari.
1	Жанубий Орол буйлари экстремал-экологик шароитида ем-хашак ўсимликлардан мол хосил етиштиришининг янги йуналишдаги йуллари	Баспа	Табийий пәнлерди оқытыў хам изертлеў мәселелери» атамасында Республикалық илимий-теориялық конференция материаллары топламы. Нөкис. НМПИ баспаханасы. 2017 ж. 430 бет. Б.343-344		Қосназаров. Қ.А..
2	Сексеуил өсимлиги хам оның фитоценозлары хаққында.	Баспа	«Табийий пәнлерди оқытыў хам изертлеў мәселелери» атамасында Республикалық илимий-теориялық конференция материаллары топламы. Нөкис. НМПИ баспаханасы. 2017 ж. 430 бет. Б.343-344.	2 б.	Қосназаров. Қ.А..
3	BetaL.-один из представителей подсемейства Chenopodiaceae и о её видах в южном Приаралье.	Баспа	Ж-л. Молодой учёный. Международный научный журнал. № 34 (220) 2018.- С.25-29.	5 б.	Kosnazarov K.A.
4	Киноа (Chenopodium quinoa) өсимлиги хам оның әҳмийети.	Баспа	«Қубла Арал бойы биологиялық қартүрли лигинсақлаў, қайта тиклеў хам қорғаудың экологиялық мәселелери» атамасында Халықаралық илимий-теориялық конференция материаллары топламы. II-бөлим. Нөкис. НМПИ баспаханасы. 2018 ж. 322 бет. Б.158-159.	2 б.	Kosnazarov K.A.
5	Соралартүкымласының (Chenopodiaceae) ўақиллеринен лаблебилер (beta) хамолардың түрлері хаққында	Баспа	«Илим хам талим-тарбияның әҳмийетли мәселелери» атамасында Республикалық илимий-теориялық хам әмелий конференция материаллары топламы. 5-бөлим Нөкис. НМПИ баспаханасы 2018 ж. 154 бет. Б. 89-91.	3 б.	Kosnazarov K.A.

Автор: Абдуллаева Ж.К.

Магистратура бо'лим баслиғи : Аллабергенова М. Н.

2019-жil «_____» _____

2. Suwretler



Iytsiygek



Iytsiygek

Alaputa



Soleros



Solyanka



Sora Qizil qum ekispediytshiyasi waqiti.



Suwǵariatuǵın zonada momitoring.

Laboratoriyada o'simliklerdi aniqlaw.