

Matematika fani bo'yicha pedagogika institutlari maxsus sirtqi bo'limi uchun
o'quv- uslubiy qo'llanma

Муаллиф: Ismailov Sh.N., Atakulov A.M., Eshonchayeva G.N.
Яратилган: Ангрен-2005 й.
Категория: Педагогика
Булм: Математика ва информатика унутувчиси
Университет: Тошкент вилояти Давлат педагогика институти
Факультет: Математика ва физика
Кафедра: Математика

Аннотация

Mazkur o'quv-uslubiy qo'llanma pedagogika institutlarining maxsus sirtqi bo'limida tahsil olayotgan talabalar uchun muljallangan. Qo'llanma uz ichiga ma'ruzalar matni va individual vazifalarni olgan.


Mundarija

So'z boshi	5
1 – mavzu. Chiqli algebra elementlari.....	6
2 -mavzu. Matematik tahlil elementlari.	13
3-mavzu. Ehtimollar nazariyasining matematik asoslari. Matematik statistika elementlari.....	24
Adabiyotlar	28
ilova. Individual vazifalar.....	29

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi Vazirligi
Toshkent viloyat Davlat Pedagogika instituti

Ismailov Sh.N., Atakulov A.M., Eshonchayeva G.N.

4	9	2
3	5	7
8	1	6



ε	9	۲
۳	۵	۷
۸	۱	۶

Matematika

*Pedagogika institutlari maxsus sirtqi bo'limi
uchun o'quv- uslubiy qo'llanma*

Angren-2005 y.

UDK 51(075)
BBK 22.11я73

M 367

*Taqrizchi: TVDPI Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası
(kafedra mudiri TVDPI professori Abdiyev U.N.)*

TVDPI O'quv Metodik Kengashi qaroriga binoan nashr qilindi.

Ismailov Sh.N., Atakulov A.M., Eshonchayeva G.N.

M 367 Математика. O'quv-uslubiy qo'llanma. / Angren, 2005.
ISBN 5-88874-227-9.

Mazkur o'quv-uslubiy qo'llanma pedagogika institutlarining maxsus sirtqi bo'limida tahsil olayotgan talabalar uchun muljallangan.
Qo'llanma uz ichiga ma'ruzalar matni va individual vazifalarni olgan.

ISBN 5-88874-227-9

© Ismailov Sh. N., 2005

SO'Z BOSHI

Oliy ta'limning fundamentalligi real dunyodagi jarayonlar, ob'ektlar va xodisalar orasidagi munosabatlarni ajratib bila olishga yo'naltirilgan bo'lib, yuqori malakali yoshlarni tarbiyalashda asos sifatida qabul qilingan. Davlat ta'lim standartlari (DTS) tayyorlanayotgan kadrlarning malaka va kunikmalariga yuqori talablarni qo'yimoqda. Shu talablar zamonaviy sharoitlardan bevosita kelib chiqqan bo'lib, ularning maqsadi – ta'lim olayotgan yoshlardan milliy intellektual elitani shakllantirish, vaholanki matematik madaniyat — zamonaviy madaniyatning tarkibiy qismidir.

Matematika — yetarlicha umumiy nuqtai nazardan barcha miqdoriy munosabatlarni va fazoviy shakllarni klassifikatsiya qiladigan va o'rganadigan fan sifatida e'tirof e'tilib, uni o'qitishning asosiy maqsadi - talabalarni zamonaviy matematika fani insonning kundalik xayotida alohida o'rin tutishini isbotlash.

Albatta, o'quv soatlarining miqdori, tayanch tushunchalar majmuasining xajmi hamda talabalarining psixologok hususiyatlari xar bir professor-o'qituvchidan mavzuni bayon etishda yuksak e'tiborni va sabr-toqatni talab qilib, yangi axborot va ta'lim texnologiyalarning zamonaviy yutuqlardan foydalanishga chorlaydi.

Shuni ta'kidlashimiz lozimki, o'quv materialni bayon etishda tayanch tushunchalarni etarli darajada aniq va sodda berish maqsadga muvofiqdir. Albatta bunda asosiy g'oyalar va natijalarni ma'lum darajada erkin berishga majburiy. Agar teoremlarning isboti murakkab bo'lsa, uni to'la bermasdan, balki mantiqiy tomonlariga e'tiborni kuchaytirish kerak.

Amaliy mashg'ulotlarda tadbirlarda keng qo'llanilayotgan asosiy matematik usullarni o'rgatishga e'tiborni kuchaytirish lozim. Ma'lum sababalariga ko'ra ma'ruzaga kirmagan va murakkab bo'lgan tushunchalarni amaliy mashg'ulotlarda ko'rib o'tish maqsadga muvofiqdir.

2- ilovadagi vazifalar uyda bajariladi.

Tayanch tushunchalarni bayon etishda ShEHM, proektor kabi texnik vositalardan keng foydalanishi ko'zda tutilgan. Ma'ruzalarni slaydlarini yaratishda va ekranda namoyish qilishda Microsoft Power Point va Flash texnologiyalardan, ayrim sonli va analitik hisob-kitoblarda Maple kompyuter dasturidan foydalanish maqsadga muvofiq.

1- ilovadagi material asosida davra suxbatlarni utkazilishini tavsiya etamiz. Bunda talabalar Internet va boshqa manbaalardan foydalanib uzlari matematikaning inson turmushidagi o'rni, matematika metodlarining gumanitar va tabiiy fanlarga tatbiqu, matematikaning asosiy bo'limlari haqida tarixiy va boshqa ma'lumotlar, buyuk allomalar hayoti va ijodi, matematikaga qo'shgan hissalari kabi mavzular bo'yicha qisqacha ma'lumotlar bayon qiladilar. Tabiiyki, bunday tadbirlar talabalarda matematika faniga qiziqishni kuchaytiradi va yuqorida qayd etilgan maqsadlarga erishishga za'min yaratadi.

Mualliflar.

1 – MAVZU. CHIZIQLI ALGEBRA ELEMENTLARI.

1. Maqsad: Chiziqli algebraning asosiy usullarini bayon qilish.

2. Reja:

1. Matritsa tushunchasi.
2. Matritsalar ustida asosiy amallar.
3. Determinant.
4. Teskari matritsa.
5. Chiziqli tenglama va chiziqli tenglamalar sistemasi (ChTS).
6. Chiziqli tenglamalar sistemasining elementar almashtirishlari.
7. Gauss usuli.
8. Teskari matritsa usuli.
9. Kramer qoidasi

3. Mavzu bayoni

Matritsa tushunchasi.

$m \times n$ ta a_{ij} ($i=1, \dots, m, j=1, \dots, n$) sonlardan tashkil topgan

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

m satrli va n ustunli matritsa deyiladi. Shunday matritsalar to'plamini $R^{m \times n}$ orqali belgilaymiz.

Ustunlar (yoki satrlar) soni birga teng matritsa *vektor* deyiladi.

Ustunlar soni satrlar soniga teng matritsa *kvadrat* matritsa deyiladi.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ ko'rinishdagi kvadrat matritsa } \textit{diagonal} \text{ matritsa deb yuritiladi.}$$

m satrli va n ustunli ikkita A, B matritsalar *nomdosh* deyiladi.

Ta'rif. $A, B \in R^{m \times n}$, $A = (a_{ik})$, $B = (b_{ik})$ matritsalar uchun $a_{ik} = b_{ik}$, $i=1, \dots, m$, $k=1, \dots, n$, tengliklar bajarilsa, bu matritsalar *teng* deyiladi.

Matritsalar ustida asosiy amallar.

Ta'rif. $A, B \in R^{m \times n}$, $A = (a_{ik})$, $B = (b_{ik})$ matritsalar *yig'indisi* deb elementlari

$$c_{ik} = a_{ik} + b_{ik}, \quad i=1, \dots, m, \quad k=1, \dots, n,$$

tengliklarni qanoatlantiruvchi $C = (c_{ik}) \in R^{m \times n}$ matritsaga aytiladi va u $A + B$ orqali belgilanadi.

Misol. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 & 2+1 \\ 0+1 & 1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$,

Agar $A \in R^{m \times n}$, $\lambda \in R$ bo'lsa, u holda A matritsaning λ *skalyarga ko'paytmasi* deb $\lambda A = (b_{ik})$, $b_{ik} = \lambda a_{ik}$, $i=1, \dots, m$, $k=1, \dots, n$, matritsaga aytiladi.

Ta'rif. $A \in R^{m \times n}$, $B \in R^{n \times t}$, $A = (a_{ik})$, $B = (b_{ik})$ matritsalar *ko'paytmasi* deb

elementlari $c_{ik} = \sum_{p=1}^n a_{ip} b_{pk}$, $i=1, \dots, m$, $k=1, \dots, t$, tengliklarni qanoatlantiruvchi

$C = (c_{ik}) \in R^{m \times t}$ matritsaga aytiladi va u $A B$ orqali belgilanadi.

Shuni ta'kidlash lozimki, $A \in R^{m \times n}$, $B \in R^{n \times t}$ matritsalar uchun BA matritsa faqat $t=s$ bo'lganida aniqlangan. Bu holda $AB \in R^{m \times t}$, $BA \in R^{n \times n}$, Umuman aytganda $m=n$ bo'lganda ham (ya'ni $A \in R^{m \times m}$, $B \in R^{m \times m}$ matritsalar uchun $AB \neq BA$ bo'ladi, ya'ni ko'paytirish amali nokommutativ amaldir. Ushbuni qo'yidagi misol ko'rsatadi.

Misollar. A) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \\ 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 & 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} =$
 $= \begin{pmatrix} 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

b) $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 & 1 \cdot 4 & 1 \cdot 1 \\ 4 \cdot 2 & 4 \cdot 4 & 4 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 & 3 \cdot 4 & 3 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 8 & 16 & 4 \\ 6 & 12 & 3 \end{pmatrix}$.

c) $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 + 4 \cdot 4 + 1 \cdot 3 = 2 + 16 + 3 = 21$.

d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = (3 + 10 \quad 4 + 12) = (13 \quad 16)$.

Ta'rif. $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$ ko'rinishdagi n-tartibli diagonal kvadrat matritsa *birlik*

matritsa deyiladi.

$A \in R^{m \times n}$ matritsa uchun $AE = A$ o'rinli (agar bunda EA ko'paytma ham aniqlangan bo'lsa, u holda $EA = A$).

Teorema Matritsalar ko'paytirish amali assotsiativ bo'ladi, ya'ni agar $(A B)C$ va $A(BC)$ ko'paytmalardan birortasi mavjud bo'lsa, u holda ikkinchisi ham mavjud bo'lib, ular uchun $A(BC) = (A B)C$ munosabat o'rinli bo'ladi.

Bu teoremani isbot qilish uchun $A \in R^{m \times n}$, $B \in R^{n \times t}$, $C \in R^{t \times s}$ matritsalar uchun $(A B)C$ va $A(BC)$ matritsalar elementlari hisoblanib, biri biriga solishtiriladi.

Teorema . Matritsalar ko'paytirish amali qo'shishi amaliga nisbatan distributiv bo'ladi. Ya'ni $(A + B)C$ va $A B + AC$ ($A(B + C)$ va $A B + AC$) matritsalaridan birortasi mavjud bo'lsa, u holda ikkinchisi ham mavjud bo'lib, ular uchun $(A + B)C = A B + AC$ ($A(B + C) = A B + AC$) munosabat o'rinli bo'ladi.

Qo'yidagi xossalar o'rinli:

$$\alpha(B + C) = \alpha B + \alpha C; (\alpha + \beta)B = \alpha B + \beta B; (\alpha\beta)B = \alpha(\beta B); 1B = B; \alpha(BC) = (\alpha B)C = B(\alpha C)$$

Determinantlar.

Ta'rif. Ikkinchi tartibli $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \in R^{2 \times 2}$ kvadrat matritsaning *determinanti* (ya'ni 2 – tartibli determinant) deb

$$\det A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (1)$$

songa aytiladi.

Ta'rif. Uchinchi tartibli $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \in R^{3 \times 3}$ kvadrat matritsaning *determinanti* (ya'ni 3 –

–tartibli determinant) deb

$$\det A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} =$$

$$(3)$$

$$= a_{11} a_{22} a_{33} + a_{13} a_{21} a_{32} + a_{12} a_{13} a_{31} - a_{13} a_{22} a_{31} - a_{11} a_{13} a_{32} - a_{12} a_{21} a_{33} .$$

songa aytiladi.

3 –tartibli determinantni hisoblashga doir konkret misollarda turli mnemonik shoidalar mavjud. Shu shoidalar bilan sizlar amaliy mashg'ulotlarda tanishasizlar.

Misollar. a) $\begin{vmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 0 \end{vmatrix}$ ni hisoblaymiz. Bu uchun (3) formulaga ko'ra

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 0 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} - (-3) \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} =$$

$$= 2(-1 \cdot 0 - 2 \cdot 5) + 3(4 \cdot 0 - 2 \cdot 3) - 1(4 \cdot 5 - (-1) \cdot 3) = -61.$$

Misol. $\begin{pmatrix} 2 & -3 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ matritsa uchun M_{31} va A_{23} ni hisoblaymiz.

$$M_{31} = \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -3 \cdot 2 - (-1) \cdot (-1) = -6 - 1 = -7. A_{23} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = -(2 \cdot 5 - (-3) \cdot 3) = -19.$$

Teskari matritsa.

Ta'rif. $A \in R^{n \times n}$ kvadrat matritsa *teskarilantiruvchi* deyiladi, agar $AB=BA=E$ shartlarni qanoatlantiruvchi B matritsa mavjud bo'lsa, bu holda B matritsa A ga nisbatan *teskari matritsa* deb yuritiladi.

Ta'rifdan ko'rinib turibdiki, $B \in R^{n \times n}$, $E \in R^{n \times n}$ bo'ladi.

Biz ma'ruzamizda faqat $n=4$ holni qaraymiz.

A ga nisbatan teskari matritsani biz A^{-1} orqali belgilaymiz.

Teorema. Agar $A \in R^{3 \times 3}$ matritsaning determinanti noldan farqli bo'lsa, u holda formula o'rinli.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$$

Misol. $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ bo'lsa A^{-1} ni toping.

Yechim. $\det A = \begin{vmatrix} 5 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 5(4-9) + 1(2-12) - 1(3-8) = -25 - 10 + 5 = -30.$

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -5; \quad M_{21} = \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 1; \quad M_{31} = \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -1;$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = -10; \quad M_{22} = \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 14; \quad M_{32} = \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 16;$$

$$\begin{aligned}
a_{11}^{-1} &= \frac{5}{30}; & a_{12}^{-1} &= \frac{1}{30}; & a_{13}^{-1} &= \frac{1}{30}; \\
a_{21}^{-1} &= -\frac{10}{30}; & a_{22}^{-1} &= -\frac{14}{30}; & a_{23}^{-1} &= \frac{16}{30}; \\
a_{31}^{-1} &= \frac{5}{30}; & a_{32}^{-1} &= \frac{19}{30}; & a_{33}^{-1} &= -\frac{11}{30};
\end{aligned}$$

Demak, $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{30} & \frac{1}{30} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & \frac{8}{15} \\ \frac{1}{6} & \frac{19}{30} & -\frac{11}{30} \end{pmatrix}.$

$$A A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{30} & \frac{1}{30} & \frac{1}{30} \\ -\frac{10}{30} & -\frac{14}{30} & \frac{16}{30} \\ \frac{5}{30} & \frac{19}{30} & -\frac{11}{30} \end{pmatrix} = \frac{1}{30} \begin{pmatrix} 25+10-5 & 5+14-19 & 5-16+11 \\ 5-20+15 & 1-28+57 & 1+32-33 \\ 20-30+10 & 4-42+38 & 4+48-22 \end{pmatrix} = E.$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} & a_{1,r+1} & \dots & a_{1n} \\ & a_{22} & \dots & a_{2r} & a_{2,r+1} & \dots & a_{2n} \\ & & \ddots & & & & \\ \bigcirc & & & a_{rr} & a_{r,r+1} & \dots & a_{rn} \end{pmatrix},$$

Chiziqli tenglama va chiziqli tenglamalar sistemasi (ChTS).

$$a_1x_1+a_2x_2+...+a_nx_n=b \quad (1)$$

Agar $b = 0$ бўlsa, u =olda (1) ga *birjinsli chiziqli tenglama* , aks holda *birjinsli бўlmagan chiziqli tenglama* deyiladi.

Ravshanki, har qanday bir jinsli chiziqli tenglama nol yechimga ega.

$$\underline{Ta'rif} \left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_2 \\ \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right. \quad (2)$$

$x_1, x_2, \dots, x_n$ lar ChTSni noma'lumlari, $a_{ik} \in R$ – ChTS koefitsientlari, va $b_k \in R$ esa ozod hadlar deyiladi. (2) sistemani qanoatlantiruvchi $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ vektor uning yechimi deyiladi. Agar (2) da barcha b_k sonlar nolga teng bõlsa, u holda (2) ga *bir-jinsli ChTS* (BChTS), aks holda u *birjinsli bõlmagan ChTS* deyiladi.

Ravshanki ixtiyoriy BChTS nol yechimga ega бўлади.

Chiziqli tenglamalar sistemasining elementar almashtirishlari.

[illegible]

sistemaga chiziqli tenglamalar sistemasi berilgan бўлсин.

Ta'rif. qōyidagi almashtirishlar ChTSni *elementar almashtirishlari* deyiladi:

- a) ChTS birorta tenglamasini nolmas skalyarga kōpaytirish.
- b) ChTS birorta tenglamasini nolmas skalyarga kōpaytirib, boshqa tenglamaga qōshish.
- v) Ozod hadi va koeffitsientlari nolga teng bōlgan tenglamani tashlab yuborish.
- g) ChTS tenglamalari ōrinlarini almashtirish.

Teorema. ChTS ustida chekli sondagi elementar almashtirishlar bajarilsa, hosil bōlgan ChTS yechimlar to'plami berilgan ChTS yechimlar to'plami bilan ustma –ust tushdi.

Gauss usuli (Karl Fridrix Gauss (1777-1855) – nemis matematigi).

Avvalambor (1) sistemada ozod hadi va koeffitsientlari nolga teng bōlgan tenglamalar yōq deb faraz qilamiz, aks holda ularni barchasini tashlab yuboramiz .

Agar (1) sistemada ozod hadi noldan farqli bōlib, koeffitsientlari esa 0 ga teng bōlgan tenglamalar mavjud bōlsa, u holda (1) yechimga ega emas.

Shuning uchun (1) sistemani yechishdan oldin , undagi tenglamalarda noldan farqli koeffitsientlar mavjud deb qabul qilamiz.

Zarur bōlsa, numeratsiyani ōzgartirib, $a_{11} \neq 0$ deb qabul qilamiz.

(1) sistemani k –nchi tenglamaga ($k=2,3,...,m$) birinchi tenglamani $-\frac{a_{k1}}{a_{11}}$ ga kōpaytirib qōshib

chiqamiz. Natijada $2,3,...,m$ tenglamalarda x_1 noma'lum yōqoladi va qōyidagi (1) ga ekvivalent sistema hosil bōladi:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{22}'x_2 + \dots + a_{2n}'x_n = b_2' \\ \dots \\ a_{m2}'x_2 + \dots + a_{mn}'x_n = b_m' \end{cases} \quad (2)$$

Agar (2) sistemada ozod hadi noldan farqli bōlib, koeffitsientlari esa 0 ga teng bōlgan tenglamalar mavjud bōlsa, u holda (2) va (1) sistemalar yechimga ega emas.

(2) sistemada ozod hadi va koeffitsientlari nolga teng bōlgan tenglamalar yōq deb faraz qilamiz, aks holda ularni barchasini tashlab yuboramiz .

Zarur bōlsa, numeratsiyani ōzgartirib, $a_{22}' \neq 0$ deb qabul qilamiz va

$$\begin{cases} a_{22}'x_2 + \dots + a_{2n}'x_n = b_2' \\ \dots \\ a_{m2}'x_2 + \dots + a_{mn}'x_n = b_m' \end{cases}$$

sistemani qaraymiz.

Ushbu sistemaning $2,3,...,m-1$ tenglamalarda x_2 noma'lum yōqotiladi va h.k.

Noma'lumlar yōqotish jarayonini davom ettirib, natijada qōyidagi sistemaga kelamiz:

$$\begin{cases} c_{11}x_1' + c_{12}x_2' + \dots + c_{1r}x_r' + c_{1,r+1}x_{r+1}' + \dots + c_{1n}x_n' = d_1 \\ c_{22}x_2' + \dots + c_{2r}x_r' + c_{2,r+1}x_{r+1}' + \dots + c_{2n}x_n' = d_2 \\ \dots \\ c_{rr}x_r' + c_{r,r+1}x_{r+1}' + \dots + c_{rn}x_n' = d_r \end{cases} \quad (3)$$

bu yerda $c_{11}, c_{22}, \dots, c_{rr}$ noldan farqli, $x_1', x_2', \dots, x_n'$ noma'lumlar $x_1, x_2, \dots, x_n$ larni ōrin almashtirish natijasida hosil bōlgan noma'lumlar.

(3) turdagi sistema *zinasimon* deyiladi, $r=n$ xususiy holda *uchburchaksimon* deyiladi. $x_1', x_2', \dots, x_r'$ noma'lumlar *bosh noma'lumlar*, $x_{r+1}', x_{r+2}', \dots, x_n'$ noma'lumlar esa *ozod noma'lumlar* deb yuritiladi.

Ravshanki, uchburchaksimon sistemada ozod noma'lumlar mavjud bōlmasdan, barcha noma'lumlar aniq qiymatlari pastdan qarab ketma–ket topiladi.

$r < n$ holdida ozod noma'lumlarni biror qiymatini fiksirlab va ʻong tarafga ʻotkazib, natijada uchburchaksimon sistemani hosil qilamiz.

Bundan keyin bosh noma'lumlar aniq qiymatlari pastdan qarab ketma-ket topiladi.

(1) sistemani echishda Gauss usulidagi hisob-kitoblarni

$$\left(\begin{array}{ccccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_n \end{array} \right) \left| \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right. \text{matritsa ustida olib borish maqsadga muvofiq. Natijada u}$$

zinasimon matritsaga olib kelinadi.

Misol. qōyidagi ChTSni eching.

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x + 3y - 5z = 5 \\ 3x + 4y - 6z = 7 \end{cases}$$

Yechim. $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & -5 & 5 \\ 3 & 4 & -6 & 7 \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

Ohirgi matritsaga mos bōlgan sistema qōyidagicha yoziladi: $\begin{cases} x + y - z = 2 \\ y - 3z = -1 \end{cases}$.

Bu yerda x, y – asosiy noma'lumlar, z esa ozod noma'lum.

Ozod noma'lumni fiksirlaymiz: $z = t$. Natijada

$$\begin{cases} x + y = 2 + t \\ y = -1 + 3t \end{cases} \text{ sistema hosil bōladi. Bundan } (3 - 2t, -1 + 3t, t), t \in \mathbb{R}, \text{ yechimlar oilasini hosil}$$

qilamiz.

Teskari matritsa usuli.

Bu bandda biz

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases} \quad (4)$$

ko'rinishdagi ChTS yechimini izlaymiz.

$$\text{Quyidagi belgilashlarni kiritamiz: } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}; \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

Faraz qilamiz A matritsa Δ determinanti noldan farqli.

(4) ChTS quyidagicha yozishimiz mumkin: $A \cdot X = B$.

Demak, $A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$. Ammo $E \cdot X = A^{-1} \cdot B$. U holda (4) teskari matritsa yagonaligidan ChTS $X = A^{-1}B$ ko'rinishdagi yagona yechimga ega.

Misol. $\begin{cases} 5x - y - z = 0 \\ x + 2y + 3z = 14 \\ 4x + 3y + 2z = 16 \end{cases}; X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 \\ 14 \\ 16 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

Oldingi ma'ruzada biz $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{30} & \frac{1}{30} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & \frac{8}{15} \\ \frac{1}{6} & \frac{19}{30} & -\frac{11}{30} \end{pmatrix}$ ni topganmiz.

$$\text{Demak, } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1}B = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{30} & \frac{1}{30} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{7}{15} & \frac{8}{15} \\ \frac{1}{6} & \frac{19}{30} & -\frac{11}{30} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 14 \\ 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} \cdot 0 + \frac{14}{30} + \frac{16}{30} \\ -\frac{1}{3} \cdot 0 - \frac{98}{15} + \frac{128}{15} \\ \frac{1}{6} \cdot 0 + \frac{266}{30} - \frac{176}{30} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Kramer qoidasi. (Kramer Gabriel' (1704-1752) – Sveysariya matematigi)

Agar $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ matritsa Δ determinanti noldan farqli bo'lsa, u holda (4) ChTSning

yechimi $x_1 = \Delta_1/\det A$; $x_2 = \Delta_2/\det A$; $x_3 = \Delta_3/\det A$ formulalar bo'yicha topiladi, bu yerda

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}; \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}; \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}.$$

Misol.
$$\begin{cases} 5x - y - z = 0 \\ x + 2y + 3z = 14 \\ 4x + 3y + 2z = 16 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -30; \Delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 14 & 2 & 3 \\ 16 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -30; \Delta_2 = \begin{vmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 1 & 14 & 3 \\ 4 & 16 & 2 \end{vmatrix} = -60; \Delta_3 = \begin{vmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 14 \\ 4 & 3 & 16 \end{vmatrix} = -90.$$

Demak, $x_1 = \Delta_1/\Delta = 1$; $x_2 = \Delta_2/\Delta = 2$; $x_3 = \Delta_3/\Delta = 3$.

4. Tayanch tushunchalar:

Matritsalar ustida asosiy amallar va ularning asosiy xossalari, determinantlar, teskari matritsa. Chiziqli tenglamalar, chiziqli tenglamalar sistemasi, yechim, elementar almashtirishlar, ekvivalent sistemalar, Gauss usuli, bosh va ozod noma'lumlar, teskari matritsa usuli, Kramer qoidasi.

5. Nazorat savollari.

1. Matritsalar ustida amallarning ta'rifini va hossalari bayon qiling.
2. Qarama-qarshi matritsa qanday aniqlanadi? U qanday hossalarga ega?
3. Determinant haqida tushuncha bering.
4. Teskari matritsa deb nimaga aytiladi?
5. Teskari matritsa qanday hisoblanadi?
6. Gauss usulini bayon qiling.
7. Teskari matritsa usulini bayon qiling.
8. Kramer qoidasini bayon qiling.

2 -MAVZU. MATEMATIK TAHLIL ELEMENTLARI.

1. Maqsad: Matematik tahlil asoslarini takrorlash.

2. Reja:

1. Sonli funktsiyalar.
2. Funktsiya limiti va uzluksiz funktsiyalar xaqida tushuncha.
3. Funktsiya limitini hisoblash
4. Hosila tushunchasi. Hosilalar jadvali.
5. Differentsiallanuvchi funktsiyalar hossalari.
6. Hosila tadbiqlari.

3. Mavzu bayoni.

Sonli funktsiyalar.

R orqali xaqiqiy sonlar to'plamini belgilaymiz. Uning qism to'plamlarini sonli to'plamlar deb yuritamiz.

Ta'rif. D sonli to'plamlarga tegishli har bir x soniga biror qoidaga binoan x ga bog'liq bo'lgan y sonni taqqoslovchi moslik aniqlanish sohasi D dan iborat bo'lgan sonli funktsiya (funktsiya) deyiladi.

Funktsiyalar odatda lotin xarflari bilan belgilanadi. Ixtiyoriy f funktsiyani qaraymiz. x ga mos bo'lgan y sonni f funktsiyaning x nuqtadagi qiymati deyiladi va $f(x)$ orqali belgilanadi.

D to'plam f funktsiyaning aniqlanish sohasi deyiladi va $D(f)$ orqali belgilanadi.

Ko'pincha sonli funktsiya formula yordamida berilgan bo'lib, uning aniqlanish sohasi argumentlarning joiz qiymatlaridan iborat (ushbu aniqlanish sohasi tabiiy deyiladi).

Ta'rif. f funktsiya berilgan bo'lsin.

a) $\{y / (\exists x \in D(f)) y = f(x)\}$ to'plam f funktsiyaning *qiymatlar to'plami* deb yuritiladi va $E(f)$ orqali belgilanadi.

b) $\{(x, y) \in \mathbf{R}^2 / x \in X, y = f(x)\}$ kurinishdagi to'plam f funktsiyaning grafigi deyiladi.

Funktsiyalar ustida algebraik amallar qo'yidagicha kiritiladi:

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x), D(f \pm g) = D(f) \cap D(g)$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) g(x), D(f \cdot g) = D(f) \cap D(g)$$

$$\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, D\left(\frac{f}{g}\right) = \{x \in D(f) \cap D(g) / g(x) \neq 0\}$$

Ta'rif. f, g funktsiyalar uchun $h(x) = g(f(x))$ tenglik bilan aniqlangan va aniqlanish sohasi $D(h) = \{x \in D(f) / f(x) \in D(g)\}$ bo'lgan h funktsiya *murakkab funktsiya* deyiladi va u $g \circ f$ yoki $g \circ f$ orqali belgilanadi.

Adabiyotlarda $g \circ f$ funktsiya g va f funktsiyalar *superpozitsiyasi* yoki *kompozitsiyasi* deb yuritiladi.

Ta'rif. f funktsiya uchun $(f \circ g)(x) = x, \forall x \in D(f)$ va $(g \circ f)(x) = x, \forall x \in D(g)$ tengliklarni ta'minlovchi g funktsiya mavjud bo'lsa, u holda f funktsiya *teskarilanuvchi funktsiya*, g funktsiya esa f *funktsiyaga teskari funktsiya* deyiladi va f^{-1} orqali belgilanadi.


Funktsiya limiti va uzluksiz funktsiyalar xaqida tushuncha.

$f(x)$ funktsiya x_0 biror atrofida aniqlangan bo'lsin.

Ta'rif. a soni $y = f(x)$ funktsiyaning x_0 nuqtada limiti deyiladi $\left[a = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right]$, agar

ixtiyoriy $\varepsilon > 0$ uchun shunday $\delta(\varepsilon) > 0$ mavjudki, $0 < |x - x_0| < \delta(\varepsilon)$ qushtengsizlikni

qanoatlantiradigan barcha x lar uchun $|f(x) - a| < \varepsilon$ tengsizlik o'rinli bo'lsa (1-rasm).



1- rasm.

Funktsiya limitini hisoblash

Ajoyib limitlar:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1. \quad \text{- I-ajoyib limit}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e \quad \text{- II -ajoyib limit.}$$

II - ajoyib limitdan qo'yardagi tengliklar kelib chiqadi:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$

Misollar.

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^3 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{x(x-1)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x(x+1)} = 0;$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 3x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin 3x}{3x \cos 3x} = 3.$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 10} \frac{\sqrt{x-1}-3}{x-10} = \left[\begin{array}{l} \sqrt{x-1} = t \\ x = t^2 + 1 \\ x \rightarrow 10 \Rightarrow t \rightarrow 3 \end{array} \right] = \lim_{t \rightarrow 3} \frac{t-3}{t^2-9} = \lim_{t \rightarrow 3} \frac{t-3}{(t-3)(t+3)} = \frac{1}{6}$$

d)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \frac{1}{2}.$$

e)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-2} \right)^{2x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-2+5}{x-2} \right)^{2x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{x-2} \right)^{\frac{x-2}{5} \cdot \frac{5}{x-2} (2x+1)} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5(2x+1)}{x-2}} = e^{10}.$$

Agar $f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ bo'lsa, u holda f funktsiya x_0 nuqtada *uzluksiz* deyiladi.

Agar f funktsiya I sonli to'plamning barcha nuqtalarida uzluksiz bo'lsa, u holda u I to'plamda *uzluksiz* deyiladi.

Ko'pincha I sonli to'plam sifatida oraliq qaraladi va ushbu oraliq *uzluksizlik oraliq*'i deyiladi.


Shuni ta'kidlash lozimki, maktab matematikasida o'rganilgan deyarli barcha funktsiyalar o'zining tabiiy aniqlanish sohalarida uzluksiz funktsiyalar bo'ladi.

Hosila tushunchasi.

Ta'rif. $y = f(x)$ funktsiyaning x_0 nuqtadagi *hosilasi*

$$y'(x_0) = f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(f(x_0 + \Delta x) - f(x_0))}{\Delta x} \text{ formula bilan aniqlanadi.}$$

f funktsiyaning x_0 nuqtadagi hosilasi ushbu funktsiyaning grafigiga $M=(x_0, f(x_0))$ nuqta orqali o'tkazilgan o'rinmaning *burchak koeffitsientini* bildiradi, ya'ni $f'(x) = \operatorname{tg} \varphi_0$ (2-rasm)



2-rasm

Agar f funktsiyaning x_0 nuqtada chekli hosilaga ega bo'lsa, u holda ushbu funktsiya x_0 nuqtada *differentsiallanuvchi* deyiladi, biror to'plamning barcha nuqtalarda differentsiallanuvchi funktsiya esa mazkur to'plamda *differentsiallanuvchi* deb yuritiladi.

Shunday qilib, berilgan nuqtada differentsiallanuvchi f funktsiyaga uning shu nuqtadagi f' hosilasini mos qo'yish mumkin. Ushbu moslik yordamida aniqlangan f' funktsiya f funktsiyaning hosilasi deyiladi va u qo'yidagi aniqlanish sohaga ega

$$D(f') = \{x_0 \in D(f) / \exists \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(f(x_0 + \Delta x) - f(x_0))}{\Delta x}\}.$$

Agar f' hosila o'zi biror $x_0 \in D(f')$ nuqtada differentsiallanuvchi bo'lsa, u holda uning $(f')'(x_0)$ hosilasi f funktsiyaning x_0 nuqtadagi *ikkinchi tartibli hosilasi* deyiladi va $f''(x_0)$ yoki

$$\frac{d^2 f(x_0)}{d^2 x} \text{ orqali belgilanadi.}$$

$f^{(n)}(x_0) = (f^{(n-1)})'(x_0)$ rekkurent formula yordamida f funktsiyaning x_0 nuqtadagi n - *tartibli hosilasini* aniqlashimiz mumkin.

Hosilalar jadvali.

$$1) C' = 0;$$

$$2) (x^m)' = mx^{m-1};$$

$$3) (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$4) \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

$$5) (e^x)' = e^x$$

$$9) (\sin x)' = \cos x$$

$$10) (\cos x)' = -\sin x$$

$$11) (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$12) (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$13) (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Differentsiallanuvchi funktsiyalar hossalari.

Agar f, g funktsiyalar x_0 nuqtada differentsiallanuvchi bo'lsa, u holda $f \pm g$,

$f \cdot g, \left(\frac{f}{g}\right)$ (agar maxraji noldan farqli bo'lsa) ham shu nuqtada differentsiallanuvchi bo'lib, qo'yidagi formulalar o'rinli:

$$a) (f \pm g)' = f' \pm g' \quad b) (f \cdot g)' = f'g + fg' \quad v) \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Misol. a) $y = x^3 + \ln x$; b) $y = (x^3 - 5)\sin x$; v) $y = \frac{x^3 - 5}{x^4 + 3}$ funktsiyalarning hosilasini toping.

Yechish. a) $y' = (x^3)' + (\ln x)' = 3x^2 + \frac{1}{x}$;

b) $y' = (x^3 - 5)' \sin x + (x^3 - 5) \sin' x = 3x^2 \sin x + (x^3 - 5) \cos x$

c) $y' = \frac{(x^3 - 5)'(x^4 + 3) - (x^3 - 5)(x^4 + 3)'}{(x^4 + 3)^2} = \frac{3x^3(x^4 + 3) - (x^3 - 5) \cdot 4x^4}{(x^4 + 3)^2} = \frac{-x^6 + 20x^3 + 9x^2}{(x^4 + 3)^2}$

2) Agar $y = f(x)$, $u = g(x)$ ($D(u) \subset D(y)$) funktsiyalar differentsiallanuvchi bo'lsa, u holda $y = f(g(x))$ murakkab funksiya differentsiallanuvchi bo'lib, qo'yidagi formula o'rinli:

$$y' = f'(u) \cdot u'$$

Misol. $y = \cos(x^3 - x^2 + 2)$ funktsiyaning hosilasini toping.

Yechish. $u = x^3 - x^2 + 2$, $u' = 3x^2 - 2x$, $y = \cos u$, $f'(u) = -\sin u$, demak

$$y' = (\cos(x^3 - x^2 + 2))' = -(3x^2 - 2x) \sin(x^3 - x^2 + 2)$$

Hosila tadbiqlari.

Ta'rif. Agar ixtiyoriy turli $x_1, x_2 \in (a, b) \subset D(f)$ nuqtalar uchun $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$

ifoda musbat (manfiy) qiymatlarni qabul qilsa, u holda f funktsiya (a, b) oraliqda *o'suvchi* (*kamayuvchi*) funktsiya deyiladi, (a, b) oraliq esa *monotonlik oralig'i* deyiladi

Ta'rif. Agar f funktsiyaning $x_0 \in D(f)$ nuqtadagi qiymati bu nuqtaning etarli-cha kichik atrofidagi qolgan nuqtalardagi qiymatlaridan katta (kichik) bo'lsa, f funktsiya x_0 nuqtada *lokal maksimumga* (*lokal minimumga*) erishadi deyiladi.

Ta'rif. Agar f funktsiya I to'plamda (I to'plam sifatida oraliq yoki kesma qaralishi mumkin) aniqlangan bo'lib, uning biror $x_0 \in I$ nuqtadagi qiymati I to'plamning qolgan nuqtalardagi qiymatlaridan kichik emas (katta emas) bo'lsa, f funktsiya x_0 nuqtada *maksimumga* (*minimumga*) erishadi deyiladi. Funktsiyaning maksimum (minimum) nuqtaga mos bo'lgan qiymati *maksimum* (*minimum*) deyiladi va $\max_I f(x)$ ($\min_I f(x)$) orqali belgilanadi.

Funktsiyaning minimumlari va maksimumlari funktsiyaning *ekstremumlari* deyiladi.

Teorema (*o'sish va kamayish sharti*). Agar f funktsiyaning ixtiyoriy $x \in (a, b) \subset D(f)$ nuqtasi uchun $f'(x)$ ifoda musbat (manfiy) qiymatlarni qabul qilsa, u holda f funktsiya (a, b) oraliqda *o'suvchi* (*kamayuvchi*) funktsiya bo'ladi.

Misol. $y = x^3 - x^2 - x + 2$ funktsiyaning monotonlik oraliqlarini toping.

Yechish. $y' = (x^3 - x^2 - x + 2)' = 3x^2 - 2x - 1 = 3(x - 1)(x + \frac{1}{3})$. Demak, $(-\frac{1}{3}, 1)$ da funktsiya

kamayadi, $(-\infty, -\frac{1}{3}) \cup (1, +\infty)$ da esa o'sadi.

Teorema (*ekstremumning zaruriy sharti*) Agar f funktsiya $x_0 \in D(f)$ nuqtada lokal ekstremumga erishsa, u holda f funktsiyaning hosilasi x_0 nuqtadagi qiymati nolga teng bo'ladi.

Teorema (*ekstremumning etarli sharti*). Agar $f'(x_0) = 0$ bo'lib, $f''(x_0) < 0$ ($f''(x_0) > 0$) bajarilsa, u holda f funktsiya x_0 nuqtada lokal maksimumga (lokal minimumga) erishadi.

Misol. $y = x^3 - x^2 - x$ funktsiyaning $[0,2]$ da ekstremumlari topilsin.

Yechish. $y' = (x^3 - x^2 - x)' = 3x^2 - 2x - 1 = 3(x-1)(x+\frac{1}{3}) = 0$. $[0,2]$ kesmaga faqat

$x=1$ «shubhali» nuqta tegishli. $y''(1) = 4 > 0$ bo'lgani uchun $x=1$ – lokal minimum nuqtasi bo'ladi. $y(1) = -1$, $y(0)=0$, $y(2)=2$ dan $x=1$ – minimum, $x=2$ maksimum nuqtalari.

Demak, $\max_{[0,2]} y = y(2)=2$, $\min_{[0,2]} y = y(1) = -1$.

Boshlang'ich funktsiya va aniqlanmas integral.

Ta'rif. Biror (a, b) oraliqda aniqlangan f funktsiyaning *boshlang'ich funktsiyasi* deb shu oraliqning barcha nuqtalarda $F'(x)=f(x)$ shartni qanoatlantiradigan $F(x)$ funktsiyaga aytiladi.

Agar $F(x)$ va $F(x)$ funktsiyalar f funktsiyaning boshlang'ich funktsiyalari bo'lsa, u holda $F(x) = F(x)+C$ bo'ladi, bu yerda C - uzgarmas son, va aksincha, agar $F(x)$ funktsiya f funktsiyaning boshlang'ich funktsiyasi bo'lsa, u holda $F(x) = F(x)+C$ funktsiya ham f funktsiyaning boshlang'ich funktsiyasi bo'ladi.

Ta'rif. Agar $F(x)$ funktsiya f funktsiyaning boshlang'ich funktsiyasi bo'lsa, u holda $F(x) = F(x)+C$ ko'rinishdagi barcha funktsiyalar to'plami f funktsiyadan *aniqlanmas integrali* deyiladi va u $\int f(x)dx$ kabi belgilanadi.

Integrallar jadvali

1	$\int \operatorname{tg} x dx$	$-\ln \cos x + C$	9	$\int e^x dx$	$e^x + C$
2	$\int \operatorname{ctg} x dx$	$\ln \sin x + C$	10	$\int \cos x dx$	$\sin x + C$
3	$\int a^x dx$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	11	$\int \sin x dx$	$-\cos x + C$
4	$\int \frac{dx}{a^2 + x^2}$	$\frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$	12	$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx$	$\operatorname{tg} x + C$
5	$\int \frac{dx}{x^2 - a^2}$	$\frac{1}{2a} \ln \left \frac{x+a}{x-a} \right + C$	13	$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx$	$-\operatorname{ctg} x + C$
6	$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}$	$\ln \left x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right + C$	14	$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}}$	$\arcsin \frac{x}{a} + C$
7	$\int x^\alpha dx$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \alpha \neq -1$	15	$\int \frac{dx}{x}$	$\ln x + C$

Integrallash usullari

Aniqlanmas integral ta'rifidan qo'yidagi integrallash qoidalarini kelib chiqadi:

a) $\int F'(x)dx = F(x)$; b) $\int c f(x)dx = c \int f(x)dx$; c) $\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$;

d) $\int u'(x)v(x)dx = u(x)v(x) - \int u(x)v'(x)dx$ – bo'laklab integrallash ;

e) $x=g(t) \Rightarrow \int f(x)dx = \int f(g(t))g'(t)dt$ – almashtirish yordamida integrallash;

Misollar.

$$\int (2x+1)^{20} dx = \{2x+1=t; \quad dt=2dx;\} = \int t^{20} \cdot \frac{1}{2} dt = \frac{1}{21} t^{21} \cdot \frac{1}{2} + C = \frac{t^{21}}{42} + C = \frac{(2x+1)^{21}}{42} + C$$

$$\int \frac{\sqrt{2-x^2} + \sqrt{2+x^2}}{\sqrt{4-x^4}} dx = \int \frac{\sqrt{2-x^2} + \sqrt{2+x^2}}{\sqrt{2-x^2} \sqrt{2+x^2}} dx = \int \frac{dx}{\sqrt{2+x^2}} + \int \frac{dx}{\sqrt{2-x^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2+2} \right| +$$

$$+ \arcsin \frac{x}{\sqrt{2}} + C.$$

$$\int \frac{\cos x}{\sqrt{\sin^3 x}} dx = \int \sin^{-3/2} x \cos x dx = \{\sin x = t; \quad dt = \cos x dx\} = \int t^{-3/2} dt = -2t^{-1/2} + C =$$

$$= -2\sin^{-1/2} x + C = -\frac{2}{\sqrt{\sin x}} + C.$$

Bo'laklab integrallash qoidasi yordamida qo'yidagi ko'rinishda integrallar topiladi:

$$\int Q(x) \left\{ \begin{matrix} e^x \\ \sin x \\ \cos x \end{matrix} \right\} dx = \int Q(x) d \left\{ \begin{matrix} e^x \\ -\cos x \\ \sin x \end{matrix} \right\}. \quad ; \quad \int f(x) \left\{ \begin{matrix} \ln x \\ \arcsin(x) \end{matrix} \right\} dx = \int \left\{ \begin{matrix} \ln x \\ \arcsin(x) \end{matrix} \right\} dF(x).$$

Misol : $\int x^2 \sin x dx = \left\{ \begin{matrix} u = x^2; & dv = \sin x dx; \\ du = 2x dx; & v = -\cos x \end{matrix} \right\} = -x^2 \cos x + \int \cos x \cdot 2x dx =$

$$= \left\{ \begin{matrix} u = x; & dv = \cos x dx; \\ du = dx; & v = \sin x \end{matrix} \right\} = -x^2 \cos x + 2 \left[x \sin x - \int \sin x dx \right] = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C.$$

Bo'laklab integrallash qoidasini bir nexha marta takrorlash mumkin.

$$\int x^2 e^{5x} dx = \left\{ \begin{matrix} u = x^2; & dv = e^{5x} dx; \\ du = 2x dx; & v = \frac{e^{5x}}{5}; \end{matrix} \right\} = \frac{1}{5} e^{5x} x^2 - \int \frac{1}{5} e^{5x} 2x dx = \frac{x^2 e^{5x}}{5} - \frac{2}{5} \int x e^{5x} dx =$$

$$= \left\{ \begin{matrix} u = x; & dv = e^{5x} dx; \\ du = dx; & v = \frac{1}{5} e^{5x}; \end{matrix} \right\} = \frac{x^2 e^{5x}}{5} - \frac{2}{5} \left[\frac{x e^{5x}}{5} - \int \frac{1}{5} e^{5x} dx \right] = \frac{x^2 e^{5x}}{5} - \frac{2x e^{5x}}{25} + \frac{2}{25} \int e^{5x} dx =$$

$$= \frac{x^2 e^{5x}}{5} - \frac{2x e^{5x}}{25} + \frac{2 e^{5x}}{125} = \frac{e^{5x}}{5} \left(x^2 - \frac{2x}{5} + \frac{2}{25} \right).$$

Trigonometrik funktsiyalarni integrallashda darajani pasaytirish va qo'yidagi formulalardan foydalanish maqsadga muvofiq:

$$\int \cos mx \cos n x dx = \int \frac{1}{2} [\cos(m+n)x + \cos(m-n)x] dx = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(m+n)x}{m+n} + \frac{\sin(m-n)x}{m-n} \right]$$

$$\int \sin mx \cos n x dx = \int \frac{1}{2} [\sin(m+n)x + \sin(m-n)x] dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{\cos(m+n)x}{m+n} - \frac{\cos(m-n)x}{m-n} \right]$$

$$\int \sin mx \sin n x dx = \int \frac{1}{2} [-\cos(m+n)x + \cos(m-n)x] dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{\sin(m+n)x}{m+n} + \frac{\sin(m-n)x}{m-n} \right]$$

Misollar. a) $\int \sin 7x \sin 2x dx = \frac{1}{2} \int \cos 5x dx - \frac{1}{2} \int \cos 9x dx = \frac{1}{10} \sin 5x - \frac{1}{18} \sin 9x + C.$

b)

$$\int \sin 10x \cos 7x \cos 4x dx = \int \sin 10x [\cos 7x \cos 4x] dx = \frac{1}{2} \int \sin 10x \cos 11x dx + \frac{1}{2} \int \sin 10x \cos 3x dx =$$

$$= \frac{1}{4} \int \sin 21x dx - \frac{1}{4} \int \sin x dx + \frac{1}{4} \int \sin 13x dx + \frac{1}{4} \int \sin 7x dx = -\frac{1}{84} \cos 21x - \frac{1}{4} \cos x - \frac{1}{52} \cos 13x -$$

$$-\frac{1}{28} \cos 7x + C.$$

c)

$$\begin{aligned}\int \sin^4 x dx &= \int \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1 - \cos 2x)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) dx = \\ &= \frac{1}{4} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x dx + \frac{1}{4} \int \cos^2 2x dx = \frac{x}{4} - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{4} \int \frac{1}{2} (1 + \cos 4x) dx = \frac{x}{4} - \frac{\sin 2x}{4} + \\ &+ \frac{1}{8} \left[\int dx + \int \cos 4x dx \right] = \frac{x}{4} - \frac{\sin 2x}{4} + \frac{x}{8} + \frac{\sin 4x}{32} = \frac{1}{4} \left[\frac{3x}{2} - \sin 2x + \frac{\sin 4x}{8} \right] + C.\end{aligned}$$

$$R(x) = \frac{Q(x)}{P(x)} \text{ to'g'ri algebraik kasrni } (P(x) = (x-a)^\alpha \dots (x-b)^\beta (x^2+px+q)^\lambda \dots (x^2+rx+s)^\mu$$

integrallash uchun u $\frac{1}{ax+b}; \frac{Mx+N}{ax^2+bx+c}; \frac{1}{(ax+b)^m}; \frac{Mx+N}{(ax^2+bx+c)^n}$ ko'rinishdagi sodda

kasrlarga ajratiladi ($m \geq 2, n \geq 2$ – natural sonlar va $b^2 - 4ac < 0$):

$$\begin{aligned}\frac{Q(x)}{P(x)} &= \frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_\alpha}{(x-a)^\alpha} + \dots + \frac{B_1}{(x-b)} + \frac{B_2}{(x-b)^2} + \dots + \frac{B_\beta}{(x-b)^\beta} + \frac{M_1x+N_1}{x^2+px+q} + \\ &+ \frac{M_2x+N_2}{(x^2+px+q)^2} + \dots + \frac{M_\lambda x+N_\lambda}{(x^2+px+q)^\lambda} + \dots + \frac{R_1x+S_1}{x^2+rx+s} + \frac{R_2x+S_2}{(x^2+rx+s)^2} + \dots + \frac{R_\mu x+S_\mu}{(x^2+rx+s)^\mu}\end{aligned}$$

Bu yerda $A_i, B_i, M_i, N_i, R_i, S_i$ – sonlar. Ularni izlash uchun aniqmas koeffitsientlar usulini qullash maqsadga muvofiq. Uning mohiyatini misolda ko'rsatib beramiz:

Misol. $\int \frac{9x^3 - 30x^2 + 28x - 88}{(x^2 - 6x + 8)(x^2 + 4)} dx$

Yechim: $(x^2 - 6x + 8)(x^2 + 4) = (x-2)(x-4)(x^2 + 4)$, demak

$$\frac{9x^3 - 30x^2 + 28x - 88}{(x-2)(x-4)(x^2 + 4)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-4} + \frac{Cx+D}{x^2+4}$$

Umumiy mahrajga keltiramiz va suratlarni tenglashtiramiz:

$$A(x-4)(x^2+4) + B(x-2)(x^2+4) + (Cx+D)(x^2-6x+8) = 9x^3 - 30x^2 + 28x - 88$$

$$(A+B+C)x^3 + (-4A-2B-6C+D)x^2 + (4A+4B+8C-6D)x + (-16A-8B+8D) = 9x^3 - 30x^2 + 28x - 88. \text{ Demak,}$$

$$\begin{cases} A+B+C=9 \\ -4A-2B-6C+D=-30 \\ 4A+4B+8C-6D=28 \\ -16A-8B+8D=-88 \end{cases} \quad \begin{cases} C=9-A-B \\ D=-30+4A+2B+54-6A-6B \\ 2A+2B+4C-3D=14 \\ 2A+B-D=11 \end{cases}$$

$$\begin{cases} C=9-A-B \\ D=24-2A-4B \\ 2A+2B+36-4A-4B-72+6A+12B=14 \\ 2A+B-24+2A+4B=11 \end{cases} \quad \begin{cases} C=9-A-B \\ D=24-2A-4B \\ 4A+10B=50 \\ 4A+5B=35 \end{cases}$$

$$\begin{cases} C=9-A-B \\ D=24-2A-4B \\ 4A+10B=50 \\ 50-10B+5B=35 \end{cases} \quad \begin{cases} C=9-A-B \\ D=24-2A-4B \\ 4A+10B=50 \\ B=3 \end{cases} \quad \begin{cases} A=5 \\ B=3 \\ C=1 \\ D=2 \end{cases}$$

Natijada:

$$\int \frac{5}{x-2} dx + \int \frac{3}{x-4} dx + \int \frac{x+2}{x^2+4} dx = 5 \ln|x-2| + 3 \ln|x-4| + \int \frac{x}{x^2+4} dx + \int \frac{2}{x^2+4} dx =$$

$$= 5 \ln|x-2| + 3 \ln|x-4| + \frac{1}{2} \ln(x^2+4) + \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + C.$$

formula hosil bo'ladi.

Noto'g'ri ratsional algebraik kasrlarni integrallashdan oldin butun qismi ajratiladi:

Misol:

$$\int \frac{6x^5 - 8x^4 - 25x^3 + 20x^2 - 76x - 7}{3x^3 - 4x^2 - 17x + 6} dx$$

Yechim.

$$\begin{array}{r} 6x^5 - 8x^4 - 25x^3 + 20x^2 - 76x - 7 \\ 6x^5 - 8x^4 - 34x^3 + 12x^2 \\ \hline 9x^3 + 8x^2 - 76x - 7 \\ 9x^3 - 12x^2 - 51x + 18 \\ \hline 20x^2 - 25x - 25 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3x^3 - 4x^2 - 17x + 6 \\ 2x^2 + 3 \\ \hline \end{array}$$

$$\int \left[2x^2 + 3 + \frac{20x^2 - 25x - 25}{3x^3 - 4x^2 - 17x + 6} \right] dx = \int 2x^2 dx + \int 3 dx + 5 \int \frac{4x^2 - 5x - 5}{3x^3 - 4x^2 - 17x + 6} dx = \frac{2}{3} x^3 + 3x +$$

$$+ 5 \int \frac{4x^2 - 5x - 5}{3x^3 - 4x^2 - 17x + 6} dx$$

Maxrajni yoyamiz: $x = 3$ uning ildizi bo'lgani uchun:

$$\begin{array}{r} 3x^3 - 4x^2 - 17x + 6 \\ 3x^3 - 9x^2 \\ \hline 5x^2 - 17x \\ 5x^2 - 15x \\ \hline -2x + 6 \\ -2x + 6 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} x - 3 \\ 3x^2 + 5x - 2 \\ \hline \end{array}$$

Demak, $3x^3 - 4x^2 - 17x + 6 = (x-3)(3x^2 + 5x - 2) = (x-3)(x+2)(3x-1)$.

$$\frac{4x^2 - 5x - 5}{(x-3)(x+2)(3x-1)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{3x-1}$$

$$A(x+2)(3x-1) + B(x-3)(3x-1) + C(x-3)(x+2) = 4x^2 - 5x - 5$$

Biz x o'rniga -3 , -2 , $1/3$ qiymatlarni quyamiz:

$$\begin{cases} 40A = 16 \\ 35B = 21 \\ C = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} A = 2/5 \\ B = 3/5 \\ C = 1 \end{cases}$$

Demak.

$$\int \frac{6x^5 - 8x^4 - 25x^3 + 20x^2 - 76x - 7}{3x^3 - 4x^2 - 17x + 6} dx = \frac{2}{3} x^3 + 3x + 3 \int \frac{dx}{x+2} + 2 \int \frac{dx}{x-3} + 5 \int \frac{dx}{3x-1} =$$

$$= \frac{2}{3} x^3 + 3x + 3 \ln|x+2| + 2 \ln|x-3| + \frac{5}{3} \ln|3x-1| + C.$$

Misol.

$$\int \frac{3x^4 + 14x^2 + 7x + 15}{(x+3)(x^2+2)^2} dx = \int \frac{A}{x+3} dx + \int \frac{Bx+C}{(x^2+2)^2} dx + \int \frac{Dx+E}{x^2+2} dx$$

$$A(x^2+2)^2 + (Bx+C)(x+3) + (Dx+E)(x+3)(x^2+2) = 3x^4 + 14x^2 + 7x + 15$$

$$Ax^4 + 4Ax^2 + 4A + Bx^2 + 3Bx + Cx + 3C + Dx^4 + 2Dx^2 + 3Dx^3 + 6Dx + Ex^3 + 2Ex + 3Ex^2 + 6E = (D+A)x^4 + (3D+E)x^3 + (A+B+2D+3E+4A)x^2 + (3B+C+6D+2E)x + (2A+3C+6E+4A)$$

$$\begin{cases} D+A=3 \\ 3D+E=0 \\ B+2D+3E+4A=14 \\ 3B+C+6D+2E=7 \\ 3C+6E+4A=15 \end{cases} \quad \begin{cases} D=3-A \\ E=-9+3A \\ B+6-2A-27+9A+4A=14 \\ 3B+C+18-6A-18+6A=7 \\ 3C-54+18A+4A=15 \end{cases}$$

$$\begin{cases} D=3-A \\ E=-9+3A \\ B+11A=35 \\ 3B+C=7 \\ 3C+22A=69 \end{cases} \quad \begin{cases} D=3-A \\ E=-9+3A \\ 11A=35-B \\ C=7-3B \\ 21-9B+70-2B=69 \end{cases} \quad \begin{cases} A=3 \\ B=2 \\ C=1 \\ D=0 \\ E=0 \end{cases}$$

Demak:

$$3 \int \frac{dx}{x+3} + \int \frac{2x+1}{(x^2+2)^2} dx = 3 \int \frac{dx}{x+3} + 2 \int \frac{x}{(x^2+2)^2} dx + \int \frac{dx}{(x^2+2)^2} = 3 \ln|x+3| - \frac{1}{x^2+2} + \frac{x}{4(x^2+2)} + \frac{1}{4\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{2}} + C.$$

$\int R(\sin x, \cos x) dx$ – ko'rinishdagi integralda qo'yidagi almashtirish qullaniladi: $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$,

$$\text{bunda } x = 2 \operatorname{arctg} t, \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$

Misollar:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{4 \sin x + 3 \cos x + 5} &= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{4 \frac{2t}{1+t^2} + 3 \frac{1-t^2}{1+t^2} + 5} = 2 \int \frac{dt}{8t + 3 - 3t^2 + 5 + 5t^2} = 2 \int \frac{dt}{2t^2 + 8t + 8} = \\ \text{a)} \quad &= \int \frac{dt}{t^2 + 4t + 4} = \int \frac{dt}{(t+2)^2} = -\frac{1}{t+2} + C = -\frac{1}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 2} + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{9 + 8 \cos x + \sin x} &= \int \frac{2dt}{(1+t^2) \left[9 + \frac{8(1-t^2)}{1+t^2} + \frac{2t}{1+t^2} \right]} = 2 \int \frac{dt}{t^2 + 2t + 17} = 2 \int \frac{dt}{(t+1)^2 + 16} = \\ \text{b)} \quad &= \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{t+1}{4} + C = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 1}{4} + C. \end{aligned}$$

Aniq integral.

Ta'rif. Agar F funksiya f funktsiyaning $[a, b]$ dagi boshlang'ich funktsiyaci bo'lsa, u holda $F(b) - F(a)$ soni f funktsiyadan a dan b gacha olingan *aniq integrali* deyiladi va bunday belgilanadi:

$$\int_a^b f(x) dx$$


(« $f(x)$ dan x bo'yicha a dan b gacha olingan aniq integral» deb o'qiladi)

Mazkur ta'rifda $f(x)$ – integral ostidagi funktsiya, $[a,b]$ kesma – integrallash oralig'i, x – integrallash o'zgaruvchisi, a va b sonlar mos ravishda integrallash qo'yi va yuqori chegarasi deyiladi.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

formula N'yuton-Leybnits formulasi deb yuritiladi (Isaak N'yuton (1643—1727) – ingliz matematigi, Gotfrid Vilgel'm Leybnits (1646—1716) nemis matematigi).

Aniq integralning absolyut qiymati integral ostidagi funktsiya grafigi hamda $x=a$, $x=b$, $y=0$ to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan egri chiziq trapetsiya S yuzini anglatadi (3-rasm).



3-rasm.

Aniq integral qo'yidagi xossalarga ega :

a) Agar $a=b$ bo'lsa, u holda $\int_a^b f(x)dx = 0$; b) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$;

c) $\int_a^b c f(x)dx = c \int_a^b f(x)dx$; g) $\int_a^b (f(x) \pm g(x))dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$;

Misol.

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \left\{ \begin{array}{l} x = \sin t; \\ \alpha = 0; \beta = \pi/2 \end{array} \right\} = \int_0^{\pi/2} \sqrt{1-\sin^2 t} \cos t dt = \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2t) dt =$$

$$= \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \sin \pi = \frac{\pi}{4}.$$

Eslatma. Aniq integralni hisoblashda maxsus komp'yuter dasturlaridan foydalanish maqsadga muvofiq (Maple, MathCad, Mathematica, Matlab).

4. Tayanch tushunchalar:

Sonli funktsiyalar, funktsiya limiti, uzluksiz funktsiyalar, ajoyib limitlar, hosila, hosilaning geometrik ma'nosi, differentsiallanuvchi funktsiya, yuqori tartibli hosila, hosilalar jadvali, differentsiallanuvchi funktsiyalar hossalari, o'suvchi va kamayuvchi funktsiya, monotonlik oralig'i, lokal maksimum va lokal minimum, maksimum va minimum, o'sish va kamayish sharti, lokal ekstremumning zaruriy sharti. Boshlang'ich funktsiya, aniqmas integral, integrallar jadvali, integrallash usullari, aniq integral.

5. Nazorat savollari.

1. Sonli funktsiyalar xaqida tushuncha bering.
2. Funktsiya limiti xaqida tushuncha bering.
3. Uzluksiz funktsiyalar xaqida tushuncha bering.
4. Ajoyib limitlar xaqida tushuncha bering.
5. Funktsiya limitini hisoblashga misollar keltiring.
6. Hosila tushunchasini bayon qiling. Hosilalar jadvalini keltiring.
7. Funktsiyani tekshirishda hosila qanday qullaniladi?

8. Boshlang'ich funktsiya ta'rifini bayon qiling.
9. Aniqmas integral ta'rifini bayon qiling.
10. Integrallar jadvalini keltiring
11. Integrallash usullari keltiring
12. Aniq integral ta'rifini va xossalarini bayon qiling.

3-MAVZU. EHTIMOLLAR NAZARIYASINING MATEMATIK ASOSLARI. MATEMATIK STATISTIKA ELEMENTLARI.

Reja:

1. Ehtimollik haqida tushuncha.
2. Ehtimollarni qo'shish va ko'paytirish.
3. Binomial taqsimot
4. Tanlanma. Tajriba natijalarini statistik ishlani.

3. Mavzu bayoni.

Ehtimollik haqida tushuncha.

Tasodifiy hodisa – bu berilgan sharoitda ruy beradigan yoki ro'y bermaydigan hodisa. Tanga tashlanganda raqam tomoni bilan tushishi, lotereya bo'yicha yutuq chiqishi, otilgan o'qning nishonga tegishi tasodifiy hodisalarga misol sifatida qaralishi mumkin. Shu bilan birga amaliyot nuqtai-nazardan alohida olingan hodisalar bilan emas, balki etarlicha ko'p sonli, ommaviy xarakterga ega hodisalarning qonuniyatlarini o'rganish maqsadga muvofiq. Masalan, korhona uchun alohida maxsulot emas, balki tayorlangan maxsulotlardan qanchasi sifatli yoki yaroqsiz ekanini bilish ahamiyatliroq.

Shu kabi masalalarni echish uchun alohida tajriba ya'ni sinash o'tkaziladi va ularning oqibatlari o'rganiladi. Har bir tajriba ma'lum shartlar va sharoitlar asosida bir necha marotaba o'tkazish mumkinligi bilan xarakterlanadi. Bunda bir-birini rad etuvchi va ro'y berish imkoniyatlari bir hil bo'lgan joiz oqibatlar (elementar hodisalar) to'plami alohida o'rin tutadi. Shu to'plamni biz Ω orqali belgilaymiz.

1-Misol. o'yin kubchasi bir marta tashlansin. Bunda elementar hodisalar to'plami $\Omega = \{E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6\}$ ko'rinishga ega, bu yerda E_i – «i – raqamli tomoni bilan tushdi» elementar hodisasi.

2-Misol. Elektr asbobni ishdan chiqmasdan xizmat qilish. Bunda har bir elementar hodisa musbat haqiqiy son bilan ustma-ust tushadi, ya'ni elementar hodisalar to'plami

$\Omega = (0, +\infty)$ ko'rinishga ega.

Amaliyotda elementar hodisalardan tashqari, murakkabroq hodisalar qiziqtiradi. Masalan, o'yin kubchasi bir marta tashlanganda «juft raqamli tomoni bilan tushdi» hodisasi, yoki «elektr asbob 3000 soat mobaynida ishdan chiqmasdan xizmat qildi» kabi hodisa.

$\emptyset$ - hodisa xech qanday elementar hodisalarni o'z ichiga olmaydi (ya'ni, xech qanday xollarda ro'y bermaydi), shuning uchun *ro'y bermasligi aniq* hodisa, Ω hodisa esa doimo ro'y berib *mukarrar hodisa* deb yuritiladi.

Ehtimollar nazariyasi tasodifiy hodisalarni ro'y berish qonuniyatlarini o'rganadi. Shuning uchun tasodifiy xodisa ruy berishi imkoniyatlarini kattaligini bildirish uchun qiymatlari $[0,1]$ segmentda qabul qiladigan maxsus funktsiya – ehtimollik kiritilishi lozim.

Tabiiyki, bunda mukarrar hodisaning ehtimolini 1 ga, ro'y bermasligi aniq xodisaning ehtimolini esa 0 ga teng deb qabul qilishimiz lozim. Bundan tashqari elementar hodisalarning ro'y berish imkoniyatlari bir hil deb hisoblaymiz.

Mashhur matematik Kolmogorov A.N. ehtimol tushunchasini qo'yidagi aksiomalar orqali kiritgan:

Tasodifiy xodisaning ehtimolligi deb qo'yidagi aksiomalarga bo'ysinadigan R funktsiyaga aytiladi:

- 1) $0 \leq P(A) \leq 1 \forall A$; 2) $P(\Omega) = 1$; 3) Agar $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ hodisalar juft-jufti bilan birgalikda ro'y bermasa (ya'ni $A_i A_j = \emptyset \forall i \neq j$ bo'lsa), u holda $P(\sum_i A_i) = \sum_i P(A_i)$.

Berilgan A va B hodisalar uchun $A \cup B$ birlashma A va B hodisalardan kamida bittasi ro'y berishidan iborat bo'lgan hodisadir. Unga A va B hodisalar *yig'indisi* aytiladi va u ko'pincha $A + B$ orqali belgilanadi.

Xuddi shunday $A \cap B$ kesishma A va B hodisalardan bir vaqtda ruy berishidan iborat bo'lgan hodisadir. Unga A va B hodisalar *ko'paytmasi* aytiladi va u ko'pincha AB orqali belgilanadi.

Hodisalar yig'indisi va ko'paytmasi tabiiy ravishda cheksiz sondagi

$A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ hodisalar uchun ham kiritilishi mumkin, bunda ular uchun mos ravishda $\sum_i A_i$ va $\prod_i A_i$ belgilashlar qabul qilingan.

A hodisaga *qarama-qarshi hodisa* sifatida $\bar{A} = \Omega/A$ hodisa qaraladi va u A hodisa ro'y bermasligidan iborat bo'lgan hodisadir.

O'zaro kesishmaydigan hodisalar ya'ni *birgalikda ro'y bermaydigan hodisalar* deyiladi. Shuning uchun o'zaro qarama-qarshi hodisalar birgalikda ro'y bermaydi.

Binomial taqsimot.

n ta sinashdan iborat bo'lgan tajriba Bernulli sinash sistemasi deyiladi agar a) ixtiyoriy sinashda A hodisaning ro'y berishi p ehtimoli uning boshqa sinashlarda ro'y berish-bermasligiga bog'liq emas;

b) istalgan sinash faqat A va $\bar{A}$ o'zaro qarama-qarshi oqibatga ega, bunda $\bar{A}$ hodisaning ehtimoli $q=1-p$ ga teng.

$P(n, m)$ orqali n ta sinashdan iborat bo'lgan tajriba mobaynida A hodisa t marta ro'y berishi ehtimolini belgilaymiz.

A hodisa $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ ta har biri $p^m \cdot q^{n-m}$ ehtimolga ega bo'lgan elemen-tar

hodisalardan tashkil topgan bo'lib, $P(n, t)$ ehtimol qo'yidagicha topiladi:

$$P(n, m) = C_n^m p^m q^{n-m} \quad (1)$$

1-Misol. o'g'il bola tug'ilishining ehtimoli 0,515 ga teng. Tavaqqal tanlangan 10 ta chaqaloqdan 6 tasi o'g'ilbola bo'lishining ehtimoli tahminan

$$P(10, 6) = C_{10}^6 (0,515)^6 (0,485)^4 \approx 0,2167 \text{ ga teng.}$$

2-Misol. Mahsulotning nosoz bo'lishining ehtimoli 0,01 ga teng. Tavaqqal tanlangan 100 maxsulotdan 3 ta dan ortiq nosoz maxsulot chiqishining ehtimoli

$$P(A) = C_{100}^0 (0,01)^0 (0,99)^{100} + C_{100}^1 (0,01)^1 (0,99)^{99} + C_{100}^2 (0,01)^2 (0,99)^{98} \approx 0,9816 \text{ ga teng.}$$

Tanlanma. Tajriba natijalarini statistik ishlanmasi.

Inson o'z turmushida A to'plamni tashkil qilgan va xossalari noma'lum bo'lgan ob'ektlar bilan tezda uchratib turadi. Ushbu to'plamni o'rganish maqsadida uning biror chekli V qism to'plamining hossalari o'rganishga doir tajriba o'tkaziladi va ushbu tajriba natijalariga A to'plam xaqida biror umumiy xulosaga ega bo'lish masalasi dolzarb hisoblanadi. Mazkur masala matematik statistikaning asosiy masalasi deyiladi.

A to'plam *bosh majmua*, V qism to'plam esa *tanlanma* deyiladi. Tanlanmadagi elementlar soni uning *hajmi* deb yuritiladi.

Umumiylikka putur etkazmasdan, bosh to'plamning elementlari qandaydir taqsimot funktsiyasiga ega bo'lgan tasodifiy miqdorning qiymatlar to'plami deb faraz qilishimiz mumkin. Ko'pincha tanlanmaning elementlari o'sish tartibida joylashtiriladi va natijada *variatsion qator* deb yuritiluvchi ketma-ketlikka ega bo'lamiz.

Masalan, 0, 5, 3, 6, 3, 4, 1, 3, 4, 6 sonlar hajmi 10 ga teng bo'lgan tanlanmani tashkil qilib, uning variatsion qatori qo'yidagi ko'rinishga ega: 0,1,3,3,3,4,4,5,6,6.

Tanlanmaning elementlari takroran o'chrashishi mumkin.

U holda hajmi N bo'lgan tanlanma uchun qo'yidagi jadval tuzish maqsadga muvofiq

X	x_1	x_2	$\dots$	x_i	$\dots$	x_n
V	v_1	v_2	$\dots$	v_i	$\dots$	v_n

(1)

Bu yerda v_i - x_i ning absolyut takrorligi.

Agar biz $W_i = v_i / N$ - x_i ning nisbiy takrorligini kiritsak, u holda tanlanma uchun qo'yidagi jadval tuzsa bo'ladi

X	x_1	x_2	$\dots$	x_i	$\dots$	x_n
-----	-------	-------	---------	-------	---------	-------

W	W_1	W_2	$\dots$	W_i	$\dots$	W_n
-----	-------	-------	---------	-------	---------	-------

(2)

Ravshanki, $v_1 + v_2 + \dots + v_n = N$, $W_1 + W_2 + \dots + W_n = 1$.

(1) va (2) jadvallari *tanlanmaning taqsimot qonunlari* deb yuritiladi.

1-Misol. 0, 5, 3, 6, 3, 4, 1, 3, 4, 6 tanlanmaning taqsimot qonunlari qo'yidagicha bo'ladi:

x	0	1	3	4	5	6
v	1	1	3	2	1	2
W	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2

Bundan buyon biz tanlanma o'zining taqsimot qonuni yordamida berilgan deb faraz qilamiz.

$F^*(x) = \frac{1}{N} \sum_{i: x_i \leq x} v_i$ funktsiya tanlanmaning *empirik taqsimot funktsiyasi* (ETF) deyiladi.


2-Misol. Hajmi 60 bo'lgan

x	2	6	10
v	12	18	30
W	2/10	3/10	1/6

tanlanmaning ETF i qo'yidagi ko'rinishga ega:


$$F^*(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 2 \\ 0,2 & 2 < x \leq 6 \\ 0,5 & 6 < x \leq 10 \\ 1 & 10 < x \end{cases}$$

Uning grafigi qo'yidagicha tasvirlanadi:



Uchlari (x_i, v_i) yoki (x_i, W_i) nuqtalarda bo'lgan siniq chiziqlar (*tanlanma poligonlari*) tanlanma xaqida qo'shimcha tushuncha hosil qilishga imkoniyat beradi.

3-Misol. 1-misoldagi tanlanmaning v bo'yicha poligoni qo'yidagi ko'rinishga ega:



OX o'qini chekli sondagi o'zaro kesishmaydigan Δ_i , $i=1,2,\dots,k$, oraliqlarga ajratib, tanlanmaning Δ_i ga tegishli elementlar sonini t_i hisoblaymiz.

$f(x) = t_i / N$, $x \in \Delta_i$, $i=1,2,\dots,k$, funktsiyaning grafigi tanlanma *gistogrammasi* deyiladi. Ayrim hollarda gistogrammada t_i / N kattalik o'rniga t_i olinadi.


Shuni ta'kidlash lozimki, gistogrammalarni hozirgi kunda keng tarqalgan Microsoft Office dasturlar oilasi yordamida nisbatan tez va sifatli yasash imkoniyati mavjud.

4-Misol. Maktab o'qituvchilari ish staji xaqida ma'lumot

Ish staji (yillar)	O'qituvchilar soni
5-10	3
10-15	5
15-20	10
20-25	12
25 da ortiq	6
Jami	36

Jadvalda o'z aksini topgan bo'lsa, u holda ShEHM gistogrammani qo'yidagicha ko'rinishda yasaydi.

O'qituvchilarning ish staji bo'yicha gistogrammasi



Q'yidagi kattaliklar tanlanmaning sonli xarakteristikolari sifatida ahamiyatlidir:

$$1) Mx = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n v_i x_i = \sum_{i=1}^n W_i x_i - \text{tanlanma o'rta qiymati};$$

$$2) Dx = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n v_i (x_i - Mx)^2 = \sum_{i=1}^n W_i (x_i - Mx)^2 - \text{tanlanma dispersiyasi};$$

$$3) s = \sqrt{Dx} - \text{o'rta kvadratik chetlanish};$$

5-Misol. 1-misoldagi tanlanma uchun o'rta qiymat, dispersiya va o'rta kvadratik chetlanish topilsin.

Yechish.

$$Mx = 0,1 \cdot 0 + 0,1 \cdot 1 + 0,3 \cdot 3 + 0,2 \cdot 4 + 0,1 \cdot 5 + 0,2 \cdot 6 = 3,5;$$

$$Dx = 0,1 \cdot (0 - 3,5)^2 + 0,1 \cdot (1 - 3,5)^2 + 0,3 \cdot (3 - 3,5)^2 + 0,2 \cdot (4 - 3,5)^2 + 0,1 \cdot (5 - 3,5)^2 + 0,2 \cdot (6 - 3,5)^2 = 4;$$

$$s = 2.$$

4. Tayanch tushunchalar: Hodisalar, ehtimollik, ehtimollarni qo'shish va ko'paytirish.

ro'y bermasligi aniq hodisa, qarama-qarshi hodisa, mukarrar hodisa, hodisalar yig'indisi, hodisalar ko'paytmasi, birgalikda ro'y bermaydigan yoki noo'rindosh hodisalar binomial taqsimot, bosh majmua, tanlanma, variatsion qator, tanlanmaning taqsimot qonunlari, empirik taqsimot funktsiyasi, tanlanma poligonlari va gistogrammasi, tanlanma o'rta qiymati, tanlanma dispersiyasi, o'rta kvadratik chetlanish.

5. Nazorat savollari.

1. Tasodifiy hodisaga tushuncha bering.
2. Ehtimollik haqida tushuncha bering.
3. Ehtimollarni qo'shish va ko'paytirish formulalarini keltiring.
4. Binomial taqsimot haqida tushuncha bering.
5. Bosh majmua va tanlanma xaqida tushuncha bering va misollar keltiring.
6. Variatsion qator deb nimaga aytiladi?
7. Tanlanmaning taqsimot qonunlari va empirik taqsimot funktsiyasiga tushuncha bering.
8. Tanlanma poligonlari va gistogrammasi deb nimaga aytiladi?
9. Tanlanma o'rta qiymati, dispersiyasi va o'rta kvadratik chetlanishni topish qanday formulalar yordamida amalga oshiriladi?

ADABIYOTLAR

1. Ismailov Sh.N. va boshq. Matematika-1. Talabalar uchun o'quv qo'llanma. T. «Moliya instituti». 2003.
2. Abduhamidov A.U. va boshq. Algebra va matematik analiz asoslari. I-qism. T. «O'qituvchi».2001 y. II-qism. T. «O'qituvchi».2002 y.
3. Gmurman V.E. Ehtimollar nazariyasi va matematik statistikadan masalalalar yechishga doir qo'llanma. T. «O'qituvchi», 1980.
4. Н.В.Богомолов «Математикадан амалий маш¹/4улотлар». 1984.472б.
5. Математикадан о'қланма I-II о'исм.Т.А.Азларов та³рири остида. Т., «О'итувчи», 1990.- 352 б.

ILOVA. INDIVIDUAL VAZIFALAR.

1-vazifa. A^{-1} ni toping. Natijani tekshiring.

$$1) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$6) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & -5 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$7) A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$3) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$8) A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$4) A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$9) A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 5 \\ -1 & 4 & -2 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$5) A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & -1 \end{pmatrix}$$

$$10) A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & -3 \end{pmatrix}$$

2-vazifa. ChTS ni Gauss, teskari matritsa usullari va Kramer qoidasi bilan yeching va javoblarni solishtiring.

$$1) \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 6 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 9 \\ x_1 - 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 13 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 6x_2 + x_3 = 10 \\ x_1 + x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 = -1 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -3 \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 11 \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 = -1 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 11 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -3 \end{cases}$$

$$7) \begin{cases} 2x_1 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 1 \\ -x_1 + 8x_2 + 3x_3 = 2 \end{cases}$$

$$8) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

$$9) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 8 \end{cases}$$

$$10) \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 = -2 \\ x_1 - x_2 = 4 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = -7 \end{cases}$$

3-vazifa. ChTS ni Gauss usuli bilan yeching va ikkita hususiy yechmini toping.

$$\begin{array}{ll}
 1) \begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 - x_4 = -2 \\ x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 = -3 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 3 \end{cases} & 6) \begin{cases} x_1 - 4x_2 + 4x_3 + x_4 = -3 \\ x_1 - 7x_2 + 6x_3 - 2x_4 = 2 \\ 3x_1 - 10x_2 + 14x_3 + 4x_4 = 1 \end{cases} \\
 2) \begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ 5x_1 + x_2 + 5x_3 + 3x_4 = -4 \end{cases} & 7) \begin{cases} 3x_1 - x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 3 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 9 \end{cases} \\
 3) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = -2 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 5 \\ -x_1 + 4x_2 + 3x_3 - x_4 = 8 \end{cases} & 8) \begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 = -2 \\ 3x_1 + 8x_2 - 7x_3 + 10x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_2 + 5x_3 - 6x_4 = 2 \end{cases} \\
 4) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 + x - x_3 + 2x_4 = 1 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = -2 \end{cases} & 9) \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x - x_4 = 6 \\ 3x_1 + 3_2 - 4x_3 - 5x_4 = 2 \end{cases} \\
 5) \begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 - x_4 = -2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 5 \end{cases} & 10) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + x - 2x_4 = -1 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 5 \end{cases}
 \end{array}$$

4-vazifa. $f'(x)$ ni toping.

$$\begin{array}{ll}
 1) f(x) = 3\sin x - \cos 9x & 6) f(x) = 5\cos x - \sin 5x \\
 2) f(x) = \sin 2x - 2\cos x & 7) f(x) = 2\sin x + \cos 4x \\
 3) f(x) = \cos 5x - 5\sin x & 8) f(x) = \operatorname{tg} 3x - 3\cos x \\
 4) f(x) = 3\cos x + \sin 6x & 9) f(x) = \cos^2 x - \sin 2x \\
 5) f(x) = 3\cos x + \sin 3x & 10) f(x) = \sin^2 x + \cos 2x
 \end{array}$$

5-vazifa. Berilgan oraliqda funktsiyaning eng katta va eng kichik qiymatlarini toping.

$$\begin{array}{ll}
 1) f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x, [2;4] & 2) f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 1, [1/2;2] \\
 3) f(x) = 2x^3 + 9x^2 - 24x + 1, [0;1] & 4) f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x - 1, [0;3] \\
 5) f(x) = x^3 - 27x + 13, [0;4] & 6) f(x) = 2x^3 + 9x^2 - 36x, [0;3] \\
 7) f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x - 1, [-5;0] & 8) f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x, [2;4] \\
 9) f(x) = x^3 + 6x^2 - 36x, [-7;0] & 10) f(x) = x^3 - 27x + 13, [-4;0]
 \end{array}$$

6-vazifa. $\int f(x)dx$ ni toping.

$$\begin{array}{ll}
 1) f(x) = 3\sin x - \cos 9x & 6) f(x) = 5\cos x - \sin 5x \\
 2) f(x) = \sin 2x - 2\cos x & 7) f(x) = 2\sin x + \cos 4x \\
 3) f(x) = \cos 5x - 5\sin x & 8) f(x) = \operatorname{tg} 3x - 3\cos x \\
 4) f(x) = 3\cos x + \sin 6x & 9) f(x) = \cos^2 x - \sin 2x \\
 5) f(x) = 3\cos x + \sin 3x & 10) f(x) = \sin^2 x + \cos 2x
 \end{array}$$

7-vazifa. Hisoblang.

1. a) $\int e^{\cos^2 x} \sin 2x dx$; b) $\int x \arctg x dx$;
- c) $\int \frac{dx}{x^3 + 27}$; d) $\int \sin^2 x \cos^3 x dx$
2. a) $\int \frac{x^2 dx}{(x^3 + 4)^6}$; b) $\int e^x \ln(1 + e^x) dx$;
- c) $\int \frac{x dx}{x^3 + 8}$; d) $\int \cos^2 x \cdot \sin^3 x dx$
3. a) $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1 - x^6}}$; b) $\int x 2^x dx$;
- c) $\int \frac{(5x + 6) dx}{x^3 + x^2 + x + 1}$; d) $\int \sin^3 x \cos^3 x dx$
4. a) $\int \frac{dx}{\sin^2 x (2 \operatorname{ctg} x + 1)}$; b) $\int \frac{x \arccos x}{\sqrt{1 - x^2}} dx$;
- c) $\int \frac{dx}{x^3 - x^2 + 2x - 2}$; d) $\int \sin^2 x \cos^2 x dx$.
5. a) $\int \frac{\sin 2x dx}{5 - \cos 2x}$; b) $\int x^2 e^{5x} dx$; c) $\int \frac{(x + 1) dx}{x^3 - 2x^2 + x}$; d) $\int \cos^4 x dx$.
6. a) $\int \frac{\cos x dx}{\sqrt{\sin^3 x}}$; b) $\int x \arccos \frac{1}{x} dx$; c) $\int \frac{(2x + 1) dx}{x^3 + 3x^2 - 4x}$; d) $\int \sin^4 x dx$.
7. a) $\int \frac{\arcsin x dx}{\sqrt{1 - x^2}}$; b) $\int x \ln(x^2 + 1) dx$; c) $\int \frac{x dx}{x^4 + 5x^2 + 6}$; d) $\int \sin^5 x \cos^2 x dx$.
8. a) $\int \frac{\arctg x}{x^2 + 1} dx$; b) $\int x \cos 2x dx$; c) $\int \frac{x dx}{x^4 - 81}$; d) $\int \sin^2 x \cos^5 x dx$.
9. a) $\int \frac{\cos x dx}{\sqrt[3]{8 + 3 \sin x}}$; b) $\int x \ln^2 x dx$; c) $\int \frac{(x^2 + x - 1) dx}{x^4 + 3x^2 - 4}$; d) $\int \sin^3 x \cos^4 x dx$.
10. a) $\int \frac{\sqrt{3 + \ln x}}{x} dx$; b) $\int x^2 \sin 3x dx$; c) $\int \frac{(x^3 + x) dx}{x^4 + 5x^2 + 6}$; d) $\int \sin^4 x \cos^3 x dx$.

8-vazifa. Hisoblang.

$$\begin{array}{llll}
1. \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx; & 2. \int_0^1 x \arctg x dx. & 3. \int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx. & 4. \int_0^1 \frac{5x+1}{x^2+2x+1} dx. \\
5. \int_0^{\pi} \sin 2x \cos^2 x dx. & 6. \int_1^2 \sqrt{x} \ln x dx. & 7. \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sin x + \cos x}. & 8. \int_0^1 x \ln(1+x) dx. \\
9. \int_0^1 \frac{dx}{x^2+x+1}. & 10. \int_0^{\sqrt{2}/2} \frac{x dx}{\sqrt{1-x^4}}.
\end{array}$$

9-vazifa. Masalani yeching.

1) Qutida 10 ta shar joylashgan. Ular ichida 6 ta yashil rangli shar bor. Tasodifan olingan 4 ta shar ichida 2 ta yashil shar chiqishining ehtimolini toping.

2) Qutida 9 ta yashil va 4 ta sariq shar joylashgan.

Tasodifan olingan 6 ta shar ichida 3 ta yashil shar chiqishining ehtimolini toping.

3) Qutida 10 ta shar joylashgan. Ular ichida 6 ta yashil rangli shar bor. Tasodifan olingan 5 ta shar ichida 3 ta yashil shar chiqishining ehtimolini toping.

4) Qutida 15 ta shar joylashgan. Ular ichida 10 ta yashil rangli shar bor. Tasodifan olingan 5 ta shar ichida 2 ta yashil shar chiqishining ehtimolini toping.

5) Qutida 25 ta shar joylashgan. Ular ichida 10 ta yashil rangli shar bor. Tasodifan olingan 4 ta shar ichida 2 ta yashil shar chiqishining ehtimolini toping.

6) Qutida 7 ta yashil va 4 ta sariq shar joylashgan. Tasodifan olingan 5 ta shar ichida 3 ta yashil shar chiqishining ehtimolini toping.

7) Qutida 30 ta shar joylashgan. Ular ichida 18 ta yashil rangli shar bor. Tasodifan olingan 7 ta shar ichida 5 ta yashil shar chiqishining ehtimolini toping.

8) Qutida 27 ta shar joylashgan. Ular ichida 7 ta yashil rangli shar bor. Tasodifan olingan 5 ta shar ichida 2 ta yashil shar chiqishining ehtimolini toping.

9) Qutida 12 ta shar joylashgan. Ular ichida 7 ta yashil rangli shar bor. Tasodifan olingan 4 ta shar ichida 2 ta yashil shar chiqishining ehtimolini toping.

10) Qutida 9 ta yashil va 6 ta sariq shar joylashgan. Tasodifan olingan 4 ta shar ichida 2 ta yashil shar chiqishining ehtimolini toping.

10-vazifa. Taqsimot qonuni yordamida aniqlangan (jadvalga qarang) tanlanmaning empirik taqsimot funksiyasi, poligoni, tanlanma o'rta qiymati, dispersiyasi va o'rta kvadratik chetlanishi topilsin.

1.	x	1	3	6	7
	ν		0,3	0,2	0,1

2.	x	1	2	4	7
	ν	0,2		0,4	0,1

3.	x	1	2	3	4
	ν	0,4		0,3	0,1

4.	x	-4	-1	2	3
	ν	0,1	0,3	0,2	

5.	x	-2	0	2	4
	ν	0,4	0,3		0,1

6.	x	-3	-1	3	5
	ν	0,1		0,3	0,4

7.	x	2	3	4	5
	ν	0,1	0,3		0,1

8.	x	1	2	3	4
	ν	0,1		0,3	0,2

9.	x	-1	0	1	2
	ν	0,3	0,4	0,1	

10.	x	1	2	3	4
	ν		0,2	0,2	0,1