

**Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
Бухоро давлат тиббиёт институти**

Кафедра:
Акушерлик ва гинекология

Маъруза матни

Мавзу:
Тор чаноқлар.

Муаллиф: т.ф.н. Г.А.Ихтиярова

Бухоро-2014

Тор чаноклар.

Агар аёл чаноги етилган хомиланинг айникса хои́ла бошининг утишга тускинлик килиш даражасида торайган булса, бундай чанокни *тор чанок дейилади*.


Тор чанок тутри, кийшик, кундаланг улчамлар бир текисда кискаради. Ёки бирортаси нормаль чанокка нисбатан 1,5-2 см кискарган булади. Тор чанокнинг энг асосий курсаткичи чир канюгата. Агар у 10 см ва ундан кичик булса, тор чанокдан далолат беради.


Тор чанок 2 га булинади.

- анотомик тор чанок
- клиник тор чанок

Анотомик тор чанок: чанокнинг ташки улчамлари улчангандан кейин килинади.

Клиник тор чанок: эса, тутрук вактида хои́ла боши билан чанок улчамлари мос келганда куйилади.





Этиологияси

- инфантилизм;
- болалик даврида сурункали инфекцион касалликлар, ҳамда балогатга етиш давридаги касалликлар;
- моддалар алмашинувининг бузилиши;
- хомиладорлик пайтида онанинг сифатли овкатланмаслиги;
- балалик даврида рахит касаллиги билан касалланиши;
- суяк ва бугинлар сил касаллигиди
- синган суякларнинг нотугри узилиши.

Анатомик тор чанок 3-3,6 %

Клиник тор чанок 3-5 % учрайди.

Классификацияси

Куп учрайдиган тор чаноклар

Хамма томонлама торайган чанок

Ясси чанок

а) оддий ясси чанок

б) ясси рахитик тор чанок

Умуман торайган ясси тор чанок

Кундаланг торайган ясси чанок

Кам учрайдиган тор чаноклар

Кийшик тор чанок

Варонкасимон тор чанок

Спандиломатик тор чанок

Остсомаляттик тор чанок

Суяк устмаси ва экзостазляр натижасида торайган чанок

Кифотик тор чанок ва бошклар

Торайиш даражасига караб 4 даражага булинади.

I даражаси 10-9 см гача

II даражаси 9-7,5 см гача

III даражаси 7,5-6,5 см гача

IV даражаси 6,5 ва ундан кам


Учрашига караб

I даражаси – 78 %

II даражаси – 21,2 %

III даражаси – 0,8 %

IV даражаси – 0,2 %



Анатомик улчамларига караб:

№	Чанок	Диста н. спина р.	Дист ан. крис т.	Дист ан. троко н.	Кончюг ата экстрен на	Кон-та Диаг- лись	Кон- та вера
1	Нормал	25-26	28- 29	30-31	20-21	13	17
2	Хамма томонлама торай-ган чанок	25	27	29	19	12	10
3	Инфантил	24	26	28	18	11	9
4	Оддий ясси	26	29	31	18	10,5	8,5
5	Ясси рахитик	26	26	31	17	9	7,5
6	Хаммма тарафлама то- райган ясси	23	24	28	15	9	7

Учрайдиган асоратлар куйидагича

- хомила бошининг ёзилиши
- когонок сувларини барвакт ёки вақтидан олдин кетиши.
- тугрукнинг чузилиши
- тугрук йулларига инфекция тушиши.
- иккиламчи тугрук кучларининг сустлиги
- хомила асфикацияси
- симфизинг ажралиши
- гипо ва атоник кон кетишлар
- хомиланинг тулик тугилиши.

Тугрукни олиб бориш

- I. Даражадаги тор чанокларда тугрук, табиий тугрук йуллари оркали олиб борилади.
- II. Даражада баъзан тугрук, табиий тугрук йуллари оркали олиб борилади.

- III. Даражада факат кесарча кесиш операцияси оркали олиб борилади. (агар хомила тирик булса)
- IV. Даражада эса хар кандай вазиятда (хомила тирик булса хам, улик булса хам) хам кесарча кесиш операцияси оркали олиб борилади.

Клиник тор чаноклар Колганов клацификацияси буйича 4 даражага булинади.

1. Тугрук процесси узунлашади. Вастен белгиси «_», Цангейместер белгиси кичик, хомила боши бир текисликда узок туради.
2. Вастен белгиси «=», Цангайместер улчами хам «=», хомила боши бир текисликда 20-30 мин. туради. Сийдик келмаслиги мумкин, дардлар огриклиги, хомила гипосияси учрайди.
3. Вастен белгиси «+», Цангестерместер улчами катта, дардлар кучли огрик да кечади, хомила боши бир текисликда 30-40 мин. куп туради, хомила гипосияси бошланади.
4. бачадон ёрилишига мойил булган клиник белгилари кузатилади.

Клиник тор чанокнинг диагнози тугрук пайтида куйилади.

I-II даражасидаги клиник тор чанок булганда тугрук табиий тугрук йуллари оркали утказиш мумкин, лекин тугрук даври узаяди ва хомила шикастланиши хавфи ошади.

III-IV даражадаги клиник тор чанокда тугрук факат кесакр – кесиш операцияси оркали олиб борилади