

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚИШЛОҚ ВА СУВ ХЎЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ

САМАРҚАНД ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ИНСТИТУТИ
ВЕТЕРИНАРИЯ, ЗООТЕХНИЯ ВА ҚОРАҚЎЛЧИЛИК
ФАКУЛТЕТИ

5621200 –Қорақўлчилик таълим йўналиши

МАМАРАҲИМОВ СОҲИБЖОННИНГ

БИТИРУВ МАЛАКАВИЙ ИШИ

МАВЗУ: ҚОРА РАНГЛИ ҚЎЗИЛАР РАНГИНИНГ ТЎҚ-ОЧЛИГИ
ВА УЛАРНИНГ БОШҚА БЕЛГИЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ.

Илмий раҳбар, доцент _____ А.И.Инаятов.

“Яйлов чорвачилиги ва
хайвонларни озиқлантириш
технологияси” кафедраси
муdiri, қ.х.ф.н., доцент
_____ Б.С.Яҳяев

№ ____ - сонли йиғилиш
баёни
« ____ » _____ 2014 йил

Ветеринария, зоотехния ва
қорақўлчилик факултети
декани, доцент _____

Н.Фармонов
№ ____ - сонли йиғилиш
баёни
« ____ » _____ 2014
йил

САМАРҚАНД – 2014

МУНДАРИЖА.

Кириш.....	3
I. Адабиётлар шарҳи.....	8
II. Хўжаликнинг қисқача тарихи.....	25
III. Танланган мавзу бўйича муаммоларнинг қўйилиши ва қўлланиладиган услубиётлар.....	41
IV. Асосий қисм.....	43
4.1. Мавзунинг ечими ва унинг ёритилиши.....	43
4.2. Тирик вазни.....	44
4.3. Тери тўқимасининг қалинлиги.....	44
4.4. Тери тўқимасининг зичлиги.....	45
4.5. Тери запаси (захираси).	47
4.6. Жун толасининг узунлиги.....	48
4.7. Жун қопламининг қалинлиги.....	49
4.8. Ипаксимонлиги.....	50
4.9. Ялтироқлиги.....	51
4.10. Майли-тери.....	52
4.11. Ҳар-хил шаклдаги гулларнинг ўзаро нисбати.....	52
4.12. Гул ўлчами.....	53
4.13. Қаламгулларнинг эни.....	54
4.14. Қалам гулларнинг узунлиги бўйича бўлиниши.....	55
4.15. Қаламгулларнинг ўртача узунлиги.....	56
4.16. Гулларнинг мустаҳкамлиги.....	57
4.17. Расмининг (нақшининг) аниқлиги.....	58
4.18. Қаламгулларнинг жойлашиш тартиби.....	59
4.19. Бош қисмининг гуллар билан қопланиш даражаси.....	60
4.20. Қора қорақўл қўзиларнинг барра типи ва класлари.....	61
4.21. Класслари.....	62
V. Муаммонинг ечимидан кутилаётган иқтисодий кўрсаткичлар.....	63
VI. Ekologik масалаларнинг ёритилиши, hayot faoliyati va texnika xavfsizligi.....	64
Хулосалар.....	68
Ишлаб чиқаришга амалий таклиф ва тавсиялар.....	70
Фойданилган адабиётлар рўйхати.....	71
Иловалар.....	75

КИРИШ

Давлатимиз раҳбари Сурхондарё вилояти кенгашининг навбатдан ташқари сессиясида сўзлаган нутукларида қишлоқ хўжалигидаги кенг қўламли ислохатлар, ҳаётга замонавий ахбарот – коммуникация технологияларни жорий этиш. Қишлоқ жойларда намунавий лойихалар асосида уй – жойлар барпо этиш, ҳудудлар инфратузилмасини ривожлантириш ва ижтимоий объектлар барпо этиш сингари кенг қўламли масалалар бўйича Республикамизда амалга оширилган ишлар ва бу борадаги вазифалар атрофлича таҳлил қилиб бердилар.

Қишлоқ хўжалигининг бошқа тармоқлари каби, чорвачиликни ҳам юқори кўрсаткичларга кўтарилиши олдимизда турган асосий вазифалардан биридир. Мамлакатда етиштирилаётган гўштнинг 94%, сутнинг 96%, хусусий сектор ҳиссасига тўғри келмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг 1993 йил 3 – сентябрда қабул қилинган “Ветеринария тўғрисидаги, 1995 йил 21 – декабрда қабул қилинган” Наслчилик тўғрисидаги қонунлари чорвачилик тўғрисидаги қонунлар чорвачиликни ривожлантиришида муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Республика Вазирлар Маҳкамасининг 1993 йил 15 – мартдаги Республика Чорвачилигида иқтисодий ислохатларни чуқурлаштириш чора – татбирлар тўғрисидаги 1994 йил 23 – февралдаги “Чорвачиликни иқтисодий ислохатларни такомиллаштириш ҳамда деҳқон, фермер хўжаликлари ва хусусийлаштирилган фермер манфатларини химоя қилиш чоралари тўғрисидаги, 2006 йил 23 – мартдаги “Шахсий ёрдамчи”, деҳқон ва фермер хўжаликларида чорвамолларини кўпайтиришни рағбатлантириш чора – татбирлари” тўғрисидаги қарорлари еса соҳани тарақий еттириш жараёнида асосий дастур бўлиб хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 23 – мартдаги “Шахсий ёрдамчи, деҳқон ва фермерхўжаликларида чорвамолларини

кўпайтирилиши рағбатлантириш чора тадбирлари тоғрисидаги ПҚ – 308 қарори иккинчи бандига асосан маъқулланган 2006 – 2010 йиллар даврида шахсий ёрдамчи, деҳқон ва фермер хўжаликларидаги чорва молларини биринчи навбатида қорамоллар сонини кўпайтиришни рағбатлантириш дастурида еса шу мақсаддан келиб чиқиб, қуйдаги вазирлар белгиланган:

2010 – йилда қорамоллар сонини 2005 – йилдаги нисбатан шахсий Ёрдамчи ва деҳқон хўжаликларида 40,2 % ёки 2422.5 минг бошга кўпайтириб 8450 минг бошга фермер хўжаликларида 98 % 655 минг бошга етказиш;

“Соғлом бола йили” Давлат дастури тасдиқлансин. Унда қуйидагилар асосий вазифалар этиб белгилансин.

Болалар ва ёшларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини химоя қилишга, уларни баркамол ривожлантиришнинг ҳуқуқий асосларини мустахкамлашга қаратилган меъёрий – ҳуқуқий базани тақамиллаштириш, амалдаги қонунчилик ҳамда меъёрий ҳужжатларга замон талабларига мос ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш;

“Соғлом бола” дастурини изчил амалга ошириш асосида соғлом авладни вояга етказиш борасидаги чора-тадбирларни янада қўжайтириш, оналар ва болаларнинг репродуктив саломатлигини муҳофаза қилиш тизимини тақомиллаштириш, профилактикага асосланган соғлиқни сақлаш тизимини устивор ривожлантириш, тиббий хизмат моддий – техника базасини мустахкамлаш, соғлом болалар туғилиши ва уларни тарбиялаш билан боғлиқ масалалар юзасидан аҳоли ўртасида тушунтириш ҳамда маслаҳат ишларини қўчайтириш:

Тайёрланаётган мутахассисларга риал иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларидаги мавжуд талабга алоҳида етибор қаратилган ҳолда, ўсиб келаётган ёш авлодга таълим ва тарбия бериш соҳасидаги моддий – техника базасини янада мустахкамлаш, ундан оқилона ва самарали фойдаланишни таъминлаш, давлат таълим стандартлари, ўқув дастурлари ва ўқув – услубий адабиётларни тақомиллаштириш:

Таълим жараёнига янги ахборот – коммуникация ва педагогик технологияларни, электрон дарсликлар, мультимедиа воситаларини кенг жорий этиш орқали мамлакатимиз мактабларида, касб – ҳунар коллежларида, лисейларида ва олий ўқув юртларида ўқиш сифатини тубдан яхшилаш, таълим муассасаларининг ўқув лаборатория базасини замонавий турдаги ўқув ва лаборатория ускуналари, компьютер техникаси билан мустахкамлаш, шунингдек, ўқитувчилар ва мураббийлар меҳнатини моддий ҳамда маънавий рағбатлантириш бўйича самарали тизимни янада ривожлантириш;

Замонавий ахборот ва камуникация технологиялари, рақамли ва кенг форматли телекоммуникация алоқа воситалари ҳамда интернет тизимини янада ривожлантириш, уларни ҳар бир оила ҳаётига жорий этиш ва кенг ўзлаштириш;

Ёш авлодни жисмонан баркамол этиб тарбиялаш, болалар спортини ривожлантириш соҳасида, ёшларни, айниқса, қишлоқ қизларини спорт мажмуаларини, стадионлар ва иншоотларни қуриш, уларни замонавий спорт анжомлари ва жиҳозлари билан таъминлаш, юқори малакали устоз ва мураббийлар билан мустахкамлаш бўйича амалга оширилаётган ишларни изчил кучайтириш;

Шахсий ёрдамчи, дехқон ва фермер хўжаликларида Зооветеринария ва бошқа сервис хизматлари кўрсатувчи инфратузилмалар тармоғини ривожлантириши мақсадида, беш йил давомида қўшимча 575 та зооветеринария шахобчадаги, 330 та сунъий уруғлантириш пунктлари ташкил қилиб, зооветеринария шахобчалари сонини 2343 тага сунъий уруғлантириш пунктлари сонини 884 тага етказиш;

Насилчилик хўжалик мақоми берилган фермер хўжаликларида ҳамда зотни яхшиланган қорамолларни кўпайтириш билан шуғулланган фермер хўжаликларида беш йил давомида 100,8 мингта насилли ва зоти яхшиланган мол этиштириб, уларни аукцион орқали шахсий ёрдамчи, дехқон ва фермер хўжаликларида сотилиши.

Қорақўлчилик Ўзбекистон чорвачилигининг асосан фармонларидан бири бўлиб, кескин ўзгарувчан иқлим минтақасида жойлашган биноян сахро ва чўл худудларидан умумий фойдаланишда, кенг хўжаликнинг қорақўл териларга қўй гўшти ва сут, пўстинбоп қўй териларига, чарим ҳам ҳом ашёсига ва ширдонларга бўлган ехтиёжини қондиришда муҳим аҳамиятга егадир.

Мамлакатимиз янги бозор сиёсатиға ўтиши муносабати билан ҳар бир тармоқнинг тўлиқ хўжалик ҳисобига ўтиши, ўз – ўзини маблағ билан таъминланиши муқаррар бўлиб қолди.

Мамлакатимиз азалдан қорақўл зотининг ватани ҳисобланиб, мазкур зот қўйларнинг бош сонига етиштирилаётган қорақўлнинг рангига кўра жаҳонда етакчи ўринни егаллаб келмоқда.

Қорақўл теридан келадиған даромад, ватанимиз ҳазинасига валюта келтирмоқда.

Бирок, катта имкониятларға еға мазкур соҳа бироз оқсай бошлади. Чунки қорақўлчилик хўжаликларининг имкониятлари ва ички резервларидан тўлиғича фойдаланилмоқда. Келажакда соҳадаги камчиликларни тугатиш учун, қўйилган вазифаларни бажариш учун фан ва техника ютуқларидан кенг миқёсида фойдаланиш, яйловлар ҳосилдорлигини ошириш, юқори даражаға кўтариш, илғор технологияларни жорий етиш, иқтисодий қонунятларнинг талаблари асосида иш жараёнини бошқариш, малакали кадрлар тайёрлаш ва уларға яратилган имкониятлардан самарали фойдаланиш, сотиладиған маҳсулотни ҳом – ашё сифатида емас балки, тайёр маҳсулот сифатида сотиш енг муҳим вазифалардан биридир. Қорақўл терини жаҳон бозорига олиб чиқиш. Ўзбекистон қорақўлини бутун дунёға танишиш мақсадида белға куч – қувват, билим тажрибаларни ишға солиш.

Тармоқни янада такомиллаштириш учун ёшлар бор куч – ғайратларни ишга солмоғи керак. “Ўзбекистон келажаги ёшлар қўлида”, деб айтган юрт бошимиз сўзларини оқлашимиз керак.

2014 йил Ўзбекистон Республикаси қарорида Қишлоқ хўжалигининг машинасозлик корхоналарини бошқаришни янада такомиллаштириш ва молиявий соғламлантириш чора – тадбирларини амалга оширишда корхоналар фаолиятини бошқаришни уларнинг самарадорлиги ва рентабеллигини ошириш, саҳада ишлаб чиқарошни модернизация қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш, агросаноат комплекси учун замонавий, унумдорлиги юқори, ички ва ташқи бозорларида рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришни ташкил этиш қаратилган сиёсатни амалга оширишни таклиф этган эдилар.

Ўз касбимизнинг ҳақиқий фидойилари бўлмоғимиз зарур. Хозирги кунда Ўзбекистонда жами қўй ечкилар сони 17.227.100 бошга етган шундан қорақўл қўйлар сони 3886800 бошга тўғри келади. Келгусида қўйлар бош сонини ошириш, гўшт масулотини кўпайтириш, жун ва қорақўл териларининг сифатини юқори даражага кўтариш олдимизга турган енг мухим вазифадир.

I. Адабиётлар шархи.

Қора рангли қоракўл кўзилар ранглининг пингметациясига қараб 3 га бўлинади. 1) Тим қора. 2) Қора. 3) Қораси етарсиз.

Бу кўзилар ичида жун қоплами тим қора рангга эга бўлганлари жуда қимматли ҳисобланади, улар ўзининг табиий рангини жуда узоқ муддатгача ўзгартирмай сақлаб тура олади. Қораси етарсиз жун қопламига эга бўлган кўзилар кам қимматли ҳисобланади ва уларнинг ранги тез ўзгариб кетади.

Кўзилар жун қоплами рангининг оч тўқлиги, толалар таркибидаги махсус модда пингметларнинг миқдорига боғлиқдир.

Қоракўл кўзилар жун толасига ранг берувчи пигментлар оксиллар турига кирувчи меланин моддасидан иборатдир.

Меланин сўзи аслида “мелас” деган гречка сўздан олинган бўлиб “қора” деган маънони билдиради.

А.И.Инаятов (1986) фикрича, меланин бу цистиннинг тирозин билан бириетирувчидир, қора рангнинг ҳосил бўлиши цистин сероводород қисмининг тирозин билан қўшилмасига боғлиқ.

Бунда цистин қайта тикланиш хусусиятига эга. Қоракўл кўзилар жун қопламида пингметларнинг пайдо бўлиши жараёнинг биринчи марта К.Д.Очилов (1997) ва А.Муродов (2000) таърифлаб берган эди. Афторларнинг аниқлашича қора рангли кўзиларнинг терисида дастлабки пингметлар учинчи ойида вужудга кела бошлайди. Пингметлар меланоцитлар ёки миланофорлар деб аталувчи ўсимтола махсус хужайраларда пайдо бўлиб, сўнгра улар билан ёнма – ён жойлашган бошқа хужайраларга ҳам тарқалади.

Меланоцитлар толанинг пиёзча қисмига тўпланган бўлиб, ўзларининг ишлаб чиқараётган пингменти билан ўсаётган хужайраларни бўяб туради. Қоракўл кўзилар жун толасига ранг берувчи меланин моддаси шаклига кўра донадор ва эриган пингметларга бўлинади.

Н.П.Ролдугина (1976) таъкидлашича донатор пингметларнинг пўстлок катламидаги хужайраларга тўпланган бўлиб, унинг устини эса эриган пингметлар қоплаб туради. Л.Лахонава(1999) таъкидлашича донатор ва эриган пингметларнинг иккаласи ҳам модда меланини икки хил кўринишидир.

О.П.Фишенконинг тасдиқлашича, қоракўл кўзиларнинг жун толасида қора – жигар ранг меланин, қамбар гулигаз кўзиларнинг, шунингдек тилла сур кўзилар жун толасидаги учки қисмида оч-сарик меланин ишқорий эритмада яхши эрийди, кислота билан ёпишқоқ моддага ўхшаш чўкма ҳосил қилади.

Н.П.Ролдугина (1964) кўзилар жун қопламининг таркибида икки хил: донатор ва эриган пингмент (меланин) мавжудлигини тасдиқлайди. Бу пингментлар турли рангдаги кўзиларда ҳар хил миқдордаги ва нисбатда учрайди. Авторнинг қайд қилишича, эриган пингмет, бошқалардан кўра, қамбар кўзиларнинг жунида кўп бўлди. Донатор пингмент эса қора кўзиларда кўп бўлиб, сур кўзиларда улардагидан кўра камроқдир.

М.Х.Арслановнинг (1971) текшириш натижалари шуни кўрсатадики, кўзининг турли қисмларидаги жун толасида шунингдек толанинг турли қисмларида меланиннинг миқдори ҳар хил бўлади. Энг кўп меланин тола пиёзчасининг таркибида мавжуд эканлиги аниқланган. Бинобарин меланин энг кўп туклаган жой тола пиёзчаси ҳисобланади.

Авторнинг маълумотига кўра, турли барра типдаги кўзилар жун қопламининг таркибида меланин миқдори турлича бўлади. Жакет барра типдаги кўзилар жунининг таркибида 16,9%, меланин бўлгани ҳолда, ясси барра типдаги кўзиларникида эса 16,6% ни ташкил қилади, қовурғасимон барра типда 16,0% ни ташкил қилади ва кавказ барра типдаги кўзиларникида эса 15,8% ни ташкил қилади. О.П.Фишенконинг (1968) маълумотига кўра тўқ қора кўзилар жун қопламининг таркибида 14,6% меланин мавжуд бўлса, ўртача қораларникида 13,5% ва оч қора кўзиларда

12,5% меланин бор.Бундай маълумот О.А.Салаватов тадқиқотларида ҳам тасдиқланган.

В.Х.Солиевнинг (1972) ёзишича кавказ барра типдаги қўзиларнинг жун қоплами жуда тез, ясси барра типдаги қўзиларники жуда секинлик билан қўнғирлашади.

С.М.Маматов (1972) ёзган эди. “ Буғозлик даврида барча хил қорақўл типдаги совлиқларни тирик вазни то январ ойигача сезиларли даражада ошиб борди. Совуқ тушиб, ёғингарчилик бошланиб, яйлов озукасининг сифати ёмонлашгандан кейин қўйлар, айниқса ясси ва қовурғасимон типдаги совлиқлар анча ориқлаш ҳолида” деган эди. М.Ж.Зокиров ва бошқалар (1999) тажриба ўтказиб қуйдаги маълумотларни олганлар. Жакет ва қовурғасимон типдаги урғочи қўзилар янги туғилганда ривожланиши ва тирик вазни жиҳатдан ўртача (оралиқ) ўрнини эгалладилар ($3,85 \pm 0,21$ ва $3,67 \pm 0,14$ кг), кавказ типдаги қўзилар уларга нисбатан йирикроқ ($4,12 \pm 0,19$ кг), ясси типдаги қўзилар эса ушоқ ($3,15 \pm 0,12$ кг) бўлиб чиқди. Йирик жингалакли жакет типдаги урғочи қўзилар ривожланиши ва тирик вазни жиҳатдан нисбатан ўртача ($4,21 \pm 0,17$ кг). Кавказ типдаги қўзилар йирик жингалаклиси ($4,51 \pm 0,21$ кг), қовурғасимон типдаги қўзилар ўртача ($4,08 \pm 0,14$ кг) ва ясси типдаги ушоқ ($3,87 \pm 0,13$ кг) бўлиб чиқди, бу маълумотлар статистик жиҳатдан ишончлидир.

С.Ю.Юсупов (2001) бирор белги бўйича деб ёзган эди системали равишда бир хил танлаш ва саралаш турли вақтлар билан ырга қўшилиб мазкур ҳайвонлар наслини, уларнинг ўзи босиб ўтган йўналишда ўзгаришга мажбур этувчи асосий сабабларидан бири бўлиб хизмат қилади. У фенотип бўйича танлашнинг самарадорлиги фенотипига кўра яхши ҳисобланган ҳайвонлар орасида яхши генотиплар анча кўп учрайди, деган тасаввурга асосланади.

М.Ж.Зокиров ва С.Ю.Юсупов (1997) тажрибасига келтирувчи “энг яхши генотипларини энг яхши фенотиплар орасидан излаш керак” деб тавсия

этган. Қониқарсиз боқиш ва асраш шароитида ўстирилган ҳайвонлар орасида яхши ирсий нишоналарга эга бўлганлари кам учрайди. Фенотип кўпинча генотипига мос келмаслигининг сабаби ҳайвонларнинг яхши боқилмаслигидадир. И.Н.Дьячков (1980) шундай деб ёзган эди. “ У ёки бу сифатлар бўйича жуда яхши ирсий сифатларга эга бўлган ҳайвонларни кўпинча боқиш, асраш, парвариш қилиш вабошқа шароит ёмон бўлганлиги сабабли ўз сифатларини юзага чиқараолмайди ва шунинг учун улар ёмон ирсий нишоналарга эга бўлган, аммо яхши боқилган ва асраладиган ҳайвонларга нисбатан заифроқ кўринишга эга бўлиши мумкин”.

Ч. Дарвин табиий шароитда энг яхши индивидлар яхшилаш учун курашадиган яшовчанлик белгисига қараб танланади,деб кўрсатган эди. Ташқи муҳитга энг яхши мослашган ҳайвонлар яшовчанроқ (чидамлироқ) бўлиб чиқади. Суъний танлаш эса хўжалик учун фойдали белгиларига қараб амалга оширилади, аммо бундан хонаки қўйларни урчитишда табиий танланишнинг ҳеч қандай аҳамияти йўқ, деган маъно келиб чиқмайди. Маълумки, табиий танланиш натижасида қўйларда турли белгилар ўртасида корреляция- боғланиш (муносабат) ривожланади. Ушбу муносабатлар кескин бузилган тақдирда ҳайвоннинг ривожланишида нормадан четлашиш содир бўлиши ва яшашга ноқобил органзм вужудга келиши мумкин. Табиий танланиш нормал ривожланган, яшашга қобилиятли мазкур экологик шароитга яхши мослашган қўзилар вужудга келиши ва яшаб кетишига ёрдам беради. Табиий танланиш суъний танлаш билан биргаликда экологик конституционал ва завод типларининг вужудга келишига ижобий таъсир кўрсатади. Суъний танлаш ҳайвонга таъсир кўрсатиш ва янги формалар яратишнинг қудратли воситасидир. Танлаш қайси йўналишда олиб борилса, худди шу йўналишда зарур маҳсулотларига ва хўжалик биологик хоссаларига эга бўлган ҳайвонлар вужудга келади. Танлаш жуда катта кучга эга. Қоракўлшуноснинг саънати селекция қилинаётган қўйлар гуруппасидаги ҳайвонлар органзмида юзага келган энг кичик ўзгаришларни ҳам пайқаб

олишдан иборат. Бу методик танлаш жараёнида янги наслда энг қимматли хоссалар ва белгиларини тўплаб, кучайтириб ҳамда мустаҳкамлаб бориши, юқори маҳсулдорлик сифатлари билан улар қилинадиган линиялар, оилалар, подаларни вужудга келтиришга керак бўлади. Ҳар қандай хўжалик – биологик белгининг ўзгариши - бу ажралган алоҳида ҳодиса эмас, у ўзгарган хоссалар билан коррелятив муносабатида бўлган белгиларнинг ҳам муқаррар суръатда ўзгаришга олиб келади. Нисбий ўзгарувчанлик қонуни селекциялар учун танлашнинг асоси бўлиб хизмат қилади. Шунинг учун экстерери – конституционал ва маҳсулдорлик белгиларига қараб танлаш сунъий уруғлашда ишга методик ёндошиш бирлигини ташкил қилади. Аммо муттасил равишда бир ёқлама, бошқа белгиларни ҳисобга олмай, фақат маҳсулдорлик белгиси асосида танлаш қўйларнинг ёмонлашувиغا келиши, уларнинг конституцияси ва соғлигини зайфлаштириш мумкин (Валиев Р.Г. 1986)

Ирсийланиш (наслдан – наслга ўтиш) генетик тафовутлар билан боғлиқ бўлган умумий фенотипик ўзгарувчанликнинг улушини ифодалайди. Белгининг ирсийланиш коэффициентлари қанча паст бўлса, танлаш самарадорлиги шунча юқори бўлади. Белгиларнинг ирсийланиш коэффициенти (Х.Ф.Кушнер 1979 бўйича) бирнинг улушлари, қуйдагича бўлади: бир ёшлик чоғидаги тирик вазни -0,40 -0,61; тоза жун қирқилиш – 0,38 жуннинг майинлиги -0,57, жуннинг майинлик бўйича мувозанати (бир нотекислиги) -0,43 бундай типларнинг асосий наслик коэффициенти эса - 0,22 тенг бўлади деган эди.

Ўз сифатларини наслига яхши ўтказадиган юқори маҳсулдор наслдор қўчқорлардан доимий фойдаланиш билан бирга сунъий уруғлантиришни кенг қўллаш поданинг наслдорлик сифатларини қисқа муддат ичида анча яхшилаш ва маҳсулдорлигини ошириш имконини беради. (А.А.Раҳимов 1967). Қорақўлчиликда наслдор қўчқорларни танлаш самарадорлигини В.М.Юдин ва бошқалар (1969) томонидан яхши кўрсатилган.

В.М.Юдин қоракўл қўйларини саралашда учта завод қоидасига амал қилган:

Биринчи қоида: “Ўхшаш ўхшаш билан қўшилиб, ўхшаш беради” ёки “яхши билан яхши қўшилиб, яхши беради” ушбу қоидага мувофиқ, қўзилик чоғидаги бонитировка маълумотларига, катта ёшидаги ривожланиши, конституцияси ва экстерьерига, шунингдек, наслининг сифатига кўра энг яхши ҳисобланган қўчқорлар учун нормал даражада ривожланган, лекин келишилган жуссали ва мустаҳкамлаш конституцияси энг яхши элита ва биринчи класс совлиқлар саралаб олинади. Жуфтлар бир хиллаб – гомоген сараланганда сифатли насл қўп олинади.

Иккинчи қоидаси: “Ёмон яхши билан қўшилса яхшиланади” ушбу қоидага муовиқ, ёмон сифат ва барча хоссаларига ёки номатлуб белгиларга эга бўлган (масалан, ривожланиши, гавда тузилиши, конституция типи туғилган вақтида ёки қанча ёшида ёмон бўлган) қўйлар етуклик пайтида нормал ривожланган, келишган жусаси, мустаҳкам конституцияли, юқори сифатли насл берган элита ёки класс қўчқорлардан қочирилади. Шундай қилиб, сифатсиз ёки унга қимматли бўлмаган совлиқлар урчитиш учун қабул қилинган типдаги сифатли қўчқорлардан қочирилади. Бундай саралаш доимо олинандиган наслининг яхшилаш шунга олиб келади.

Учинчи қоида: “Нотекис нотекис билан қўшилиб, текислашади”. Ушбу қоидага муовиқ, шундай тахмин қилинади, нозик конституцияли қўйларни мустаҳкам конституцияли қўйлар билан жуфтлаштириш текислашган (ўртача) мустаҳкамлаш типига яқин қўзилар олишга олиб келар экан. Аммо бундай саралашда хамиша кўзланган мақсадга эришилаверилмайди нуқсонли қўзилар сони ортиб боради. Шунинг учун гап жингалакларни йирик – майдалиги тўғрисида борганда С.Ю.Юсупов (2001) шу усули қўлланиш лозимлигини таъкидлаган. Маълумки, янги туғилган қўзилар жингалаклиги йирик – майдалиги уларнинг ривожланиши даражаси, конституцияси ва барра хоссалари билан боғлиқ бўлади. Шу сабаб жингалакларнинг майда

ёки йирик томонга ўзгариши ўртача жингалакликка нисбатан кўпроқ ходиса деб ҳисобланади. Шунинг учун майда ва йирик жингалакни совлиқларга ўртача жингалакли кўчқорларни саралаб қўшиш ҳар иккита ҳолда ҳам ўртача жингалакни қўзилар сони кўп бўлишига олиб келади. Қорақўлчиликда наслчилик ишини яхшилашдаги вазифа асосий маҳсулот ҳисобланган қорақўл тери етиштиришни кўпайтиришни тери сифатини тобора яхшилаш, ва зотни тобора такомиллаштириш, айниқса қора рангдаги ярим доирали гул жингалаклик жакет нав тери етиштириш мақсадида қўйларнинг қорақўл зотини тобора такомиллаштиришдан иборат. Наслчилик ишлари натижасида қорақўл териларнинг сифатини яхшилаш билан бирга асл зотли, яшаш шароитига мослашган қорақўл қўйларнинг сонини кўпайтириш лозим. Қорақўлчиликда наслик ишларида танлаш ва жуфтлаш усуллари етук молларни боқиш ва асраш, қўзиларни тўғри парвариш қилиш ҳамда насли кўчқорларни талабга жавоб берарлик даражада ва етарли миқдорда кўпайтириш вазифалари билан бир-бирига боғлаб олиб борилишига керак. Қорақўл терининг аъло сифатини, жингалакларининг ўртача ва майда гуллари, терисининг зичлигини ва юпқалигини сақлаш билан бир қаторда унинг сатхини катталаштириш ҳам наслчилик ишининг муҳим вазифаларидандир. Бу ишга аввало селекция ва наслчилик ишиданки, шунингдек завод типидagi қўйлардан тўғри фойдаланиш орқали эришилади. Хўжалик бошқариш усуллари такомиллаштириш ва дунё бозори талабининг ўсиши билан қорақўл зоти билан олиб бориладиган насл ишлари методикасининг такомиллашига ва ўзгаришга олиб келади.

Биринчи марта қорақўлчиликда илмий асосда ишларни юритиш системасини қорақўл қўзиларнинг гул ўлчамларини ва классларини ҳисобга олган ҳолда олимларидан М.Ж.Зокиров ва бошқалар (1999) зоотехника классификацияни ишлаб чиқдилар. Шу борада дунё бозорининг маълум келажагида қорақўл зотини такомиллаштириш, танлаш ва саралашнинг янги методларини ишлаб чиқаришни талаб қилди. Бу методик ишлаб чиқаришда

калам гулларнинг типи ва формаси ҳисобга олиниб, асосий кўрсаткич килибтериларнинг товар қиймати олинди.

С.Ю.Юсупов (2005) томонидан янги туғилган кўзиларнинг барра типлари бўйича классификацияси ишлаб чиқилди. Қорақўл кўзиларни жакет, ясси, қовурғасимон ва ўсинқираган барра типларига бўлиниши ўзини оқлади, қорақўл қўйлар устида олил бориладиган насл ишларининг йўналишини белгилаб берди. Теридаги жингалакларнинг маълум шакллари гулларига, уларнинг кўзи терисида жойлашишига қараб қора рангли қорақўл қўйлари тўрт хил барра типга бўлинади. Терисидаги жингалаклари ярим доира шаклида бўлган типдаги (жакет типли) кўзилар, уларнинг терисида ярим доира ўақлда қалам ва дона гуллар мавжуд бўлиб, териси юпқа ва калинлашган зич, жун қоплами қуюқ, ипаксимон ялтироқ ва жингалаклари бақувват. Бу типли кўзилар кўпгина яхши етилган, конституцияси мустаҳкам, тери зонаси кўп ва териси майин бўлади. Жингалакларнинг очилиши бошқа томонга қараган бўлади, қалам гуллари узун ва ўртача узунликдаги ташқи кўриниши аниқ гулдор бўлади. Утипли кўзилар зотнинг етакчи хилдир ва бу қўйларни қора рангли тери етиштирувчи барча қорақўлчилик хўжаликлари кенг миқёсида урчитишлари лозим.

Терисидаги жингалаклари ўсиқираган типдаги кўзилар (кавказ типи) уларнинг жун узунлиги бирмунча ўсинқираган, жингалаклари кўпгина бўш дона гулсимон улакдор етилувчан эмас ва нотекис жойлашган. Кўзиларнинг конституцияси кўпол. Бу гуруҳга қирадиган кўзилар одатда кам боҳолик тери берадиган ва ярим доира шаклдаги қалам гулли мустаҳкам ёки нозик конституцияли қўйлар билан урчитилиб яхшиланиши лозим.

Терисидаги жингалаклари ясси бўлган типдаги кўзилар (плоский тип) ясси айланма гулли, қисман чаппа ва ясси гуллари билан характерланади. Аммо ипаксимонлиги аъло даражада, жун қопламининг ялтироқлиги жуда кучли, териси юпқа ва зич бўлади. Терисининг хусусияти ясси 1 – навли кўзиларнинг энг яхши хилига тўғри келадиган қўйларни маълум мақсад

билан урчитиш ҳам талабга муофикдир қовурғасимон шаклда бўлган типдагиқўзилар терисидаги жингалаклари қовурғасимон шаклда бўлган қалам гуллар, чаппа ва ясси гулларнинг аралаш бўлиши билан характерланади. Буларнинг жун қоплами қисқа, ипаксимон етарли даражада эмас, қуруқ жунлардан иборат буларнинг терисида баъзан шаклсиз гуллар ҳам бўлади. Баъзан қўзиларнинг териси факат чаппа ва ясси гуллардан иборат. Жингалакларнинг очилиши кўпинча дум томонига бўлади. Қоракўл зотининг ичида сифатли гуруҳларнинг бўлиши бу зотни янада такомиллаштириш учун шароити яратиб беради. Қоракўл зоти одатда тоза ҳолда урчилади. Аммо узоқ муддати бир зотнинг ўз ичида урчитиш олиб борилса бу зотнинг маҳсулдорлиги пасайиб кетади. Бунинг тузатиш учун боўқа шароитда тарбияланган насли кўчқорлардан фойдаланилади. Қоракўлчиликда ҳам уларнинг барра тери такомиллаштириш учун бошқа подада ўстирилган кўчқорлар келтирилиб уларнинг уруғи билан маҳаллий совлиқлар қочирилади.

А.К.Лебедев (1976) маълумотиға кўра, “Гагарин” номли давлат наслчилик заводининг сур рангли қўзилар “Фориш” савхозида ишлаб чиқариладиган терининг сифати яхшилашда ижобий таъсири этганини қайд этган. Териларда жун қопламининг ипаксимонлиги, ятироқлиги гуллари яхшиланиб, қалам гуллар узунлашган.

Ш.М.Ризаев (1972) қайт этадики, “Қоркўл терисининг сифатини яхшилашда асосий йўллардан бири бошқа хўжаликдан бири бошқа хўжаликдан насли кўчқор келтириш ва хшжаликлар аро қшчқорлар алмаштиришдир”. Бошқа хўжаликдан келтирилган кўчқорлардан муваққиятли равишда фойдаланилган тўғрисида маълумотларға А.А.Раҳимов (1973) ўз ишида кўрсатиб ўтади. Н.С.Гигинейшвили (1976) фикрича, қора қоракўлчилик хўжаликларида кўк рангли қоракўл қўйларини урчитишда хўжаликлар ора кўчқор алмаштиришни кенг қўллаш керак. Бошқа хўжаликларнинг кўчқорларидан эффеқтли равишда фойдаланиш тўғрисидаги

маълумотларни Б.Н.Васин ва бошқалар (1971), А.А.Раҳимов (1967) ва бошқалар ўз ишларида кўрсатиб ўтганлар.

“Вўзор” давлат наслчилик заводига “Нишон” давлат наслчилик заводидан қора рангли кўчқорларни келтириб, кўк рангли совлиқлар билан жуфтлаганда икки йил тажриба давомида махалий кўчқорлар наслига 15,2% элита ва 12,2% биринчи класс кўзилар кўпроқ олинган. Р.Г.Валиев (1989), кўрсатадики, қора рангли қоракўл кўйларининг сифатини яхшилашда боўқа юқори махсулдорли подаларнинг кўчқорларидан фойдаланиш керак. Қоракўлчиликда наслчилик ишларининг юргазиш ва кўзиларни баҳолаш (бонитировка қилиш) бўйича кўлланмасида (2000) наслчилик ишининг вазифаси ва режага мувофиқ наслчилик хўжаликларидан кўчқорлар келтириш тажрибасини кўллаш тавсия этилади. Юқорида келтирилган маълумотлар шуни кўрсатадики наслчилик ишини тўғри йўлга кўйганда наслчилик хўжаликлардан фойдаланиш қоракўл кўйларининг махсулдорлигини такомиллаштиришда асосий зоотехника тадбирларидан биридир. Африка наслчилик иши олиб борадиган немис олимлари ҳам гул узунлигини ўрганиш, гул тўри, шакли ва барра типлари билан алоқодорлигини аниқлаганлар. Х.Э.Маттернинг (1976) маълумотига кўра, гул эни билан жун узунлиги орасидаги боғланиш коэффиценти $Z=0,524$ га тенг. Шундай қилиб, қоракўлчиликда ўзора мустақил бўлган тўртта барра типборлиги тан олинди ва 1961йилдаги “қоракўл кўзиларни бонитировка қилиш” ва наслчилик ишининг асослари кўлланмасига” киритилди. Лекин бу ҳам факат қора рангли тоза зотли қоракўл кўзиларга таълуқли эди. Шу кўлланманинг 1967 йилдагига эса олиб борилган танлаш ва жуфтлаш тажрибаларнинг натижалари ҳам кўшилди, ҳамда тоза зотли кўк ва сур қоракўл кўзиларни ҳам барра типларга бўлинадиган бўлди.

Қоракўлчиликда жун тола узунлиги кўпгина омилларга боғлиқ асосан яйлов шароитига қарайди. Бу эса яйловларда ҳосилдорлик жуда ўзгарувчан (А.П.Воробьеский 1991). Республикамизда етиштирилаётган қоракўл

терилари нафакат ранг ва нави билан ҳатто кўпи хилма – хиллиги билан ҳам фарқ қилади. Ана шундай хилма – хил бўлишида жун қопламининг пигментациясига боғлиқдир. Пигментацияси Эта гуруҳга бўлинади. Тим қора, қора ва қораси етарсиз.

Булар ичида тим қора рангиги эга бўлганлари жуда қимматли ҳисобланиб, улар ўзининг табиий рангини жуда узоқ муддатга ўзгартирмай сақлаб туради. Қораси етарсиз жун қопламига эга бўлган кўзилар кам қимматли ҳисобланади ва уларнинг ранги тез ўрганиб кетади. Терилар жун қоплами рангининг оч – тўқлиги, толалар таркибидаги махсус модда пигментларнинг миқдорига боғлиқдир. Қоракўл терисидаги жун толаси ранг берувчи пигментлар оксиллар турига кирувчи мезнин моддасидан иборат. Қоракўл кўзилар жун қопламида пигментларнинг пайдо бўлиши жарёнини биринчи марта М.Х.Арсланова (1973) ва О.П.Фищенко (1984) таърифлаб берган эди. Авторларнинг яқинлашига қора рангдаги кўзиларнинг терисида дастлабки пигментлар учунчи ойда вужудга кела бошларкан. Н.П.Ролдугина (1963) кўзиларнинг жун қопламининг таркибида икки яни донатор ва эриган пигмент (меланин) мавжудлигини тасдиқлади. Бу пигментлар турли рангдаги кўзилардан ҳар хил миқдорда ва нисбатда учрайди. М.Х.Арслоновнинг (1969) текшириш натижалари шуни курсатадиган кўзининг турли қисмларидаги толасида шунингдек толанинг турли қисмларида меланиннинг миқдори ҳар хил бўлади. Энг кўп меланин тола пиёзчасининг таркибида мавжуд эканлиги аниқланган. Автор маълумотида кўра турли барра типдаги кўзилар жун қопламининг таркибида меланин миқдори турлича бўлади. Жакет барра типдаги кўзилар жуннинг таркибида 16,9% меланин бўлганлиги ҳолда, ясси барра типдаги кўзиларникида эса 16,6% ташкил қилади. Қавурғасимон барра типдаги 16,0 %ни ташкил қилади ва кавказ барра типдаги кўзиларникида 15,8% ни ташкил қилади.

А.И.Иноятов (1986) маълумотида қараганда, тим қора кўзилар жун жун таркибида 14,6% меланин мавжуд бўлса, ўртача қораларникида 13,5% ва

қораси етарсиз кўзиларникида 12,5% меланин бор экан. Қоракўл кўзиларнинг класслари ва навлари қанча юқори бўлса улар рангининг тўқлиги ҳам ўунча юқори бўлади. А.И.Инаятов (1986) тақидлашига кўра, қора рангда кўзилар жун толасининг таркибидаги меланин миқдори ота – онасининг рангига қараб ҳам турлича бўлиши мумкин. Масалан: қора рангдаги ва кўчқордан олинган қора кўзилар жун толасининг таркибида 10,9% меланин мавжуд бўлган, холда қора совлик билан сур кўчқорни жуфлаштириш натижасида олинган қора кўзиларники 10,6% ота – онаси тилла сур бўлган қора кўзилар жуни таркиби 7,6% меланин бор. Қора кўзиларга нисбатан рангдор кўзилар жун меланин таркибида меланин анча кам бўлади.

Масалан: қора рангдор совлик кўчқорлардан олинган қора кўзилар жунида пигментлар миқдори 100% деб олсак, сур кўзиларнинг жун толасидаги меланин миқдори 50% ни, жигар ранг кўзиларжунидаги 38,0% ва гулигаз кўзиларнинг жунидаги пигмент 32,0% ни ташкил этади.

Қоракўлчиликда наслчилик ишларини юргозиш ва кўзиларни баҳолаш (бонитировка қилиш) бўйича қўлланма (2000) ва териларни товар хусусиятларини ўрганиш (ЎзРСТ 041-95) талаблари асосида қора кўзилари ва териларни оч тўқлигига катта эътибор берилган.

Инструкцияга мувофиқ тўқ қора кўзилар ва терилар 10 балл, ўртача қора кўзилар ва терилар 6 балл ва оч қора кўзилар ва терилар 3 балл билан баҳолаши муҳимлиги кўрсатилган.

Қоракўл кўзилар териси саноатда бўяш йўли билан тўқ қора рангга айлантирилади. Бироз қора қоракўл кўзилар жун қоплами рангининг оч тўқлиги уларнинг биологик хусусиятлари билан боғланган бўлганлиги туфайли тери сифатига ҳам таъсир кўрсатади. В.И.Сетаяновскаянинг (1960) таъқидлашига кўзиларнинг ранги, организмнинг соғломлиги, конституцияси ва ҳаёт фаолиятини кўрсатувчи ўзига хос белги (индикатор) дир.

Зот ичида (худудий) тип – Аниқ хўжалик ва табиий шароитда одамларнинг ижодий фаолияти натижасида яратилган қорақўл қўй зотининг гуруҳи ҳисобланиб, узотнинг умумий хусусиятлари билан бир қаторда ўзига хос маҳсулдорлик, тана тузилиши, конституцияси, урчитиш худудига мослашиш, касаллик ва ташқи муҳит таъсирига чидамли, юқори самара бериш хусусиятлари билан характерланади.

Завод типи – наслчилик заводи, наслчилик хўжалиги ва уларнинг таъсири доирасидаги хўжаликларда селекцияларнинг узоқ муддатли ижодий фаолияти натижасида линияли урчитиш ва уларнинг классларини мослаштириш натижасида яратилган қорақўл зотининг чегараланган гуруҳи бўлиб, у ўз специфик морфологик, физиологик, маҳсулдорлик хусусиятларини, маълум хўжаликларда урчитиладиган қўйларга ҳам хўжалик бой белгиларни мужассамлаштирилган янги тип ҳисобланади. Завод типи - янгилиги, фарқланиш, ўхшашлиги ва турғунлиги билан характерларинилозим. (Х.Гиёсов ва бошқалар 2001.).

Селекция самарадаорлигига таъсир кўрсатувчи асосий омиллардан бири белгиларнинг наслга берилувчанлигидир. Наслга берилувчанлик коэффиценти яхши йўлга қўйилган селекция шароитда, қанчалик юқори бўлса селекция самараси ҳам шунга юқори бўлади ва аксинча, белгиларнинг наслга берилувчанлик коэффиценти паст бўлган шароитда мақсадли селекция самарасига етиш қийин. Тадқиқотларнинг натижалари кўрсатишча, келиб чиқиши маълум наслга кучли бериладиган экстерьер, конституция, маҳсулдорлик ва бошқа кўрсаткичлар бўйича ўхшаш селекция ютуғини яратиш режаси талабларига жавоб берадиган етарли микдордаги қўйларнинг мавжудлиги. Бу шароитда тоза зотли насли қўйлар сони қўйдагидан кам бўлмаслиги лозим. (Х.Гиёсов 2001).

М.Ж.Зокиров ва бошқалар (1999) маълумотида кўра, тўла консервалаш, ошлаш жарёнида қорақўл терилар юзасининг катталиги асл холига қайтади. Бтроқ қуриштиш жараёнида температура ва бошқаларга қараб териларнинг

кичрайиши анчагина ўзгариб туради. Одатдаги қуришиш майдончасида офтобга ёйиб қурилганда қуруқ тузланган терилар юзасининг катталигига нисбатан кичрайиши 11,0% ни, одатдаги майдончада сояда қурилганда 7,32% ни, одатдаги майдончада кечаси қурилганда -7,11% ни, бетон ёткизилган майдончада офтобда қурилганда 10,99% ни, иккинчи марта тортиб қўйиб, қурилганда 5,19% ни, маҳкамлаб қўйибмеханик усулда қурилганда -2,05% ни ташкил қилди. С.А.Асамов ва бошқалар (1988) яйлов озиқа шароитида яхши жойлашган хўжаликларда (“Конимех”, “Нишон” давлат наслчилик заводи ва “Чимқўрғон совхоз”) қорақўл терилар вазни озиқа камроқшароитда жойлашган хўжаликлардагига нисбатан (“Жонгелди” наслчилик хўжалиги ва “Қорақата” савхоз) 8-22% ортқидир. М.Ж.Зокиров ва К.К.Каримов (1987) тажрибаларида ҳар хил сорт ва рангларда мансуб қорақўл терилар ўртасида ҳам тери тўқмасининг қалинлиги жиҳатдан мўайян тофовутлар бор. Москва жакет, кирпук ва ясси юпка 1 сонларига кирувчи қорақўл терилар тери тўқмасининг ниҳоятда юпка эканлиги билан; жакет – II, қовурғасимон юпка -1 ва ясси қалин-1 сортлари ўртача қалинлиги билан Кавказ қалин-1, кавказ юпка -1, қалин жакет ва қовурғасимон қалин-1, сортлари эса мағзли эканлиги билан характерланади. М.Ж.Зокиров ва бошқалар (1999). Шунини айтиб ўтиш керакки, қорақўлнинг қимматли ҳисобланувчи жакет 1, кирпук, қовурғасимон юпка -1 навлари тавор сатҳи бўйича бир хил текисликда узун жингалакларива кам қимматли ҳисобланадиган. Кавказ қалин-1, кавказюпка-1, навларига эса унча текис эмас, анча калта жингалаклар характерлидир. И.Н.Дьячков (1980) қорақўл қўйлари гул жингалаклари узунлигига қараб танлаш ва селекциялаш юксак даражада самарали эканлигини аниқлади.

А.Ибрагимовнинг (1978) тадқиқот натижаларига кўра турли завод типдаги қўйлардан олинган терилар жун қопламининг ипаксимонлиги турлича бўлади. Авторнинг фикрича “Навоий” ва “Свердлов” завод типларнинг терилари, “Қорақўл”, “Нурота”, ва “Қизилқум” завод

типлариникидан ипаксимонлиги бўйича юқори туради. Р.Г.Валиев (1984) маълумотига кўра турли завод типдаги кўчқорлардан олинган авлодлар жун қопламининг ипаксимонлик даражаси турлича бўлиши мумкин. Авторнинг таъкидлашича, памук кўчқорларидан олинган авлодлар орасида жуни ўта ипаксимонликка эга бўлган кўзилар кўпроқ учрайди. Бу эса “Конимех” давлат наслчилик заводи кўйларининг ипаксимонлик даражасини оширишга ижобий таъсир кўрсатади.

Биз битирув малакавий ишни бажаришимизда турли рангли кўйларни жуфтлаш натижаларидан фойдаланишнинг айрим натижаларини кўзиларни хусусиятларини таққослаб ўрганишни мақсад қилиб олдик.

О.П.Фишенконинг (1981) таъкидлашича қора рангдаги кўзилар жун толасининг таркибидаги меланин миқдори ота-онасининг рангига қараб ҳам турлича бўлиши мумкин. Масалан: қора рангдаги кўчқор ва совлиқдан олинган қора кўзиларжун толасининг таркибида 10,9% меланин мавжуд бўлган ҳолда қора совлиқ билан тилло сур кўчқорни жуфтлаштириш натижасида олинган қора кўзиларникида 10,6%, ота-онаси тилло сур бўлган қора кўзилар жунининг таркибида 10,3% меланин бор.

Қора кўзиларга нисбатан рангдор кўзилар жун толасининг таркибида меланин анча кам. Масалан: қора рангдаги совлиқ ва кўчқорлардан олинган қора кўзилар жунидаги пигмент миқдорини 100% деб олсак сур кўзиларнинг жун толасидаги меланин 50-50% ни, жигар ранг кўзилар жунидаги 38,0% ва гулигаз кўзиларнинг жунидаги пигмент 32,0% ни, ташкил этади.

Рангдор кўзилар жун қопламининг таркибидаги меланин миқдори улар рангининг оч тўқлигига ва ота-онасининг рангига қараб ҳар хил бўлади, яъни рангдор қоракўл кўзиларда қора рангли кўйларнинг таъсири камая борган сари, уларнинг жун толасида меланин миқдори ҳам камаяди. Шунингдек ота-онасининг ранги бир хил бўлган бир тусли кўзиларда ҳам,

уларнинг ранги қанча оч бўлса, толалардаги меланин миқдоришунча кам бўлади.

О.П.Фищенко (1970, 1978) электрон микроскоп ёрдамида ўтказган текширишларнинг натижасига асосланиб, қоракўл қўзилар жун толасининг пигменти икки хил морфологик тузилишига эга бўлиши мумкинлигини уқтиради: а) алоҳида якка доначалардан. б) доначаларнинг ўзора бирлашувидан ҳосил бўлган турли шаклдаги (урчуксимон, юлдузсимон, юмолоқ, таёқча ва шунча ўхшаш) пигмент тудалардан иборат лигини кўрсатади. Турли рангга эга бўлган қоракўл қўзиларнинг жун толасидаги пигмент парчаларининг катталиги турлича бўлиши мумкин энг йирик пигмент парчалари қора рангдаги совлиқ ва қўчқорлардан олинган қора қўзиларнинг жунида мавжуддир. Қамбар (жигарранг) қўзиларнинг жунида икки хил катталикга эга бўлган (майда ва йирик) пигмент парчалари учрайди. Бу ерда шуни ҳам қайд қилиш керакки йирик парчалар майда парчаларнинг бирлашувидан ҳосил бўлмасдан балки уларнинг ўзлари алоҳида пардали мустақил тузилишга эга бўлган парчалардир.

А.И.Инаятов (1986) қоракўл қўзиларнинг жунида (кўпчилик авторлар тамонидан қайд қилинган), пигментларнинг (дифузний) шаклини учратмаганларини қайд қилдилар.

Авторларнинг фикрича меланин парчалари жуда кичик бўлганлиги учун уларнинг шакли ва катталигини одатдаги микроскоп ёрдамида ўрганиб бўлмайди.

Уларнинг тузилиши тўғрисида аниқ маълумотларни фақат электрон микроскоп ёрдамида олиш мумкин. Қоракўлчиликда наслчилик ишларини юргизиш қўлланмасида (2001) қора қўзилар рангининг оч тўқлигига катта эътибор берилган. Бу инструкцияга мувофиқ тўқ қора қўзилар 10 балл, ўртача қора қўзилар 6 балл ва оч қора қўзилар 3 балл билан баҳоланиши муҳимлиги кўрсатилган. Қоракўл қўзилар териси саноатда бўяш йўли билан тўқ қора рангга айлантирилади. Бироқ қора қоракўл жун қоплами рангининг оч

тўқлиги уларнинг биологик хусусиятлари билан боғланган бўлганлиги туфайли тери сифатига таъсир кўрсатади.

С.Ю.Юсупов (2005) таъкидлашича кўзиларнинг тери ва жун қопламнинг ранги, организмнинг соғломлиги, конституцияси ва ҳаёт фаолиятини кўрсатувчи ўзига хос белгидир.

II. ХЎЖАЛИКНИНГ ҚИСҚЧА ТАРИХИ.

“Сарибел” наслчилик ширкат хўжалиги Ўзбекистон қишлоқ хўжалик вазирлигининг 26 август 1957 йилдаги № 318-К буйруғига асосан Бешрабат массивидаги чорва фермалари асосида ташкил топган. Унинг маркази “Янги ғазғон” деб белгиланган.

Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 28 апрел 1976 йилдаги № 208 буйруғига асосан, аввалги “Коммунизм” ҳозирги “Сарибел” совхозига “Давлат наслчилик заводи” мақоми берилган. 1980 йили заводнинг №3 фермаси асосида “Комсомолобод” совхозида ташкил қилинган. 1992 йилнинг августида “Коммунизм” наслчилик заводи “Сарибел” деб номланган. 1994 йил “Сарибел” уюшмага 1999 йил март ойдан бошлаб “Сарибел” наслчилик ширкат хўжалигига айлантирилган.

Хўжалик ташкил бўлган йиллардан бошлаб сур рангли қорақўл териларга ички ва айниқса ташқи бозорларда талаб тез ўса бошлади. Қора рангли қорақўлга нисбатан сур рангли терилар нархи 1.5 баровар ошганлиги сур қўйларини урчитишга катта туртки бўлди.

Сур қўйларни урчитиш учун етарли илмий усул, ишланма ва таклифлар борлиги хўжаликларга катта фойда берди.

“Сарибел” хўжалиги ташкил бўлганда (1957 йил) 70 мингдан кўпроқ қўй бўлиб уларнинг 95 % дан кўпроғи қора ранга мансуб бўлиб, дурагай ва пац синфлилар 40 % дан кўпроғини ташкил қилган.

Хўжаликнинг иқтисодини яхшилаш мақсадида 1961 йили Оёқ-оғитма тажриба цансиясидан 50 бош ва 1969 йили Бухоро вилоятининг колхозларида 150 бош сур қўчқорлар крлтириб сурчилик билан шуғулланишга асос солинган эди. Келтирилган сур қўчқорлар билан хўжаликдаги қора рангли қўйлар сун’ий усулда уруғлантириш йўли билан уларнинг ирсий та’сирини оширишга эришилган. Натижада қора рангли гетерозигат қўйлар йилдан – йилга кўпайиб уларни сур қўчқорлар билан уруғлантириш асосида сур қўзи олиш имкони яратилган. ранг бўйича ҳар хил

жуфтлаш, яъни гетерозигат кора рангли қўйлар (сур қўчқорлардан туғилган) сур қўчқорлар билан жуфтлаштириш туфайли 50 фоизгача сур қўзи олиш имконига эришилган эди.

Сур рангли қўйлар кўпайиши билан сур ранг бўйича бир хил жуфтлашга ўтиш туфайли сифатли, сурлик даражасининг номоёнлиги яхши ифодааланган, жун тола сифати яхши қўзилар йилдан-йилга кўпайиб уларнинг орасидан насли қўчқорларни танлаш имкони туғила бошлаган эди. Бир йўла пац синфли ва курагай қўйларни суеувдан чиқариш ишлари ҳам олиб борилган натижада 1961 йил хўжалик 1.2 % сур тери этиштирган бўлса, 1980 йилга келиб терилар

“Сарибел” наслчилик ширкат хўжалиги 1976 йили наслчилик завод тоифасига ўтказилган. Шу билан бир вақтда хўжалик Бухоро сури қоракўл қўйларининг ясси гул типини урчитишга ихтисослаштирилган эди. Юқорида айтилганидек ўтган даврда хўжаликдаги қўйларни 99.4 фоизи сур рангга мансуб бўлишига эришилган. Ҳар йили пац синфли ва қорасур қўйларини сурувдан чиқариш натижасида уларни 40 фоиздан 18-20 фоизга тушишиг эришилган.

Насли сур қўчқорларини танлашга эътибор йилдан йилга ошиши натижасида уларнинг сифатлари яхшиланиб қалам гуллилари ва ясси гуллиларидан иборат бўлишига эришилган. Уларнинг 70 фоизи элита синфига мансуб. Яна бир муҳим ютуқ бу хўжаликдаги сур қўйларнинг 70-80 фоизи кумушсур рангбарангликда бўлишидир. Ясси гулли қўйлар селекциясига алоҳида эътибор берилиши ва ясси гулли сур қўчқорларидан су'ний уруғ'лантириш усули орқали унумли фойдаланиш шу қўйларнинг хўжалик подасида 30-35 фоизни ташкил қилишга олиб келади.

Умуман олганда, “Сарибел” наслчилик ширкат хўжалигидаги Бухоро сури қоракўл қўйлари ўзига хос юқори махсулдор яссигулли кумуш ранг барангликдаги генафондига айланган.

Эндиги вазифа 2012-2014 йилларда еришилган селекцион ютуқларни муцахкамлаб мақсадли жуфтлаш асосида наслчилик ишларини хўжалик қоракўл қўйларини махсулдорлик ва наслий хусусиятларини такомиллаштириш зот типига мансуб қўйларни сифатий ва миқдорий жихатдан ривожлантириш талаб қилинади. Натижада хўжаликда қоракўл қўйларидан олинган махсулотларнинг экспорт боплиги ошади, қўйларни сифати яхшиланади. Булар хўжаликнинг самарадорлигини янада юқори бўлишига сабаб бўлади.

Хўжаликнинг табиий шароитлари.

Хўжаликнинг умумий тер майдони 159861 гектар бўлиб шулардан 159783 гектари табиий яйловлардир. Умумий ер майдонининг 120 000 га бутазор ва саксовулзорлар ташкил этади. “Сарибел” наслчилик ширкат хўжалиги Навоий вилояти Конимех туманида жойлашган. Унинг шимол қисмида “Қизилқум”, шарқида “Оёқ-қудуқ”, жанубида “Саржал”, “Ғозғон” ва ғарбида “Қизилча” ҳамда Абай номидаги ширкат хўжаликлари жойлашган.

Иқлим шароити кескин ўзгарувчан, ёзда ниҳоятда иссиқ ва қуруқ, қишда совуқ ҳавоси билан фарқ қилади. Ҳавонинг ўртача йиллик ҳарорати 15-16С. Энг иссиқ ой июл, бу ойда ҳарорат 44-46С бўлиши мумкин. Декабрь ойининг охири ва январ ойи энг совуқ давр ҳисобланади. Бунда ҳаво ҳарорати -2С дан то -28С гача бўлиши кузатилган. Ҳавонинг намлиги ўртача 30% бўлиб, ёзда 10% гача бўлиши мумкин. Йиллик ёғингарчилик ўртача 160-170 мм, унинг энг кам миқдори 80-90 мм ва юқориси 280-300 мм бўлиши кузатилган.

Хўжаликнинг яйлов ҳосилдорлиги турли хил бўлиб, ўртача 2-3 ц.ни ташкил қилади. Хўжаликда асосан рангли ўсимликлар эфемер бир йиллик ўтлардан илок, арпоғон, қўнғирбош, ялтирбош ва бошқалари кўп учрайди. Бундан ташқари бута ва ярим буталарда сингрон боржок, салин, черкез, коврак, оқ ва қора саксовул ўсимликлари ҳам кўп учрайди ва қуйидагича таърифланади.

РАНГ, ҚОРАБОШ - Ҳилолдошлар оиласига мансуб эфемероид бўйи 6-25см. Соз, кумок, механик таркибли бўз тупроқларда тарқалган ўсимлик. Ранг тупроқнинг юқори қатламини бутунлай қамраб олади. Эрта баҳор (куз) майсалайди, апрель ойида гуллайди, майда уруғлари пишади.

Бошоғи қўнғир қорамтир тусда бўлгани сабабли қорабош номи билан ҳам аталади. Барча зотли чорва- моллари, бутун йил давомида хуш кўриб ейувчи озуқа. Ранг пичани таркибида 19% протеин, 4,5% ёғ, 46% АЭМ ва 20,5% клетчатка бор. 100 кг пичани таркибида ёзда 51,7 озуқа бирлигига эга.

ҚЎНҒИРБОШ – Ғалладошлар оиласига мансуб, бўйи 15-35см, эфемероид. Турли-туман тупроқ, экологик шароитларда (гипс, бўз, шағалли тупроқларда, тоғ этаклари) кенг тарқалган тур. Эрта баҳорда майсалайди, апрель майда гуллайди ва уруғлари пишади. Уруғи қўнғир пиёзча, шунинг учун ҳам уни қўнғирбош деб аташган.

Қўнғирбош кўкат ҳолида ҳам, қуригандан кейин ҳам чорва молларининг тўйимли хуш кўриб ейилувчи озиғи ҳисобланади. Унинг пичани таркибида 10,1% протеин, 1,5% ёғ, 4,4% АЭМ ва 35-40% клетчаика сақлайди. 100 кг пичанида 64,6 озуқа бирлиги бор. Табиий яйловлар маҳсулдорлигини оширишда истиқболли фитомелиорант.

ИЛОК - Ҳилолдошлар оиласидан, қумсевар илдизпояли эфемероид, бўйи 15-25см. У кучли ва кам ривожланган қумлар, қум тепаликлар орасидаги текисликлар, қумли тупроқларнинг шўрланмаган майдонларида кенг тарқалган. Қумни мустаҳкамловчи ўсимлик, унинг илдизлари тупроқнинг юза қисмида кучли ривожланган. Февралнинг охиридан майсалай бошлайди. Куз серёмғир, илиқ келса, октябрь-ноябрь ойларида ҳам кўкаради, мартда гуллайди, апрелда уруғ беради. Қумли яйловларнинг барча зотли моллари учун ўта муҳим баҳорги кўкат ҳисобланади Қуруқ хашаги ҳам тўйимли озуқа. Баҳорда илок пичанида (гуллаш даври) 14,1% протеин, 2,7% ёғ, 48,8% АЭМ ва 24,1% клетчатка бор. 100 кг пичанида 94 озуқа бирлиги сақлайди.

ЯЛТИРБОШ – Ғалладошлар оиласига мансуб, бўйи 15-40 см келадиган бир йиллик ўт. Зичлашган қумлар, бўз тупроқлар ва қўнғир-бўз тупроқларда кенг тарқалган. Февраль-мартда униб чиқади, апрелда гуллайди ва уруғ беради. Қўкат ҳолида ҳам қуриганида ҳам чорва моллар учун яхши озиқа. Уруғ тугиш даврида пичани таркибида 17,5% протеин, 3,6% ёғ, 45,0% АЭМ, 8,5% кул моддалари ва 25,27% клетчатка сақлайди. Тўйимлилиги 92,3 озука бирлигига тенг. Қумли, гипсли чўл яйловлари маҳсулдорлигини оширишда истиқболли фитомелиорант.

АРПАҒОН - Ғалладошлар оиласидан, бўйи 10-25см, эфемер. Қум ва бўз тупроқли майдонларда ўсади. Март-апрелнинг бошларида қўкариб чиқади май ойида уруғлари пишади. Уни чорва моллари қўклигида ҳам қуриганидан кейин ҳам яхши ейди. Об-ҳаво қулай келган йиллари ундан хашак жамғариш мумкин.

ЧИТИР - Крестгулдошлар оиласига мансуб, бўйи 10-50, эфемер, Ўзбекистонда читирлар туркумига кирадиган ўсимликларнинг 14 тури мавжуд. Читирлар чўлларда турли-туман тупроқ шароитларда ўсади, аксарият адир ва тоғ олди яйловларида кенг тарқалган. Читирлар орасида энг тўйимлиси ва ҳосилдори оқ. читирдир. Оқчитирлар март ойида майсалайди, апрель-майда гуллайди, май-июнда уруғи пишади. Оқчитирни барча турдаги чорва моллари хуш қўриб ейди. Пичани эса ўта тўйимли бўлиб, ундан озиқланган моллар тез семиради. Оқчитир пичани таркибида 24.2% протеин ва 22,6% клетчатка мавжуд. 100кг пичанида 96,2 озука бирлиги бор. Сернам йиллари чорвадорлар қўплаб читир хашаги ғамлайдилар. Читирлар яйловлар маҳсулдорлигини оширишда ҳам истиқболли ўсимликлар ҳисобланади.

НЎХАТАК – Дуккакдошлар оиласидан, бўйи 10-40см келадиган бир йиллик ўт. У бўз, қўнғир - бўз, тупроқларда зичлашган қумларда ўсади. Нўхатак қоракул қўйлари, эчки, қорамолларнинг тўйимли озиғи. Уни чорва моллари қўкат ҳолида ҳам, пичан ҳолида ҳам яхши истеъмол қилади. Нўхатак

пичани таркибида (уруғ тугиш даврида) 22,37% протеин, 2,65% ёғ, 49,8% АЭМ, 10,36% кул моддалари ва 14,9% клетчатка мавжуд.

Бир йиллик шўра ўтлар.

БАЛИҚ КУЗ - Шўрадошлар оиласига мансуб бир йиллик ширали шўра ўт. Ўсимпикнинг бўйи 20-60см. Барглари этли, ширали, яримяссимон, қўнғир хаворанг тусда. Тақирсимон, қўнғир-бўз, турли даражада шўрланган кумлар. Шўрхок майдонлар атрофларида ўсади. У март ойида униб чиқади. Июль август ойида гуллайди, уруғлари сентябрь-октябрда пишиб етилади. Балиқкуз куз ва қишда қўй ва туялар учун яхши озуқа ҳисобланади. Бошқа бип йиллик шўра ўтлар қатори балиқкуз қочириш даврида муҳим озуқа ҳисобланади. Балиқкуз пичани таркибида 6,6% протеин, 5,6% ёғ, 19,3% АЭМ ва 18,9% клетчатка бор. 100 кг пичани баҳорда 23, ёзда 47, кузда 36 ва қишда 30 озуқа бирлигини сақлайди. Шўрхок тупроқли яйловлар, гипсли чўл яйловлари маҳсулдорлигини оширишда истиқболли тур.

ДОНАШУР - Шўрадошлар оиласидан, паст бўйли бир йиллик ширали шўра ўт. Тақирлар ва шўрланган тупроқларда ўсади. Пояси тик, асосидан шохланган кўлранг тусда. Пастки барглари ясси, устки барглари навбатлашиб жойлашган, этли, икки томони ва тукчалар билан қопланган. Донашур март ойида униб чиқади, май-июнда гуллайди, уруғлари анча эрта (август-сентябрь пишиб етилади). У қўй ва туялар учун куз ва қиш ойлари давомида ейилувчан озуқа ҳисобланади. 100 кг куруқ пичанида 34 озуқа бирлиги бор. Шурланган яйловлар маҳсулдорлигини оширишда истиқболли тур.

ХАРИДАНДОН, БУЗОҚБОШ – Шўрадошлар оиласига мансуб бир йиллик шўра ўт, бўйи 25-30см. Шўрхоклар, тақирлар ва бошқа шўрланган тупроқларда ўсади. Барглари чизикли, узунлиги 4-5см, ширали, этли, зич жойлашган тукчалар билан қопланган. Апрель-октябрь ойигача кўкаради, сентябрь-октябрда уруғ беради.

Ўсиш даврида чорва молари харидандонни деярли емайди: куз ва қиш мавсумларида қўйлар ва туялар уни яхши ейди, семиртирувчи озуқа

хисобланади. Уруғ бериш палласида харидандон пичани таркибида 7,1% протеин, 2,5% ёғ, 34% АЭМ ва 21,4% клетчатка бўлади. 100кг пичанидаги озуқа бирлиги қуйидагича ёзда 47, кузда 36, қишда 30. Шўрланган яйловлар ва тақирларнинг маҳсулдорлигини оширишда.

ОҚ САКСОВУЛ – Шўрадошлар оиласига мансуб 3-4 м баландликдаги дарахтсимон бута, у қора саксовулдан фарк қилиб қумларда тарқалган ва танасининг оқ пўст билан қопланганлигидадир.

Қўй, эчки ва туялар куз ва қиш мавсумларида унинг юмшаган новдаларини, уруғини яхши ейди. Оқ саксовулнинг пичанида 3,0-10,0 протеин 25,0-40,0% АЭМ ва 13,0-16,0%. клетчатка мавжуд. 100 кг пичанида 53 озуқа бирлиги бор. Оқ саксовулдан қумли майдонларни мустаҳкамлашда, яйловлар маҳсулдорлигини оширишда кенг фойдаланилади.

ҚИЗИЛҚАНДИМ – Торондошлар оиласига мансуб, бўйи 1,5-2,5 метргача бўлган дарахтсимон бута, Қизилқандим кучувчан ва кам зичлашган қумларда кенг тарқалган. Мартнинг иккинчи ярми - апрелнинг бошларида кўкара бошлайди, майнинг биринчи ун кунлигида гуллайди, июннинг охирида уруғлари пишади. Бир йиллик новдалари баҳор ва ёз ойлари яхши ейилади. Қандимнинг пичани таркибида гуллаш даврида 12,5% протеин, 1,1% ёғ, 34,4 АЭМ, 19,4% кул моддалари ва 30,0% клетчатка мавжуд. 100 кг пичани йил мавсумига қараб 37-59 озуқа бирлигига эга. Қумли яйловлар маҳсулдорлигини ошириш, кучувчан қумларни мустаҳкамлашда фойдаланилади.

ҚИЗИЛЧА-БОРЖОК – зағозадошлар оиласидан, бўйи 1,5-2 метрга етадиган, кучли шохланган, доимий яшил бута. Аксарият қумли чўлларда тарқалган бўлиб, юзаси қумоқлашган гипсли тупроқларда ҳам учрайди. Вегетатив усулда кўпаяди, бир асосий илдизпоя атрофида ёрдамчи илдизлар воситасида бир талай Янги новдалар вужудга келади. Чорва моллари уни йилнинг барча мавсумларида фойдаланган озуқа ҳисобланади. Гуллаш давридаги озуқанинг қиймати қуйидагича: протеин – 16,8%, ёғ – 3,7%, АЭМ –

31,6%, кул моддалари – 9,6%, клетчатка 30,4%. 100 кг пичанида баҳор пайтида 73,6 озуқа бирлиги бор. У қумларни мустаҳкамлашда, чўл минтақаси учун манзарали ўсимлик сифатида истиқболли.

СИНГРЕН – Дуккакдошлар оиласидан, бўйи 70-120 см бутача. Қумли ва гипсли чўлда тарқалган. Марказий Осиё қумли чўлларининг эндемиги. Поялари йўғон, сершоҳ, очикранг тукчалар Билан қопланган. Март ойида кўкаради, апрель-майда гуллайди, уруғлари июнда пишади.

Чорва моллари унинг бартчалари, гуллари дуккаклари ва бир йиллик новдаларини истеъмол қилади. Юқори тўйимли озуқа: ғунчалаш даврида пичани таркибида 19,8% протеин, 2,56% ёғ, 10,4% кул моддалари, 32,5% АЭМ ва 26% клетчатка сақлайди. Тўйимлилиги: 100 кг пичанида баҳорда 61 ва кузда 32 озуқа бирлиги бор. Қумли чўллар маҳсулдорлигини оширишда истиқболли фитомелиорант.

ОҚ ШУВОҚ – (ёвшон, жусан) – бир йиллик новдалари қўнғир яшил рангли, барглари майда, кучли қирқилган. Поя ва барглари оқ тукчалар Билан қопланганлиги сабабли, уни оқ шувок ҳам деб аташади. Оқ шувок пичани уруғ бериш палласида қуйидаги озуқа таркибига эга. Протеин 8,0%, ёғ – 5,5%, АЭМ-35,2%, кул моддалари 6,7% ва клетчатка 45,4%. 100 кг пичани таркибида йил мавсумлари бўйлаб 66-18 озуқа бирлигига (ўртача 31 озуқа бирлиги) эга.

ИЗЕН – Шўрадошлар оиласига мансуб ярим бута. Бўйи 30-85 см. изен 3 экотипга ажратилади: қумли, шағалли ва соз тупроқли. Қумли изеннинг новдалари оқиш рангдаги туклар Билан қопланган. Баргчалари кичикроқ Қизилқум, Муюнкун ва бошқа қумли чўлларда ўсади. Қумли ва қумоқ чўл яйловларини яхшилашда истиқболли ўсимлик.

ШУВОҚЛАР – Мураккабдошлар оиласига мансуб ярим бута, хашакбоп ўсимликлардир. Бўйи уларнинг турларига қараб 20-100 смга етади. Чўлларнинг барча типларида турли-туман тупроқ шароиталарда кенг тарқалган тур. Илдиз системаси асосан тупроқнинг юза қисмида (0,6-1,2

метр) тарқалган. Февралнинг охири мартнинг бошларида кўкаради ва харорат кескин кўтарилиши ва тупрокда нам камайиши Билан (июн-август ойларида) ўсишдан тўхтайди. Сентябрдан бошлаб ўсишни давом эттиради. Сентябрнинг охирларида гуллайди, уруғлари ноябрда пиши етилади.

Шувоқларни чорва моллари асосан куз ва қиш мавсумларида хуш кўриб ейди. Шувоқзор қоракўл тери сифатини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади. Шувоқлар кузги-қишки ва йил давомида фойдаланиладиган яйловлар барпо этишда муҳим хашакбоп ўсимликлардир.

Дағал пояли ўсимликлар.

ЯНТОҚ – дуккакдошлар оиласига кирувчи, буйич 50-130 см атрофидаги кўп йиллик ўсимлик. Ўзбекистонда нтоқнинг 4 та тури бўлиб, улардан энг кўп тарқалгани ёлғон янтоқдир. Янтоқ кам шўрланган, нам Билан таъминланган майдонларда, дарёлар узанларида, паст текисликларнинг ер ости сувлари яқин жойлашган майдонларида кўпроқ тарқалган. Унинг кучли риволанган илдизи грунт сувлари тарқалган тупроқ қатламларигача етиб боради. Пояси серҳок, новдалари силлик, туксиз уткир бурчакли тик ўсувчан. Барглари тухумсимон чўзик, тиканчаларининг узунлиги 1-3 см бўлиб, ўзгарган новдлара ҳисобланади. Апрельда кўкаради, июн-августда гуллайди, уруғлари сентябр-октябрда пишиб етилади. Янтоқ чорва моллари учун тўйимли озуқа ҳисобланади, айниқса қоракўл қуйлари учун қишқи хашакдир. Гуллаш даврида пичани таркибида 12,6% АЭМ мавжуд. 100 кг пичанида 33,5 озуқа бирлигига эга. Янтоқлар шифобахш ва шакар йиғувчи, ҳамда асаларичиликда қўлланилувчи ўсимликлар сифатида ҳам диққатга сазовор. Яйловлар маҳсулдорлигини оширишда қўлланиладиган истикболли ўсимлик.

КАРПАК, ОҚ КАРПАК – Мураккабдошлар оиласига мансуб, буйи 40-60 см, намгарчилик йиллари 1 метргача етадиган икки йиллик ўсимлик. Адирлар ва тоғ этакларида энг кўп тарқалган. Барглари қирқилган, учи тиканли, остки томони оқ тукчалар Билан қопланган. Ҳар йили тўпбарглар ҳосил қилади,

кулай шароит бўлгач, поя чиқаради ва гуллар шу Билан қурийди. Май ойида гулга киради, июнда уруғлари пишиди.

Ўсиш даврида карракни фақат туялар истеъмол қилади, бошқа чорва моллари эса фақат пичанини янчилган ҳолида ейди. Шоналаш даврида каррак пичанида 9% протеин, 44% клетчатка ва бошқа зарур моддалар сақлайди. Каррак қоракўлчилик ҳудудлари учун қиш ойлари мобайнида қўшимча озиклантиришга мўлжалланган озуқа тайёрлашда муҳим манбаа ҳисобланади.

СЕЛИНЛАР – Бошокдошлар оиласидан, буйи турига қараб 40-60 смдан 80-150 смгача етадиган, чим ҳосил қилиб ўсувчи кўп йиллик ўтчил ўсимликлар. Урғочи ва нар селинлар қумли чўлларда кенг тарқалган. Илдиз системаси ён томонларга кучли ривожланган, иккаласининг ҳам биологик хусусиятлари одатда кескин фарқ қилмасда, туйимлик жиҳатдан урғочи Селин бироз устунроқ. Урғочи селиннинг барглари ингичка, қаттиқ лентасимон, бутун илдизи олдидан ўсиб поясини нов ҳолида ўраб туради. Илдизи чим ҳосил қилиб, диаметри 0,5-1,0 смга етади. Эрта баҳордан ёзнинг ўрталаригача майсалайди, май ойида гуллайди, уруғлари июлда пишади. Ўсиш даврида ейилувчанлиги юқори эмас, ундан тайёрланган пичанни барча турдаги чорва моллари яхшироқ ейди. Унинг пичанининг озуқавий қиймати: протеин 3,7%, клетчатка 44% борлиги аниқланган. 100 кг пичанида 34,5 озуқа бирлиги сақлайди. Кўчувчан қумларни мустаҳкамлашда муҳим фитомелиорант.

КАВРАК – Соябонгулдошлар оиласига мансуб, буйи 100-120 смга етадиган монокарпик (ҳаётида бир марта гуллаб мева берадиган) кўп йиллик ўсимликдир. Каврак баҳорда кўкариб, фақат илдизи олди барглари ҳосил қилади. Барглари йилдан-йилга катталашиб боради, илдизи эса йўғонлашиб кўп миқдорда озуқ моддалар тўплайди. У ҳаётининг 7-13 йиллари поя ҳосил қилади ва гуллайди.

Уруғ бериш палласига кирган йили баргларининг узунлиги 50-60 см, диаметри 1 метргача етади. Маар-апрел ойларида гуллайди. Генератив

новдасининг учиди сариқ рангли мураккаб соябончали тўпгул ҳосил қилади, уруғлари май-июн ойларида пишади. Кавраклар кўкат ҳолида деярли ейилмайди. Пичан ҳолида истеъмол қилинади. Каврак уруғида 14-19% протеин, 8% ёғ, 37-47% АЭМ ва 23-27% клетчатка бор. Каврак поясидан чиқадиган чирк «асафетида»дан шарқ тиббиётида фойдланилади, илдизидан каврак крахмали олинади. Адир ва тоғ олди яйловларини бойитишда қўлланилиши мумкин.

1-жадвал

Хўжаликда ердан фойдаланиш

Кўрсаткичлар	га	%
Жами ер майдони	159861	100
Ишлов	159783	99.95
Шу жум.саксавуллар	120.000	75.1
Аҳоли яшайдиган ҳудудлар	78	0.049

Юқоридаги жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики хўжаликнинг жами ер майдони 159861 гектар бўлиб шундан 159783 гектари яйловлардан иборатдир бу эса хўжаликнинг умумий ер майдонининг 99.95% ни ташкил қилади. Хўжаликнинг яйловининг 75.1% ни тбийй бутазор ва саксовулзорлар ташкил қилади.

2-жадвал

Хўжаликда ем-хашак тайёрлаш.

Озиқа тури	Ўлчов бирлиги	2011	2012	2013
Дағал хашак	ц	88150	54380	34926
Омухта ем	ц	7445	2337	15594

Юқоридаги жадвал маълумотларида кўриниб турибдики хўжаликда 2011 йилда 88150 центнер дағал хашак тайёрланган. 2012 йилда 2011 йилга нисбатан 33770 центнер кам дағал хашак, 5108 центнер кам озуқа тайёрланган. 2013 йилда 2012 йилга нисбатан 19454 центнер дағал хашак кам жамғарилган, лекин озуқа етиштириш 13257 центнер ортиғи билан бажарилган буни йилнинг оғир келганлиги дағал хашакнинг кам жамғарилганлиги ва ҳосилдорлигининг паст бўлганлиги билан изоҳлаш мумкин.

3-жадвал

Хўжаликда чорва мол бош сони.

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	2011	2012	2013
Жами қўйлар	бош	70000	71223	56200
Отлар	бош	162	171	185
Туялар	бош	177	186	198

Юқоридаги жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики хўжаликда чорва моллар бош сони йилдан йилга купайиб борган 2013 йилда қўйлар 56200 минг бош бўлса 2012 йилда 15023 бош га камайган. Шунингдек от ва туялар сони ҳам йилдан йилга кўпайиб борган. 2011 йилга нисбатан 2013 йилда отлар 23 бошга, туялар эса 21 бошга кўпайган.

4-жадвал

Хўжаликнинг пода структураси.

Кўрсаткичлар	2011	2012	2013
Жами қўйлар; Шу жумладан	70000	71223	56200
Она қўйлар	45000	46000	40912
Ўстиришга қолдирилган урғочи қўзилар	15795	16486	13320
Наслли қўчқорлар	2850	2906	1968

Юқоридаги жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, хўжалик чорва молларининг асосий қисмини совлиқлар ташкил этиб, 2013 йилда 64,3 %, 2012 йилда 60,5 %, 2013 йилда 61.6% ташкил қилган. Хўжаликда насли кўчқорлар жами кўйларнинг 2013 йилда 4,1 %, 2013 йилда эса 3,9 % ни ташкил қилган. Ўтган йили тўғилган урғочи кўзилар 2013 йилда жами кўйларнинг 22.7 % ни ташкил этган.

5-жадвал

Хўжаликда махсулот ишлаб чиқариш

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	2011	2012	2013
Қорақўл тери	дона	12100	11450	11282
Жун	ц	1179	1181	1183
Гўшт	ц	2062	2072	2074
Ширдон	дона	9340	8000	8000

Юқоридаги жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики хўжаликда 2013 йилда 12100 дона қорақўл тери ишлаб чиқарилган яъни 650 дона қорақўл тери кам ишлаб чиқарилган, 2013 йилда ўтган йилга нисбатан 168 дона қорақўл тери кам ишлаб чиқарилган. Жун ва гўшт ишлаб чиқариш 3 йил мобайнида ҳам 2 тсентинердан кўпайиб борган. Ширдон ишлаб чиқариш аксинча 2013 йилга нисбатан 2012-2013 йилларда 1340 донага кам ишлаб чиқарилган.

Хўжаликда маҳсулот сотиш.

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	2011	2012	2013
Қоракўл тери	дона	12127	10388	11344
Жун	ц	1256	1677	1288
Гўшт	ц	2063	2072	2074
Ширдон	дона	9340	8000	8000

Юқоридаги жадвал маълумотлардан кўриниб турибдики хўжаликда 2013 йилда 12127 дона қоракул тери сотилган, 2012 йилда 2013 йилга нисбатан 1739 дона кам сотилган. 2013 йилда 2012 йилга нисбатан 1956 дона тери кўп сотилган. жун ва гушт ишлаб чиқариш ҳам йилдан йилга кўпайиб борган, ширдон ишлаб чиқариш эса 2013 йилда нисбатан 2012-2013 йилларда 1340 донадан кам сотилган.

Хўжаликда маҳсулотни сотиш баҳоси.

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	2011	2012	2013
Қоракўл тери	дона	14080	17435	23515
Жун	ц	49535	45000	85550
Гўшт (тирик вазнда)	ц	82000	9000	9400
Ширдон	дона	300	450	800

Юқоридаги жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, хўжаликда ишлаб чиқарилган 1 дона қоракўл тери 2013 йилда 23515 сўмга, 2011 йилда эса 14080 сўмга, 2012 йилда эса 17458 сўмга сотилган. 2013 йилда бир

центнер жун 85550 сўмга, гўшт тирик вазнда 94000 сўмга, бир дона ширдон 800 сўмга сотилди.

8-жадвал

Хўжаликда маҳсулот ишлаб чиқариш таннари (сўм)

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	2011	2012	2013
Қорақўл тери	дона	9110,2	13688,8	16018,5
Жун	ц	32365	40165	45074
гўшт (тирик вазнда)	ц	101564	120885	175688

Юқоридаги жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, хўжаликда ишлаб чиқарилган 1 дона қорақўл терининг таннари 2013 йилда 9110,2 сўм, 2012 йилда 13688,8 сўм бўлди. 2013 йилда эса бир дона қорақўлнинг таннари 16018,5 сўмни ташкил қилди.

2013 йилда хўжаликда жун ва гўшт ишлаб чиқариш учун бўлган харажатлар 1 ц жун учун 45074 сўмни, 1 ц гўшт учун 175688 сўмни ташкил қилди. Хўжаликда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар таннарининг йилдан-йилга кўтарилишига сабаб ёқилғи маҳсулотларининг баҳосининг нархининг ошганлиги билан изоҳлаш мумкин.

III. Танланган мавзу бўйича муаммоларнинг қўйилиши ва қўлланиладиган услубиётлар

Тажрибани тадқиқот қисми ишлаб чиқариш амалиёти даврида Навоий вилояти Конимех туманига қарашли “Сарибел” ширкат хўжалигида ўтказилган.

Қўзилатиш компанияси даврида олинган қора қорақўл қўзилар яккама – якка бонитровка қилиниб қуйдаги белгилари ўрганиб чиқилди.

-Қўзиларнинг тирик вазни 0,1 кг аниқликда ўлчай оладиган пружинали тарозида ўлчаб олинди.

-Сағри қисмидаги жун толаларининг узунлиги қалами гулларининг эни ва узунлиги миллиметрли линейкалар ёрдамида 1мм аниқликгача ўлчаб олинди.

-Қўзиларнинг конситутсия типи, терисининг қалинлиги, зичлиги ва терисининг танага нисбатан ортиқлиги сезги органлари ёрдамида чамалаб аниқланади.

-Қўзилар жун қоплами рангининг оч тўқлиги, ипаксимонлиги, ялтироқлиги, қалинлиги , майин териблиги қўл ва кўз ёрдамида аниқланади.

-Турли шакилдаги гулларнинг ўзаро нисбати, гул ўлчами, гулларининг маҳкамлиги, расмининг аниқлиги, жойлашиш тартиби, бош қисмининг гуллар билан қопланиши даражаси, қўзиларнинг барра типи ва класслари амалдаги қорақўлчиликда насилчилик ишларини юргизиш инструкциясига мувофиқ аниқланади.

-Ўлчов асбоблари ёрдамида олинган қўзиларнинг тирик вазни, жун толасининг узунлиги, қалами гулларнинг эни ва узунлиги тўғрисидаги рақамлар биометрик статистика (Н.А.Плохинский, 1969) усули билан ишлаб чиқилди.

-Таққослаш йўли билан олинган сифат кўрсаткичлари оддий арифметик усул билан ишлаб чиқилиб , фоизларда ифода этилади.

-Тажриба натижаларини таҳлил қилишда тўқ қора, ўртача қора ва оч қора қўзиларнинг ҳар қайси гуруҳидан 40 бошдан олиниб уларнинг кўрсаткичлари гуруҳлараро таққослаб кўрилди.

-иқтисодий самарадорлигини соф фойдани таннархга нисбати билан аниқланади.

-ишдаги рақамли натижалар биометрия усулида ишланиб умумлаштирилади (Я-Арифметик ўртача қиймат, t -ўртача квадратик оғиш, S_v -ўзгарувчанлик коэффиценти, $\pm m$ -ўртача арифметик хато, T_g -икки вариация қатор) арифметикўртача қийматлар солиштирилиб (P -эҳтимоллик, $P < 0,05$, $P < 0,01$, $P < 0,0001$ топилади). А.А.Плохинский 1968. Сифат кўрсаткичлари фоизларда ҳисобланди.

IV. АСОСИЙ ҚИСМ.

Мавзунинг ечими ва унинг ёритилиши

4.1. Қоракўл кўзиларнинг конситутсияси.

Жун қоплами рангининг оч-тўқлиги турлича бўлган қора қоракўл кўзиларининг конситутсия типлари бўйича тақсимланиши жадвалда кўрсатилган.

9-жадвал

Жун қоплами пигменттатсияси турлича бўлган қора қоракўл кўзиларининг конситутсия типлари

Кўзилар жун қоплами пигментатсияси	Ҳисобга олинган кўзилар сони	Шу жуладан конституция типлари бўйича %		
		Нозик конституциялилар	Мустаҳкам конституциялилар	Кўпол конституциялилар
Тим қора	40	7,5	67,3	25,0
Қора	40	2,5	80,0	17,5
Қораси етарсиз	40	30,0	57,5	12,5

Жадвалда келтирилган рақамлардан маълум бўлишича , қора қоракўл кўзилар жун қопламини пигментатсияси билан улар конситутсия типлари ўртасида маълум боғланиш мавжуддир. Энг кўп сони (80%) мустаҳкам конституциялилар жун қопламининг ранги қора кўзилар орасида учрайди. Жун қопламининг ранги тим қора кўзилар орасида кўпол конституциялилар кўпроқ кам (12,5%) нозик конституциялилар кўп (30% гача) бўлади. Жун қопламининг ранги тим қора кўзилар орасида кўпол конституциялилар кўпроқ (25 % гача) бўлиши билан бир қаторда улар орасида нозик конституцияли кўзилар ҳам учрайди.



1-рasm.

4.2.Қоракўл кўзиларнинг тирик вазни.

Жун қоплами пигментацияси турлича бўлган қора қоракўл тирик вазни жадвалда кўрсатилган.

10-жадвал

Жун қоплами пигментацияси турлича бўлган қора қоракўл тирик вазни

Кўзиларнинг жун қопламининг пигментацияси	Кўзилар сони	Ўртача тирик вазни Кг $M \pm m$	Квадрат оғишма (сигма)	Ўзгарувчанлик коэффициенти C_v
Тим қора	40	$4,93 \pm 0,13$	0,84	17,1
Қора	40	$4,43 \pm 0,10$	0,65	14,6
Қораси етарсиз	40	$4,41 \pm 0,15$	0,97	22,2

Жадвал келтирилган рақамлардан маълум бўлишича қора қоракўл кўзилар жун қоплами рангининг пигментацияси билан уларнинг тирик вазни ўртасида бироз боғланиш мавжуддир. Кўзилар жун қоплами ранги шунча тўқ бўлса уларнинг ўртача тирик вазни ҳам шунчалик юқори бўлади. Масалан тўқ қора кўзиларнинг ўртача тирк вазни қора сметареиз кўзилардан 0,524 0,202 кг ортиқдир ўртадаги фарқ статистик жиҳатдан унча ишонарли бўмаса ҳам, қора кўзилар жун қоплами рангининг уларнинг тирик вазнининг ортишига ижобий таъсир кўрсатади деб айтиш мумкун.



4.3. Тери тўқимасининг қалинлиги.

Жун қоплами рангининг пигментатсияси турлича бўлган қора қоракўл қўзилари тери тўқимасининг қалинлиги қуйидаги жадвалда кўрсатилган.

11-жадвал

Пигментатсия турлича бўлган қора қоракўл қўзиларининг тери тўқимаси қалинлиги бўйича бўлиниши.

Қўзилар жун қоплами пигментатсияси	Ҳисобга олинган қўзилар сони	Шу жуладан тери тўқимасининг қалинлиги бўйича %			
		Териси жуда юпқа	Териси юпқа	Териси қалинлашган	Териси қалин
Тим қора	40	—	37,5	30,0	32,5
Қора	40	—	50,0	35,0	15,0
Қораси етарсиз	40	30,0	45,0	32,5	10,0

Жадвалда келтирилган маълумотлар шуни кўрсатиб турибдики, қора қоракўл қўйилар жун қоплами рангининг пигментатсияси билан тери тўқимасининг қалинлиги ўртасида маълум бўлиниш мавжуддир. Қоракўл қўзилар жун қоплами рангининг сусая бороши билан улар орасида териси қалин ва териси бироз қалинлашган қўзиларнинг сони камайиб, териси юпқа ва терисида жуда юпқа қўзилар кўпаяди. Тери тўқимасининг қалинлиги бўйича энг кўп сонли мақсадга мувофиқ қўзилар жун қопламининг ранги қора қўзилар орасида учрайди. Жунининг ранги қора симтореиз қўзилар орасида учрайдиган тери тўқимаси жуда юпқа қўзилар мақсага мувофиқдир. Чунки, уларнинг териси ҳаддан ташқари юпқа бўлиши билан, чидамсиз, жунни сийрак, жунлар бўш бўлиши мумкин.

4.4.Тери тўқимасининг зичлиги

Жун қоплами рангининг пигментатсияси турлича бўлган қора қоракўл қўзиларининг тери тўқимасининг зичлиги қуйидаги жадвалда келтирилган.

12-жадвал

Жун қоплами рангининг пигментатсияси турлича бўлган қора қоракўл қўзилар тери тўқимасининг зичлиги.

Қўзилар жун қоплами пигментатсияси	Ҳисобга олинган қўзилар сони	Шу жуладан тери тўқимасининг зичлиги бўйича %			
		Териси жуда зич	Терисининг зичлиги ўртача	Терисининг зичлиги етарли эмас	Териси бўш
Тим қора	40	2,5	77,5	20,0	—
Қора	40	10,0	75,0	15,0	—
Қораси етарсиз	40	5,0	70,0	7,5	17,5

Жадвалдаги рақамларнинг далолат беришича қор қоракўл кўзилар жун қоплами рангининг пигментацияси билан уларда тери тўқимасининг зичлиги ўртасида маълум боғланиш мавжудга ўхшайди. Жун қопламининг ранги қора кўзилар ўртасида тери тўқимаси жуда зич ва терисинг зичлиги ўртача бўлган кўзилар энг кўп (85 фоизини) сонини ташкил этади. Жун қопламининг ранги қора кўзилар орасида тери тўқимасининг зичлиги етарли даражада бўлмаган кўпроқ учрагани ҳолда, жуннинг ранги қора симтореиз кўзилар орасида тери тўқимаси бўш кўзилар анчагина миқдорини (17,5 фоизини) ташкил қилади.

4.5.Тери запаси (захираси).

Жун қоплами рангининг оч-тўқлиги турлича бўлган қора қоракўл кўзилар терисининг танига нисбатан ортиқлик даражаси (тери зонаси) куйидаги жадвалда кўрсатилган.

13-жадвал

Рангининг оч-тўқлиги турлича бўлган қора қоракўл кўзилар терисининг танага нисбатан ортиқлик даражаси.

Кўзилар жун қоплами пигментацияси	Ҳисобга олинган кўзилар сони	Шу жуладан терисининг танага нисбатан ортиқлиги бўйича %		
		Териси танага таранг тортилган	Териси танасига эркин тушиб туради	Териси танасига нисбатан кенг
Тим қора	40	12,5	67,5	20,0
Қора	40	2,5	85,0	12,5
Қораси етарсиз	40	32,5	37,5	27,5

Келтирилган маълумотлар шундан далолат бериб турибдики, қора қоракўл кўзилар жун қоплами рангини оч-тўқлиги билан кўзилар терисининг танага нисбатан ортиқлик даражаси ўртасида тўғридан-тўғри боғланиш бўлмаса ҳам, секция учун қандайдир ахамияти бўлган алоқа яққол кўзга

ташланади. Чунончи энг кўп сонли териси танасига эркин тушиб турадиган кўзилар (85 фоизгача) жуни ортача қора кўзилар бу кўрсаткич бўйича биридан кескин фарқ қилади. Яъни улар орасида териси танасига таранг тортилиб турган кўзилар билан бир қаторда териси танасига нисбатан кенг кўзилар ҳам кўп учрайди, Бундай тафовуд тўқ қора кўзилар орасида ҳам бор, лекин улар орасидаги фарқ кескин эмас.

4.6. Жун толасининг узунлиги

Пигментатсияси турлича бўлган қора қоракўл кўзилар сағри қисмидан жун толасининг узунлиги қуйидаги жадвалда кўрсатилган.

14-жадвал

Пигментатсияси турлича бўлган қора қоракўл кўзилар жун толасининг узунлиги.

Кўзилар жун қоплами пигментатсияси	Ҳисобга олинган кўзилар сони	Шу жуладан терисининг танага нисбатан ортиқлиги бўйича %		
		Сарғисидаги толасининг ўртача узунлиги	Квадрат қисми (сиғими) мм	Нотекислик нисбати (С), %
Тим қора	40	10,65± 0,39	2,36	24,7
Қора	40	10,42± 0,34	2,17	20,8
Қораси етарсиз	40	9,53 ±0,35	2,23	23,5

Жадвалда кўрсатилган маълумотлар шуни айтиши мумкинки, қора қоракўл кўзилар рангининг пигментатсияси билан улар толасининг узунлиги ўртасида маълум боғланиш мавжуддир. Қора синтореиз кўзиларнинг сағри қисмидаги жун толасининг узунлиги тўқ қора кўзиларникидан 1,12±0,51 мм калтароқдир, Бундан шундай фикр чиқариш мумкинки, жун таркибида

меланин моддасининг камлиги толаларнинг ўсишига салбий таъсир кўрсатади.

4.7. Жун қопламининг қалинлиги.

Пигментатсияси турлича бўлган қора қорақўл қўзилар жун қопламининг қалинлиги бўйича тақсимланиши қуйидаги жадвалда кўрсатилган.

15-жадвал

Пигментатсияси турлича бўлган қора қорақўл қозиларининг жун қоплами қалинлиги бўйича тақсимланиши.

Қўзилар жун қоплами пигментатсияси	Ҳисобга олинган қўзилар сони	Шу жуладан тери тўқимасининг зичлиги бўйича %			
		Жуни жуда қалин	Жуннинг қалинлиги ўртача	Жуннинг қалинлиги етарли эмас	Жун сийрак
Тим қора	40	47,5	35,0	17,5	—
Қора	40	37,5	55,0	7,5	—
Қораси етарсиз	40	40,0	37,5	17,5	5,0

Жадвалда киритилган маълумотлардан кўриниб турибдики жун қопламининг ранги қора бўлган қўзилар орасида мақсадга мувофиқ қўзилар яъни жуда қалин ва жуннинг қалинлиги ортача бўлган қўзилар кўп (92,5 фоизгача) бўлади. Қора сиетореиз қўзилар орасида жуни сийрак қўзилар ҳам учрайди. Тўқ қора қўзилар орасида жуни жуда зич қўзилар кўп бўлиши билан бир қаторда, жуннинг зичлиги етарли бўлмаган қўзилар ҳам кўпроқ (17,5 фоизгача) учрайди.

4.8. Ипаксимонлиги

Пигментатсияси турлича бўлган қора қорақўл қўзилар жунининг ипаксимонлиги даражаси жадвалда келтирилган.

**Пигментацияси турлича бўлган қора қоракўл қўзилар жун
қопламасининг ипаксимонлиги даражаси**

Қўзилар жун қоплами пигментацияси	Ҳисобга олинган қўзилар сони	Шу жуладан жун қоламининг ипаксимонлиги бўйича %				
		Ўта ипакси мон	Нормал ипаксим он	Ипакс имонли ги етарли эмас	Жуни дағол	Жун қуруқ
Тим қора	40	15,0	80,0	5,0	—	—
Қора	40	2,5	87,5	10,0	—	—
Қораси етарсиз	40	—	52,5	40,0	5,0	2,5

Жадвалда кўрсайтилган маълумотлар шуни айтиши мумкинки, қора қоракўл қўзилар рангининг пигментацияси билан улар ипаксимонлик даражаси ўртасида маълум боғланиш мавжуддир.

Жуннинг қопламининг ранги тим қора қўзилар орасида жуни ўта ипаксимон қўзилар кўп, жуннинг ипаксимонлиги етарли бўлмаган қўзилар кўп бўлиши билан бир қаторда жуни дағал, жуни қуруқ қўзилар ҳам учрайди. Жун қопламининг ранги қора бўлган қўзиларларнинг аскарий қисмида (87,5%) жунлари нормал ипаксимонликга эгадир.

4.9.Ялтироқлиги.

Пигментацияси турлича бўлган қора қоракўл жун қопламининг ялтироқлик даражаси.

**Пигментацияси турлича бўлган қора қорақўл жун қопламининг
ялтироқлик даражаси.**

Қўзилар жун қопламини пигментацияс и	Ҳисобга олинган қўзилар сони	Шу жумладан жун қопламининг ялтироқлиги бўйича, %				
		жуни кучл и ялтир оқ	жуни нармо л ялтиро қ	жунининг ялтироқл и гиги етарли эмас	жуни ипаксим он ялтироқ	жуни ялти роқс из
Тим қора	40	57,5	37,5	-	5,0	-
Қора	40	10,0	85,0	2,5	2,5	-
Қораси етарсиз	40	2,5	42,5	47,5	5,0	2,5

Жадвалда келтирилган рақамлардан маълум бўлишича қора қорақўл қўзилар жун қопламини рангининг пигментацияси билан, улар жунининг ялтироқлик даражаси ўртасида катта боғланиши мавжуддир. Хусусан жун қопламининг ранги тим қора қўзиларнинг кўпчилигида (57,5%) жуни кучли ялтироқликка ҳам эгадир. Жун қопламининг ранги қораси етарсиз қўзилар орасида жунининг ялтироқлиги етарли бўлмаган қўзилар сони кўп (47,5%) бўлиши билан бир қаторда улар орасида жуни ипаксимон ялтироқ, жуни ялтироқсиз қўзилар ҳам учраб туради. Жунининг ранги қўтача қора қўзиларнинг аскарий қисмида (85%) жуни нормал ялтироқликка эгадир.

4.10.Майли-тери.

Рангининг оч-тўқлиги турлича бўлган қора қоракўл қўзилар жун қопламининг майли-терлилик даражаси жадвалда кўрсатилган.

18-жадвал

Рангининг оч-тўқлиги турлича бўлган қора қоракўл қўзилар жун қопламининг майли-терлилик даражаси.

Қўзилар жун қоплами рангининг оч-тўқлиги	Ҳисобга олинган қўзилар сони	Шу жумладан жун қопламининг майли-терлиги бўйича, %		
		Майли-тери кўп	Майли-тери ўртача	Майли-тери кам
Тим қора	40	32,5	42,5	25,0
Қора	40	35,0	47,5	17,0
Қора етарсиз	40	15,0	32,5	52,5

Жавалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, жун қопламининг оч-тўқлиги бўйича турли гуруҳларга киритилган қўзиларда жунинг майли-терлилик даражаси ҳам бир хил бўлмади. Жуннинг майли – тери бўйича жунини ўртача қора қўзилар иккинчи ўринни эгаллаган ҳолда, жунининг ранг оч қора қўзилар охириги эгаллайди. Жун қопламининг ранги оч қора қўзилар орасида майли – тери кўп қўзилар жуда кам бўлгани ҳолда, майли-тери кам қўзилар мазкур гуруҳдаги қўзиларнинг яримдан кўпироғини ташкил қилади.

4.11.Ҳар-хил шаклдаги гулларнинг ўзаро нисбати.

Жун қоплами ранининг пингментацияси турлича бўлган қоракўл қўзилар устини қоплаган ҳар хил шаклдаги гулларнинг ўзаро нисбати.



19-жадвал

Жун қоплами ранининг пингментацияси турлича бўлган қорақўл қўзилар устини қоплаган ҳар хил шаклдаги гулларнинг ўзаро нисбати.

Қўзилар жун қоплами пингмент ацияси	Ҳисоб га олин ган қўзи лар сони	Қўзилар устидаги ҳар хил шаклдаги гулларнинг нисбати, %								
		Қалам гуллар	Ловиясимон гуллар	Ёл гулар	Ҳалқа	Нўхат гуллар	Парма гуллар	Ялоқ гуллар	Шаклсиз гуллар	Жами:
Тим қора	40	50,9	30,2	17,8	0,5	-	-	0,6	-	100,0
Қора	40	44,0	41,5	13,1	0,6	0,6	-	-	0,2	100,0
Қораси етарсиз	40	36,5	40,4	15,5	3,5	2,5	0,5	1,5	0,5	100,0

Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, тим қора қўзиларда қаламгуллар нисбати қораси етарсиз қўзиларига нисбати 14,4% , қора қўзилардагича нисбатан 6,9% юқоридир. Жун қопламининг ранги қораси етарсиз қўзиларда энг қимматли гулларнинг камайиши бир қаторда, уларда ҳалқа гул, нўхат гул, парма гул, ялоқ гуллар ва шаклсиз гулларнинг нисбатан ҳам ортиқлиги ёққол қўзга ташланиб турибди.

4.12. Гул ўлчами.

Жун қоплами пингметацияси турлича бўлган қўзиларнинг гул ўлчамлари бўйича тақсимланиши.

20-жадвал.

Жун қоплами пингметацияси турлича бўлган қўзиларнинг гул ўлчамлари.

Қўзилар жун қоплами рангининг пингментацияси	Ҳисобга олинган қўзилар сони.	Шу жумладан гул ўлчамлар бўйича, %		
		Майда гуллар	Ўрта гуллар	Катта гуллар
Тим қора	40	5,0	45,0	50,0
Қора	40	-	62,5	37,5
Қораси етарсиз	40	10,0	75,0	15,0

Жадвалда кўрсатилган рақамлардан маълум бўлишича, қора қоракўл қўзилар жун қопламининг рангининг пингментацияси билан, уларнинг гул ўлчамлари ўртасида муаян боғланиш мавжуддир. Чунончи, қўзилар жун қопламининг сусайиши, улар орасида майда ва ўрта гулли қўзиларнинг сони кўпайиб, катта гулли қўзилар сонининг камайишига олиб келади. Хусусан ранги қораси етарсиз қўзилар орасида майда ва ўрта гулли қўзилар сони 85% ни ташкил қилади. Бу эса ўз навбатида ранги қораси етарсиз қўзиларнинг она қорни камроқ ривожланганлигидан далолат беради.

4.13.Қаламгулларнинг эни.

Жун қоплами пингметацияси турлича бўлган қорақўл қўзилар қалам гулларнинг эни (кенглиги).

21-жадвал

Рангининг пингметацияси турлича бўлган қорақўл қўзилар қалам гулларнинг эни.

Қўзилар жун қоплами рангининг пингментацияси	Ҳисобга олинган қўзилар сони.	Қаламгулларнинг ўртача эни, мм ($M \pm m$)	Квадрат оғиши (сигма δ) мм	Нотекислик нисбати (с), %.
Тим қора	40	8,10 $\pm$ 0,36	2.26	28,0
Қора	40	7,72 $\pm$ 0,26	1,65	21,4
Қораси етарсиз	40	6,80 $\pm$ 0,30	1,90	27,9

Жадвал маълумотларидан кўриниб турубдики, қора қорақўл қўзилар жун қоплами рангининг пингментациясига қараб қаламгулларнинг эни билан маълум даражада боғлангандир. Хусусан қораси етарсиз қўзилардаги қаламгулларнинг эни тим қора қўзилар устидаги қаламгулларнинг энидан 1,30 $\pm$ 0,46 мм камдир. Бошқача қилиб айтганда, қора қўзилар жун қоплами рангининг сусайиши қаламгулларнинг энининг ортишига салбий таъсир кўрсатади.

4.14.Қалам гулларнинг узунлиги бўйича бўлиниши.

Жун қоплами рангининг пингментацияси турлича бўлган қора қорақўл қўзиларнинг қалам гуллар узунлиги бўйича тақсимланиши жадвалда кўрсатилган.

Жун қоплами рангининг пигментацияси турлича бўлган қора қорақўл қўзиларнинг қаламгул узунлиги бўйича бўлиниши.

Қўзиларнинг жун қоплами пигментацияси	Ҳисобга олинган қўзилар сони	Шу жумладан қаламгулларнинг узунлиги бўйича, %		
		Узун қаламгуллар	Ўртача узунликдаги қаламгуллар	Калта қаламгуллар
Тим қора	40	42,5	55,0	2,5
Қора	40	27,5	70,0	2,5
Қораси етарсиз	40	25,0	52,5	22,5

Жадвал рақамларидан маълум бўлишича, қора қорақўл қўзилар жун қопламининг рангининг пигментацияси билан, улардаги қалам гулларнинг узунлиги ўртасидаги ўзаро боғланиши мавжудлиги кўзга ташланди. Хусусан жун қоплами тим қора қўзилар орасида узун қаламгулли қўзилар кўп (42,5%) гача учрагани ҳолда, калта қалам гулли қўзилар қораси етарсиз қўзилар орасидагидан 10 барабар кам учрайди. Жун қоплами рангининг сусайиши узун қалам гулли қўзиларнинг кўпайишига олиб келади.

4.15.Қаламгулларнинг ўртача узунлиги.

Жун қоплами пигментацияси турлича бўлган қора қорақўл қўзилар қаламгулларининг ўртача узунлиги жадвалда келтирилган.

Пигментацияси турлича бўлган қора қорақўл қўзилар қаламгулларининг ўртача узунлиги.

Қўзиларнинг жун қоплами пигментацияси	Ҳисобга олинган қўзилар сони	Қалам гулларнинг ўртача узунлиги	Квадрат оғиш (сигма τ)	Нотекислик нисбати (с), %
Тим қора	40	45,1±2,43	15,4	34,1
Қора	40	39,2±1,92	13,2	33,8
Қораси етарсиз	40	34,8±2,35	14,8	42,5

Жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, қора қўзилар жун қоплами рангининг пингментацияси қалам гулларнинг узунлиги билан маълум даражада боғлангандир. Чўпончи жун қопламининг рангининг сусая бориши билан қаламгулларнинг ўртача узунлиги ҳам камайиб беради. Масалан: тим қора қўзиларникидан $10,3 \pm 3,37$ мм ортиқдир, орасидаги фарк статистик жиҳатдан ишонарлидир.

4.16. Гулларнинг мустаҳкамлиги.

Жун қоплами пингментацияси турлича бўлган қора қоракўл қўзиларнинг маҳкамлик даражаси бўйича бўлиниши.

24-жадвал

Жун қоплами пингментацияси турлича бўлган қора қоракўл қўзилар гулларининг маҳкамлиги.

Қўзилар жун қоплами пингментацияси	Ҳисобга олинган қўзилар сони	Шу жумладан гулларнинг маҳкамлиги бўйича, %.			
		Гуллари жуда маҳкам	Гулларнинг маҳкамлиги ўртача	Гулларнинг маҳкамлиги етарли эмас	Гуллар и бўш.
Тим қора	40	40,0	42,5	17,5	-
Қора	40	42,5	47,5	10,0	-
Қораси етарсиз	40	25,0	37,5	30,0	7,5

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатиб турибдики, қора қоракўл қўзилар жун қоплами рангининг пингментацияси билан, улардаги гулларининг маҳкамлиги ўртасида маълум боғланиш мавжуддир. Жун қопламининг ранги ўртача қора қўзилар гулларининг маҳкамлиги бўйича биринчи ўринни тим қора қўзилар, иккинчи ўринни эса қора қўзилар эгаллайди. Жунининг ранги қораси етарсиз қўзилар орасида гулининг маҳкамлиги етарли даражада

бўлмаган ва гуллари бўш қўзилар кўп (37,5%) гуллари мустахкам қўзилар кам бўлиши билан охирги учунчи ўринни эгаллайди.

4.17.Расмининг (нақшининг) аниқлиги.

Жун қоплами рангининг оч- тўқлиги турлича бўлган қора қорақўл қўзилардаги гуллар расмининг (нақшининг) аниқлик даражаси.

25-жадвал

Жун қоплами рангининг оч- тўқлиги турлича бўлган қора қорақўл қўзилардаги гуллар расмининг (нақшининг) аниқлиги.

Қўзилар жун қоплами рангининг оч-тўқлиги	Ҳисобга олинган қўзилар сони	Шу жумладан гуллар расмининг аниқлиги бўйича, %.		
		Расми аниқ	Расмининг аниқлиги етарли эмас	Расми ноаниқ
Тим қора	40	95,0	5,0	-
Қора	40	70,0	22,5	7,5
Қора етарсиз	40	47,5	27,5	25,0

Жадвал рақамларидан маълум бўлишича, жун қопламининг ранги гуллар хосил қиладиган расмнинг аниқлик даражасига ҳам таъсир кўрсатар экан. Қора рангли қорақўл қўзилар жун қопламининг ранги қанча тўқ бўлса, улар орасида расми аниқ қўзиларнинг солмоғи шунча юқори бўлади, аксинча оч қора қўзилар орасида расмининг аниқлиги етарли бўлмаган ва расми ноаниқ қўзилар сони кўп (52,5%) бўлади.

4.18. Қаламгулларнинг жойлашиш тартиби.

Жун қоплами рангининг оч тўқлиги турлича бўлган қора қорақўл қўзилардаги қаламгулларнинг жойлашиш тартиби -жадвалда келтирилган.

**Жун қоплами рангининг оч тўқлиги турлича бўлган қора қоракўл
қўзилардаги қаламгулларнинг жойлашиш тартиби.**

Қўзилар жун қоплами рангининг оч- тўқлиги	Ҳисоб га олинган қўзилар сони	қаламгулларнинг жойлашиш тартиби					
		Ёндош тўғри	Ёндош ярим айланма	Аралаш	Арчасимон	Илон изи	Ноаниқ. бетартиб
Тим қора	40	37,5	27,5	22,5	10,0	2,5	-
Қора	40	37,5	27,5	17,5	-	2,5	15,0
Қора етарсиз	40	37,5	22,5	10,0	2,5	-	27,5

Жадвалда кўрсатилган рақамлардан маълум бўлишича қора қоракўл қўзилар жун қоплами рангининг оч-тўқлиги билан улардаги қаламгулларнинг жойлашиш тартиби ўртасида деярли ҳеч қандай боғланиш йўқ. Лекин, оч қора қўзилардаги гулларнинг бошқа хусусиятлари ҳам паст бўлганлиги учун улар орасида гуллари бетартиб жойлашган қўзилар кўп учрайди.

4.19.Бош қисмининг гуллар билан қопланиш даражаси.

Жун қоплами рангининг оч-тўқлиги турлича бўлган қора қоракўл қўзилар қўзилар бош қисмининг гуллар билан ёки муҳаёр расмлар билан қопланиш даражаси жадвалда кўрсатилган.

**Жун қоплами рангининг оч-тўқлиги турлича бўлган қора қоракўл
қўзилар қўзилар бош қисмининг гуллар билан қопланиш даражаси.**

Қўзиларнинг жун қопламининг оч-тўқлиги	Ҳисобга олинган қўзилар сони	Шу жумладан бош қисмдаги гуллари бўйича			
		Бошида гуллари жуда яхши	Бошида гуллар яхши	Бошида гуллари кам	Бошида гуллари йўқ
Тим қора	40	5,0	17,5	37,5	40,0
Қора	40	10,0	27,5	52,5	10,0
Қора етарсиз	40	20,0	20,5	27,5	32,5

Жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, жун қоплами рангининг оч тўқлиги бўйича турли гуруҳларга киритилган қўзилар бош қисмининг гуллар билан қопланиш даражаси ҳам турличадир. Бош қисмида гуллари жуда яхши бўлган қўзилар (20%) оч қора қўзилар орасида учрайди. Лекин худди шу гуруҳдаги қўзилар орасида бош қисмида гуллари йўқ қўзилар ҳам анчагина миқдорни (32,5%) ташкил қилади. Худди шундай қўзилар тўқ қора орасида (40%) кўп бўлиши қайд қилинди.

4.20. Қора қоракўл қўзиларнинг барра типи ва класлари.

Барра типлари: Жун қоплами пигментацияси турлича бўлган қора қоракўл қўзиларнинг барра типлари бўйича тақсимланиши жадвалда кўрсатилган.

**Жун қоплами пигментацияси турлича бўлган қора қоракўл қўзиларнинг
барра типлари бўйича тақсимланиши.**

Қўзилар жун қоплами пигментацияси	Ҳисобга олинган қўзилар сони	Шу жумладан барра типлари бўйича, %			
		Жакет барра типлари	Ясси барра типлари	Қовурғасимон барра типлари	Кавказ барра типлари
Тим қора	40	67,5	22,5	5,0	5,0
Қора	40	82,5	-	7,5	10,0
Қораси етарсиз	40	42,5	12,5	30,0	15,0

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, қора қорақўл қўзилар жун қоплами пингментацияси билан, барра типлари ўртасида маълум даражада боғланиш борга ўхшайди. Хусусан тим қора қўзилар кўпинча жакет ва ясси барра типларига мансуб бўлгани ҳолда, қораси етарсиз қўзилар орасида қавурғасимон ва кавказ барра типларига киритилган қўзилар кўп бўлди. Жун қопламининг қора қўзиларнинг аскарий қисми (82,5%) жакет барра типига мансубдир.

4.21.Класслари.

Жун қопламининг пингментацияситурлича бўлган қора қорақўл қўзиларнинг класслар бўйича тақсимланиши жадвалда кўрсатилган.

30-жадвал

Жун қопламининг пингментацияси турлича бўлган қора қорақўл қўзиларнинг класслар.

Қўзилар жун қоплами пингментацияси	Ҳисобга олинган қўзилар сони	Шу жумладан класслари бўйича, %			
		Элита қўзилар қўзилар	Биринчи класс қўзилар	Иккинчи класс қўзилар	Брак қўзилар
Тим қора	40	10,0	75,0	15,0	-
Қора	40	2,5	80,0	17,5	-
Қораси етарсиз	40	5,0	50,0	45,0	-

Жадвалда келтирилган рақамлардан маълум бўлишича жун қопламининг ранги тим қора бўлган қўзилар орасида элита қўзилар кўп бўлиб, иккинчи классли қўзилар кам учрайди. Жун қопламининг ранги қораси етарсиз бўлган қўзилар орасида иккинчи классли қўзилар жуда кўп бўлиб, биринчи классли қўзилар сони, бошқа қўзиларниқидан бир ярим баробар кам учрайди.

Умуман олганда жун қопламининг ранг тим қора ва қора қўзилар мақсадга мувофиқ, ранги қораси етарсиз қўзилар мақсадга мувофиқ ҳисобланмайди.

V. Муоммонинг ечимидан кутилаётган иқтисодий кўрсаткичлар.

Жун қоплами рангининг пигментацияси турлича бўлган қора қорақўл кўзилар терисининг таннари, тахмин қилинган сотиш қиймати, олинган фойда ёки зарар ва самарадорлик даражаси жадвалда кўрсатилган.

31-жадвал

Тажрибанинг иқтисодий самарадорлиги

Кўзилар жун қоплами пигментацияси	Ҳисобга олинган кўзилар сони	Кўзилар терисининг таннари (бир донаси 16018,5)	Тахминқилинган баҳоси, сўм		Натижа Фойда+ Зарар – (сўм)	Самарадорлиги
			бир донаси	жами		
Тим қора	40	640740	21529	861160	+220420	34,4
Қора	40	640740	19500	780000	+139260	21,7
Қораси етарсиз	40	640740	15022,7	600908	-39832	-6,2
Жами ўртача	120	1922220	18683,9	2242068	+319848	16,6

Жадвалдан кўриниб турибдики, жун қопламининг тим қора бўлган кўзилар бир дона терисининг сотиш баҳоси қора кўзиларникидан 2029сўм , қораси етарсиз кўзиларникидан 6506,3 сўм юқори туради. Жун қопламининг ранги тим қора кўзилар терисининг самарадорлиги даражаси энг юқори (34,4%), бўлгани ҳолда қораси етарсиз кўзилар терисининг ҳар биридан 180588сўм (16,6%) зарарга сотилди. Жун қопламининг ранги қора кўзилар терисининг самарадорлик даражаси 21,7 % ни ташкил қилган бўлса ҳам бу кўрсаткич тим қора кўзиларникидан икки баробар камдир.

Тим қора кўзилар терисининг сотиш баҳосини 100% деб олсак, қораси етарсиз 85,7 % га, қора кўзиларнинг териси 94,5%га тўғри келади.

VI. ЭКОЛОГИК МАСАЛАЛАРНИНГ ЁРИТИЛИШИ, ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ВА ТЕХНИК ХАВФСИЗЛИГИ.

Ерни кўпайтириш мақсидида Амударё ва Сирдарёнинг суви Орол денгизига этиб бормаслиги натижасида Қорақолпоғистон Республикаси, Хоразм, Бухоро ва Навоий вилоятларининг ижтимоий ҳаётига қанчадан қанча муаммолар пайдо қилмоқда. Дастлаб ер шўрлаб иқтисодий унумдарлиги камайиб кетмоқда, шўрлаш бошқача қилиб айтганда денгизнинг шўри шамол ёрдамида интенсиве равишда бошқа ҳудудларни қоплаб бормоқда, балиқчилик тармоғи катта зарар кўрди. Яккаю ёлғиз ҳисобланган балиқ маҳсулотларини қайта ишлайдиган завод тўлиқ қувват билан ишламай қўйди. Бу муаммони ҳал қилиш борасида Марказий Осиё Республикаларининг жамоатчилиги нуфузли халқаро ташкилотлар (Юнеско, экосан) қатор тадбирлар уюштирмоқда.

Энг катта ва долзарб муаммоларидан бири бу экологик муаммо. Экологик муаммонинг келиб чиқишига эса инсонларнинг ўзлари сабабчидир. Сivilизатсия ривожлангани сари инсонлар табиат билан ўта қўпол муомалада бўлмоқда. Ҳар хил сабаблар билан тирик мавжудодлар нисбатини бузушга ҳаракат қилди. Хусусан ўсимлик ва ҳайвонлар дунёсига бўлган этибор сусайганлиги натижасида, кўпгина турлар эр юзидан йўқолиб кетмоқда. Уларни сақлаб қолиш учун қилинган ҳаракатлар қўриқхона ташкил этиш, қизил китоб жорий этиш ва хоказолар ҳам ижобий натижаларни беравермайди. Ер ости қудуқларини кўпайтириш ва ариқ, дарёларни сувини иқтисод қилиш мақсадида кўплаб сув бўйи ўт ўлан ва ҳайвонлар қирилиб кетди, оқова сувларига саноат ва ижтимоий чиқиндиларнинг ташланиши натижасида сув ифлосланди, бу эса атроф муҳит ҳавосини бузулишига ва инсонлар орасида ҳар хил касалликларни келиб чиқишига сабаб бўлди.

Чорвачликда экологик муаммоларга этибор бериш, экологик талабларга риоя қилиш учун қуйидагиларни бажариш лозим:

1. Чорва моллари ва паррандаларини санветекспертизадан ўтган доридармонлар билан даволаш ва вакциналар билан эмлашни йўлга қўйиш.
2. Чорвачилик фермалари ва иншоотларини кураётганда ҳудудни зооветеринария ҳолатига эҳтибор бериш. Аҳоли яшайдиган жойларни, катта саноат корхоналари, қабристон жойлашганлиги, захарли моддалар, кимёвий ўғитлар сақланган эски омборларни ҳисобга олиш;
3. Чорва моллари ва паррандаларни соғлигига эҳтибор бериш, касалликларини олдини олиш билаб боғлиқ бўлган зооветеринария чоратадбирларини ўз вақтида ўтказиш, касалланган молларни дарҳол подадан ажратиб даволаш йўллари қилиш;
4. Чорва моллари ва паррандаларига экологик тоза ем хашак бериш, бунинг учун ширали, кўк ва дағал хашакни ичига захарли ўтларни тушурмасликни тامينлаш. Омехта емларниеса заводлардан, сеҳлардан олишдан илгари яхшилаб лаборатория текширувидан ўтказиш.
5. Чорва маҳсулотларини санветекспертизадан ўтгандан кейингина истемолга чиқаришга эришиш. Касал молларни маҳсулотларини истемолга чиқармаслик уларни эрга кўмиб юбориш ёки ёндиришни ташкил қилиш.
6. Чорва молларини яйловга чиқаришдан илгари, яйловни ҳар томонлама текшириш, эски иморатлар ва қўтонларни жойини яхшилаб дезинфекция қилиш.
7. Ташқаридан импорт қилинадиган чорва моллари, паррандалари ва уларни маҳсулотини божхонадан ўтаётганда экспертиза қилиш. Касал молларни ўзини ва уларни маҳсулотларини ўтишига йўл қўймаслик, бунинг учун эса катта зооветеринария назоратини ўтказиш.
8. Қишлоқ хўжалик ходимларини экологик тоза маҳсулот ишлаб чиқаришини тامينлаш мақсадида доимий равишда режага асосан семинар, ўқиш ва малака оширишни ташкил этиш.

Чорвачилик фермалари, фермер ва дехқон хўжаликлари, паррандачилиқ фабрикаларида яна бир муҳим тadbир ҳаёт фаолияти хавфсизлигига этибор бериш лозим бунинг учун эса:

1. Молхонада, фабрикада ҳизмат қилаётган ишчи ходимлар билан доимий равишда ҳаёт фаолияти бўйича йўл-йўриқлар ўтказиш. Дастлаб ишга қабул қилинаётган ходимни огоҳлантириб махсус китобга имзо қўйдириш лозим.
2. Чорвачилиқ фермаларида ишлайдиган ҳар бир ходим кийим-кечак билан таминланган бўлиши керак.
3. Озуқа тайёрлайдиган сехдаги механизмлар: гўнг чиқарадиган механизмлар, электр манбаларининг ишлаб турган вақтида қўл текизмаслик ва созламаслик керак. Ушбу механизмларни ишлашдан тўхтатиб кейин тамирлаш керак.
4. Соғин сигирлар билан муомала қилишдан олдин уларни лақабини айтиб бир неча марта чақириш керак, агар ундан ҳайвон реакция қилса уни ўнг томонидан ёндашиб, соғин апаратини кийдириш, ёки ўлчамлар олиб баҳолашмумкин.
5. Наслли ҳайвонларни ва махсулдорлиги бўйича рекорд бўлган ҳайвонларни намоишларга олиб чиқиш учун махсус эталагич яратиш керак ва ўша ёрдамида олиб чиқиш мақсадга мувофиқдир.
6. Ҳайвонларни бир жойдан иккинчи жойга кўчирганда, гўштга топширганда, кўрғазмага олиб борганда авто уловни махсус жихозлаш керак, ҳайвонларни шикастланишига йўл қўймаслик учун, уларни талаб даражасида жойлаштиришга эришиш лозим;
7. Ҳар бир ферма қошида ходимлар шикастланганда бирламчи тиббий ёрдамни кўрсатиш учун зарур бўлган дори-дармонлар аптекаси бўлиши зарур
8. Ҳар бир фермада ходимлар ечиниб махсус кийимларини киядиган хона бўлиши керак.

9. Хўжалик ҳисобидан ҳаёт фаолияти ва техника хавфсизлиги тадбирлари учун молиявий режа тузаётганда маблағ ажратилиши шарт. Ажратилган маблағни бир қисми тадбирлар учун сарфланса бир қисми шкастланган ходимларни соғлигини тиклашга ва уларни санаторияларга дам олиши учун сарфланади.

10. Касб-ҳунар коллежларида кўзда тутилган мавзуга қараб ва амалий ва лаборатория дарсларида қўлланиладиган асбоб ускуналар, лаборатория анжомлари, кимёвий моддалардан фойдаланишда ҳам ҳаёт фаолияти хавфсизлигига катта эътибор бериш керак.

11. Экология, ҳаёт ва техника хавфсизлиги масалаларини амалга ошириш учун ҳар бир жорий йилнинг бошидан махсус режа тузилади ва тасдиқланади. Ҳар бир соҳа ёки экологик, ҳаёт фаолияти ва техника хавфсизликлари бўйича алоҳида алоҳида масул ходим тайинланади. Барча жавобгарлик ишлари ушбу шахс зиммасига юкланади. Режа тасдиқланган йиғилишда ҳисобот йилида ушбу муаммоларни ечими бўйича қилинган ишлар таҳлил қилинади. Ҳар бир бажарилган банди бўйича сифатли ишлар самараси айтиб ўтилади. Бажарилмаган бандларини бажармаслик сабаблари аниқланади, бажариш учун масул бўлган шахслар огохлантирилади. Келгуси режалар аниқлаб олинади.

ХУЛОСАЛАР.

Ўтказилган тажрибанинг натижаси қуйдаги хулосаларни қилиш имкониятини беради:

1. Қора қоракўл қўзилар жун қоплами рангининг пигментацияси энг муҳим селекцион белгилардан бўлиб, у қоракўл қўзилар тери сифати билан боғлангандир.

2. Жун қопламининг ранги тим қора қўзилар кўп жиҳатлари билан қора ва қораси етарсиз қўзилардан устун туради. Хусусан бундай қўзилар яхши етилган, жуни ўта ипаксимон, кучли ёлтироқ, қаламгуллари кўп, узун расми аниқ бўлиб, аскарият қисми элита ва 1 класс қўзилар тоифасига мансубдир.

3. Жун қопламининг ранги қораси етарсиз қўзиларининг тери сифати тим қора ва қора қўзиларникига нисбатан паст бўлади. Хусусан жун қопламининг ранги қораси етарсиз қўзилар орасида, яхши етилмаган, нозик конституциялилар, тери тўқмаси хаддан ташқари юпка, бўш териси танасига таранг тортилиб турган, жунининг ипаксимонлиги ва ялтироқлиги етарли даражада бўлмаган, мойли тери кам учрайди.

4. Жун қопламининг ранги қораси етарсиз қўзилар орасида калта қаламгул, гулнинг мустаҳкамлиги етарли даражада бўлмаган расми ноаниқ, кавказ ва кокурғасимон барра типларига мансуб бўлган иккинчи классли қўзилар бошқа гуруҳлар орасидагига нисбатан кўпроқ бўлади.

5. Жун қопламининг ранги қора қўзилар кўп жиҳатлари билан тим қора қўзиларга яқин туради. Қора қўзилар орасида мустаҳкам конституцияли, териси танасига эркин тушиб турадиган, жунни нормал ипаксимон, нормал ялтироқ, мойли терли қўзилар кўпроқ учрайди. Бундай қўзиларни гулларининг мустаҳкамлик даражасининг юқорироқ бўлиши билан ҳамда улар орасида жакет барра типдаги биринчи класс қўзиларнинг кўпроқ бўлиши билан фарқ қилади.

6. Қора қоракўл қўзилар жун қоплами рангининг сусайиши, тирик вазнининг пасайишига, конституциянинг нозиклашувига, тери қалинлиги ва

толалар узунлигининг камайишига қаламгулларнинг салмоғини пасайишига, гулларнинг эни ва узунлигининг қисқаришига олиб келади. Шунингдек элита ва биринчи классли қўзилар салмоғининг ортишига сабаб бўлади.

7. Тим қора қўзилар терисининг харид нархини 100% га тенг қилиб олсак, қора қўзиларники 94,4% га, қораси етарсиз қўзиларники 83,9% га тўғри келади.

8. Тим қора қўзилар терисининг самарадарлик даражаси 34,4 % , қора қўзиларники 21,7% тўғри келган бўлса, қораси етарсиз қўзиларникидан -6,2% зарар кўрган.

Ишлаб чиқаришга амалий таклиф ва тавсиялар.

1. Хўжаликларида насл учун ўстиришга қолдирилган қора рангли қўчқор кўзиларнинг жун қоплами тим қора рангда бўлиши шарт.
2. Қора рангли қўчқорларни 15-20 кунлигида ва ундан кейинги даврларда қайта баҳолашдан ўтказганда қора ранг ўзгармай узоқ муддат сақланиш даражасига катта эътибор бериш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Каримов. И.А. “Ўзбекистон иқтисодий ислохатларни чуқурлаштириш йўлида”. Тошкент “Ўзбекистон” 1995 йил
2. Каримов.И.А.“Ўзбекистон иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш” Тошкент – 1999 йил.
3. Каримов. И.А. “Жаҳон молиявий – иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари”. Тошкент – “Ўзбекистон” – 2009 йил.
4. Наслчилик туғрисида” ги Давлат қонуни. Тошкент. 1995 йил 21 декабр.
- 5.“Шахсий ёрдамчи. Деҳқон ва фермер хўжаликларида чорва молларини кўпайтиришни рағбатлантиришни чора-тадбирлари тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПК-308 сонли қарори. Тошкент 2006 йил 13 март.
6. Шахсий ёрдамчи, деҳқон ва фермер хўжаликларида чорва молларини кўпайтиришни рағбатлантиришни кучайтириш ҳамда чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтириш борасидаги қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси президентининг ПК-842 сонли қарори. Тошкент 2008 йил 21 апрел.
- 7.Арсланова М.Х. «Вопросы пигментации каракульских ягнят» Труды ВНИИК. Ташкент, 1976,
- 8.Валиев Р.Г. «Значение формы и типа завитков в селекции каракульских овец» Технология производства продукции каракулеводства. Москва «Колос» 1974
- 9.Васин Б.Н. «Наследование продолжительности эмбрионального развития и установление связи между числом дней отелa и качеством смушка» В.кн. Селекция каракульских овец. М., Советская Азия 1993.
- 10.Васин Б.Н. «Цветной каракуль» -М: международная книга. 1968.

11. Васин Б.Н. и др «Руководство по каракулводству» М. «Колос»1971.
- 21.Воробьевский А.П. «Некоторые вопросы механизма изменения и развития каракульских завитков» в кинига конференции молодых учённых по с/х Узбекистон 1990. Ташкент.
12. Воробьевский А.П. и др «Эпр-спекрометрическая оценка содержания меланина в шерсти каракульских ягнят и овец» с/х биология М.Колос 1980.
- 13.Газиёв А. ва бошқалар. «Қора рангли қоракўл қўйлари селекцияси самарадорлигини ошириш усуллари».(Услубий кўрғазмалар). Самарқанд. 2001.
- 14.Ғиёсов М.А. ва бошқалар. «Қоракўлчиликда селекция ютуқларини апробациядан ўтказиш бўйича Низом». Тошкент.2001.
- 15.Гигинейшвили Н.С. «Племная работа в цветном каракулводстве» М.Клос, 1976.
16. Дыячков И.Н., Зокиров М.Д. Письменная Р.Т. «Методика изучения качества каракуля» Турды ВНИИК, Т.13. Самарқанд. 1963.
17. Дыячков И.Н. «Длина волоса каракулских ягнят внешний признак в селекционной работы» Туруды ВНИИК, Т.18. Самарқанд. 1980.
- 18 Дыячков И.Н. «Племенное дело в каракулским овцеводстве» Тошкент.Изд-ве «Фан» 1980.
- 19.Елмесов К.Е. «К вопросу создания стада каракульских овец с ребристым завитков» в совхозе «Тасты», ВКИ: Проблемы гаистини и в кракулеводстве. Агмоты «Кайнар» 2000.
20. Зокиров М.Д., Хамрокулов Д.Ю., Ширинбоев Ш.Ш., «Қоракўлчилик» Т. «Укитувчи». 1983.
21. Зокиров М.Д., Каримов К.К. «Смушководение» Тошкент 1987.
22. Зокиров М.Д., Атамуродов К.А., Ҳайдаров Я.Х. “Ҳайвонлар хом-ашёси товаршунослик” Тошкент 1999.

23. Ибрагимов А. «Ценные заводские типы каракульских овец сур» В кн: Тезисы докладов конференции по вопросам каракулеводства,. Самарканд, 1999.

24. Инаятов А.И., Рахимов Д.А., Валиев Р.Г. «Содержание меланина в волосе каракульских ягнят и активность некоторых ферментов крови». «Каракулеводство» Сборных научных трудов ВНИИК, вып. XII. Т., 1981

25. Инаятов А.И. «Сравнительная оценка методов определения в волоса каракульских ягнят» В кн: Каракулеводство. Вып. X. Ташкент, 1986.

26. Инаятов А.И. «Содержание меланина и физико-механические свойства волоса окраски и происхождения» Автореф. дис. соисканной ученой степени. Конд. с/х наук. Дубровины. Москва 1986.

27. Искандаров М.А. «Научные основы товароведения шкур каракуля» В кн: Каракулеводство. Сборник научных трудов ВНИИК. Вып. XI. Ташкент, 1980.

28. Искандаров М.А. «Пути улучшения качества каракуля» Ж. Овцеводство, 1989, №4,

29. Искандаров М.Ш., Турсунов Ш. «Заготовки и переработка продукция каракулеводства рыночных условиях». Қоракўлчилик ва чўл озиқа ишлаб чиқариш технологияси. ЎзКИИТИ илмий мақолалар тўплами. Самарканд 2001.

30. Ролдугина Н.П. «Морфогенез пигмента у позвоночных» Самарканд 1984.

31. Ролдугина Н.П. «Особенности пигментации волосяного покрова каракульских ягнят различных окрасе» Труды ВНИИК, том 13, 1963.

32. Ролдугина Н.П. «Качества каракульских сумушков разных окрасок в связи с интенсивностью пигментации волосяного покрова» Труды ВНИИК, том 16, 1964.

33. Фищинко О.П. «К вопросу о морфогенезе пигмента каракульских овец» в кн: Труды ВНИИК, том 19, 1989,

34. Умирзаков Т.У. «Изменчивость признаков и селекция каракульских овец» Автореф. дисс. док. с/х. наук. 06.02.01. Дубровицы Москва. 1989.

35. Юсупов С.Ю., Исмоилов А.И., Рахимов А.А. “Қорақўлчилик” Тошкент. “Меҳнат” 1996.

36. Юсупов С.Ю., Рўзимуротов Р.Х. “Қорақўлчилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси” Самарқанд 1995,

Каракулеводство

Подраздел: [Статьи об Узбекистане](#) | [Узбекистан](#)

Страницы: 1



Узбекистан занимает ведущее место в мире по производству каракуля. Каракульская порода была выведена сотни лет назад на пустынных кызылкумских пастбищах вокруг Кара-Куля (в переводе «Черного озера»).

Впервые тюркское слово «каракуль» упоминает в 978 году арабский историк Ибн-Хаукаль. А спустя 300 лет венецианский путешественник и купец Марко Поло

восторгался оригинальными узорами каракуля. Бухарские и хивинские купцы торговали в XVII веках каракулевым сырьем на рынках в Нижнем Новгороде и Твери. А в XIX веке бухарский каракуль пользовался огромным спросом на международных пушных аукционах Европы и Америки.

До начала XX века правители Бухары сохраняли монополию на производство и экспорт своего золотого руна – через Иран или приволжский город Астрахань. Отсюда и пошли западные названия каракуля – «персидский ягненок» и «астрахан». Но в 1907 году последний бухарский эмир сделал необдуманый подарок британскому послу - стадо каракульских овец, и англичане незамедлительно вывезли их в Намибию, откуда пошло новое направление в каракулеводстве - производство намибийского каракуля, получившее название «свакара» – то есть аббревиатура South-West African KARAKul, в переводе означавший каракуль из юго-западной Африки.

В 1920 году последний эмир Бухары бежал от большевиков в Афганистан, забрав с собой лучшие отары. Тем самым в Афганистане также начали выделывать каракуль. Афганистан стал ведущим производителем каракуля, хотя афганские шкурки проигрывали изысканному и разнообразному узбекскому прототипу.

Узбекский каракуль называют тонким как замша и мягким как бархат. В советское время под маркой BUHARA KARAKUL каракулеводство стало основным направлением экономики. Каракуль составлял 40 % всего экспорта. Получение цветного каракуля было одним из направлений племенной работы во всех странах. Перед производителями каракуля была поставлена задача в получении различных цветов.

Самый распространенный цвет каракуля – это черный. Особенной ценностью в черном окрасе является узор. По сравнению с черным каракулем рисунок серого более простой, но отличается игрой цвета. В зависимости от соотношения количества черных и белых волосков, возможно получение палитры цветов от светло-серо-голубого до черного с седым оттенком.

Наличие в сером каракуле небольшого количества коричневых волосков, придает шкурке красивый сиреневый оттенок. Такой сорт каракуля называют "гулигаз" (в переводе с узбекского - "цветок тамариска"). Серый каракуль является прекрасным материалом для окрашивания, т.к. нейтрально-серый не дает цветовых искажений. Серый каракуль был получен во всех странах, но особенных успехов производители достигли в Афганистане, где доля такого каракуля может достигать 60%.



Коричневый каракуль относится к редким цветам и не часто используется в натуральном виде. К проблемам его подбора по завитку добавляется большой спектр расцветок: от шоколадного до бежевого, от рыжего до холодно-палевого. Самым ценным сортом коричневого каракуля является "сур", у которого интенсивность цвета меняется по длине волоса: у корня - темнее, на концах - светлее. Самый редкий цвет каракуля - белый. Лучших результатов по качеству и количеству достигли только в Намибии. Белая свакара имеет чистый, молочный цвет.

Сейчас Узбекистан – второй в мире производитель каракуля после Афганистана. Селекционеры Узбекистана сделали ставку на легкий и тонкий каракуль так называемого жакетного типа, у которого тугие завитки образовывали трубчатые вальки разной длины по всей площади шкуры. На мировом рынке растет спрос на высококачественный узбекский каракуль и производимую из него продукцию.