

АДИР МИНТАКАСИ СУВ ОМБОРЛАРИДА ЭНДИМИК ВА НОЁБ ИККИ ПАЛЛАЛИ МОЛЛЮСК АЛ АРИНИНГ ТАРКАЛИШИГА АНТРОПОГЕН ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Боймуродов Х., Баходирова Ш.
Самарканд Давлат университети

Аннотация. *Жиззах сув омборида 8 тур, Тусинсой сув омборида 8 тур ва Икепжа тур иккипаллали моллюскалар яшайди, улар 2 оила ва 4 авлодга тааллулуя. Сув омборларида пеллофил, пелореофил, вареофил экологик гуруҳига кирувчи моллюскалар учрайди.*

Калит сузлар. *Фаунистик, комплекслар, популяциялархув омборлари, икки паллали моллюскалар. фауна, ноёб, эндемик ва реликт хайвонлар, экологияси.* Кнриш. Адир минтакаси океан сағхддан 400 - 500 м дан 1000 - 1200 м гача булган баландликларда жойлашган булиб тоғ олдиларинн эгаллаеди. Адир икдими чул икднмидан бир оз фарк килсада, ёзи песик ва узок давом этади. Ёз чулдагидек жазирама иссик эмас йиллик ёгин мавдори 300 - 450 мм. Уснмликлар коплами чулдагидан кура калпнрок. Бувдай пшронтда оддий ва тук гусли буз тупровутар косил булади.

Адир минтакаси сув омборларида иккипаллали моллюскалар кеиг таркалган.

Материаллар ва методлар. Чиганоги иккипаллали унғ ва чан паллалардан нборат булган моллtpсалйр-пккйбан.-иил. .^л^АБ^ллдр деб пталзди. Удар еувда муадлак холатда булган эиг кичик организмз[ир { аллахтон организмлар) билан озикданади ва шу бtШан^ бирга сувни фильтирлошда иштирок этадиган энт мухдм табиий тазалочилар хисобланади. Охирги йилларда иккипаллали моллюскаларни асосан В.И.Жадпн (3938, 1952), А.Ф.Алимов (1981), Я.И.Старобогатов, З.И.Изагуллаев (1978,1985), А.В. Корнюшин, З.И.Изагуллаев (1992), А.В.Корнюшин (3 996) ларнинг илмий тадқиқот ишларида янги усул ва уелубларни кулланишн бу моллtpскаларнинг таксономик тузилишнда мухам натижаларга олиб келди.

Адир минтакаси сув омборлари иккипаллали моллюскаларининг систематик таркиби, уларнинг биоэкологик хусусиятлари, биотоплараро таркалиши ва боишда муҳим томонлари тулик урганилмаганлигшга эътиборга олган холда биз уз тадқиқотларимизии 1997 йилдан бошлаб моллюскаларни йиғишни бошладик. Борча тадқиқотларимиз учун илмий материаллар 1997-2014 йилларнинг баҳор, ёз ва куз фасилларида адир минтакасида жойлашган Тусинсой ва Жиззах сув омборларида ва улар атрофидаги сув типларидаи терилди. Ушбу моллюскалар намуналари фанда маълум булган ва В.И.Жадин (1938, 1952), Я.И.Старобогатов, З.И.Изагуллаев (1985), З.И.ИзагуллаевД.Т.Боймуродов ус луб л ар и билан урганилди.

Натижалар ва уларнинг таҳднли. Тусинсой сув омбори. Тусинсой сув омбори Пайарик тумани "Халкабод" ижара хужалиги майдонида жойлашган булиб, кдсман Кушрабoт тумани "Кушрабoт" ижара хужаяиғи билан ҳам

четарадош. Бу сув омбор 1988 йил ишга туширилган. Униат сув сигами 55,0 млн.м ни ташкил килади, тутоннинг баландлиги 32 м, узунлиги 380 м.

Биз сув омборида 2012-2014 ниллар молокологик текширишлар олиб бордик. Бааик хужалигини ривожлантириш мақсадида 1990-1992 йиллар ушбу ҳудудда

Хитой комплекс баликлари ва карп балиги инсон тамонидан икклимлаштирилган.

Тусинсой сув омбори якин вақтлар ичида ташиқ этилганлиги сабабли сувда яшовчи ҳайвонлар, шу жумладан моллюскалар бизгача алоҳида урганилмаган. Ушбу сув омборида балнклар билан биргаликда моллюскалардан *Sinanodontagibba*, *S.orbicularis*, *S.puerorum* турлари тарқалган. Улар сув омборининг турли биатохшарида кенг учрайди. Бу моллюскалар сув омборидан мавсумлараро тегиб урганилди. Моллюскалар зичлиги сув омборининг 2,5-3,8 метр чуқурликларида лой орасида 1 ж да 1-5 донагача тугри келади. Сонжихатдан *S.gibba*, *Colletopterum cyreum sogdianum*, *Corbicula purpurea* куп.

Тадқиқотларимиз натижасида ушбу сув омборида моллюскаларнинг 8 тури ва 1 кенжатурининг яшашини аниқладик, улар 3 оила ва 4 уруғ татааллукли. Сув омборининг киргок бўйлари оқарсувлари оёлиларида - пелореофилларнинг 8 тури (*Sinanodonta orbicularis*, *S.gibba*, *S.puerorum*, *Corbicula cor*, *C.purpurea*, *Corbicula tibeteris*, *C.fjuminalis*, *C.ferghanensis*) тарқалган сув омбори сув келиб тушади гангисмларида, реофиллардан 1 кенжатурининг (*C.cyreum sogdianimi*) яшашини аниқладик.

Хулосаси сув омбори тоғ сойлари олдинги тусишдан юзага келган бўлиб, Зарафшон дарёсининг бошқаси сув типлари билан боғлиқ эмас. Шунинг билан, моллюскалар турлари кам.

Жиззах сув омбори.

Сангзар дарёси сувлари дантулик фойдаланиш ҳамда унинг оқ, имини тартибга солиш учун Жиззах сув омбори барпо этилган. Сув омбори Жиззах вилояти ҳудудидан барпо этилган бўлиб, ушахридан 9 км жанубий шарқда жойлашган. Сув омбори 1963-1968 йилларда қурилиб бишгача туширилган бўлиб, майдони 12,7 км², чуқурди 19,8 м, сув ҳажми 87,5 млн м³ энг кенг жойи 5,1 км, узунлиги 3,3 км.

2013-2014

йиллар Сангзар дарёси ҳавзасида гн Жиззах сув омборида гн моллюскаларнинг аҳоли амафисти турлари тарқиб, биотоплар аҳоли тарқалишини, генофондини асраш учун экологияси ва популяцияси аҳоли ургандик. Биздан олдинги урганишлар ва бизнинг — ?ад^ккв*я**1р.*и^4_на.1 цжаа&гцц Жиззах сув омборида 8 тури ккипалли моллюскалар яшашини, улар 2 оила ва 4 авлодга кнриши аниқладик. Куйида уларнинг фаунистик турлари 1 ц5 кио ТГ келтирилади: Unionidae оиласи *Sinanodonta* авлоди *S.orbicularis*, *S.gibba*; *Coelocypoda* тегиткшлоди. *C. cyreum sogdianum*, *C. ponderosum volgense*; *Corbiculidae* оиласи: *Corbicula* авлоди *C. cor*, *C.purpurea*, *C.fjuminaiis*; *Corbiculina* авлоди: *C.ferghanensis*.

Жиззах сув омбори култикларида дарё сув қуядиган юкори кисмида *Sinanodonta orbicularis*, *S.gibba* тарқалган бўлиб, бошқатурларганисбатан кам тарқалган. Сув омбори сув сатҳининг узгариб туриши иккипалли моллюскалар тарқалишига урта сирини қурсатган.

Натижада юкори эда келтирилган хитой моллюскаларининг тарқалишига олиб келган. Чуйки балнклар хитой тиши сизларининг глохидиялари паразитлик қилади. 1

Colletopterum cyreum sogdianum тури 2,5 - 3 м. ва ундан ортиқ чуқурликларда яшайди,

улар билан бирга бушчиганоклар ҳам учраб туради.

Сув омборининг сув куйиладиган қисмида чап соҳилида сув чиқиш каналида моллюскалардан *Corbicula cor*, *C.purpurea*, *C.fluminalis*; *Corbiculina ferghanensis* лар яшайди. Умуман моллюскалар сув омборининг лой босқа ва микрофитлар куп усадиган қисмларида сероб. Бу ерларда улар 2 -- 4,5 м чуқурликларда қамиш ва сув утлари куп усган жойларда яшайди ва баъзи вақтларда қумлок, тошлок жойларда ҳам учрайди.

Иккипаллели моллюскалар экологик гуруҳлари бўйича пелолимнофил, пелореофил ва реофил гуруҳларга бўлинади.

Жиззах сув омбори оқар сувлар лойларида пелореофиллар *Sinonadonta orbicularis*, *S.gibbata* сув ости лойлар, балчикларда пелолимнофиллар : *Corbiculina cor*, *C.purpurea*, *C.fluminalis*, *Corbiculina ferghanensis* яшайди.

Сув омборларнинг даре сув қуядиган қисмида ва каналлар оқар еузларида *Colletopterum sogdianum* турининг яшаши аниқланди.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки. Жиззах сув⁴ омборида 8 тур, Тусинсой сув омборида 8 тур ва 1 кенжа гуруҳ иккипаллели моллюскалар яшайди/улар 2 оила ва 4 авлодга га айлукли Сув омборларида пелолимнофил, пелореофил ва реофил экологик гуруҳига қарашли моллюскалар учрайди.

ТОҒМИНТАКАСИ БУЛОК ВА ЧАШМАЛАРИДА НОЁБ ИНКИ ПАЛЛАЛИ МОЛЛЮСКАЛАРНИНГ ТАРҚАЯИШИ

Боймуродов Х., Бахадирова У(СамДУ)\

Тоғ минтақаси океан етхидан 1000 -1200 м дан 2700-2800 м гама будган балагяликдаги жойларни у< ичига олади. Баландликка кутарилган сари каво \аро[чгги пасайиб. ёгинлар микдорн орта боради Тоғларда бз салкинрок чулцжга нисбатан кискарок булади.

Тоғларнинг шимолий ён багирлари жанубий ён багирларига нисбатан| салкин ва намрок булганлигидан утлар из буйи кум - кук булиб усиб туради. I Тоғларнинг гарбий ён багирларида шаркий ён багирларига нисбатан сшк| купрок булади, бинобарин бу ён багирларида усимликлар хам купрок калин! усади.

Тоғ минтақасидаги нам иклим ва калин усимликлар коплами тупрош таркибида чириндининг купайишига шароит яратади. Тоғлзрда тоғ кунрир вз I ТОҒжигарранг тупроклари таркиб топган. Тоғ минтақасида тоғ урмонлар ва! булок чашмаларда узига хос экосисгемапар хосил булган. Оксан сат\идан 14001 м дан 2500 м гача булган баландликларда арча учрайдн. Тоғ урмоқпарнииш ахамияти капа. Улар сув окимларини таркибга солади, селларнинг олдиня I олади, тупрокларни ювилиб кетишдан саклайди, хаво хароратини I

мутадиллаштирадн, хаводаги зарарли моддаларни, чангни ютиб, кискларод ва I намни купайтиради. Тоғ минтақасининг хайвонот дунёси бой ва жуда хилма - I хилдир. Зарафшон табиий географик улкасининг ер усти тузилиши бир хач I эмас. Зарафшон водийси шимол хамда жанубга гомон баландлашнб, тоғларга I туташиб кегади. Зарафшон водийсидан окувчи Зарафшон дарёсига доимий I куйилиб турувчи ирмоқлардан ташкари унинг урта кисмида 60 дан ортик I сойлар хам мавжуд. Улардан энг мухимлари Зарафшон тогининг farбий I кисмидан бошланувчи Ургутсой, Омонкутансой, Сазагансой, ДараГпутсой ва I бошкалар, %

Тоғ ён багирлари ва унинг этаклари, водийлар кадимдан ахолининг I табиий яйлов, лалми ва сугориладиган дехкончиликнинг вужудга келиш Iучокдари, ноёб гидротехника иншоатлари таркиб топган, нодир казилма Iбойликлари казиб олинадиган улка сифатида маълум. Эндиликда халк Iхужалиги тармоқдарининг текорлик билан ривожланишн тоғ, гог олди Iхудудлари сув, усимлик ва бошка ресурслардан янаца кенгрок фойдаланишига | олиб келмокда. Бу сойлар паст тоғлардаи бошланнб эрта бахорда эриган кор ва Iёмгир сувларидан туйинади. Езда эса уларнинг суви камайиб кетади. Булокдар I (чашмалар) тоғ худудидаги узига хос экосистемани хосил килган булиб ер ости сушгари табиий холатда ер юзасига чикяб турадиган жойларднр. Тоғли | худуддаги Омонкутан сойда хам булок ва чаишалар куплаб учрайди.

Омонкутан урмон хужалигига биринчи дарахтлар 1887-йи; . И.И.Корольков томонидан кияликларга Iушадиган селларни тухтатиш

|
максадида экилган. Бу Марказий Осиёда тоғли ерларнй |
дарахтзорлаштиришдаги биринчи кадам булган. Гог ён багирларига туп - туп
JSпа якка-якка килиб кайрогоч, дулана, ок акация, ёнгок, кримкарагайи, заране
|| каби дарахтлар экилган. Бу биринчидан, тоғ урмонлари табиий мухит хосі« 1
килувчя функцияни бажаради, иккинчидан, тунрокнинг устки кисмидаги гумус
Я ва озик моддаларни етарли даражада тупланиши учун кулай шароит яратади.
Д ТОҒ-экосистемаларига урмонлар тупрокни сув эрозиясидан саклайдн,Я|
кияликларда окадиган сувларнинг ер ости сувига айлапишини, окимнк 4!
секинлаштиришни таъминлайди. Бу эса сел окимлари ва кучли тошкинлс а.
хосил буяишининг олдини олади, булок ва чашмалар окимини тартибга
солади^ It

Омонкдайнсой Зарафшон дарёсининг чаи ирмоги булиб, дарёга етиб келмайди, Крратсяа сув омборига кунилади. Омоикутаисой худудида йиллик ёгин микдорп (800-850 мм атрофида) энг кун тушадиган жойлари на урмон хужалш ини мавжудлиги саоабли чашма ва булоклар купдир. Омоикутаисой сув и мавжуд булган кисмининг узуклиги 27 км атрофида сув йнгаднган майдони эса 24,3 кв.км. йиллик уртача сув сарфи 0,63 (секунд кубометр).

ушбу улка суп моллюскаларини урганиш тарихини баён этишдан олдии, умуман Урта Осиё хайвонот оламини урганиш тарихига тухталиб утамиз. Урта Осиёнинг фаунаси билан танишиш бу улканинг бошка давлатлар билан савдо ва турни алокаларининг ривожланиш давридан бошланади. Академик М.Н.Нфзикуловнинг (1474) маълумотларига кура, Урта Осиёнинг габиати ва фаунаенни Россия олимларидан П.П.Семёнов - Тяньшаньский (1856-1871), Н.А.Скрябин (1864-1878), А.П.Федченко (1868-1879), Л.С.Берг (1940-1949) ва бошкаяф урганишган. Улар умурткдли хайвонларни урганишдан ташкари, умурпфеизларга, жумладан моллюскаларга хам эътибор беришган. Урта Осиё моллюскалари фаунасини урганишда А.П.Федченконинг 1868-1871 йилларда ушбу худуддан тергаи материаллари асос булиб хисобланади, Аммо у вакгда Россияда моллюскаларни урганувчи мутахассисларнинг йу'кднги туфайли, улар ни урганиш ва системалаштириш имконияти мавжуд эмас эди. Ийилгап матертллар чет эл олимларига (асосан, Германияга) урганиш учун юборилди ва моллюскаларни Э.Мартене (1874) аникдаган.

Урта Осис нкки паллапи моллюскаларини урганишда В.И.Жадиннинг "Семейство Unionidae фауны" (1938) монографияси капа урин тутди. Унда Урта 1) сиё сув хавзапариди таркалган моллюскаларнинг турлар таркиби келтирилган. Умуман олганда, В.И.Жадин (1950, 1952), Я.И.Старобогатов (1970), З.И.Иззатуллаев, Я.И.Старобогатов (1985) ларнинг ишларнда Урта Осиё йувларидаги моллюскалар ва уларнинг зоогеографияси хакида асосий фикрлар баён этилган.

З.И.Иззатуллаев Урта Осиё сув моллюскаларини хдр гомонлама урганиш даврида икки паллали моллюскаларнинг бир неча янги турларини фанга киритилган. (Иззатуллаев, 1978, 1980. 1987; Старобогатов, Иззатуллаев, 1984). Бу тадикикотлар З.И.Иззатуллаевнинг (2002, 2003) ишларнда умумлаштирилган.

С.монкутансой булок ва чашмалари экосистемаларида икки паллали моллюскалари фаунаси, экологияси ва таркалиши махсус урганилмаган. З.И.Ифатуллаев Урта Осиё моллюскаларини хар гомонлама урганиш даврида Зарафшон ахоли сойлар булок ва чашмаларидан материаллар териб урганган. (З.И.Иззатуллаев, 1987). Омоикутаисой чашма ва булокларни экосистемаларидан 2012-2013 йиллар давомида 30 дан оргик намуналар териб икки паллали моллюскаларнинг фаунистик таркиби. биотоплараро сувларда таркалиши экологик гурухлари урганилди. Кичик икки паллали моллюскалардан *Euglesa* турлари турлари асосан тог ва тоғолди чашма ва булокларда яшайди. Ушбу моллюскаларнинг чиганоги канча катта булса. уларнинг эмбромони шунча куп буладп. Моллюскалар сув экосистемаларининг холатини бахолошда мухим ахамитга эга. Сойдаги булок ва чашмалар, улардан окиб чикувчи арикларда

таджик тилларида Euglesidaeva Pisididae оиласига талукли 10 турлар яшашни таниқланди. Euglesidae оиласи: Euglesa heldreichi, E. hissari, E. turkestanica, E. obliquata, E. turanica. Pisididae оиласи: Odhnepipisidi; polytimeticum, O. terenense, O. sogdianum, O. issykkulense, O. behnin, (Иззатуллаев., Боймуродов. 2001).

Иланишлар натижасида қуйидагиларга қўйилди:

Тоғнинг табиат экосистемалари нинга хамияти қилди.

Омонкутан сой бўлоқ қашқарларида Штуркичи қилқилли алли моллюскалари яшашни таниқланди.

Адабиётлар.

Иззатуллаев З.И. Водные моллюски Средней Азии и сопредельных территорий: Автореф. дис. докт. биол. наук -Л.: Наука. 1987.-45с.

Иззатуллаев З.И., Боймуродов Х.Т. Экология распространения* двусторчатых моллюсков бассейна реки Зарафшан. Биология-наука XXI века: 5ая Путинская конференция молодых ученых. -М, 2001.-с. 234-235.