

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
QISNLOQ VA SUV XO'JALIGI VAZIRLIGI
SAMARQAND QISNLOQ XO'JALIK INSTITUTI
Iqtisodiyot va boshqaruv fakulteti

“TASDIQLAYMAN”
Iqtisodiyot va boshqaruv
fakulteti dekani, dotset
_____ F.B. Ahrorov
“___” _____ 2014 yil

**“Yaylov chorvachiligi va hayvonlarni oziqlantirish texnologiyasi”
kafedrası**

**5610100-“Fermer xo‘jaligini boshqarish va yuritish” yo‘nalishi
bo‘yicha**

BITIRUV MALAKAVIY ISNI

**Mavzu: «Qo‘zilarning o‘shish va rivojlanishiga ona qo‘ylarni bo‘g‘ozlik
davrida to‘liq qiymatli oziqlantirishning iqtisodiy samaradorligi»**

**Bajardi: 5610100 -“Fermer
xo‘jaligini boshqarish va yuritish”
yo‘nalishi 4-bosqich 408-guruh
talabasi**

**Ilmiy rahbar, q.x.f. nomzodi,
katta o‘qituvchi**

Tog‘aev sherali

Qo‘ziyev I.

**Malakaviy ish muhokama qilindi va
himoyaga ruhsat beraman**

**Kafedra mudiri, dotsent
_____ B.S. Yahyaev
“___” _____ 2014-yil**

SAMARQAND – 2014

MUNDARIJA

KIRISH	3
Mavzuning dolzarbligi	8
Mavzuning ilmiy amaliy ahamiyati	9
I. Adabiyotlar tahlili	11
II. Xo‘jalik tasnifi	41
III. Tajriba o‘tkazish materiallari va uslubi	45
IV. Asosiy qisim	47
4.1. CHorvachilikda qo‘ychilikni tutgan o‘rni va rivojlanish yo‘llari	47
4.2. Qo‘ylarning to‘yimli moddalarga bo‘lgan talabi	48
4.3. Qorako‘lchilik muammolari va echimlari	49
4.4. Bo‘g‘oz sovliqlarni boqish	55
4.5. Qo‘zilarni o‘sish rivojlanishiga ona qo‘ylarni to‘liq qiymatli oziqlantirishning iqtisodiy samaradorligi	56
4.6. Tajribadagi bo‘g‘oz qo‘ylarni tirik vaznini o‘zgarishi	59
V. O‘tkazilgan tajribani iqtisodiy samaradorligi	63
VI. Ekologik muammolar, hayot faoliyati va texnika xafzizligi masalalari	65
6.1. Qumli cho‘llarni yaxshilash texnologiyalari	65
VII. Xulosalar, takliflar va ishlab chiqarishga tavsiyalar	70
VIII. Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati	72

KIRISH

O'rta asrda dehqonchilik bilan, birgalikda chorvachilikning rivojlanishiga ham alohida e'tibor berilgan. CHorva mollari ichida qorako'l qo'ylarini urchitish, katta maydondagi yaylovlardan foydalanishda va tannarhi arzon bo'lgan mahsulot ishlab chiqarishda muhim ro'l o'ynagan.

Qorako'l qo'ylari ming yillar moboynda xalq seleksiyasi asosida keltirib chiqarilgan. Ular eksterimal sharoitga moslashish imkoniyatiga ega.

Qorako'l qo'ylarining kelib chiqish makoni, Buxora viloyatining Qorko'l tumani hisoblanadi. Ularning asosiy mahsuloti qorako'l teri bo'lsada, ulardan yuqori sifatga ega bo'lgan go'sht, jun, ichaklaridan tibbiyot jarrohligi uchun ket-kut iplari, shirdonidan pishloq ishlab chiqarishda, shohlaridan turli hildagi taqinchoqlar, tugmalar, shoh qoldiqlari va tuyoqlaridan kley tayyorlanadi.

Qorako'l qo'ylarining qora, sur, ko'k va oq ranglari mavjud bo'lib, ko'k va sur qorako'llarda etti hil rangbaranglik mavjud.

O'ninchi asrda Buxora va Xivadan keltirilgan qorako'l teri bilan savdo sotiq ishlari boshlangan. Ular asosan Rossiyaning Tobolski, Tver, Nijniy-Novgorot va Irbit shaharlarida sotilganligini mashhur yozuvchi Marko Polo qayt etadi. Arabistonlik mashhur geograf Ibn-Xoukal qorako'l terilarda turli hildagi jilo beradigan, xushro'y tabiiy gullar mavjudligini yozib qoldiradi.

Qorako'l teri bilan savdo sotiq ishlari jahonda bo'lib o'tadigan barcha auksionlarda (Nyuork, Leypsik, London va Sankt-Peterburg) "Buxora-qorako'l" nomi bilan sotiladi.

Hozirgi kunda 16 tadan ziyot mamlakatda qorako'l qo'ylari urchitilmoqda, ammo ularning ichida O'zbek qorako'li sifat ko'rsatgichlari, rangi va rangbarangligi bo'yicha birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Bugungi kunda har bir qorako'l terimiz o'rtacha 25-30 dollordan sotilmoqda.

O'zbekistonda barcha toifa xo'jaliklarda 6 mln dan ziyotroq qorako'l qo'yi mavjud. 103 ta shirkat xo'jaligi davlat tasarrufida faoliyat yuritmoqda. 31 ta

qorako‘l qo‘ylarining zavod tiplari yaratilgan. Qorako‘l qo‘ylari cho‘l zonasida yashayotgan aholining sotsial masalalarini hal qilishda ham muhim ro‘l o‘ynaydi.

Qorako‘l qo‘ylari O‘zbek xalqining milliy boyligidir.

Qorako‘lchilik chorvachilikning asosiy tarmoqlaridan biridir Qorako‘l qo‘ylar eng qadimgi zot hisoblanib, ular barcha barra terili zotlarning urug‘boshisi hisoblanadi. Ular vujudga kelguncha hozirgi O‘rta Osiyo xududida yashagan qorako‘lchi-chorvadorlarning ko‘p asrlik mehnati sarflangan. O‘zbekistonda chorvachilikni rivojlantirish bo‘yicha bosqichma – bosqich choralar amalga oshirilib kelinmoqda. Amalga oshirilayotgan islohotlar chorvachilikda, shu jumladan qorako‘lchilikda bozor munosabatlariga asoslangan yangi tizimini ishlab chiqish imkonini berdi.

YAngidan qabul qilingan dasturiy hujjatlar, shu jumladan “naslchilik to‘g‘risida” gi qonun, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006 yil 23 martdagi 308-sonli, 2008 yil 21 apreldagi 842-sonli va Vazirlar Mahkamasining qator qarorlari chorvachilikni rivojlantirishga o‘zining kuchli ijobiy ta‘sirini ko‘rsatdi.

SHu bilan bir qatorda chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko‘paytirish bo‘yicha Respublikada ishlab chiqilgan 2011-2015 yillarga mo‘ljallangan xukumat dasturi qabul qilinib, uning bajarilishida yaylov chorvachiligining alohida o‘rni borligi belgilab o‘tilgan.

Hozirgi kunda qorako‘lchilik Respublika xalq xo‘jaligida muhim o‘rin egallaydigan sohalardan hisoblanib, 17,5 mln. ga cho‘l yaylovlaridagi barcha kategoriyadagi xo‘jaliklarda (shirkat, dehqon, fermer) 4,5 mln. bosh shu jumladan “O‘zbek qorako‘l” kompaniyasi tizimidagi xo‘jaliklarda 2,5 mln. bosh qorako‘l qo‘ylari urchitiladi. Qorako‘l zotining nasl zahirasi juda boi. Uning tarkibida 10 ga yaqin rang 30 dan ziyod rang-barangliklar, 4 gul, 4 konstitutsiya tiplariga mansub qo‘ylar mavjud. Ushbu zot bilan uzoq yillar davomida olib borilgan tadqiqot ishlari natijasida qorako‘lchilikda naslchilik ishlarini yuritish tizimi, turli rang, rang-

baranglik va gul tipidagi qorako‘l qo‘ylarining 31 yangi zavod tiplari yaratilib, patentlar bilan himoyalangan, yaylovlarni yaxshilash texnologiyalari ishlab chiqilgan.

Soha respublika miqyosida yiliga 17000,0-18000,0 tonna go‘sht, 250-300 ming dona qorako‘l terilari va 3000,0 tonna atrofida jun ishlab chiqarishni ta‘minlamoqda.

Qorako‘lchilikning nasl bazasi kuchli xozirda respublikada 29 naslchilik zavodlari va xo‘jaliklari faoliyat ko‘rsatmoqda va zot miqyosida 31 yuqori irsiyatli zavod tiplari mavjud. Barcha zavod tiplari qorako‘lchilik institutining ilmiy xodimlari va amaliyotchilar ijobiy hamkorligining mahsuli hisoblanib, ularning irsiyati qora, ko‘k, Buxoro, Qoraqalpoq, Surxondaryo surlari oq, guligaz ranglaridagi, turli gul tipli (qalamgul, yassi, qovurg‘asimon) yuqori sifatli qorako‘l terilari ishlab chiqarish bo‘yicha seleksiyalanib, mustahkamlangan.

O‘zbekiston Respublikasi o‘zining Mustaqqillik yillari davomida xalq xo‘jaligi barcha tarmoqlari bo‘yicha ulkan yutuqlarga erishib, dunyo hamjamiyatini hayratda qoldirmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning 2013 yilning asosiy yakunlari mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlari va 2014 yilda O‘zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan O‘zbekiston Respublikasi **Vazirlar Mahkamasining majlisidagi “2014 yil Vatanimiz taraqqiyotini yangi bosqichga ko‘taradigan yil bo‘ladi” mavzusidagi** ma‘ruzasi e‘lon qilindi.

O‘tgan 2013 yil ham mamlakatimiz ijtimoiy hayotining turli jabhalarida yangi yutuq va natijalarga juda boy bo‘ldi. Prezidentimiz I.A.Karimov 2014 yilning 19 yanvarida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yilning asosiy va 2014 yilda O‘zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan majlisida o‘tgan yil natijalariga atroflicha to‘xtalib, joriy yil vazifalarini aniq-ravshan belgilab berdi.

Davlatimiz rahbarining ma'ruzasida jahonda e'tirof etilgan taraqqiyotning o'zbek modeli hamda Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasining ustuvor yo'nalishlarini izchil amalga oshirish natijasida, dunyo iqtisodiyotida yuz berayotgan inqiroz holatlariga qaramasdan, 2013 yilda mamlakatimiz iqtisodiyotining yuqori barqaror o'sish sur'atlari va makroiqtisodiy mutanosibligi taminlangani qayd etildi.

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini modernizatsiya qilish, oziq-ovqat tovarlari ishlab chiqarishni kengaytirish dasturini amalga oshirish, fermer va dehqon xo'jaliklarini rivojlantirish 120,8 mingta ish o'rne, shu jumladan, chorvachilik, parrandachilik va baliqchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarda 35,4 mingta, bog'dorchilikda va issiqxona xo'jaliklarida 37,8 mingta ish o'rne tashkil etilishini ta'minladi.

Fermer xo'jaliklarida meva-sabzavot hamda go'sht-sut mahsulotlarini qayta ishlash va saqlashni tashkil etish, 56,4 ming tonna sig'imga ega bo'lgan 55 ta sovutish kamerasini qurish va rekonstruksiya qilish 19,7 ming kishini mehnat faoliyatiga jalb etish imkonini berdi.

Prezidentimiz ma'ruzasida 2014 yilda mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning quyidagi eng muhim ustuvor vazifa va yo'nalishlari belgilab berildi:

birinchidan, yuqori va izchil o'sish sur'atlarini saqlash, makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash;

ikkinchidan, iqtisodiyotining raqobatdoshligini oshirish bo'yicha dastur tayyorlash va uni amalga oshirish;

uchinchidan, xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish;

to'rtinchidan, transport va muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasini jadal rivojlantirish;

beshinchidan, qishloq joylarda namunaviy loyihalar asosida xususiy uy-joylarni qurish bo'yicha dasturni amalga oshirish;

oltinchidan, aholi bandligini ta'minlash va yangi ish o'rinlarini tashkil qilish muammosini hal etish;

Respublikamiz Prezidentining qator farmonlarida chorvachilikni jadal rivojlantirish, xalqimizning tobora o'sib borayotgan chorva mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirishga alohida e'tibor qaratilgan. CHorvachilik qishloq xo'jaligining etakchi sohalaridan biri bo'lib, aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Bu talabni qondirishda chorva mahsulotlari etishtirishni ko'paytirish katta ahamiyatga ega. CHorva mollari va parrandalardan olinadigan go'ng o'simliklar uchun qimmatli organik o'g'it sifatida foydalaniladi. Hayvonlar arzon to'yimlilik kam bo'lgan o'simlik oziqalarini, kishilar iste'moli uchun zarur bo'lgan qimmatli mahsulot va sanoat uchun kerakli bo'lgan xom ashyoga aylantirib beradi.

Axolini sifatli va arzon chorva oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash dunyo mamalakatlardagi kabi bizning xam mamlakatimizda xam eng dolzarb masalalari xam biri bo'lib turibdi. Mustaqillikka erishganimizdan keyin mamlakatimizda boshqa soxa va tarmoqlar kabi chorvachilikning rivojlanishiga katta e'tibor berilmoqda.

Iqtisodiy isloxlarni tobora chuqurlashtirish asosida chorvachilikni yanada rivojlantirish uchun qator imkoniyatlar yaratilmoqda. Istiqloлга erishgan kunlardan oq agrar sektorning muhim tarmog'i hisoblangan chorvachilikni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilgan. Eng asosiysi sohada bozor munosabatlarini qaror toptirishga qaratilgan iqtisodiy isloxlalar izchillik bilan amalga oshirilib, chorvachilikni barqaror rivojlantirishni xuquqiy asoslari barpo etildi. Bunga misol qilib, Davlat qonunlarini, Prezident farmon va qarorlarini va hukumat Dasturlarini, Vazirlar maxkamasining qator qarorlarini keltirish mumkin. Ayniqsa, bu borada Prezident I.A.Karimov tomonidan "SHaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo'jaliklarida chorva mollarini ko'paytirishni rag'batlantirish chora tadbirlar to'g'risida" gi 2006 yil 23 martda qabul qilingan 308-sonli hamda "SHaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo'jaliklarida chorva mollarini ko'paytirishni rag'batlantirishni kuchaytirish hamda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni

kengaytirish borasidagi qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida” gi 2008 yil 21 aprelda qabul qilingan 842 - sonli qarorlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu qarorlarni joylarda ijrosini ta‘minlash maqsadida, Respublika Vazirlar mahkamasining 2009–2011 yillar davomida chorvachilikni rivojlantirish, qoramollar bosh sonini va sut hamda qoramol go‘шти ishlab chiqarishni ko‘paytirish borasida Respublika Dasturi ishlab chiqildi. Mamlakatda chorvachilik, qoramolchilik, asalarichilik va baliqchilikni rivojlantirishga yo‘naltirilgan qator qarorlar va me‘yoriy xujjatlar qabul qilindi.

SHu sababli qishloq xo‘jaligi doimiy ravishda amalga oshiriladigan iqtisodiy isloxlarni markazida turadi. Barcha iqtisodiy o‘zgarishlarni jarayoni dexqonchilik va chorvachilik sektoriga qancha chuqur ta‘sir etishiga qishloq xo‘jaligi jumladan chorvachilik yuzdan o‘zgaruvchan iqtisodiy isloxlarga muxtoj. Ko‘p bosqichli xo‘jaliklarni tashkil etish xozirgi kunning talabi. Xozirgi davrda fermer xo‘jaliklarini tashkil etish va uni ommaviy tarzda rivojlantirishni mamlakatimizda jadal suratlar bilan olib borilmoqda. Fermer xo‘jaliklari maxsulotini ishlab chiqarish qayta ishlash, saqlash va sotish kabi jarayonlarni o‘z qo‘llariga olishlari xamda xaqiqiy mulk egalari bo‘lishi kerak. Respublikamizda chorva mollarini bosh sonini ko‘paytirish ularning maxsuldorligini oshirish, jaxon andozalaridagi yangi texnologiyalarni joriy etish, chorva maxsulotlarini ishlab chiqarishda dexqon, fermer, ijara kabi ishlab chiqarish usullarini qo‘llab chorvadorlarni mulk egalari deb xis etgan xolda mexnat qilish bilangina chorvachilikni rivojlantirish mumkin.

MAVZUNING DOLZARBLIGI

Qo‘ychilik qadimdan rivojlanib kelayotgan chorvachilikning asosiy tarmoqlaridan biri bo‘lmb IX-X- asirlardan boshlab qo‘ychilikning insonlar o‘z manfaatlari yo‘lida teri, qorako‘l teri, dag‘al, yarim dag‘al, mayin va yarim mayin jun kabi mahsulotlar etishtirish uchun ularni turli xildagi mahsulot yo‘nalishiga mansub zotlarni yaratib, sanoat xom ashyolari va sut kabi oziq ovqat mahsulotlari etishtirishda foydalanib kelmoqda.

Hozirgi kunda respublikamizda qo'ychilik ayniqsa qorako'lchilik oqsoq sohalardan biriga aylanib qolgan. SHuning uchun mamlakatimiz Prezedenti tomonidan chorvachilikni rivojlantirishga qaratilgan 308- 342- qarorlarida qo'ychilikni rivojlantirishga ham alohida e'tibor berilgan. Qo'ychilikni ayniqsa qorako'lchilikni rivojlantirish hozirgi davirdagi dolzarb masalalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Qoraqo'l qo'ylarining bosh sonini ko'paytirish va ularning mahsuldorligini oshirishda qo'zilarni o'sish rivojlanish darajasini yuqori bo'lishini taminlash muhim ahamiyatga ega. Qo'zilarni sog'lom bo'lishi va o'sish rivojlanishining yuqori bo'lishiga ona qo'ylarni bo'g'ozlik davrida to'la qiymatli oziqlantirish ularning o'sish – rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri bo'lib hisoblanadi.

Qo'zilarning o'sish va rivojlanishigaona qo'ylarni bo'g'ozlik davrida to'liq qiymatli oziqlantirishni tashkil etish tug'ilgan qo'zilarni kasalliklarga chidamli,kunlik o'sishining yuqori bo'lishida va iqtisodiy samaradorlikni yuqori bo'lishida katta ahamiyatga ega. Qo'ylarning bo'g'ozlik davri asosan qish oylariga to'g'ri keladi shuning uchunxo'jalikda mustahkam ozuqa bazasini yaratish lozimayniqsa qo'ylarning bo'g'ozligini ikkinchi davrida oziqlantirishga alohida e'tibor berish kerak. Ozuqa zahirasini yaratishda sifatli ozuqa tayyorlash bo'g'oz qo'ylarni to'liq qiymatli oziqlantirishni ta'minlaydi.

Ozuqa bazasini yaratish ham asosiy muammolardan biri bo'lib hisoblanadi. hozirgi davirda qo'ylarni bosh sonini ko'paytirish va mahsuldorligi yuqori bo'lgan guruhlarini tashkil etish dolzarb masalalar bo'lib hisoblanadi. Mahsuldorligi yuqori bo'lgan qo'ylarni ko'paytirish uchun ona qo'ylarning bo'g'ozlik davrida to'la qiymatli oziqlantirishni tashkil etishning ahamiyati katta.

MAVZUNING ILMIY AMALIY AHAMIYATI

CHorvachilikni rivojlantirish mamlakatimiz aholisini go'sht, sut va go'sht – sut mahsulotlari bilan, sanoatni teri, qorako'l teri va jun mahsulotlari bilan ta'minlashda amaliy ahamiyatga ega. Qo'ychilik chorvachilikning asosiy

tarmoqlaridan biri bo'lib, ilmiy asoslangan holda o'tkazilgan tajribalar natijasida rivojlantirib kelinmoqda qo'zilarini o'sish va rivojlanishiga ona qo'ylarni bo'g'ozlik davrida to'liq qiymatli oziqlantirishning iqtisodiy samaradorligi mavzusida bajaradigan ish qorako'lchilikni rivojlantirishda ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega. Qorako'l qo'ylaridan olinadigan qorako'l teri mahsulotiga bo'lgan talab butun jahonda barcha mamlakat xalqlarining etiborini tortadigan antiqa mahsulot bo'lib jahon bozorida o'z o'rnini topgan. Sifatli tabiiy mahsulot bo'lib o'zining rangbarangligi turli xildagi tovlanadigan rangi bilan xammaning e'tiborini tortadi.

Qorako'lchilik nafaqat qorako'l teri etishtirishda bundan tashqari charimbob teri, jun mahsuldorligi bilan ham iqtisodiy samaradorlikga ega bo'lib hisoblanadi. Aholini sut go'sht mahsulotlari bilan ta'minlashda ham eng muhim ahamiyatga molik bo'lgan sohalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Qorako'lchilikni rivojlantirishda ona qo'ylarning bo'g'ozlik davrida ayniqsa bo'g'ozligining ikkinchi davrida tsho'la qiymatli ratsion bilan oziqlantirish homilaning o'sish va rivojlanishini yaxshilash bilan bir qatorda sovliqlarni to'o'andan so'ng sut mahsuldorligini yuqori bo'lishini ta'minlaydi. Bu esa tug'ilgan qo'zilarining kasalliklarga chidamliligi va kunlik o'sishini yuqori bo'lishida katta ahamiyatga ega. SHuning uchun bitiruv malakaviy ishida bajariladigan mavzu hozirgi davirda ilmiy, amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega.

I. ADABIYOTLAR TAHLILI

Qorako‘lchilik chorvachilikning muhim va o‘ziga xos, Respublikamizning og‘ir ekstremal sharoiti bilan xarakterlanadigan cho‘l xududlarida rivojlanib, shu xududlarda samarali foydalanuvchi va ushbu region aholisining sotsial turmush darajasini taminlashda katta ahamiyatga ega bo‘lib, uning asosiy mahsuloti – qorako‘l terilari valyuta manbai hisoblanadi. Bu borada ta’kidlash lozimki, ushbu mahsulot o‘zining rangbarangliklari, gullarning naqshlari, jun tola qoplaminig yuqori sifati jihatidan tangsiz hisoblanadi.

Hayvonlarning alohida- alohida sifatlarining xususiyatlarini yaxshilashi naslchilik ishini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilganiga bog‘liqdir. CHorvachilikda asosiy urchitish metodlari – toza holda urchitish va chatishtirish.

CHorvachilikning tajribasida hayvonlarni uzoq muddatda bir xil sharoitda saqlash bilan yopiq urchitish yomon natijalarga olib kelgani ma’lum.

B.A. Kuznitsov (1955) o‘qtirdiki, “Ulus” sovxozining sovliqlarini “Qorako‘l” naslchilik xo‘jaliklarning qo‘chqorlaridan olingan urug‘ bilan urug‘lantirilganda,

ulardan olingan qo'zilarning hayotchanligi oshib, tirik vazni ko'paygan, teri sathi kengaygan va elita hamda o'rta gulli qo'zilar ko'proq tug'ildi. Agar naslchilik ishi to'g'ri yo'lga qshyilgan bo'lsa, deydi M.A. Koshevoy (1975) yangi raionlarga urchitish uchun keltirilgan qo'ylarni chatishtirishni yaxshilash va mahsuldorligini ba'zi bir tomonlarini oshirish uchun qon quyish yo'li juda yaxshi natijalarni beradi.

P.V. Aralov va V.A. Petrov (1935) ko'rsatadi, eski vaqtda dehqonlar vaqti-vaqti bilan o'z podalariga boshqa joydan keltirilgan qo'chqorlarni qo'shganlar.

Akademik V.M.YUdin va M.I. Kotov (1949) naslli qo'chqorlarni vaqti – vaqti bilan almashtirishga katta ahamiyat berib, shunday usul bilan qorako'l qo'ylarning teri sifatini yaxshilash mumkin deb hisoblaganlar. I.N. Dyachkov (1980) fikricha, keltirilgan qo'chqorlardan shu vaqtda yaxshi olish mumkinki, qochonki ularning o'sgan sharoiti bilan yangi sharoiti o'xshash bo'lsa.

N.S. Giginayshvili (1974) ko'k qorako'l qo'ylarni urchitishda boshqa sharoitda o'stirilgan ko'k qorako'l qo'chqorlardan foydalanish, olingan ko'k qo'zilar hayotchanligini oshiradi, albiniot (oq tanglay) qo'zilarning tug'ilishini kamaytiradi, degan fikrga kelgan.

R.G.Valiev (1964) fikricha, boshqa xo'jaliklardan keltirilgan naslli qo'chqorlar qorako'l terisini sifatini yaxshilashga ijobiy natija berganligini ma'lum qilganlar. Tadqiqotchi o'z oldiga qo'ygan maqsadiga qarab qorako'l terilar yuzasini o'lchashning u yoki bu metodini qo'llanishi mumkin. Qorako'l terilar yuzasining kattaligi xom ashyoning turi va rangiga bog'liq bo'ladi. M.D.Zokirov (1976) agar qora qorako'l terilar yuzasi 100% deb qobul qilinsa, qorako'l – qorako'lcha terilar 87,3% ni, qorako'lcha- 75,6%ni, golyak-60,9% ni va yaxbop terilar 15,2% tashkil qiladi. Ko'k va sur terilar orasida ham xuddi shunday tafovut qayd qilingan. Har xil turdagi terilar yuzasining bunday farqli bo'lishiga sabab ular xomiladan embrional rivojlanishining turli davrlarda va yangi tug'ilgan qo'zilar hayotining dastlabki kunlarida shilib olinishidadir. I.YA.Averyanov va I.M.Ibragimov (1950) yaylov – ozuqa sharoiti va qo'ylarning boqish darajasi ham ayniqsa bug'ozliqning so'nggi davrida terilar kattaligiga va qorako'l mahsulotiga ta'sir ko'rsatadi. Yaxshi yaylovli oziqa sharoitida joylashgan xo'jaliklarda (

Konemex, Nishon, davlat naslchilik zavodi, “CHimqo‘rg‘on” sovxozi) olinayotgan qorako‘l terilar yuzasining kattaligi jihatidan, nisbatan og‘irroq sharoitda joylashgan xo‘jaliklarda (“Jongeldi” naslchilik xo‘jaligi va Karakata savxozi) olinayotgan terilardan 9,2 – 10,3 % afzal ekanligi aniqlandi. SHu bilan birga yaxshi semirgan sovliqlardan semizligi past bo‘lgan sovliqlarning qo‘zilarga nisbatan ancha katta (10 – 12%) teri beradigan yirik qo‘zilar olindi. Teri og‘irligi uning muhim tovar xususiyatlaridan biridir. CHunki ulardan tayyorlanadigan kiyimlar qanchalik engil bo‘lsa, shuncha narxi yuqoridir.

M.I.Kotov (1950) aytishicha, qo‘zilarning tirik vazni ortishi bilan terilarni og‘irligi ham oshib boradi. YAngi shilib olingan terilar og‘irligi yirik vazni katta bo‘lgan qo‘zilarda 18% va maydalarida esa 22% tashkil etadi. Qo‘zilar kattalashgan sari bu nisbat o‘zgardi va bu ko‘rsatgich 6 – 9 % tushub qoladi. YAngi shilib olingan qorako‘l teri og‘irligi uning kengligiga bog‘liq ekanligini I.N.Dyachkov (1966) aniqlagan terisining og‘irligi uning qalinligiga ham bog‘liqdir. Teri qalinligi qancha ortiq bo‘lsa, uning og‘irligi ham shuncha og‘ir bo‘ladi. A.A.Rahimov (1967) ma‘lumotiga ko‘ra teri og‘irligi qo‘zilarning katta – kichikligiga bog‘liqdir. Teri oshlanganda tuz hisobiga uning og‘irligi ortadi, ikki tomondan, teri tuzlangandan so‘ng o‘zidagi og‘irligi ortadi, ikkinchi tomondan, teri tuzlagandan so‘ng o‘zidagi ortiqcha suvni yo‘qotadi va shu hisobdan uning og‘irligi ham kamayadi. Agar yangi shilib olingan teri namligi o‘rtacha 70% ga yaqin bo‘lsa, tuzlangan teri namligi 40 – 50% da quritilib silkitilgandan so‘ng uning namligi 15-18 % dan oshmaydi. I.YA.Averyanov (1941) ma‘lumotiga ko‘ra, terining og‘irligi uning barra tipiga bog‘liqdir. Eng og‘ir terilar, o‘sinqiragan tiplarga xosdir va eng engil terilar qovurg‘asimon – yassi terilardir. Hozirgi vaqtda jahon bozorida yupqa va engil terilarga talab katta. Qorako‘lchilik XX asrning 2 yarmidan keyingi ilmiy izlanishlar juda serqirra, ya‘ni har tomonlama olib borildi. Bulardan eng katta ahamiyatga ega bo‘lganlari rang, rang-tuslari, rangbarangliklarning qanday qilib qancha miqdorda nasldan-naslga o‘tishi, gul turi va shaklining irsiyati va barra tiplarining ro‘yobga chiqishidir.

Gullarning har xilligini 1900 yilda I.V. Sinitsin yozgan bo'lsa, u ham besh turga bo'lib, yassi – halqasimon gulini ham qayd qilgan edi. (I.N.Dyachkov 1980 y). 1905 yilda I.Ivanov yassi to'liqlik gulni va yaloq gulni ham yozadi. V.YA.Demyanenko esa 1912 yili yassi gul deb qo'shdi. 1914 yilda esa akademik M.F. Ivanov bu klassifikatsiyasini ancha kengaytirdi va 1914 yili katta yol gulni ham qo'shdi. Professor I.N.Dyachkov (1980) to 1981 yilgacha yuqorida yozilgan klassifikatsiya qo'llanilgan emas, deb yozgan va 1926 yilda davlat standartida ham gullar to'g'risida noaniqlik bor edi, ya'ni yaltiroq gul mayda gul, xira gul deb qayd etilgan.

Gullarning nomlari aytilishi, qrim terisi merlushka va boshqa terilarda (klam, lyamki) ham bir xil edi.

1933 yili B.N.Vasin qovurg'asimon qalam gulni qo'shdi, keyin esa tor qirrali yolsimon qalami gul, xalqasimon qalami gul deb bo'ldi. (I.N. Dyachkov, R.T. Pismennaya 1951 – 1952 yil, B.A. Kuznitsov 1955 yil, M.D.Zokirov va boshqalar (1983yil) so'ngra esa buralma (ilon izi) taroqsimon qalami gul deb ham qo'shildi. Lekin 1961 yilda barra tiplari deb tasdiqlangan edi.(A.Gaziev va boshqalar 2002 y) ma'lumotiga ko'ra, qorako'l qo'zilarining tug'ilganlaridan keyingi davrida gul ko'rsatgichlari va jun tola qatlami sifati ma'lum o'zgarishlarga uchraydi. Ushbu o'zgarishlar jarayonida ma'lum yosh davrlari oralig'ida gullarning bosqichma – bosqich buzilishi, jun tola qoplami yaltiroq va ipaksimonligining susayish jarayonlari yuz beradi. Korrelyasiya qonunlariga asoslanib T.U. Umrzoqov (1989) yozishicha, har bir organizm bir butun va cheklangan tuzimni tashkil qilib, uning ayrim qismlar orasida yuz beradigan foydali va salbiy o'zgarishlar orasida o'zaro bog'liklik kuzatiladi. P.Fidereen (1975) su'niy va tabiiy tanlov jarayonida organizmning bir qismida bo'ladigan o'zgarishlar, tanlov olib borilayotgan boshqa belgilarda ham ma'lum o'zgarishlarga olib keladi.

R.G.Valiev va F.SH.SHarofidinov (1972) xatti – xarakati, xulki turlicha bo'lgan qo'ylarning mahsuldorlik belgilarida ham o'zgarish to'fovutlar borligini yozganlar. Qorako'lchilik muhim seleksion belgilaridan biri, bu yirik qo'zilar olish ayniqsa qanday naslchilik qo'chqorlardan foydalanishdan, chunki qorako'l

terisining sohasi 1- 3 kunlik qo'zining tirik vazniga bog'liq (I.YA.Averyakov 1966).

Professor I.N.Dyachkov (1960) boshchiligida bir guruh olimlar qorako'l qo'yning gul shakllariga asoslanib seleksiya – naslchilik nazariyasini ilgari surib 1961 yil qorako'lchilik amaliyotiga keng qo'llash uchun tavsiya bergan edi. Akademik V.M.Yudin (1950) gullarning 15-20 kun davomida saqlanishiga e'tibor berib naslli qo'chqorlarni takroriy 15-20 kunligida baholoshni tavsiya etgan edi. I.N. Dyachkov (1966) qora rangli urg'ochi qorako'l qo'zilar 12-15 kunligida takroriy ko'rib chiqib gullar yaxshi saqlanganlarini alohida guruhlariga ajratib super elita suruvi deb nomlashni tavsiya qilgan edi. Qo'zilar 12-15 kunligida qumli cho'l va tog' oldi mintaqalarida har – xilligi aniqlangan va belgining yuqori darajada o'zgaruvchanligini tog' oldi va yarim cho'l xududlarida qayd qilingan. Gullarning saqlanishi va u bilan bog'liq bo'lgan seleksion belgilarning o'zgaruvchanlik darajasi o'rganilib, gullarning keskin buzilish davri 23-30 kunligida ro'y berishi aniqlandi. Bu esa gullari yaxshi saqlanadigan guruhlar yaratilish imkoniyatlari borligidan dalolat beradi. (K.E.Elemesov 1975)

Gullarning buzilish jarayoni ularning jun tolalarning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, gullarning qimmatli, mustahkam, uzun gullar solmog'ini kamaytirish va pasaytirish kuzatilgan. (T.U.Umrzoqov 1989). A.Gaziev (2002) qo'zilar 12-15 kunligida gul ko'rsatgichlarining saqlash darajasi qovurg'asimon va yassi tipli qo'ylarni bir xil juftlash sharoitida yuqori ko'rsatgichlarga ega bo'ldi. Gul qoplaminin saqlanish darajasi “jaket x jaket” juftlash variantida 10-15 kunlikdan 20-30 kunlikgacha 76,1% dan 44,3% gacha pasaysa, bu ko'rsatgichlar “qovurg'asimon x qovurg'asimon” variantida 89,2% va 64,4% ni “yassi x yassi” variantida 84,4 va 58,3% ni tashkil etishi kuzatildi. Oxirgi ikki juftlash variantida gullar uzunligi va mustahkamligi kam o'zgaradi. Ushbu yondoshishda jun tola qoplami sifat ko'rsatgichlarida ham sezilarli o'zgarishlar kuzatilmadi. Olingan natijalar bozor talabidagi (jaket qalin, qovurg'asimon va yassi qalin) keng sathli qorako'l terilar etishtirishni davrlarga qarab 25-30% ko'paytirish imkonini beradi.

Barcha belgilar bo'yicha qo'zilarni tanlashda qumli va shuvoqli – efemerli cho'l sharoitlari uchun optimal muddat 16-22 kunlik, tog' oldi yarim cho'l sharoiti uchun 10-15 kunlik yosh davrlari hisoblanadi. Qimmatli gullar va jun tolasi pigmentatsiyasi bo'yicha qumli va shuvoqli- efemerli cho'l sharoitida qo'zilarni 23-30 kunlik yosh davrida ham samarali tanlash mumkin (A.Gaziev 2002y)

Qorako'l qo'ylar genetikasi o'rganish 20-30 yillarda boshlandi. (B.N.Vasin 1971, A.Arapov, V.Petrov, I.Semenov 1935, B.N. Vasin 1929) qorako'l teri ranglarining klassifikatsiyasini ishlab chiqdi. Keyingi yillarda qorako'l gajaklarining turi va jun qoplaminig xususiyatlarining nasldan – naslga berilishi I.N.Dyachkov (1980), M.A.Koshevoy (1977), R.Valiev (1976) va qator boshqa mualliflar maqollarida o'rgatilgan. Qorako'l qo'ylarni seleksion patensialidan to'loroq foydalanish rezervlar mavjud. Ulardan seleksiya jarayoniga ijodiy yondoshish yo'li bilan qo'ylar mahsuldorligini ancha oshirish mumkin. SHunday yo'llardan biri qorako'l qo'zilarni gullar ko'rsatgichlarini saqlash va o'zgarish darajalarini o'rganish, ularni nasliy xususiyatlarini aniqlashdir. Zotning salohiyatidan to'laroq foydalanib, gul qoplami xususiyatlarini keyingi o'sish jarayonida yaxshi saqlanganlarini tanlash ijobiy natija berishi mumkin. Asl zotli qora qorako'l terisining davlat standarti (O'zRST – 641-95) va qorako'lchilikda naslchilik ishlarini yurgazish qo'llanmasida (2000) qora rangli qorako'l qo'zilarining qalam gullar eniga qarab mayda (tor), o'rta va katta (enli) qalam gullarga bo'linadi. Bunda eni 4mm gacha mayda, 4mm dan ortiq 8mm gacha o'rta va 8mm dan ortiq bo'lganlari katta (keng) qalam gullar guruhiga kiritiladi. K.B. Muxtorov (1971) tomonidan tavsiya qilingan oshlangan qora qorako'l terilarni eksportga jo'natish oldidan navlarga ajratish qo'llanmasida qalam gullar eniga qarab yanada bir necha kichikroq guruhlariga bo'linadi, ularning har bir guruhga tabaqalashtirilgan baho berilgan.

I.N.Dyachkov, R.T.Pismennayalar (1951) har xil turdagi qalam gullarning, eni turliqa bo'lishini qayd qilib o'tganlar. Haddan tashqari keng qalamgullar yassi (14mm gacha) va qovurg'asimon (12 mm gacha) qalamgullarga xos ekanligi ko'rsatilgan. Qo'zilarining va qorako'l terilarning gul o'lchami, shuningdek

qalam gullarning kengligi, avvalo, bo'g'oz sovliqlarning bo'g'ozlik davrida oziqlantirish darajasiga qarab turlicha bo'ladi. I.N.Dyachkovning (1940) yozishicha, qo'zilatish kompaniyasining boshidan oxiriga qarab katta gulli qo'zilar soni ko'payib, mayda va o'rta gulli qo'zilar salmog'i kamayib boradi.

M.A.Koshevoy va boshqalarning (1973) ma'lumotiga ko'ra, oziqa – yaylov sharoiti yaxshi kelgan yillarda, oziqa – yaylov sharoiti noqulay kelgan yillarga nisbatan mayda va o'rta gulli qo'zilar kamayib katta gulli qo'zilar soni ko'payadi. Bunday ma'lumot V.I. YUdin, M.I. Kotov, (1951) tadqiqotlarida ham qayd etilgan. P.Aralov, V.Petrovlar (1935) qo'zilar gul o'lchami, ular ona qornida davrining uzoqligi bilan ham aloqadorligini uqtiradilar. Bu davrning uzayishi katta gulli qo'zilar sonining ko'payishiga olib keladi. V.I.YUdin, M.I.Kotovlarning (1951) ma'lumotiga ko'ra, sovliqlarni beshinchi tug'ishiga qadar katta gullilar soni, har tug'ishi ko'payib boradi. Oltinchi tug'imda qaytadan katta gullilar kamayib, mayda gullilar ko'payadi. I.YA.Averyanov (1951) ning yozishicha, qo'zilar gul ulchami ota – onasining konstitutsiya tiplari bilan aloqadordir. Ko'pol konstitutsiyali qo'ylardan olgan qo'zilar orasida katta gullilar, nozik konstitutsiyali qo'ylarning avlodlari orasida mayda gullilar ko'p uchraydi. Avtorning qayd qilishicha nozik konstitutsiyali qo'ylarning ko'pchiligi (77,7% gacha) mayda gulli, ko'pol konstitutsiyali qo'zilar katta gulli (66,3 % gacha) va mustahkam konstitutsiyalilar o'rta gulli (80,7% gacha) bo'ladi. Bunday ma'lumotlar B.A. Kuznotsov (1955) tadqiqotlarida ham ko'rsatib o'tilgan. M.A.Shirinskiy (1962) ning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, qo'zilar gul o'lchamlari ota – onasining gul o'lchami bilan bog'langandir. Mayda gulli sovliqlarni mayda gulli qo'chqorlar bilan juftlantirilganda, eng ko'p mayda gulli katta gulli qo'chqorlarda esa eng ko'p katta gul qo'zilar olinadi. S.Mamajonovning (1963 – 1964) ta'kidlashicha, qo'ylarning gul o'lchami bilan ularning tirik vazni o'rtasida ijobiy bog'lanish mavjud bo'lib qo'zilar gullari qancha yirik bo'lsa, ularning tirik vazni shuncha yuqori bo'ladi. Turlicha gul o'lchamiga ega bo'lgan

sovliqlardan olingan qo‘zilar tirik vazni, qalamgullarning eni va uzunligi, tolalar uzunligi bir – biridan keskin farq qiladi.

B.N.Vasin va boshqalarning (1971) ma’lumoti bo‘yicha qo‘zilarning gullari yiriklashgan sari ularning tirk vazni va tana o‘lchovlarining xajmi ham ortib boradi. M.A.SHIRINSKIYNING (1970) xulosasi bo‘yicha gul o‘lchami, gul turlari bilan bir qatorda qo‘zilarning muhim seleksion belgilaridan hisoblanadi va undan oqilona foydalanish qorako‘l zotini yanada takomillashtirish va uning mahsulot sifatini oshirish imkonini beradi. Biologik fanning rivojlanishi va undagi qonuniyatlarning ochilishi hayvonlarni ilmiy asosda yo‘lga qo‘yilganligi mahsuldorligini yaxshilashga imkon yaratib beradi. Bu esa o‘z navbatida har xil hayvonlar guruhini, tipini, va hayvon zotlarini yaratishga imkon yaratib beradi. CH.DARVIN o‘zining geneal asarida tashki muhit faktorlari ta’siriga katta ahamiyat berib, shunday deb yozgan edi: “Yashash sharoitida yuz beradigan har qanday, hatto haddan tashkari engil o‘zgarishlar ham ko‘pincha o‘zgaruvchanlikni keltirib chiqarish uchun etarli bo‘ladi”. M.F.Ivanov (1949) ko‘rsatishicha oziqlantirish hayvonlarning tana tuzilishi va mahsuldorligiga katta ta’siri borligini, uning kuzatishicha, yaxshi oziqa bilan oziqlantirilgan qo‘ylardan yomon oziqlantirilgan qo‘ylari nisbatan tug‘ilgan qo‘zilarning tirik vazni 1,2 – 1,6kg ko‘p bo‘lganlar. Professor E.YA.BAGDANOV (1951) o‘zining ilmiy ishlari xulosasida shuni ma’lum qiladilarkim, yosh hayvonlarini to‘yimli oziqalar bilan boqqanda ularni o‘sishi va rivojlanishi jaddalashadi, tirik og‘irligi oshadi, tana tuzilishi yaxshilanadi. Aksincha kam oziqalar bilan yosh hayvonlarni oziqlantirilsa ularning o‘sishi to‘xtaydi, qo‘shimcha o‘sish og‘irligi pasayadi. V.M.YUDIN (1950), I.N.DYACHKOV (1972) va boshqa olimlarning keyingi tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, hayvonlarni boqib va asrash sharoitlari, ayniqsa bug‘ozlik davrining ikkinchi yarimidagi sharoitlar haqiqatda ham qorako‘l terilarning xossalarga muayan darajada ta’sir ko‘rsatar edi.

I.N.DYACHKOV (1980), B.A.KO‘ZIEV (1955) va boshqalarning ma’lumotiga ko‘ra, rivojlanishning dastlabki oylarida embriyonning tashqi dermalari o‘zgaradi va ichki organlari shakllanadi. Xomilaning boshi paydo bshladi, gavdasi va dumi

ajratiladi, oldingi orqa oyoqlari vujudga keladi. I.YA.Averyanov (1961) qo'ylarni boqish va asrash sharoiti ta'sirida qorako'l terining sifati o'zgarishi to'g'risidagi materiallarga asoslanib, qorako'l jingalakligining bosqichma – bosqich rivojlanish to'g'risida gipotezani oldinga so'radi. I.N.Dyachkov (1961) takidlashicha, barra teri beradigan qo'ylarning junlarini jinglakligi mutatsiya natijasidir, qaysikim yo'naltirib tanlash natijasida bu belgi mustahkamlangan va xozirgacha nasldan – naslga berib kelmoqda.

A.A.Rahimov (1967) qorako'l qo'yi eng qadimiy hisoblanib, buning paydo bo'lishiga ming yillar mobaynida, mehnat sarfi natijasida kelib chiqqan qo'zilik vaqtida, chiroyli qingalakka ega bo'lgan qo'ylar kerak bo'lgan buning uchun ko'p asrlar va ming yillar o'tib ketib, shunday qorako'l qo'yi paydo bo'lgan deb tushuntirilgan. Ikki xil jun qoplamiga ega bo'lgan qo'ylarning chatishtirish natijasida yangi jingalakka ega bo'lgan qo'zilar tug'ilib ular asosida qorako'l qo'zilarni paydo bo'lgan, deb B.N. Vasin va boshqalar (1971) tushuntirgan. I.N.Dyachkov, N.V.Nikolskiy, A.P.Vorobevskiy (1972) va boshqalar qorako'l terisini tip asosida seleksiyalash mumkin ekanligiga asoslanib, jingalaklarning har xil formasi va tipi hamda umuman qorako'l teri tiplari genetik tabiatiga ega deb ko'rsatganlar.

V.I.Styanovskaya (1974) ona qo'ylar vaznining 1 kg oshganligi, tug'ilayotgan qo'zilarning vazni o'rtacha 40 gr ga oshganligini aniqlangan. A.A.Rahimov (1972) ma'lumotiga ko'ra, o'rta semizlikdagi bir yashar qozilardan o'rtacha 37,5% ko'proq oriq qo'zilarga nisbatan jun qirqib olindi. O'rtadan yuqori semizlikdagi qo'zilar esa 70,6% dan ziyodroq jun jun berar ekan.

SH.M.Rizaev (1975) o'tkazgan tajribalaridan shunday xulosa qilinganki, 4,5-4,8 kg massaga ega bo'lgan qo'zilarning terisi yuqori sifatli bo'ladi. Chunki ularning terisi katta, terisi qalin, navi yuqori hamda og'ir vaznliekanligi aniqlangan. Markaziy Osiyo viloyatlari qorako'l qo'ychiligi halq xo'jaligi uchun katta ahamiyatga Markaziy Osiyoda juda katta territoriyaga ega bo'lgan dasht va yaylovlar ko'p. Ana shu yaylovlarida tashqi va ichki bozor talabini qondiradigan chiroyli teri beradigan qorako'l qo'ylari urchitiladi. Qorako'l qo'ylari quruq

iqlimga ega bo'lgan dasht va yarim dashtlarda ko'pgina chorvadorlarning xizmati tufayli kelib chiqqan ana shu tariqa yozning eng issiq kunlariga, dashtning suruvlariga ega dag'al oziqalarga moslashib ketgan. Qorako'l qo'ylari boshqa ko'pgina dag'al junli qo'ylardan o'zining ba'zi bir xususiyatlari bilan farq qilib turadi. Boshqa zonalarga moslashgan qo'ylardan qorako'l qo'ylarning farqi shuki, bularning qo'zillardagi jun qoplaminig jingalak bo'lishi va har xil sifatli gullar bilan qoplangan qimmatli terilar berishidir.

A.A.Rahimov (1967) ko'rsatishicha, mayin junli qo'ylar terisining har bir sm^2 satxida 3000 – 8000 gacha jun tolasini joylashgan bo'lsa, dag'al junli qo'ylarda 300 -1600 tacha jun tolasini bo'ladi.

SH.M.Rizaev (1976) ma'lumotiga asosan 1 sm^2 teri satxida nozik konstitutsiyali qo'ylarda tola soni 1600 ta bo'lsa, g'o'zamoyda 1460 ta, oq gulda 1270 ta tola tashkil qilgan ekan. Qorako'lchilikda naslchilik ishlarini yuritishga doir qo'llanmada (2000) qorako'l qo'zilar jun tolasining bo'lgan qo'zilarni katta junlilar 9-11 mm liklarini, o'rtacha 12 mm va undan ortiq uzunlikdagi qo'zilarni uzun junlilar guruhiga kiritish lozimligi belgilagan. B.L.Isoyans (1970) ma'lumotiga ko'ra, qorako'l qo'zilarning jun tolasini ularning turli qismlarida turlicha uzunlikka egadir. Avtorning qayd qilishicha, Qo'zilarning bo'yin qismidagi jun tolasini 19,7 mm , elka ustida 15,8 mm bo'lgan holda sarg'isidagi junning uzunligi 13,2 mm ga tengdir. I.N.Dyachkov (1963) tadqiqotlariga ko'ra, qo'zilarning elka qismidagi jun tolalarning uzunligi ularning sarg'isidagi jun tolasiga nisbatan jaket barra tipida 29,3% kavkaz barra tipida 33,3%, qovurg'asimonda 20,9% va yassidagi qo'zilarida 42,4% ortiqdir. Qorako'l qo'zilarning turli qismlarida jun tolasining turlicha uzunliklarda bo'lishining sababi mazkur qismlardagi tola ko'rsatgichlarning vujudga kelishi va tolalarning teri yuzasiga o'sib chiqish muddatlari turlichadir. B.L.Isoyans (1971), R.G.Valiev, F.SH. SHarofidinov (1972), A.P.Vorobevskiy (1970), I.N.Dyachkov va boshqalarning (1950) tadqiqot natijalariga ko'ra qorako'l xomilasining oldingi qismlarida jun ko'rtaklarining paydo bo'lishi va ulardan jun tolasining o'sib chiqishi, keyingi qismlardagidan 7 – 10 kun avval sodir bo'ladi, bu farq yangi

tug'ilgan qo'zilar jun tolasining uzunligida aks etadi. Jun tolalarning uzunligi qo'zilardagi gullarning o'akli va turi bilan bog'liqligi I.YA.Averyanov (1951), I.N.Dyachkov (1963) va B.L.Isoyans (1970) tadqiqotlarida qayd etilgan. Avtorlarning ta'kidlashicha, eng qisqa tolalardan yol gullar, eng tolalardan xalqa, parma gullar xosil bo'ladi. Eng qimmatli qalam va loviyasimon gullar o'rtacha uzunlikdagi tolalardan xosil bo'ladi.

Qovurg'asimon va yass qalami gullar jun tolasining uzunligi yarim doira qalamigullarnikidan kamroq bo'ladi.

I.N.Dyachkov (1968), S.M. Mamatov (1970), B.L.Isoyans (1971) ma'lumotiga qaraganda, kavkaz barra tipidagi qo'zilarning juntolasi eng uzun, qovurg'asimon va yassi barra tiplarining eng qisqa jaket barra tipidagi qo'zilarning jun tolasini o'rtacha uzunlikka egadir.

I.N.Dyachkov (1980) ma'lumotiga ko'ra, jaket barra tipidagi qo'zilarning ona qornidagi bir sutkalik o'sishi 0,22 mm, kavkaz barra tipidagi qo'zilarniki 0,28mm, qovurg'asimon barra tipidagi qo'zilarning 0,18 mm va yassi barra tipidagi qo'zilarniki 0,19 mmga tengdir. S.M.Mamatovning (1992) kuzatishlariga qaraganda, elita qo'zilarning juni eng qisqa, II klassli qo'zilarning eng uzun va I klassli qo'zilarning jun tolasini o'rtacha uzunlikka egadir. SHuningdek tegishli barra tiplari darajasida mayda gulli qo'zilar eng qisqa katta gulli qo'zilar eng uzun va o'rta gulli qo'zilar o'rta uzunlikdagi jun tolalariga egadir. Bunday ma'lumotlar YA.N.Nurullaev (1980), B.L.Isoyans (1971) tadqiqotlarida ham qayd etilgan.

A.N.Vorobevskiyning (1970) tadqiqotlariga qaraganda, turli barra tipidagi qo'zilarning jun tolasini tug'ilgandan keyin ham turlicha tezlik bilan o'sadi. Kavkaz barra tipidagi qo'zilarning jun tolasini tug'ilgan vaqtida ham 2,5-4,5 oyliklarida ham uzun, qovurg'asimon va yassi barra tipidagi qo'zilarning juni har doim katta bo'ladi. Bunday ma'lumotni M.X.Arslonova (1969) tomonidan ham qayd qilingan.

I.N.Dyachkov (1969) ta'kidlashiga qaraganda, qorako'l qo'zilaridagi jun tolalarning nasldan – naslga o'tuvchi belgilaridandir. YA.Nurullaev, S.Mamatov tomonidan (1977) turli navlarga mansub bo'lgan, qorakshl terilarida jun tolalari

ham turlicha uzunlikda ekanligi qayd qilingan. Qo‘zilarda jun tola uzunligi qumli cho‘l va tog‘ oldi mitaqalarida har xilligi aniqlandi va bu belgining yuqori darajada o‘zgaruvchanligi tog‘ oldi yarim cho‘l xududlarida qayd etildi. (I.N.Dyachkov 1980). Ajab emaski, ming yillar oldin ham bunyodkor ajdodlarimiz bu ztoning yaratishda odamlarni ma’naviy talabini qodirishni o‘ylagan bo‘lsa.

YAngi zavod tiplari va liniyalarni yaratish qo‘chqorlarning nasl sifatini tekshirish, qimmatli genofondlarni asrash, naslli manbalardan unumli foydalanish, urchitish mavsumiga aniqliklar kiritish va o‘zgarish, qochirish muddatlarini qisqartirish va yuqori sifatli qo‘chqorlar urug‘i bilan otalantirish xissalarini oshirish, qo‘zilarni asrash va bepushtlikning oldini olishdek masalalar turibdi. Hozirgi vaqtda ixtisoslashtirishni hisobga olmay, naslchilik ishlari xizmatlarini xabardor qilmay xo‘jaliklaroro naslli qo‘chqorlar almashtirish avj olib ketmoqda, talabdan ortiq qo‘chqorlarni o‘stirishga qoldirish va ularni xo‘jalikda noma’lum muddat saqlanishi, poda sturukturasi buzilishiga va ishlab chiqarish samaradorligini pasayishiga olib kelmoqda. Qorako‘lchilikda erishilgan yutuqlarning hozirgi darajasi umuman olganda mahsulot sifatini yaxshilash, uning assortimentini kengaytirsh, qo‘ylarning nasliy va mahsuldorlik patensiallaridan unumli foydalanish, hamda boshqa muammolar ma’lum darajada echilgan, lekin qorako‘l qo‘ylarni maxsuldorlik imkoniyatlaridan ham oxirigacha foydalanmagan. Bu borada qorako‘l va qo‘y terilarni sathini oshirish imkoniyatlari mavjud. SHu yo‘nalishlar bo‘yicha seleksiya va naslchilik ishlarini ilmiy izlanishlar olib borish qorako‘l qo‘ylaridan to‘laroq foydalanish imkoniyatlarni berishi mumkin.

S.I.Kedrova (1967) yozgan edi. “ Bug‘ozlik davrida barcha xil qorako‘l tipidagi sovliqlarni tirik vazni to yanvar oyigacha sezilarli darajada oshib bordi. Sovuq tushib, yog‘ingarchilik boshlanib, yaylov ozuqasining sifati yomonlashgandan keyin qo‘ylar, ayniqsa yassi va qovurg‘asimon tipidagi sovliqlar ancha oriqlash holidi” degan edi. M.D.Zokirov va SH.SH.SHirinbaev (1983) tajriba o‘tkazib quydagi ma’lumotlarni olganlar. Jaket va qovurg‘asimon tipidagi urg‘ochi qo‘zilar yangi tug‘ilganda rivojlanishi va tirik vazni jihatdan

oʻrtacha (oralik) oʻrmini egalladilar ($3,85 \pm 0,21$ va $3,67 \pm 0,14$ kg), kavkaz tipdagi qoʻzilar ularga nisbatan yirikroq ($4,12 \pm 0,19$ kg), yassi tipdagi qoʻzilar esa ushoq ($3,15 \pm 0,12$ kg) boʻlib chiqdi. Yirik jingalakli jaket tipdagi urgʻochi qoʻzilar rivojlanishi va tirik vazni jihatdan nisbatan oʻrtacha ($4,21 \pm 0,17$ kg). Kavkaz tipdagi qoʻzilar yirik jingalaklisi ($4,51 \pm 0,21$ kg), qovurgʻasimon tipdagi qoʻzilar oʻrtacha ($4,08 \pm 0,14$ kg) va yassi tipdagi ushoq ($3,87 \pm 0,13$ kg) boʻlib chiqdi, bu maʼlumotlar statistik jihatdan ishonchlidir.

P.N.Kulishov (1951) biror belgi boʻyicha deb yozgan edi sistemali ravishda bir xil tanlash va saralash turli vaqtlar bilan irga qoʻshilib mazkur hayvonlar naslini, ularning oʻzi bosib oʻtgan yoʻnalishda oʻzgarishga majbur etuvchi asosiy sabablaridan biri boʻlib xizmat qiladi. U fenotip boʻyicha tanlashning samaradorligi fenotipiga koʻra yaxshi hisoblangan hayvonlar orasida yaxshi genotiplar ancha koʻp uchraydi, degan tasavvurga asoslanadi.

M.F.Ivanov (1964) tajribasiga keltiruvchi “eng yaxshi genotiplarini eng yaxshi fenotiplar orasidan izlash kerak” deb tavsiya etgan. Qoniqarsiz boqish va asrash sharoitida oʻstirilgan hayvonlar orasida yaxshi irsiy nishonalarga ega boʻlganlari kam uchraydi. Fenotip koʻpincha genotipiga mos kelmasligining sababi hayvonlarning yaxshi boqilmasligidadir. M.F.Ivanov (1949) shunday deb yozgan edi. “ U yoki bu sifatlar boʻyicha juda yaxshi irsiy sifatlarga ega boʻlgan hayvonlarni koʻpincha boqish, asrash, parvarish qilish vaboshqa sharoit yomon boʻlganligi sababli oʻz sifatlarini yuzaga chiqaraolmaydi va shuning uchun ular yomon irsiy nishonalarga ega boʻlgan, ammo yaxshi boqilgan va asraladigan hayvonlarga nisbatan zaifroq koʻrinishga ega boʻlishi mumin”.

CH. Darwin tabiiy sharoitda eng yaxshi individlar yashash uchun kurashadigan yashovchanlik belgisiga qarab tanlanadi,deb koʻrsatgan edi. Tashqi muhitga eng yaxshi moslashgan hayvonlar yashovchanroq (chidamliroq) boʻlib chiqadi. Suʼniy tanlash esa xoʻjalik uchun foydali belgilariga qarab amalga oshiriladi, ammo bundan xonaki qoʻylarni urchitishda tabiiy tanlanishning xech qanday ahamiyati yoʻq, degan maʼno kelib chiqmaydi. Maʼlumki, tabiiy tanlanish natijasida qoʻylarda turli belgilar oʻrtasida korreletsiya- bogʻlanish (munosabat)

rivojlanadi. Ushbu munosabatlar keskin buzilgan taqdirda hayvonning rivojlanishida normadan chetlashish sodir bo'lishi va yashashga noqobil organizm vujudga kelishi mumkin. Tabiiy tanlanish normal rivojlangan, yashashga qobiliyatli mazkur ekologik sharoitga yaxshi moslashgan qo'zilar vujudga kelishi va yashab ketishiga yordam beradi. Tabiiy tanlanish su'niy tanlash bilan birgalikda ekologik konstitutsional va zavod tiplarining vujudga kelishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Su'niy tanlash hayvonga ta'sir ko'rsatish va yangi formalar yaratishning qudratli vositasidir. Tanlash qaysi yo'nalishda olib borilsa, xuddi shu yo'nalishda zarur mahsulotlariga va xo'jalik biologik xossalariga ega bo'lgan hayvonlar vujudga keladi. Tanlash juda katta kuchga ega. Qorako'lshunosning sa'nati seleksiya qilinayotgan qo'ylar guruppasidagi hayvonlar organizmida yuzaga kelgan eng kichik o'zgarishlarni ham payqab olishdan iborat. Bu metodik tanlash jarayonida yangi naslda eng qimmatli xossalar va belgilarini to'plab, kuchaytirib hamda mustahkamlab borishi, yuqori mahsuldorlik sifatlari bilan ular qilinadigan liniyalar, oilalar, podalarni vujudga keltirishga kerak bo'ladi. Har qanday xo'jalik –biologik belgining o'zgarishi - bu ajralgan alohida hodisa emas, u o'zgargan xossalar bilan korrelyativ munosabatida bo'lgan belgilarning ham muqarrar sur'atda o'zgarishga olib keladi. Nisbiy o'zgaruvchanlik qonuni seleksiyalar uchun tanlashning asosi bo'lib xizmat qiladi. SHuning uchun ekstereri – konstitutsional va mahsuldorlik belgilariga qarab tanlash sun'iy urug'lashda ishga metodik yondoshish birligini tashkil qiladi. Ammo muttasil ravishda bir yoqlama, boshqa belgilarni hisobga olmay, faqat maxsuldorlik belgisi asosida tanlash qo'ylarning yomonlashuviga kelishi, ularning konstitutsiyasi va sog'ligini zayflashtirish mumkin (Valiev R.G. 1986)

Irsiylanish (nasldan – naslga o'tish) genetik tafovutlar bilan bog'lik bo'lgan umumiy fenotipik o'zgaruvchanlikning ulushini ifodalaydi. Belgining irsiylanish koeffitsienti qancha past bo'lsa, tanlash samaradorligi shuncha yuqori bo'ladi. Belgilarning irsiylanish koeffitsienti (X.F.Kushner 1979 bo'yicha) birining ulushlari, quydagicha bo'ladi: bir yoshlik chog'idagi tirik vazni -0,40 -0,61; toza jun qirqilish – 0,38 junning mayinligi -0,57, junning mayinlik bo'yicha muvozanati

(bir notekisligi) $-0,43$ bunday tiplarning asosiy nasliy koeffitsienti esa $-0,22$ teng bo'ladi degan edi.

O'zsifatlarini nasliga yaxshi o'tkazadigan yukori mahsuldor nasldor qo'chqorlardan doimiy foydalanish bilan birga sun'iy urug'lantirishni keng qo'llash podaning nasldorlik sifatlarini qisqa muddat ichida ancha yaxshilash va mahsuldorligini oshirish imkonini beradi. (A.A.Rahimov 1967). Qorako'lchilikda nasldor qo'chqorlarni tanlash samaradorligini V.M.YUdinva boshqalar (1964) tomonidan yaxshi ko'rsatilgan.

V.M.YUdin qorako'l qo'ylarini saralashda uchta zavod qoidasiga amal qilgan:

Birinchi qoida: "O'xshash o'xshash bilan qo'shib, o'xshash beradi" yoki "yaxshi bilan yaxshi qo'shib, yaxshi beradi" ushbu qoidaga muvofiq, qo'zilik chog'idagi bonitirovka ma'lumotlariga, katta yoshidagi rivojlanishi, konstitutsiyasi va ekster'eriga, shuningdek, naslining sifatiga ko'ra eng yaxshi hisoblangan qo'chqorlar uchun normal darajada rivojlangan, lekin kelishilgan jussali va mustahkamlash konstitutsiyasi eng yaxshi elita va birinchi klass sovliqlar saralab olinadi. Juftlar bir xillab – gomogen saralanganda sifatli nasl ko'p olinadi.

Ikkinchi qoidasi: "Yomon yaxshi bilan qo'shilsa yaxshilanadi" ushbu qoidaga muvofiq, yomon sifat va barcha xossalarga yoki nomatlub belgilarga ega bo'lgan (masalan, rivojlanishi, gavda tuzilishi, konstitutsiya tipi tug'ilgan vaqtida yoki qancha yoshida yomon bo'lgan) qo'ylar etuklik paytida normal rivojlangan, kelishgan jussasi, mustahkam konstitutsiyali, yuqori sifatli nasl bergan elita yoki klass qo'chqorlardan qochiriladi. Shunday qilib, sifatsiz yoki unga qimmatli bo'lmagan sovliqlar urchitish uchun qabul qilingan tipdagi sifatli qo'chqorlardan qochiriladi. Bunday saralash doimo olinadigan naslning yaxshilash shunga olib keladi.

Uchinchi qoida: "Notekis notekis bilan qo'shib, tekislashadi". Ushbu qoidaga muvofiq, shunday taxmin qilinadi, nozik konstitutsiyali qo'ylarni mustahkam konstitutsiyali qo'ylar bilan juftlashtirish tekislashgan (o'rtacha) mustahkamlash tipiga yaqin qo'zilar olishga olib kelar ekan. Ammo bunday

saralashda xamisha ko‘zlangan maqsadga erishilaverilmaydi nuqsonli qo‘zilar soni ortib boradi. SHuning uchun gap jingalaklarni yirik – maydaligi to‘g‘risida borganda V.M.YUdin (1951) shu usuli qo‘llanish lozimligini ta’kidlagan. Ma’lumki, yangi tug‘ilgan qo‘zilar jingalakligi yirik – maydaligi ularning rivojlanishi darajasi, konstitutsiyasi va barra xossalari bilan bog‘liq bo‘ladi. SHu sabab jingalaklarning mayda yoki yirik tomonga o‘zgarishi o‘rtacha jingalaklikka nisbatan ko‘proq xodisa deb hisoblanadi. SHuning uchun mayda va yirik jingalakni sovliqlarga o‘rtacha jingalakli qo‘chqorlarni saralab qo‘shish har ikkita holda ham o‘rtacha jingalakni qo‘zilar soni ko‘p bo‘lishiga olib keladi. Qorako‘lchilikda naslchilik ishini yaxshilashdagi vazifa asosiy mahsulot hisoblangan qorako‘l teri etishtirishni ko‘paytirishni teri sifatini tobora yaxshilash, va zotni tobora takomillashtirish, ayniqsa qora rangdagi yarim doirali gul jingalaklik jaket nav teri etishtirish maqsadida qo‘ylarning qorako‘l zotini tobora takomillashtirishdan iborat. Naslchilik ishlari natijasida qorako‘l terilarning sifatini yaxshilash bilan birga asl zotli, yashash sharoitiga moslashgan qorako‘l qo‘ylarning sonini ko‘paytirish lozim. Qorako‘lchilikda nasllik ishlarida tanlash va juftlash usullarini etuk mollarni boqish va asrash, qo‘zilarni to‘g‘ri parvarish qilish hamda naslli qo‘chqorlarni talabga javob berarlik darajada va etarli miqdorda ko‘paytirish vazifalari bilan bir-biriga bog‘lab olib borilishiga kerak. Qorako‘l terining a‘lo sifatini, jingalaklarining o‘rtacha va mayda gullarini, terisining zichligini va yupqaligini saqlash bilan bir qotorda uning satxini kattalashtirish ham naslchilik ishining muhim vazifalaridandir. Bu ishga avvalo seleksiya va naslchilik ishidanki, shuningdek zavod tipidagi qo‘ylardan to‘g‘ri foydalanish orqali erishiladi. Xo‘jalik boshqarish usullarini takomilashishi va dunyo bozori talabining o‘ssishi bilan qorako‘l zoti bilan olib boriladigan nasl ishlari metodikasining takomillashiga va o‘zgarishga olib keladi.

Birinchi marta qorako‘lchilikda ilmiy asosda ishlarni yuritish sistemasini qorako‘l qo‘zilarning gul o‘lchamlarini va klasslarini xisobga olgan holda olimlaridan M.F.Ivanov (1964) va V.M.YUdin (1933) zootexnika klassifikatsiyani ishlab chiqdilar. SHu borada dunyo bozorining ma’lum

kelajagida qorako'l zotini takomillashtirish, tanlash va saralashning yangi metodlarini ishlab chiqarishni talab qildi. Bu metodik ishlab chiqarishda qalam gullarning tipi va formasi hisobga olinib, asosiy ko'rsatgich qilib terilarning tovar qiymati olindi.

V.M.Yudin (1943), I.N.Dyachkov va R.T.Pismennaya (1951) I.N.Dyachkov va boshqalar (1960) tomonidan yangi tug'ilgan qo'zilarning barra tiplari bo'yicha klassifikatsiyasi ishlab chiqildi. Qorako'l qo'zilar ni jaket, yassi, qovurg'asimon va o'sinqiragan barra tiplariga bo'linishi o'zini oqladi, qorako'l qo'ylar ustida olil boriladigan nasl ishlarining yo'nalishini belgilab berdi. Teridagi jingalaklarning ma'lum shakllari gullariga, ularning qo'zi terisida joylashishiga qarab qora rangli qorako'l qo'ylari to'rt xil barra tipga bo'linadi. Terisidagi jingalaklari yarim doira shaklida bo'lgan tipdagi (jaket tipli) qo'zilar, ularning terisida yarim doira o'aklda qalam va dona gullar mavjud bo'lib, terisi yupqa va qalinlashgan zich, jun qoplami quyuk, ipaksimon yaltiroq va jingalaklari baquvvat. Bu tipli qo'zilar ko'pgina yaxshi etilgan, konstitutsiyasi mustahkam, teri zonasi ko'p va terisi mayin bo'ladi. Jingalaklarning ochilishi boshqa tomonga qaragan bo'ladi, qalam gullari uzun va o'rtacha uzunlikdagi tashqi ko'rinishi aniq guldor bo'ladi. Utipli qo'zilar zotning etakchi xildir va bu qo'ylarni qora rangli teri etishtiruvchi barcha qorako'lchilik xo'jaliklari keng miqyosida urchitishlari lozim.

Terisidagi jingalaklari o'sinqiragan tipdagi qo'zilar (kavkaz tipi) ularning jun uzunligi birmuncha o'sinqiragan, jingalaklari ko'pgina bo'sh dona gulsimon ulakdor etiluvchan emas va notekis joylashgan. Qo'zilar ning konstitutsichsi ko'pol. Bu guruhga kiradigan qo'zilar odatda kam boholik teri beradigan va yarim doira shakldagi qalam gulli mustahkam yoki nozik konstitutsiyali qo'ylar bilan urchitilib yaxshilanishi lozim.

Terisidagi jingalaklari yassi bshlgan tipdagi qo'zilar (ploskiy tip) yassi aylanma gulli, qisman chappa va yassi gullari bilan xarakterlanadi. Ammo ipaksimonligi a'lo darajada, jun qoplami yaltiroqligi juda kuchli, terisi yupqa va zich bo'ladi. Terisining xususiyati yassi 1 – navli qo'zilar ning eng yaxshi xiliga to'g'ri keladigan qo'ylarni ma'lum maqsad bilan urchitish ham talabga

muofiqdir qovurg'asimon shaklda bo'lgan tipdagi qo'zilar terisidagi jingalaklari qovurg'asimon shaklda bo'lgan qalam gullar, chappa va yassi gullarning aralash bo'lishi bilan xarakterlanadi. Bularning jun qoplami qisqa, ipaksimon etarli darajada emas, quruq junlardan iborat bularning terisida ba'zan shaklsiz gullar ham bo'ladi. Ba'zan qo'zilarining terisi fakat chappa va yassi gullardan iborat. Jingalaklarning ochilishi ko'pincha dum tomoniga bo'ladi. Qorako'l zotining ichida sifatli guruhlarining bo'lishi bu zotni yanada takomillashtirish uchun sharoiti yaratib beradi. Qorako'l eoti odatda toza holda urchitiladi. Ammo uzoq muddati bir zotning o'z ichida urchitish olib borilsa bu zotning mahsuldorligi pasayib ketadi. Buning tuzatish uchun boo'qa sharoitda tarbiyalangan naslli qo'chqorlardan foydalaniladi. Qorako'lchilikda ham ularning barra teri takomillashtirish uchun boshqa podada o'stirilgan qo'chqorlar keltirilib ularning urug'i bilan mahalliy sovliqlar qochiriladi.

M.F.Ivanov (1964) qayd etadiki, podaning qonini tozolash uchun vaqt – vaqti bilan “boshqa xo'jaliklardan qo'chqorlar keltirib foylanish kerak”.

N.F. Nikolskiy (1952) o'zining tajribasida ko'rsatadiki, xar xil sharoitda o'stirilgan qo'chqorlardan foydalanish yaxshi natija beradi. I.YA.Averyanov (1951) qayd qiladiki, “boshqa xo'jalikdan qo'chqorlardan foydalanish shu vaqtda yaxshi natija beradiki, juftlanayotganda hayvonlarning xo'jaliklarida yaylov oziq sharoti bir xil bo'lsa. S.M.Bulagov(1969) yozadiki, “Muborak” va “Nishon” davlat naslchilik zavodlarining naslli qo'chqorlaridan “O'zbekiston” davlat naslchilik zavodida foydalanish yuqori sifatli terilarni ko'proq ishlab chiqarishga imkon beradi. A.K.Lebedov (1976) ma'lumotiga ko'ra, “Gagarin” nomli davlat naslchilik zavodining sur rangli qo'zilar “Forish” savxozida ishlab chiqariladigan terining sifati yaxshilashda ijobiy ta'siri etganini qayd etgan. Terilarda jun qoplaminig ipaksimonligi, yatiroqligi gullari yaxshilanib, qalam gullar uzunlashgan.

SH.M.Rizaev (1972) qayt etadiki, “Qorko'l terisining sifatini yaxshilashda asosiy yo'llardan biri boshqa xo'jalikdan biri boshqa xo'jalikdan naslli qo'chqor keltirish va xshjaliklar aro qshchqorlar almashtirishdir”. Boshqa xo'jalikdan keltirilgan qo'chqorlardan muvaqqiyatli ravishda foydalanilgan to'g'risida

ma'lumotlarga A.A.Rahimov (1973) o'z ishida ko'rsatib o'tadi. N.S.Gigineyshvili (1976) fikricha, qora qorako'lchilik xo'jaliklarida ko'k rangli qorako'l qo'ylarini urchitishda xo'jaliklar ora qo'chqor almashtirishni keng qo'llash kerak. Boshqa xo'jaliklarning qo'chqorlaridan effektli ravishda foydalanish to'g'risidagi ma'lumotlarni B.N.Vasin va boshqalar (1971), A.A.Rahimov (1967) va boshqalar o'z ishlarida ko'rsatib o'tganlar.

“G'o'zor” davlat naslchilik zavodiga “Nishon” davlat naslchilik zavodidan qora rangli qo'chqorlarni keltirib, ko'k rangli sovliqlar bilan juftlaganda ikki yil tajriba davomida maxaliy qo'chqorlar nasliga 15,2% elita va 12,2% birinchi klass qo'zilar ko'proq olingan. (M.A.Koshvoy va YA.N.Nurillaev 1970), N.V.Borinova(1948), O.G.Valiev (1948), M.M.Rizaev(1969) lar ko'rsatadiki, qora rangli qorako'l qo'ylarining sifatini yaxshilashda boo'qa yuqori mahsuldorli podalarning qo'chqorlaridan foydalanish kerak. Qorako'lchilikda naslchilik ishlarining yurgazish va qo'zilarni baholash (bonitirovka qilish) bo'yicha qo'llanmasida (2000) naslchilik ishining vazifasi va rejaga muvofiq naslchilik xo'jaliklaridan qo'chqorlar keltirish tajribasini qo'llash tavsiya etiladi. YUqorida keltirilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki naslchilik ishini to'g'ri yo'lga qo'yganda naslchilik xo'jaliklardan foydalanish qorako'l qo'ylarining mahsuldorligini takomillashtirishda asosiy zootexnika tadbirlaridan biridir. Afrika naslchilik ishi olib boradigan nemis olimlari ham gul uzunligini o'rganish, gul to'ri, shakli va barra tiplari bilan aloqadorligini aniqlaganlar. X.E.Matterning (1967) ma'lumotiga ko'ra, gul eni bilan jun uzunligi orasidagi bog'lanish koeffitsienti $Z=0,524$ ga teng. SHunday qilib, qorako'lchilikda o'zora mustaqil bo'lgan to'rtta barra tipborligi tan olindi va 1961yildagi “qorako'l qo'zilarni bonitirovka qilish” va naslchilik ishining asoslari qo'llanmasiga” kiritildi. Lekin bu ham fakat qora rangli toza zotli qorako'l qo'zilarga ta'luqli edi. SHu qo'llanmaning 1967 yildagiga esa olib borilgan tanlash va juftlash tajribalarning natijalari xam qo'shildi, hamda toza zotli ko'k va sur qorako'l qo'zilarni ham barra tiplarga bo'linadigan bo'ldi.

1974 – 1989 yillarda esa bonitirovkaning qo‘lanmasi qayta ishlab to‘ldirildi va qo‘zilar elita I va II klasslarga bo‘linadigan bo‘ldi. Sur rangli qo‘zilarga en solishda “ Buhoro, Qoraqolpoq va Surxondaryo zot tiplariga alohida ko‘rsatma – chizma ilova qilindi. 1967 yildagi instruksiyada yassi barra tipdagi qo‘zilarning kuchli ipaksimon va kuchli yaltiroqlikka ega bo‘lganlari alohida urchitishga, qovurg‘asimon barratipli qo‘zilar esa maqsadga muvofiq emas deb, jaket tipli qo‘chqorlar bilan yaxshilanishi ko‘zda tutilgan edi, yassi bilan qovurg‘asimon tipli qo‘zilarni alohida suruv qilish tavsiya etildi. Bunday qilish ham suruvni tozalashda yaxshi jaket tipini qilishiga imkon yaratar va yassi bilan qovurg‘asimon tipni zotni takomillashtirishda ishlatishga imkon berar edi. SHu davrda johon bozorida yassi yupqa -1, qavurg‘asimon-1, navli terilar narhi jaket 1 navga yaqinlashib qolgan edi. 1989yilda siqarilgan (Moskva1989) naslchilik ishining qo‘llanmasida qorako‘l qo‘zilar tana jun uzunligiga qarab bo‘linadi kalta 8mm, o‘rta 9-11mm va uzun 12mmdan ziyod.

Qorako‘lchilikda jun tola uzunligi ko‘pgina omillarga bog‘liq asosan yaylov sharoitiga qaraydi. Bu esa yaylovlarda hosildorlik juda o‘zgaruvchan (S.YU.YUusupov va I.X.Ro‘zimurotov1995) Respublikamizda etishtirilayotgan qorako‘l terilari nafakat rang va navi bilan hatto ko‘pi xilma – xilligi bilan ham farq qiladi. Ana shunday xilma – xil bo‘lishida jun qoplamining pingmetatsiyasiga bog‘liqdir. Pingmentatsiyasi 3ta guruhga bo‘linadi.

1. Tim qora.
2. Qora.
3. Qorasi etarsiz.

Bular ichida tim qora rangigi ega bo‘lganlari juda qimmatli hisoblanib, ular o‘zining tabiiy rangini juda uzoq muddatga o‘zgartirmay saqlab turadi. Qorasi etarsiz jun qoplamiga ega bo‘lgan qo‘zilar kam qimmatli hisoblanadi va ularning rangi tez o‘rganib ketadi. Terilar jun qoplamini rangining och – to‘qligi, tolalar tarkibidagi maxsus modda pingmentlarning miqdoriga bog‘liqdir. Qorako‘l terisidagi jun tolasi rang beruvchi pingmentlar oqsillar turiga kiruvchi meznin moddasidan iborat. Qorako‘l qo‘zilar jun qoplamida pingmentlarning paydo

bo'lishi jaryonini birinchi marta I.X.Maqsudov (1935) va F.A.Turdakovlar (1936) ta'riflab bergan edi. Avtorlarning yaqinlashiga qora rangdagi qo'zilarning terisida dastlabki pingmetlar uchunchi oyda vujudga kela boshlarkan. N.P.Ropdugina (1963) qo'zilarning jun qoplaminig tarkibida ikki yani donador va erigan pigment (melanin) mavjudligini tasdiqladi. Bu pigmentlar turli rangdagi qo'zilardan har xil miqdorda va nisbatda uchraydi. M.X.Arslonovning (1969) tekshirish natijalari shuni kursatadigan qo'zining turli qismlaridagi tolasida shuningdek tolaning turli qismlarida mellanning miqdori har xil bo'ladi. Eng ko'p melanin tola piyozchasining tarkibida mavjud ekanligi aniqlangan. Avtor ma'lumotiga ko'ra turli barra tipdagi qo'zilar jun qoplaminig tarkibida melanin miqdori turlicha bo'ladi. Jaket barra tipdagi qo'zilar junning tarkibida 16,9% melanin bo'lganligi holda, yassi barra tipdagi qo'zilarnikida esa 16,6% tashkil qiladi. Qavurg'asimon barra tipdagi 16,0 %ni tashkil qiladi va kavkaz barra tipdagi qo'zilarnikida 15,8% ni tashkil qiladi.

A.I.Inoyatov (1986) ma'lumotiga qaraganda, tim qora qo'zilar jun jun tarkibida 14,6% melanin mavjud bo'lsa, o'rtacha qoralarnikida 13,5% va qorasi etarsiz qo'zilarnikida 12,5% melanin bor ekan. Qorako'l qo'zilarning klasslari va navlari qancha yuqori bo'lsa ular rangining to'qligi ham o'uncha yuqori bo'ladi. A.I.Inayatov (1979) taqidlashiga ko'ra, qora rangda qo'zilar jun tolasining tarkibidagi melanin miqdori ota – onasining rangiga qarab ham turlicha bo'lishi mumkin. Masalan: qora rangdagi va qo'chqordan olingan qora qo'zilar jun tolasining tarkibida 10,9% melanin mavjud bo'lgan, xolda qora sovlik bilan sur qo'chqorni juflashtirish natijasida olingan qora qo'zilarniki 10,6% ota – onasi tilla sur bo'lgan qora qo'zilar juni tarkibi 7,6% melanin bor. Qora qo'zilarga nisbatan rangdor qo'zilar jun melanin tarkibida melanin ancha kam bo'ladi.

Masalan: qora rangdor sovliq qo'chqorlardan olingan qora qo'zilar junida pigmentlar miqdori 100% deb olsak, sur qo'zilarning jun tolasidagi melanin miqdori 50% ni, jigar rang qo'zilarjunidagi 38,0% va guligaz qo'zilarning junidagi pigment 32,0% ni tashkil etadi.

Qorako'lichilikda naslchilik ishlarini yurgazish va qo'zilar baholash (bonitirovka qilish) bo'yicha qo'llanma (2000) va terilarni tovar xususiyatlarini o'rganish (O'zRST 041-95) talablari asosida qora qo'zilar va terilarni och to'qligiga katta e'tibor berilgan.

Instruksiya muvofiq to'q qora qo'zilar va terilar 10 ball, o'rtacha qora qo'zilar va terilar 6 ball va och qora qo'zilar va terilar 3 ball bilan baholoshi muhimligi ko'rsatilgan.

Qorako'l qo'zilar terisi sanoatda bo'yash yo'li bilan to'q qora rangga aylantiriladi. Biroz qora qorako'l qo'zilar jun qoplami rangining och to'qligi ularning biologik xususiyatlari bilan bog'langan bo'lganligi tufayli teri sifatiga ham ta'sir ko'rsatadi. V.I.Setyanovskayaning (1960) ta'kidlashiga qo'zilar rangi, organizmning sog'lomligi, konstitutsiyasi va xayot faoliyatini ko'rsatuvchi o'ziga xos belgi (indikator) dir.

Zot ichida (xududiy) tip – Aniq xo'jalik va tabiiy sharoitda odamlarning ijodiy faoliyati natijasida yaratilgan qorako'l qo'y zotining guruhi hisoblanib, uzotning umumiy xususiyatlari bilan bir qatorda o'ziga xos mahsuldorlik, tana tuzilishi, konstitutsiyasi, urchitish xududiga moslashish, kasallik va tashqi muhit ta'siriga chidamli, yuqori samara berish xususiyatlari bilan xarakterlanadi.

Zavod tipi – naslchilik zavodi, naslchilik xo'jaligi va ularning ta'siri doirasidagi xo'jaliklarda seleksiyalarning uzoq muddatli ijodiy faoliyati natijasida liniyalari urchitish va ularning klasslarini moslashtirish natijasida yaratilgan qorako'l zotining chegaralangan guruhi bo'lib, u o'z spetsifik morfologik, fizologik, mahsuldorlik xususiyatlarini, ma'lum xo'jaliklarda urchitiladigan qo'ylarga ham xo'jalik boy belgilarni mujassamlashtirilgan yangi tip hisoblanadi. Zavod tipi - yangiligi, farqlanish, o'xshashligi va turg'unligi bilan xarakterlanilozim. (X.Giyosov va boshqalar 2001.).

Qora qorako'l terilarining navlari gullarning shakli va xili uzunligi yoki teri to'qmasining qalinligiga qarab qora qorako'l terilar barra (qalam – jaket, qovurg'asimon, yassi va o'sikgul) va navlarga bo'linadi (O'zRST 641-95).

Seleksiya samaradorligiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillardan biri belgilarning naslga beriluvchanligidir. Naslga beriluvchanlik koeffitsienti yaxshi yo'lga qo'yilgan seleksiya sharoitda, qanchalik yuqori bo'lsa seleksiya samarasi ham shunga yuqori bo'ladi va aksincha, belgilarning naslga beriluvchanlik koeffitsienti past bo'lgan sharoitda maqsadli seleksiya samarasiga etish qiyin. Tadqiqotlarning natijalari ko'rsatishcha, kelib chiqishi ma'lum naslga kuchli beriladigan eksterer, konstitutsiya, mahsuldorlik va boshqa ko'rsatgichlar bo'yicha o'xshash seleksiya yutug'ini yaratish rejasi talablariga javob beradigan etarli miqdordagi qo'ylarning mavjudligi. Bu sharoitda toza zotli naslli qo'ylar soni qo'ydagidan kam bo'lmasligi lozim. (X.Giyosov 2001).

1-jadval

Qo'ylar	Seleksiya	YUtug'i	Kategoriyasi
Guruhi	YAngi yoki takom. zot ichidagi tip	YAngi zavod tipi	YAngi zavod liniyasi
Qorako'l zotli qo'ylar (qora, ko'k, sur rangli) ona qo'ylar.	5000	3000	500
YAxshilovchi naslli qo'chqorlar	100	60	10
Kamyob rangli qorako'l zotli qo'ylar:ona qo'ylar.	-	1000	250
YAxshilovchi naslli qo'chqorlar.	-	20	10

M.D.Zokirov va boshqalar (1976) ma'lumotiga ko'ra, to'la konservalash, oshlash jaryonida qorako'l terilar yuzasining kattaligi asl xoliga qaytadi. Btroq quritish jarayonida temperatura va boshqalarga qarab terilarning kichrayishi anchagina o'zgarib turadi. Odatdagi quritish maydonchasida oftobga yoyib quritilganda quruq tuzlangan terilar yuzasining kattaligiga nisbatan kichrayishi 11,0% ni, odatdagi maydonchada soyada quritilganda 7,32% ni, odatdagi

maydonchada kechasi quritilganda -7,11% ni, beton yotkizilgan maydonchada oftobda quritilganda 10,99% ni, ikkinchi marta tortib qo'yib, quritilganda 5,19% ni, mahkamlab qo'yib mexanik usulda quritilganda -2,05% ni tashkil qildi. S.A.Asamov vaboshqalar (1988) yaylov oziqa sharoitida yaxshi joylashgan xo'jaliklarda ("Konimex", "Nishon" davlat naslchilik zavodi va "CHimqo'rg'on sovxosi) qorako'l terilar vazni oziqa kamroq sharoitda joylashgan xo'jaliklardagiga nisbatan ("Jongeldi" naslchilik xo'jaligi va "Qoraqata" savxosi) 8-22% ortiqdir. M.D.Zokirov va K.K.Karimov (1987) tajribalarida har xil sort va ranglarda mansub qorako'l terilar o'rtasida xam teri to'qmasining qalinligi jihatdan mo'ayyan tofovutlar bor. Moskva jaket, kirpuk va yassi yupqa 1 sonlariga kiruvchi qorako'l terilar teri to'qmasining nihoyatda yupqa ekanligi bilan; jaket – II, qovurg'asimon yupqa -1 va yassi qalin-1 sortlari o'rtacha qalinligi bilan Kavkaz qalin-1, kavkaz yupqa -1, qalin jaket va qovurg'asimon qalin-1, sortlari esa mag'zli ekanligi bilan xarakterlanadi. M.D.Zokirov va boshqalar (1999). SHuni aytib o'tish kerakki, qorakshlning qimmatli xisoblanuvchi jaket 1, kirpuk, qovurg'asimon yupqa -1 navlari tavor sathi bo'yicha bir xil tekislikda uzun jingalaklariva kam qimmatli hisoblanadigan. Kavkaz qalin-1, kavkazyupqa-1, navlariga esa uncha tekis emas, ancha kalta jingalaklar xarakterlidir. M.D.Zokirov (1999). SHuni aytib o'tish kerakki, qorako'lning qimmatli hisoblanuvchi jaket 1, kirpuk, qovurg'asimon yupqa1 navlariga tovar sathi bo'yicha bir xil teksiklikda uzun jingalaklar va kam qimmatli hisoblanadigan – Kavkaz qalin 1, kavkaz yupqa 1, navlariga esa unchalik tekis bo'lmagan ancha kalta jingalaklar xarakterlidir. Boshqa sortlarga mansub terilarning jingalakgi o'rta uzunlikda bo'lib, tovar yuzasi bo'yicha o'rtamiyona bir tekis tarqalgandir. M.SH.Ikandarov (1972) ma'lumotiga ko'ra, chuqur seleksiya – naslchilik ishlari sitemasini ravishda olib borilayotgan xo'jaliklarda "Muborak", "O'zbekiston", "Karnab", "Nishon", "Konmex", va "Jongeldi" davlat naslchilik zavodlarida qorako'l teri mahsuloti juda qimmatli, uzun va tovar yuzalarida bir tekis joylashganligi bilan ajralib turadi. I.N.Dyachkov (1966) qorakshl qo'ylari gul

jingalaklari uzunligiga qarab tanlash va seleksiyalash yuksak darajada samarali ekanligini aniqladilar.

A.Ibragimovning (1978) tadqiqot natijalariga ko'ra turli zavod tipdagi qo'ylardan olingan terilar jun qoplaminig ipaksimonligi turlicha bo'ladi. Avtorning fikricha "Navoiy" va "Sverdlov" zavod tiplarning terilari, "Qorako'l", "Nurota", va "Qizilqum" zavod tiplaridan ipaksimonligi bo'yicha yuqori turadi. V.G.Valiev (1974) ma'lumotiga ko'ra turli zavod tipdagi qo'chqorlardan olingan avlodlar jun qoplaminig ipaksimonlik darajasi turlicha bo'lishi mumkin. Avtorning ta'qidlashicha, pamuk qo'chqorlaridan olingan avlodlar orasida juni o'ta ipaksimonlikka ega bshlgan qo'zilar ko'proq uchraydi. Bu esa "Konimex" davlat naslchilik zavodi qo'ylarining ipaksimonlik darajasini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Biz bitiruv malakaviy ishni bajarishimizda turli rangli qo'ylarni juftlash natijalaridan foydalanishning ayrim natijalarini qo'zilar xususiyatlarini taqqoslab o'rganishni maqsad qilib oldik.

Respublikada chorvachilik sohasini rivojlantirish bo'yicha 2013 yil davomida olib borilgan ishlar to'g'risida ma'lumot.

Mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo'jaliklarida chorva mollari sonini ko'paytirish rag'batlantirish, servis xizmatlari tarmog'ini tashkil etishga doir chora – tadbirlar dasturining amalga oshirilishi natijasida chorvachilikni rivojlantirishda ijobiy siljishlar qayd etilmoqda.

Amalga oshirilayotgan ishlar natijasida barcha toifa xo'jaliklarida 2013yil qoramollar bosh soni 10607,0 ming boshga etkazilib, 2012 yilga nisbatan o'sish darajasi 4,6 foizga, shundan sigirlar bosh soni 4020,5 ming bosh yoki 2,2 foizga, qo'y va echkilar bosh soni 17720,2 ming bosh yoki 3,5 foizga, parrandalar bosh soni 52337,2 ming bosh yoki 10,2 foizga oshdi.

SHuningdek, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1787,5 ming tonna yoki 7,0 foiz ko'p tirik vaznda go'sht, 7884,7 ming tonna, 7,8 foiz sut, 4379,2 mln dona, 13,1foiz tuxum ishlab chiqarildi.

Joriy yilda ham Vazirlar mahkamasining tomonidan tasdiqlangan dasturi ijrosi bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirildi.

SHaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo'jaliklaridagi chorva mollariga mavjud 2591ta zooveterinariya punktlari orqali 9792,1 mln so'mdan ortiq zooveterinariya servis xizmatlari ko'rsatildi, o'tgan yilga nisbatan o'sish darajasi 7,4 foizga oshdi.

SHaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo'jaliklaridagi chorva mollari naslini yaxshilash maqsadida joriy yilda 1920 ming boshdan ortiq sigir va urg'ochi tanalar su'niy urug'lantirildi, 2012 yilga o'sish darajasi 6,6 foiz oshdi.

Su'niy urug'lantirishni amalga oshirish maqsadida o'zimizda mahaliy sharoitda naslli buqalarning muzlatilgan urug'larini qadoqlash tashkil etilgan bo'lib, joriy yilda 3671,2 ming dozadan ortiq naslli buqalarning urug'i etkazib berildi, o'tgan yilga nisbatan o'sish darajasi 42,4 foizga oshdi.

Respublikamizda hozirgi kunda faoliyat yuritayotgan 448 ta qoramolchilik naslchilik xo'jaliklarida bugungi kunda 8,7 ming bosh naslli mollar tayyorlanib auksionlarda sotish tashkil etildi, o'tgan yilga nisbatan o'sish darajasi 20,6 foizga ko'p.

2013 yil mobaynida xorijiy mamlakatlardan 8327 bosh naslli mollar olib kelinib, o'tgan yilga nisbatan o'sish darajasi 70,4 foizga ko'p. Ularning umumiy soni 36 ming 590 boshdan oshdi.

SHuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 21 noyabrdagi 01-03-34-5-sonli, 2013yil 18 apreldagi 01-03-34-5-sonli, 2013yil maydagi 01-03-34-18-sonli, 2013yil 14 maydagi 01-03-34-18-sonli, 2013yil 24 maydagi 01-03-34-18-sonli, dastur va loyihalarga asosan 2013 yil yakuniga chorvachilik sohasida jami 8 ming 545 ta loyiha amalga oshirildi.

Ushbu maqsadlarga jami 534 mlrd. 983 mln. so'm, shu jumladan 163 mlrd. 206 mln. so'mlik bank kreditlari yo'naltirilib, 72 ming 996 ta yangi ish o'rinlari barpo etildi.

Jumladan, qoramolchilik yo'nalishlarida jami 1390 ta loyiha amalga oshirilgan bo'lib, ularda chorva mollar bosh soni 59 ming 375 boshni tashkil etdi.

Ushbu yo‘nalishga jami 246 mlrd. 453 mln. so‘m, shu jumladan 96 mlrd. 406 mln. so‘mlik bank kreditlari jalb etilib, 4447 ta yangi ish o‘rinlari barpo etildi.

Parrandachilik yo‘nalishidagi jami 675 ta loyiha amalga oshirilgan bo‘lib, ularda parrandalar bosh soni 6 mln. 829 ming boshni tashkil etdi. Ushbu yo‘nalishdagi loyihalar uchun jami 134 mlrd. 597 mln. so‘m, shu jumladan 43 mlrd. 784 mln. so‘mlik bank kreditlari sarflanib, 3009ta yangi ishchi o‘rinlari tashkil etildi.

Bundan tashqari sanoat usulida parranda boqishni tashkil etish yo‘nalishi bo‘yicha jami 4349 ta loyihalar amalga oshirilgan bo‘lib, ularga etkazib berilayotgan jo‘jalar soni 7 mln. 12 ming boshni tashkil etdi. Ushbu yo‘nalishdagi loyihalar uchun jami 106 mlrd. 803 mln. so‘mlik bank kreditlari o‘zlashtirilib yangidan 61937 ta ishchi o‘rinlar tashkil etildi.

Baliqchilik yo‘nalishdagi jami 662 ta loyiha amalga oshirilib, ushbu loyihalarga jami 27 mlrd. 390 mln. so‘m, jumladan 8 mln. so‘m bank kreditlar jalb etilib, 1805 ta yangi ish o‘rinlari yaratildi.

Asalarichilik yo‘nalishidagi jami 1469 ta loyiha amalga oshirilgan bo‘lib, ushbu maqsadlarga jami 19 mlrd. 740 mln. so‘m, o‘u jumladan, 3 mlrd. 778 mln. so‘mlik, kredit mablag‘lari jalb etildi hamda 1798 ta yangi ish o‘rinlari yaratildi.

YUqoridagilardan kelib chiqib, 2014 yil uchun xozirdan puxta zamin yaratish maqsadida har bir tumanlarda aniq hisob-kitoblar asoaida hududiy Oziq-ovqat dasturlari tasdiqlandi.

Dasturga asosan:

Respublikamizda qoramolchilik, parrandachilik, baliqchilik, asalarichilik loyihalari bo‘yicha 354,4 mlrd. so‘mlik 2256 ta loyihalar amalga oshiriladi.

Natijalar qoramol bosh soni 32 ming 695 boshga (106%), parranda bosh soni 4,9 mlnga (107%) ko‘payadi.

SHuningdek, go‘sht ishlab chiqarish 3 ming 114 tonnaga etkazish (107%), sut 42 ming 901 tonna (109%), tuxum 868 mln. dona (130%), baliq 2,4ming dona (110%), asal 301 tonna (135%) etkazish rejalashtirilgan.

Bundan tashqari, chetdan 8000 ming bosh yuqori mahsuldor naslli qoramollar olib kelish rejalashtirilgan.

Natijada 2014 yilda qo‘shimcha 12438 ta yangi ish o‘rinlari yaratiladi.

II. XO‘JALIKNING TASNIFI

Institut o‘quv tajriba xo‘jaligi Camarqand viloyat Oqdaryo tumanida joylashgan bo‘lib, 2004 yilda tashkil etilgan. O‘quv tajriba xo‘jaligi viloyat markazidan 8 km, tuman markazidan 25 km uzoqlikda joylashgan bo‘lib, er maydoni tekis, qumloq, er osti suvlari 4 - 5 m, ayrim joylarda 6 - 8 m. chuqurlikda joylashgan, iqlim sharoiti yil fasllarining kelishiga karab qish oylari 7-8⁰ S sovuq, yoz oylari esa issiq harorat +35⁰ +40⁰ S gacha ko‘tariladi.

Xo‘jalik raxbari Usmonov Aslom faoliyat ko‘rsatib kelmoqda. Xo‘jalikning er maydoni 50 gektar bo‘lib, molxona va uchastkalar 6 gektarni tashkil etadi. SHundan 44 gektari dehqonchilikka ixtisoslashtirilgan.

O‘quv tajriba markazida 3 ta bino bo‘lib, ular ko‘ndalang joylashgan 2 ta eshik, 6 ta derazadan tashkil topgan. Binolar maydoni 6 gektarni tashkil etadi.

Xo‘jalikda jami 65 bosh qoramol bo‘lib, har bir bosh uchun 2,2 m² joy ajratilgan. Zoogigiena talablariga rioya qilgan holda binoning ichi har oyda 2 marta dezinfeksiya qilinadi.

Xo‘jalikda 15 bosh sog‘in sigir bo‘lib, o‘quv tajriba xo‘jaligi bo‘lganligi uchun sut topshirish rejalashtirilmagan sog‘ib olingan sut bolalar bog‘chalariga va kasalxonalarga tarqatilib beriladi. Bundan tashqari 9 bosh bo‘rdoqiga boqiladigan, 2 bosh g‘unojin, 18 bosh buzoqlar, 72 bosh qo‘y, 2 bosh tuya saqlanadi.

O‘quv tajriba xo‘jaligida bo‘lgan qishloq xo‘jalik hayvonlaridan talabalarni o‘quv amaliyotlarini o‘tkazish va ilmiy tatqiqot ishlari o‘tkazishda keng ko‘lamda foydalaniladi.

Institut rektorining tashabbusi bilan 2012 – yilda o‘quv tajriba xo‘jaligiga Nurobod tumanidan 10 bosh qorako‘l zotli qo‘ylar olib kelindi. Bugungi kunga kelib xo‘jalikda jami 92 bosh qo‘y bo‘lib shulardan 45 boshini qorako‘l zotli qo‘ylar tashkil etadi.

Xo‘jalikning iqtisodiy ko‘rsatkichlari tahlil qilinganda o‘quv tajriba xo‘jaligiga qarashli 50 ga maydon bo‘lib shundan paxta, g‘alla, bog‘dorchilik, sabzavodchilik, qishloq xo‘jalik hayvonlari uchun ozuqa bob ekinlar ekiladi.

OXIRGI 3 YILDA XO‘JALIKDAGI ERDAN FOYDALANISH (GA)

Ko‘rsatkichlar	2012	2013	2012-yilda 2013-yilga nisbatan
Umumiy er maydoni	50	50	50
Jami qishloq xo‘jalik erlari	44	44	44
SHundan sug‘oriladigan erlar	44	44	44
YAylovlar	6	6,5	6,5
Ko‘p yillik daraxtlar	0,5	0,5	0,5

Xo‘jalikning umumiy er maydonidan qishloq xo‘jalik hayvonlarini boqish uchun jami 6 ga maydon ajratilgan bu xo‘jalikda ozuqa etishtirish uchun juda kam hisoblanadi. Xo‘jalikda chorva mollarini oziqlantirish uchun ozuqa bazasi etishmaydi. Benda maydoni uchun jami 4 ga maydon ajratilgan ozuqalar asosan g‘alla ekiladigan maydonlardan somon yig‘ish va g‘alladan bo‘shagan erlarga takroriy ekin sifatida chorva mollariga ko‘k ozuqa sifatida edirish uchun hamda silos tayyorlash va donli ozuqalar etishtirish maqsadida makkajo‘xori ekiladi.



QORAMOLLARNI SAQLANISH JOYI



QORAMOLLARNI OZIQLANTIRISH SHAROITI

O'quv tajriba xo'jaligida bo'lgan qishloq xo'jalik hayvonlarining bosh soni doyimiy ravishda ma'lum miqdorda o'zgarib turadi chunki institut vivariysida veterinariya va zootexniya yo'nalishi talabalarining o'quv jarayonida qoramollardan, qo'y, ot va eshaklardan doyimiy ravishda foydalanilib turiladi.

Vivariy uchun zarur bo'lgan qishloq xo'jalik hayvonlari o'quv tajriba xo'jaligidan keltiriladi.

O'QUV TAJRIBA XO'JALIGIDAGIMOLLARNING BOSH SONI TO'G'RISIDA MA'LUMOT

№	GURUHLAR	BOSH SONI	
		2013 yil	2014 yil
1	Jami qoramollar	64	61
2	6 oygacha buzoqlar	18	22
3	6 oydan-1 yoshgacha	18	15
4	1-2 yosh qoramollar	6	2
5	Buqalar	1	1
6	G'o'najin	4	1
7	Sigirlar	17	20
1	Jami qo'y va echkilar	75	87
2	Sovliqlar	47	51
3	Quchqorlar	3	2
4	Quzilar	22	30
5	Echkilar	3	4
1	TUYALAR	2	2

- jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki o'quv tajriba xo'jaligidagi chorva mollarining bosh soni yildan – yilga oshirish rejalashtirilmagan chunki chorva mollari uchun ajratilgan er maydoni chegaralangan. O'quv tajriba xo'jaligidagi chorva mollaridan mahsulot olish ko'zda tutilmagan shuning uchun bo'rdoqiga boqilgan qoramollarni sotib barcha chorva hayvonlari uchun konsentrat ozuqalar shu jumladan qo'shimcha materiallar qurilish materiallari sotib olinadi. Barchamizga ma'lumki har yili yangi yil bayrami oldidan institut xodimlari uchun arzonlashtirilgan narxda go'sht sotiladi.

III. TAJRIBA O'TKAZISH MATERIALLARI VA USULLARI

Agar sohani rivojlantirish mamlakatimiz aholisini qishloq xo'jalik mahsulotlari, sanoatni xom ashyo bilan ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa chorvachilikni rivojlantirish hozirgi davirdagi muhim masalalardan biri bo'lib hisoblanada.

Qo'ylar, qoramol va boshqa hayvonlarga nisbatan ser harakat tuyoqlari va oyoqlari baquvvat, o'tkir tishlari past va siyrak o'sgan o'tlarni, hatto krga to'kilgan mayda barklarni terib olib istemol qilish qobiliyatiga egadir. Ular achchiq, sassiq hidli, tikali o'tlarni ham istemol qiladi.

O'qychilikni rivojlantirish cho'l va yarim cho'l, tog' bag'ri yaylovlari va pichan zorlarida o'sadigan ozuqa resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini yaratadi qo'ylar jazirama issiqqa, sovuqqa va suvsizlikka ham chidamli. Bu tarmoqni rivojlantirish qo'shimcha kapital qo'yilma, mehnat resurslarini ham talab qilmaydi.

Qo'ychilik aholi uchun ozuq ovqat, go'sht, yog', chut va sanoat uchun xom ashyo jun, qorako'l teri, teri etkazib beradi. O'zbekistonda rivojlantirilayotgan qo'y zotlarini quydagi guruhlariga bo'lib tahlil qilish va iqtisodiy baholash maqsadga muvofiq.

- 1- guruh- mayin junli qo'ychilik;
- 2- guruh- yarim mayin junli qo'ychilik;
- 3- guruh- qorako'l teri uchun qo'ychilik;
- 4- guruh- po'stinbob teri beradigan qo'ychilik;
- 5- guruh- go'sht – yog' beradigan qo'ychilik;

O'zbekistonda 1- va 2-guruhga kiradigan qo'ychilik zotlari juda kam miqdorda rivojlantirilgan. Jun balansini mayin va yarim mayin jun tashkil etadi; Qolgan guruh qo'ylardan dag'al jun olinadi. Barcha turdagi qo'y va echkilarning go'shtlari Respublika go'sht balansida 10 – 15 % ni tashkil qiladi.

Qo'ylarning istemol qiladigan tabiiy yayloq ozuqalari iqtisodiy baholanmaydi, natijada qo'ychilikdan nisbatan arzon ozuq ovqatlar hamda xom ashyolar ishlab chiqariladi.

SHu maqsadda biz qo'zilarni o'sish rivojlanishiga ona qo'ylarni bo'g'ozlik davrida to'la qiymatli oziqlantirishning samaradorligini aniqlash uchun institutimizning o'quv tajriba xo'jaligida ilmiy tatqiqotlar o'tkazishni rejalashtirdik.

Bo'g'oz qo'ylarning to'yimli moddalarga bo'lgan talabini qondirish uchun fiziologik xolatini me'yor darajasida bo'lishini ta'minlaydi. Xomilaning o'sish rivojlanishiga bo'g'oz qo'ylarni to'liq qiymatli oziqlantirish ijobiy ta'sir ko'rsatadi. SHuni o'rganish maqsadida institutimizning o'quv tajriba xo'jaligida bo'lgan qorako'l zotli bo'g'oz qo'ylardan 20 bosh ajratib olib anolog bo'yicha 2 guruhga bo'lindi. 1 – guruh nazorat guruhi qilib olindi va xo'jalik sharoitidagi ratsion bilan oziqlantirilda va ratsioni tarkibiga taurli o't pichani, kuzgi bug'doy somoni, yantoq pichani, makkajo'xori silosi va arpa doni kiritildi.

2 – guruhdagi bo'g'oz qo'ylartajriba guruhi bo'lib ularni to'liq qiymatli ratsion bilan oziqlantirish maqsadida ratsion tarkibigi proteinga, vitaminlarga boy bo'lgan ozuqalardan qo'shib mneral moddalar bo'lgan talabini qondirish uchun diammoniy fasfat qo'shib oziqlantiriladi. Nazorat guruhini ratsioni tarkibidagi turli o't pichanini to'yimliligiga mos ravishda beda pichani bilan almashtirilib ratsion tuzildi va fosforiga bo'lgan talabini qondirish uchun DAF qo'shib berildi.

Tajriba bo'g'oz ona qo'ylarning bo'g'ozligini ikkinchi davrida 2 oy davomida o'tkazildi. Tajriba boshida va 1 oyda bir marta tarozidan o'tkazilib kunlik o'sishi va semizlik darajasi o'rganib borildi. Mutloq va nisbiy o'sishi tahlil qilinib semizlik darajasini tug'iladigan qo'zilarining tirik vazniga ta'siri aniqlanadi.

Tajriba natijasida olingan ma'lumotlar asosida iqtisodiy samaradorlik aniqlanib shu asosda xulosalar va ishlab chiqarishga taklif tafsiyalar beriladi.

IV. ASOSIY QISIM

4.1. CHORVACHILIKDA QO'YCHILIKNING TUTGAN O'RNI VA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Respublikamizda agrar sohani rivojlantirishda asosiy tarmoqlardan biri bo'lgan qo'ychilikni yuqori darajada o'sishini ta'minlashga mamlakatimiz Prezidenti tomonidan alohida e'tibor qaratilgan. SHuning uchun qorako'lchilik xo'jaliklari xususiylashtirilmagan, hozirgi kungacha davlat tasarrufida bo'lib jamoa va shirkat xo'jaliklari sifatida faoliyat yuritib kelmoqda.

Qo'ychilik ham chorvachilikning etakchi sohalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Bu soha ham mahsuldorlik yo'nalishiga qarab jun, go'sht, go'sht – yog', go'shtli – jundor, qorako'l va Romanov zotli qo'ylarga bo'linadi. Har bir

mahsuldorlik yoʻnalishiga mansub boʻlgan qoʻzi zotlaridan yuqori darajada mahsulot olish uchun ularning zotiga, mahsuldorlik yoʻnalishiga, fiziologik xolatiga, yoshiga va tirik vazniga qarab toʻyimli moddalarga boʻlgan talabi boʻyicha ilmiy asoslangan holda toʻla qiymatli ratsion tuzib, ratsion asosida oziqlantirish ularning mahsuldorligini oshirishga olib keladi.

Qoʻylarni oziqlantirishni toʻgʻri tashkil etish, nasilli qoʻchqorlardan unumli foydalanishda, har 100 bosh sovliqdan olinadigan qoʻzilar sonini yuqori boʻlishida, emizikli qoʻylarning sut mahsuldorligini, va yosh qoʻzilarning oʻsish – rivojlanish darajasini yuqori boʻlishida muhim ahamiyatga ega. Qoʻylarni oziqlantirish ratsionini tuzishda sifatli ozuqalardan foydalanish va A.P. kolashnikovning (1988) “CHorva mollarini oziqlantirish normalari va ratsionlari” kitobida berilgan meʼyorlar asosida ratsion tuzib ilmiy asosda oziqlantirish maqsadga muvofiq.

4.2. Qoʻylarni toʻyimli moddalarga boʻlgan talabi

Qoʻy va echkilar uchun ozuqa normalari mahsuldorlik yoʻnalishi boʻyicha ishlab chiqarilgan boʻlib, yaylovdan foydalanmaydigan hayvonlar uchun tuzilganidir. Agar qoʻy va echkilar yaylovda boqilganda bu norma 15 – 20 % koʻpaytiriladi.

Ozuqa normasi qoʻylarning jinsi, yoshi, tirk vazni, semizlik darajasi va ulardan olinadigan malumot miqdoriga qarab belgilanib, u 18 – 19 koʻrsatkich bilan ifoda etiladi.

YOsh qoʻylarning oʻsishi va ozgʻin qoʻylarni 1 kg semirishi uchun 5 ozuq birligi va shunga mos ravishda boshqa toʻyimli moddalar normaga qoʻshimcha tarzda beriladi.

Qoʻylar ratsionidagi quruq moddaning optimal meʼyoriga alohida eʼtibor berish kerak. Qoʻylar 100 kg tirik vazni uchun 3,2 - 3,8 kg quruq modda istemol qiladi. Qoʻchqorlar ratsionining 1 kg quruq moddasiga 0,85 – 0,90 ozuq birligi toʻgʻri kelishi kerak. Sovliqlar uchun bu koʻrsatkich 0,6 – 0,7 ozuq birligiga teng.

Ratsionda energiyaning ietishmasligi hamma hayvonlardagi singari oqibatiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari qo'y va echkilarda juning o'sishini sekinlashuvi va sifatini buzilishi ("och ingichkalik" holati) kuzatiladi. Hazimlanuvchi proteinga bo'lgan talab qorako'l qo'chqorlarida 1 ozuq birligi uchun 114 – 115 ni, dumbali qo'chqorlar uchun esa 108 – 109 gr ni tashkil qiladi.

Sovliqlar bo'g'ozligining birinchi davrida 1 ozuq birligiga 0,58 – 0,90 gr XP to'g'ri kelsa, so'ngi 7 – 8 haftasida 95 – 100 gr ga teng bo'ladi. YOsh hayvonlarda proteinga bo'lgan talab 10 – 15% ortiq bo'ladi.

Garchand norma ko'rsatkichlarida tozalanmagan kletchatka ,qand kraxmal va AEM lar miqdori keltirilmagan bo'lsada, barcha kovshovchi hayvonlar singari ularning ratsiondagi miqdorini nazorat qilib borish kerak.

Ratsionda tozalanmagan kletchatkani miqdori 6 oyligigacha qo'zilar quruq moddaning 13%, 15 – 17 oyligida 25% va katta yoshli qo'zilar 27% dan ortmasligi kerak. Agar ratsionda kletchatkaning miqdori ortib ketsa, barcha to'yimli moddalarning hazm bo'lishi pasayadi.

Qo'ylarning qandga bo'lgan talabi ularning 1 kg tirik vazni uchun 2,5 – 3,0 gr ni tashkil qilib, qand protein nisbati 0,5 – 0,9 bo'lishi kerak.

Qo'ylar ratsionida mikroelementlardan kalsiy, fosfor, magniy, osh tuzi va oltingugurtlar miqdori nazorat qilinadi. Ular orasida oltingugurt alohida ahamiyati bor. Jun tolasining tarkibiga kiruvchi asosiy modda karatin oqsili bo'lib, unda 2,5 – 5,5 % oltingugurt moddasi bor. Metionin, sistin va sisteinlar mikro organizmlar tomonidan sintezlanishi uchun ham oltingugurt elementi kerak bo'ladi. Dag'al junlarda 3,55 – 5,40 % sistin, 0,44% metionin borligini hamda mayin jun tarkibida esa 9,1 – 11,1 % metionin va 0,67 % sistin bo'lishini A. A. Patashkin va A. B. Lilar (1961)¹ aytib o'tganlar. Bu elementlarning jun tolasini o'sishini sekinlashtiradi. Mustahkamligini pasaytiradi. S va V guruh vitaminlarining faoliyatini oshirishda va kobolt hamda mis bilan birgalikda qonni sintezlashida marganets qatnashadi deb uqtiradi A.

V. Modyanov (1978)². Qolgan makroelementlarning ta'siri qoramollardagi singaridar

4.3. Qorako'lichilik muammolari va echimlari

O'zbekiston Respublikasi keskin o'zgaruvchan iqlimga ega bo'lib, uning umumiy er maydonning qariyb 25 mln. Gektarini, ya'ni 56,7 foizini cho'l, yarim cho'l, dasht hamda tabiiy yaylovlar tashkil etadi. Bu yaylovlarning asosiy ozuqa manbai iqlim sharoitiga bog'liq holda vegetatsiya davri qisqa efemer o'tlar, yarim buta va butalar hisoblanadi. Respublikamizda qorako'l terilari bilangina emas, balki mahalliy noqulay iqlim va yaylov sharoitiga moslashganligi bilan ham qadrlidir. Boshqa chorvachilik sohalari kabi qorako'lichilikni rivojlantirishda ham asosan ikki omil, ikki yo'nalish hal etuvchi rol uynaydi. Bular naslchilik ishlarini yuritish va ozuklantirishdir.

Qorako'l ko'y zoti halq seleksiyasi natijasida yaratilgan bo'lib ulardan olinadigan qorako'l terilari o'zining nafisligi, bejirimligi, pishiqligi, rang-barang turlarda tovlanib turishi bilan jahon mo'yna bozorida xamisha munosib baholangan. Biroq qorako'lichilik sohaning asosiy mahsuloti bo'lgan qorako'l terilarini ishlab chiqarish manbai bulib qolmasdan, balki, arzon tannarlarda go'sht, jun va charm mahsulotlari ishlab chiqarish manbai hamdir. Cho'llarni o'zlashtirish va uning tabiiy resurslaridan oqilona foydalanish tajribasi shuni ko'rsatadiki, xozirgi davrda qorako'l qo'ylarini urchitish cho'l mintaqalari resurslaridan samarali foydalanishning yagona, iqtisodiy jihatdan asoslangan va maqsadga muvofiq yo'lidir. Demak, qorako'lichilikni rivojlantirish ijtimoiy – iqtisodiy masala bo'lib, sohada iqtisodiy islohatlarni chuqurlashtirish va rivojlantirishning yaqin yillarga mo'ljallangan ustivor yo'nalishlarini aniqlash uning taraqqiyotini belgilaydigan dolzarb muammolardan hisoblanadi.

Qorako'chilikka ixtisoslashgan shirkat xo'jaliklarida 2007-2008 y qish faslining o'ta sovuq kelishi va shu yo'ili va undan avvalgi bir necha ob-havo noqulay kelgan yillarda yaylovlar hosildorligining kamayib, quduq va buloq suvlarning kurib qolishi qorako'lichilikka ixtisoslashtirilgan xo'jaliklar moliyaviy ahvolining og'irlashuviga olib keldi.

Muxtaram Prezidentimiz va Xuqumatimiz tomonidan chorvachilik sohasida, shuningdek qorako'chilik soxasida iqtisodiy islohatlarni chuqurlashtirish borasida olib borayotgan siyosatlari o'zining ijobiy natijalarini bera boshlaydi. Natijada kompaniya tizimidagi xo'jaliklarda sohani rivojlantirish, sifatli va eksportbop qorako'chilik maxsulotlari ishlab chiqarish, eksport qilish, qorako'l ko'ylar bosh sonini ko'paytirish, ularni suniy urug'lantirish chorva mollari naslini yaxshilash borasida ijobiy ishlar amalga oshirilishigiga zamin yaratildi.

Kelajakda asosiy e'tibor eksport talablariga javob beradigan, raqobatbardosh assortimentdagi qorako' terilarini ishlab chiqarishga qaratiladi. SHu munosabat bilan 2011 y qora rangli qorako'l terilarining 80-82% 1 navli, shulardan jaket 1 assortimentdagi terilar 5-7%, qovurg'asimon assortimentdagi terilar 25-30%, yassigul assortimentdagi terilar esa 17-22% tashkil etishi 2015 yilga borib bu ko'rsatkichni mutanosib ravishda 82-85, 10-12, 30-35 va 20-25% etkazish ko'zda tug'ilgan.

Oxirgi yillarga rangli qorako'l terilariga bozor talabining ortishi uning sifatini yaxshilash va assortimentini kengaytirishni taqozo etmoqda. Ushbu holatini hisobga olgan xolda 2011 y 1 navli sur qorako'l terilar salmog'ini 80-82%, 1 navli ko'k rangli terilar salmog'i 78-80 % etkazish borasida sa'yi xarakatlar qilinmoqda.

Qorako'l zoti genofondida to'plangan qimmatli genotiplar mavjud. Bu genofond tarkibidagi qora, ko'k, buxoro suriga mansub bo'lgan populyasiyalar miqdoriy jihatdan etarli darajada bo'lib, olib borilayotgan seleksiya-naslchilik ishlari ularning yanada kengayishini ta'minlanmoqda. Bu qimmatli genotiplardan naslli material sifatida foydalanish zotning salohiyatini yanada boyitishi mumkin. SHu nuqtai nazardan ularni saqlash va ko'paytirish qorako'chilikning dolzarb muammolaridan biridir. Naslchilik ishlarini yuritish tizimiga asosan qorako'chilikda naslli mollarni etishtirish naslchilik zavodlari va naslchilik xo'jaliklari zimmasiga yuklatilgan. Hozirgi kunda respublikada jami 104 qorako'chilik xo'jaliklari mavjud bo'lib ulardan 20 tasi naslchilik zavodlari, 9 naslchilik xo'jaliklari makomiga ega.

Naslchilik zavodlari va xo'jaliklari o'z talablarini qondirish bilan bir qatorda tovar xo'jaliklarini naslli mollar, ayniqsa, naslli qo'chqorlar bilan ta'minlashlari lozim.

Qorako'l qo'y zoti tarkibida jami 30 yuqori mahsuldor zavod tiplari mavjud bo'lib, ularning 9 tasi qora, 12 tasi sur, 5 tasi ko'k, 2 tasi oq, 1 tasi guligaz va 1 tasi zarmalla rangli qorako'l qo'ylarning zavod tiplaridir. Ular asosiy naslly yadro hisoblanib, zotning har tomonlama rivojlanishi ta'minlaydi.

Har bir sohadagi kabi kabi qorako'lchilik sohasida ham muammolar mavjud. Qorako'l qo'ylarining irsiy saloxiyati faqatgina ularni to'la qonli oziqlantirish sharoitida yuqori darajada namoyon bo'ladi. SHu jihatdan cho'l xududlarida yaylovlardan foydalanish, ularning holatini yaxshilash va mahsuldorligini oshirish muhim ahamiyatga ega. Qorako'lchilikka ixtisoslashtirilgan shirkat xo'jaliklariga davlat tomonidan 11,7 mln ga er maydonlari uzoq muddatga foydalanishga topshirilgan bo'lib, shundan 0,2 mln ga haydaladigan er maydonlari, 9,7 mln ga yaylovlar tashkil etadi.

Qorako'lchilik xo'jaliklari yaylovlaridagi mavjud suv inshootlaridan uzoq vaqt foydalanish natijasida aksariyat shaxtali qujduqlar va skvajinalar suvi kamayib, etarli darajada suv chiqmay qolgan va yaylov suv quvurlarining bir qismi yaroqsiz holga kelib kolgan. Buning asosiy sababi, hozirgi vaqtda Respublikada mavjud yaylovlardagi suv inshootlarini keng qo'lamdagi ta'mirlash va yangilarini barpo etish ishlarib olib borilmayotganligi, bu sohada faoliyat yurituvchi tashkilotlar tugatilganligidir.

Respublikamizdagi mavjud yaylovlarning holati so'ngi yillardagi noqulay iqlim sharoiti va boshqa salbiy ta'sirlar natijasida yomonlashib, har yili 16,5 ming ga yaylov degradatsiyaga uchramoqda. Sungi 25 yil ichida degradatsiya hisobiga yaylovlar 412, ming ga kamaygan. YAYlovlar hosildorligi ular joylashgan xududlarga bog'liq holda 0,65-1,65 s/ga ozuqa birligini, respublika bo'yicha o'rtacha 1,1 s/ga ozuqa birligini tashkil etadi. Respublika bo'yicha har yili yaylovlar hosildorligining pasayishi o'rtacha 1,5% ni tashkil etmoqda. Bu muammo davlat miqyosida keng ko'lamdagi yaylovlarning meliorativ holatini

yaxshilash bo'yicha markazlashgan holda ajratilgan mablag'lar hisobidan fitomeliorativ tadbirlar amalga oshirilmayotganligi oqibatida yanada chuqurlashmoqda.

YUqolridagilardan tashqari, qorako'lichilikka ixtisoslashgan xo'jaliklar asosan cho'l, dasht, va tog' oldi kabi ekstremal sharoitli xududlarda joylashganligini inobatga olib qorako'lichilik shirkat xo'jaliklari xududidagi aholini ijtimoiy himoyalashni yaxshilash maqsadida qo'ychilik otarlari va cho'poncho'liklar turmush kecharadigan manzillarda elektr, ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash YU ijtimoiy-iqtisodiy infratuzilmasini rivojlantirish, shu va yuqorida ko'rsatilgan boshqa muammolarni hal etish, sohaning eksport imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida xom-ashyoga qayta ishlov berish, texnika va uskunalari sotib olish, xo'jaliklarining moddiy-texnika va institutsional salohiyatini oshirishga davlat, mahalliy va xorijiy hamda halqaro nodavlat-notijorat, gumaknitar tashkilotlar xomiylik ko'magi, grant va investitsiyalarni jalb etishga davlat boshqaruvi organlari tomonidan amaliy yordam ko'rsatilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

2010 yilning birinchi yarim yillik yakunlari bo'yicha "O'zbek qorako'li" kompaniyasi tarkibidagi qorako'lichilik shirkat xo'jaliklari, shuningdek, bir qancha a'lo sanoat tashkilotlarining faoliyati natijasida qator ijobiy natijalarga erildi. SHu jumladan, tizim bo'yicha joriy 1 iyul holatiga o'tgan yilning shu davriga nisbat:

- mayda shoxli bosh sonini 58,3 ming bosh, shundan, sovliqlar 151,1 ming boshga ko'paytirishga erishildi;

- ichki ehtiyojlar uchun qo'y va echkilarni xshjalikda so'yim 4455 boshga, harom chiqimi 1792 boshga kamaydi.

Kompaniya bo'yicha 2010 yilning 1 iyul holatiga jami 1024,0 ming bosh, hosil olinib, olingna hosilning 771, 9 ming boshi yoki 75 foizi o'stirishga qoldirildi.

Joriy yilning birinchi yarmida kompaniya bo'yicha 6921,4 tonna go'sht ishlab chiqarilishiga, va ushbu ko'rsatkichning o'tgan yilga nisbatan 53,2 tonnaga ko'paytigiga erishildi.

Jun ishlab chiqarish ko'rsatkichi 1514,1 tonnani tashkil etdi.

Bu yilgi tashki bozordagi eksportbop mahsulotlarga bo'lgan talabdan kelib chiqib, o'stirishga qoldirishni ko'paytirish hamda qorako'l teri uchun so'yishni kamaytirgan holda jami 843,5 ming dona qorako'l teri ishlab chiqarildi.

Kompaniya va qorako'lchilik va cho'l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti olimlari hamkorligida tug'ilgan qo'zilarining nasliy sifatlarini aniqlash hamda naslchilik ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yish maqsadida 344 nafar bonityorlar malakasi oshirildi. Natijada joriy yilda o'stirishga qoldirilgan 766,1 ming bosh qo'zilar daromadga olinib individual baholandi va sirg'alanadi.

Seleksiya-naslchilik ishlarini yaxshilash uchun Qorako'lchilik va cho'l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot instituti olimlari bilan hamkorlik joriy yilda 29 ta naslchilik toifasidagi xo'jaliklarda 20,1 ming bosh qo'chqorlar kelajakda naslchilik ishlarida tana tuzilishi va kelib chiqishi bo'yicha, 15-20 kunlik yoshida esa teri va gul xususiyatlarining saqlanishi va rivojlanish ko'rsatkichlari bo'yicha baholandi.

Kompaniya rejasi asosida aholi va fermer xo'jaliklarini naslli mollar bilan ta'minlash maqsadida har yili o'rtacha 120-130 min bosh atrofida naslli qo'chqorlar va qo'zilar parvarishlashnib, sotish ko'zda tutilmoqda. Bu o'z navbatida aholi va qorako'lchilik fermer xo'jaliklarida chorva mol bosh sonlari oshishiga va chorcachilik mahsulotlari etishtirishga zamin yaratmoqda.

Kompaniya tizimida chorva qishlovchi mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida korakulchilik shirkat xo'jaliklarida dag'al xashak tayyorlash tadbirlari ishlab chiqilib bir shartli qo'y uchun 150 kilogrammdan, jami 322,1 ming tonna dag'al xashak tayyorlash bo'yicha ishlab bajarilmoqda.

Kompaniya tizimidagi qorako'lchilik xo'jaliklari va tashkilotlari tomonidan 2010 yilning birinchi yarmida 1395,3 ming AQSH dollari miqdorida qorako'lchilik mahsulotlari, shu jumladan 463,8 ming AQSH dollari miqdorida qayta ishlangan qorako'l teri, 931,5 ming AQSH dollari miqdorida yuvilgan jun eksport qilinib, bu boradagi topshiriqni 168 % bajarishga erishildi.

Bu boradagi yillik topshiriqlarini bajarish maqsadida bugungi kunga qadar shiriqlarini bajarish maqsadida bugungi kunga qadar 258,1 ming AQSH dollari

hajmida qorako'pchilik mahsulotlarini eksportga sotish bo'yicha shartnomalar imzolanib o'rnatilgan tartibda tegishli tashkilotlar ro'yxatidan o'tkazildi.

4.4. Bo'g'oz sovliqlarni boqish

Sovliqlarga belgilangan ozuqa normalari ularning mahsuldorligi bo'yicha yo'nalishiga, tirk vazniga, fiziologik xolatiga va semizlik darajasiga qarab belgilanadi. YAylovlarning xosildorligi past bo'lganda istemol qilingan ozuqa energiyasi XF talablarini va embirionning o'sishini taminlay olmaydi va junda "Och Ingichkalik" holati ro'y beradi. Qo'ylar juda ozib ketib, embirion bazi hollarda boshlang'ich bosqichlarida so'rilib ketadi va qisir qolishi 30 – 35% ga ortadi. Qisir sovliqlarni qochirish mavsumidan 1 - 2 oy oldin yaxshi yaylovlarda boqi semizligini o'rtadan yuqori darajada bo'lishini taminlamoq lozim. Juda ozg'in sovliqlarga 0,2 – 0,4 kg konsentrat ozuqa berish kerak. Ozg'in qo'ylar 1 kg semirishi uchun 5 ozuqa birligi, 500 gr hazimlanuvchi protein talab qiladilar. Me'yorida semizlikga ega bo'lgan sovliqlar birinchi qochishdayoq bo'g'oz bo'ladilar, qisir qo'ylar soni kamayadi va egizaklar soni 2 – 3 barobar ko'payadi. Sovliqlarda qisirlik davri yoz va kuzning boshiga to'g'ri kelib, serhosil yaylovlarda qo'shimcha ozuqasiz to'yimli moddalarga bo'lgan talablarini qondirishlari mumkin. Bo'g'ozligining birinchi uch oyi oktyabr – dekabr oylariga, noyabrda qochirilgan sovliqlar uchun esa noyabr – yanvar oylariga bog'liq bo'lib, yaylovni qor bosmasa serhosil yaylovlarda qo'ylar qo'shimcha ozuqasiz to'yimli moddalarga bo'lgan talabini qondiradilar. YAylov xosildorligi past bo'lib yaylovda qor ham bo'lsa, u holda yaylovga chiqarishdan oldin va kechqurun 1 bosh qo'yga bir kunda 1 – 1,5 kg atrofida to'ymaganligi sezilsa dag'al ozuqa miqdori 1,5 – 2 kg etkaziladi.

Bo'g'ozlikning so'ngi 7 – 8 haftasi bizning sharoitimizda yanvar, fevral, mart oylariga to'g'ri kelib, energiyaga bo'lgan talabi 40 – 50% ga, hazimlanuvchi proteinga bo'lgan talabi 50 – 60% ga va meneral moddalarga talabi esa 2 barobar ortadi.

Bu davirdagi yaylovdagi ozuqalar qo'ylarning to'yimli moddalarga bo'lgan talabini qondira olmaydi. SHuning uchun yaylovdan foydalanilmagan kunlari har bosh qo'yga 1 kunda 1,5 – 2,0 kg pichan, 0,3 – 0,4 kg konsentrat ozuqa berish kerak. Pichanning 40 – 50% bahori o'simliklar poxoli bilan almashtirilishi mumkin. Nushqurti kamaytirish maqsadida dag'al ozuqalar maydalab beriladi. Bu davirda yaxshi semizlikda bolgan sovliqlardan sog'lom, yirik qo'zilar olinadiva sovliqlar tuqqandan so'ng sersut bo'ladilar.

Bo'g'oz sovliqlarni qorli va qirovli yaylovlarga chiqarishdan oldin albatta dag'al ozuqa berish va ularni osh tuzi, mineral moddalar bilan ta'minlash kerak.

4.5. Qo'zilar o'sish rivojlanishiga ona qo'ylarni bo'g'ozlik davrida to'liq qiymatli oziqlantirishning iqtisodiy samaradorligi

Qorako'l qo'ylarini qochirish va qo'zilatish mavsumiy usulda tashkil qilinadi. Oktiyabr oyining ikkinchi yarmi va noyabr oyining birinchi yarmida qochirish mavsumi tashkil etilib mart, aprel oylarida to'la ya'ni qo'zilatish mavsumi o'tkaziladi. Qorako'l qo'ylarining bo'g'ozlik davri asosan qish oylariga to'g'ri keladi, shuning uchun ularni oziqlantirishga alohida etibor berish zarur. Bo'g'ozligining birinchi yarmida ularning semizlik darajasini o'rtacha va o'rtachadan yuqori bo'lishini taminlash kerak. Bo'g'ozligining ikkinchi yarmida ya'ni oxirgi 7 – 8 g'afasi davrida xomilaning o'sish rivojlanishi jadallashadi. Bu davirda ularni to'liq qiymatli ratsion bilan oziqlantirish lozim, chunki to'yimli moddalarga, vitaminlarga, mneral moddalarga ayniqsa hazimlanuvchi proteinga bo'lgan talabi 30 – 40 % ga oshadi.

Bo'g'oz qo'ylarni oziqlantirishni to'g'ri tashkil etish xomilani o'sish rivojlanishini yuqori darajada bo'lishini ta'minlash bilan bir qatorda tug'ish jarayonini ham engil kechishiga olib keladi. Bundan tashqari ona qo'ylarni sut mahsuldorligini yuqori bo'lishini, tug'ilgan qo'zilar kasalliklarga chidamli bo'lishini va ularni kunlik o'sishini yuqori darajada bo'lishini ta'minlaydi.

Qoʻzilarni oʻsish rivojlanishini yuqori darajada boʻlishiga ona qoʻylarni boʻgʻozlik davrida toʻliq qiymatli oziqlantirishning taʼsirini oʻrganish maqsadida institutimizning oʻquv tajriba xoʻjaligida boʻlgan qorakoʻl zotli boʻgʻoz qoʻylardan yoshi, tirik vazni fiziologik xolati bir xil boʻlgan 20 bosh boʻgʻoz qoʻylardan ajratib olindi va anolog boʻyicha ikki guruhga ajratildi tajribadagi birinchi guruh nazorat guruhi boʻlib xoʻjalik sharoitidagi ratsion bilan oziqlantirildi. Ratsion tarkibiga turli oʻt pichani, kuzgi bugʻdoy somoni, yantoq pichani, makkajoʻxori silosi va arpa doni kiritildi. Ikkinchi guruhdagi qoʻylar ratsionini nazorat guruhidagi qoʻylar ratsionini tarkibidagi turli oʻt pichani va yantoq pichanini bir qismi toʻyimlilikiga mos ravishda beda pichani bilan almashtirib oziqlantirildi.

Tajribadagi qorakoʻl zotli boʻgʻoz qoʻylarning oziqlantirish ratsioni quyidagi jadvalda keltirilgan.

Tajribadagi qorakoʻl zotli qoʻylarning boʻgʻozlik davrining ikkinchi yarmida oziqlantirish ratsioni.

Ratsionga kiritilgan ozuqalar	Ozuqa miqdori kg	Ozuqa birligi kg	Quruq modda kg	Xazimlanuv chi protein	Osh tuzi gr	Sa gr	R gr	Karotin mg
Meʼyor		1,35	1,9	135	6	9,2	5,5	18
Nazorat guruhi								
Turli oʻt pichani	1	0,44	0,85	56	-	8,3	2,0	15
Kuzgi bugʻdoy somoni	0,5	0,1	0,42	2,5	-	1,4	0,4	2
Yantoq pichani	0,5	0,14	0,42	17	-	2,1	1,7	10
Makkajoʻxori somoni	1	0,2	0,25	14	-	1,4	0,6	40

Arpa doni	0,3	0,34	0,25	25	-	0,27	0,2	0,5
Osh tuzi	0,006	-	-	-	0,6	-	-	-
DAF								
jami		1,22	2,19	114	-	12,08	4,9	67,5
Tajriba guruhi								
Turli o't pichani	1	0,44	0,83	101	-	17	2,2	49
Kuzgi bug'doy somoni	0,5	0,1	0,42	2,5	-	1,4	0,4	2
YAntoq pichani	0,5	0,14	0,42	17	-	2,1	1,7	10
Makkajo'xori somoni	1	0,2	0,25	14	-	1,4	0,6	40
Arpa doni	0,3	0,34	0,25	25	-	0,27	0,2	0,5
Osh tuzi	0,006	-	-	-	0,6	-	-	-
DAF	0,5	-	-	-	-	-	10	-
Jami		1,36	2,17	159	-	22,17	15,1	101,5

Tajribadagi bo'g'oz qo'ylari oziqlantirish ratsioni tahlil qilinganda, nazorat va tajriba guruhidagi qo'ylarning ratsionida ozuqa turlari va to'yimlilik bir xil bo'lib lekin nazorat guruhidagi qo'ylar ratsionining tarkibidagi turli o't pichani tajriba guruhidagi qo'ylar ratsionida beda pichani bilan almashtirib berilganligi uchun xazimlanuvchi proteinga bo'lgan talab qondirilgan bu bug'ozlikning 2-davrida xomilaning o'sish rivojlanishi uchun oqsil biosintezini to'liq bo'lishini ta'minlaydi.

Ratsion tahlili shuni ko'rsatadiki nazorat guruhidagi bo'g'oz qo'ylar ratsionida 1 ozuqa birligiga to'g'ri keladigan hazimlanuvchi protein 93 gr ni tashkil qilgan bu ko'rsatkich tajriba guruhida 106,8 gr ni tashkil qilgan. Me'yor talabi bo'yicha bo'g'oz qo'ylar ratsionida 100 – 105 gr bo'lishi kerak.

Xo'jalik sharoitida oziqlantirilayotgan nazorat guruhidagi qo'ylar ratsionida kalsiy fosfor nisbati 1:0,4 nisbatda bo'lganligi ratsion tarkibidagi ozuqalarning mineral to'yimlilik talabga javob bermaganligini ko'rsatadi.

Tajriba guruhidagi bo'g'oz qo'ylarning ratsionidamineral moddalarga bo'lgan talabini qondirish uchun ratsionga qo'shimcha mineral ozuqalardan

diammoniy fosfat qo'shib berildi va mineral moddalarga bo'lgan talabi qondirildi. Tajriba guruhida kalsiy fosfor nisbati 1:1,5 ni tashkil etgan.

Tajriba guruhidagi qo'ylarning ratsionida hazimlanuvchi protein, vitaminlar va mineral moddalar etarli darajada bo'lganligi uchun ularning semizlik darajasi o'rtacha va o'rtachadan yuqori bo'ladi.

4.6. Tajribadagi bo'g'oz qo'ylarning tirik vaznini o'zgarishi.

Nazorat tajriba guruhidagi bo'g'oz qo'ylarning ratsionini to'yimlilik bir xil bo'lib (1,22 ozuqa birligi) ratsion tarkibidagi turli o't pichani to'yimlilikiga mos ravishda veda pichanibilar almashtirib berish tajribadagi qo'ylarning hazimlanuvchi proteinga bo'lgan talabini qondirgan. Bundan tashqari ratsionda kalsiy fosfor nisbati ham nazorat guruhida 1 : 0,4 bo'lgan bo'lsa bu ko'rsatkich tajriba guruhida 1 : 1,5 ni tashkil qilgan. Bo'g'oz qo'ylar ratsionida kalsiy fosfor nisbati me'yor talabi bo'yicha 1 : 1,5 – 2 bo'lishi kerak bo'g'oz qo'ylar ratsionida mineral moddalarning etarli darajada bo'lishi xomilaning o'sish rivojlanishida ya'ni suyak to'qimalarini hosil bo'lishida muhim ahamiyatga ega.

Ratsion tarkibidagi hazimlanuvchi protein bo'g'oz qo'ylarning kunlik o'sishini ya'ni tirik vazni yuqori bo'lishi hamda homilani rivojlanishi uchun biosintezini ta'minlaydi.

Tajribadagi bo'g'oz qo'ylarning tirik vazni o'zgarishi.

(60 kun davomida)

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi		Tajriba guruhi	
	Tirik vazni kg	Kunlik o'sishi gr	Tirik vazni kg	Kunlik o'sishi gr
Tajriba boshida	42	-	42	-
1 oydan so'ng	45,3	110	48	166
2 oydan so'ng	49	123	54,5	216
60 kun davomida	49	116	54,5	208

Jalval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki tajriba boshida nazorat va tajriba guruhlaridagi qo'ylarning tirik vazni bir xil bo'lgan, 1 oy o'tkandan so'ng tarozidan o'tkazilganda nazorat guruhidagi qo'ylarning tirik vazni 45,3 kg, kunlik o'sishi 110 gr ni tashkil qilgan. Tajriba guruhida esa bu ko'rsatkich o'z navbatida, tirik vazni 48 kg bo'lib kunlik o'sishi 166 gr bo'lgan. Ikki oy o'tkandan keyin nazorat o'lchovi o'tkazilganda tajriba guruhidagi qo'ylarning tirik vazni 54,5 kg, ya'ni nazorat guruhiga nisbatan 5,5 kg yuqori bo'lgan. Kunlik o'sishi esa nazorat guruhida 123 gr tajriba guruhida esa 216 gr bo'lganligi kuzatildi.

Tajribadagi bo'g'oz qo'ylarning tirik vaznini o'zgarishi aniqlanib olingan natijalar tahlil qilinib ularning mutloq va nisbiy o'sish darajasi aniqlanildi. Olingan ma'lumotlar quyidagi jadvalda keltirilgan.

Tajribadagi bo'g'oz qo'ylarning mutloq va nisbiy o'sishi

(1 bosh hisobida)

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi			Tajriba guruhi			Tajriba va nazorat guruhi
	Tirik vazni kg	Mutloq o'sishi kg	Nisbiy o'sishi %	Tirik vazni kg	Mutloq o'sishi kg	Nisbiy o'sishi %	Guruhlarning farqi %
Tajriba boshida	42	-	-	42	-	-	
1 oydan keyin	45,3	3,3	7,8	48	6	14,2	6,4
2 oydan keyin	49	3,7	8,1	54,5	6,5	13,54	5,44
Tajriba davomida	49	7	16,6	54,5	12,5	29,76	13,16

Jadval ma'lumotlari bo'yicha, olingan ma'lumotlar tahlil qilinganda tajriba boshida 1 – 2 – guruhlardagi bo'g'oz qo'ylarning tirik vazni bir xil bo'lib 1 oydan keyin nazorat guruhidagi qo'ylarning tirik vazni 45,3 kg, mutloq o'sishi 3,3 kg, nisbiy o'sishi 7,8 % ni tashkil qildi. Bu ko'rsatkichlar tajriba guruhida esa mos ravishda 48 kg, 6 kg, 14,2% bo'lganligi aniqlandi. 2 oydan keyin nazorat guruhiga nisbatan

tajriba guruhidagi bo'g'oz qo'ylarning tirik vazni 5,5 kg, mutloq o'sishi 2,80 kg nisbiy o'sishi 5,54 % yuqori bo'lgan.

O'tkazilgan tajriba davomida olingan ma'lumotlarning ko'rsatishicha nazorat guruhidagi qo'ylarning tirik vazni 49 kg, mutloq o'sishi 7 kg, nisbiy o'sishi 16,6 5 bo'lgan bo'lsa bu ko'rsatkichlar tajriba guruhida mos ravishda 54,5 kg, 12,5 kg, 29,76 % bo'lganini ko'rsatadi.

Qo'ylarning bo'g'ozligining ikkinchi yarmida to'liq qiymtli ratsion bilan oziqlantirishni tashkil qilishlarning semizlik darajasini o'rtacha va o'rtachadan yuqori bo'lishini ta'minlaydi. Bu ularning normal fiziologik xolatda bo'lishini hamda qo'zilarining tug'ilgan paytdagi tirik vazni yuqori bo'lishiga olib keladi.bundan tashqari ona qo'ylarning tuqqandan keyin ularning sut mahsuldorligini yuqori bo'lishini, bu esa qo'zilarni sog'ish, kasalliklarga chidamli va tug'ilgandan keyingi davirlarda kunlik o'sishi yuqori bo'lishini ta'minlaydi.

Tajribadagi bo'g'oz qo'ylarni ratsionida hazimlanuvchi protein, vitaminlar va mneral moddalarga bo'lgan talabini me'yor darajasida bo'lishi tug'ilgan qo'zilarining tirik vazniga ko'rsatadigan ta'sirini o'rganish maqsadida nazorat va tajriba guruhlaridagi qo'zilardan tug'ilgan qo'zilarni tug'ilgan davridagi tirik vazni o'rganildi.

Tajribadagi bo'g'oz qo'ylardan tug'ilgan qo'zilarining tirk vazni
(O'rtacha bir bosh hisobida)

Guruhlar	Bosh soni	Onasini tirik vazni kg	Tug'ilgan qo'zilarining tirik vazni kg	Onasini tirik vazniga nisbatan
Nazorat guruhi	10	49	3,3	6,7
Tajriba guruhi	10	54,5	4,6	8,4

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki nazorat guruhidagi qo'ylardan tug'ilgan qo'zilarining tirik vazni 3,3 kg tajriba guruhidagi qo'ylardan tug'ilgan qo'zilar esa 4,6 kg bo'lganligi aniqlandi. YA'ni tug'ilgan qo'zilarining tirk vazni onasining tirik

vazniga nisbatan nazorat guruhida 6,7 % tajriba guruhida 8,4 % ni tashkil qilganligini ko'rsatadi.

Semizlik darajasi yuqori bo'lgan tajribadagi ona qo'ylardan olingan qo'zilar sog'lom va baquvvat bo'lib terisining sifatli va rangbarangligi bilan hamda terisining sathi kengligi bilan ham keskin ajralib turadi.

V. O'TKAZILGAN TAJRIBANING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Har qanday bajariladigan ilmiy tatqiqot ishlarining natijasi olingan iqtisodiy samaradorlik bilan belgilanadi.

Tajriba va nazorat guruhlaridan olingan qo'zilarining terisini sifati va o'lchamlari, satxi bo'yicha iqtisodiy samaradorlik hisoblanganda iqtisodiy samaradorlik yanada yuqori bo'lishi kerak edi. Lekin o'quv tajriba xo'jaligidagi qorako'l qo'ylardan olingan qo'zilar so'yilmaydi, chunki qorako'l teri etishtirish rejalashtirilmagan. SHuning uchun nazorat va tajriba guruhidagi qo'ylarning tirik vazni bo'yicha iqtisodiy samaradorlik hisoblab chiqiladi.

Tajribadagi qo'ylardan olingan tirik vazinning sotish bahosi nazorat va tajriba guruhlarida bir xil bo'lib tajriba guruhidagi qo'ylarning kunlik o'sishi yuqori bo'lganligi uchun olingan daromad miqdori ham ko'p bo'ladi.

O'tkazilgan tajribada qilingan xarajatlarni hisobga olgan holda sof foyda hisoblab topildi va 1 kg tirk vazining tan narhi hisoblab chiqildi.

Sof foyda va qilingan xarajatlar hisobga olinib tajribaning rentabillik darajasi hisoblab topildi.

Qo'yidagi jadvalda nazorat va tajriba guruhlarining iqtisodiy samaradorligi keltirilgan.

-jadval

Tajribaning iqtisodiy samaradorligi

Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Nazorat guruhi	Tajriba guruhi
Qo'ylarning tirik vazni	kg	49	54,5
Sotish bahosi	so'm	12000	12000
Olingan daromad	so'm	588000	654000
Qilingan xarajat	so'm	450000	450000
1 kg tirik vazning tan narxi	so'm		
Sof foyda	so'm	138000	204000
Rentabillik darajasi	%	30,6	45,3

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki nazorat va tajriba guruhlaridagi bo'g'oz qo'ylarning xo'jalikga keltirgan daromadi va sof foyda tajriba davomida olgan tirik vaznining sotish bahosi bo'yicha hisoblandi. Ikkala guruhdagi qo'ylarning sotish bahosi bir hil bo'lsada olingan daromad nazorat guruhida 588000 so'mni, tajriba guruhida esa 654000 so'mni tashkil qildi. Olingan sof foyda nazorat guruhida 138000 so'm bo'ldi bu ko'rsatkich tajriba guruhida nazorat guruhiga nisbatan 66000 so'mga yuqori ekanligi aniqlandi. Nazorat va tajriba guruhlariga qilingan xarajat bir xil bo'lsada nazorat guruhiga nisbatan tajriba guruhida rentabillik darajasi 14,7 % ga yuqori bo'ldi. demak qo'ylarning bo'g'ozlik davrida to'liq qiymatli ratsion bilan oziqlantirishlarni semizlik darajasini o'rtacha va o'rtachadan yuqori bo'lishini ta'minlaydi, bu esa xomilaning o'sish va rivojlanish darajasini yuqori bo'lishida katta ahamiyatga ega.

VI. EKOLOGIK MUAMMOLAR, XAYOT FAOLIYATI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI MASALALARI

CHo'l yaylovlari hosildorligini yaxshilashni ekologik tabaqalashgan texnologiyalari. YAylovlar holatini tubdan yaxshilash tufayli yaylov ishlari, ular tarqalgan ekologik shart-sharoitlarni hisobga olgan holdagina yuqori samara berishi mumkin.

O'z navbatida zanal xususiyatlarini e'tiborga olinib, yaylovlar hayotini yaxshilash chora tadbirlari amalga oshirilsa, yaylov maydonlarining ozuqa zaxiralarini uzoq muddat pasaytirmay mol boqish imkonini vujudga keltiradi.

Hozirgi kunda talaygina tabiiy cho'l yaylovlari turli darajada inqirozga uchrab hosildorligi keskin pasayib ketmoqda. SHu boisdan yaylovlarning inqiroz darajasiga qarab ularni yuzaki yoki tubdan yaxshilash tadbirlarini qo'llash lozim.

Quyida har bir cho'l ekologik adirlarning o'ziga mos zanal xususiyatlarini e'tiborga olib ularni tubdan yaxshilashning tabaqalashgan texnologiyalari bayoni qaytarilmoqda.

6.1. Qumli cho'l yaylovlarini yaxshilash texnologiyalari.

Qumli yaylovlar morfologiyasi sharoitlari, qumlarning mustahkamlanganligi inqirozga uchrash darajasi, relefi va hokazolar hisobga olingan holda tubdan yoki yuzaki yaxshilash masalasi aniqlanadi.

Qumli yaylovlarni yuzaki yaxshilashda ikki holat nazarda tutiladi. Birinchidan yaylovning ozuqa zaxirasi oshiriladi. Ikkinchidan ozuqaning sifatiga sezilarli yaxshilanadi.

Yaylovlarni tubdan yaxshilanganda uning inqirozga uchragan qismida tuproqqa mintaqachalar (helsalar shaklida) ishlov berib ishlov agrofetosenozlari (chinlari) barpo etiladi. Agrofetosenoqlar barpo etishi bir vaqtning o'zida uch vazifani amalga oshirish imkonini beradi.

1. Yaylov hosildorligi oshadi.
2. Ozuqa sifati yaxshilanadi.
3. O'simlik konlarida yaxshi o'simliklar turlari va miqdori keskin ko'payadi.

Qumli yaylovlar holatini yaxshilash texnologiyalari er maydonlarini va fitomelkozalarini jamlash tanlangan maydonlarni ekishga tayyorlash. Ekin muddatlari, urug' qadash chuqurliklari, urug' me'yori, ekish usullarini aniqlash kabi tarkibidan iborat.

Yaxshilashga mo'ljallangan muayyan yaylov maydonlarini tanlash geobotanik, tuproq, gidrologik ma'lumotlarni o'rganish asosida amalga oshiriladi.

Birinchi navbatda, kuchli inqirozga uchragan, imkoniyati bo'lsa, reliefi nisbatan tekis, quduqlarga yaqin maydonlar yaxshilash uchun ajratilishi lozim.

Qumli cho'l sharoitida shamol eroziyasining oldini ochish uchun yaxshilanadigan yaylov maydonlari (mayda uydek tepali qumlar) ga maxsus ishlov berilmaydi. Tuproq yuzasi zichlashgan maydonlarga shudgorlashning o'rniga tuproq yuzasi (zichlashgan) mintaqachalar

(kengligi 5-10 metr) hamda 10-12 sm chuqurlikkacha bora ololsa qumoq.

SHuningdek, oldindan ko'chatlar saksovul etishtirilib so'ngra ular yaylovga ko'chirilsa, maxsus ishlov berish ham talab qilinmaydi.

Urug' sepish o'rniga ko'chat o'tqazish texnologiyasi ekologik va iqtisodiy jihatdan ancha ixcham va yuqori samarali hisoblanadi. Urug' sepish vositasida tadbirlar amalga oshirilganda aksariyat bitomeliorantlarni qulay ekish muddatlari – kuz – qish oylari hisoblanadi.

Zarur zichlikdagi ekinlar olish uchun quyidagi urug' sarfi qo'llaniladi, yarim bo'talar (izen, cho'g'on, teresnen) 15-20 kg ga o'tchilik turlari (baliq ko'z, o'sma) 6 – 8, bo'talar uchun (sapsovullar, qondishlar, chernezlar) – 10 – 18 vg/ga teng.

Relifi nisbatan tekis qum tepalar oraliqlari maydonlarini bitomelkozasiylashda foydalanish yaxshi samara bersa, boshqa joylarda qum ko'chishi yoki mahalliy moslamalar yordamida amalga oshirishi mumkin.

Mayda uydish tepalik maydonlarda sapsovul, izen urug'lari 2-3 sm undan yirikroq urug'lar (cho'g'on, chernez, qandim) – 3 – 4 sm chuqurlikka qadalsa qoniqarli qalinlikdagi maysalar olishga erishiladi.

Bo'talar, yarim bo'talar, o'tchil turlar aralashmasidan iborat, barpo etish yaxshi samara berish isbotlangan. Bunday aralashmada bo'talarning (oq sapsovul, chernez, qandim) ulushi 20 – 25% yarim bo'talar (izen, teresnen, cho'g'on) – 45-50 va o'tchil turlar (baliq qo'z, kumarchin, o'sma, paxtabosh) – 25-35% bo'lishi maqsadga muvofiq.

Qumli bo'lmagan cho'l hududlari yaylov holatini yaxshilash xususiyatlari.

Ma'lumki Respublikamizning shuvoq efemerli, adir yaylovlari holatini tubdan yaxshilovchi ixotayyorlar, turli mavsumlarda foydalanishga mo'ljallangan yaylov agrofitosenozlari, adirlarda kuzgi-qishgi yaylovlar barpo etish texnologiyalari ishlab chiqarilib qo'llanilib kelinmoqda.

O'zbekistonning qumli bo'lmagan cho'l hududlarining inqirozga uchragan va yirik bo'talar o'smagan yaylov maydonlarida qora sapsovul, chernoz, cho'g'on aralashmalaridan etish borasida yaxshigina tajriba to'plangan. Ixotozorlar barpo etishda, qumli cho'llarga o'xshash bioseta urug' qadash yoki ko'chatlardan foydalanish yaxshi samara beradi. Jumladan urug' ekish me'yori qora sapsovul urug'larining sifat ko'rsatkichlari bilan belgilanadi. Har bir gektar ishlov berilgan mintaqachalarga 1,2 klassik qora sapsovul urug'idan 9-10,5 kg, chernoz urug'idan 25-31 kg sarflansa yaxshi samara olinishi kafolatlanadi.

Ko'chatlardan foydalanilganda esa muayyan sharoitga qarab maxsus ishlov berilmagan maydonning har 5-8 metriga 1 donadan ko'chat sarflanib qatorlar oralig'i ham shu kenglikda belgilanadi.

Ko'chatlar dalaga fevral – mart oyidan kechiktirilmasdan 35-40 sm chuqurlikka o'tqaziladi. Bunda ko'chat o'tqazuvchi maxsus mexanizmlar yoki qo'l kuchi qo'llaniladi.

Standart talabga javob beruvchi ko'chatlar (sapsovul, chernozlar, qandimlar) ning bo'yi 25 sm, ildiz bo'g'izining eni 3-4 mm va ildizining uzunligi 35-40 sm dan kam bo'lmog'i lozim. Ta'kidlamoq lozimki, qorako'lchilik yaylovlari holatini tubdan yaxshilashning muhim va

samarali usuli – yaylov ekinzorlari (agrofitosenozlari) barpo etish hisoblanadi. Uning afzalligi shundaki, maxsus fitomeliorantlar tarkibini aniqlash vositasida mavsumiy (bahorgi – yozgi, kuzgi – qishki va yil davomida) foydalanishga mo‘ljallangan maydonlar barpo etish imkoniyati tug‘iladi.

VII. XULOSALAR, TAKLIFLAR VA ISHLAB CHIQRISHGA TAVSIYALAR

O'tkazilgan tajriba natijalariga asoslangan holda quyidagi xulosalarga kelindi.

1. CHorvachilikni rivojlantirish hozirgi davirdagi dolzarab masalalardan biri bo'lib hisoblanadi, shuning uchun mamlakatimiz prezidenti tomonidan chorvachilikni rivojlantirish to'g'risida chiqargan qaror va farmonlarini bajarilishini ta'minlash zarur.

2. Qorako'lchilikni rivojlantirish uchun qorako'l qo'ylarining bosh sonini ko'paytirish va ularning mahsuldorligini oshirish lozim.

3. Qorako'l qo'ylarini bo'g'ozlik davrida to'liq qiymatli ozqlantirish ulardan olinadigan qo'zilarini sog'lom, kasalliklarga chidamli va qo'zilarining o'sish rivojlanishdarajasini yuqori bo'lishini ta'minlaydi.

4. Qo'ylarni bo'g'ozligining ikkinchi yarmida oziqlantirishni to'g'ri tashkil etish ularning semizlik darajasini o'rtacha va o'rtachadan yuqori bo'lishini ta'minlaydi.

5. Qorako'lchilikni rivojlantirish mamlakatimiz aholisini go'sht mahsulotlari va sanoatni jun, teri, qorako'l teri bilan ta'minlashda katta ahamiyatga ega, shuning uchun qorako'l qo'ylarining bo'yoq sonini ko'paytirish, tug'ilgan qo'zilarini to'liqlashtirishga qoldirish lozim.

6. Qora ko'l qo'zilarini bosh sonini ko'paytirish va ularni to'liq qiymatli ratsion bilan oziqlantirish ulardan olinadigan mahsulot miqdorini va sifatini oshirishda katta ahamiyatga ega.

7. Qo'ylarni to'liq qiymatli ratsion bilan oziqlantirishni tashkil etish samaradorlikni yuqori bo'lishini ta'minlaydi, rentabillik darajasini 14,7 % yuqori bo'lishiga olib keladi.

Bajarilgan bitiruv malakaviy ish bo'yicha o'tkazilgan ilmiy tajribalarning natijasidan olingan ma'lumotlar asosida keltirilgan xulosalar bo'yicha ishlab chiqilgan quyidagi tajriba va tavsiyalarni beramiz.

1. Mamlakatimiz prezidenti tomonidan chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha chiqarilgan qaror va farmoyishlarni keng jamoatchilik o'rtasida targ'ibot qilishva shirkat, fermer hamda shaxsiy xo'jaliklarda qo'ychilikni tashkil etish va rivojlantirishni taklif etamiz.

2. CHorvachilikni asosiy sohalaridan biri bo'lgan qo'ychilik ayniqsa qorako'lchilikning mamlakatimizning cho'l hududlarida tashkil etish va qishloq aholisini ish bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish imkoniyatlarini izlab topishni taklif etamiz.

3. Qo'ychilikga ixtisoslashgan chorvachilik fermer xo'jaliklarini tashkil etish va mamlakatimiz hududidagi yaylovlardan unumli foydalanishni taklif etamiz.

4. Qo'ylardan ayniqsa qorako'l qo'ylarini bosh sonini ko'paytirish va ulardan olinadigan mahsulot miqdorini va sifatini oshirish uchun mustahkam ozuqa bazasini yaratish, me'yor asosida ratsion tuzib to'liq qiymatli ratsion bilan oziqlantirishni tavsiya etamiz.

Foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxati.

1. Karimov. I.A. "O'zbekiston iqtisodiy islohatlarni chuqurlashtirish yo'lida". Toshkent "O'zbekiston" 1995 yil
2. Karimov.I.A."O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish"
Toshkent – 1999 yil.
3. Karimov. I.A. "Jahon moliyaviy – iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari". Toshkent – "O'zbekiston" – 2009 yil.
5. Naslchilik tug'risida" gi Davlat konuni. Toshkent. 1995 yil 21 dekabr.
- 6."SHaxsiy yordamchi. Dehqon va fermer xo'jaliklarida chorva mollarini ko'paytirishni rag'batlantirishni chora-tadbirlari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PK-308 sonli qarori. Toshkent 2006 yil 13 mart.
7. SHaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo'jaliklarida chorva mollarini ko'paytirishni rag'batlantirishni kuchaytirish xamda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi prezidentining PK-842 sonli qarori. Toshkent 2008 yil 21 aprel Bakanov V. H. , Menkin V. K. "Karmlenie selsko – xazaystvennix jiyvotnix" Moskva "V O Agropromizdat 1998 yil.
8. Valiev R.G. «Ispolzovanie zavoznykh karakulskix proizvoditeley i gosplemzavoda» «Konimex» Tr.VNIIK.tom13. 1983.s. 131-139.
9. Vasin B.N. «Nasledovvanie prolojitelnosti embrinalnogo razitiya i usanavlenie svyazi mejdu chislom dney otnoşeniya i kachestvom smushka» V.kn. Seleksiya karakulskix ovets. M., Sovetskaya Aziya 1993.s.103-1
10. Vorobevskiy A.P. «Nekotorye voprosy mexanizma izmeneniya i razvitiyakarakulskix zavitkov» v kiniga konferensii molodyyx uchyonnyx po s/x Uzbekiston 1990. Tashkent.
11. Gaziev A. va boshkalar. «Kora rangli qorako'l qo'ylari seleksiyasi samaradorligini oshirish usullari».(Uslubiy ko'rgazmalar). Samarqand. 2001. 9-bet.
12. Gaziev A. va boshkalar. «Kora rangli qorako'l qo'ylari seleksiyasi samaradorligini oshirish usullari».(Uslubiy ko'rgazmalar). Samarqand. 2002. 9-bet.

13. Giyosov M.A. va boshqalar. «Qorako‘lchilikda seleksiya yutuqlarini aprobatsiyadan o‘tkazish bo‘yicha Nizom». Toshkent.2001.9-bet.
14. Djuraev F.J. «Razvitie karakulvodstva Uzbekiston v novyx usloviyax xozyaystvovatsiya» Toshkent «Mexnat» 2001. S.72-92.343s.
15. Elmesov K.E. «K voprosu sozdaniya stada karakulskix ovets s rebristym zavitkov» v sovxoze «Tasty», VKI: Problemy gaistini i v krakulevodstve. Agmoty «Kaynar» 2000. S.70-74.
16. Zokirov M.D., Atamurodov K.A., Haydarov YA.X. “Hayvonlar xom-ashyosi tovarshunoslik” Toshkent 1999.89-93-306 betlar.
17. Iskandarov M.SH., Tursunov SH. «Zagotovki i pererabotka produksiya karakulevodstva rynochnyx usloviyax». Qorako‘lchilik va cho‘l oziqa ishlab chikarish texnologiyasi. O‘zKIITI ilmiy maqolalar to‘plami. Samarkand 2001. 25-29.
18. Ismoilov A., Murtozaev O. “qishloq xo‘jalik iqtisodiyoti” Toshkent 2005 yil
19. Kalashnikov A. P. “Chorvachlikda ozuqa normalari va ratsionlari” Toshkent “Mehnat” 1988 yil.
20. Nurallaev YA. “Qorako‘lchilikda naslchilik ishlarini yuritish” Toshkent. “Mehnat” 1996. S.274.
21. Ombaev A., Maminov X., SHaxgalaev I.R. “Tovarno-texnologicheskie svoystva shkurok karakulchi nauchennых pri zaboe staro vozrazstnyx ovetsematok” . Aktualnye voprosy karakulevodstva. Alma-ata “Layder” 2004. Tom 9. S 147-152.
22. YUsupov S.YU., Ismoilov A.I., Raximov A.A. “Qorako‘lchilik” Toshkent. “Mehnat” 1996.
23. YUsupov S.YU., Ro‘zimurotov R.X. “Qorako‘lchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi” Samarqand 1995, 178 b.
24. R. Hamraqulov, K. K. Karibaev “Qishloq xo‘jalik hayvonlarini oziqlantirish” Toshkent 1999 yil.
25. Ergashev R. X. “Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti” Toshkent 2011 yil

26. www.ziyonet.uz. –axborot – talim 71ortal
27. www.stat.uz, O‘z.R- Davlat statistika qo‘mitasi sayti
28. www.agro.uz, O‘Zr- Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi sayti
29. www.academy.uz. O‘z.R Fanlar akademiyasi sayti
30. www.ftk.cc.uz –O‘z.R Vazirlar mahkamasi huzuridagi fan va texnologiyalari rivojlanishini muvofiqlantirish qo‘mitasi sayti
31. www.mineconomy.uz – O‘z.R Iqtisodiyot vazirligi sayti.
32. www.fermer.ru.

И Л О В А

1. Этологические признаки животных - пищевая, двигательная и общая активность имеют важное селекционное значение в скотоводстве. Индексы этологической активности связаны с возрастом и физиологическим состоянием животных. У сухостойных коров, по сравнению с лакти-рующими, двигательная активность ниже. В первые 100 суток лактации по сравнению с последующим периодом на 3,6-10,8% ($P>0,999$) повышаются все изучаемые этологические признаки.

2. При проявлении у крупного рогатого скота показателей пищевой, двигательной и общей активности характерен средний и высокий уровень повторяемости. У племенных бычков он составляет 0,5 при $P>0,999$. У коров черно-пестрой, симменталской и красно-пестрой пород коэффициент повторяемости по 1-ой лактации в среднем равен 0,7 при $P>0,999$, у полновозрастных животных он находится на уровне 0,6 при $P>0,999$.

3. Этологические индексы у коров изученных пород являются наследственно обусловленными признаками. Коэффициент корреляции это-логических показателей у коров-полусестер по отцу, в среднем составляет +0,3 при $P>0,999$. Коэффициент наследуемости этологических признаков с учетом всего массива исследуемых животных равен 54%. Высокий уровень групповой изменчивости этологических показателей у продуктивных животных обеспечивает необходимый продуктивный эффект этологического отбора.

4. Взаимосвязь между индексом общей активности и живой массой племенных бычков черно-пестрой породы при их развитии составляет +0,35 при $P>0,99$. У более активных бычков в основные периоды развития живая масса в среднем повышается на 9,8% при $P>0,95-0,999$ по сравнению с инфрапассивными животными. Этологически пассивные бычки занимают промежуточное положение.

5. Животные черно-пестрой породы с голштинской «кровью» с повышенной молочной продуктивностью тратят больше времени на поедание корма. Коровы с высоким суточным удоем на момент исследований имеют повышенную пищевую и двигательную активность.

6. Отбор животных черно-пестрой породы вологодской селекции по индексу пищевой и двигательной активности сопровождается повышением надоя за 1-ю лактацию до 13,1% при $P>0,999$ и по общей активности до 5,6%. Наиболее реагирующими являются коровы полновозрастной лактации. Разност по надою за 305 суток лактации, количеству молочного жира и коэффициенту молочности у них доходит соответственно до 17,8; 17,4 и 22,7% при $P>0,999$. У черно-пестрых животных ультраактивного и активного типов пищевой активности надой за 305 суток лактации выше до 14,3% ($P>0,95$) - 21,2% ($P>0,999$). Этологически активные животные имеют высокодостоверное повышение количества молочного жира и коэффициента молочности.

7. У черно-пестрых коров тамбовской селекции в племзаводе «Пригородный» разност по надою у первотелок и полновозрастных коров

в условиях отологического отбора доходит до 11,6% ($P>0,99$) и 17,5% ($P>0,95$). В племязаводе им. Ленина разност по надое у полновозрастных коров она составляет до 13,3% при $P>0,95$.

8. Отбор симменталского и красно-пестрого скота по уровню этологических признаков в условиях большой выборки животных сопровождается повышением надоя и количества молочного жира за 305 суток 1-ой лактации до 9,5% и коэффициента молочности до 11,2%. С учетом полновозрастной лактации надой за 305 суток у коров возрастает до 12,4%, количество молочного жира до 13,0% и коэффициент молочности до 12,4% при $P>0,999$.

9. На уровень молочной продуктивности коров значительное влияние оказывает суммарно действующий этологический отбор с учетом нескольких индексов. В разрезе изученных пород молочного и молочно-мясного направления эффективность эго возрастает в 1,4-3,0 раза по сравнению с селекцией по отдельно взятым этологическим признакам.

10. Исследования, проведенные на наследственно сходных живот-"ных, подтверждают эффект этологического отбора, особенно по индексу пищевой активности. Повышение надоя у животных за 1-ю лактацию доходит до 15,4%, количества молочного жира до 15,1% и коэффициента молочности до 14,8% при $P>0,95$. Разност в надое за лактацию у активных и ультраактивных животных по сравнению с пассивными и инфрапассивными возрастает до 19,3% при $P>0,999$. Суммарно действующий этологический отбор животных способствует повышению показателей молочной продуктивности в 1,4-2,6 раза по сравнению с селекцией по отдельно взятым этологическим признакам.

11. Селекция животных по этологическим индексам благоприятно сочетается с одновременно направленным отбором по родословной, обеспечивая повышение эго эффективности. Ранговое распределение этологических линий по уровню молочной продуктивности совпадает с таковым по сумме этологических индексов. Животные, относящиеся к различным генеалогическим линиям, по-разному реагируют на этологическую селекцию. Наиболее реагирующими являются животные более продуктивных генеалогических линий.

12. У этологически активных коров отмечается более интенсивный белковый, углеводный и минеральный обмен веществ. Активные и ультраактивные животные по сравнению с пассивными и инфрапассивными имеют повышенное содержание гемоглобина ($P>0,95$), общего белка ($P>0,95$), а также глюкозы в крови. В сыворотке крови таких коров содержится больше кальция и неорганического фосфора.

13. Расчет экономической эффективности показывает, что стоимость дополнительной молочной продукции, приходящаяся на 1 животное, составляет 3791-6147 р. В целом по симменталской и черно-пестрой породе по сравнению с красно-пестрой породой животных эффект выше на 14,2-24,7%.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. В хозяйствах с высоким уровнем кормления при отборе племенных животных использовать в качестве признака селекции этологические индексы пищевой, двигательной и общей активности.

2. В селях значительного повышения показателей молочной продуктивности коров рекомендовать проводить селекцию по сумме этологическим индексам, а также в сочетании с отбором по родословной.

3. Результаты выполненной работы рекомендуются для применения в учебном процессе аграрных вузов, в работе научно-исследовательских институтов, станций и лабораторий, а также при написании учебных пособий, монографий и других научно-практических работ.

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

В рецензируемых научных журналах ВАК РФ:

1. Гаврилин С.А. Отбор молочного скота по этологической индивидуальности / А.Г. Кудрин, С.А. Гаврилин // Зоотехния. - 2007.-№6,- С. 21-23.

В материалах международных конференций:

2. Гаврилин С.А. Использование этологических параметров в селекции молочного скота. / А.Г. Кудрин, С.А. Гаврилин // Современные проблемы технологии производства, хранения, переработки и экспертизы качества сельскохозяйственной продукции. - Материалы международной научно-практической конференции. - Т.2. - Мичуринск, 2007. - С. 108-111.

3. Гаврилин С.А. Использование этологических индексов в селекции крупного рогатого скота / А.Г. Кудрин, С.А. Гаврилин // Селекционно-технологические аспекты повышения продуктивности сельскохозяйственных животных в современных условиях аграрного производства. - Материалы международной научно-производственной конференции. - 4.2. - Брянск, 2008. - С. 193-196.

В трудах всероссийских конференций:

4. Гаврилин С.А. Этологические параметры и молочная продуктивность длительно используемых коров / А.Г. Кудрин, С.А. Гаврилин // Селекционно-генетические и эколого-технологические проблемы повышения долгодельного продуктивного использования молочных коров. - Научные труды. - Вып. 8. - Брянск, 2006. - С. 16-20.

5. Гаврилин С.А. Этологические факторы продуктивного использования коров / А.Г. Кудрин, С.А. Гаврилин // Селекционно-генетические и эколого-технологические проблемы повышения

долголетнего продуктивного использования молочных коров. - Научные труды. - Вып. 9. - Брянск, 2006. - С. 34-37.

В настоящее время наукой определены, а практикой подтверждены три основных направления интенсификации производства говядины.

Первое. Эффективное использование животных раёнированных пород комбинированного направления продуктивности, через генетическое повышение их потенциала мясной продуктивности, интенсивное выращивание молодняка и убой скота в молодом возрасте с большей живой массой. Экспериментальные данные, в том числе и авторов данной статьи, в АО "Славянское" Верховского раёна показывают, что от молодняка разводимых в области пород можно получать в сутки 800-850 г, а к двухлетнему возрасту он способен достигать живой массы 450-500 кг при убойном выходе 56-58%.

Второе. Широкое применение промышленного скрещивания коров и телят черно-пестрой и симменталской пород с быками-производителями мясных пород. И хотя первыми исследователями в этом направлении были США, в настоящее время законодателем таких работ является Европа, где в большинстве стран даже с развитым мясным скотоводством (Великобритания, Франция, Италия) значительную часть говядины производят за счет выращивания помесей. Молодняк, полученный за счет такого скрещивания по сравнению со сверстниками раёнированных пород, обладает повышенной на 10-15% энергией роста, расходует на 8-10% меньше кормов на единицу прироста живой массы, характеризуется большим убойным выходом (58-60%) и лучшим качеством мяса.

Расчеты показывают, что с каждой головы помесного молодняка можно дополнительно получать по 40-50 кг мяса, и на товарных хозяйствах можно осеменить быками мясных пород до 20% коров.

Однако, основной причиной отсутствия работы в этом направлении в нашей области, на наш взгляд, является отсутствие элементарного учета и контроля в ряде хозяйств за движением поголовья, как маточного, так и ремонтного. Там же, где этот вопрос решен, выгода очевидна.

Третье. Развитие мясного скотоводства, как за счет расширения воспроизводства мясного скота, так и использования помесных телок, полученных при промышленном скрещивании в молочном скотоводстве. Ранее ("КАРО" Н 1-2) нами уже отмечалось фактическое отсутствие специализированного мясного скотоводства в нашей области, что не может быть оправданным. Уменьшившееся за последние 10 лет поголовье крупного рогатого скота в области при всех своих негативных сторонах,

тем не менее, невольно создало ситуацию для успешного разведения мясного скотоводства, особенно в северо-западных районах, где насчитывается сегодня лишь несколько сотен голов крупного рогатого скота. Основными условиями разведения специализированного мясного скота являются наличие пастбищ и помещений легкого типа (по канадскому и американскому опыту). И пастбища, и помещения потребуют для своего создания или реконструкции небольших затрат, которые быстро окупятся, что же касается самих животных, то выше уже были обозначены основные направления их разведения. В связи с этим необходимо отметить, как отечественный, так и зарубежный опыт создания мясного типа скота на широко распространенном симментальском скоте с использованием имеющегося на государственном племенном предприятии "Орловское" семени быков шаролеизской, лимузинской, абердин-ангусской и других мясных пород. Селекция на создание собственного специализированного мясного скота диктуется не только соображениями развития мясного скотоводства как отрасли, но и фактическим отсутствием отечественных мясных пород, отвечающих запросам современного потребительского рынка.

Таким образом, интенсификация производства говядины в соответствии с изложенными основными направлениями позволит решить не только проблему снабжения населения говядиной, но и даст импульс развитию мясной отрасли на качественно новом уровне уже в ХХI-ом столетии www.голденпагес.уз