

УЗБЕКИСТОН КИШЛОК ВА СУВ ХУЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ АГРАР УНИВЕРСИТЕТИ

ЗООТЕХНИА
ФАКУЛТЕТИ

ИПАКЧИЛИК
ЙУНАЛИШИ

2-57ГУРУХ
ТАЛАБАСИ

НАЗИРКУЛОВА
ФОТИМА

БЕГОНА УТЛАР МАВЗУСИ БУЙИЧА

АЛЪБОМ

Тошкент
2013
Абдалова Т.

ТОШКЕНТ-2013.



- а. Сарықашықабөге - *Melilotus officinalis* adans
 дуқсақдошлар (Leguminosae) ошмасига киради.
 МДХнинг бутун Европа ва Осиё қисмида тар-
 қалган. Биринчи даражада оз шўрл ерда урр.
- б. Қрқийт - Тагахасит *Taraxacum vulgare* (Lam.) мурак-
 кабгулдошлар (Compositae) ошмасига киради.
 Халла ерда тарқалган.

А. Сарик кашкарбеда- Марказий Осиё давлатларида богларда, арик буйларида усади. Европада эса бошокдошлар орасида, шудгорларда ва ташландик ерларда усади. Пояси тугри, пояси 30-100см ва ундан ортик. Июндан кузгача гуллайди. Уругдан купаяди. Битта усимлиги 17 минтагача уруг тугади, улар тупрокда унувчанлигини 20 йилдан ортик саклайди. Уруги етарли даражада нам булишига талабчан, кийинчилик билан унади. Кашкарбеда биринчи йили гулламайдиган поя хосил колади. Кишда бу пояси нобуд булади, кишлашда факат илдизи ва илдиз бугзидаги куртаклари колади. Келгуси йили бахорда илдиз бугзи куртаклари уса бошлайди ва поя чикаради, улар гуллайди ва хоил тугади. Хосил бергандан кейин кузга бориб, усимлиги бутунлай нобуд булади. Иккинчи йили кашкарбеда бакувват ривожланган поялари билан экинларни каттик сикиб куяди ва хосилни йигиштириб олишга халакит беради. Ёввойи кашкарбедани молларга беришга ярамайди, чунки таркибида хайвонлар хаёти учун хавфли булган кумарин моддаси бор. Кашкарбеданинг таркибида кумарин моддаси булмаган навлари чикарилган.

Б. Кокиут- богларда, полизларда, ташландик ерлар атрофида жуда куп усади. Каучукли усимлик-куксагиз экин орасида усадиган энг зарарли бегона ут хисобланади. Поясининг ичи буш, баргсиз, буйи 15-36 см, илдиз бугзидан чиккан барглари патсимон киркилган шаклда. Тупгули олтин ранг-сарик гули саватча. Апрельдан сентябргача гуллайди. Уругдан ва кисман илдиз бачкиларидан купаяди. Уругда думчалари булиб, шулар ёрдамила шамол билан таркалади. Битта усимлиги 250-700та уруг тугади. Уруги пишиши билан тезда униб чикади. Уругини 0,5-1 см кумилса бас. Пишиб етилмаган уруглари хам униб чикади. Биринчи йили усимлик тупбарг ва укилдиз, иккинчи йили эса гулловчи поя чикаради.



а. Ёввойм цутожикўроз

цутожикўроздом / ошласига киради. МДХ да
55-60° ш. кенгликдаги ҳамма жойда тарқалган.
У XVI асрда Америкадан Европага келиб қалган.

б. Қурмак - *Echinochloa macrocarpa* Vasingg
бешоқдомлар (Gramineae) ошласига киради.
Шолининг характерлик белгиси ўти ҳисоби.

А. Оддийгултожихуроз, кизилча- юмшатишган ва угитланган ерларни ёктиради. Асосан у чопик килинадиган экинлар: гуза, картошка, лавлаги, полиз ва сабзаёт экинлари орасида усади. Пояси тугри, куп кисми шохланган, буйи 100 смгача етади. Гултожихуроз Ўзбекистон шароитида июн-августда гуллайди ва июлдан сентябргача ҳосил тугади. Факат уругдан купаяди, куп ҳосил бериши билан бошқалардан фарк қилади. Яхши ривожланган битта усимлиги 500 мингдан ортик уруг тугади. Уруги 22-26⁰ униб чиқади. Етилмаган уруги ҳам деярли етилган уруги каби униб чиқади. Зарарланган уруглари тузрок униб чиқади. У лавлаги майсаларига ухшаш кизил булгани учун лавлаги орасидан утаб ташлаш кийин (унинг кизилча номи ҳам шундан келиб чиққан).

Б. Курмак- биологик хусусиятлари шоли билан деярли бир хил. Уларнинг уруги бир вақтда униб чиқади ва ёш вақтида бир-бирига жуда ухшайди, бу унга қарши қурашишни кийинлаштиради. Курмак шоли донини жуда ифлослантиради донни курмакдан тозалаш жуда кийин иш.

Курмак фақат генератив усулида купаяди. Битта уимликда 2 минггача уруг ҳосил булади. Август-сентябрда гуллайди. Шоликорликда курмакдан ташқари, карантин бегона утларнинг бошқа тури-говкурмак (*E. Cruyicola Vasing*) ҳам тарқалган. У биологияси жиҳатидан курмакдан деярли фарк қилмайди. Жуда қиска 8-15 см (курмакда 20 см гача) руваги билан ажралиб туради. Барг нави узун тукчалар билан калин қопланган. Говкурмакнинг уруги курмакнинг уругидан майда булади. Курмак ва говкурмак шамакка қараганда даланинг ута нам булишига чидайдди, лекин сув бутунлай булмаслигига бардош бера олмайди. Шамак кургоқчиликка чидамли экинлар орасида уса олади. Курмакка ва шолининг бошқа бегона утларига қарши, асосан сув режимини бошқариш йули билан қурашилади. Шолипояга қиска вақт сув бостирилса, улар сув остида нобуд булади.



а. Ёвбойи ниёз - *Allium rotundum* L. Ниёз
 гулдошлар (*Liliaceae*) оиласига киради.
 Урта Осиёда, Туркия ва МДХнинг Европа
 қисмида тарқалган.

б. Зуботурму - *Plantago major* зуртурмудош
 (*Plantaginaceae*) оиласига киради. Халла
 жойда урқайди.

А. Ёввойи пиёз- Узбекистонда асосан, богларда, токзорларда, қисман экинлар орасида учрайди. Бегона ут сифатида алохида ахамиятга эга эмас, осон йуқолади. Пиёзбош ва уругдан купаяди. Пояси оддий, ярмигача барг билан копланган, буйи 30-60 см, Узбекистонда май-июнда гуллаиди.

Б. Зуптурум – далаларда, полизларда, йуллар, арик буйлари, богларда учрайди. Бурглари кенг тухумсимон булиб, илдиз бугизидан чикади. Асосан уругдан купаяди. Майдан ноябргача хосил тугади. Битта усимлиги 6-80 мингта уруг тугади, булар тупрокда унувчанлигини камида 7 йил саклайди. Уруги купи билан 2-3 см чуқурликдан тез униб чикади. Биринчи йилида усимлик факат тупбарг ва уқилдиз, иккинчи йили эса гулловчи поя чикаради.



а. зунай - *Sorghum halepense* (L. Brot) Бошокгошлар (Gramineae) оиласига киради. Ўрта Осиёда, Кавказ ва Ўрмулда узрайди.

б. Аэриус - *Cynodon dactylon* (L) Pers. Бошокгош оиласига киради Марказий Осиё давлатларида, Кавказда ва МДҶ нинг Европа қилишнинг жанубий туманларда.

А. Гумай- Урта Осиёда гумай гуза орасида усадиган энг зарарли бегона ут хисобланади. Май-июнда гуллайди, июл-октябрда хосил тугади. Поясининг буйи 1,5 м гача етади, паст томонидан шохлайди, гумай уругдан ва айникса илдизпоясидан купаяди. Битта усимлиги 2-3 минта уруг тугади, булар тупрокда узок вақт сакланади. Уругнинг тиним даври 7ойгача даовм этади. Уругдан усиб чиккан гумай , гуллаш олдидан илдизпоя чикаради. Бу вақтда уни култивация ёки уток килиш билан йукотиш керак. Бир туп усимлигида 1-80 тагача илдизпоя ва 800 тагача бугим хосил булиши мумкин. Гуза ва бошка экинларни илдизпоялари жуда сиқиб куяди. Кособуцкий маълумотларига кура, жқда ифлосланган далаларда гумай илдизпоясида бачки чикарадиган 500 минггача куртак булиши мумкин. 1,5 м даги узунликдаги илдизпоя тупрокда 80 см гача чуқурликда, асосий кисми (90-95%) 20 см чуқурликда жойлашади. Гумайнинг баланд пояси экинларни жуда соялаб куяди.

Гумай ташки белгиларига кура суданутга ухшайди ва унинг энг зарарли бегона ути хисобланади. Ёш новдалари баъзан моларни захарлайди.

Б. Ажрик- Узбекистонда барча экинлар орасида, айникса, гуза орасида ниҳоятда куп усади. 1 балл шурланган, оз шурланган тупроқларда учрайди. Илдизпояси шурланиб усадиган ингичка кукиш чизикли-лентасимон баргли, панжасимон тупгулли усимлик. Пояси бугимли, куп баргли, шохланган, буйи 30-50 см гача булади. Узбекистонда майдан-июнгача гуллайди, июн-сентябрда хосил тугади. Уруги камдан-кам униб чикади. Асосан илдизпоясидан купаяди, булар ишлов бериладиган ерларда 22 см гача чуқурликкача таркалади ва ерга ишлов беришни жуда кийинлаштириб юборади. Ажриқдан кумликларни мустахкамлаш учун фойдаланилади.



а. Какра - *Acroptilon picris* С.А. М. мураккабчул-
 дошлар (Compositae) ошласига киради.
 Ўрта Осиёда, Қрилда, Кавказда, МДХнинг Евро-
 па қисмининг жанубий тубида тарқалган.
 б. қўйпечак - *Convolvulus arvensis* L. пелакчул-
 лар ошласига киради. Чекка Шиллодан
 ташқари қамма ерда учрайди.

А. Какра – сугориладиган ва сугорилмайдиган барча туманларда учрайди гуза, галла, бог, сабзавот экинлари ва бошқалар орасида усади. Пояси тик, шохлаган, баргалари билан калин копланган, буйи 60 см га етади. Ўзбекистон шароитида июн-сентябрда гуллайди, июл-сентябрда ҳосил тугади. Уругдан ва илдиз бачкиларидан купаяди. Какранинг асосий уқилдизи тупрокка 5-6 см ушиб кириб, сизот сувларигача етади ва ён илдизлар чиқаради.

Какра зичлашган тупроқларда ҳам усади. Кургоқчиликка чидамли ва захарли. Унга қарши курашдаги қийинчилик шундаки, у хайдалма қатламдан пастда жойлашган илдизлардан ҳам, хайдалма қатлам бачкиларидан ҳам усаверади. У 5% пичанга аралашса хайвонлар ҳаёти учун хавфли бўлади.

Б. Куйпечак- Сугориладиган ва баҳорикор ерларда усади. Барча экинлар, айникса, гуза, беда, галла экинлари орасида усади. Пояси ингичка, чирмашиб усади, узунлиги 30-100 см. гули йирик, оқ пушти рангда. Ўзбекистонда май-августда гуллайди, июн-октябрда ҳосил тугади. Уругдан ва вегетатив йул билан купаяди. Битта усимлик 600 тагача уруг тугиши мумкин. Уругнинг усти қаттиқ бўлганидан бир текис униб чиқмайди. Илдиз системаси бақувват ривожланган; илдизи тупрокка чуқур қиради ва ён шохлар чиқаради. Қатта ёшдаги уқилдизи 2 м ва ундан ҳам чуқурга қиради. Горизонтал илдизлари хайдалмаган ва хайдалган қатламларда жойлашади. Илдизининг кесилган қисмидан янги бачкилари ушиб чиқади.

Куйпечак усимликларни чирмаб олиб, уларни ётқизиб қуяди, пахтани машинада теришни, галлани қомбайнда уриб олишни қийинлаштириб, улар иш органларининг синишига сабаб бўлади. Қишлоқ хужалик зарарқунандаларини тарқатувчи бегона утдир.



а. жаз - жазгүл. - *C. bursa-pastoris* (L)
 Medic. Ҳоз ва жинзорларда, йўл,
 дарё бўйларига ўсади.

б. Ялтирбош - *Bromus secalinus* L бошонқош-
 лар ошмасига кирди. ЧМДХнинг Европа
 қисмида жуда кўп ўрайди. Ўзбекистонда ка...

А. Жаг-жагут... *Битта усимлиги орасига кирувчи*

Буйи 10см, баъзан 70-см буладиган бир...
ёки бир канча паяга эра булган бир йил-
лик ўтди. Майсалари қимматли қобили-
ятига эра булган - қимматли бегона ўт.
Кузда унган уруғлари шоду ёшидан
тўлбарт хосил қилиб ҳамма ривожланиш
раъласида, хатто унган ўздаида ҳам
қимматли мулкин.

Б. Ялтирбош- МДХнинг Европа қисмида ёввойи супурги каби галла (жавдар ва бугдой) экинлари орасида учрайди. Ёввойи холда усадиган турли номаълум булган типик бегона ўт, фақат уругдан купаяди. Битта усимлиги 800-1500 та уруг тугади, бу уруглар унувчанлигини 2-3 йил саклайди. Уруглар пишгандан кейин 6-9 кун утгач униб чика олади. Чала пишган уруги ҳам униб чикади. Улар 2-3 см чуқурликдан яхши униб чикади. Ялтирбош жавдар орасида усадиган типик бегона ўт. Рувак чикаргунча уни кузги жавдардан ажратиш кийин. Поясининг буйи ва уругнинг йирик-майдалиги жавдарники билан бир хил. Агар жавдар хосилга ялтирбош уруги аралашиб колса, унинг сифати камаяди, у корайиб, таъми бузилади.



а. Күркбүзим - *Equisetum* L. пояс икки
 жыл: баар ва ёзун. Чилликчим
 бүйүм 10-15 см.

б. Салма лейкум - *Cyperus rotundus* L. кийс-
 дош (Cyperaceae) ошасига кыради. 4000
 жыл тури бор. Асосан Үрмә Осиёда, Закавказье,
 зьеда, камдан-кам Шималий Кавказда учур

А. Киркбугим..... илдирилдиш кўра йиллик бего-

на..... ўт бўлиб, илдирилдиш илдирилдиш Тугунак-
илдирилдиш..... жуда қисқарган асосий ўт илди-
рилдиш қисқарган, булардан тугунак шак-
лида..... қўйилдиш илдирилдиш қисқарган.....

Б. Саломалейкум- нам ерларда яхши усади, барча экинлар,
айникса, шоли ва гуза ривожланишининг дастлабки даврларида,
сабсабот-полиз ва бошка экинларнинг энг зарарли бегона ути
хисобланади. Ундан кутулиш учун ерларни куриштириш ва агротехникавий
тадбирларни амалга ошириш керак.

Пояси тугри, уч киррали, ингичка, силлик, буйи 15-20 см.
Ўзбекистон шароитида июн-августда гуллади. Уругдан қандай қупайса,
поясидан ҳам шундай қупаяди. Илдирилдиш ер юзасига қанча якин
жойлашса, бачкилари шунча қуп чикади. Қупайтириш чуқурлигига қараб,
битта тугунак турли сонда: 1-5 см да 4 та бачки, 10-15 см да 2 та бачки,
20-30 см да 1 та бачки ҳосил қилади. Саломалейкум уруги, одатда
бахорда жуда секин, бир неча йил давомида униб чикади.