


БОТАНИКА

ДАСТУРИ УСЛУБИ ОИД БА МАШҒУЛОТҲОИ АМАЛИИ ТАСНИФОТИ РАСТАНИҲОИ ДАРАҶАИ ОЛӢ



Самарқанд - 2015

ВАЗОРАТИ ТАЪЛИМИ ОЛӢ ВА МИЁНАИ МАХСУСИ ҶУМҲУРИЯТИ
ЎЗБЕКИСТОН

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ САМАРҚАНД БА НОМИ А. НАВОЙ

БОТАНИКА

ДАСТУРИ УСЛУБИ ОИД БА МАШҒУЛОТҲОИ АМАЛИЙ
ТАСНИФОТИ РАСТАНИҲОИ ДАРАҶАИ ОЛӢ.

Барои аз худ намудани толибони гуруҳҳои тоҷикии шӯбаи биология

Шӯрои илмию услубии донишгоҳи
Давлатии Самарқанд ба нашр тавсия кардааст.

САМАРҚАНД-2015

**БОТАНИКА ДАСТУРИ УСЛУБИ ОИД БА МАШҒУЛОТҲОИ АМАЛИИ
СИСТЕМАТИКАИ РАСТАНИҲОИ ТАЛЛОМИ. НАШРИ ДОНИШГОҲИ
ДАВЛАТИИ САМАРҚАНД, 2015 С.**

Тартибдиҳандаҳо: Ҳайдаров Х..Қ., Жалов Х.Ҳ., Ражабов Т.Ф.

Мухаррири масъул: доц. Исломов Б.С.

Тақризнависон:

Доценти кафедраи ботаника ва физиологияи растаниҳои
донишгоҳи давлатии Самарқанд. н.ф.б. Қобулова Ф.Ж.

Профессори Донишгоҳи давлатии ҳоҷагии қишлоқи
Самарқанд д.ф.б Ҳамдамов И.Ҳ

**© Нашриёти донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Алишери Навой,
2015**

САРСУХАН

Дастурамал барои толибони факултети фанҳои табиӣ, шӯъбаи биологияи Донишгоҳи давлатии Самарқанд. Предмети таснифоти растаниҳои дараҷаи олий барои гузаштани машғулоти амали талабаҳои курси дуюм ҳамчун дастурамали хониш нависта шудааст. Барои тайёр намудани дастурамали хониш ба қоидаҳои тайёркуни дастури миллии Кадрҳои Ҷумҳурият риоя кардан ҳаракат карда шудааст. Мазмуни матн дар асоси “дастури равияи Биологияи Университет” сохта шудааст. Барои гузаштани бисёрии дарсҳои амали аз материалҳои маҳали истифода бурда ва онҳо барои омӯхтани таксонҳо вобаста нависта шудааст. Дар матн пай дар пай таснифоти растаниҳои дараҷаи олий ба ҳисоб гирифта шудааст. То вақти ҳозира ба забони тоҷики дастури амали таснифоти растаниҳои дараҷаи олий дар асоси системаи нав нашр карда нашудааст. Расм ва нақшаҳои дар матн оварда шуда аз китобҳои “Систематика растений” и Н.А. Комарницкий, Л.В. Кудряшов, А.А. Уранов, “Практический курс систематика растений” и Т.Н. Гордеева, Ю.К. Круберг, В.В. Писякова, “Жизнь растений” 6-томаи ва “Систематика высших растений” и С.А. Шостаковский гирифта шудааст. Класификацияи магнолиятоифаҳо ва ибораҳои ботаник дар асоси китоби Ў.П. Пратов, М.М.Набиев нависта.

Дастурамали хониш дар речаи хониши фани ботаника нишон дода шуда 44 соат дарсҳои амалиро дар бар гирифтааст.

Дастурамали хониши фани ботаника барои омӯхтани талабаҳо ва омӯзгорони шӯъбаи биологияи донишгоҳи Давлатии Самарқанд ва дигар донишқадаҳои гуруҳҳои тоҷики биология доштаи Ҷумҳурият истифода бурданашон мумкин.

ШЎЪБАИ УШНАТОИФАҲО (BRYOPHYTA)

Шўъбаи ушнатоифаҳо боло будани гаметофити эволюцияи растаниҳои дараҷаи олиро ташкил мекунад ва онҳоро фани (Бриология) меомӯзад. Ушнаҳо аз ҳама қадимтарин растаниҳои дараҷаи оли буда, боқибмондаи онҳо аз қатламҳои давраи ангиштсанг ва перми эраи палеозой ёфта шудааст, аммо ба фикри олимҳо ин боқибмондаҳои палеоботаники пурра барқарор намудани фелогенези ушнаҳоро имконият намедихад.

Намояндаҳои шўъба анча содда буда сохти ғайрирешаги, системаи гузаронанда шакл наёфтаас, намудҳои дараҷаи олитарин аз барг ва поя, формаҳои дараҷаи поёни бошад сохти талломи хобанда дорзовентрал, шохаронии дихотами, талломдор (қаттана) автотроф растаниҳо мебошанд.

Барои афзоиши ушнаҳо бисёршавии наслҳо пурра дида мешаванд. Дар онҳо насли гаметофит (чинси) боло буда, насли спорофит ҳамма вақт бо гаметофит вобаста ва аз ҳисоби он зист мекунад, аммо дар спорофит мавҷуд будани дончаҳои хлорофил он як қисм фотосинтез карданаҳам мумкин. Аъзоҳои чинси антеридий (дар он ду қамчинакдор спермотозоидҳо ҳосил мешавад) ва архегоний (дар он хучайратухм шакл меёбад). Бордоршави да муҳити об ба амал меояд. Дар натиҷаи он зигота ҳосил мешавад. Спорофит аз банд в кўсакча сохта шудааст.

Шўъбаи ушнатоифаҳо то 35 ҳазор намудҳоро дарбар мегиранд.

Таснифоти шўъбаи ушнатоифаҳо аз зеринҳо иборат мебошад:

Шўъбаи ушнатоифаҳо (Bryophyta) ба сето аҷдод тақсим мешавад:

1-аҷдод: Ушнаҳои чигаршакл – Hepaticopsida

Қабилаҳо (тартибҳо): а) Маршанциянамоҳо – Marchantiales,

б) Юнгермениянамоҳо – Jungermanniales

в) Сферокарпнамоҳо –

2-аҷдод: Антцеротшаклҳо – Anthocerotopsida

Қабилаҳо (тартибҳо): Антоцеротнамоҳо – Anthocerotales

3-аҷдод: Ушнашаклҳои барг поядор – Bryopsida, Musci

Зераҷдодҳо: а) Сфагнумгӣҳо – Sphagnidae

б) Андреягӣҳо - Andreaeidae

в) Брийгӣҳо – Bryidae

МАШҒУЛОТИ 1

Таракқиёт ва сохти маршанцияи бисёрнамуда (*Marchantia polymorpha*)

Мақсади машғулот: Сохт ва цикли таракқиёти маршанцияро омӯхтан.

Шакли машғулот: амалиёт

Услуби гузаштани машғулот: хучуми ақли, анъана

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, расми цикли афзоиши маршанцияи бисёрнамуда, гербарийҳо, препаратҳои тйёри микроскопи (антеридий, архегоний, спорогон); микроскопҳо, лупаҳо, ойнача чиҳоз, ойначаи пӯшанда, сўзанҳои препарат, чакрачакон.

Шўъба: Ушнатоифаҳо - Bryophyta,

Ачдод: Ушнаҳои чигаршакл – Hepaticopsida,

Қабила (тартиб): а) Маршанциянамоҳо – Marchantiales,

Оила: Маршанциягӣҳо – Marchantiaceae

Намуд: Маршанцияи бисёрнамуда - *Marchantia polymorpha*

ТАРТИБИ ОМЎЗИШ

ГАМЕТОФИТ: Гаметофит ёки насли чинси гуфта, аз спора сабзида мебаромадаги **ўсимта** фаҳмида мешавад.

Кўсакчаи маршанцияро гирифта, бо ёрии сўзан аз спораҳои камтар бароварда мешавад. Ба болои ойначаи чиҳоз монда препарат тайёр карда мешавад ва онро аввал бо объективи хурд ва пас за он бо объективи калон дида мешавад. Дар микроскоп спораҳои лунда ва риштаҳои пуржинашакли элатера дида мешавад. Мавҷуд будани чилд ва ядро, мағиз, тағирёби дароз шудани элатера. Бо ёрии тағирёбии элатера аз кўсакчаи маршанция спораҳо паҳн мешаванд. Расми спораҳо ва риштаи пружинашакли элатера кашида мешавад.

Протонема-спора ба хоки нам афтида ва ҳарорати мусоид расо бошад, аз он ривож меёфтаги ба пластинкашакл обсабз монанд иптидои растани мебошад. Он зиёда ба рӯи хок баромада, ранги сабзро мегирад, дар натиҷаи тақсимшавии хучайраҳо наздак чавони маршанцияро ҳосил мекунад.

Бо ёрии лупа сохти морфологи беруни таллом шинос мешавад. Тарзи шохарони, дар баъзе талломҳо мавҷуд будани дискҳои васеи бўлакчадор (антеридинок таллом), дар дигар талломҳо мавҷуд будани ситорашакл дискҳо (талломи архегоний) эътибор дода мешавад. Қабатҳои болои ва поёни бо диққат омӯхта шуда шакл ва ранги фарқи онҳо аз якдигар, айнан сабатҳои


бароваранда (дар боло) ризоидҳо ва амфигастрҳо (дар поён) мушоҳида карда мешавад.

Аз буриши кундаланги таллом тайёр намудаги препарат бо ёрии объективи хурди микроскоп эпидермиси болои ва поёни, камераҳои ҳавои, хучайраҳои ассимиляция, дахончаҳо дида мешавад ва ба дафтар расмашро кашид зарур.

Нуқтаи сабзиши талломи маршанцияро ёфта расмашро кашидан лозим. Аз сутунчаҳои антеридий ва архегоний препарат тайёр карда бо ёрии объективи хурди микроскоп дида мешавад ва бофтаҳои ҳосилкунанда сутунчаҳо ва бофтаи таллом муқоиса карда мешавад. Сутунчаҳои архегоний ва антеридийро ёфта муқоиса карда омӯхтан зарур. Девори онҳо аз чанд қабат иборат буданастро бо ёрии микроскоп дида мешавад. Расми сутунчаҳои антеридий ва архегони, аъзоҳои чинси ва хучайраҳои он кашид гирифтани зарур.

Дар антеридий ҳосил шудаги бо ёрии об ҳаракат карда, дар архегоний будаги хучайратухмро бордор карда зигота ҳосил мекунад.

СПОРОФИТ: Спорофит гуфта дар натиҷаи тақсимшавии хучайраи зигота ҳосил шудаги ҳама мавҷудихо гуфта мешавад. Дар маршанция спорогон яъне кўсакча ва банди он спорофитро ташкил мекунад. Аввал шакли спорогон, ҳаҷм, қисмҳои он мушоҳида карда мешавад. Кўсакча дар зер микроскоп мушоҳида карда, девори он аз чанд қабат хучайраҳо иборат буданаш аниқ карда мешавад. Дар дохили кўсакча будаги спораҳо аз хучайраҳои археспорий ҳосил мешавад. Баъзе хучайраҳо тақсим нашуда ба риштаҳои элатера мубадал мешавад.



Расми 1. Цикли тараккиёти маршанцияи бисъёрнамуда (*Marchantia polymorpha*).

Гаметофит: 1- аз спорогон рехтани спораҳо ва элатераҳо, 2- сабзиши спора, 3- протонема, 4- талломи архегонийнок, 5- талломи антеридийнок, 6- мажмуаи архегонийҳо, 7- мажмуаи антеридийҳо, 8- архегоний, 9- антеридий, 10- сперматозоид.

Спорофит: 1- бордоршави (Y!), 2- спорагони архегоний хучайранок, 3- мачмуаи спорогонҳо, 4 – аз хучайраҳои археспорий бо роҳи тақсимшави редуксионӣ, ҳосил шудани спораҳои гаплоиди (P!),

Саволҳои назорат:

1. Кадом хусусиятҳои сохти тана ва афзоиши ушнаҳо ба растаниҳои дараҷаи олий хос будани онҳоро нишон медиҳад?
2. Сохти гаметофити маршанция чи гуна аст?
3. Протонемаи ушнаҳо гуфта чиро мефаҳмед?
4. Протонема дар чигуна шароит месабзад?
5. Спорофити маршанция аз кадом қисмҳо иборат?

МАШҒУЛОТИ 2

Мавзу: Сохт ва таракқиёти фунарияи намченкунанда (*Funaria hydrometrica*).

Мақсади машғулот: Сохт ва цикли таракқиёти фунарияи намченкунандаро омӯхтан.

Шакли машғулот: амалиёт

Услуби гузаштани машғулот: ҳучуми ақли, анъанави

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, гербарияи ушнаи фунария, экспонатҳо, материали табиӣ ва препарати тайёри микроскопи (антеридий, архегоний, спорогон), микроскопҳо, лупаҳо, ойнача ҷиҳоз, ойначаи пӯшанда, сӯзанҳои препарат, чакраҷакон; расми цикли афзоиш.

Шӯъба: Ушнатоифаҳо - Bryophyta,

Аҷдод: Ушнашаклҳои барг поядор – Bryopsida, Musci

Зераҷдод: Брийгиҳо – Bryidae

Оила: Фунариягиҳо – Funariaceae

Намуд: Фунарияи намченкунанда - *Funaria hydrometrica*

ТАРТИБИ ОМӢХТАН

Гербарий ёки экспонати фунарияро аз назар гузаронидан, гаметофит ва спорофитҳоро дидан.

ГАМЕТОФИТ: Гаметофит насли чинси буда, он дар натиҷаи шароити мусоид сабзидан ва ривоч ёфтани спора ҳосил мешавад. Спора бошад дар спорогон пухта мерасад. Аз кӯсаҷаи фунария спораҳо ҷуда карда гирифта препарат тайёр карда дар объективи хурд ва калони микроскоп дида мешавад, ба набудани риштаҳои элатера эътибор дода мешавад. Сохт ва шакли спораҳо зери микроскоп дида расмашро кашидан зарур. Спораҳо ба шароити мусоид афтад, аз онҳо ришташакл протонема ҳосил мешавад. Фарқи протонема аз ришташакл обсабзҳо муаян карда мешавад. Дар бехҷастаҳо муғчаҳо ҳосил мешавад. Аз онҳо талломи ҳосилшудаи ушнаи баргпоядор эътироф карда мешавад. Расми протонема ва муғчаҳо кашида гирифта зарур.


Материали зиндаи фунарияро дида, пояи онҳо, паст ва болои онҳо ҷиғуна рангба соҳиб муайян карда ва муқоиса карда омӯхта мешавадх. Сохти ризоидҳои дохили хок бо ёрии лупа омӯхта мешавад.

Аз қисми поя ва барги ушна препарат тайёр карда бо ёрии микроскоп дида мешавад дар атрофи будаги хучайраҳои рангин пўстлохро марказ буда бандҳои гузаронандаро ҳосил мекунад. Қабати хучайраҳои беруна бофтаи механикиро дохили бошад бофтаи асосиро ҳосил мекунад. Бандҳои гузаронандаи намудро дида баромада, дар қисми маркази хучайраҳои мурда бисёр чой гирифта шуда аҳамият дода мешавад. Расми схемаи буриши кундаланги поя кашида мешавад.

Дар зери микроскоп сохти анатомияи барги фунария дида мешавад ва чойгиршавии хучайраҳои ассимиляционии назорат кунед. Аз як қабат хучайраҳо сохта шудаги барг аҳамият дода мешавад ва расми он кашида мешавад.

Фунария растании ду хонаги ва якчинса мебошад. Аъзоҳои чинси – архегонии ва антеридий дар нўги поя мобайни баргҳо чой гирифтааст. Дар сабзида истода фунария чой гирифтаги тўдаи архегонии ва антеридий муқоиса карда мешавад. Материалро баҳор аз сахро зимистон ва тирамоҳ аз гармхона гирифтани мумкин. Фарқи онҳо аз якдигар эътибор дода мешавад. Ба риштаҳои парафизаи мобайни архегоний нўги поя чой гирифта эътибор дода мешавад. Фафсии хучайраҳои девори архегонии муайян карда мешавад. Расми буриши ба дарози нуги пояи растании архегоний ва антеридий кашидан лозим. Фарқи онҳо муайян карда мешавад (бо антеридии маршанция муқоиса карда мешавад). Дар ушнаҳои барг поядор тухмхучайра-сперматозоидҳо ҳамагун буда, барои бордоршавии муҳити обдор шудани муҳим аст. Дар натиҷаи бордоршавии зигота ҳосил мешавад, тақсимшавии зигота аз саршавии насли спорофит дарак медиҳад.

СПОРОФИТ: Бордоршавии ва ривожёбии архегонийи спорофитро ҳосил мекунад. Спорофити фунария аз спорогон ва банди он ташкил ёфтааст. Препарати аз кўсакча тайёр кардаги дар зери микроскоп дида мешавад. Дар препарат апофиза, кўсакча, қопқокча, устунча, эпифрагма, девори спорогон, спорангий, сутунчаи спорангий ва ба девори кўсакча якҷоя мекардаги риштаҳо, дандончаҳои перистом ёфта мешавад ва ба сохти онҳо эътибор дода мешавад. Расми буриши ба дарозии кўсакча кашида мешавад. Бо ёрии расми 2 бо сохт ва цикли ривожёбии фунария шинос шуда ва қисмҳои онро навистан зарур.



Расми 2: Тарақиёти цикли фунарияи намченкунанда (*Funaria hygrometrica*).

1- Сабзиши спораҳо, 2 – протонема – гаметофити чаони муғчадор, 3- растании архегоний, 4 – мачмуаи архегонийҳо, 5 – антеридий, 6 – спермотозоид, 7 – зигота (иптидои спорофит), 8 – спорофити пухта расида, 9 – аз спорогон рехтани спораҳо.

1. Гаметофити фунария чигуна сохта шудааст?
2. Спорофити фунария чигуна сохта шудааст?
3. Антеридий ва архегоний чигуна сохта шудааст?

МАШҒУЛОТИ 3

Мавзӯ: Сохт ва тарақиёти сфагнуми нозикбарг ва ушнаи торфи (*Sphagnum acutifolium*).

Мақсади машғулоти: Сохт ва цикли тараққиёти маршанцияро омӯхтан.

Шакли машғулоти: амалиёт

Услуби гузаштани машғулоти: хучуми ақли, анъанави

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, гербарии намудҳои сфагнум, экспонатҳо, микропрепаратҳо, чадвалҳо, парчаи торф, микроскопҳо.

Шӯъба: Ушнатоифаҳо - Bryophyta,

Ачдод: Ушнашаклҳои барг поядор – Bryopsida, Musci

Зерачдод: Сфагнумгиро – Sphagnidae

Намуд: Ушнаи торфи - Sphagnum acutifolium

ТАРТИБИ ОМУХТАН

Бо гербарии намудҳои сфагнум, экспонатҳо ва парчаи торф шинос шудан, аз китоб ва консепт таъриф ва биологияи он омӯхта мешавад.

ГАМЕТОФИТ: Гаметофити ушнаи торфи ба воя расидаги барг поядор растани буда, сабзи кушод, кумуш ранг мешавад.

Бо ёрии гербарий шохаронии поя, ранги поя ва баргҳо, мавҷуд будани ва набудани ризоидҳо муайян карда мешавад. Буриши кундаланги пояи сфагнум дар зерини микроскоп дида мешавад, қисмҳои он ва фарқи онҳо муайян карда, расми онро кашидан зарур аст.

Препарати тайёри протонемаи сфагнум бо ёрии микроскоп дида мешавад. Фарқи протонемаи сфагнум фарқ ва монандии он аз дигар ушнаҳо муайян карда мешавад. Аз муғчаҳои протонема растании баргпоядор ривоч меёбад. Расми протонемаро кашида, ба дихотамик шохарони, пластинкашакл ва ризоиднок будани он эътибор дода мешавад.


Баргҳо дар поя бо навбат чой гирифтаанд, рағбанди дида намешавад, доимо як қабат, аз ду хел ҳучайраҳо ташкил ёфтааст, онҳо чудо карда бо лупа ва микроскоп омӯхта мешавад. Ҳучайраҳои калон беранги мурда ковок мешавад, бо ёрии ковокиҳо об ёки ҳаво дохил мешавад. Ингуна ҳучайраҳо гиалин яъне об нигоҳдоранда ҳучайраҳо гуфта мешавад. Дар мобайни чой гирифта ҳучайраҳои дарози борики сабз бошад, ассимиляцияи яъне фотосинтезкунанда ҳучайраҳо ба ҳисоб меравад. Бо ёрии микроскоп дидаги ҳама қисмҳо расмашро кашида гирифта зарур.

Антеридий ва архегони сфагнум дар нӯги навдаҳои гуногуни поя тӯда-тӯда чой гирифтааст, аммо онҳоро дар гербарий ёфтан душвор. Баъзе намудҳо як хонаги чудочинса, баъзеашон бошад духонаги растаниҳо мебошанд. Препарати аз мачмӯаи антеридий ва архегоний тайёр карда бо ёрии микроскоп дида мешавад. Шакл ва сохти дохили онҳо ба дафтар кашида гирифта мешавад.

СПОРОФИТ: Дар антеридий буда тухмҳучайраҳо (ду қамчинакдор сперматозоидҳо) ҳучайратухми беҳаракати архегониро бордор мекунад ва зигота ҳосил шуда, он бо тези тақсим мешавад ва ҳучайраҳои спорогенро ҳосил мекунад. Насли ғайри чинси спорофити аз бордоршуда ҳучайратухм сар мешавад. Дар спорофит чанокча-спорогон ҳосил мешавад. Он қафида спораҳо ба замин мерезад. Шароити мусоиди намноки ва гарми бошад, аз он беҳаастаи пластинкашакли сабз – ризоиднок протонема месабзад. Аз протонема ушнаи сфагнум ривоч меёбад.

Буриши ба дарозии спорогон чанок дар зери микроскоп дида мешавад. Фарқи он аз чанокҳои дигар уشناҳо (мачуд набудани банди ҳақиқии спорогон ва дандончаҳои перистом) муайян карда мешавад ва расми он ба дафтар кашида мешавад.

Аз расми 3 бо сохт ва цикли ривочёбии ушнаи торфи шинос мешавад, дар микроскоп ва расмҳои кашида шуда муқоиса карда мешавад.



Расми 3: Сохти ушнаи торфи.

1 – сохти умумӣ, 2 – спорогон ва дастачаи он, 3 – сохти дохилии барг (а – ҳуҷайраҳои ассимиляционӣ, б- ҳуҷайраҳои мурда, гиалин, в – суроҳҳои ҳуҷайраи гиалин), 4 – буриши кундаланги барг, 5 – протонема ва гаметофити ҷавони ризоиднок, 6 – қисми нӯги поя (А – наждаи антеридийнок, Б- наждаи архегонийнок, В - баргҳо).

Вазифаҳои амали:

1. Сохти сфагнумро аз ҷадвалҳо ва препаратҳо омӯхтан.
2. Расми сохт ва афзоиши сфагнумро аз ҷадвалҳо кашида гирифтан.

Саволҳои назорат:

1. Уشناҳои ҷигаршакл аз баргпоядорҳо бо чи фарқ мекунад?
2. Сохти гаметофити сфагнум чигуна аст?
3. Сохти спорофити сфагнум чигуна аст?
4. Цикли тарққиёти сфагнум чигуна мегузарад.

ШЎЪБАИ ПЛАУНТОИФАҲО (МУНМУНАҲО) (LYCOPODIOPHYTA)

Дар эволюцияи растаниҳои дараҷаи оли равияи спорофити аз гаметофити боло шўъбаи якумин ба ҳисоб меравад.

Намояндаҳои ин шўъба дар рӯи замин паҳн шудаги растаниҳои дараҷаи оли споронок қадима ба ҳисоб меравад. Боқибмондаҳои онҳо аз қатламҳои давраи силур ёфта шудааст. Дар мобайни мунмунаҳои ҳамон давра қадаш ба 30 метр мерасидаги намудҳои дарахт бисёр будааст. Боқибмондаҳои қабилаҳои лепидодендронҳо, сигиллярияҳо барои ҳосил шудани ангиштсанг иштрок кардааст. Дар давраи ҳозира зист мекардаги намояндаҳо плаунҳо (мунмунаҳо) ва селлагинеллаҳо растаниҳои алафи мебошанд. Онҳо растаниҳои ҳақиқии барг поядор буда, доимо реша мешавад. Пояҳо дихотамик шоха рондааст. Баргҳо содда, ба онҳо аз аз поя найҳои об дохил мешавад. Спорофилҳо як спороангийдор ва дар дохили онҳо спораҳо пухта мерасад. Ҳачми спораҳо якхел (плаунҳо) ёки гуногун (селлагинеллаҳо) мешавад. Мунмунаҳо ҳам ба монанди ушнаҳо растаниҳои спороноки оли буда, бо роҳи якҷояшавии наслҳои спорофит ва гаметофит ва вегетативи зиёд мешавад. Фарқи онҳо аз ушнаҳо насли спорофит аз гаметофит боло мебошад. Дар шароити мусоид аз спораҳо банди чинси ёки беҳаҷастаи гаметофит месабзад. Дар гаметофит будаги антеридий ва архегоний ҳосил шудаги хучайраҳои чинси- хучайратухм ва сперматозоидҳо бо якдигар якҷоя шуда зигота ҳосил шуда, дар натиҷаи тақсимшавӣ он спорофити нав насли ғайри чинси ривоч меёбад. Спорофит аз гаметофит мустақил месабзад.

Дар вақти ҳозира ба 1200 наздик намудҳои мунмунатоифаҳо ба мо маълум.

Таснифоти шўъбаи мунмунатоифаҳо: - Lycopodiophyta

Ачдоди-1: Плауншаклҳо (мунмунашаклҳо) – Lycopodiopsida

Қабилаҳо (тартибҳо): а) Астероксилнамоҳо – Asteroxylales

Б) Протолепидодендроннамоҳо – Protolepidodendrales

В) Мунмунанамоҳо – Lycopodiales

Ачдоди -2: Полушникшаклҳо – Isoetopsida

Қабилаҳо (тартибҳо) а) Лепидодендроннамоҳо – Lepidodendrales

Б) Селлагинелланамоҳо – Selaginellales

В) Полушникнамоҳо – Isoetales

МАШҒУЛОТИ 4

Мавзу: Сохт ва таракқиёти плаун (*Lycopodium clavatum*)

Мақсади машғулоти: Сохт ва цикли таракқиёти плаунро омӯхтан.

Шакли машғулоти: амалиёт

Услуби гузаштани машғулоти: хучуми ақли, анъанави

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, Гербарии плаун, экспонатҳо, препаратҳои микроскопи, чадвалҳо, нақшаҳо, микроскопҳо

Шӯъба: Мунмунатоифаҳо – *Lycopodiophyta*

Ачдод: Мунмунашаклҳо – *Lycopodiopsida*

Қабила: Мумунанамоҳо – *Lycopodiales*

Намуд: Мунмуна - *Lycopodium clavatum*

ТАРТИБИ ОМӢХТАН

Шиносои бо гербарий ва экспонатҳои плаун, аз китобҳо ва консепт хусусиятҳои биології онро омӯхтан.

СПОРОФИТ: Насли ғайри чинси плаун - муғчаи аз зигота шаклфто ривоч меёбад. Адади тӯдаи хромосомаҳо ҳама вақт диплоид ($2n$) мешавад. Насли спорофит растании ба воя расида мебошад. Аз материалҳои гербарий пояи вертикали ва горизонтали, шохарони ва решаҳои иловаги назорат карда мешавад. Сохти морфологи шакли баргҳо, чойгиршавии онҳо дар поя, дар нӯги поя чойгир шудаги хӯшаи спораҳо адади онҳо ва дигар аломатҳои морфології растани омӯхта мешавад. Дар хӯшаи спора будаги спораҳо ва спора ҳосил кунанда спорангийҳо бо ёрии лупа омӯхта мешавад.

Аз гербарий препарати кундаланги пояро тайёр карда бо ёрии микроскоп омӯхта мешавад. Чойгиршавии бандҳои гузаронанда поя, ксилема ва флоэма муайян карда мешавад. Мачмӯаи хучайраҳои маллаи пӯстлох – чои бург буданаширо эътироф мекунам. Бо ёрии микроскоп ва лупа дидаги маълумотҳо ба дафтар кашида гирифта зарур аст.


Аз хӯшаи спора бо ёрии сӯзан якто спорофилро чудо карда гирифта бо ёрии лупа шакли он, дар он чойгиршавии спорангий муайян карда мешавад. Аз буриши кундаланги хӯшаи спора тайёр кардаги препаратро бо ёрии микроскоп нигоҳ карда, сохти он ба дафтар кашида мешавад.

Спорангий дар болои оиначаи чиҳоз бо сӯзан кафонида, спораҳои онро бо объективи хурд ва калони микроскоп назорат карда мешавад. Шакл, калон ёки яхела ва гуногунии муайян карда мешавад. Маълумотҳои муайян карда ба дафтар кашидан зарур аст.

ГАМЕТОФИТ: Аз нешзании спора ҳосил шудаги аъзо гаметофит мебошад. Аз препарати тайёр бо сохти гаметофит шинос мешавад ва бо расми дар ҷадвал мавҷуд буда беҳааста муқоиса карда мешавад.

Ризоидҳои беҳаастаи – гаметофит бо гиғаҳои замбӯруғ симбиоз зист карда, ғайри хлорофилл буданаш, як хонаги чудочинса, аз тарафи беруна бо эпидермис пӯшида шуда, қисмҳои маркази беҳааста аз ҳуҷайраҳои соддаи бофтаи паренхима иборат буданаш эътибор дода мешавад ва расми онҳо ба дафтари расм кашида мешавад.

Бордоршави вақти муҳити оби будан ба амал меояд. Аз ҳосил шудаги зигота то пайдошавии спорофити ҷавон 15-18 сол зарур аст.



Расми 4. Сикли ривочёбии плаун.

Спорофит: 1 – бордоршави (Y!), 2 – ҳосилишавии бофтаҳои зигота, 3 – спорофити ҷавон, 4 – спорофити пухта расида, 5 – хӯшаи спораҳо

Гаметофит: 1 – спораҳо, 2- шаклҳои усимта, 3 – усимта, 4 – архегоний (♀), 5 – антеридий (♂), 6 – сперматозоидҳо.

Вазифаҳои амали:

1. Сохти плаунро аз гербария ва ҷадвалҳо омӯхтан.
2. Расми сохт ва цикли тарққиёти плаунро аз ҷадвал кашида гирифттан.

Саволҳои назорат:

1. Гаметофит ва спорофити плаун чигуна сохта шудааст?
2. Спораҳо дар куҷо ва кадом вақт ҳосил мешавад?
3. Кўсаки спораи плаун чигуна сохта шудааст?
4. Антеридий ва архегоний дар гаметофит чигуна ҷой гирифтааст?

МАШҒУЛОТИ -5

Мавзу: Сохт ва тараққиёти селлагинелла (*Selaginella helvetica*)

Мақсади машғулоти: Сохт ва цикли тараққиёти селлагинелла ро омӯхтан.

Шакли машғулоти: амалиёт

Услуби гузаштани машғулоти: ҳучуми ақли, анъанавӣ

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, дар тувак сабзида истода селлагинелла, гербарийҳо, экспонатҳо, препаратҳои микроскопик ва нақшаҳо, лупаҳо, микроскопҳо.

Шӯба: мумунатоифаҳо – Lycopodiophyta

Ачдод: Полушникшаклҳо – Isoetopsida

Қабила (Тартиб): Селлагинелланамҳо – Selaginellales

Оила: Селлагинеллагҳо – Selaginellaceae

Намуд: Селлагинеллаи швейцария - *Selaginella helvetica*

ТАРТИБИ ОМӢХТАН

Дар тувак сабзида истода селлагинелла, гербарийҳо, экспонатҳо мушоҳида карда мешавад, аз китоб ва консептҳо хусусиятҳои биологӣ он омӯхта мешавад.

СПОРОФИТ: Спорофит насли ғайри чинси – ҳучайратухми бордоршудаи бо роҳи митоз тақсимшаванда аз муғчаи шаклфто ҳосил мешавад. Дар селлагинелла ҳам ба монанди мумунаҳо якҷояшавии наслҳои спорофит ва гаметофит мушоҳида карда мешавад, насли спорофит дар афзоиш боло мешавад. Аз барои ҳамин дар селлагинелла ҳам насли спорофит ба воя расидаги растани мебошад.

Дар тувак сабзида истода селлагинелла бо ёрии лупа шохашакл зиёдатиҳо – ризофороҳо эътибор дода мешавад. Ба шохарони поя ва


гуногуни баргҳо калони ва шакл – анизофилия эътибор дода мешавад. Дар ризофораҳо набудани барг, бо роҳи экзогени ҳосил шудани ризофораҳо, нӯги онҳо ба замин расида аз он решаҳои иловаги сабзида баромадани мушоҳида карда мешавад ва ҳулоса бароварда расмашро кашидан зарур аст.

Тартиби чойгиршавии спорангийҳо ва шакли онҳо дар пояи селлагинелла аҳамият дода мешавад. Аз буриши кундаланги пояи селлагинелла препарат тайёр карда аввал дар объективи хурд пас аз он дар объективи калони микроскоп дида мешавад. Препарати аз поя тайёр карда аломатҳои монанди ва фарқи бандҳои гузаронанда муайян карда мешавад. Тартиби чойгиршавии ксилема ва флоема дар бандҳои гузаронанда эътибор дода мешавад.

Аз қисми спорангий чойгирифтаи поя буриши ба дарози препарат тайёр карда мешавад. Препаратро бо ёрии микроскоп мушоҳида карда фарқи селлагинелла аз плаун муайян карда мешавад. Дар мобайни баргҳо чойгиршавии спорангийҳо, гуногунии шакли макро ва микроспорангийҳо эътибор дода мешавад. Макроспораҳо – дар макроспорангий, микроспораҳо дар микроспорангий ҳосил мешавад. Девори спорангий аз се қават иборат буда, дар дохили он аввал спораҳои модари – хучайраҳои археспорий чой гирифтааст. Дар натиҷаи редуксион тақсимшавии ин хучайраҳо тетрада хучайраҳо ҳосил шуда, онҳо ба гаплоид спораҳо мубадал мешавад. Спораҳо як хучайраги буда, адади онҳо гаплоид (n) хромосомаҳо соҳиб мебошанд. Дар микроспора як тӯда микроспораҳо пухта расад, дар мегаспорангий фақат чорта мегаспора инкишоф меёбад.

ГАМЕТОФИТ: Сохти гаметофити селлагинелла, дар асоси китобҳо ва нақшаҳо омӯхта мешавад. Аз микроспораҳои селлагинелла спермаген – хучайраҳо антеридиал гаметофит ривоч меёбад. Аз спермаген хучайраҳо 2 камчинакдор сперматозоидҳо ҳосил мешавад. Макроспора бошад, архегоний ҳосил мекардаги ба шохай чинси мубадал мешавад. Дар архегоний пухта расидаги хучайратухм ривоч ёфта зигота ҳосил мешавад, аз бофтаи зигота чанин ва аз он спорофити чавон месабзад.

Аз расми – 6 бо сохт ва тараққиёти селлагинеллаи швейцария шинос шуда, расм ва нақшайи он кашидан мешавад.



Расми 6. Сикли ривочёби селажинелаи швейцари.

Спорофит: 1 – бордоршави (Y!), 2 – ҳосилишави бофтаи зигота, 3 – спорофити чавон, 4 – спорофити ба воя расида, 5- хўшаи спора, 6-7 – пухта расидани спораҳо дар макро ва микроспорангийҳо, P!- тақсимишави редуксионӣ.

Гаметофит: 1 – макроспорангий, 2 – микроспорангий, 3 – макро ва микроспораҳо, 4- ўсимтаи архегонийнок, 5 – антеридийнок ўсимта ва сперматозоидҳо, 6 – архегоний.

Вазифаҳои амали:

1. Сохти селажинелларо аз гербария омӯхтан.
2. Расми сохт ва цикли тараққиёти селажинелларо аз ҷадвал кашида гирифтан.

Саводҳои назорат:

1. Спорофит чигуна ҳосил мешавад?
2. Спорангий дар куҷо ҷой гирифтааст?
3. Сохти спорангияҳо чигуна аст?
4. Сохти гаметофит чигуна аст?

ШЎЪБАИ ЧИЛБАНДТОИФАҲО (EGUISETOPHYTA)

Ба ин шўъба дохил шаванда растаниҳо сабаби чилбандҳо номидан пояи онҳо тез ба бандҳо чудо шуда, байни бандҳо тақсим шудаанд, баргҳо чудо майда ба редукция дучор шудааст ва дар поя ҳалқашакл чой гирифтааст. Баргҳо қобилияти фотосинтезкуни надоранд.

Аз маълумотҳои палеоботаники маълум аст, ки чилбандҳо аз эраи Палеозой давраи девон пайдо шудаанд, дар давраи ангиштсан фаол ривоч ёфтаанд. Аввал намудҳои дарахтшакл пас аз он растаниҳои дигари споранок несту нобуд шудаанд. Дар давраи ҳозира фақат растаниҳои алафии решапоядори чилбандҳо месабзанд. Дар асоси ҳар як банд бофтаҳои бавучудоранда (меристема) мавҷуд буда осн сабзидани бандҳои пояро таъмин мекунад.

32 намуди чилбандҳо мавҷуд буда, онҳо ба ғайр аз қитъаҳои Австралия ва Зеландия Нав дар дигар ҳама қитъаҳои замин дида мешаванд. Дар ҷумҳуриятҳои ДҶМ 12 намуди чилбандҳо муайян карда шудааст. Дар Амрикои ҷануби қадаш то 10-12 метр мерасидаги намуди *Equisetum giganteum* дида мешавад. Дар маркази пояи чилбандҳо ковоки буда, онро ковоки марказии ҳаво гуфта мешавад.

Дар намояндаҳои шўъба зери замини решапояи печанда дошта, дар он захираи оҳар ҷам мешавад. Аз бандҳои решапоя решаҳои иловагии борики сиёҳчатоб мебарояд. Решапоя аъзои афзоиши вегетативи буда, дар он гирехҳои оҳар ҷамшаванда ҳосил мешавад.

Дар флораи Ўзбекистон ду намуд чилбандҳо паҳн шудааст. Онҳо чилбанди саҳрои (*Equisetum arvense*) ва чилбанди сершоха (*E. ramosissimum*). Дар чилбандҳо ҳам монанди мумунатоифаҳо дар давраи афзоиш насли спорофит боло меистад. Пояи чилбанди саҳрои ду хел мешавад. Пояҳо аз ҷиҳати сохти морфологи ва функцияшон аз якдигар фарқ мекунанд. Пояҳои баҳори барвақт месабзанд, ранги онҳо зардчатоб, чигарранг, дар он хўшаи спорофилл ҳосил мешавад. Спорофиллҳо шакли сипаршакл дошта, барги шаклдигаркарда мебошад. Дар онҳо аз 5-13 та спорангийҳо чойгир мешаванд. Банди споририллҳо ба тири хўша перпендикуляр часпидааст. Спораҳо дар шароити мусоид афтанд аз он гаметофит ривоч меёбад.

Ҳуҷайратухми архегоний бо яке аз сперматозоидҳо якҷоя шуда зигота ҳосил мешавад. Аз бофтаи зигота бошад, ба воя расидаги растани спорофит шакл меёбад.

Таснифоти шўъбаи чилбандтоифаҳо: Equisetophyta

- Ачдоди -1: Фонабаргшаклҳо – Sphenopsida
 Қабилаҳо (тартибҳо): а) Гиениянамоҳо – Hyeniales
 б) Фонабаргнамоҳо - Sphenophyllales
 Ачдоди – 2: Чилбандшаклҳо – Equisetopsida
 Қабилаҳо (тартибҳо): а) Каламитнамоҳо – Calamitales
 б) Чилбанднамоҳо – Equisetales

МАШҒУЛОТИ 6

Мавзу: Сохт ва тараққиёти чилбанди саҳрои (*Equisetum arvense*)

Мақсади машғулоти: Сохт ва цикли тараққиёти чилбанди саҳроиро омӯхтан.

Шакли машғулоти: амалиёт

Услуби гузаштани машғулоти: хучуми ақли, анъанави

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, Герабрӣҳо аз пояҳои баҳори ва тобистони растани, экспонатҳо, препаратҳои микроскопик (буриши ба дарози аз хӯшаи спора, гаметофитҳо, буриши кундаланги поя) ва нақшаҳо, лупаҳо, микроскопҳо.

Шӯъба: Чилбандтоифаҳо - Equisetophyta

Ачдод: Чилбандшаклҳо – Equisetopsida

Тартиб: Чилбанднамоҳо – Equisetales

Оила: Чилбандгӣҳо – Equisetaceae

Намуд: Чилбанди саҳрои - *Equisetum arvens*

ТАРТИБИ ОМӢХТАН

Аввал бо гербарӣҳои пояҳои генеративи ва вегетативи чилбанди саҳрои шинос шудан. Аз китоб ва консепт доир ба биологияи чилбанди саҳрои маълумотҳо омӯхта мешавад ва ба дафтари амалиёт менависанд.

СПОРОФИТ: Насли ғайри чинси (спорофит) чилбанди саҳрои аз пояҳои генеративи баҳори ва тобистона ассимиляцион пояҳо иборат ва дар онҳо ҳам насли спорофит аз гаметофит боло меистад. Аз материалҳои гербарии бо ёрии лупа сохти берунии поя, навдаҳои паҳлӯи, шакли баргҳо, тартиби чойгиршави, ранг, решаҳо ва чои гирехҳои омӯхта мешавад. Пояи баҳориро назорат карда мешавад. Пояи баҳори спора ҳосил карда хушк мешавад, ба чои он пояи аз решаи ҳамин растани пояи тобистона сабзида мебарояд. Бо ёрии лупа фарқ ва монанди пояҳои баҳори ва тобистони муайян карда мешавад. Расми сохти пояҳои баҳори ва тобистона, шакли баргҳо ва чойгиршавии онҳо ба дафтари амалиёт кашида мешавад.

Аз поя тари чилбанд препарат тайёр карда дар зери микроскоп дида мешавад. Дар маркази поя будаги ковоки ҳаво эътибор дода мешавад. Аз тарафи беруна ба равияи чойгиршавии бофтаҳои маркази – эпидермис, фотосинтез кунанда – ассимиляцион бофтаҳо, ковокии ҳаво ва бо ҳамин якҷоя бофтаҳои паренхимаи пӯслох таҳлил карда мешавад. Тартиби чойгиршавии флоэма ва ксилема дар бандҳои гузаронанда, ба сохти он, банди гузаронандаи кушод ёки маҳкам эътибор дода мешавад. Бо ёрии микроскоп мушоҳида кардаги қисмҳои препарат ба дафтари амалиёт кашида гирифтани зарур аст.


Аз микропрепарати тайёр ва хӯшаи спораи чилбанди сахрои тайёр кардари бо ёрии микроскоп ва лупа омӯхта мешавад. Ба шакл ва чойгиршавии спорофилҳо дар тири хӯша эътибор дода мешавад. Якто спорофил чудо карда гирифта, ба шакли бисёркунҷаи спаршакл он ва дар дохили он чой гирифтаги ҳашто спорангийҳо омӯхта мешавад.

Девори спорангий се қавата буда дар дохили он аввал хучайраҳои археспорий чой мегирад. Спора ҳосил кунанда хучайраҳо (спороген) редукцион тақсим шуда, аз онҳо микроспораҳои гаплоид пайдо мешавад.

Спорофили чилбандро чудо карда ба болои оинача монда бо ёрии сӯзани препарат кафонда мешавад. Аз дохили спорангий баромадаги спораҳо бо ёрии микроскоп дида мешавад. Шакл, ранг, ҳаҷм ва се қабат пардаи он муайян карда мешавад. Қабати берунаи спора чудо шуда дуто тасмашакл – элатераро ҳосил мекунад. Дар оиначаи препарат спораро хушк карда мушоҳида карда мешавад. Ҳаракат кардани элатера, хусусиятҳои гигроскопии онҳо ва аҳамияти онҳо барои паҳн шави спораҳо. Сохти спора ва риштаҳои элатера ба дафтари амалиёт кашида гирифтани зарур аст.

ГАМЕТОФИТ. Гаметофити чилбанди сахрои ҳам аз спора ҳосил мешудаги насли чинси мебошад. Дар он адади мачмӯаи хромосомаҳо гаплоид мешавад. Барои омӯختани гаметофит аз препаратҳои тайёр, китобҳо ва нақшаҳо истифода бурда мешавад. Спораҳо якхела буда, гаметофитҳо ду хел мешаванд антеридийнок ва архегонийнок гаметофитҳо. Аз барои ҳамин спораҳо аз ҷиҳати физиологӣ ду хел мешаванд. Як ёки духонаги гаметофит, мавҷуд будан ва набудани ризоидҳо, қобилияти фотосинтезкуни, монанди ва фарқи антеридий ва архегонийноки гаметофитҳо аниқ карда мешавад.

Пас аз бордори содир шудан, аз ҳосил шудаги зигота аввал спорофити ҷавон баъд аз он ба воя расидаги фотосинтез кунанда спорофит шакл меёбад.



Расми 6. Сохт ва афзоиши чилбанди сахрои (*Equisetum arvense*).

А- Пояи вегетативи (assimilation); Б-пояи генеративи (spora hosil кунанда); В- спорангифори спорангийнок; Г-спора; Д- гаметофитҳо (антеридий, архегоний); 1- решапоя ва лундачаҳои он, 2- хўшаи спора, 3-спорофилӣ спаршакл, 4-спорангия, 5-пояча, 6-элатера, 7-элатераҳо, 8-антеридий (♂), 9-архегоний (♀),

Вазифаҳои амали:

1. Сохт ва цикли тарққиёти чилбанди сахроиро бо ёрии ҷадвалҳо, гербарияҳо ва препаратҳои доими омӯхтан.
2. Расми цикли таракқиёт ва сохти чилбанди сахроиро аз ҷадвал кашидан.

Саволҳои назорт:

1. Сохти пояҳои баҳори ва тобистонаи чилбанди сахро чигуна сохта шудааст?
2. Афзоиши чилбанди сахрои чигуна мегузарад?
3. Сохти гаметофит ва спорофити чилбанди сахрои чигуна аст?

ШҶҶБАИ САРАХСТОИФАҲО (ПАПОРОТНИКТОИФАҲО) (PTERIDOPHYTA)

Сарахстоифаҳо (папоротниктоифаҳо) яке аз гурӯҳҳои қадимаи растаниҳои дараҷаи оли буда, дар давраи девон пайдо шудаанд. Дар замони ҳозира 300 туркум ва 10000 намудро ташкил мекунад. Сарахстоифаҳо дар минтақаҳои тропики васеъ паҳн шудааст. Насли спорофити аз насли гаметофити боло меистад. Спорофит аз сето органи вегетативи иборат: реша (ҳама вақт иловаги), поя ва барг. Дар спорофит спорангийҳо ҳосил мешавад. Дар пушти баргҳо сорусҳо (мачмӯаи спорангийҳо) гуруҳ шуда ҷой гирифтаанд. Баъзан спорангийҳо дар қисми функционали генеративии барг пухта мерасад (ужовникҳо).

Аз спора гаметофит сабзида мебарояд (насли чинсии фазаи гаплоиди). Дар намоёндоҳои аҷдодҳои гуногуни шӯъба спораҳо якхел ёки ҳархела (микро ва мегаспора), аз барои ҳамин ҳам гаметофит якхонаги ёки духонаги мешавад. Гаметофит – сабз, ризоиднок пластинкашакл буда, дар ҳок мустақил зист карда ва фотосинтез мекунад. Архегоний ва антеридийҳо ба бофтаи гаметофит ғўтида ҳолатба мешавад. Дар архегоний ҳуҷайратухм, дар антеридий бошад бисёр камчинакдор сперматозоидҳо пухта мерасад. Пас аз якҷоя шави онҳо дар натиҷаи тақсимшавии зигота индивиди нави спорофит ҳосил мешавад.

Таснифоти сарахстоифаҳо ёки папоротниктоифаҳо:

Шӯъба: Сарахстоифаҳо – Polypodiophyta

Аҷдоди-1: Сарахсшаклҳои қадима – Primofilicopsida

Қабилаҳо (тартибҳо): а) Протоптеридийнамоҳо – Protopteridiales

б) Кладоксилнамоҳо – Cladoxylales

в) Зигоптеридийнамоҳо – Zygopteridiales

г) Археооптеридийнамоҳо – Archeopteridiales

Аҷдоди -2: Ужовникшаклҳо – Ophioglossopsida

Қабила: Ужовникнамоҳо - Ophioglossales

Аҷдоди – 3: Мараттийшаклҳо – Marattiopsida

Қабилаҳо: а) Сарахснамоҳои ҳақиқи – Filicales

б) Марсилиянамоҳо – Marsiliales

в) Салвиниянамоҳо – Salviniiales

МАШҒУЛОТИ 7

Мавзу: Сохт ва тарққиёти сарахси беша (*Dryopteris filix mas*)

Мақсади машғулоти: Сохт ва цикли тарққиёти сарахси бешаро омӯхтан.

Шакли машғулоти: амалиёт

Услуби гузаштани машғулот: хучуми ақли, анъанави

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, дар тувак сабзида истода сарахс, гербарийҳо, экспонатҳо, препаратҳои микроскопик (сорус, спорангий, спора, гаметофит) ва нақшаҳо, лупаҳо, микроскопҳо.

Шӯъба: сарахстоифаҳо ёки папоротниктоифаҳо - Polypodiophyta

Ачдод: Полиподиидшаклҳо – Polypodiopsida

Зерачдод: Полиподиидгӣҳо – Polypodidae

Қабила: Сарахснамоҳои ҳақиқи – Filicales

Оила: Сарахсгӣҳо – Polypodiaceae

Намуд: Сарахси беша – *Dryopteris filix-mas*

ТАРТИБИ ОМУҲТАН

Дар тувак сабзонидаги сарахс сумбули оби ва гербарийҳо аз назар гузаронида мешавад. Ба баргҳо ва тартиби ҷойгиршавии сорусҳо эътибор дода мешавад.

СПОРОФИТ: Насли спорофити сарахси беша растани алафии бисёрсола буда, мураккаб патшакл як тӯда баргҳо сербар дорад. Баргҳо аз нӯги решапоё баромадагӣ. Решапоё (наздаи шакл дигаркарда) дар ҳолати горизонтал ба рӯи замин наздик ҷой гирифта, ранги маллаи сиёҳчатоб дошта, аз ҳудаш решаҳои борики иловагӣ ҳосил мекунад. Решапоёро асоси бандҳои барги аз соли пеш боқибмонда зич пӯшида меистад. Аз расм маълум аст, ки аз сабзида баромадаги баргҳои ҷавон ба монанди шулқ кирмҳо тобхӯрда бо ҷигарранг тангачашакл мӯякчаҳо зич пӯшида шудааст ва асос ба нӯгаш ниох карда кушода мешавад. Барги ба воя расидаги патшакл муракаб буда, дарозииаш 1-1,2 метрро ташкил мекунад. Аз пояи буғкардаи *Dryopteris filix-mas* препарат тайёр карда дар объективи хурд ва калони микроскоп дида мешавад. Решапоё бахти мураккаби дохили соҳиб мебошад. Поя бо эпидермис пӯшида шуда, пӯстлох дар навбати худ ба қисмҳои дохили ва беруна тақсим мешавад. Мачмӯи ҳучайраҳои қисми берунаи пӯстлох вазифаи бофтаҳои механикӣро иҷро мекунад. Дар поя бандҳои гузаронандаи гуногун бисёр дида мешавад. Бандҳои гузаронандаи калон дар маркази поя майдаҳояш бошад, ба дарози реша ҷойгир шудааст. Дар препарат бандҳои гузаронанд бо эндодерма ҳамсарҳад буда, пас аз эндодерма як ёки ду қабат ҳучайраҳо иборат перицикл, пас аз он флоема-элакшакл найҳо ва парехимаи лиф мавҷуд буданаш муайян карда шудааст. Дар маркази бандҳо ксилема ҷой


гирифтааст. Буриши кундаланги решапояро дар микроскоп дида расми онро ба дафтари амалиёт кашидан зарур.

Сохти анатоми барги сарахси бешаро дар микроскоп таҳлил кунем: аз боло ва поён бо эпидермис пӯшида шудааст ва дар хучараи онҳо бисёр будани доначаҳои хлорофиллро дида мумкин. Дар мезофилл ковокиҳои байни ҳуҷайравиро дида мумкин. Дар қисми поёни барг атрофи рағҳои маркази сорусҳо (мачмӯаи спорангий) ҷой гирифтааст. Сорусҳо лунда, дилшакл ва бо пардаи тунуки нафиси беранг (индузий) пӯшида шудааст.

Дар спорангий археспорийҳо пай дар пай тақсим шуда, 16 та хучайраи модари пайдо мешавад. Онҳо ҳам дар навбати худ редукцион тақсим шуда-тетра спораҳо ҳосил мекунад. Спора бо ду чилд дохили эндоспорий ва беруна экзоспорий печонида шудааст.

ГАМЕТОФИТ: Спора ба замин афтада гарми ва номнокии мӯътадил бошад, сабзида мебарояд ва гаметофити ба воя расидаро ҳосил мекунад. Гаметофит сабз, ризоиднок, лунда – дилшакл, диаметраш 0,5-0,9 см пластинкашакл буда, як хонаги чудочинса фотосинтез карда меиавонад. Дар он архегоний ва натеридий пухта мерасад. Гаметофити ба воя расида ба ҳаёти мустақилона мутобиқ шуда атрофаш як қабат ва миёнаи он аз бисёр қабата ҳуҷайраҳо иборат мебошад. Архегоний шакли колбашаклро дошта, бо шикамча ба бофтаи гаметофит ғўтида меистад. Дар архегоний ҳуҷайратухм ҳосил шуда, дар антеридия бошад сперматозоидҳои спиралшакли бисёрқамчинакдор ривоч меёбад. Ҳуҷайраҳои гарданаки архегония ҳал шуда, моеи сперматозоидҳоро доранда ҳосил мекунад. Антеридий қафида сперматозоидҳо ба об баромада ва боёрии гарданаки архегони ба тарафи ҳуҷайратухм ҳаракат карда онро бордор мекунад. Ҳуҷайраҳои зигота бо роҳи митоз тақсим шуда, спорофити ҷавонро, пас аз он растании спорофити ба воя расидаро ҳосил мекунад. Дар он мачмӯаи хромосомаҳо ҳама вақт диплоиди мебошад. Сарахси беша бо ёрии решапоя вегетатив нағз ривоч меёбад.

Нақшаи цикли тарққиёт ва шакли берунаи сарахси беша ба дафтари амалиё кашидан зарур.



Расми-7 Цикли тарақиёти сарахси беша.

Спорофит: 1 – 2- Зинаҳои иптидои ривочёби спорофит, 3- спорофити чавон, 4 – спорофити ба воя расида, 5 – буриши сорус, 6 – спорангий, рехтани спораҳо аз спорангийҳо, р!- тақсимишави редуксионӣ

Гаметофит: 1- спораҳо, 2 – оғозёбии сабзии спора, 3 – усимтаи чинси, 4 – архегоний (♀), 5 – антеридий (♂), 6 – архегонии пухта расида, У!- бордоршави, 7 - аз антеридий баромадани сперматозоидҳо.

Вазифаҳои амали:

1. Сохт ва цикли тарққиёти сарахси бешаро аз Ҷадвал ва гербарияҳо омӯхтан.
2. Расми цикли тараққиёт ва сохти сарахси бешаро аз Ҷадвал кашидан.

Саволҳои назорат:

1. Сохти барги сарахс чигуна аст?
2. Спорофити сарахс чигуна сохта шудааст?
3. Сохти анатоми барги сарахс чигуна аст?
4. Сохти гаметофити сарахс чигуна аст?

МАШҒУЛОТИ 8

Мавзу: Сохт ва тараққиёти сарахси оби (*Salvinia natans*)

Мақсади машғулот: Сохт ва цикли тараққиёти сарахси оби ро омӯхтан.

Шакли машғулот: амалиёт

Услуби гузаштани машғулот: ҳучуми акли, анъанави

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, гербарийҳои сарахси оби, экспонатҳо, препаратҳои микроскопик ва нақшаҳо, лупаҳо, микроскопҳо.

Шӯъба: Сарахстоифаҳо – Polypodiophyta

Ачдод: Полиподиидшаклҳо – Polypodiopsida

Зерачдод: Сальвиниягиҳо - Salviniidae

Қабила: Сальвиниянамоҳо - Salviniaceae

Оила: Сальвиниягиҳо – Salviniaceae

Намуд: Сарахси оби – *Salvinia natans*

ТАРТИБИ ОМӢХТАН

Гербарияҳо, экспонатҳо, аз гербарий бо сохти берунаи сарахси оби шинос шудан, давраи афзоиш ва бо ёрии нақшаҳо омӯхта мешавад.


СПОРОФИТ: Дар афзоиши ғайри чинси насли спорофит боло меистад. Пояи сарахси оби нозук, горизонтал, 15 см ба мерасад. Баргҳо дар поя сетоги чой гирифтаанд. Аз баргҳо дутоаш тухумшакл, новшакл, сабз ва дар рӯи об сеюм барг ресмоншакл бо мӯякҳо пӯшида шуда вазифаи реша ро иҷро мекунад. Дар сарахси оби решаи ҳақиқӣ намешавад. Аз буриши кундаланги барг ва реша препарат тайёр карда дар зер микроскоп дида мешавад. Дар он ривоч наёфтани бофтаи механики, редукция шудани бофтаи гузаронанда, аз ҳад зиёд будани ковокиҳои ҳаво буданаш эътибор дода мешавад. Дар расм дидагибарин, макро ва микроспорангийҳо дар дохили об дар асоси бандҳои калтаи барг чой гирифта дар дохили соруҷо ва спорокарпийҳо ҳосил мешавад. Споракарпийро ба қисм бурида бо ёрии лупа мушоҳида кунем, чилди он аз ду қабат парда сохта шуданашро мебинем. Миёнаи онҳо бо ҳаво пур шудааст. Ин чилд гомологи индузий мебошад. Споракарпий дар поячаи кӯтоҳ меистад, ҳамин пояча ба ковокии он даромада васеъ мешавад ва плацентаро ҳосил мекунад. Дар плацента мега ва микроспорангийҳо якҷоя мешавад.

Дар спорокарпий як чандто шаршакл микроспорангий ва тухумшакл мегаспорангийҳо пухта мерасад. Дар маркази спорангий ҳучайраҳои археспорий шакл ёфта, онҳо дертар ҳучайраи модариро ҳосил мекунад ва аз редукцион тақсимшавии он тетраспораҳо спораҳои гаплоиди ҳосил мешавад.

Дар дохили микроспорангий то 64 та микроспора пухта мерасад. Дар мегаспорангий чудоҳам бисёр мегаспораҳо ҳосил мешавад, аммо яктои онҳо пухта мерасад. Спорокарпийҳо тирамоҳ аз растании модари канда шуда ва дар таги об зимистонро мегузаронад. Чилди берунаи спорокарпии хӯрда шуда спорангийҳо канда шуда, баҳор ба рӯи об мебарояд.

ГАМЕТОФИТ: Аз ҳосил шудани чиси навраси гаметофит насли гаметофити сар мешавад. Аз микроспора редукция шудаги антеридийнок шохаи чинси ривоч меёбад. Аз якум тақсимшавии спора дуто хучайра ҳосил мешавад, ин хучайраҳо дар қисми поёни гаметофит чой мегирад. Қисми болои гаметофитро дуто антеридий ишғол кардаанд, дар ҳар яктои он чортоги сперматозоид мавҷуд. Нуги гаметофит девори микроспорангийро суроҳ карда ба берун мебарояд. Гаметофити антеридийнок дуто антеридийнок ва 8то сперматозоид мавҷуд мебошад. Девори антеридий ҳал шуда сперматозоидҳои дохили он буда ба об мебарояд. Аз мегаспора гаметофити архегонийнок ҳосил мешавад. Ин гаметофит шакли себурчаи хурди сабз дошта, ҳама доим бо мегаспора пайваста мемонад. Пас аз бордори шудан, насли спорофити оғоз меёбад ва чанин шакл меёбад. Дар натиҷаи бо роҳи митоз тақсимшави хучайраҳои чанин ба воя расидаги растани ҳосил мешавад. Чараёни сабзиши спораҳо, бордори, ривочёби чанин дар об мегузарад.

Сохти беруна ва цикли тараққиёти сараҳси оби ба дафтари амалиёт кашида мешавад.



Расми – 8. Цикли тараққиёти салвинияи шинокунанда.
 Спорофит: 1-2- Зинаҳои ипидои ривҷёбии спорофит, 3 – спорофити чавон, 4 – спорофити пухта расида, 5 – қисми споракарпийноки спорофил, 6 – ҷойгиршави макро ва микроспорангийҳо дар споракарпий, 7 – ривҷёбии микро ва макроспорангийҳо, Р! - тақсимшави редуксионӣ.
 Гаметофит: 1 – макроспори макроспорангий, 2 - микроспораи микроспорангий, 3 – сабзиши макро ва микроспораҳо, 4 – бехчастии архегоний, 5 – бехчастии антеридий, 6 – архегоний, 7 – сперматозоид, У! – бордоршавӣ.

Вазифаҳои амали:

1. Сохт ва цикли тараққиёти сарахси обиро аз ҷадвал ва гербарияҳо омӯхтан.
2. Расми сарахси обиро аз ҷадвал ва гербарияҳо кашида гирифтан.

Саволҳои назорат

1. Сохти спорофити сарахси оби чигуна аст?
2. Гаметофити сарахси оби чигуна сохта шудааст?

3. Цикли тараққиёти чигуна мегузарад?
4. Сохти барги сарахси оби чигуна аст?

ШЎЪБАИ ҚАРАҒАЙТОИФАҲО (ЛУЧТУХМТОИФАҲО) – PINOPHYTA (GYMNOSPERMATOPHYTA)

Қарағайтоифаҳо (лучтухмтоифаҳо) гурӯҳи қадимаи растаниҳои тухмдор буда, боқибмондаи онҳо аз қабатҳои давраи девони эраи палеозой ёфта шудааст. Шўъбаи сановбартоифаҳо ба сохти мураккаб соҳиб буда растаниҳои архегони мебошанд. Онҳо дарахтҳо, қисман бутаҳо, фақат дар хушкӣ масабзидаги масабзидаги растаниҳо мебошанд.

Спорофити онҳо нағз ривоч ёфта аз гаметофит боло мебошад. Ба ин шўъба дохил мешудаги растаниҳо реша, поя ва барг дошта, гаметофити онҳо редукция дучор шуда ва дар спорофит ҳаёт мегузаронад. Аз ҳама аломати характерноки дар намояндаҳои ин шўъба тухм ҳосил мекунад, аз ҷаннин дохили он бошад, дар навбати худ спорофит ривоч меёбад. Тухм ин ҳосилаи нав буда, дар ҳамаи растаниҳо пеш аз ин омӯхта мавҷуд набуд. Тухм ин ривоч ёфтаги мегаспорангии тағирёфта мебошад. Танай қарағайтоифаҳо ҳама вақт чуб шудаги мебошад. Аз барои ҳамин онҳо дароз зист мекунад. Сохти анатоми онҳо анча мураккаб буда дар намудҳои ҳозираи онҳо бандҳои гузаронандаи эвстелъ ва коллатерал мавҷуд. Фаолияти камбий ғайраравишӣ поя ва ҳосилравии бофтаҳои дучанда – ксилема ва флоэма ба вуҷуд оварда, перидермаро ҳосил мекунад. Трахеидҳои чўб мавҷуд. Найҳои ҳақиқӣ (трахеяҳо) дар лучтухмҳо намешавад.

Реша бисёртар аз решаи асосӣ ва паҳлӯӣ иборат мебошад. Аз ҷиҳати сохти анатоми онҳо бисёртар бар растаниҳои гулдор монанд мебошанд. Дар намудҳои қитъаҳои тропикӣ масабзида баргҳояш, калон, патшакл, ба монанди сарахсҳо аз нўғаш масабзад. Дар намудҳои олиаш бошад, баргҳо бутан бисёртар сўзанбарг (дар сўзанбаргҳо), тангачашакл (туя, кипарис) ёки баргҳои васеъ (масалан гнетшаклҳо-вельвичия, гнетум).

Дар сохти анатоми баргҳо паренхимаҳои дурушт ва мураккаб сохташуда бандҳои гузаронанда мавҷуд. Дар лучтухмтоифаҳо афзоиши вегетативӣ тақрибан дида намешавад.

Дар намояндаҳои ин шўъба ба архегонийҳо хос навбатии насл: спорофит (диплоид ёки насли ғайриҷинси) ва гаметофит (гаплоид ёки насли ҷинси) мушоҳида карда шуда ва якумаш аз ду юмаш боло меистад. Аъзоҳои ҷинси фақат ба намудҳои ҳамин шўъба хос қуббаҳо пухта мерасад.

Дар шўъбаи лучтухмтоифаҳо 6 ачдод ва 800 намуд мавчуд мебошад. Аз онҳо намояндаҳои ду ачдод фақат дар ҳолати боқибмонда дида мешавад.

Таснифоти шўъба аз зеринҳо иборат мебошад:

Шўъба:Қарағайтоифаҳо (лучтухмтоифаҳо) – pinophyta (gymnospermatophyta).

Ачдоди – 1: Сарахсшаклҳои тухмдор – Pteridospermatopsida

Қабилаҳо: а) Сарахснамоҳои тухмдор – Pteridospermales

б) Кейтонийнамоҳо – Caytoniales

Ачдоди – 2: Саговникшаклҳо – Cycadopsida

Қабила: Саговникнамоҳо – Cycadales

Ачдоди – 3: Беннеттитшаклҳо – Bennettitopsida

Қабила: Беннеттитнамоҳо – Bennettitales

Ачдоди – 4: Гинкгошаклҳо – Ginkgopsida

Қабила: Гинкгонамоҳо – Ginkgoales

Ачдоди – 5: Қарағайшаклҳо – Pinopsida (Coniferopsida)

1) Зерачдод: Кордаитгҳо – Cordaititidae

Қабила: а) Кордаитнамоҳо – Cordaitales

2) Зерачдод Қарағайгҳо – Pinoideae (Coniferoideae)

Қабила: Қарағайнамоҳо – Pinales (Coniferales)

Ачдоди – 6: Гнетшаклҳо – Gnetopsida (Chlamydospermatopsida)

Қабила: а) Эфедранамоҳо (сурхчанамоҳо) – Ephedrales

Қабила: б) Гнетнамоҳо – Gnetales

Қабила: в) Вельвичиянамоҳо – Welwitschiales

МАШҒУЛОТИ 9

Мавзу: Сохт ва таракқиёти саговники хамшаванда (*Cycas revoluta*)

Мақсади машғулоти: Сохт ва цикли таракқиёти саговникро омӯхтан.

Шакли машғулоти: амалиёт

Услуби гузаштани машғулоти: ҳучуми ақли, анъанави

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, Гербарияи барг, апорофил ва тухмҳои саговник, экспонатҳо, расмҳои рангин, нақшаҳо

Шўъба:Қарағайтоифаҳо (лучтухмтоифаҳо) – pinophyta (gymnospermatophyta).

Аждоди: Саговникшаклҳо – Cycadopsida
Қабила: Саговникнамоҳо – Cycadales
Оила: Саговникгиҳо – Cycadaceae
Намуд: Саговники хамшаванда – *Cycas revolute*

ТАРТИБИ ОМЎХТАН

Барои омӯхтани саговник аввал гербария ва экспонатҳо аз назар гузаронида мешавад. Маълумотҳо, расмҳои дар дастурамалҳо ва адабиётҳо омӯхта мешавад.

СПОРОФИТ: Насли ғайричинси саговник пас аз бордор шудани хучайра тухм ҳосил мешудаги тухм ривоч меёбад. Спорофит дарахти ба воя расидаги мебошад.

Аз расм – нақшаҳо, гербарияҳо истифода бурда сохти тана, шохарони ва системаи решаи саговникро омӯхта мешавад. Ба шакли барг, чойгиршави он дар поя, сохти куббаҳо ва дигар аломатҳои морфологи эътибор дода мешавад. Дар кубба будаги спорофил, дар спорофил будаги спорангий ва тухммуғча мушоҳида карда мешавад.

Саговник растании дарахт буда, танай сутуншакл, шоха нарондааст, қадаш 20-25 м, сатҳи поя бо пўстлохи ғафс ёки бо перидерма пўшида шудааст. Пас аз он банди гузаронандаи коллатерал жойгирифтааст он аз лиф, камбий ва трахеидҳо иборат. Дар маркази поя дилаи нағз ривочёфта ва шўълаҳои дила, дар пўстлох ва дила рохҳои моеъи часпак чудокунанда чой гирифтааст. Дар дила “саго” гуфтаги оҳар ғун мешавад аз барои ҳамин растани саговник гуфта мешавад.

Аз расм маълум, ки решаи асоси дароз, дар решаҳои пахлуи замбўруғҳо, бактерияҳои азот ғункунанда ва обсабзи сабзу-кабуд *Anabaena* симбиоз зист мекунад. Баргҳои саговник як тўда дар нўги поя чой гирифтааст. Баргҳо калони патшакл, саҳт то 3 м дароз мешавад, аз асосаш сабзида, навраси он ба монанди шилиқ кирмҳо мебошад.

Саговник дарахти духонаги буда, ғуддаҳои гардони онҳо 50-70 см буда вазни он то 40 кг мешавад. Дар ғуддаи гардгирак микроспорофилҳо чангдонҳо синангияҳоро ҳосил мекунад.


Дар микроспорангий спораҳо бисёр гард мешаванд. Микроспора да вақти сабзиш аз сето хучайра иборат мешавад: проталлиал - **ўсимта**, антеридиал, аз он дуто бисёр қамчинадор сперматозоид ҳосил мешавад ва вегататив, дере нагузашта он найи гардро (гаустория) ҳосил мекунад.

ГАМЕТОФИТ: Микроспора сабзида аз он гаметофити нарина ҳосил мешавад. Сохти он аз нақша ва расмҳо истифода бурда омӯхта мешавад.

Мегаспорофили саговник ҳам дар нўги поя ҳосил мешавад. Онҳо баргҳо кутӯҳи патшакл монанд буда, дар ду паҳлӯи рағи маркази аз 2-6 та мегаспорангий яъне тухммуғчаҳо чой гирифтаанд. Сохти дохили тухммуғча аз зеринҳо иборат: сатҳи онро се қабат интегумент пӯшида меистад, қабатҳои дохили ва берунаи он мулоим, қабати миёна саҳт мебошад дар дохилаш – нуцеллус (мегаспорангий), дар тарафи болои микропиле (роғи гард), дар пасти он ковоки камераи чанг чой гирифтааст. Он аз қисми нўги нуцеллус ҳосил мешавад. Дар нуцеллус мегаспораи калон ривоч меёбад, аз он бо роғи митоз эндосперми якҷанда ва дуто архегоний пухта мерасад (расмро ба дафтари амалиёт кашидан).

Микроспора (гард) бо ёрии шамол ба тухммуғча афтида, бо микропиле ба камераи чанг дохил мешавад. Вегетатив ҳуҷайраи гард наӣи гардро ҳосил мекунад. Аз ҳуҷайраи антеридиал 2 та ҳуҷайра – пояча ва спермаген ҳуҷайра ҳосил мешавад. Спермаген ҳуҷайра дуто сперматозоид ҳосил мекунад, онҳо ба эндосперм равона шуда, яктоаш тухмҳуҷайраи архегонийро бордор мекунад, дуомаш бошад ҳал шуда меравад.

Зигота давраи оромиро нагузаронида ривоч меёбад ва ду паллаги чанин ҳосил мекунад. Тухммуғча ба тухм табдил меёбад. Пурра расидани чанин баъд ба замин афтидани тухм сар мешавад. Ранги тухми расида сурхчатоб мебошад. Сохти умуми саговник аъзои вегетатив ва генеративи онро ба дафтари амалиёт кашидан зарур аст.



Расми - 9 Сохти органҳои афзоишкунандаи Саговник.

1 – микроспорофил; 2 – сохти сорус; мегаспорофилҳо; 3 – буриши кундаланги қисми болои тухммуғча (ар-архегоний, нт- наӣи гард, сп-сперматозоидҳо, и-интегумент, м-микропиле); 5 – буриши ба дарози

тухммуғча (нмс-қабати мулоими беруна, вмс-қабати мулоими дохили, м-микропиле, пк-камераи гард, нц-нуцеллус, ар-архегоний, кс- қабати сангшакл); б – буриши ба дарози тухм, (к-решача, энд-эндосперм, ксқабати сангшакл, нмс-қабати берунаи мулоим, м-микропиле).

Вазифаҳои амалӣ:

1. Сохт ва тараққиёти саговникро аз гербария ва ҷадвалҳо омӯхтан.
2. Расми цикли тараққиёт ва сохти саговникро аз ҷадвалҳо кашида гиред.

Саволҳои назорат:

1. Сохти анатоми ва морфологи саговник чигуна сохта шудааст?
2. Саговнок чиро мефаҳмонад?
3. Афзоиши саговникро таъриф диҳед?

МАШҒУЛОТИ 10

Мавзу: Сохт ва тараққиёти гинкго (*Ginkgo biloba*)

Мақсади машғулоти: Сохт ва цикли тараққиёти гинкгоро омӯхтан.

Шакли машғулоти: амалиёт

Услуби гузаштани машғулоти: ҳучуми ақли, анъанави

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, гербарияҳои тухммуғчадор ва гардондори гинкго, тухмҳо, нақшаҳо, расмҳо, схемаи цикли тарққиёт

Шӯъба: Қарағайтоифаҳо (лучтухмтоифаҳо) – pinophyta (gymnospermatophyta).

Ачдоди: Гинкгошаклҳо – Ginkgoopsida

Қабила: Гинкгонамоҳо – Ginkgoales

Оила: Гинкгогиҳо – Ginkgoaceae

Намуд: Гинкго – *Ginkgo biloba*

СПОРОФИТ: Расм ёки наждаи сабзида истодаи гинкгоро нишон додан ва омӯхтан. Қад он 30-40 м, танай он хокистарранг пуслох мавҷуд, моноподиал шохарондаги дарахт. Дар сохти анатоми дила нағз ривоч ёфтаги, чӯбшави анча ғафс мебошад. Дар вақти гербарияҳоро аз назар гузаронидан

ду хел будани навдахоро мушоҳида кардан мумкин: а) дароз, баргҳо кам ва пай дар пай чой гирифтааст ва б) кӯтоҳ шудаги, баргҳо тӯда шуда чой гирифтааст.

Банди баргҳо дароз, себурчакшакл ва нӯги он ба ду қисм тақсим шудааст, рағбандии дихотами. Баргҳо тирамоҳ мерезад, ин ҳодиса дар лучтухмҳо кам дар кам дида мешавад.


Гинкго ду хонаги растани. Микроспорофилҳо чам шуда ҳалқашакл “тӯдагул” ҳосил карданастро дидан мумкин. Дар микроспорофилҳо микроспорангийҳо чой гирифта, халтачаи ҳаво дар онҳо дида намешавад. Микроспорангийҳо ёки тухммуғчаҳо ҳам дар култуғи барг дар нӯги дастача чуфт шуда чой гирифтааст.

Гард дар дохили микроспорангий ба ривочёби оғоз мекунад ва се хучайраги мешавад: проталлиал, антеридиал ва вегетатив хучайраҳо бо хамин ҳолат ба атроф паҳн мешавад.

ГАМЕТОФИТ: Дар камераи гарди тухммуғча гارد сабзида гаметофити наринаро ҳосил мекунад, он аз 2 сперматозоиднок найи гард иборат. Тухммуғча бо интегументи ғафс пӯшида шуда, қисми нӯгаш пайваста набуда ва микропилеро ҳосил мекунад. Дар даруни интегумент нуцеллус чой гирифтааст. Хучайраҳои болои нуцеллус ҳал шуда камераи чанг ҳосил мешавад, аз хучайраҳои қисми поёни хучайраҳои модари мегаспораҳо ҳосил мешавад. Аввал он чорта хучайра ҳосил мекунад, ва сетои он ҳал шуда меравад. Якто хучайра тақсимшавиро давом дода эндосперми якчандаро – гаметофити модинаро ҳосил мекунад. Дар қисми болои он дуто архегоний ба воя мерасад.

Ба камераи чанг афтодаги микроспора гард сабзиданро давом медиҳад. Аз хучайраи антеридиал дуто бисёр камчинакдор сперматозоид ҳосил мешавад. Онҳо дар дохили гаустория будаги плазма чойгир мешавад. Нӯги найи гард кафида, дохили он буда ба эндосперм омехта мешавад. Яке аз сперматозоидҳо хучайратухмро бордор мекунад-зигота ҳосил мешавад. Дуюм архегоний ва яке аз сперматозоид ҳал шуда меравад. Зигота тақсим шуда аз бофтаи он чанин шакл меёбад. Тухми ҳосил шуда қабати дохили ва беруна мулоим хушбӯй ва ба рағбан бой мебошад. Аз шакл тухм ба олуболу монанд, дар қитъаҳои Хитой, Япония ва Осиёи Шарқи барои хӯроквори истифода мебаранд.

Аз чадвалҳо сохт ва цикли тараққиёти гинкгоро ба дафтари амалиёт кашида гиред.



Расми 10. Сохт ва афзоиши гинкго.

А – қуббаи гарддори дар нажда чойгирифта, Б – микроспорофили микроспорангийнок (гардгиракдор), В – наждаи тухммуғча чойгиришуда, Г-қуббаи тухммуғчаи дучандадор, Д-Е- буриши ба дарозии қисми болои тухм.

1 – интегументи пуштаи мулоим, 2 – нуҷеллус, 3 – камераи гард, 4 – архегоний, 5 – эндосперм, 6 – қабати берунаи мулоими тухм, 7 – қабати сангин, 8 – қабати тунуки пардашакл, 9 – чанин.

Вазифаҳои амалӣ:

1. Сохт ва таракқиёти гинкгоро аз гербария ва ҷадвалҳо омӯсед.
2. Расми цикли таракқиёт ва сохти гинкгоро аз ҷадвалҳо кашида гиред.

Саволҳои назорат:

1. Спорофити гинкго чигуна сохта шудааст?
2. Навда ва баргҳои гинкго чигуна сохта шудааст?
3. Микроспорофили гинкго чигуна сохта шудааст?
4. Сохти тухммуғчаи гинкго чигуна аст?

МАШҒУЛОТИ 11

Мавзу: Сохт ва таракқиёти қарағайи беша (*Pinus silvestris*)

Мақсади машғулот: Сохт ва цикли тараққиёти қарағайи бешаро омӯхтан.

Шакли машғулот: амалиёт

Услуби гузаштани машғулот: ҳучуми акли, анъанави

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, наждаҳои куббадори қарағай, куббаҳо, сӯзанбаргҳо, тухмҳо; микропрепаратҳои аз чӯб ва гардонҳо тайёр карда, гербарияҳо, расмҳо ва нақшаҳо.

Шӯба: Қарағайтоифаҳо (лучтухмтоифаҳо) – pinophyta (gymnospermatophyta).

Аҷдод: Қарағайшаклҳо – Pinopsida (Coniferopsida)

Қабила: Қарағайнамоҳо – Pinales (Coniferales)

Оила: Қарағайгиҳо – Pinaceae

Намуд: Қарағайи беша – Pinus silvestris

ТАРТИБИ ОМӢХТАН

Омӯхтани қарағайи беша аз гербарияҳо, экспонатҳо ва материалҳои аз ғундошта сар мешавад.

СПОРОФИТ: Қад қарағайи беша 20-40 метр ва ғафсии он 1-2 м, дарахти моноподиал шохаронда. Навда ду хел кӯтоҳ ва аз хушбӯй барг ҳосил кунанда, наждаҳои ғафс ва дароз сабзанда. Сохти анатоми тана мураккаб – пӯслӯх ва дила кам ривоч ёфтааст. Қисми чӯб ҷудоҳам ғафс ва аз трахеидҳо иборат. Паренхимаи ҷӯб кам ривоч ёфтааст. Шӯълаҳои дила бо ҷашми одди дида мешавад. Флоема аз найҳои элакшакл иборат. Яке аз аломатҳои характерноки сохти дохилии он сӯзанбарг ва дар чӯб мавҷуд будани роҳҳои мум мебошад.

Барг-сӯзаншакл, баъзан паҳн, се қирранок ёки чор қирранок, дар наждаи кӯтоҳ дутоги ҷой гирифта баъзан сетоги ҷойгир шудааст. Буриши кундаланги барг дар зерини микроскоп чунин мушоҳида карда мешавад: аз тарафи беруна бо пӯст пӯшида шудааст, дахонҷаҳо дар барг суфта паҳн шудааст, дар зерини эпидермис як қабат бофтаи механики (гиподерма) ва роҳҳои смола мум; пас аз он дурушт хлоренхимаи мезофил ва дар марказ бо эндодерма печонидаги дуто банди гузаронанда мавҷуд. Сохти бандҳо коллатерал – ксилема, қабати камбий тунук аз хушбӯйҳои флоема ва склеренхима иборат. Барги қарағай ба сохти ксерофил соҳиб: саҳт, пӯстшакл; 3-6 сол зист карда ва бо наждабат мерезад.

Қарағайи беша фақат аз тухм зиёд мешавад, ба монанди дигар лучтухмтоифаҳо дар цикли тарққиёти он ҳам насли спорофит боло истода,


гаметофит редукция шудаги ба ҳисоби растании спорофит ҳаёт мегузаронад. Қарағайи беша як хонаги чудочинса буда дар баъзе навдаҳояш ғуддаҳои микроспорофилдор ва дигар навдаҳоба бошад куббаҳои мегаспорофилдор пухта мерасад.

Куббаи микроспорофилдор ёки куббаи гардон ранги зард ёки сурхча дорад. Дар қисми пасти микроспорофил дутоги микроспорангий (халтаи гард) ва дар хоначаҳои он микроспораҳо (гардҳо) пухта мерасад. Гаметофити нарина дар дохили микроспорангий сабзида, ривочёбиро сар мекунад. Пӯсти микроспора беруна экзина ва дохили-интина гуфта мешавад. Онҳо аз якдигар чудо буда дар миёнаи он халтачаи ҳаво ҳосил мешавад ва ин халтача барои гардҳо бо ёрии шамол паҳн ёри мерасонад. Дар натиҷаи тақсимшавии ядрои гардҳо ҳучайраҳои проталлиал ва ризодиал ҳосил мешавад. Ин ҳучайраҳо тез ҳал шуда ва тақсимшави навбати ядрои микроспора антеридиал ва найи гардро ҳосил кунанда вегетатив ҳучайра ҳосил мешавад.

ГАМЕТОФИТ: Дар тири куббаи мегаспорофил мегаспорофилҳо чойгир мешавад. Дар асоси ҳар як мегаспорофил дуто тухммуғча пухта мерасад. Сатҳи тухммуғча бо интегументпечонида шудааст. Интегумент аз қабат иборат: қабати беруна ва дохили мулоим қабати миёна саҳт мебошад. Дар қисми нӯги интегумент микропиле буда, пасти он дар нуцеллус камераи гард чой гирифтааст. Дар нуцеллус мегаспораи калон ривоч меёбад ва аз он ду архегонийдор гаметофит ҳосил мешавад. Эндосперми якҷанда барои ривочёфтаистода чанинон ҳамчун ғизо хизмат мекунад.

Гард боёрии шамол ба тухммуғча афтада, бо микропели ба воситаи нуцеллус ба камераи гард мерасад. Вегетатив ҳучайраи гард найи гардро ҳосил мекунад, аз ҳучайраи антеридиал дуто спермий пухта мерасад, яке аз онҳо дар дохили архегоний будаги тухм ҳучайро бордор мекунад. Зигота ҳосил мешавад.. Дуюм тухмҳучайра ва дуюм архегоний ҳал мешавад. Тухм ҳучайраи бордоршуда якҷанд маротиба тақсим шуда, аввал бофтаи чанин, пас аз он чанинро ҳосил мекунад. Дар чанин реша, пояча, муғча ва якҷанд барг паллаҳо ҳосил мешавад. Тухмҳо дар давоми як сол пухта расида ва аз куббаҳо рехта спорофити навро ҳосил мекунад.

Расми схемаи давраи тараққиёт ва сохти қарағайро ба дафтари амалиёт кашидан зарур аст.



Расми 11 Цикли таққиёти Сановбар.

Спорофит: 1-2- Зинаҳои иштидои ривҷёбии спорофит, 3 – тухм, 4 – спорофити ҷавон, 5 – спорофити пухтаги, 6 – наждаи қуббадори ағдрдор ва тухммуғчадор, 7 – қуббаи тухммуғчадор, 8 – қуббаи микроспорофилдор, 9 – микроспорофити гарддор, 10 – мегаспорофити ду тухммуғчадор, P!- тақсимишави редуксионӣ

Гаметофит: 1 – микроспора-гардча, 2 – сабзиши мегаспора, 3 – гаметофити архегонийнок, 4 – гаметофити спермийнок, гарди сабзида, 5 – қисми нӯги архегонийноки тухммуғча, 6 – қисми спермийҳо ҷойгирифтаи найчаи гард, U!-бордоршавӣ.

МАШҒУЛОТИ 12

Мавзу: Сохт ва таракқиёти эфедра (*Ephedra distachya*)

Мақсади машғулот: Сохт ва цикли таракқиёти эфедра ро омӯхтан.

Шакли машғулот: амалиёт

Услуби гузаштани машғулот: ҳучуми ақли, анъанавӣ

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, гербария ва экспонатҳои эфедра, расм-нақшаҳо.


ТАРТИБИ ОМУҲТАН

Барои омуҳтани эфедра аз гербарияҳо, экспонатҳо ва расм-нақшаҳо истифода бурда мешавад. Пас аз шинос шудан бо гербария ва расмҳо мавҷуд набудани барг ва бутан наонқадар дароз будани он бовари ҳосил кардан мумкин.

СПРОФИТ: Намудҳои дар табиат месабзидаги спорофит мебошад. Сохти он ба чилбуғумҳо монанд аст. Аз гербария қирранок будани поя ва банднок, баргҳо дар навда рӯ ба рӯ ёки ҳалқашакл чой гирифтааст.

Эфедраҳо ду хонаги растани мебошанд. Аз гербария ва экспонатҳо маълум аст, ки растании куббадор куббаҳо дар навдаи борик 2-4 тоги чойгирифтааст. Дар асоси тири куббаҳо 2-8 та тангачашакл баргҳо, дар нӯги ҳар як микроспорофил аз 2 то 8 чангдонҳо (микроспорангияҳо) пухта мерасад. Микроспорангияҳо ду хонаги, баъзан 3-4 хонаги шуданаш мумкин. Дар микроспорангийҳо элипсшакл микроспораҳои бисёр ҳосил мешавад ва дар дохили микроспорангий ба ривочёби оғоз мекунад. Дар микроспораи сабзида дуто проталлиал, якто вегетатив ва якто антеридиал ҳучайра мешавад. Ядрои антеридиали ҳучайра тақсим шуда спермаген ва ядрои пояча ҳучараи антеридийро ҳосил мекунад. Микроспора сабзида бо ёрии шамол паҳн шуда, ба воситаи микропиле ба камераи гард дохил мешавад. Куббаи тухммуғча дар навдаи индивиди дигар ҳосил мешавад. Тухммуғча бо ду чилд пӯшида шудааст: беруна пӯсти хушк ва дохили интегумент. Яке аз қатламҳои интегумент, дар болои тухммуғча ба худ хос найи микропилярро ҳосил мекунад. Қисми маркази тухммуғчаро эндосперми якҷанда ишғол кардааст, қисми болои он дар нуцеллус камераи гард шакл меёбад. Дар эндосперм дуто архегоний пухта мерасад. Дар камераи гард ривочёбии микроспора давом меёбад. Найи гард ҳосил шуда, он ба воситаи нуцеллус ба тарафи архегония равона мешавад. Ядрои спермаген тақсим шуда дуто спермий ҳосил мекунад, нӯги найи гард кафида яке аз спермияҳо бо якто тухм ҳучайраи архегоний якҷоя мешавад ва бордори ба вучуд омада, аз он чанин шакл меёбад. Чанин аз ду тухмпалла, решача ва муғча иборат. Тухм аз берун бо ранги сурх, мулоим ҳосилаи интегумент “пӯсти мева” пӯшида шудааст. Тухм ба шароити мусоид афтада ривоч меёбад ва индивиди навро ҳосил мекунад.

Расм ва нақшаи сохти беруна ва аъзоҳои генеративи эфедраро ба дафтари амалиё кашидан зарур.



Расми 12: Эфедраи ду хӯшадор (*Ephedra distachya*).

А – Навдаи гарддор; Б- навдаи тухмаи пухтарасида; В- гарддор “тудагул”, Г- “гули” гарддор, Д-буриши ба дарози тухммуғча, 1 – баргҳои стерили мӯякишакл, 2 – нуҷеллус, 3 – камераи гард, 4 – найи микропиле, 5 – чилди “гул”, интегумент, Е – қуббаи тухммуғчаи бо мӯякҳо пачида.

ШЎЪБАИ МАГНОЛИЯТОИФАҲО (ПЎШИДА ТУХМТОИФҲО) – MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMATOPHYTA)

Дар баъзе адабиётҳо ин шўъба растаниҳои тухмдор ёки гинецейнок гуфта мешавад. Бо асоси нишондодҳои илми солҳои охир омада баромадан дар соҳаи таснифоти растаниҳои гулдор магнолиятоифаҳо гуфта ном гирифтаанд.

Магнолиятоифаҳо дуҷум шўъбаи растаниҳои тухмдор буда, сохти мураккаби тана, ба худ хосноки афзоиши чинси (мавҷуд будани гул), адади намудҳо ва бисёр будани имкониятҳои мутобикшавӣ ба муҳити зист, дар қураи замин васеъ паҳн шуда аз споранокҳои оли ва қарағайтоифаҳо фарқ мекунад. Онҳо дар мобайни ҳама растаниҳои дараҷаи оли аз ҷиҳати филогенетик аз ҳама ҷавон ба ҳисоб рафта, давраи авҷи ривҷебии онҳо ба дуҷум нимаи давраи бўри эраи мезазой тугри меояд. Дар аввали асри XX адади намуди растаниҳои гулдор 160000 гуфта шудааст (Н.Кузнецов), дар миёнаи аср аз 200000 зиёд ва дар вақти ҳозира бошад 533 оила, 13000 туркумба мансуб 250.000 намудҳо муайян карда шудааст (А.Л.Тахтаджян, 1987 г).

Боз яке аз аломатҳои фарқи магнолиятоифаҳо, аъзои махсуси афзоиши чинси гул мебошад. Ба монанди дигар растаниҳои дараҷаи оли дар цикли таракқиёт ду фаза мавҷуд: спорофит (диплоид, ғайричинси) ва гаметофит (гаплоид, чинси).

Гул – аз комбинацияи метаморфозаи поя ва барг иборат буда, аз ғунҷа ривоч ёфтаги наждаи генератив мебошад. Ба сохти гул ба худ хос зеринҳо аломатҳои фарқкунандаи магнолиятоифаҳо аз дигар растаниҳои дараҷаи оли аз зеринҳо иборат:

1) Тухммуғчаҳо як ёки якчандто буда, дар дохили ғўраки тухмдон ба ҳолати пўшанда чой гирифтааст; 2) дончаҳои гард бевосита ба микропиле нарафта, балки ба паҳнаки тухмдон меафтад ва мечаспад; 3) гаметофитҳо содда шудаги, гаметангий нест ва гаметофит дар натиҷаи як чанд маротиба тақсимшави митотики шакл меёбад; 4) бордоршавии дучанда ба вучуд меояд, яке аз спермийҳо тухммуғча дар дохили халатаи чанин будаги ҳучайра тухм, дуомаш бошад, бо ҳучайраи маркази диплоид хромосоманок якҷоя мешавад, дар натиҷа чанин ва онро ғизодиҳанда бофтаи эндосперми триплоиди ҳосил мешавад.

Дар бисёр ҳолатҳо гул, ба монанди нажда аз беҳи барги пўшиш ҳосил шуда, банди гул, паҳлӯи гул ва чои гул мавҷуд. Дар чои гул гулкосачабаргҳо, тоҷгулбаргҳо ва тухмдон чой мегирад. Қўрғони гул содда ёки ду қабат, озод ёки пайваста, туғри (актиноморф) ёки нотуғри (зигоморф), баъзан гул бегулқўрғон (хўшадорҳо) шуданаш ҳам мумкин.

Гардонҳо (андроцей) – микроспрофилҳо ба ҳисоб рафта, аз риштаи гард ва гардонҳо иборат, дар гардон бо гардҳо пур шудаги 1-4 та хоначаҳои гардон мавҷуд. Дар маркази гул гардгирак чой гирифта, ҳар як гардгирак аз як ёки дар бисёр ҳолатҳо аз якҷояшави якчандто баргмеваҳо ҳосил мешавад. Паҳнаки гардгирак, сутунча (гарданак) ва шикамча (ғўрак) сето қисм иборат ва дар дохили ғурак тухммуғча (тухммуғчаҳо) чой гирифтааст. Дар маркази тухммуғча будаги халтаи чанин, онро печонидаги нуцеллус ва аз се қабат интегумент иборат ва бо пояча ба девори дохили ғурак пайваста мешавад. Нуцеллус мегаспорангии шаклдигаркарда мебошад, дар дохили он бо роҳи мейоз 4 та мегаспора ҳосил мешавад, аз онҳо яктоаш сабзида ба халтаи чанин (гаметофити модари) табдил меёбад, боқибсонда ҳал шуда меравад. Халтаи чанин пеш аз чараёни бордоршави аз якто тухмҳучайра, дуто синергида (ҳамроҳак), сето антипода ва якто ҳучайраи маркази ташкил меёбад.

Гулҳо якчинса, дучинса, баъзан ғайричинси; яктоги, содда ёки мураккаб тўдагулҳоба чойгирифтанишон мумкин. Сохти гулро, адади қисмҳо ва пайвастшави формулаи гул ва бо воситаи диаграмаи он нишон дода мешавад. Масалан, формулаи гули себ: $Ca_5 Co_5 A_{\infty} G_{605}$.

Адади қисмҳо, шакл, ранги гул дар ачдодҳо, қабилаҳо, оилаҳо, туркумҳо ва таснифоти намудҳо аломатҳои ҳалқунандаи систематики ба ҳисоб мераванд.

Гард ба пахнаки гардгирак афтида, аз ҳисоби ҳучайраи вегетативи найчаи гард шакл меёбад, аз ҳучайраи генеративи бошад, дуто спермий ҳосил мешавад; найчаи гард дар ҳалтаи чанини тухммуғча ривоч меёбад. Яке аз спермийҳо ҳучайра тухмро, дуомаш бошад ҳучайраи марказиро бордор мекунад. Ин ҳодисаро 1898 сол профессори университети Киев С.Навашин аз лилияи беша тайёр кардаги препарат кашф карда ва онро “бордоршавии дучанда” гуфта номидааст.

Соҳти мураккаби олии анатоми ва морфологии магнолиятоифаҳо бо экология бевосита алоқаманд аст. Аммо дар хуноки, гарми, хушки ва дар об сабзидан барои растаниҳои гулдор муҳити зисти дучанда мебошад. Ҳамаги аз растаниҳои гулдор обҳои шӯр 30 намуд сабзиданаш муайян карда шудааст.

МАШҒУЛОТИ 13

Мавзу: Соҳти гаметофит ва спорофит дар магнолиятоифаҳо (пӯшидатухмтоифаҳо) – Magnoliophyta (Angiospermatophyta)

Мақсади машғулоти: Соҳт ва цикли тараққиёти магнолиятоифаҳоро (пӯшидатухмҳо) омӯхтан.

Шакли машғулоти: амалиёт

Услуби гузаштани машғулоти: ҳучуми ақли, анъанави

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, ғунча, гули лилия ёки амарилис (ёки растаниҳои дигар), микропрепаратҳои сабзиши гард ва соҳти тухммуғча; расм-накшаҳо, бордоршавии дучанда, микро ва макроспорогинез; микроскоп, косачаҳои Петри, сӯзан препарат.

Вазифаҳои зеринро иҷро кунед:

1. Дар микропрепарат соҳти гардон ва гаметофити наринаро омӯzed. Барори дар гармхона аз буриши кундаланги гардони гули лилия ва амарилиси сабзида истода ёки микропрепарати тайёр истифода бурда мешавад. Мушоҳида кунед гардон аз чандто хонача иборат? Дар он будаги ҳар як хонача якто спорангий мебошад. Аз препарат девори хонача ва

археспорияи марказиро ёбед. Деаори спорангия аз чор қабат эпидермис, фиброз, миёна ва ба археспория расида истодаги қабати ҳучайраҳои тапетум иборат буданаширо эътибор диҳед. Сохти дар намунаро ба дафтари амалиёт кашида гиред.

Пас аз он гардони пурра кушода шудаи гули лилия ва амарилисро намуна тайёр карда омӯхтан зарур. Ҳучайраҳои қабати дохили – тапетум ва миёнаи спорангий ҳал шуда ба моддаи часпак табдил ёфтанаширо мушоҳида кунед. Ин модда барои сабзидани гардҳо ҳамчун моддаи ғизои хизмат мекунад. Дар хонаҷаҳо бисёр гардҳо ҷой гирифтааст, онҳо дар натиҷаи пай дар пай тақсимшави ҳучайраҳои археспория ва дар натиҷаи ҳар як тақсимшави редукцион тетрадаҳо – гардҳои гаплоид пайдо шудааст. Дар гардон будаги ҳар як гард сабзида ба гаметофит табдил меёбад, дар дохили он ҳучайраи вегетативӣ шакл меёбад. Гард бо интина ва экзина қабати пуст печонида шудааст. Сохти берунаи гардро ба дафтари амалиёт кашида гиред.

Аз препарати тайёр гарди ба пахнаки гардгирак афтидаро аз назар гузаронед ва ба дафтари амалиёт кашед.

2. Аз микропрепарати тайёр сохти тухммуғчаро омӯzed.

Дар микроскоп тухммуғчаи гули лилия ёки лоларо мушоҳида кардан мумкин. Аввал сохти тухм муғчаро аз китоб ва расм –нақшаҳо аз назар гузаронед. Аз препарат найи гард ва тухммуғчаро ёбед, ҷойгиршавии тухммуғча туғри ёки нотуғри? Ҳалтаи чанин ва онро печонидаги нуцеллусро ёбед. Аз дохили ҳалтаи чанин ҳучайра тухм, синергидаҳо, ҳучайраи маркази ва ҳучайраҳои антиподаро ёбед. Расми сохти тухммуғчаро кашед ва номи қисмҳои онро нишон диҳед.

3. “Аз морфологияи растаниҳо” мавзӯи сохти гул дар пӯшидатухмҳо микроспорагенез ва ривочёбии гаметофити нарина; мазуҳои сохти тухммуғча ва ривочёбии гаметофити модариро ёфта хонед, пурра омӯzed, консепт кунед ва нақшаи онро ба дафтари амалиёт кашед.

Аз маълумотҳои ҷамшуда истифода бурда расми нақшаи схемаи давраи ривочёбии (цикли) магнолиятоифаҳо (пӯшида тухм растаниҳои гулдор) ро кашед.

4. Тартиби умумӣ тавсифдиҳи растани гулдор.

Барои тавсиф додани ҳар гуна растани гулдор ба зеринҳо эътибор дода мешавад.

А) Шакли ҳаёти растани ва аҷдод (синф) дарахт, бута, ним бута, ўт (бисёрсола, ду сола, як сола) – магнолияшаклҳо (ду паллагихо), лилияшаклҳо (як паллагихо).


Б) Системаи реша

- решаи асосӣ, решаҳои иловагӣ, решаҳои паҳлӯӣ,

- шакл (биотиб) тир реша, патак реша, решапоя, шохаронда,
- метаморфозаҳо: лунда решаҳо, решамеваҳо, лундаҳо.

В) Поя

- рост, печанда, часпанда, хазанда
- шохаронда, шоханаронда,
- мўякчадор, бемўякча
- буриши он: диора, чорбурча, себурча, паҳн,
- метаморфозаҳо: решапояҳо, пиёзҳо, хорҳо, лундаҳо.



Расми 14 Цикли тарақиёти растаниҳои гулдор

Спорофит: 1-2-Зинаҳои иптидоии ривҷёбии спорофит, 3 – мева ва спорофити чавон, 4 – спорофити пухта расида, 5- гул, 6 – гард, 7- гардгирак, 8 – буриши кундаланги гардон, 9- буриши кундаланги тухммуғча, P!- тақсимишави редуксионӣ.

Гаметофит: 1 – тухммуғчаи пухта расида, 2 – гардча, 3 – сохти халтаи чанин, 4 – гарди сабзида, 5 – найчаи гарди спермийдор, 6 – ҳучайра тухм ва якҷояшави спермийҳо бо ҳучайраҳои маркази, У! – бордоршавӣ.

Г) баргҳо

- содда, банддор, бебанд, ғилофдор; баргчаи паҳлӯи надошта, баргчаи паҳлӯи дошта, шакли сатҳи барг; атрофи барг: бутун, аррашакл, дандонадор, рағбанди; патшакл, панчашакл, паралел, камоншакл,

- мураккаб, баргчаҳои паҳлӯи мавчуд нест ёки мавчуд, шакли барг, шакли баргчаҳо; шакли атрофи баргча бутун, аррашакл, дандонашакл; адади баргчаҳо,

- Чойгиршаби баргҳо дар поя: пай дар пай, рӯба рӯ (супротив), ҳалқашакл (мутовка), дар атрофи гадани реша ,

Д) тўдагулҳо

- моноподиал: хўшаи содда, ҳалқашакл, сўта, шингил, соябон, сарак, сабатча; хўшаи мураккаб, соябони мураккаб,

- симподиал: монохазий (гачак), дихазий, плейохазий,

- тўпгул мавчуд нест (гулҳо яктоги чой гирифтааст).

Ж) Гул

- актиноморф, зигоморф,

- гулкўрғон: мураккаб, содда (точшакл, косачашакл), гулкўрғон мавчуд нест,

- косача: озод, якчоя сабзида (дарачаи якчояшаби, шакл),

- точгул: озод, пайваста сабзидаги (дарачаи пайвастшаби, шакл): гул – адади точбаргҳо, адад, ранг, мавчуд будани зиёдатиҳо, мавчуд будани нектарҳо,

- гардон: якхел ёки ду хел дарозиба, адади онҳо

- гардгирак: содда (апокарп, синкарп, адади баргпаллаҳо) мураккаб (адади гарбаргҳо)

- формулаи гул тартиб диҳед (Ca, Co, A, G)

З) Мева

- содда: бисёртухма хушк: баргак, лўбиёги, қутича, кўсак; яктухма хушк: чормағз, чормағзча, писта; меваи қанотчадор, хуша; бисёр тухма тармева: резавор, себ мева, каду мева; яктухма хушк: донак мева,

- тўдамева

Номи оила (лотини тоҷики).....

Роҳи муайян намудани оила (теза, антеза №).....

Методи муайян намудани туркум (теза, антеза №).....

Методи муайян намудани намуд (теза, антеза, №).....

МАШҒУЛОТИ 14

Мавзу: Афзоиш ва сохти магнолия ва зирк (*Magnolia grandiflora*)

Мақсади машғулоти: Сохт ва цикли тараққиёти магнолия ва зиркро омӯхтан.

Шакли машғулоти: амалиёт

Услуби гузаштани машғулоти: ҳучуми ақли, анъанави

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, гербарияҳо, экспонатҳо, лупа, игна, расмнақшаҳо оид ба магнолия, китобҳо

Ачдод: Магнолияшаклҳо (дупаллагихо) – Magnoliopsida (Dicotyledones)

Зерачдод: Магнолиягихо – Magnoliidae

Қабила: Магнолиянамоҳо – Magnoliales

Оила: Магнолиягихо – Magnoliaceae

Зероила: Магнолиягичаҳо – Magnolideae

Намуд: Магнолия – *Magnolia grandiflora*

Оила: Зиркгихо – Berberidaceae

Намуд: Зирки сиёҳ – *Berberis oblonga* Shneid.

Қабилаи магнолиятоифаҳо аз тасаввурҳои ҳозира маълум аст, ки растаниҳои қадимаи гулдор мебошад. Сохти анатоми ва морфологи ва шакли ҷои гул ва дар он ҷойгиршавии тартиби қисмҳои гул аз он далолат медиҳад. Гули он калон то 10 см ҷа, тоҷбаргҳо 6-12 та, 3 тоғи доира ҳосил мекунад, адади бисёри гардбаргҳо ва гардгиракҳо дар ҷои гул спиралшакл ҷой гирифтааст. Тартиби ҷойгиршави гардбаргҳо аломати онҳо дар банди тўдамева нигоҳ карда муайян кунед. Тартиби ҷойгиршави гардгиракҳо (гинетей) ро, ба ҷои конусшакли гул меваҳо асос карда муайян карда мешавад.

Ба дафтари амалиёт расми гул, ҷойгиршави қисмҳои гул ва сохти тўдамеваро кашед. Диаграма ва формулаи гулро тартиб диҳед ва ба дафтар нависед

Формулаи гули магнолия $Ca_0 Co_{6-12} A_{\infty} G_{\infty}$.




Расми 15. Магнолия (*Magnolia grandiflora*)

А-нақшаи гул, Б-нақшаи тўдамева, В-диаграмаи гул.

Дуюм зер оилаи магнолиягиро Лириодендрогичах (*Liriodendroideae*) буда, онро ҳамчун дарахти манзаранок истифода мебардаги намудаш дарахти лола (*Liriodendron tulipifera*) мебошад. Аз гербарияҳо истифода бурда сохти онро омӯзед. Ба чор нуга будани барг сохти ба худ хосро дорад. Якхела будани қисмҳои гулкӯрғон (точбаргшакл), бисёр будани гардон ва гардгиракхоро мушоҳида кунед.

Ба оилаи зиркҳо бута ва алафҳо дохил мешаванд. Бутаи зирк 2-3м буда, баргҳо пай дар пай ҷой гирифтааст. Дар навда хорҳо дар натиҷаи тағирёби барг ба вучуд омадааст. Гулҳо ранги зард дошта, дар шингил тўдагул ҷой гирифтааст. Дар гул нектардонҳо мавҷуд ва энтомофил гардолуд мешавад. Формулаи гул $+ P_{3+3} A_{3+3} G_1$. Мева резавор зард ёки сурхчатоб.



Расми 16. Зирки сиёҳ (*Berberis oblonga*)

Барои омӯхтани мавзу зеринҳоро иҷро кунед:

1. Аз гербарияҳо ёки материали табиӣ сохти магнолия (*Magnolia grandiflora*)ро омӯхтан.
2. Дар асоси гербария ва китоб ба растани таъриф диҳед – тана, шох-шабаҳо чигуна (пирамидал, шаршакл, паҳн)буданаширо мушоҳида кунед ва нависед.
3. Морфологияи шакли барг, ҳачм, сатҳ ва атрофи онро тавсиф диҳед. Гули онро (аз гербария ёки ба мисоли гули табиӣ) омӯzed ва таъриф диҳед.
4. Қўрғони гул ва қисмҳои онро таъриф диҳед, шакли ҷои гул (конусшакл) эътибор диҳед.
5. Қисмҳои гулқўрғон, тартиби ҷойгиршави гардонҳо ва гардгиракҳо дар ҷои гул, ва бо ҷойгиршавии тухмдон ва тухммуғҷаи қарағай муқоиса кунед. Мобайни растаниҳои гулдор ва қарағайтоифаҳо наздики филогенетикиро фикр баён кунед.

МАШҒУЛОТИ 15

Мавзу: Сохт ва афзоиши чинорак (*Ranunculus acris*)

Мақсади дарс: Сохт ва цикли афзоиши чиноракро омӯхатн.

Шакли машғулоти: амалиёт

Услуби гузаштани машғулоти: ҳучуми акли, анъанави

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, Гербарияҳои туркуми Чинорак (*Ranunculus*), исфарак (*Delphinium*), учма (*Ceratocephalus*), седона (*Nigella*), растани табиӣ, нақшаҳо-расмҳо, лупа, сўзан препарат, китобҳо.

Аҷдод: Магнолияшакл (дупаллаги)ҳо – Magnoliopsida (Dicotyledones)

Зераҷдод: Чинораккабиҳо – Ranunculidae

Қабила: Чиноракнамоҳо – Ranunculales

Оила: Чиноракиҳо – Ranunculaceae

Зероила: Чиноракичаҳо – Ranunculoideae

Намуд: Чинораки печанда – *Ranunculus acris*

ТАРТИБИ ОМӢХТАН


Оилаи **чиноракгиҳо** дар вақти ҳозира аз 66 иуркум, зиёда 2000 намудҳо мавҷуд буда, онҳо ба 5 та оилача тақсим карда меомӯзанд. Яке аз туркумҳои асоси оила чинорак (*Ranunculus*) мебошад. Чиноракиҳо растаниҳои алафи, оилачаҳо бо сохти гул аз якдигар фарқ меkunанд. Шиноси бо гербарияҳои мавҷуд буда.

Чинораки заҳарнок () дар сернам алафзорҳо, зминҳои заҳ, лаби чӯйборҳо сабзида пояш 30-80 см, баргҳо панчашакл, бисёрсола кӯтоҳ решапоянок алаф. Поя тик, цилиндршакл, сершох, дарунковак, баргҳо бо навбат чой гирифтаанд, содда панчашакл, қисмҳояш ромбшакл, ланцетшакл.

Гулҳо зард, бандаш дароз, яка-яка дар тӯдагул чой гирифтааст. Гулкӯрғон ду қабат, 5 аъзоги, қисмҳо озод, точбаргҳо тухмшакл, дар қисми асоси сатҳи дохили нектардон мавҷуд ва он бо мӯякчаҳо пӯшида шудааст. Гардон бисёр, озод, дар чои гул ба тарзи спирал чой гирифтааст. Тухмдон (гинецей) апокарп, мураккаб, адади номаълум ва конусшакл дар чои гул чой гирифтааст. Ғуррак болои, як хонаги ва як тухммуғчанок, гарданак кӯтоҳ, паҳнак ғафс нашудааст. Формулаи гул $C_5 \ C_5 \ A_{\infty} \ G_{\infty}$

Мева мураккаб тӯда чормағзча.

Дар охири дарс расми сохти умуми растани, буриши кундаланги гул, сохти точбарги гулро ба дафтари амалиёт кашед.



Расми 17. Чинорак (*Ranunculus acris*).

А – сохти умуми, Б – точбаргҳои гул, В – кӯрғони гул гирифта партофта шудааст, Г – мева (чормағзча), 1 – фуруҳамидаи асоси точгул, 2 – гинецей-гардгиракҳо, 3 – андроцей-гарбаргҳо.

Дар давоми дарс вазифаҳои зеринро иҷро кунед:

1. Сохти гуногуни намояндаҳои оилаи Чиноракиҳои дар флораи Ўзбекистон месабзидагиро омӯzed:

- Туркумҳои гулкӯрғонноки гулҳояш содда – пуфанак (*Anemone* -точбаргшакл), илонўт, илонпечак (*Clematis* -косачашакл), санчикўт (*Thalictrum* -бекўрғон)....

- Туркумҳои гулкӯрғонноки гулҳояш мураккаб – чинорак (*Ranunculus*), сувйиғар (*Aquilegia*), учма (*Ceratocephalus*)....

- Туркумҳои зигоморф гулнок – исфарак (*Delphinium*), парпи (*Aconitum*).....

2. Ба тартиби тавсифи растаниҳои гулдор нигоҳ карда, сохти чиноракро тавсиф диҳед. Ба аъзоҳои вегетатив ва сохти гул алоҳида эътибор диҳед.

3. Сохти умуми растани омӯхтаро, расми мева ва баргашро кашед, формула ва диаграмаи гулро тартиб диҳед.

4. Ба оила мансуб 3-4 намудро муайян кунед ва пай дар пай онро ба дафтари амалиёт нависед.

5. Ба чиноракиҳо мансуб бо растаниҳои маданий шинос шавед – саллагул, пеон (*Paeonia*), седона (*Nigella*) ва аҳамияти онҳоро нишон диҳед.

МАШҒУЛОТИ 17

Мавзу: Сохт ва афзоиши юнучқа (*Medicago sativa*)

Мақсади дарс: Сохт ва цикли афзоиши оилаи лўбиёгичоро омӯхтан.

Шакли машғулоти: амалиёт

Услуби гузаштани машғулоти: ҳучуми ақли, анъанави

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, Гербарияи туркумҳои нухат (*Pisum*), юнучқа (*Medicago*), талхак (эшакмия) (*Vexibia*), нўхотак (*Astragalus*), баргак (*Onobrychus*), себарга (*Trifolium*), шутурхор (*Alhago*), ширинбех (*Glycyrrhiza*), мушкбўя (*Psoralea*), шамбала (*Trigonella*), юнучқаи кашқари (*Melilotus*), расмнакшаҳо, лупа, сўзани препарат, китобҳо.

Ачдод: Магнолияшаклҳо, (Дупаллагихо) – Magnoliopsida (Dicotyledoneae)

Зерачдод: Настарингиҳо – Rosidae

Қабила: Лўбиёгинамоҳо – Fabales


Оила: Лўбиёгиҳо – Fabaceae

Зероила: Лўбиёгичаҳо – Faboideae

Намуд: юнучқаҳо – *Medicago sativa*

Дар вақти ҳозира аз оилаи лўбиёғиҳо 650 туркум, 18000 мавҷуд будани намудҳо маълум. Баргҳо сетоги, панчашакл, патшакл мураккаб буданаш, шакл ва калонии баргҳо; сохти ба худ хоси парвонашакли гулҳо; сохти ба худ хоси парвонашакли гулҳо ва дар реша симбиоз зист кардани лундачаҳои бактерияҳо аломатҳои характерноки оила мебошад. Барои дар дохили оила туркумҳоро муайян кардан ҷойгиршавии тартиби гардонҳо ба аҳамияти муҳим соҳиб мебошад. Риштачаҳои туркумҳои талхак (*Vexibia-Sophora*), афсонак (*Thermopsis*), 10 то гардонҳо озод; дар люпин (*Lupinus*), дрок (*Genista*) 10 то риштачаҳои гардон бо якдигар пайваست шуда ва найи гардро ҳосил кардааст. Аммо дар аксарияти бисёр туркумҳо 9 то риштачаҳои гардон якҷоя шуда якҷоаш озод – нўхат (*Pisum*), нут (*Cicer*), юнучка (*Medicago*), себарга (*Trifolium*), шутурхор (*Alhagi*) ба онҳо мисол мешавад.

Сохти меваи лўбиёғиҳо ҳам ба худ хос мебошад. Дар баъзе туркумҳо лўбиё аз ду табақ иборат (мош, лўбиё, нўхат, нут, бурчок), баъзеҳояш лубиё аз бисёр тухм, аммо ба як қисмча тухмҳо тақсим мешавад (*Coronilla*, *Hedysarum*), мушкбўя ва эспарцет дукар як тухма мебошад.



Расми 18. Гуногуни меваҳои оилаи лўбиёғиҳо (*Fabaceae*).


А – расмона лубиё (*vicia sativa*), Б – лубиёи як тухм ҷудо мешудаги лўбиё (*Hedysarum obscurum*), В – лубиёи спиралшакл (*Medicago sativa*), Г – лўбиёи яктухма (*Onobrychis sativ*), Д – як-ду тухма қанотдор лўбиё (*Pterocarpus indica*).

Қади юнучка (*Medicago sativa*) 50-90 см ҷа бисёрсола поликарп растанӣ. Реша тирреша буда дар он бисёр лундачаҳои бактерияҳо мавҷуд. Дар лундачаҳо азот ҷамқунанда бактерияҳо (*Azotobacter radicola*) ҷам шуда, азоти атмосфераро фиксация ва ҷамқуни вазифаашро иҷро мекунад. Поя рост, сершох, буриш доира, қобурғанок мебошад. Баргҳо сетоги мураккаб, паҳлўбаргҳо; баргчаҳо дароз, атрофаш аррашакл дандонадор.

Гулҳо зич дар шингил, аз барг дарозтар, зигоморф мебошад. Қўрғони гул ду қабат: косача гул 5 та ба якдигар пайваст косачабаргҳо ташкил ёфтааст.

Точгул аз 5 та точбарг иборат – аз хамин сетоаш озод, дутоаш бошад бо нўгаш пайваст ва қайиқчаро ҳосил мекунад. 9та гардонҳо 5+4 ба якдигар пайваст ва 2 та ҳалқа ҳосил мекунад, 1 та озод, алоҳида чой гирифтааст. Гардгирак якта, аз асосаш ҳам шудааст, ғурак болои , як хонаги, якчанд тухммуғчадор. Формулаи гул – $Ca_{(5)} Co_{1+2(2)} A_{(5+4)+1} G_1$

Мева-спиралшакл тобхўрда дукак. Гербарияро аз назар гузаронида , барг, тўпгул, гул; расми гардон, гардгирак ва мева ба дафтари амалиёт кашидан зарур.



Расми 19. Юнучқа (*Medicago sativa*).

А – наждаи гул, баргдор, Б – системаи реша; В – гул (сохти умуми ва буриши ба дарози); Г – тухм; Д – мева-лўбиёги.

Вазифаҳои зеринро иҷро кунед.

1. Фарқи сохти аъзоҳои вегетатив ва генеративӣ якчанд намудҳои лўбиёғихоро тавсиф диҳед- сохта акатсия (*Robinia pseudoacacia*) ёки сафораи япон (*Sophora japonica*); себарга (*Trifolium repens*, *T.pratense*); шутурхор (*Alhagi camelorum*).
2. Расми барг, гул, меваи ҳар як растании тавсифкардaro ба дафтари амалиёт кашед.
3. Якчанд намуди оиларо аз китоб истифода бурда муайян кунед.
4. Номи илми ва маҳали якчанд намуди лўбиёғихор ба дафтар нависта аҳамияти онро нишон диҳед.

МАШҒУЛОТИ 18

Мавзу: Сохт ва афзоиши пудинаи Осиё (*Mentha asiatica*)

Мақсади машғулоти: Сохт ва цикли тараққиёти пудинаи осиро омӯхтан.

Шакли машғулоти: амалиёт

Усули гузаштани машғулоти: ҳуҷуми ақли, анъанавӣ

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, Гербарияи туркумҳои пудина (*Mentha*), марварак (*Salvia*), гӯшибара (*Phlomis*), пудинаи кӯҳи (*Ziziphora*), райҳони кӯҳи (*Origanum*), эремостахис (*Eremostachys*); лупа сӯзани препарат, китобҳо, расм-нақшаҳо.

Ачдод: Магнолияшаклҳо (дупаллагҳо) – Magnoliopsida (Dicotyledoneae)

Зерачдод: Пудинагҳо – Lamiidae

Қабила : Пудинанамоҳо – Lamiales

Оила: Пудинагҳо (Лабгулиҳо) – Lamiaceae (Labiatae)

Зероила: Пудинагичаҳо – Lamioideae

Намуд: Пудинаи Осиё – *Mentha asiatica*

Пудинагҳо яке аз оилаҳои калони растаниҳои гулдор буда аз 200 туркум ва 3500 зиёд намудҳо дохил мешаванд. Дар кураи замин васеъ паҳн шудаанд, бисёри онҳо растаниҳои космополит мебошанд. Дар дохили оила 11 та зероила фарқ карда якҷандтои онҳо як туркум доштаги оилачаҳо ба ҳисоб мераванд. Яке аз зероилаи калони марказии пудинагҳо пудинагичаҳо буда, он 34 туркумро дар бар мегирад.

Яке аз аломатҳои характерноки оила ин чор қараноки поя баргчаҳои паҳлӯи надоштани баргҳо ва чойгиршавии рӯ ба рӯ, қисмҳои болои замини ба дараҷаи муайян бо мӯякчаҳо пӯшида шуда, дар бисёриҳо чудокуни рағбанҳо эфери мебошад.

Тўдагулҳо ҳушакл ёки дар поя култиғибарг 6, 14, 30 гулнок мутовқаҳо, ҳалқаҳо, баъзан дар нӯги поя саракшакл тўдагул ҳосил мекунад.

Гулҳо зигоморф, аксарияти онҳо ду лабнок, баъзан актиноморф (*Mentha*). Гулкосачаҳо 5 та пайваста аз гулкосачабаргҳо ҳосил шудааст - кунғироқшакл, найшакл ёки 2 лабнок. Точгул 5 аъзонок, қисми асос найча,

қисми нўғ бошад 2 та лаби овезон ҳосил кардааст. Баъзан точгул 4 аъзоги (Teucrium, Ajuga). Қисми дохили найча мўякчанок буда он барои пудинагиҳо аломати асоси таснифоти ба ҳисоб меравад.


Гардонҳо 4та дутоаш дароз, ва бокибмонда кўтоҳтар мебошад. Ҳамаи онҳо дар сатҳи дохили найчаи точгул чой гирифтааст. Аммо дар марварак (Salvia), розмарин (Rosmarinus)ҳо гардонҳо дуто. Геницей якта ва он аз пайваستшавии дуто мевачабарг ҳосил шудааст. Болои ғурак 4 хонаги. Устунча анча дароз, тумшуғаш ду лабдор мебошад. Формулаи гул - $Ca_{(5)} Co_{(2+3)} A_{2+2} G_{(2)}$

Мева тўда чормағзча, 4 та дароз тухмшакл ба 3 қиранок чормағзча тақсим мешавад.

Пудинаи Осиё дар Ўзбекистон анча бисёр паҳн шуда растании бисёрсолаи поликарп мебошад. Поя 60-70 см, шохаронда, рост, 4 қиранок, бо мўякчаҳои майдаи кумушранг пўшида шуда, баргҳо наштаршакл, дароз асосаш дилшакл; бандаш кўтоҳ яки часпанда, атрофаш аррашакл дандонадор. Тўдагулҳо дар нўғи поя ёки дар қисми болои поя будаги қултиғи баргҳо чой гирифтааст. Гулпахлуи баргҳо ришташакл, мулоим мўякчанок. Косача сиёҳчатоб 2,0-2,5 (3) мм, зич мўякчадор, дандончаҳо аз найи точ 1,5- 2,0 маротиба калтатар мебошад.

Дар моҳҳои июнь-август гул карда, дар моҳҳои июль-сентябр мева ҳосил мекунад. Дар лаби чў, канал, сойҳои кўҳҳо, чойҳои сернам месабзад.

Дар Ўзбекистон 3 намуди ёвонии пудинагиҳо месабзад.



Расми 20. Сохти пудинаи Осиё (Mentha asiatica).

1-сохти умуми, 2-сохти барг аз тарафи пеш ва пушт, 3-сохти гул, 4-сохти гардгирак, 5-сохти мева.

Дар давоми дарс зеринҳоро иҷро кунед.

1. 3-4 намуди аз якдигар фарқ мекардари аз гербария чун карда гиред ва дар асоси қоидаи қабулкарда шуда тавсиф диҳед: марварак (*Salvia*), ғуши барра (*Phlomis*), пудинаи кӯҳи (*Ziziphora*), райҳони кӯҳи (*Origanum*).

2. Расми барг, буриши кундаланги поя, сохти умуми гул, гулкосача, гулточ ва гардонҳои ҳар як намудро ба дафтари амалиёт кашед.

3. Ба оила мансуб 3-4 намудро муайян кунед ва пай дар пай онро ба дафтар нависед.

Аз оилаи пудинагӣҳо бо намудҳои мадани райҳон (*Ocimum basilicum*), марварак (*Salvia splendens*), мурч, пудина (*Mentha piperita*), шинос шуда номхояшро нависед ва азёд кунед.

МАШҒУЛОТИ 19

Мавзу: Оилаи кӯкноргӣҳо (*Papaveraceae*) ва шотарагӣҳо (*Fumariaceae*)

Мақсади машғулоти: Сохта ва афзоиши кӯкнорро омӯхтан.

Шакли машғулоти: амалиёт

Услуби гузаштани машғулоти: анъанавӣ, ҳуҷуми ақлона

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаи электрони, дастурамали электрони, гербарияи туркумҳои кӯкнор (*papaver*), лолаарӯсак (*roemeria*), ўрмонқора (*glaucium*), хунҷўп (*chelidonium*), бурмақора (*corydales*), шотара (*fumaria*), шотарача (*fumariola*), лупа, сўзани препарат, китобҳо.

Мазмуни машғулоти:

Ачдод: Магнолияшаклҳо (дупаллагӣҳо) - *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)*

Зерачдод: Чинораккабӣҳо - *Ranunculidae*

Қабила: Кӯкнорнамоҳо - *Papaverales*

Оила: Кӯкноргӣҳо - *Papaveraceae*

Туркум: Кӯкнор - *Papaver L*

Намуд: кӯкнор - *Papaver somniferum*

Оила:Шотарагиҳо - *Fumariaceae*

Туркум:Бурмақора - *Corydalis*

Намуд: Бурмақораи северсови - *Corydalis seversovii*


Ба оилаи кўкноргиҳо мансуб 24 туркум ва 250 намуд растаниҳо мавҷуд. Дар флораи давлат мутаҳидаи ҳамдўсти ба 11 туркум мансуб 43 намудҳо маълум шудааст. Дар Осиёи миёна аз он чумла дар Ўзбекистон ба ин оила 9 та туркум ва 32 намудҳо васеъ паҳн шудааст. Онҳо як ва бисёрсола растаниҳо, аломати характернок дар танаашон маҳлули ширмонанд мавҷуд. Баргҳо бо навабт чой гирифта патшакл мураккаб мебошад. Гул якто ёки дар мачмӯаи гул чой гирифтааст, калон актиноморф, гулкўрғон дучанда мебошад. Косачабаргҳо ду хел резанда, точ баргҳо 4 та. Гардонҳо беохир бисёр, гардгирак ду ёки аз он зиёд мевабаргҳо шакл ёфтааст. Формулаи гул $*C_2 C_4 A_{\infty} G_{(2)}$. Гурак якхонаги, мева кўсакча, тухм эндоспермнок мебошад. Аксарият намояндаҳои оила заҳарнок дар медицина истифода мебардаги яксола алаф растани. Дар Ўзбекистон туркумҳои (*Paraver*) кўкнор ва лолаарўсак (*Roemeria*) дохилшаванда намудҳо васеъ паҳн шудааст.

Ба туркуми кўкнор мансуб намудҳо дар кураи замин 110 та зиёд паҳн шудааст. Дар Осиёи миёна 50 намуд, дар Ўзбекистон 5та намуд паҳн шуда, аз он якто *Paraver pavonium* намудаш маданий карда шудааст. Он яксола алаф, поя бо маҳлули ширмонанд омехта қабати мум пўшида шуда, хокистарранг мебошад. Барг дароз ду маротиба найшакл бурида шудааст. Гул яка дар нўги поя чой гирифта, точбаргҳо сафедча, сурхчатоб мебошад. Гардгирак аз бисёрада мевабаргҳо шакл ёфтааст. Мева як хонаги кўсакча мебошад. 50% -и тухмро равшан ташкил мекунад. Лолаарўсак дар Ўзбекистон васеъ паҳн шуда яксола алаф, қад онҳо 20-30 см мешавад. Дар солҳои охир аз онҳо мегирифтаги рангҳо барои саноати хўроквори ва тайёр намудани ширинвориҳо истифода бурда мешавад.



Расми 21.

Гули оилаи шотарагиҳо зигоморф буда, тўдагул шингил, дар точбарг шохачаи дароз мавчуд. Гардонҳо 4 та.



Расми 22. Сохти бурмақора. А-Нақшаи умуми, Б- буриши гурак, В-гул, Г-ҳолати кушодашави гул, Д- гардбарг, Е- гардгирак, Ж- мева, З- тухм, И- диаграмаи гул

Мавзу: Сохт ва афзоиши қоқуи дорувор (*Taraxacum officinale*)

Мақсади машғулоти: Сохт ва цикли тараққиёти қоқуи доруворро омӯхтан.

Шакли машғулоти: амалиёт

Услуби гузаштани машғулоти: ҳучуми ақли, анъанави

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, Гербарияи туркумҳои қоқу (*Taraxacum*), гули бўта (*Centaurea*), какра (*Acroptilon*), андиз (*Inula*), бўйи модарон (*Achillea*), хори ғусфандак (*Xanthium*), офтобпараст (*Helianthus*), махсар (*Carthamus*); лупа, сўзани препарат, китобҳо.

Ачдод: Магнолияшаклҳо (дупаллагихо) – *Magnoliopsida (Dicotyledoneae)*

Зерачдод: Қоқуғихо – *Asteridae*

Қабила: Қоқунамоҳо – *Asterales*

Оила: Қоқудощо – *Asteraceae*

Зероила: Қоқудочаҳо – *Asteroideae*

Намуд: Қоқуи дорувор – *Taraxacum officinale*

Оилаи қоқуғихо яке аз оилаҳои калонтарини магнолияшаклҳо буда, дар эволюцияи растаниҳои гулдор зинаҳои олиро ишғол кардааст. Дар вақти ҳозира 1250-1300 туркум ва 20000-25000 наздик намудҳо маълумотҳо мавҷуд, ин аз 1/10 қисмашро ташкил мекунад.

Аломати ба худ хоси оила тўдагули он саватчамонанд мебошад. Сабатҳои хурд бошад, дар навбати худ сипаршакл ёки чўробшакл тўдагулро ташкил мекунад (бўйимодарон -*Achillea*, ханделия - *Handelia*,). Ҳар як сабатча бо якчанд қатор пушанда баргчаҳо печлинида шудааст. Адад, шакл, калони ва ранги баргҳо пўшанда барои муайян намудани туркумҳо аломати муҳими таснифоти ба ҳисоб меравад. Шакли ҷои сабатча пахнак, фурӯхамида, барчааста дарозак шуданаш мумкин ва он шакли сабатчаро нишон медиҳад.


Гулҳо дар 4 доиранок, 5 аъзоги. Гулкосача тамоман нест ёки ба мўякчаҳо тағир ёфтаги. Точгулҳо пайвааст, гардонҳо 5 та ва онҳо бо якҷояги найчаро ҳосил мекунанд. Гардгирок 1 та, устунча ду лабдор ва аз миёнаи ҳалқаи гардонҳо баромада меистад.

Формулаи гул - $\text{Ca}_{(ped)} \text{Co}_{(5)} \text{A}_{(5)} \text{G}_{(2)}$

Мева – хўшача, дар бисёр ҳолатҳо шоханок.

Ба сохти точгул нигоҳ карда, гул найчашакл, забончашакл, забончашакли сохта гурҳоба тақсим мешавад.

Панҷ дандончадор актиноморф ду чинса гул ба ҳисоб меравад (офтобпараст ва мойчечак). Дар қисми асоси гулҳои забончашакл ҳам найча мавҷуд, аммо қисми нўгаш дарозак ва 5 дандончадор, 2 чинса зигоморф. Ингуна гул аз найчашакл гул омада баромадаги (қоқу, чатрқоқу).



Расми 23 Сохти гули қоқуғиҳо (Asteraceae).

А-найчашакл; Б- диаграмаи гули найчашакл; В- забоншакл; Г- забоншакли сохта; Д-даханашакл: 1,7- бӯтачаишми мови (*Centaurea cyanus*), 2-явшони эрмон (*Artemisia absinthium*), 3-қоқуи дорувор (*Taraxacum officinale*), 4- ҳиндбо (*Cichorium inthybus*), 5- офтобпараст (*Helianthus annuus*), 6- бӯйи.модарон (*Achillea millefolium*), 8- бӯтачаишми алафзор (*Centaurea jacea*).

Гули сохта забончашакл аз 2 лабчодор зигоморф гул пайдо шудааст, қисми болои он 2 дандончадор, редуксия шудаги ва 3 дандончадор лаби поёни нигоҳ дошта шудааст. Дар бисёр ҳолатҳо онҳо гардгиракдор, гардон мавҷуд нест ва дар атрофи тўдагул чой гирифтааст (офтобпараст).

Дар якто тўдагул ҳам найшакл (дар миёна), ҳам забончашакл, сохта забончашакл, даханашакл (дар атроф) гулҳо шуданаш мумкин. Ин ҳолат ба худ ҷалб кардани ҳашаротҳоро имкон медиҳад. Дар сабатча будаги гулҳо фақат ду чинса (забончашакл ёки найчашакл), дучинса ва якчинса ёки тамоман ғайричинси шуданаш ҳам мумкин.

Яке аз намояндаи асоси оилаи қоқуғиҳо бо қоқуи дорувор (*Taraxacum officinale*) шинос шудан мумкин. Қоқуи дорувор бисёрсола, 15-25 см тиррешадор растани алафи мебошад. Растании космополит дар водийҳо бисёр паҳн шудааст. Пуя кўтоҳ ба руи хок намебарояд. Баргҳо содда, патшакл буридаги ва дар атрофи гарданаи реша тўда шуда месабзад. Дар нўги гулабанд диаметраш 3-4 см яктоги сабатча ба воя мерасад. Баргчаҳои

пўшанда 3 қатор, баргчаҳои болои камбар, наштаршакл, нўгаш ба паст ҳам шуда, 7- 12 мм, чои гул суфта мебошад. Дар сабатча будаги ҳама гулҳо 5 дандончадор, забончашакл, 2 чинса, зарди тиллоранг, гардонҳо 5 та ва гардонҳо пайваста шуда най ҳосил кардааст. Гинецей синкарп, аз 2 та мевабарг ҳосил шудааст, ғурак поёни мебошад. Формулаи гул - $Sa_{(ped)} Co_{(5)} A_{(5)} G_{(2)}$. Мева хокистарранг, 4 қирраноки номуайян, қисми нўгаш варамида, 3-4 мм, нўгаш 0,5 – 1,5 мм пирамидашакл мешавад. Дар охири дарс сохти қоқуи доруворро ба дафтари амалиёт кашед.



Расми 24. Қоқуи дорувор (*Taraxacum officinale*)

А- сохти умумӣ, Б- буриши ба дарози тўдагул, В- гул, Г- мева. 1- гирдбарҳо, 2- чои гул, 3- тирпар.

Барои омўхтани мавзу зеринҳоро иҷро кунед:

1. Аз лупа ва сўзани препарат истифода бурда тўдагули қоқуғихоро омўзед: гулҳои забончашакл (қоқу, хорхасак, чатрқоқу, ришитака); гулҳои найшакл (андиз, хори ғўсфандак, явшон); гулҳои сохта забончашакл ва найшакл (офтобпараст, топинамбур, бўйимодарон, ромашка); найшакл ва даханашакл (гули бўта).
2. Растаниҳои омўхтаро дар асоси тартиби қабулкарда шуда тавсиф диҳед ва ба дафтар нависед.
3. Расми барг, сохти берунаи сабатча, сохти сатҳи чои гул, баргҳои печанда ҳар як намуд растаниро ба дафтари амалиёт кашед.
4. Намуди растаниҳои омўхтаро муайян кунед, пай дар пай муайян куниро номҳои латинча – ўзбекчаро нависед. Этикетка тайёр карда ба варақҳои гербария часпонед.

5. Аз гербарияҳо якчанд намуди мадании қоқуғиҳо ро омӯхта аҳамияти онҳо ро нишон диҳед.

МАШҒУЛОТИ 21

Мавзу: Сохт ва афзоиши лолаи грейг (*Tulipa greigii Rgl.*)

Мақсади машғулоти: Сохт ва цикли тараққиёти лоларо омӯхтан.

Шакли машғулоти: амалиёт

Услуби гузаштани машғулоти: ҳуҷуми ақли, анъанави

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, Гербарияи туркумҳои лола (*Tulipa*), ғозпиёз, олғи, лолаи барра (*Fritillaria*), ринопеталум (*Rhinopetalum*); лупа, сӯзани препарат, китобҳо; расм-нақшаҳо

Аҷдод: Лилияшаклҳо (якпаллагӣҳо) - *Liliopsida (Monocotyledones)*

Зераҷдод: Лилиягӣҳо - *Liliidae*

Қабила: Лилиянамоҳо - *Liliales*

Оила: Лилиягӣҳо - *Liliaceae*

Намуд: Лолаи грейг - *Tulipa greigii Regel*

Оила: Пиёзгӣҳо - *Alliaceae*

Намуд: Пиёзи оши - *Allium cepa L.*, Пиёзи анзӯри - *A. Suvorovii*

Оила: Шираҷгӣҳо - *Asphodelaceae*

Намуд: Норшираҷ - *Eremurus robustus*

Дар адабиётҳои ҳозираи ботаника ҳаҷми оилаи лилиягӣҳо (*Liliaceae*) анча калон буда, аз 11 зероила иборат. Лилиягӣҳо яке аз ҳамина оилачаҳо буда, онро Тахтаджян А.Л. (1966-1987) аз ҷиҳати асосҳои илми алоҳида оила ғуфта ҷудо кардааст. Дар натиҷаи ҳаҷми қабул карда намояндаҳои оила бо нишондодҳои зерини систематикӣ фарқ мекунанд.

1. Фақат пиёзакдор растаниҳо,
2. Найҳои гузаронанда фақат дар решаҳо ва нарвоншакл перфорациянок,
3. Гулқӯрғон содда, гулточшакл, қисмҳо озод, нектардонҳо дар асоси дохили гулточбарг ҳосил мешавад.
4. Гинецей синкарп, мева се ҳонаги кӯсак.

Ба таркиби он 10 та туркум ва 470 таҷа намудҳо дохил мешавад.

Ҳамаи намудҳо рост поя бисёрсола, пиёзакдор патакрешадор алафҳо, аксарияти намудҳо эфемероидҳо. Баргҳо содда, бебанд, дар поя бо навбат

чой гирифтаанд атрофаш суфта мебошад. Пиёзак сероб мулоим , бо пўстҳои сахт пўшида шудааст.

Гулҳо калон, яктоги (лола) ёки якта-якта дар тўдагул (ғозпиёз) чой гирифтааст, рангаш бошад сурх, зард, сафед мешавад. Қисмҳои гул сетоги 4 та доира ҳосил мекунад.

Формулаи гул - $C_6 C_{3+3} A_{3+3} G_{(3)}$

Мева 3 хоначаги кўсак.


Дар Ўзбекистон намояндаҳои 4 та туркуми оилаи лилиягӣҳо паҳн шудааст.

Лолаи грейг ва лолаи сурх ҳамаи аломатҳои лолагӣҳоро мучассам кардааст. Қадди лолаи сурх 15-45 см меомадаги тухмшакл ёки лунда пиёзнок эфемероид. Баргҳо 3-4 та дар поя яка-яка чой гирифтааст, атрофаш дурушт, дар сатҳаш доғҳои сурх мавҷуд, поёни васеъ наштартшакл, дароз, банди барг мавҷуд нест, дарозияш 10-32 см, бараш 3-10 см мебошад. Ранги гул сурх, дарози 4-5 см, баъзан зард, зардчатоб, пасти гул зард ва дар он доғҳои сиёҳ мавҷуд. Гардон 6 та, риштааш зард, гардонҳо зард, ё инки хокистарранг.

Ранги кўсак зард, дарозии он 11 см бараш то 4 см мешавад. Дар моҳҳои апрель-май гул мекунад ва июль-июл мева мебандад. Арёалаш ҷудалхам кам ноёб намуд ба ҳисоб меравад.

Ба “Китоби сурхи Ўзбекистон” дохил карда шудааст.

Расми сохти лолаи сурхро кашада қисмҳои онро нишон диҳед.



Расми 25. Лолаи грейг (*Tulipa gregii* Rgl)

1-2 сохти умуми лола, 3-гули ғайри гулқўрғон, 4- буриши кундаланги ғўрак, 5-диаграмаи гул.

Дар давоми дарс зеринҳоро иҷро кунед.

1. 1-2 намуди туркумҳои лола (*Tulipa*), ғозпиёз (*Gagea*) ро омӯzed, тавсиф кунед ва ба дафтар нависед.
2. Расми тўдагул, гардон ва гардгираки ғозпиёзро кашед ва ченак, рангашро назорат кунед, адади тухмҳоро шуморед.
3. Лолагихоро (лола, ғоз пиёз) бо пиёзгихо (пиёз, пиёзи анзўри) муқоиса кунед, фарқкунанда аломатҳоро нишон диҳед.
4. 2-3 намуди туркумҳои лола, ғозпиёз ва олғиро муайян кунед ва пай дар пай таснифоти онҳоро нависед.

МАШҒУЛОТИ 22

Мавзу: Сохт ва афзоиши гандуми мулоим (*Triticum aestivum*)

Мақсади машғулоти: Сохт ва цикли тараққиёти гандумро омӯхтан.

Шакли машғулоти: амалиёт

Услуби гузаштани машғулоти: ҳуҷуми ақли, анъанави

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: слайдҳо, анимация, маърузаҳои электрони, дастурамали электрони, Гербарияи гандум (*Triticum*), чав (*Hordeum*), гандумак (*Agropyrum*), қилтиқ (*Taeniatherum*), ялтирбош (*Bromus*), чувормакка (*Zea*); лупа, сўзани препарат, китобҳо

Ачдод: Лилияшаклҳо (Якпаллагихо) – *Liliopsida (Monocotyledones)*

Зер ачдод: Лилиягихо – *Liliidae*

Қабила: Гандумнамоҳо – *Poales*

Оила: Хўшагихо, гандумгихо – *Poaceae, Gramineae*

Зер оила: Қунғирбошгичаҳо – *Pooideae*

Намуд: Гандуми мулоим – *Triticum aestivum*


Гандумгихо яке аз оилаҳои калонтарини ачдоди лилияшаклҳо буда, дар вақти ҳозира 900 та туркум 11000 та намуд дохил мешавад. Дар бисёр ҳолатҳо (дашт, чўл) қисми асоси қабати растаниҳоро ташкил мекунад. Растаниҳои ғизои ва ҳамчун ем-хошок зарур ба ҳисоб мераванд. Дар кураи замин чудоҳам васеъ паҳн шудааст. Аксарияти намудҳо алафи, дар қитъаҳои тропики намудҳои дарахтиашон (бамбук) ҳам мавҷуд.

Даруни поя ковак, баъзан маркази поя бо пўкашакл бофтаи мулоим пур шудааст (чуворимакка, чувори сафед), ба бандҳо тақсим шудааст. Решаҳо патакшал, аз системаи решаҳои иловаги иборат.

Баргҳо содда, (ба ғайр аз бамбук), қалами, нештаршакл, бандҳо ба ғилофак тағир ёфтааст ва байни бандро пўшонида меистад, рагбанди паралел, дар поя пай дар пай чой гирифтааст. Дар асоси сатҳи барг ба ғилофак мегузаштаги чой забонча мавҷуд, он аз пайвастишави ду барги паҳлӯи ҳосил шудааст. Шакли ва ҳаҷми он аломати асоси таснифоти ба ҳисоб меравад.

Гулҳо майда, беранг, кўрғони гул мавҷуд нест ва тўдагули содда – дар хўшагулҳо чамъ шудааст. Хўшачаҳо дар навбати худ рувак, султон, сўта тўдагулҳои мураккабро ҳосил мекунад. Дар ҳар як асоси хўшача аз тири тўдагул баромадаги дуто хўшача поёни ва болои тангача баргҳо мавҷуд, он хўшачаҳоро печонида дар бисёр ҳолатҳо нўги онҳо қилтиқнок мешавад. Дар хўшача аз 1-10 та як чинса ёки ду чинса гулҳо мавҷуд. Ҳар якто гулро дуто тангача баргҳо пўшидааст. Пас аз гултангачабарги дохили тухмдон бо 2-3 пардаи тунуки нафис печонида ва он лодикула гуфта мешавад. Лодикулаҳо баргчаҳо гулкўрғони шаклдигаркарда гуфта тахмин карда мешавад. Аҳамияти биологи лодикулаҳо чудо калон, онҳо дар вақти гулкуни ҳам мешавад, барои гардон ва гардгирокро аз гул баромаданаҳ ва овезон истоданаҳ ёрдам медиҳад. Гардҳо аксарият вақт 3 та, баъзан 2та (қиёқи сурх, забонбурак) ёки 6 та (шоли, бамбук, шакарқамиш), гардонҳо анча калон ба риштаи гард пайваста доимо чумида рехтани гардро осон мекунад. Гардгирок 1та, 2 ёки 3 та аз пайваста сабзиши мевачабаргҳо ҳосил шудааст. Устунча кўтоҳ, паҳнак 2 ёки 3 бўлакнок патшакл мебошад. Ғурак болои як хонаги ва як тухммуғчадор мебошад (расми -26).

Меваи ин оила хўша.



Расми 26. Сохти гул ва хўшаи қунғирбош (*Poaceae*).

А-гул, Б-диаграмаи гул, В-хўшаи се гулдор, Г-диаграммаи хўшача.

1-тири хўша, 2-тири хўшача, 3-хўшачаи поёни мўякча, 4-мўякчаҳои хўшачаи болои, 5-тангачагули поёни, 6-тангачаи гули болои, 7-пардаҳои гул (лодикулаҳо), 8-гинецей (гардгирак), 9-андроцей (гардон).

Ба мисоли гандум бо сохти оилаи гандумгиҳо шинос шудан мумкин. Гандум яксола, дусола (тирамоҳи) патак решадор, барг тасмашакл пояи алафи аз банд ва байни бандҳо иборат. Тўдагул мураккаб хўшагул. Хўшаҳо 3-7 гулдор аз чуқурчаҳои хўша мебарояд. Тири хўша дурушт намешиканад (навҳои мадани) ёки ба қисмҳо тақсим мешавад (дар навҳои ёвои). Пулакчаҳои хўшача ду қилтиқчадор. Пулакчаи гул поёни дароз қилтиқдор ёки дандончадор, болои бошад пардашакл. Гардонҳо 3та, паҳнаки гардгирак 2 бўлакнок ва патшакл, ғуакро 2та лодикула печонида меистад. Асосан худгардолудшави ва бо ёрии шамол меғузарад.

Мева – хўша, озод ба замин мерезад.

19 намуди туркуми гандум буда, аз он 13 тоаш дар сарҳадҳои Кавказ, дар Осиёи Маркази бошад 4 намуд паҳн шудааст. Гандум ҳамчун хўроквори барои ҳаёти инсон зарур мебошад. Навҳои мадани гандуми саҳт (*T.durum*) ва гандуми мулоим (*T.aestivum*) мебошад.

Аз гербария хўшаи гандумро гирифта бо диққат омӯхта, дарози, адади хўшачаҳо, ҳаҷми хўша ва ранги онро тавсиф карда ба дафтар нависед.

Сохти шолиро (*Oryza sativa*) омӯzed. Аломатҳои ба худ хоси поя, реша, сохти гул ва меваро тавсиф диҳед. Формула ва диаграмаи гулро тартиб диҳед. Фарқи онро аз гандум нишон диҳед.

Расми 27.

Сохти чуворимаккаро (*Zea mays*) омӯзед. Фарқи он аз гандум ва шоли бо аломатҳои сохти гул, поя, ҳосил шудани реша нишон диҳед. Формула ва диаграмаи гулро тартиб дода онро таҳлил кунед.

Расми 28.

Дар давоми дарс вазифаҳои зеринро иҷро кунед.

1. Гербарияи намудҳои ба 2-3 туркуми оилаи гандумиҳо оидро омӯзед ва тавсифашро нависед (гандумак-*Agropyrum*, сули-*Avena*, гандум-*Triticum*, чуворимакка - *Zea*, шоли- *Oruza sativa*.....).
2. Расми сохти умуми, тўдагул, хўшача, гули растаниҳои тавсифкардари ба дафтари амалиёт кашед. Диаграмаи гулро тартиб диҳед.
3. 3-4 намуди гандумиҳоро муайян кунед ва пай дар пай онро ба дафтар нависед. Тайёр намудани этикеткаи гербария.

МАШҒУЛОТИ 23

Мавзу: Аз худ куни таркиби флоравии сохти фитоценозҳо-ярус ва синузияҳо.

Мақсади муайяни аз худ куни: Муайянкуни ва за худкуни таркиби флоравии сохти фитоценозҳо – ярус ва синузия.

Шакли машғулоти: амалиёт

Усули машғулоти: анъанавӣ, ба гурӯҳҳо тақсим карда кор кардан.

Асбобҳои дидактики ва материалҳо: Чадвал, дастурамалҳо, шкалаи дуде ва папкаи гербария.

Мазмуни машғулоти: Барои дар саҳро тавсифҳои геоботаники гузаронидан шиносои умуми бо майдон ва ҳисобкуни намунавӣ ба майдонҳо ҷудо кардан ибодат. Сатҳи майдонҳои азхудкунандаро ба таркиби шаклҳои ҳаёти нигоҳ карда тақсим кардан зарур аст. Майдонҳои растаниҳои алафи 1-10м², барои тўқайзорҳо 10-20 м², барои бешаҳо 100-1000 м², дар кўҳҳо микрорелефро ба ҳисоб гирифта шуда майдонҳо майдатар мешавад. Барои муайян намудани намудҳои дарахтҳои бешаи кўҳҳо истифода бурда мешавад. Агар дар вақти санҷишҳо ниҳолҳои дарахт, адади баъзе намудҳоро шуморидан зарур бошад, дар даруни майдонҳои намунави майдонҳои хурд 1-4м кв ҷудо карда мешавад. Агар дар фитоценоз ченаки вазн миқдори талаб карда шавад, майдонҳои 0,25 м кв гирифта мешавад.

Муайян кардани таркиби намудҳои мачмӯи (фитоценоз) растаниҳо

Аз барои ин ҳамаи индивиди намудҳои дар майдони санчидаистодаро бо диққат мӯҳтан зарур. Дар вақти тартибдиҳи рӯйхат ба сохти зинаи вегетативи ва генеративи майсаҳо ба эътибор гирифта мешавад. Дар рӯйхат намудҳоро бо тартиби шаклҳои ҳаёти навиستان – аввал дарахт, бутаҳо, бутачаҳо, ним бутаҳо, бисёрсола, дусола, яксола, ушнаҳо, лишайникҳо, замбӯруғҳо ва обсабзҳо ба ҳисоб гирифта мешавад. Санчишҳо дар алафзорҳо гузаронида шавад, намудҳоро аз рӯи сифати ем-хошоки чойгир карда мешавад. Дар ин ҳолат аввал хӯшадорҳо, ҳилолгиҳо, лӯбиёгиҳо пас аз он дигар растаниҳои ем-хошоки ва растаниҳои заҳарнок ба тартиби рӯйхат дароварда мешавад. Дар рӯйхат пай дар пай намудҳо туркумҳои оила ёки аз алфавит навишта мешавад.

Таркиби намудҳоро аз рӯи оила навиستان зарур бошад, ин санчишро дар шароити лаборатория гузаронида мешавад. Дар шароити саҳро растаниҳоро то дараҷаи намуд имконияти тавсифкуни намешавад.

Чадвали 1

Рӯйхати растаниҳои майдони намуна

№	Номи оилаи растаниҳо (точки - лотини)	Бисёрноки (аз рӯи шкалаи друде)	Баланди (см)	Фенофаза	Шакли ҳаёти	эзоҳ
1						
2						

Муайянкуни бисёрноки намудҳоро дар фитоценоз

Дар майдони намуна индивидҳои намуди муайяни ёки адади пояҳо бисёрноки ҳамин намуд гуфта мешавад. Бисёр ҳолатба дар майдончаи намуна аз намудҳо адади пояҳоро муайян кардан осон. Масалан асоцияҳои ранг, гандумаҳо ҳамин тарз муайян кардан осонтар мебошад.

Аммо дар амалиёт барои бисёрноки намудро муайян кардан баҳодихии субъектив аз 5-10 балнок шкалаҳо истифода мебаранд. Аз онҳо 5 балнок шкалаи Хулт бисёр истифода мебаранд. Дар он 5 балл бисёртар, 4 балл бисёр, 3балл бисёр нест, 2балл кам, 1 балл камтар. Аз шкалаҳои 6 балнок шкалаи Друде ба диққат сазовор мебошад. Дар он бисёрноки бо рақамҳо набуда, бо калимаҳо ифода карда мешавад:

Soc (sociales)
меистад, фон ҳосил мекунад.

6 пояи индивидҳо ба якдигар расида

Cop₃ (copiosus3)

5-индивидҳои намуд аз ҳама бисёртар

Cop₂ (copiosus2).....4-индивидҳои намуд бисёртар
 Cop₁ (copiosus1).....3-индивидҳои намуд бисёр
 Sp (sparsus).....2-индивидҳои намуд кам
 Sol (solitarius).....1-индивидҳои намуд аз ҳама камтар

Агар индивиди намуд дар майдонча якто бошад “unicum” ягона гуфта мешавад. Дар вақти бо шкалаи Друде санчиш гузаронидан бо индивидҳои намудҳо ишғол карданастро тасаввур кардан мумкин. Дар ин ҳолат Soc-90%, cop3-90-70%, cop2- 70-50%, cop1-50-30%, sp-30-10%, sol-10% ишғол кардани майдонро нишон медиҳад.

Ярус ин дар фитосенотоз чойгиршави намудҳо бо пай дар пай вертикали нисбати баландноки. Ҳар як ярус алоҳида қабати экологӣ ба ҳисоб меравад, индивидҳои намуд аз ҳамин ярус ишғол кардаги ашёҳо (ҳаво, рӯшноӣ) истифода мебарад. Ярусҳо ба адаҳои рими нишон дода мешавад. Аз рӯи нишондодҳо аз ҳама баланд ярус I, аз он пасттар II ва ҳоказо III, IV бо ададҳо нишон дода мешавад. Аз барои муайян намудани чойгиршави намудҳо аз рӯи ярусҳо аввал он везуал омӯхта мешавад. Пас аз он бо чадвал (1м) ёки рамкаи симини 1м x 1м вертикал чойгир карда баланди намудҳо чен карда, ба дафтар адади онҳо навишта мешавад.

Чадвали 2

Тақсимшави ярусноки намудҳо дар фитоценоз.

№	Номи намудҳо	Баланди (см)	Ярус	Шакли ҳаёти	Фазаи фенологӣ	Ҷои ҳосилшави фитоценоз	
						доминант	субдоминант
1.							
2							

Пас аз муайян намудани ярус, дар асоси далилҳои намудҳои доминант ва субдоминанти фитоценозро нишон диҳед.

Пас аз муайян намудани ярус, таркиби синузияҳои онро муайян кардан зарур аст.

Синузия гуфта дар фитоценоз ба як хел шакли ҳаёти мансуб ва якто ярусро ишғол кардаги намудҳои экобиоморф мачмӯаи популяцияҳо гуфта мешавад (Б.А.Биков, 1987).

Чадвали 3

№	Тартиби	Намуди	Баланди	Ярус	Шакли
---	---------	--------	---------	------	-------

	синузияҳо	растани	(см)		ҳаёти
	I-тартиб II-тартиб III-тартиб				

Барои аз худ кардани майдони интиҳоб карда рӯйхати намуди растаниҳоро бо тартиб нависед ва маълумотҳои ба онҳо хосро ба чадвал пур кунед.

Чадвали 4

№	Шаклҳои ҳаёти	аломат	Қисми зери замини	Номдҳои дар асоси Раункер
I	Дарахтҳо 1 2 3			
II	Бутаҳо 1 2 3			
III	Нимбутаҳо 1 2 3			
IV	Растаниҳои алафи 1 2 3			

Типҳои биологӣ дар асоси раункер

1. Фанерофитҳо – дарахтҳо, бутаҳо
2. Хамефитҳо – хобида месабзидаги бутачаҳо ёки растаниҳои алафи бисёрсола
3. Гемикриптофитҳо – алафҳои бисёрсола (муғчаҳо дар гарданаи реша);
4. Криптофитҳо – Алафҳои бисёрсолаи муғчаҳояшон дар мобайни хок ёки зери об оромиро гузаронанда.
5. Терофитҳо – растаниҳои яксола (тухмҳо зимистон нигоҳ дошта мешавад).

Зинаҳои иҷрои кор:

1. Аз конспектҳо, китобҳо маъноӣ ярус, дар минтақаҳои гуногун дар қабати растаниҳо шаклҳои ярусҳо шинос шавед.

2. Омўхтани муайянкуни таърифи синузия, хелҳои он.
3. Омўхтани таркиби шаклҳои ҳаёти фитоценоз.
4. Муайянкуни ярусҳои фитоценози майдони омўхташуда.

Шакли назорат:

1. Дар асоси шкалаи дуде бисёрноки ҳар як намудро муайян карда ва ҷадвалро пур кунед.
2. Дар фитоценоз ярус, синузия ва шаклҳои ҳаёти растаниҳоро бо гурӯҳҳо (5-6 каси) мутобиқ буданашро назорат кардан.
3. Дуруст будани ярусҳоро назорат кардан.
4. Фарқи синузия аз ярус муайян кардан, хелҳои синузияро назорат кардан.

АДАБИЁТҲОИ ИСТИФОДАБУРДА

1. Комарницкий Н.А., Кудряшов Л.В., Уранова Л.А. “Ботаника . “Систематика растений” М. Просвещение, 1975 г.
2. Курсанов Л.И. ва бошқалар. “Ботаника”. 2 том. Тошкент, “Ўқитувчи”, 1972 й.
3. Саҳобиддинов С.С. “Ўсимликлар систематикаси”. I-II жилдлар “Ўқитувчи”, Тошкент, 1966 й.
4. Шостаковский С.А. “Систематика высших растений». М., 1972 г.
5. Ҳамдамов И.Ҳ. ва бошқалар. “Ботаника асослари”. Тош., 2003 й.
6. Пратов Ў., Жумаев Қ. “Юксак ўсимликлар систематикаси”. Тошкент 2003 й.
7. О’Р. Pratov, M.M.Nabiev. “O’zbekiston yuksak o’simliklarning zamonaviy tizimi”. Toshkent, 2007 y.
8. О’Р. Pratov, L. Shamsivalieva, E.Sulaymanov, X.Axunov, K.Ibodov, V.Mahmudov. “Botanika”. Toshkent. 2010 y.
9. Сулаймонов Э.С. “Геоботаника” Маърузалар матни. Самарқанд. 2004 й.
10. Гордеева Т.Н и др. “Практический курс систематики растений”. Москва, 1971 г.
11. Фурсаев А.Д., Тарасов А.О. “Высшие растения». Саратов, 1961 г.

12. Хржановский В.Г., Паномаренко С.Ф. «Практикум по курсу общей ботаники». М., «Высшая школа», 1979 г.
13. Худойкулов С.М. «Ўсимликлар систематикасидан методик қўланма». Тош., «Ўқитувчи», 1971 й.
14. Сулайманов Э.С., Исломов Б.С., Умурзакова З.И. «Ботаника – юксак ўсимликлар систематикасидан амалий машғулотлар учун қўланма». Самарқанд, 2004 й.

МУНДАРИҶА

САРСУХАН	3
Тараққиёт ва сохти маршанцияи бисёрнамуда (<i>Marchantia polymorpha</i>).....	5
Сохт ва тараққиёти фунарияи намченкунанда (<i>Funaria hydrometrica</i>).....	8
Сохт ва тараққиёти сфагнуми нозикбарг ва ушнаи торфи (<i>Sphagnum acutifolium</i>).....	10
Сохт ва тараққиёти плаун (<i>Lycopodium clavatum</i>).....	14
Сохт ва тараққиёти селлагинелла (<i>Selaginella helvetica</i>).....	16
Сохт ва тараққиёти чилбанди саҳрои (<i>Equisetum arvense</i>).....	20
Сохт ва тарққиёти сарахси беша (<i>Dryopterix filix mas</i>).....	23
Сохт ва тараққиёти сарахси оби (<i>Salvinia natans</i>).....	27
Сохт ва тараққиёти саговники хамшаванда (<i>Cycas revoluta</i>).....	31
Сохт ва тараққиёти гинкго (<i>ginkgo biloba</i>).....	34
Сохт ва тараққиёти қарағайи беша (<i>Pinus silvestris</i>).....	37
Сохт ва тараққиёти эфедра (<i>Ephedra distachya</i>).....	39

Сохти гаметофит ва спорофит дар магнолиятоифаҳо (пўшидатухмтоифаҳо) – <i>Magnoliophyta</i> (<i>Angiospermatophyta</i>).....	43
Афзоиш ва сохти магнолия ва зирк (<i>Magnolia grandiflora</i>).....	47
Сохт ва афзоиши чинорак (<i>Ranunculus acris</i>).....	49
Сохт ва афзоиши юнучқа (<i>Medicago sativa</i>).....	51
Сохт ва афзоиши пудинаи Осиё (<i>Mentha asiatica</i>).....	54
Оилаи кўкноргиҳо (<i>Papaveraceae</i>) ва шотарагиҳо (<i>Fumariaceae</i>).....	56
Сохт ва афзоиши қоқуи дорувор (<i>Taraxacum officinale</i>).....	58
Сохт ва афзоиши лолаи грейг (<i>Tulipa greigii</i> Rgl.).....	62
Сохт ва афзоиши гандуми мулоим (<i>Triticum aestivum</i>).....	64
Аз худ куни таркиби флоравии сохти фитоценозҳо-ярус ва синузияҳо.....	67