

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТИТУТ

КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ И ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ

ЗАВ. КАФЕДРОЙ проф. КАРИМОВ А.М

АНДИЖАН 2005

МЕНИНГИТЫ

ВЫПОЛНИЛ: СТУДЕНТ 618 гр.

ПЕД. ФАКУЛЬТЕТА

САМАДОВ Ф.

**Менингит – воспаление оболочек
головного и спинного мозга**

Классификация

- По характеру воспалительного процесса
 - Серозный
 - Гнойный
- По патогенезу
 - Первичный
 - Вторичный
- По этиологии
 - Бактериальные
 - Вирусные
 - Грибковые
 - Протозойные

Классификация

(продолжение)

- По локализации
 - Генерализованные
 - Ограниченные
- По течению
 - Молниеносные
 - Острые
 - Подострые
 - Хронические
- По степени тяжести
 - Легкая
 - Средняя
 - Тяжелая
 - Крайне тяжелая

Клиника

- Основные синдромы
 - Общеинфекционный
 - Оболочечный
 - Воспалительные изменения цереброспинальной жидкости

Общеинфекционный синдром

- Озноб
- Жар
- Повышение температуры
- Воспалительные изменения периферической крови

Менингеальный синдром


- Головная боль
- Рвота
- Общая гиперстезия
- Менингеальная поза
- Менингеальные симптомы
 - Ригидность шейных мышц
 - Симптомы Кернига
 - Симптомы Брудзинского верхний, средний, нижний
 - Симптом одеяла


Воспалительные изменения цереброспинальной жидкости


- Повышение давления
- Помутнение (при вирусном менингите прозрачный)
- Изменение цвета (при бактериальных)
- Увеличение количества лейкоцитов и лимфоцитов
- Увеличение содержания белка
- Снижение уровня сахара

Общие лечебные мероприятия

- Ликвидация бактериального шока
- Коррекция водно-электролитного баланса
- Изоляция







Антибактериальная терапия

- Введение парентеральное
 - Внутривенно
 - Эндолюмбально
- Максимально переносимые дозы
- Препараты с широким спектром
- Комбинация препаратов
- Предпочтение препаратам, проходящим через ГЭБ
- Терапия длительная, продолжать 10 суток после падения температуры и стерилизации ликвора

Антивирусная терапия

- Применение интерферонов и их индукторов
- Введение парентеральное
 - Внутривенно
 - Эндолюмбально
- Максимально переносимые дозы
- Терапия длительная, продолжать 10 суток после падения температуры и стерилизации ликвора