

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
СОЎЛИЎНИ САЎЛАШ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ФАРМАЦЕВТИКА ИНСТИТУТИ

“ФАРМАЦИЯДА ТАЪЛИМ, ФАН
ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ
ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ”

ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН
МАТЕРИАЛЛАРИ

МАТЕРИАЛЫ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

“АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И ПРОИЗВОДСТВА В ФАРМАЦИИ”

Таърир қайрати:

Раис: Юнусхўжаев АН.

Аъзолар: Шабилолов А.А.
Аминов С.Н.
Расулова С.А.
Файзуллаева Н.С.

Сульфас таблеткасини эришини аниқлаш

А.Д.Таджиева

Тошкент фармацевтика институти, Тошкент ш., Ўзбекистон Республикаси

Ишнинг мақсади: дориларнинг терапевтик унумдорлигига биологик, биокимёвий ва фармацевтик омиллар бевосита таъсир қилади. Фармацевтик омилларни ўрганиш катта амалий аҳамиятга эга. Шатти дори турларининг биосамарадорлиги тайёр маҳсулотнинг парчаланиши, эриши ва дори моддаларни дори шаклларида ажралиб чиқиш тезлигига боғлиқ бўлади. Таблеткаларни терапевтик самарадорлик кўрсаткичларини баҳолашда тажриба лар *in vitro* ва *in vivo* усулларида амалга оширилади. *In vitro* усули бирмунча оддий, қулай, тез ва аниқ бажарилгани учун кенг миёсда ишлатилади. Фармакологлар томонидан сульфас таблеткасини турли шомоллаш касаллигини даволашда ишлатишга тавсия этилган. Сульфас таблеткаси сульфадимезин (0,25г), аскорбин кислотаси (0,05г), ёрдамчи моддалардан (крахмал ва кальций стеарат) иборат.

Усуллар: сульфас таблеткаси таркибидаги таъсир этувчи моддаларни муайтга ажралиб чиқиш тезлигини аниқлашда Хl ДФСда келтирилган усулдан фойдаланилди.

Натижалар: сульфас таблеткасини таркибидаги биофаол моддаларни муайтга ажралиб чиқишини ўрганиш алоқида муайтларда олиб борилди. Таблетка таркибидан сульфадимезинни муайтга ажралиб чиқиш тезлигини аниқлашда “Айланувчи кажава” асбобининг идишига 500,0 мл 0,1 моль/л хлорид кислотаси, аскорбин кислотани муайтга ажралиб чиқишини аниқлашда эса тозаланган сувдан фойдаланилди. Икки олатда ҳам кажавага 1донадан таблетка тортиб солинди, кажаванинг айланиш тезлиги дақиқасига 100 маротабани ташкил қилди. 45 дақиқадан сўнг эритма шат- шат шоз фильтр орқали филтрланди. Филтратларнинг бошланғич 10-15 мл миқдори ташлаб юборилди. Сўнгра биофаол моддаларнинг миқдори таклиф этилган усуллар бўйича текширилди. Сульфадимезин миқдори спектрофотометрик усулида, аскорбин кислотасини миқдори йодометрик усулида аниқланди. Сульфас таблеткаси таркибидан 45 дақиқа давомида ажралиб чиққан сульфадимезин ва аскорбин кислотанинг миқдори 75% дан юқори бўлиб, тегишли Мў талабига жавоб бериши аниқланди.

Хулосалар: мураккаб таркибли сульфас таблеткасини терапевтик самарадорлиги *in vitro* тажрибаларида ўрганилди ва ижобий натижалар олинди.