

**ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ**

**КАФЕДРА:** Офтальмология и детская офтальмология

**ТЕМА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ:**

**«Результаты хирургического лечения вторичной врожденной  
синдромальной глаукомы у детей»**

**РЕЗИДЕНТ:**

**Туракулова З.М.**

**Ташкент 2010**

**Аннотация**

К магистерской диссертации на тему: « **Результаты хирургического лечения вторичной врожденной синдромальной глаукомы у детей**» резидента 3-го года обучения по специальности офтальмология, кафедры "Офтальмология и детская офтальмология" ТашПМИ Туракуловой Зухры.

Глаукомы занимают одно из первых мест среди причин слепоты и инвалидности со стойкой утратой зрения. По статистике ВОЗ, на данное время на земном шаре количество больных, страдающих глаукомой, достигло 67 миллиона человек. Доля больных вторичной глаукомой составляет 24-40% от общего числа лиц с глаукомной патологией (К. Душин, В. Н. Трубилин, В. С. Беляев: Вестник офтальмологии 2003). Вторичная глаукома возникает после травмы, при воспалении сосудистого тракта - увеитах, после удаления катаракты при выпадении стекловидного тела в переднюю камеру и Т.Д. и сопровождается развитием органических изменений в дренажной системе глаза в нашем случае этиология связана в основном с наследственностью.

Терапевтические методы лечения вторичной глаукомы чаще всего оказываются неэффективными, что доказано многолетним опытом. Причины возникновения вторичной глаукомы многообразны, этим объясняется существование различных хирургических методов с целью нормализации внутриглазного давления и зрительных функций. Поэтому проблема эффективного лечения заболевания с использованием современных технологий становится особенно актуальной.

**Цель исследования:** Анализ результатов лечения больных с вторичной врожденной глаукомой, находившихся на лечении в глазном отделении ТашПМИ и РЦМГ за 2004-2008 п.

- Задачи исследования:** 1. Выявить клинико-социальную структуру обследуемых больных, находившихся на стационарном лечении (возраст, пол, откуда и т.д.).
2. Определить показания к хирургическому лечению.
3. Оценить результаты хирургического лечения больных с вторичной глаукомой.

**Практическая значимость работы:** Настоящее исследование расширило представление об этиопатогенезе и клинике заболевания больных с вторичной врожденной синдромальной глаукомой и методах их лечения. Полученные анализы результаты могут быть использованы при составлении хирургических лечебных мероприятий у больных с данной патологией.

**Научный руководитель:**

**доц. Захидов Б. О.**

**Исполнитель**

**резидент 3-го курса:**

**Туракулова З.**



