

Эффективность H_2 -блокаторов и блокаторов протонной помпы при гастродуоденальных кровотечениях у лиц пожилого и старческого возраст

Усманов М.М., А.Е. Аталиев, Р.М. Мадаминов, И.И. Юнусов, А.С. Муродов
Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, республика Узбекистан.

Цель: изучить эффективность H_2 -блокаторов и блокаторов протонной помпы в комплексной консервативной терапии при гастродуоденальной язвенном кровотечениях (ГДЯК) у лиц пожилого и старческого возраста.

Материал и методы исследования: под нашим наблюдением за период 2003 -2008 гг. находились 59 больных ГДЯК. Мужчин было -40, женщин – 19. 44 больных пожилого возраста, старческого возраста -15. Язва двенадцатиперстной кишки (ДПК) у 37 больных, язва желудка - у 22. У 6 (10%) больных была «немая» язва. Желудочный анамнез до 5 лет – у 9 больных, у остальных свыше 5-10 лет. Старые язвы – у 48, поздние – у 11. Локализация язвы и степень кровотечения верифицировалось ЭГДС. F-I(B) – у 2, F-II(A) – у 13, F-II(B) – у 38 и F-II(C) – у 6 больных. Кровопотеря по Горбашко: легкой степени у 29 больных, средней степени- 17 и тяжелой степени - у 13.

На сегодняшний день наша клиника стоит на позиции активно-выжидательной тактики. Всем больным консервативная лечения проводится в палате интенсивной терапии или реанимации. Заместительная и гемостатическая терапия проводится под контролем свертывающей системы крови. Обязательным компонентом консервативной терапии является активное внутривенное ведение H_2 -блокаторов (зантак, невофам, квамател) и блокаторы протонной помпы внутрь.

Подобная терапия во всех случаях способствовало остановки кровотечения и не было необходимости к экстренной или срочной операций. После остановки кровотечения больным проводилась комплексная терапия язвенной болезни с последующим гастрофиброскопическим исследованием и контрольно-динамическая биопсия из язвы желудка.

Таким образом, комплексная консервативная терапия с применением H_2 -блокаторов и блокаторов протонной помпы при ГДЯК у лиц пожилого и старческого возраста с тяжелыми взаимоотношающимися сопутствующими заболеваниями является эффективным методом лечения