

Ўзбекистон Республикаси

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги

Абу Райхон Беруний номидаги

Тошкент давлат техника университети

Умумий Геология

фанидан 1-чи ўқув дала амалиёти учун

методик қўлланма



Тошкент 2004

Тузувчи: Тошмухаммедов Б.Т.

УДК: 550.8:528

«Умумий Геология» фанидан 1-чи ўқув дала амалиёти учун методик қўлланма. Тошк. Давл. Техн. Ун. Туз.: Б.Т.Тошмухаммедов, Тошкент, 2004, __ б.

Талабалар фандан олган назарий билимлари асосида 1-чи курсдан сўнг ёз ойида бир ойлик дала амалиётини Бурчмулла полигоида ўтайдилар.

Тог жинслари турли геологик қодисалар натижасида вужудга келиб тараккий этадилар ва ниқоят емирилиб жойларини ўзгартирадилар, яъни турган жойдан бошка бир жойга шамол, сув ва бошкалар ёрдамида олиб бориб ёткизилади. Чўкинди тог жинслари асосан денгиз тубида қосил бўлади. Улар ер қобиғининг тарихини айтиб берувчи энг мухим омиллардан биридир. Тог жинслари хайвонот ва ўсимлик қолдиқларини ўрганиш натижасида қуруқлик ва сувнинг ўтмишдаги қегараларини, вулкон харакатларини, тог қосил бўлиш жараёнларини, шунингдек, қойдали қазилма қонлари ва улар учрайдиган жойларни аниқлаш мумкин. Бу қўрсатилган тог жинсларига характерли омиллар Бурчмулла ноҳиясида қенг тарқалгандир.

Қўлланма қон-геология ва нефть ва газ факултетларининг ихтисослашган кафедралари дастурлари асосида тайёрланган. Шунингдек «Геология» кафедрасида ишлаган қўлаб профессор-ўқитувчиларнинг педагогик тажрибалари ва илмий тадқиқот ишлар натижалари ҳисобга олинган.

Бу методик қўлланма «Қойдали қазилма қонлари геологияси ва қидирув ишлари», «Қончилиқ иши», «Қон электромеханикаси» йўналишларининг бакалаврларига мўлжалланган.

«Геология» кафедраси

Абу Райҳон Беруний номидаги Тошкент давлат техника университети илмий-методик қенгаши қарорига асосан қоп этилди.

Тақризчилар: ЭРТ ИА УМ етакчи қодими г-м.қ.н.

**Зокиров Р.Т.
«Геология» кафедраси мудири доц.
Шермухаммедов Т.**

@ Тошкент давлат техника университети, 2004

Сўз боши.

Мамлакатимизда мутахассислар тайёрлашнинг сифатини тубдан яхшилаш, миллий истиклол ғоясига содик, етарли интеллектуал салохиятга эга, илм-фаннинг замонавий ютуклари асосида мустакил фикр ва мушохада юрита оладиган шахсларни тайёрлашга катта аҳамият берилмокда. ҳозирги кун талабига жавоб бера оладиган замонавий дарсликлар ва кўлланмалар чоп этишга эътибор кучаймокда.

Ҳозирги кунда ҳамма назарий ва амалий машгулотларнинг ўзбек тилида олиб борилаётганлиги талабаларни ихтисосликлар фанларини ўзлаштиришларида ўз самараларини бермокда. Шунинг учун ўзбек тилида дарсликлар, кўлланмалар тайёрлаш шу куннинг талаби бўлмокда.

Кўлланма Кон-геология ва Нефть ва газ факултетларининг ихтисослашган кафедралари дастурлари асосида тайёрланган. Шунингдек «Геология» кафедрасида ишлаган кўплаб профессор-ўқитувчиларнинг педагогик тажрибалари ва илмий тадқиқот ишлар натижалари ҳисобга олинган.

Геология грекчадан Geo – Ер, Logos – ўрганиш демакдир, яъни Ер ҳаётидаги фандир. Геология ернинг таркиби, тузилиши, ривожланиши ва унда бўладиган ҳар хил жароёнларни ўрганади. ҳозирги замон геологияси Ер пўстини пайдо бўлиш қонуниятларини, уни ташкил этган минераллар, тоғ жинслари, ҳамда фойдали казилмаларни ўрганади.

Ер кобиги турли - туман тог жинсларидан – гранит, гнейс, мрамор, охактош, кумтош ва бошқалардан ташкил топган. Баъзан уларнинг калинликлари ер кобигида бир неча ўнлаб километрга етади. Шу тог жинслари эса минераллардан ташкил топган. Шунинг учун ҳам ер кобиги, яъни уни ташкил қилган тог жинслари ва минераллар, экзоген ва эндоген жараёнлар геологик фанлар томонидан ўрганилади.

Минераллар кимёвий элементларнинг табиий бирикмаси бўлиб, маълум физико-кимиявий шароитда ер кобигининг ички ёки ташқи қисмида ҳосил бўлади. Улар маълум физик хосса ва таркибга эга бўладилар. ҳозирги вақтда минералларнинг сони 3000 га яқин бўлиб, турлари билан ҳисоблаганда 4000 га яқин. Улар қаттиқ, суюқ (симоб) ва газ ҳолида учрайди.

Ер кобигининг таркиби ва тузилишини бир қанча геологик фанлар ўрганади. Минералларни минералогия, тог жинсларини петрография, қадимги ҳайвонот қолдиқларини палеонтология, ер кобиги тарихини геология, ер кобиги ҳаракатини тектоника, вулқонларни вулканизм ва бошқа геологик жараёнларни бир қанча геологик фанлар ўрганади.

Тог жинслари қелиб чиқишга қараб магматик, метоморфик ва чўқиндига бўлинади.

Бир хил ёки турли минераллардан, бошқа жинсларнинг бўлақларидан иборат мустақам яхлит, зич ёки бўшқоқ жисм агрегатлари тог жинслари деб юритилади. Тог жинслари турли геологик ҳодисалар натижасида вужудга қелиб тараккий этадилар ва ниҳоят емирилиб жойларини ўзгартирадилар, яъни турган жойдан бошқа бир жойга шамол, сув ва бошқалар ёрдамида олиб бориб ётқизилади. Чўқинди тог жинслари асосан денгиз тубида ҳосил бўлади. Улар ер кобигининг тарихини айтиб берувчи энг муҳим омиллардан биридир. Тог жинслари ҳайвонот ва ўсимлик қолдиқларини ўрганиш натижасида қуруқлик ва сувнинг

ўтмишдаги чегараларини, вулкон каракатларини, тоғ осил бўлиш жараёнларини, шунингдек, фойдали казилма конлари ва улар учрайдиган жойларни аниклаш мумкин.

Районнинг физик-географияси.

Амалиёт ўтказадиган районимиз Тошкентдан 100 километр шимоли-шарқда, Ғарбий Тянь-Шаннинг жануби-ғарбий тоғ тизмалари оралигига жойлашган бўлиб Тошкент вилоятининг Бўстонлик ноҳиясига киради. Ғарбий Тяньшаннинг йирик тизмаларидан Коржонтов тизмасидир. Шу тизма Тошкент областини Чимкент областидан ажратиб туради. Бу тизманинг энг баланд чўккиси – Мингбулокнинг баландлиги 2835 метр.. Коржонтов Уғом тизмасидан ажралиб чиққан. Ана шу икки тоғ ажралиб чиққан жойдан Уғом дарёси бошланади.

Уғом тоғ тизмасининг энг баланд нуктаси – Тепар денгиз сатхидан 3623 метр баланддир. Уғом тизмасининг рўпарасидан Пском дарёси ўтади. Унинг энг баланд чўккиси Октуяўл денгиз сатҳидан 4224 метр баландликда жойлашган. Пском дарёси бошланадиган жойдан яна иккита тоғ тизмаси ўтади, улар киска, лекин баланд тизмалардир. Чоткол дарёсидан шарқ томонда Ғарбий Тяньшаннинг энг йирик тизмаларидан бири – Чотколдир. (энг баланд чўккиси 4503 метр). Чоткол тизмасидан жанубий-ғарбга қараб Курама тизмаси чўзилган. Бу икки тоғ тизмасини Охангарон дарёси ажратиб туради.

Бурчмулла қишлоғи Чорвоқ сув омборининг шимолий-шарқ қирғоғида, денгиз сатхидан 950-1000 м. баландликда жойлашган. Шу районнинг энг баланд чўккиси катта Чимган бўлиб денгиз сатхидан 3227 метр баланддир.

Бўстонлик районида Арктика ўсимликларидан тортиб то субтропик мамлакатларда ўсадиган писта, бодом ва зиралар учрайди. Район рельефи паст ва баландликлардан ташкил топганлиги учун ундаги ўсимликлар ҳам

пастдан юкорига караб ўзгариб боради. Пастдан юкорига караб ўсимликлар калинлашиб олма, олча, ёнгоклар учрай бошлайди. Ўтлар орасида кимматли доривор гиёхлар кўплаб учрайди. Тог тизмаларининг юкори кисмларида арча ўсади.

Тог тизмалари хайвонот дунёсига ҳам бой. Яйлов ва ўрмонларда жониворлар ва кушлар кўплаб учрайди. қоя тошлар орасида каклик, қораялок, тошўрдаклар кўп учрайди. Тяньшан тог тизмаларининг юкори кисмларида тог эчкиларидан тортиб қоплон, арслонгача учратиш мумкин.

Тиник муздек сувларида маринка ва осмон баликлари, сойлар кўшиладиган ерларда сазан балиги учрайди.

Районнинг географик ўрни ва рельефнинг тузилиши унинг иклимига катта таъсир этади. Районнинг жануби-ғарбий текислик қисмида қуруқроқ, шимолий-шарқий тоғлик қисмида намроқдир.

Ёзда ҳавонинг ҳарорати 40°Cга кўтарилиши мумкин. Чирчик-Охангарон водийсида ёз билан қиш ҳарорати орасидаги йиллик фарқ ҳам қам, қундузги ва тунги ҳароратлар фарқи ҳам анча катта. Районнинг иклими умуман континентал иқлим. Ёғин миқдори текисликдан тоққа томон ошиб боради. Тошкентда бир йилда 367 мм ёғин бўлса, Пском қишлоғида 800 мм. Ёзда об-ҳаво ўзгармай бир қил бўлиб турганда тоғ-водий шамоли эсиб туради. Шамол қундуз қуни водийдан тоғ томонга, кечаси тоғдан водийга қараб эсади. Ажойиб тоғ ҳавоси, салқин ёз, қорли қиш Бўстонлик ноҳиясида дам оладиган жойларни бунёд этишга имқон беради.

Дала практикаси ўтказиладиган райониимиз ва унинг атрофлари Чимён, Бурҷмулла, Богистон, Нанай, Хумсон, Октош қаб ҳуш манзара жойлар айниқса диққатга сазовордир.

Районнинг орогидрографияси.

Ўқув геологик амалиёти ўтказиладиган ноҳия Ўзбекистоннинг шарқий қисмида, Тошкент вилояти – Бўстонлик ноҳиясининг Бурчмулла қишлоғида жойлашган.

Бурчмулла қишлоғи Кўксув ва Чотқол дарёларининг қўшилиш қисмида, Чорвоқ сув омборининг шимолий-шарқий қисми денгиз сатҳидан 100 м. баландликда жойлашгандир.

Практика райони Ғарбий Тянь-Шаннинг тоғ тизмалари билан ўралгандир. Буларга Қоржонтов, Уғам, Пском ва Чотқол тоғлари қиради. Тизмаларни дарё водийлари бир-биридан ажратиб туради. Шимолий-шарқда Чотқол дарёсининг чап соҳилидан Чотқол тизма тоғи кўтарилади. Бу тизманинг Ўзбекистондаги баланд чўққиси катта Чимён (3309) ва Бабайтоғ (3555) дир.

Қоржонтов Ғарбий Тянь-Шаннинг йирик тизмасидир. Тянь-Шань хитойча сўз бўлиб осмон бўйи тоғлар демақдир. Тянь-Шань тоғ тизмалари орасида ҳар ерда кенг котловиналар (чўқма) бордир. Бунга Чорвоқ котловинаси мисол бўла олади. Бу котловиналар тектоник ҳаракатлар натижасида тоғ оралиғида ер қобиғининг чўқишидан пайдо бўлган. Чорвоқ ёки Бурчмулла котловинаси қадимги геологик даврлардаги йирик сув ҳавзаларининг қолдиқларидир. Бундай ҳавзаларга қуйилувчи дарёлар атрофдаги тоғларни секин-секин емириб чуқур водийлар, тор даралар ҳосил қилган. Тоғ водийлари ва даралар кўпроқ тектоник ёриқлар ўрнида вужудга келган. Дарё қаттиқ жинслардан тузилган тоғларни емириб, улар орасидан тор йўл очган ва тик қояли ён бағирларини вужудга келтирган. Шундай қилиб Ғарбий Тянь-Шань тоғлари ораларида Уғам, Пском, Кўксув, Чотқол, Чирчиқ каби водийлар ҳосил бўлган. Водий ва котловиналар серунум ерлар бўлиб, у ерларда аҳоли зич яшайди, шаҳар ва қишлоқлар кўп. Водийлар кўкаламзор, энг обод ерлардир.

Бурчмулла котловинасини ўраб турган тоғ чўккиларининг ер сатҳидан баландлиги 1000-2200 м.

Чоткол дарёси Талас Олатоғи билан тизмаси бир-бирига қўшилган жойидан бошланади. Узунлиги 220 км, унинг қуйи қисмигина Чирчик-Охангарон райониға қарайди. Унинг қуйи қисми бир қанча террасали кенг водийдан оқади. Чоткол дарёси асосан қор, қисман муз сувларидан тўйинади. Чорбоғ сув омборига ўнғ томондан Кўксув дарёси қуйилади. Унинг суви номиға мос равишда кўм-кўк, мусаффордир.

Уғом-Чирчикнинг йирик ирмоқларидан бири. Унинг узунлиги – 70 км. Дарё Коржонтоғ ва Уғом тизмалари орасидан оқиб ўтади.

Топ Чорбоғ дарасида Чорбоғ тўғони ва ГЭС қурилган. Тўғондан юқорида Чорбоғ сув омбори бунёд этилди. Гидроузел тўғонининг баланд-лиги 170 м.дир. «Чорбоғ денгизи» майдони 37 км². Сув омбори атрофи аҳолининг қордиқ чиқарадиган жойға айланиб бормоқда.

Районнинг ўрганилиш тарихидан.

Бурчмулла қишлоғи ва Чимён тоғи Ўрта Осиёнинг маданияти марказиға яқин жойлашганлиғиға қарамай 1919 йилға қадар яхши ўрганилмаган, бир оз бўлса-да, унинг геологиясиға оид маълумотлар деярли йўқ, факатгина мис, темир ва бошқаларнинг қорлиғи тўғрисида унча аниқ бўлмаган фикрларгина мавжуд эди.

1931 йилда геологлардан Е.И. Ефименко текширишларидан кейин Бурчмулла ўшшоғи яқинида маргимуш, висмут, молибден-вольфрам ва олтин қорлиқлари қорлиғи аниқланади.

Кейинчалик турли геология ташкилотларининг текшириш ишлари олиб қоришлари натижасида Чотқол тоғларида бир ўанча руда ўонлари очилиб ишға туширилди. 1930-1936 йиллардан бошлаб мунтазам геологик ўидирув ишлари билан бир ваўтда турли масштабдағи геологик карталар тузилди. 1935 йилда экспедицияға рақбар бўлган Б.Н. Наследов Чирчиқ-

Ангрен тоғлиғ ўлканинг геологик тузилиши ва руда конларини аниқлаш ишларини бажарди. Шу йилнинг ўзида Чимён тоғлари А.С. Уклонский рақбарлигидаги Чирчиғ экспедицияси томонидан ўрганилиши натижасида унда молибден, темир ва мармар конлари борлиги аниқланди. Шундай қилиб, бу конларни қилдириб топиш ва ишга туширишда Б.Н. Наследов, А.С. Уклонский, Н.П. Васильковский ларнинг хизмати каттадир. Кейинги йилларда районнинг геологияси ва тектоникаси устида иш олиб борган ва катта қисса қўшган олимлардан В.И. Поповни, Г.А. Мавлановни, М.А. Ахмаджоновларни кўрсатсак бўлади.

Ўзбекистон геологлари қидирув, разведка ва карталар тузиш ишларини давом эттирмоқдалар. Бундан ташқари бу районга бошқа шақарлардан деярли қар йили геологлар, олимлар турли геологик ишлар олиб бориш учун келадилар, шунингдек, Ўзбекистоннинг барча олий ўқув юртларидаги геология-қидирув, тоғ ва бошқа факультет талабалари ўзларининг дала практикаларини ўтказадилар.

Йиқилган материалларни тартибга солиш ва қисобот ёзиш.

Дала маршрутларидан ўқувчилар қайтишганларидан сўнг 2-3 соат йиқилган материалларни умумлаштириб, чизилган расмларни тартибга солишади. Бу ишларнинг бари ўқитувчи бошчилигида ўтказилади. Амалиёт рақбари ўқувчилар томонидан ёзиб борилаётган кундалик дафтарларни мунтазам равишда текшириб боради. Дала маршрутлари тугагандан сўнг ўқувчилар қисобот ёзишади. Қисобот ёзиш учун тахминий мундарижа қуйидагилардан иборат:

I. Кириш қисми.

II. Районнинг ўрганилиш тарихидан.

III. Районнинг геологик тузилиши:

а) районнинг физико-географияси;

б) районнинг стратиграфияси;

в) районнинг тектоникаси;

г) районнинг ҳиссача магматизми.

IV. Районнинг ҳазилма бойликлари.

V. Геологик маршрутлар.

VI. Хулоса.

Қисоботнинг умумий ҳажми 30-35 бет атрофида бўлиши керак, расмлари эса 20-25 бет. Практиканинг охириги куни ўқувчилар қисоботни қимоя қиладилар ва тегишли баҳо оладилар.

Стратиграфия.

Чирчиқ дарёсининг қавзасида, хусусан Бурчмулла қишлоғи атрофида тарқалган чўшинди жинсларнинг стратиграфияси тўла ишлаб чиқилган. Протерозой Бурчмулла атрофидаги жинсларнинг энг қариси протерозой эрасига оид бўлиб, улар асосан кулранг ва қорамтир рангдаги сланецлардан ҳамда кулранг яшил шўмтошлардан ташкил топгандир. Бў чўшинди жинсларнинг геологик ёши протерозой эрасининг юзори қисмига, аниқроғи рифей-венд даврига оид деб аниқланган. Уларнинг умумий қалинлиги (мощ-ность) 900-1200 метрга тенг. Шунинг ҳам таъкидлаш лозимки, протерозой эраси ётқизиқлари асосан Қўксув дарёсининг юзори қисмида тарқалган бўлиб, бевосита Бурчмулла қишлоғи атрофида учрамайди.

Палеозой.

Протерозой эраси ётқизиқларидан сўнг ва уларнинг ювилган юзасида палеозой эрасига оид чўшиндилар ётади. Уларнинг орасида энг қариси ордовик системаси чўкиндиларидир.

Ордовик даври чўкиндилари Бурчмулла қишлоғининг шимолий-шарқ қисмида учрайди. Бу ёшдаги жинслар асосан турли катталиқдаги

заррачаларга эга бўлган ўмтош, патнистош ва оқактошлардан ташкил топган. Ушбу ётшизишларнинг таркибида граптолит ҳамда трилобит каби организмларнинг ёлдишлари саъланиб ёлган.

Ордовик даври ётламларининг умумий ёалинлиги ўртача ёисобда 200-400 метрни ташкил этади.

Девон. Ордовик даври ётшизишларининг устига номуносиб (несогласно) ёолда ёўори девон ётшизишлари ётади. Номуносиблигининг асосий сабаби шундаки, бевосита Бурчмулла атрофида силур ётшизишлари учрамайди. Улар Пском антиклиналининг ядросидагина учраши мумкин. Девон даври ётшизишларининг геологик ёши фран ва ёомен ярусларига оид деб аниёланган.

Фран яруси ётшизишлари ёизил рангли формациядан иборат бўлиб, конгломерат, кумтош, алевролит, ёамда аргиллит ётламларидан ташкил топган. Улар учун хос бўлган ери шундаки, уларда тўлкин излари ва ёийшиё ётламланишларни учратиш мумкин. Бу ётламларнинг орасида *Bothriolepis* деб аталган балиёнинг ёолдишлари саъланиб ёлган. Улар ётшизишларнинг фран ярусига оид эканлигини тасдиёлайди. Кесманинг ёўори ёисмида ёораминиферларнинг ёиёаноёлари ёам учрайди. Фран ярусига оид ёўкиндиларнинг барчаси литологик ёикатдан тулкибош деб номланган. Фран яруси ётшизишлари, асосан Бурчмулла ёишлоёининг шимолий-шарёида, Кўксув дарёсининг водийсида ер ёзига ёиёиб туради ва уларнинг умумий ёалинлиги 100 дан 700 метргача етади.

Фран яруси ётшизишларининг устида у билан мосланган ёолда ёомен ётшизишлари ётади ва у икки ёисмидан иборат. +уйи ёисми ёора рангдаги ёат-ёат оқактош ёаламларидан ҳамда шу рангдаги оёакли ўмтошлардан ташкил топган. Ёўори ёисми эса кулранг гилли оёактош ётламларидан иборат. Ниёоят ёомен ярусининг энг ёўори ёисмида бутунлай ёора рангдаги ёупёа катламчалардан иборат оёактош ёатлами ётади. Ёўорида

кўрсатилган ётшизишлар таршибида турли брахиоподаларнинг шолдишлари саъланиб шолган. Улар шуйидагилардан иборат: *Cyrtospirifer romanovskii* Nat., *Cyrtospirifer kitckinaensis* Serg. ва бошшалар.

Фамен ярусига оид чўкиндиларнинг умумий шалинлиги 900 метрга етади, лекин Бурчмулла шишлођи атрофида эса 300 метрни ташкил етади камда улар Чотшол ва Кўксув дарёларининг водийларида ер юзасига чишиб туради.

Карбон. Тошкўмир системасига оид чўкиндилар Бурчмулла шишлођи атрофида учта ярусдан иборат, яъни турне, визе ва Серпухов яруслари ётшизишлари бўлиб, улар юшори девон даври ётшизишларининг устида мослашган қолда етади.

Турне яруси чўкиндилари икки шисмдан иборат бўлиб, биринчи шисми кулранг рангдаги доломитлашган шаттиш майда заррачали оқактош шатламидан ташшил топган. Шатламнинг пастки шисми ош-шора рангли бўлиб, юшори шисми эса тим шорадир. Шатламнинг шалинлиги 500-600 метрни ташкил етади. Турне ярусининг иккинчи шисми шат-шат оқактош-лардан иборат ва уларнинг таркибида турлича шаклли кремний жинслари кам учрайди. Ушбу ётшизишларнинг орасида брахиопода шолдишларини учратиш мумкин, унинг шалинлиги – 200 метр. Турне яруси ётшизишлари Бурчмулла шишлођидаги Кўксув дарёси ўзанида ва катта Чимён тођида учрайди.

Визе яруси чўкиндилари кам икки шисмдан иборат. Яруснинг пастки шисми шора рангдаги шат-шат оқактошлардан иборат ва унинг таркибида фауна шолдишлари саъланиб шолган. *Leptainella rugularis* Nat. Кўрсатилган шотишмалар ушбу оқактошларнинг ёши визе ярусига оид эканини тасдишлайди. Визе яруси ётшизишлари турне яруси ётшизишларининг устида мосланган қолда етади. Шалинлиги 850-900 м.

Визе ярусининг юшори шисми мраморга айланган оқактош шатламларидан ва конглобрекция шатламларидан ташкил топган. Фашат

ушбу **šатламлар Бурчмулла šiшлоҳидан ташšарида, Угам дарёсининг бўйида қамда катта Чимён тоҳида учрайди. Šалинлиги 300-400 м.**

Визе яруси ётšизиšларининг ювилган юзаси Серпухов ярусининг чўкиндилари мосланмаган равишда ётади ва улар асосан конгломерат, оқактош, вулканоген жинслар šумтошлардан ташкил топган. Оқактош šатламларининг таркибида брахиопода фаунасининг šолдиšларини учратиш мумкин. Серпухов яруси ётšизиšларининг šалинлиги 200-300 метрни ташкил этади.

Протерозой қамда палеозой эраларига оид ётšизиšларни ўз навбатида гранит таркибидаги магматик жинслар ёриб чиšади. Ушбу жинслар Бурчмулла šiшлоҳи ҳудудида қам учрайди.

Мезозой эрасига оид жинслар бевосита Бурмулла атрофида учрамайди. Юра ва бўр даври ётšизиšлари Хўжакент, Хумсон šiшлошларида ўчрайди. Бевосита Бурчмулла šiшлоҳи палеозой эрасининг юшори šисми қамда мезозой эраси ётšизиšларининг бутунлай йўшлиги, шу даврларгача бу ерда чўкинди йиҳилишида узоš ваšt šуруšлик ҳукм сурганидан далолат беради.

Кайнозой. Бевосита Бурчмулла šiшлоҳи атрофида тошқўмир даври ётšизиšларнинг устида, мосланмаган қолда бўлинмаган палеоген-неоген šатламлари ётади ва улар šизил рангдаги šумтош, алевролит, гравелит ва мергелдан ташкил топган. Ушбу чўкинди тоҳ жинслари, асосан денгиз šирҳошларида ва šуруšликда қосил бўлган. Айрим геологик тадšишотларда келтирилишига šараганда ушбу чўкинди жинсларнинг таркибида микрофауна šолдиšларини учратиш мумкин.

Албатта кайнозой ётšизиšларининг қам юшори šисми ювилиб кетган. Кайнозой ётšизиšларининг умумий šалинлиги 200 метрни ташкил этади.

Тўртламчи давр. Тўртламчи давр чўкиндилари деярли қамма ерда учрайди ва улар палеоген-неоген ётšизиšларининг устида номуносиб

ётади. Биз ўрганган территорияда тўртламчи давр ётёизиёларининг тўрт бўлими учрайди:

1. Ёуйи тўртламчи давр ётёизиёлари (нанай комплекси) – конгломератлар. Улар йирик бўлаклардан иборат, ёалинлиги 200 метр.

2. Тошкент комплекси дарё бўйи террасаларидаги аллювиал-проллювиал ётёизиёлар-конгломератлар ва лёссимон суглиноклар, ёалинлиги 80 метр.

3. Мирзачўл комплекси (голодностепский). Паст ёисмида конгломератлар, ёумтошлар ва галечниклар. Устида суглинок ётади. +алинлиги 30 метр.

4. Сирдарё комплекси ёосил бўлиши жикатидан аллювиал ва деллювиал ётёизиёлар бўлиб, галечник ва конгломератлардан иборат, энг юёори ёисми эса лёссимон суглинок (соё тупроёдан) дан ташкил топган, ёалинлиги 25-30 метр.

Тектоника.

Бурчмулла райони тектоник тузилишида турли ёшдаги пликатив ва дизъюнктив структуралар иштирок этадилар. Улар герцин, альп ва жуда янги тектогенез циклларида ёосил бўлгандир.

Пликатив структуралар.

Ёосил бўлиш ваётига ёараб пликатив бузилишлар (структуралар) герцин ва тўртламчи структураларга бўлинадилар.

Герцин ваётида геосинклиналь процесслар натижасида (ўрта тошкўмир даврида юзага келган бурмачанликнинг асосий орасида) умумий эзилиш (смятия) бурмалари ёки голоморф бурмалар вужудга келди бу шимолий-шарёий ўйналишдаги катта антиклинор ва синклинор бурмалардир антиклинарий ёанотлари оддий антиклиналдир.

Шундай ёилиб, Бурчмулла районида иккита Пском ва Угом, Шимолий-шарё йўналишидаги катта антиклинорийларнинг переклиналь ёисмини

кўрамиз. Пском антиклинорияси ўш чизиғи Кўксув ва Чотшол дарёларининг ўйшилиш ўсмида чўккан. Ўратутбоши тоғидаги оқактош ўатламлари Пском антиклинориясини жануби-шарўий ўанотидир. Антиклинорийнинг ўанотлари анча кичик бўлган бурмалар (антиклиналь ва синклиналлар) билан мураккаблашгандир. Уларни Кўксув дарёсининг ўнг ва чап томонида кузатиш мумкин. Антиклинорий структуралар ядролари девон ва тошкўмир даврининг карбонат жинсларидан ташкил топган бўлиб, гумбаз (купола) ўосил ўилувчи жинслар эса анча аввал ўосил бўлган ва анча ўари жинслар билан мураккаблашгадирлар.

Гумбаз – бу овал шаклидаги структуралар бўлиб, ички ўисмлари ўари жинслардан, чеккалари эса ёш Д-С жинсларидан иборатдир.

Шундай ўилиб Бурчмулла районида Худойдод, Чаватта, Тепар ва бошўа (Аурахматнинг жанубида Чумбучкут, шимолида Пском дарёсининг ўрта ўисмида) гумбазлар мавжуддир. Барча пликатив структуралар асосан герцин (С₂-Р) ваўтида вужудга келгандир.

Герцин ваўтида пайдо бўлган пликатив структуралардан ташўари шу ваўтга мансуб кўплаб дизўюнктив структуралар (узилмалар)ни кузатамиз.

Улар морфологик белгиларига ўараб сурилма (надвиг), узилма (сброс) ва тик сурилма (взброс)ларга бўлинадилар. Бурчмулла узилмачанлик зонасидаги герцин ваўтида ўосил бўлган узилмани (сброс) Кўксув ва Кулосьё дарёларининг ўуйилиш ўисмида кузатиш мумкин. Ер юзасидаги узилма (синиўлар)ларда тектоник брекчиялани, Кулосьё дарёсининг ўнг томонида ва С ётўизиўлари чиўиб турган ўисмида Кўксувнинг ўам ўнг томонида кузатиш мумкин.

Сурилмаларни (надвиглар) тик бўлмаган жанубий Устарасой, Марказий Устарасой ва Шимолий Устарасой синиўлари бўйлаб кузатиш мумкин. Улар бўйлаб Фомен ярус ўатламлари жанубий /арбга бири устига иккинчиси итарилиб чиўиб келган.

Альп даврида Памир ва Копеттоҳдан ташғари, Ўрта Осиёнинг барча территориясида, эпиконтиненталь денгиз Т-Р ётғизликлари тўпланадиган эпигерцин платформаси бўлган (герциндан кейин Т-Р) қосил бўлган платформа. Палеоген ётғизликларининг 4000 м юқорида учраши бунинг яққол далилидир (Янгибозор, Ангрен). Палеоген даврида конседиментацион пликатив структуралар пайдо бўлади. Улар кенг антиклиналь ва синклинал бўрмалар бўлиб, герцин ваётидаги рельеф формасини сағлаб қолган. Узилма (дизъюнктив) структуралар ўша ваётда жуда кучсиз бўлган ва қашатгина палеозой фундаментдаги синишлар бўйлаб содир бўлган неоген давридан боғлаб то шу ваётгача бу территорияда неотектоник қаракатнинг кучайганлиги қайд қилинади. Янги неотектоник қаракат неогендан қозирги ваётда қадар бўлган ваётни ўз ичига олади. Геологлар бунда қозирги тектоник қаракатни асбоблар ёрдамида кейинги 100-150 йил давомида кузатилганини қам қисобга оладилар.

Жуда янги тектоник қаракатнинг асосий хусусияти қуйидагилардан иборатдир: бу ваётда кенгайиш (растяжение) қаракати натижасида вужудга келган вертикал қаракат кучли, яъни синиш қизиллари бўйлаб юқори ва пастга 3 км гача кучли контраст қаракатлар бўлган. Бундай қаракатлар натижасида дала практикаси ўтилаётган районда Чотқол, Пском ва боғша водийлар (грабенлар) ва уларни ўраб турган Пском, Чимбучкут, Қоратут- боши, Чотқол (катта ва кичик Чимён) тоғлари пайдо бўладилар.

Структура жикатдан бу водийлар грабен-синклиналлар, уларни ураб турган тоғлар эса горст-антиклиналллар. Бу ваётда пликатив структурадан ташғари, территориянинг активланиши натижасида вужудга келган дизъюнктив бўзилишлар бўлганлиги қам қайд этилади.

Тектоник қаракатлар асосан герцин даврида фундаментда қосил бўлган синишлар (дарзликлар) бўйлаб содир бўлгандир. Улар кўплаб сурилма, сбросларни ва бошқа бузилишларни қосил ўиладилар.

Шунингдек, Бурчмулла синиғи (дарз) Чотшол дарёсининг унғ томонида палеозой ётғизишлари (шатламлари) палеоген-неоген жинслари устига сурилиб чиғиб ўолган.

Қозирғи вағтда бу территорияда янғи қозирғи замон тектоник қаракатлари содир бўлмоғда (ер ўимирлаш, пастга тушиши ва кўтарилиш). Бунинг натижасида қозирғи дарё террасалари, чиғиш конуслари, водийлари, тоғларни пайдо булаётгани кўзга яғшол ташланиб туради. Буларнинг қаммаси эндоген ва экзоген процессларни бирғалиғда содир булаётганлиғи натижасидир.

Фойдали ўазилмалар.

Бурчмулла Тянь-Шань тоғ тизмаларининг бошқа райондағи каби фойдали ўазилма конларига бойдир. Бундай конлардан флюорит, марғимуш, висмут ва бошқаларни кўрсатиш мумкин.

Оби-раймат флюорит кони ўуйи тошқўмир оқактошлари ичига жойлашгандир. Бу жойда катта ва кичик узилмалар учрайди. Бу флюорит кони катта Бурчмулла зонасида жойлашгандир ва унинг пайдо бўлиши билан боғлиғдир. Бу кон гидротермаль эритмаларнинг оқактошлари билан ўзаро муносабатлари натижасида қосил бўлган. Бу ерда флюорит турли оч бинафша, яшил рангдадир. Бошқа минераллардан галенит, кальцит, пирит, арсенопирит учрайди.

Оби-раймат кони Чотшол дарёсининг ўнғ ширғоғида жойлашган бўлиб, шу номли булоғнинг ёнидадир. Бундан ташқари вольфрам, тилла ва бошқа конлар учрайди буларнинг ичида Устарасой висмут кони катта ақамиятга

эгадир. Кўксув дарёсининг ўнг ўирўоўида жойлашган бўлиб. Устарасойнинг ўрта ўисмидадир. Оби-ракмат флюорит кони 30-йилларда ишга туширилган. Бу ерда бойитиш фабрикаси бўлган, майдаланган флюорит 50 кг ли ўопларда алюминий заводларига юборилади. Оби-ракмат флюорит кони саргардон оўактошларида жойлашгандир. Флюоритдан ташўари бу ерда гематит, галит, кварц ва бошўа минераллар учрайди. Бу кон ўз ваўтида шахталар ва карьерлар ёрдамида ўазиб олинган. Эски уйимлар кўзирда кам саўланиб ўолган. Флюорит миўдори томон бўлганлигидан сўнг кон ёпилган.

Бурчмулла маргимуш кони 1160-метр денгиз сатўидан баланликда бўлиб, Бурчмулланинг шимолий ўарбий ўисмида жойлашгандир. Бу кон 1932 йилда очилган. Улуў Ватан уриши даврида бу кондан маргимуш ўазиб олинган. Унинг миўдори тамом бўлгандан кейин кон ёпилган. Геологик ўидириш ишлари висмут конини очишга 1970 йилларда муяссар бўлинди. Бу висмут конини Устарасой кони деб киритилди. Висмут рудалари бойитилгандан кейин махсус идишларда Чимкентга ўўрўошин заводига юборилади. Устарасой висмут кони девон даврининг фамен ва франк яруслари орасида жойлашгандир. Устарасой кони рудасини бойитиш учун фабрика ўурилган. Висмут бойитиш фабрикаси полигондан 300 м юўорида жойлашгандир. Бу фабрикада висмут концентрати тайёрланган. Бу кон ва завод Ўзбекистонда муўим аўамиятга эгадир. Бу конлардан ташўари Бурчмулла атрофида жуда катта запасга эга бўлган ўурилиш материаллари яўни оўактошлар, шаўаллар, ўумтошлар, соз тупроўлар ва бошўалар мавжуддир.

Геологик маршрутлар.

Биринчи маршрут.

Чотўол дарёси икки томони ўояли тошлар орасидан оўиб келади. Чотўол дарёсининг суви доим бир хилда оўмайди. Баўор ва ёз бошларида

ёђингарчилик бўлганда, қавонинг исиши натижасида музлар эриши тезлашганда дарё суви тўлиб осяди. Сув кўпайган ваётида кучли оёим ёум, лёс ва қар хил минералларни водийнинг ёуйи ёисмига – Чорвоё сув омборига олиб келиб ташлайди. Куз ва ёиш Чотёолнинг суви жуда озайиб кетади.

Дарё бўйлаб тахминан 1 км юрилса, Одамтош тепалигига дуч келинади. Тепаликнинг Чотёол дарёсига ёараган томонида ёум тошлардан одамнинг хайкалига ўхшаш тош ёад кўтариб турибди. Худди шу ердан Чотёолнинг Кўксув билан ёўшилиши, Чорвоё сув омборининг кўп ёисми, зинапоя бўлиб ётган Чотёол дарёсининг супалари, катта Бурчмулла синиёи, катта ва кичик Чимён тоё тизмалари яёёол кўриниб туради.

«Чорвоё» денгизи деб аталадиган бу сув омбори ёурилгандан кейин теварак-атрофдаги иёлим анча ўзгарди: ёиши илиёроё, ёзи салёинроё бўлиб ёолди. Бундан бир неча йил олдин сув омборига қарп, сазан балиёларининг майдалари ёўйиб юборилган эди. Сувнинг ўртача қарорати +13 - +14°С ни ташкил ёилади. Ёзнинг июль ойларида сувнинг қарорати ёирёоё ерларида +24 - +25°С гача етади. Тарихий йилномаларнинг ёзишича, Ўзбекистоннинг тоёли районларида милоддан аввал тўртинчи асрдаёё мис ва олтин ёазиб чиёарилган. Милоднинг саккизинчи асрида қунармандчиликнинг тараёёий этиши билан Чотёол тоёларида кумуш-ёўрёошин ёазиб чиёарила бошланди.

Маршрут тугагач, талабалар ўз таассуротларини кундалик дафтарга туширмоёлари даркор.

Иккинчи маршрут.

Чотёол дарёси бўйлаб юёорига бориш. Дарё бўйлаб тахминан 1 км 200 м юрилса, одамтош тепалигидан ўтиш билан йўлнинг чап томонида лой ёатлам орасидан чиёиб ётган оёактошларга кўзингиз тушади. Бу оёактош

палеозой эрасига šарашли šатлам бўлиб, фаšат шу ерда ер устига чишиб ётибди. Оқактошлар лупа билан šаралганда унинг ичида қайвонлар ва ўсимликлар šолдиšларини ва қар хил минералларни (кварц, биотит, мусковит ва бош.) кўриш мумкин. Чишиб ётган оқактошнинг šалинлиги 6-8 м., узунлиги 80-90 метр. Оқактошли šатлам тугаши билан йўл иккига бўлинади, биринчиси тўғрига, иккинчиси ўнгга пастга šараб кетади. Шу ўнг томондаги йўл билан чамаси 100 м. тушсак, мевали 3 га ерни эгаллаган боғлиш булошли сувга дуч келамиз. Бу булош сувлари оқактошли šатламнинг 5 та ердаги ёриғидан чишади. Шунинг учун қам ақоли бу булошша Бешбулош деб ном беришган. Булошларнинг суви қайрон šоларлик даражада тиниш ва совуш, халш бу булош сувини шифобахш деб билади. Бунда жон бўлса керак. Қар қолда салшин сув, соя-салшин дарахтзор, мусаффо тоғ қавоси, гўзал табиат – буларнинг қаммаси кишига šандайдир куч бағишлайди ва киши ўзини бардам сезади, бу ерда кўрган-билганларини узош ваšтларгача эсидан чишармайди. Бу булошнинг атрофида катта чинор савлат тўкиб турибди. Бир оз дам олгач, маршрутни давом эттириб, чаммаси 1200 м юрилгач, йўлнинг чап томонидан, икки адирлик оралиғида қар хил тоғ жинсларининг ўйилиб ётганлигини кўрасиз. Бу селнинг геологик ишига киради.

Шу ерда геологик болға билан жинсларни майдалаб, улар орасидан халькопирит, кальцит, кварц ва бошша минералларни кўришингиз мумкин. Шу нуштада домла ёрдамида тоғ компаси билан šатламларнинг элементларини ўлчаб, кундалик дафтарга ёзмош даркордир.

Шу нуштадан тахминан 500 метр юрилса, илгариги «Оби-рақмат» дам олиш уйи тепасидан чишилади. Шу ердан Чотшол дарёсини қосил šилиб кетган šумтошлик ва тупрошли террасаларини (Чорвош сув омборида сув камайган ваšтда 3 та терраса кўринади) кўришимиз мумкин. Шу нуштадан туриб дарёнинг чап томонидан палеозой ёриғи пастдан юшорига

кўтарилганини кўриш мумкин. Бу ёришни катта Бурчмулла ёриғи дейилади. Чотшолнинг ўнг ширёғи билан тахминан 200 метр юрилса, флюорит кони ёнидан чиşıлади. Бу кондан 30-40 йилларда флюорит шазиб олинган, ғозирги кунда флюоритнинг каммаси шазиб олинганлиги учун иш тўхтатилган.

Учинчи маршрут.

Кўксувнинг юшори шисмига. Эрта тонг Кўксувнинг ўнг томонидан йўлдан эски Бурчмулла дам олиш уйи томон йўлга тушилади. Дам олиш уйига етмасдан Кулосиё сойининг Кўксув билан шўшиладиган ерида тўхтаб Отаяйлов тепалигига назар ташланса, жуда катта сурилмани кўриш мумкин. Сурилманинг (оползень) узунлиги 300-320 м., эни 180-200 метр. Бир неча юз йиллар давомида жим ётган бу сурилма 1954 йили ўзини кўрсатди. Бу водийда бўлган сурилмаларнинг энг каттасидир. Бу сурилма 20 дан ортиш хонадонни вайрон шилди, ғозир кам хавф солиб турибди. Шунинг учун Бурчмулла дам олиш уйи ва хонадонлар бошша кавфсиз ерга кўчирилган.

Шу водийда жуда кўплаб кичик-кичик сурилмаларни учратишимиз мумкин, шунинг учун кам Кўксув водийси «сурилмалар водийси» деб кам аталади. Дам олиш уйидан тахминан 100 м нарида йўлнинг катта-кичик карсанг тошлар аралаш гил уюмлари ётибди. Айрим катта карсанг тошлар катто дам олиш уйининг пляжигача думалаб тушган. Бу тоғ жинслар катта Бурчмулла ёриғидан ажралиб чишсан ва пастга юмалаб тушган тектоник брекчиялардир. Катта Бурчмулла ёриғи Кўксувнинг чап ширёғидан Чумбучкут тоғи томонида жуда яшшол кўриниб туради. Шу ёриш оршали С катламининг жинслари палеоген ва неоген шатламлари устига сурилиб чишсан. Катта Бурчмулла ёриғидан висмутга бой бўлган кон топиб фойдаланишга топширилган. Тахминан 150 метр юрилса, Кўксув дарёси чап ширёғида, Чумбучкут тоғи ён бағрида шатламларнинг кар хил кўринишда

ётганлигини кўрамиз. Šатламларнинг қар хил кўринишда ётишига асосан тектоник қаракатлар ва зилзилалар сабаб бўлган. Шу нуқтадан чамаси 400 метр ўтгандан сўнг Кўксув водийси торайиб лотинча «V» қарфига ўхшаш ўолади. Агарда водийдаги оппоš тошлардан бири геологик болға билан мадайланса, унинг таркибида юзлаб майда ялтираб турган кальцит кристалларини кўриш мумкин – бу мармардир. Мармар асосан оқактошнинг босим ва юшори қарорат таъсирида ер остида қосил бўлади. У ердаги мармар геология жараёнлари натижасида юшорига чишиб ўолган.

Тўртинчи маршрут.

Кулосиё сойи бўйлаб юшорига. Дам олиш уйига етмасдан ўнг томондан Кулосиё сойи ошиб чишиб, Кўксувга кўшилади. Маршрут худди шу ердан бошланади. Шу нуқтадан Кулосиё сойининг геологик ишини, сойининг ўуйи ўисмида сийшаланган қар хил ўлчамдаги тоғ жинсларини: оқактош, конгломерат, гранит, ўумтошларни кўришимиз мумкин. Чамаси 100 м. кўтарилсак, тўртламчи даврнинг конгломератларини (чўкинди тоғ жинслари) ёнидан чишамиз. Соининг икки томонида кичик-кичик супачалар жойлашган. Бу супачалар асосан тўртламчи даврнинг тоғ жинсларидан, яъни алювиал, промовиал ётшизишларидан ташкил топган. Маршрут Кулосиё сойининг чап томонидан ўнг томонидан тошдан-тошга ўтиб тепага ўараб кўтарилади. Чап ва ўнг томонидан худди устимизга аҳдарилаётгандай оқактош ўатламлари осмонга ўараб кўтарилиб кетган. Шу маршрут ваштида кўплаб тоғ жинсларининг оралиғидан чишаётган ер ости сувларини кўришимиз мумкин. Бу сойда ёзда сув кўп бўлади, ўишда деярли бўлмайди. Соининг суви 20-25 км жануби-шаршдаги Олабуша чўшши си ён бағридаги ўирликлар ва булошлардан олади. Ичкарига кириб борган сари дара ўандайдир саловатли бўла боради. Тик ўоялар бир-бирига жуда қам яшинлашиб боради. Шўх сой суви гоқчап, гоқ ўнг томонга тошларга

урилиб, кўпириб ошиб боради. Бир оз дам олгач, тоғ жинсларидан намуналар олиб группа бошлиқининг рақбарлигида кундалик дафтарга туширамыз. Ётлам-ларнинг жойланиш элементларини тоғ компаси ёрдамида ўлчаймиз.

Бешинчи маршрут.

Палеоген-неоген ётламларининг кесимини тузиш.

Бу маршрутга чишиш учун албатта тоғ компаси метр (15-20 метрли) ва геологик болға бўлиши зарур. Палеоген-неоген ётламларининг ер устига чишиб турган ва ўлчашга ўлай бўлган жойи Бурчмулладан Яккатут ўишлоғига борадиган йўлнинг ўнг томонида Чумбучкут тоғининг ён бағрида жуда кам яшол кўриниб турган ердан нушта олса, маъсадга мувофиқ бўлади. Кесимни тузаётганда майда, ўртача ва йирик донали ўмтош ётламлари билан бир ёторда алевролит ва гил тошлар учрайди. Метр билан ўлчаётган ваътда шуларга жуда катта эътибор бериш керак. Ўлчамларни тугатиб, кундалик дафтарга ёзиб булгач маршрутимиш тугайди.

Олтинчи маршрут.

Висмут конига экскурсия. Висмут конига Кўкув дарёсининг устига ўрилган кўприк оръали ўтиб Яккатут ўишлоғи томон юрилади. +ишлошша етмасдан, чамаси бир 100 м ўнга бурилиб. Чумбучкут тоғини ёнбағирлаб тепага 500 м кўтарилса, висмут кони куринади. Висмут конига кўтарилиш билан жуда чиройли манзарани кузатиш мумкин. Шу нушадан Чорвош сув омбори, эски Бурчмулла дам олиш уйи, катта сурилма Чумбучкут, Отяйлов, Ёратутбоши, Кичик Чимён тоғлари унинг ортидан муз билан ёпланган катта Чимён тоғ тизмалари кўриниб туради.

Бурчмуллада геологик ўидирув ишларини 1924 йили А.С. Уклонский бошчилигидаги экспедиция бошлаган эди. 30-йилларда шу районларда Е.И. Ёфименко бошчилигидаги экспедицияси геологик ўидирув ишларини олиб

борди. Бу иккала экспедициячининг маълумотларига кўра 1961 йили висмут кони ишга туширилди. Бурчмулла районида очилган висмут кони жумхуриятимизда ягона кон қисобланади. Кондан висмут билан олтин, кумуш ва мис учраб туради. Висмут кони билан танишгандан сўнг ташланган штабеллардан тоғ жинсларидаги ва минераллардан намуналар олиб қайтамиз.

**Бурчмулла полигонида амалий ўқитиш тартиби, техника қавфсизлиги
қоидалари ва тозалик қолатлари тўғрисида кўрсатма.**

Бурчмулла амалий ўқитиш полигони 1960 йили ташкил этилган. У Чорвоқ сув омборининг шимоли-шарқ қирғоғида жойлашган. Қар йили бу полигонда Қон-геология, Нефть ва газ факультетларининг талабалари геология, геологик хариталаш, геофизика ва геодезия фанларидан амалий машғулотлар ўтказадилар.

Амалий машғулотлар уч босқичда олиб борилади – тайёргарлик, дала ва хонавий (камералка).

Тайёргарлик босқичи Тошкентдан бошланади. Бу босқичда қамма талабалар медицина кўригидан ўтказилади. Амалий машғулотлар учун керак бўлган асбоб-анжомлар тайёрланади (рюкзак, геологик болға, дала дафтарлари, тоғ компаси, дала халтаси, чўнтак ойнаси (лупа), ўчирғич, қора ва рангли қаламлар, масштабли чизғич, қўғоз (ватман), миллиметрли ва ялтироқ қўғоз, намуналар учун халтача, қар хил рангли туш, рулетка (масофа ўлчовли асбоб), дурбин, ўлчагич (циркул), транспортир ва пахта).

Ўқитувчи-рақбар томонидан талаба гуруҳлари ўртасида йўл-йўриқлар (инструкция) ўтказилади ва махсус дафтарга қайд этилади.

Полигонда кетиш куни белгиланади. Белгиланган кунда қамма гуруҳ талабалари махсус автобусларга тартиб билан ўтказилади.

Ўшитувчи раќбарлигида талабалар ўшйтиш полигонигача кузатиб борилади.

Дала босшичида ќамма талабалар яшаш учун палатка ўурилмаларга ва махсус хоналарга гуруќлари бўйича жойлаштирилади ва жўра боши сайланади. Ётиш ва ишлаш учун талаб ўилинадиган анжомлар (кўрпа-тўшак, кровать, стол, стул) полигон раќбарлари томонидан таъминланади.

Полигон раќбарлари томонидан ќамма талабалар учун ўрнатилган тартиб ва иш интизоми, иш шароитлари тўғрисида кўрсатмалар берилади.

Маршрутга чишиш, ўайтиш, мусташил ишлаш, маъруза ўтказиш, дам олиш, эрталабки, тушки ва кечки овшатланиш ваштлари аниш белгиланади. Шунингдек ќар куни маълум белгиланган вашда маршрутдан олинган ќужжат ва намуналар талабалар томонидан ўрганилади, дала дафтарлари, журналлар тартибга солинади ва хулосалар ўилинади.

Талабалар ўртасида ташкилий масалалар кўрилади: талабаларнинг ваштинча уюшмалари, тартиб ўрнатиш гуруќлари ташкил ўилинади.

Талабаларнинг ишдан бўш ваштларида амалга ошириладиган маиший иш режалари кўрилиб чишлиди.

Ўтказиладиган ќар хил экскурсия, дискотека, кино, адабий кечалар, спорт мусобаашалари, деворий газеталар каби тадбирларнинг ваштлари белгиланади.

Хонавий (камералка) босшичида эса талабалар ўшитувчи раќбарлигида йишилган бирламчи геологик ќужжатлар асосида ќисобот ёзадилар. Тайёрланган ќисобот махсус комиссия иштирокида ќимоя ўилинади ва баќоланади.

Полигонда амалий ўшиш машўулотларини ўтказиш жараёнида ќамма талабалар ўуйидаги тартиб-интизомга, техника хавфсизлиги ўоидаларига, тозалик ќолатларига амал ўилишлари керак.

1. Амалий машғулотлар белгиланган тартиб ва интизом асосида олиб борилади ва унинг бузилишига йўл қўйилмайди.

2. Талабалар амалий машғулотларнинг қамма хилларига техника қавфсизлиги бўйича йўл-йўриқларини ўтгандан кейингина киришишлари мумкин.

3. Маршрутларга йўл-йўриқда кўрсатилган аслақа-анжом ва кийимларсиз (бош ва таги резинали оёқ кийим, узун қўлак) чиқиш ман этилади.

4. Мустақил ўтказиладиган маршрутларга қаида иккита талаба қатнашиши шарт.

5. Об-қаво маълумотларига кўра қучли шамол, бўрон, ёқингарчилик қутилган қунларда маршрутларга чиқишга рухсат этилмайди.

6. Мустақил маршрутга қетган талабалар қуруқ белгиланган вақтда қелишмаса, қуруқ рақбари қолгон рақбарларига қудлик билан маълум қилади ва қидириш тадбирлари қўрилади.

7. Ўпирилиш қавфи бўлган қойларда амалий машғулот ўтказишда назорат қучайтирилади.

8. Намуналар олиш қараёнида геологик қолқадан қойдаланиш қоидаларига амал қилиниши қерак. Чунки тоқ жинси ва мақданлардан учган қарчалар олувчини ёқи атрофидаги талабаларни қароқатлантириши мумкин.

9. Қасалланган талабалар медицина қодимларининг рухсатсиз маршрутларга қўйилмайди.

10. Маршрутларда енгил қароқатланган ёқи қараланган талабаларга биринчи тиббий ёрдам кўрсатилади.

11. Талабалар қашайдиган қоналар ва қалатка қурилмалари, ўқитиш қоналари, ошқоналар, қўмилиш қушлари, қожатқоналарнинг тозалик қолатлари тиббиёт қодимлари томонидан назорат қилинади.

12. Вашти-вашти билан талабаларнинг соғлиғ даражасини анишлаш маъсадида махсус тиббий кўрик ўтказилиб турилиши лозим.

13. Маршрут жараёнида чекиш, гугуртдан фойдаланиш, гулхан ёшмош тавсия этилмайди.

14. Закарли илонлар, шурт-шумурсчалар учрайдиган жойларда эктиёт бўлиш талаб шилинади.

15. Мевали дарахтларни синдириш, жарохатлантириш ва пишмаган меваларни истеъмол шилиш ман этилади.

16. Палатка шурилмаларига рухсатсиз электр симларини ўтказиш рухсат берилмайди.

17. Кулосия, Палтов шаршаларида, Кўксув дарёсида ва Чорвош сув омборида чумилиш ман этилади.

18. Рақбарларнинг рухсатсиз полигон чегарасидан ташқарига ёши узоқ жойларга бориш шатъий ман этилади.

19. Спиртли ичимликларни истеъмол шилган талабалар университет даргоқидан мақрум шилинади.

Табиатни муҳофаза шилиш.

Инсон географик муқитда яшайди ва эктиёжига керак бўлган каво, сув, озиш-овшат, кийим-бош, турар жой учун материалларни, саноат қомашёларини табиатдан олади. Шундай экан, инсон ишлаб чиқарувчи куч, жамият учун бойликлар уларнинг меқнати натижасида яратилади.

Инсон ўзини ўраб турган табиатга таъсир этиб, уни тинимсиз ўзгартиради. Қозир планетамизда инсон фаолияти таъсир этмаган ландшафт деярли шолмаган. Инсоният хўжалик фаолиятида табиатга турли йўллар билан таъсир этмошда ва планетамиз рельефини ўзгартирмошда.

Лекин одамлар табиат бойликларини ўзлаштира бориб, ўзлари шилаётган ишларининг ошибатлари тўғрисида ошилона ўйлаб кўрмайдилар.

Ердаги барча жонзотларнинг бир-бири билан ўзаро алоқадорлиги ва мувозанати ҳақида ташвишланмайдилар. Инсоннинг табиат ишига аралашуви табиатдаги бузилган мувозанатни аслига қайтариб бўлмайдиган ўзгаришларга олиб келмоқда.

Масалан: Инсон таъсирида жумқуриятимиздаги ўрмонлар майдони 1,5-2 баравар камаймоқда, айрим қайвон турлари эса бутунлай йўқ қилинмоқда.

Атроф-муҳит – бу ҳаёт одамларнинг атрофини ўраб турган нарсаларгина эмас, балки биологик, иқтисодий, маданий ва сиёсий аспектларнинг бир-бирига мураккаб йўл билан қўшилиб кетишидир.

Улар бир бутун, узлуксиз равишда ўзгариб турадиган экологик структурани ҳосил қилади. Экология деганда, организмларнинг теvarак-атрофдаги муҳит билан ўзаро муносабатларини ўрганадиган биологик фан тушунилади. Масалан, ҳозирги вақтда Ер шарининг қавоסי, суви, ўсимлиги, қайвонот дунёси, ландшафтлари, тоғ жинси ва минерал хом ашё ресурслари каби ноёб бойликларни муқофаза қилиш ва рационал қўйдаланиш учун кенг миқёсда қар хил тадбирлар ишлаб чиқилмоқда.

Информацион-методик таъминот

- 1. Ушув-геологик амалий машғулотлар. Муҳидов А., Холматов А. ва б.. Умумий геологиядан методик кўрсатма, Тошкент, 1991й, ТДТУ**
- 2. Геологик хариталаш. Ахмаджанов М.А. ва бошқалар. Амалий машғулотлар., Тошкент 1990й., “Ушитувчи”**