

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚИШЛОҚ ВА СУВ
ХЎЖАЛИК ВАЗИРЛИГИ

АНДИЖОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ИНСТИТУТИ

АГРОНОМИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

ЎСИМЛИКЛАР ҲИМОЯСИ ВА КАРАНТИНИ
ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШИ

«ЎСИМЛИКЛАР ҲИМОЯСИ ВА КАРАНТИНИ»
КАФЕДРАСИ

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
факультет декани

«Химояга рухсат этаман» кафедра
мудир

доцент, З.БЎСТОНОВ
«___» _____ 2013 й

доцент, Қ.Х.ХУШВАҚТОВ
«___» _____ 2013 й

Агрономия факультети «Ўсимликлар химояси ва карантини»
таълим йўналиши 4-босқич 1-гуруҳ талабаси

ИРГАШЕВ ФАЗЛИДДИН нинг

У

БИТИРУВ МАЛАКАВИИ ИШИ

Мавзу: Избоскан тумани шароитида ғўза шираларини зарарини
аниқлаш.

Илмий рахбар:

доц. Қ.Х.Хушвақтов

Андижон - 2013 йил

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚИШЛОҚ ВА
СУВ ХЎЖАЛИК ВАЗИРЛИГИ

АНДИЖОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ИНСТИТУТИ

АГРОНОМИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

ЎСИМЛИКЛАР ҲИМОЯСИ ВА КАРАНТИНИ
ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШИ

Ўсимликлар химояси ва
карантини кафедраси

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
кафедра мудири

профессор А.Г.КОЖЕВНИКОВА

«___» _____ 2012 й

4-босқич 1- гуруҳ талабаси Иргашев Фазлиддин га
битирув малакавий ишини бажариш учун

ТОПШИРИК

1. «___» _____ 2012 й № ____ -Ст буйруқ билан тасдиқланган.
2. Мавзу: Избоскан тумани шароитида ғўза шираларини зарарини аниқлаш.
3. Битирув малакавий ишини тугатиш вақти «___» _____ 20__ йил.
4. Битирув малакавий ишини бажариш учун керакли маълумотлар: тупроқ иқлим шароити, об-ҳаво маълумоти, зарарли объект ривожланиши хусусиялари, натижалар.
5. Битирув малакавий ишини асосий бўлимлари: Кириш, адабиётлар шарҳи, тажриба ўтказиш услуби, жойи ва табиий иқлим шароити, тажриба ўтказиш услуби, тажриба ўтказиш жойи ва табиий иқлим шароити, ғўза агротехникаси, ғўза шираларини биологияси, тарқалиши, ривожланиши ва зарари, тажриба натижалари, тажриба майдонида ғўзани ўсиш ва ривожланиши, тажриба майдонида ўрганган этомофаглари ривожланиши динамикаси, тажриба майдонида ғўза шираларини ривожланиши динамикаси ва зарари, ғўза шираларига қариш уйғунлашган кураш чоралари, ғўза шираларига қариш қўлланилган агротехник курашни биологик самарадорлиги, тажриба натижаларини математик тахлили, агротехник курашни иқтисодий самарадорлиги хулоса ва таклифлар, фойдаланилган адабиётлар.
6. Жадваллар рўйхати: _____

7. Битирув малакавий ишининг режаси.

№	Битирув малакавий ишининг қисмлари	Асосий қисмни бажариш вақти	Текширувдан ўтганлик белгиси
1.	Кириш	1.04.2012	5.05.2012
2.	Адабиётлар шархи	2.05.2012	15.05.2012
3.	Тажриба ўтказиш услуги, жойи ва табиий иқлим шароити	20.04.2012	24.10.2012
4.	Тажриба ўтказиш услуги	20.04.2012	1.05.2012
5.	Тажриба ўтказиш жойи ва табиий иқлим шароити	5.03.2012	27.09.2012
6.	Ўза агротехникаси	30.04.2012	1.10.2012
7.	Ўза шираларини биологияси, тарқалиши, ривожланиши ва зарари	20.04.2012	15.08.2012
8.	Тажриба натижалари	20.04.2012	15.08.2012
9.	Тажриба майдонида ўзани ўсиш ва ривожланиши	30.04.2012	10.08.2012
10.	Тажриба майдонида ўрганган этомофагларни ривожланиш динамикаси	30.04.2012	10.08.2012
11.	Тажриба майдонида ўза шираларини ривожланиш динамикаси ва зарари	20.04.2012	30.04.2012
12.	Ўза шираларига қарши уйғунлашган кураш чоралари	28.10.2012	15.05.2013
13.	Ўза шираларига қарши қўлланилган агротехник курашни биологик самарадорлиги	4.05.2013	15.05.2013
14.	Тажриба натижаларини математик тахлили	5.05.2013	15.05.2013
15.	Агротехник курашни иқтисодий самарадорлиги	2.05.2012	15.05.2013
16.	Хулоса ва таклифлар	2.05.2012	15.05.2013
17.	Фойдаланилган адабиётлар рўйхати	1.04.2012	15.05.2013

8. Битирув малакавий иши бўйича маслаҳатчи(лар)

№	Бўлим мавзуси	Маслаҳатчи ўқитувчи ф.и.ш.	Имзо, Сана		
				топшириқ берилди	топшириқ бажарилди
1.					
2.					

Топириқ берилган вақти «__» ____20__ й

Илмий раҳбари: _____ доцент. Қ.Х.Хушвақтов

Талаба: _____ Ф.Иргашев

М У Н Д А Р И Ж А

бет

Кириш.	
1. Адабиётлар шархи.	
2. Тажриба ўтказиш услуби, жойи ва табиий иқлим шароити.	
2.1. Тажриба ўтказиш услуби.	
2.2. Тажриба ўтказиш жойи ва табиий иқлим шароити.	
3. Ёўза агротехникаси.	
4. Ёўза шираларини биологияси, тарқалиши, ривожланиши ва зарари.	
5. Тажриба натижалари.	
5.1. Тажриба майдонида ёўзани ўсиш ва ривожланиши.	
5.2. Тажриба майдонида ёўза шираларини ривожланиш динамикаси ва зарари.	
5.2.1. Тажриба майдонида ўрганган этомофагларни ривожланиш динамикаси.	
5.2.2. Ёўза шираларига қарши уйғунлашган кураш чоралари. .	
5.3. Ёўза шираларига қарши қўлланилган агротехник курашни биологик самарадорлиги.	
5.4. Тажриба натижаларини математик тахлили.	
5.5. Агротехник курашни иқтисодий самарадорлиги.	
Хулоса ва таклифлар.	
Фойдаланилган адабиётлар.	
Илова	

Р У Х С А Т Н О М А

Ўсимликлар ҳимояси ва карантини кафедраси “_____”
20__ йилдаги йиғилишида Агрономия факультети Ўсимликлар ҳимояси
ва карантини таълим йўналиши 4-босқич 1-гуруҳ талабаси _____
_____нинг

_____ мавзусидаги битирув малакавий иши кўриб
чиқилиб, муҳокама қилинди ва кафедра йиғилишининг № ____ қарорига
асосан у Якуний Давлат Аттестация Комиссияси ҳузурида ҳимоя қилишга
рухсат берилди.

Қарор аслига тўғри деб:

Кафедра мудири, доцент

Қ.Х.Хушвақтов

Р У Х С А Т Н О М А

Ўсимликлар ҳимояси ва карантини кафедраси “_____”
20__ йилдаги йиғилишида Агрономия факультети Ўсимликлар ҳимояси
ва карантини таълим йўналиши 4-босқич 1-гуруҳ талабаси _____
_____нинг

_____ мавзусидаги битирув малакавий иши кўриб
чиқилиб, муҳокама қилинди ва кафедра йиғилишининг № ____ қарорига
асосан у Якуний Давлат Аттестация Комиссияси ҳузурида ҳимоя қилишга
рухсат берилди.

Қарор аслига тўғри деб:

Кафедра мудири, доцент

Қ.Х.Хушвақтов

Андижон қишлоқ хўжалик институти Агрономия факультети
Ўсимликлар химояси ва карантини таълим йўналиши бўйича
битирувчиси _____нинг

битирув малакавий ишига

ТАҚРИЗ

Битирув малакавий иши мавзуси _____

Чизмалар сони _____ Тушунтириш ёзуви сони _____

Битирув малакавий ишининг бажарилишини топшириққа мос келиши

Битирув малакавий ишининг ҳар бир бўлимининг бажарилиши, битирувчи
томонидан фан, техника ва илғор иш усуллари қўлланиши

Битирув малакавий ишининг ижобий рўйхати ва тушунтириш ёзувининг
сифати _____

Битирув малакавий ишида йўл қўйилган камчиликлар _____

Битирувчининг умумий таълим ва умумтехника фанлари бўйича
тайёргарлигини баҳолаш (битирувчи билан мулоқот натижаси) _____

Битирув малакавий иши бўйича умумий мулоҳаза _____

Тақризчи _____

(имзо)

(Ф.И.Ш.)

(илмий унвони)

(даражаси)

(иш жойи ва лаовзими)

КИРИШ

Пахта мустақил Республикамизни миллий бойлиги ҳисобланади. Мамлакатимизни миллий даромадини 1/3 қисми пахтани ҳисобига яратилади. Бугунги кунда давлатимизни пахтачиликга оқилона ихтисослашувини сақлаб қолиш ихтисодиётимизни асосини ташкил этади. Ғўза экинини ички имкониятлари жуда каттадир. Агар бу экинини биологик талабаларини илмий асосланган деҳқончилик системасида амалга оширилса олинadиган пахта ҳосилдорлиги гектаридан 50-60 центнерга етиши мумкин. Қишлоқ хўжалик экинларидан юқори, сифатли маҳсулот етиштирмасдан туриб мамлакат аҳолисини озиқ – овқат маҳсулотлари билан таъминлаб бўлмайди. Пахта ҳам – ошёсидан иккиюздан ортиқ кенг истеъмол моллари ва техникабон маҳсулотлар тайёрланади. Ғўза зараркунандалар ва касалликлар билан қаттиқ шикастланadиган ўсимликлар қаторига киради.

Уни бир қатор зараркунандалар шикастлайдики уларга ўз вақтида кураш чораси қўлланилмаса ҳосилни 50-60 % гача едириб қўйиш мумкин.

Ғўзага бир неча турдаги ширалар зарар келтиради. Уларни ишда энг асосийлари қора беда шираси, полиз ёки ғўза шираси ва катта ғўза ширасидир. Кейинги йилларда бу зараркунандаларни ривожланиш динамикачи ва зарари кескин ўзгарди. Умуман ҳар бир шира алоҳида олганда ўзининг зарар келтириш вақтига эгадир. Шу сабабли уларга қарши ўз вақтида курашиш талаб этилади.

Бей – Биёнка (1971) маълумотида кўра собиқ иттифоқ бўйича, ғўза экиладиган районларда, ғўзада 2200 турдан ортиқ умуртқасиз ҳайвонлар шу жумладан 156 тур хашоратлар зарар келтиради. Бизни мустақил жумҳуриятимизда эса ғўза экиладиган майдонларда ғўза ўсиш ва ривожланиш даврида 214 турдан ортиқ зарарли хашоратлар ривожланади ва зарар келтиради. (Алимухаммедов ва бошқ. 1989). Кўпчилик олимларни фикрича ғўза, асосий зараркунандалар ҳисобига йил давомида 55-60 % ҳосилни йўқотади. Пахтакор хўжаликларда йилдан – йилга техника минерал ўғитлар ва ўсимликларни химоя қилувчи воситалар билан таъминлаш

яхшиланмоқда. Ўсимликларни химоя қилиш тадбирларини унумли ва самарали амалга ошириш ғўза хосилини зараркунанда ва касаликлардан сақлашни асосий омилларидан бири ҳисобланади.

Эндиликда ғўзани зараркунанда ва касалликлардан умумий химоя қилиш системаси ҳам тубдан ўзгармоқда. Бунда диққат – эътибор, табиатдаги фойдали хашоратларга қаратилмоқда. Уларни кўплаб биофабрикаларда кўпайтирилмоқда кўп йиллар давомида сурункасига зараркунандаларга қарши қўлланилган кимёвий воситалар табиатдаги турлар ўртасидаги мувозанатларни бузилишига сабаб бўлмоқда, табиатни ифлосланишига олиб келмоқда.

Хозирги пайтда зараркунандаларга қарши курашда уйғунлашган химоя усулига катта эътибор берилмоқда ва айрим хўжаликларда кенг қўлланилмоқда. Бу кураш усули жуда кенг маънога эга бўлиб барча кураш воситаларини керакли вақтида навбатлаб зараркунандаларни зарарлилик иқтисодий чегарасини ҳисобга олган ҳолда ишлатиш, табиатдаги фойдали хашоратларни сонини ҳисобга олган ҳолда кураш чораларини қўллаш каби омилларга эътибор беришга тўғри келади.

Уйғунлашган химоя услубида зараркунандаларни сонини камайтириш билан бирга табиатдаги фойдали хашоратларни кўпайишига ўсимликни соғлом ривожланиши шароит яратиб берилади. Кўпчилик олимларни фикрича зараркунандаларга қўлланиладиган ҳар қандай кураш воситаларини қўллаганда, уларни тўлиқ йўқотишни ўйламасдан, балким, уларни сонини камайтиришга эришмоқ лозимдир. Чунки зараркунандаларни йўқотсак, унинг табиий кушандалари ҳам йўқолиб кетади. Натижада табиатдаги табиий биоценоз бузилади. Шу нарсани алоҳида қайд этиш керакки она – табиатнинг ўзи ҳам эволюцион тараққиёт давомида бошқа мавжудодлар сингари хашоратлар оламида ҳам маълум мувозанат сақлайди.

Юқорида айтиб ўтганимиздек ҳозирги пайтда фақат ғўза далаларини ўзида 300 турга яқин хашоратлар борлиги аниқланган. Жуманов Б.Ж. (1989) фикрича шулардан 8-10 % гина ҳосилга зарар етказади, қолган 70-80

% зараркунандаларга киргин келтириб фақат улар хисобига яшовчилар хисобланади.

Кейинги йилларда жумхуриятимизда инсоннинг қишлоқ хўжалик фаолияти анча фаоллашди. Қишлоқ хўжаликда фойдаланаётган кимёвий воситалар тирик мавжудотга салбий таъсири қилмоқда. Тупроқга солинаётган ўғитлар миқдори жадал ошиб бормоқда. Ноорганик ўғитлар, захарли химикатларнинг кенг қўлланиши тупроқда ва кейинчалик ўсимликлар ва хайвонлардан олинадиган махсулотларда қўрғошин, симоб, фотор ва табиий радионуклендлар миқдорини ошиб боришига олиб келмоқда. Суғориладиган ер майдонларининг чексиз кўпйитиришсиёсати, пахтачиликда янгидан – янги рекордларда интилиш жумхуриятимизда экологик шароитни жуда мураккаблашувича олиб келади. Республика хўжаликлари ҳар йили 1,3-1,4 миллион тонна минерал ўғитлар ва 80-85 минг тонна ҳар хил пестицидларни ишлатади. Ўртача ҳар бир гектар суғориладиган майдонга 300-350 кг минерал ўғитлар ва 20-25 кг пестицидлар тўғри келади. Табиатдаги мувозанатни сақлаш учун авлод бор зараркунандаларни зарарлик даражасини билган ҳолда уларга керакли вақтда курашиш мақсадга мувофиқ бўлади. Юқоридагиларни ҳисобга олиб биз малакавий битирув ишимизда ғўза шираларини ривожланиш ва зарарини хабар бериш йўли билан ўрганган ҳолда уларга қарши табиатдаги мувозанатни бузилишни олдини олишни иложи борица экологик тоза кураш чораларини қўллашни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик. Бунда қуйидаги масалалар ўрганилди:

1. Шираларни ривожланиш динамикасини ўрганиш.
2. Ғўзани ўсиш ва ривожланишини ҳисобга олиш.
3. Шараларни зарарлилик даражасини ҳисобга олиш.
4. Қўлланилган кураш чораларини самарадорлигини аниқлаш.
5. Олинган маълумотлар асосида тавсиялар тайёрлаш.

1. АДАБИЁТЛАР ШАРХИ

Мустақил Ўзбекистонимиз шароитида ғўзага зарар келтирувчи 200 дан ортиқ зараркунандалар ичида етти тир ширалар борлиги аниқланган. Шулардан энг асосийлари учта бўлиб: 1. Беда ёки окация шираси (Ахис сроссивора Коч) 2 полиз ёки ғўза шираси (аҳпис госсйпии Глов) ва 3 катта ғўза шираси (Асйр тҳосипҳон госсйпии мордв) (Алимухамедов ва бошқалар 1986).

Ширалар ғўза чинбарг чиқаргандан то ҳосил йиғиб олгунга қадар ғўзада ривожланади ва зарар келтиради. Улар ўсимлик соқларини сўриб зарар келтиради, натижада ўсимлик ўсишдан ва ривожланишдан тўхтади, барглар бужмайиб тукилади ва охириги ҳосилдорлик кескин камаяди.

Агар ўз вақтида шираларга қарши кураш чоралари олиб борилмаса, улар ғўза ҳосилдорлигини 30-50 % гача, айрим ҳолларда ёш ниҳолларни умуман йўқотишга олиб келади.

(Яхонтов, 1931, Довлетшина 1953, Норзиқулов 1981, Кан А.А. 1988, Хушвақтов 1994). Ҳозирги пайтда кўпчилик олимлар томонидан шираларни биологияси, ривожланиш динамикаси, систематикаси яхши ўрганилмагандир (Невский 1929, Давлетшена, Журовскал 1953, Ходосиевич 1978, Нарзиқилов 1986, Кан ва бошқалар 1994).

Шираларни зарарлик даражаси, уларни ўсимликда сони ва ўсимликка тушган вақти ҳисобланиб охириги натижа ҳосилдорликни ўзгариши билан аниқланади. Шираларни зарарлик даражаси кўпчилик олимлар томонидан ўрганилгандир (Коубукий, 1934, Курдюков 1979, Норзиқулов 1985, Мамедова 1986, Умаров ва бошқалар 1991 Хушвақтов 1994).

Ҳозирги пайтда Ўзбекистонда шираларни зарарлик иқтисодий чегараси (ЗИЧ) 100 баргда 25-30 дона шира ёки ширалар ўсимликда 3-5 % терқолган бўлганда ҳисобланади. (Алимухаммедов ва бошқалар 1982).

Хушвақтов Қ.Х. (1994) таъкидлашича ғўзадаги шираларни зарарлик иқтисодий чегараси (ЗИЧ) қуйдагича. Ғўза чинбарг чиқаргандан то шонаси давригача 1 ўсимликда 12-18 дона бир баргда 1,0-1,5 дона шира бўлганда,

ғўза гуллаш ва хосил туғиш даврида 1 ўсимликда 25 ва ундан ортиқ шира ёки 1 баргда 1,0-1,5 дона шира бўлганда кураш чораси қўллаш тавсия этилади.

В.П. Невский (1942) маълумот беришича Ўзбекистон шароитида бўлган ўсимликларда яшаб ривожланиб зарар келтиради. Беда шираси ғўзага асосан апрель – июнь ойларда катта зарар келтиради. Улар зарар келтирган ўсимлик ўсиш ва ривожланишдан тўхтади.

Давлетшина, Аванесова (1980) кузатишлари шуни кўрсатадики беда шираси 20-25⁰С харорат ва 60-75 % нисбий намликда жуда яхши ривожланиди, ғўзада беда шираси 7-авлоди ривожланади ва зарар келтиради. Умуман мавсум давомида 10-18 авлод бериб ривожланади. Юқоридагилардан кўриниб турибдики беда шираси ғўзада кўп яшамайди. Лекин шу даврда ғўзага катта зарар келтириши мумкин.

Полиз шираси биринчи бўлиб 1855 йилда шимолий Америкада мустақил тур сифатида топишган. Ўрта осияда эса 1910 йил В.И. Воселев томонидан биринчи бўлиб аниқланган. Полиз шираси ҳаммахўр зараркунанда ҳисобланиб 25-ботиқ оилага мансуб бўлган 46 турдан ортиқ ўсимликда ривожланади. (Давлетшина 1952). Полиз шираси ғўза униб чиқандан хосил йиғиб олингунча кучли зарар келтиради. У биринчи: ғўзани ёш ниҳолларига зарар келтиради, иккинчидан ёзги дварда ғўза соқларини сўриш натижасида хосил органларини (шоналар, гуллар, кўсаклар) ни тўкилишига олиб келади, учинчидан: кузда эса ширалар ажратган суюқлик таъсирида тўла ифлосланади ва сифати бузилади. Ғўза катта шираси ширалар ичида энг каттаси ҳисобланади. Бу ширани актив ривожланиши ғўзани ёппасига гуллаш даврига тўғри келади. Кўпчилик олимларни таъкидлашича, ғўза гуллаш даврида, ғўза катта шираси зарар келтириши натижасида гулларини чангланиш хусусияти йўқолади. (Степануев 1949, Норзиқулов 1954). Степануев (1949) таъкидлашича ғўза катта шираси 23⁰ С харорат ва 58 % нисбий намликда жуда яхши ривожланади. Ғўза катта шираси зарар келтириш натижасида шоналар тўкилиб кетади.

Кўпчилик олимларни кузатишларига кўра ғўза далаларида шираларни 40 дан ортиқ таъбий кушандалари мавжудир. (Девлетшина 1972, Алимухаммедов, Хўжаев 1978). Алимухаммедов С.Н. Хўжаев Ш.Т. (1991) таъкидлашича Тошкент вилояти шароитида ғўзани энг кўп полиз шираси (75-80%), кейин беда шираси (15-20 %) ва нихоят катта ғўза шираси (5-10 %) зарарлайди.

Хозирги пайтда бу шираларга қарши замонавий агротехник, биологик ва кимёвий кураш чоралари қўлланилмоқда. Агротехник кураш ширалар сонини камайтиришда муҳим ўрин тутди. Хозирда ғўзани фосфорли ва калилий ўғитлар билан барг сотхидан озиқлантириш ғўза шираларини йўқотишда энг самарали кураш усулларида бири ҳисобланади, бу йўналиш бўйича ҳозир кўпчилик олимлар изланишлар олиб бормоқда.

Кўпчилик олимларни таъкидлашича фосфорли ўғитлар ёрдамида ғўзани баргидан озиқлантириш натижасида ширалар сони 2-маротаба камаяди, (Юзбшян, Хомраев 1982, Хомраев 1991, Хушвақтов 1994, Насриддинов 1994) Мирзалиева Х.Р. (1986) таъкидлашича ғўза шонаси даврида лаборатория шароитида кўпайтирилган олтинкўзни етук хашоратидан шираларга қарши 1:100 нисбатида қўллаш жуда яхши самара беради.

А.А. Кан, Хушвақтов К. (1994) кузатишлари шуни кўрсатадики ғўза шираларига қарши қўлланиладиган кураш усулини ҳамиша такомиллаштириб бориш керак бунда уйғунлашган кураш усулидан фойдаланиш энг асосий ва самарали ҳисобланади.

Юқорида адабиётлар шахридан кўриниб турибдики ғўза шираларини биологияси ривожланиши, уларга қарши қўлланилган кураш чоралари кўпчилик олимлар томонидан яхши ўрганилгандир. Биз ўзимизни битирув ишимизда хўжалиги шароитида ғўза шираларини ривожланиш динамикасини ўрганиб уларга қарши уйғунлашган кураш системасини қўллашни мақсад қилиб олдик. Айниқса фосфорли ўғитлар билан ўсимликни барг сотхидан озиқлантириб шираларга қарши курашиш ва уни самарадорлигини ўрганишни тажриба йўли билан исботлашга ҳаракат қилдик.

2.ТАЖРИБА ЎТКАЗИШ УСЛУБИ, ЖОЙИ ВА ТАБИИЙ ИҚЛИМ ШАРОИТИ

2.1. ТАЖРИБА ЎТКАЗИШ УСЛУБИ

Биз тажрибамизни Избоскан туманидаги фермер хўжаликларида олиб бордик. Тажрибани ўтказишдан мақсад ғўза шираларини ривожланиши, зарари ва уларга қарши кураш чораларини самарадорлигини ўрганишдан иборатдир. Дала тажрибасини қуйидаги тизимда олиб бордик.

жадвал - 2.1.1

Вариантлар	Тажриба режаси
I Назорат	Вўза шираларига қарши кураш чораси амалга оширилмади.
II Тажриба	Вўза шираларига қарши 10 % аммафос (22 кг/га) суспензияси билан қарши курашилди.

Тажрибамиз 4- қайтариқ 2- вариантдан иборат бўлиб ғўзани Андижон – 35 навида 90 х 10 х 1 схемада олиб борилди.

Тажрибани умумий майдони 5260 м² ни ташкил қилиб, делянкалар узунлиги 100 м дан бўлиб, эни 7,2 м ни ташкил этди. Хар бир делянкани умумий майдони 720 м² ни ташкил этди.

Хар бир вариантдан ҳисоблаш учун 100 тадан ўсимлик танлаб олинди ва шу ўсимликлардан хар 10 кунда феналогик кузатишлар олиб борилди. Барча феналогик кузатишлар ЎЗУХҚИТИ услуги бўйича олиб борилди.

Шираларни ривожланиш динамикаси ва зарарини хар 10 кунда танлаб олинган ўсимликлардан кузатилиб турилади. Ўсимликни ўсиш ва ривожланишини хар ойни 1-3 кунлари ҳисоблаб турилади. Тажрибада агротехник кураш чораси олинган маълумотлар асосида олиб борилди.

Қўлланилган агротехник воситани биологик самарадорлиги зараркунандаларни яъни шираларни қўлланиладиган олдинги ва кейинги сонига қараб назорат вариантыга солиштириб Гендирсонтитон формуласи асосида аниқланади.

Бу қуйидагича:

$$M_{\%} = (1 \frac{Ta}{Ca} \times \frac{Cв}{Tв}) \times 100\%$$

Бунда; М %-биологик самарадорлик

Та–тажриба майдонида ишлаб берилгандан кейинги
зараркурандалар сони.

Тв–тажриба майдонида ишлаб берилгандан олдинги
зараркурандалар сони.

Са–назорат вариантда ишлаб берилгандан кейинги
зараркурандалар сони.

Св–назорат вариантда ишлаб берилгандан олдинги
зараркурандалар сони.

Қўланилган агротехник воситаларни иқтисодий самарадорлиги эса
олинган қўшимча хосил хисобига аниқланади.

Тажриба натижаларини математик таҳлил Доспеков (1985) услуби
бўйича аниқланади.

2.2. Тажриба майдонини таъбий иқлим шароити

Избоскан тумани “Чўнгбоғич элита” фермер хўжалиги 2006 йил
ташкил топган. Хўжалик асосан пахтачиликка ихтисослашган бўлиб
ғаллачилик, сабзавотчилик ҳам салмоқли ўрин тутди. Хўжаликни умумий ер
майдони 66,0 гектар бўлиб шундан 33 гектари пахта 30,0 гектар буғдой,
қолгани сабзавотдир.

Хўжаликда йиллик ёғингарчилик 280 мм га боради. Ўртача йиллик
харорат қишда январь ойида 10-13⁰ С совуқни ёзда эса июнь ойида ўртача 36-
38⁰ С иссиқни ташкил этади. Самарали харорат даври давомийлиги 145-160
куни ташкил қилиб самарали харорат йиғиндиси 3400-3500⁰ С ни ташкил
қилади. Хўжаликда асосан суғориб деҳқончилик қилинади. Хўжаликни
тупроғи ўтлоқи бўз тупроқ бўлиб, деҳқончилик қилиш учун жуда қулайдир.

Суғориладиган ерлардаги тупроқларни механик таркиби енгил бўлиб кам шўрланган кучсиз кислотали нейтрал мухитга эга.

Чиринди миқдори хайдов қатламида 0.8-1.0 % ни азот миқдори 0,06-0,08 % ни ҳаракатчан фосфор миқдори 1,0-1,3 % ни калий миқдори эса 0,4-0,6 % ни ташкил қилади. Ер ости сувлари 1,5-2 метрни ташкил этади. Хўжаликда экинлар парваришида органик ва минерал ўғитлардан самарали фойдаланишни тақазо этади. Массивда жами 6 та фермер бўлиб улар асосан пахта + буғдой алмашлаб экишга мослаштирилган. Бундан ташқари чорва учун буғдойдан бўшаган ерларга оралиқ экинлар ҳам экиб парвариш қилинади.

3. Ғўза агротехникаси

Пахтадан юқори ва сифатли хосил олишда ўсимликнинг ҳар бир фазасида ва босқичида унга керак бўладиган шароитни яратиб бериш муҳимдир. Чунки ўсимликнинг ўсиши ва ривожланиши ана шу шароитга боғлиқ. Ғўза ўсимлиги ўртача 135-145 кун яшайди шу даврда бир –бири билан узвий боғланган жуда кўп жараёнларни бошдан кечиради. Шунинг учун пахта етиштиришда самарали иш олиб бориш ҳозирги куннинг асосий вазифасидир. Пахтачиликда юқори ва мўл – кўл хосил етиштиришда қуйидаги тадбирларни амалга ошириш талаб қилинади. Тупроқ унумдорлигини ошириш, органик уғитдан шудгор олдида солиш, хайдовдан олдин чуқир юмшатгичлар ёрдамида хайдов қатлами остига ўғитлар солиб юмшати, кузги шудгорни ноябрь ойида ўтказиш, бегона ўтларга қарши гербицидлардан самарали фойдаланиш, ўғитлардан ўсимлик энг кўп талаб қилган фазада фойдаланишни билиш уларни тупроқ намлиги етарли бўлганида солиш, микро ўғитлардан фойдаланиш агрохимкروتграммасини тузиш шу орқали ўсимликнинг унга бўлган талабани аниқлаш, тупроқ намлигини ва ўсимликни сув билан таъминланишини доимо кузатиб туриш, хашорат ва касалликларга қарши комплекс усулда кураш олиб бориш, энг чидамили намларини экиш, янги химявий ўстирувчи моддаларни ўсимликка бериш орқали унинг ўсиш ва ривожланишини бошқариш билан хосилдорликни ошириш, атроф – муҳитни зарарлайдиган инсон ва табиатга хавфли бўлмаган дефолиантларни топиш ва ишлатиш, хосилни майдонда териб олишни уюштириш уни оптимал шароитда сақлаш ва ўз вақтида қайта ишлашни таъминлаш.

Пахта етиштириш учун далалар структурасини экиладиган уруғлар сифатини ва навини тупроқнинг озик моддаларига макро ва микро элементлар билан таъминланганлик даражасини тупроқнинг агрохимия характеристикасини далаларнинг бегона ўтлар ва зараркунандалар билан қандай даражада ифлосланганлиги хайдов қатламидаги кам миқдори ва сув билан таъминланиш даражасини тупроқни қайси усулда ишлашини ҳар бир

майдонга мувофиқ қиладиган кўчат калинлигини ва бошқа омилларни ҳисобга олиш зарур.

Ѓўза жумхуриятимиз тупроқларида яхши ўсиб юқори ва сифатли ҳосил беради.

Ѓўза шўрга чидамли шунинг учун у хлор миқдори 0,006 % ҳатто ундан юқори бўлса ҳам ўсаверади лекин интенсив ривожланмайди. Шунингдек кумли, тош – шағалитупроқларда яхши ўсмайди. Бедадан чикган гўнг ишлатилган ерлар ғўза учун энг қулайдир. Ѓўзанинг иссиқликка бўлан талаби ҳароратга нисбатан ғўза юқори мақбул ва босм муносабатда бўлади. Яъни иссиқлик 25-35 даражагача бўлганда фотосинтез яхши ўтади. Ҳарорат 37 даражадан ошганда бу жараён секинлашади.

Ѓўзанинг сувга бўлган талаби тупроқ намлиги дала нам сифими 55 % бўлганда ғўзанинг ўсиш ва ривожланиши сусаяди, намлиги 65-75 бўлганда эса ўсув ва мева органлари ўзаро мутаносиб равишда ўсади маҳсулдорлик етади. Ѓўза турли суғориш схемалари (0-2-1, 1:3:1, 2-4-2, 3-5-2, 0-1-1 ва бошқа) ва сув бериш меъёрлари билан (3200-5000-8000 м³ га) бошқа экинлардан фарқланади.

Ѓўзанинг ёруғлик бўлган талаби. Ѓўза ниятда ёруғликка талабгандир. Шунинг учун ҳам ғўза барглари доимо қуёшга қараб йўналган бўлади. Агарда биз яхши ёритилган ва дарахт соясида ўсган ўсимликларни бири-бирига кўриниши билан бир-биридан тубдан фарқ қилишини гувоҳи бўламиз.

Умуман чигит экинидан кўсаклар пишгунга қадар ўрта толали навлари учун 1800-2000 даражада фойдали ҳарорат керак, ингичка толали навлар учун эса 2000-2200⁰ фойдали ҳарорат керак бўлади. Ўрта осие шароитида ғўзанинг бу тури ер ўсимлик қисмлари билан бирга 1 т чигитли пахта етиштириш учун агротехника нуқтаи назаридан муҳим бўлган озик элементлардан тахминан 50 кг азот, 10 кг фосфор 50 кг калий бўлиши керак.

Бошқа элементлардан: ўртача ҳисобда 60 кг калий, 10 кг олтингургурт, 10 магний ва тушунча натрий 2 кг гача темир 200 г гача бор, 50г дан мис, Б.В.

Рогельский маълумоти бўйича 1.5 кг атрофида хлор бўлиши керак. С.А. Кудрин ўрта толали ғўзалари ўзининг ер устки вегетатив массаси билан бирга 1 т пахта ҳосил қилиши учун 30-70 кг азот 10-20 кг гача фосфор ва 30-80 гача калий талаб қилиниши фазаларига қараб ердан азот ва фосфор моддасини қуйидаги миқдорда олади. Чигит униб чиққандан шоналагунча 7 %, фосфор 5 %, шоналагандан гуллагунча азот 46 % фосфор 35 % гуллагандан пиша бошлагунча азот 44 % фосфор 50 % пиша бошлагандан пишиш даврининг охиригача азот 3 % фосфор 10 % шундай қилиб ғўзанинг нормал ўсиши ривожланиши ҳамда ундан юқори сифатли мўл пахта ҳосили яратиши учун озиқ моддаларнинг тегишли нисбатда бўлиши ҳам нихоятда муҳимдир. Чигитлар экиш олдида дориллаб экиш ишлари 8-10 кунда тамомланиши керак ҳаво ҳарорати 12-14⁰ экиш учун гектарига туксизгичини сарфи 25-30 кг/га тукли бўлса 60-70 кг/га ни ташкил этиши керак. Экиш чуқурлиги 3-4 см дан 4-5 см гача етказилиши лозим. Ҳозирда ундан кўплаб хўжаликлар чигитни плёнка остига екмолдалар. Бу эса мўл – кўл сифатли ҳосил олишни таъминлайди. Лекин кўл меҳнатини кўп талаб қилади. Шу билан бирга кутилган натижани яъни ҳосилни эрта ва сифатли йиғиштириб олиш имконини беради.

Ўғитлаш ишлари тупроқ унумдорлиги олинадиган ҳосил миқдорига ернинг шўрланганлик даражаси озуқалари ва биологиясига қараб 1 гектаридан чиқиб кетадиган элементларни ҳисобга олган ҳолда режалаштирилади. Ёўза турларининг тез ривожланиши ва кейинчалик мўл пахта ҳосили етиштирилишини таъминлашининг асосий шартларидан бири нихолларни яғаналашдир. Яғаналаш пайтида бақувват ва соғлом ўсимликлар қолдирилиб заиф ривожланаётганлари олиб ташланади. Ёўзанинг усув даврида бир неча бор бегона ўтларни йўқотиш учун чопиқ қилишга тўғри келади. Ўтоқ ва чопиқ қилиш ишлари усув даврининг бошларида култивациядан сўнг бажарилганда яхши самара беради ва бунда кам меҳнат сафланади. Ёўзанинг ўсув даврида 2-3 марта ўтоқ қилинади.

Ѓўзани суғориш унинг суғориш муддатлари ва талабига биновн ривожланиши фазаларига қараб ривожлантирилади ва амалга оширилади. Агар тупроқ яхши ва қумоқ бўлса гуллагунча 500-600 м³/га гуллаш мевалашда 700-800 м³/га ўртача бўз тупроқларда гуллагунч 600-700 м³/га гуллаш мевалашда 800 м³/га сув берилади.

Ѓўза зараркунандалар томонидан энг кўп зарар кўрадиган ўсимликлардан биридир. Ѓўза 200 турдан ортиқ зараркунанда борлиги аниқланган улардан кўсак курти кародрина кўп курт тунлаши, таъмаки трипкоси, ўргимчаккана ва ширалар кўплаб учрайди. Шунингдек хавфли касалликлардан илдиз чириши гоммоз вилт, макроспородиоз кабилар пахта далаларида кўп содир бўлади. Шунинг учун ҳосилни химоя қилишни табақалаштирилган усулдан фойдаланиши мақсадга мувофиқдир. Эрта ва мўл ҳосил етиштириш технологиясида ғўзани чеканка қилиш муҳим агротехник усуллардан бири ҳисобланади бунда ғўзанинг бошпоёси учлари ва ёнланма усув шохлари чиканка қилинади. Чунал озиқ элементлари сув билан бирга ҳосил шохларига қараганда уларга кўпроқ ўтади. Чиканкадан кейин озиқ моддалар юқорига ўсув шохлари ўртача ҳосил органларига йўқолади. Чеканка қилиш ҳосил тўплашга имконият яратади, ҳосилдорликни оширади ва пахта сифатини сифатини яхшилайдди.

Ѓўзанинг теримга тайёрлашда ососий агротехник тадбирлардан бири дефляциядир. Бу кўсакларни очилишни тезлаштиради. Тола миқдорини оширади. Ҳосилни ўз вақтида териб олишни таъминлайди. Йиғим терим ишлари тугагандан кейин далалар ғўзапоядан тозаланади.

4. ҒЎЗА ШИРАЛАРИНИ БИОЛОГИЯСИ, ТАРҚАЛИШИ, РИВОЖЛАНИШИ ВА ЗАРАРИ

Ғўзага ўсимлик шираларининг бир неча тури зарар етказади. Булар орасида беда ёки оқацил шираси ғўза ёки полиз шираси ва катта ғўза шираси хавфлидир. Ўсимлик ширалари баргларни суюқликларини суради. Бунда оқибатида поя ва илдизлардаги запас углеводлар миқдори кескин камайиб кетади. Қаттиқ зарарланган баргларнинг шакли ўзгаради ва бужмайиб қолади. Бундай ўсимликлар жуда суст ўсади. Зарарланган ўсимликларда ҳосил 30-51 % гача камайиши мумкин. Ўсимлик ширалари – *Homoptera* туркумига *Aphididae* оиласига мансуб сўрувчи майда хашорат бўлиб чала ўзгариб ривожланади.

Ўсимлик ширалари шакли жihatдан бир неча хил бўлади, чунки булар ўртасида тирик туғувчи қанотсиз урғочилари тухум қўядиган қанотсиз урғочилари қанотли эркеклар бор. Ширалар ҳароратга қараб 20-26 та беда бити эса 12-15 тагача авлод беради.

Урғочилари ёзда 18 кун яшайди ва 150 тагача личинка туғади. Личинкалар ривожланиб тўрт марта гуллайди ва беш ёшни кечиради. Оз – оздан ёгин тушиб турадиган сернам қўклам об – хавоси ўсимлик битларининг ривожланишига ёрдам беради. Аммо шовуллаб ёққан кучли ёмғирлар уларни йўқотади. Об – хавоси қуруқ ёқори ҳароратли районлардан ўсимлик ширалари қўплаб ривожланмайди. Яшаш шароити ёмонлашганда оиқ етишлганда шунингдек асосий ва оралиқ озиқбop ўсимликлар алмашганида битлар жойдан – жойга кўчади. Яшаш жойи алмашганда учуғланган тухумларасосий ўсимликларда қишлайди. Улардан бир – иккита (қанотсиз) ширалар авлоди ривожланади. Иккинчи – учинчи авлодларда қанотсизлар орасида тирик туғувчи қанотли урғочилари пайдо бўлиб улар оралиқ экинларга учиб ўтиб, бир қанча қанотсиз шира авлодларини бера бошлайди. Битларни йўқотадиган афидофог – йиртқичлар ва паразитлардан

46 та тури рўйхатга олинган. Булар жуда катта ахамиятга эга улар баъзан шираларнинг 90 % гача йўқотади.

Беда ва акацил шираси – (*Aphis czeeschovora koch*) Хаммахор зараркунанда бўлиб ўрта осиеда кенг тарқалган.

Акацил шираси ғўзадан бошқа беда оқ акацил ерёнғоқ эспарует вика, бурчоқ нўхат шунингдек полиз экинларига жами 52 тур ўсимликка зарар етказди.

Ўсимлик биринчи ғўзага май – июнь ойларида энг кўп зарар етказиу ғўзанинг ўсиш ва ривожланишини сусайтиради.

Тирик туғувчи урғочисининг танаси йилтроқ қора бўлиб бўйи 1,3-2,2 мм га боради. Мўйлови танасининг бўйидан каттароқ сариқ тусли қорамтир – кўнғир йўллари ва думи қорамтр кўнғир рангли. Тухум қўядиган урғўчилари тўқ тусли бўлиб хамма сегментларда қопқора бўртиклари бор. Эркакни қанотли қора бўлади. Личинкаси кўнғир бўлади, акация шираси бедада ёки акацияда тухум фазасида қишлайди.

Эрта кўкламда беда – пояда пайдо бўлган шира гудаларини кўриш мумкин. Беда шираси беда дағаллашгунга қадар бедада ривожланади кейинчалик бошқа ўсимликларга ўтади.

Беда шираси ғўзада бир ой отрофида яшайди. Аммо ана шу оз вақтида хам улар ғўзага кучли зарар келтириш мумкин. Қанот пайдо қилган ширалар беда пояга учиб ўтади ва кеч кузгача ўсимликнинг илдиз бўғзида бўлади. Аммо озиқланиш шароити ноқулай бўлганлиги учун кўп ўғит олмайди.

Полиз шираси – (*Aphis gossypii Glov*) хоммохур зараркунанда бўлиб ўрта ўсиёда кенг тарқалган. Ўсимликларнинг 46 та турига шикаст етказди. Кўпроқ ғўза, полиз экинлари ерёнғўқ қарам, кунжут ва хоказоларга зарар етказди. Қанотсиз ширанинг танаси тухум шаклида бўлиб бўйи 1,25-2,1 мм гача боради. Ранги кўкиш ёки сариқдан тўқ яшилгача бахор ва ёз ойларида аксари ўтсимон яшил ва сарғиш тусларда учрайди. Кузда эса тўқ яшил рангда бўлади. Тирик туғувчи урғочиларининг боши кўкраги оёқларининг учлари ва

шира сўрадиган найчалари қора тусда учрайди қанотли шираларни шира найчалари қанотсизларникига нисбатан қалтироқ бўлади.

Полиз шираси бегона ўтларда асосан тугмачагул каби ўсимликларда личинка ва етук хашорат холида кишлайди.

Полиз шираси апрель ойида кишлаб чиқади ва дастлабки вақтда бегона ўтларда учрайди май ойининг бошида ғўзага полиз экинларига учиб ўтади. Май – июнь ва сентябрь – октябрь ойларида ёппасига учиб кўпаяди.

Катта ғўза шираси – (*Acyzthis gossypii* Mordy) барча пахтакор районларда кенг тарқалган. У ғўзадан ташқари мош, ловияги бегона ўтлардан янтоқча зарар келтиради. Катта ғўза шираси анча йирик хашорат етук шира тонасининг узунлиги 3,5-4,5 мм га боради. Ривожланишнинг хамма босқичлари қизил оёқ учлари қўнғир тусли бўлади. Оёқлари ва шира найчалари жуда узун кейингисиники қорайиб 1,7 мм га етади.

Қанотлилари қанотсизлардан кичикроқ бўлади. Катта ғўза шираси ғўзапояда ва янтоқзорда тухум фазасида кишлайди. У боҳорда майнинг иккинчи ярмида ғўзапояда ривожланади ва ғўза майдонларига кўчиб ўтади. Катта ғўза шираси йил давомида тўлиқ ривожланиш даврини ўтайди ёзда портегенетик усулда кўпаяди кузда эса битта жинсий бўғин натижасида тухум кўяди.

Ќўза шираларини зарарлилик даражаси

Юқоридагилардан кўриниб турибдики ғўза ўсиш ривожланиш даврида асосан 3-турдаги ширалар (беда, полиз ва катта ғўза) зарар келтиради. Бу шираларни ғўза чинбарг чиқарганда то хосилни йиғиштириб олгунга қадар ғўза майдонларида учратиш мумкин.

Хушвақтов Қ.Х. (1994) таъкидлашича ғўза шоналаш давригача ширалар билан зарарланганда ғўзани ўсиш ва ривожланиши сусаяди барглар бужмаяди натижада 9,3 ц/га хосил йўқотилади. Бизга маълумки шираларни зарарлик даражасини ҳисобга олиш бошқа зараркунандаларга қараганда анча қийинроқдир. Шираларни зарарлик даражаси уларни ўсимликдаги олиб ўхирги натижа хосил йўқотилганлиги билан аниқланади. Ҳозирги вақтда

Ўзбекистонда шароитида шираларни зарарлик иқтисодий чегараси (ЗИЧ) ўсимлик 2-балли шкалада зарарланиши қабул қилинган. Шунинг учун шираларни зарарлик даражасини ҳисобга олмасак улар ўсимликни каттик зарарлаши мумкин. Ширалар билан зарарланган ғўзалар баҳорда ўсиш ривожланишдан тўхтайти барглар бужмайиб қолади. Ғўза ҳосил органлари тўкилиб кетади. Кузда эса ширалор ажратган суюқликлар таъсирида пахта толаси ифлосланади.

Кўпчилик олимларни таъкидлашича ғўзани энг кўп полиз шираси (75-80%) кейин беда шираси (15-20%) ва нихоят катта ғўза шираси (5-10%) зарарлайди. Умуман булардан кўриб турибдики шираларни зарарлилик хусусияти жуда катта экан. Уларни зарарлик иқтисодий чегарасини (ЗИЧ) ҳисобга олган ҳолда уларга ўз вақтида уйғунлашган химоя чорасини қўллаш биринчидан табиатдаги мувозанатни тўғрилаш иккинчидан эса пахта ҳосилини нобудгарчилиқни олдини олишда катта аҳамиятга эга. Юқоридагилардан келиб чиқиб биз ғўза шираларига қарши экологик тоза ва орзон кураш чорасини қўллаш мақул деб ҳисоблаймиз.

Мен кейинги изланишларимда шуларга қарши агротехник кураш яъни аммофосни 10 % эритмаси билан уни самарадорлигини аниқлашни ўз олдимга мақсад қилиб қўйдим.

5. ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ

5.1. Тажриба майдонида ғўзани ўсиш ва ривожланиши

Зарарли ва фойдали хашоратларни ривожланиши ғўза ривожланиши билан кескин боғлиқдир. Шунинг учун ғўзани ўсиш ривожланиши ҳисобга олмай туриб хашоратларни ривожланишини ўргана олмаймиз. Тажриба майдонида чигит экиш 10-апрель куни амалга оширилди. 7-10 кун ўтгандан кейин ғўза униб чиқа бошлади. Тажриба майдонида ғўзани ўсиш ва ривожланиши қуйидаги жадвалда кўрсатилган. Бугунги шоналар май ойининг 2-ўн кунлигида пайдо бўла бошлади. Июль ойини 1-чи ўн кунлигида шоналар сони юқори чегарага етди. Кейин улар ўз ўрнини гулларга бера бошлайди. Бу давирда 1 ўсимликда ўртача 20-22 дона шона борлиги кузатилди.

Гуллар ҳосил бўлиши июнь ойининг 2-чи ўн кунлигидан бошланди. Гуллар ҳосил бўлишини юқори чегараси июль ойининг 1-чи ўн кунлигига тўғри келди.

Биринчи кўсаклар июль ойининг 1-чи ўн кунлигидан пайдо бўла бошлайди. Кўсаклар тугиш сентябрь ойининг охиригачяа давом этди. Аммо асосий ҳосил органлари июль ва август ойларида пайдо бўлди.

Тажриба майдонида ғўзани ўсиш ва ривожланиши
(1-ўсимлик ҳисобида)

жадвал 5.1.1.

Кузатилган кунлар	Ўсимликни бўйи (см)		Шоналар сони (дона)		Гуллар сони (дона)		Кўсаклар сони (дона)	
	Назорат	Тажриба (агротехник кураш)	Назорат	Тажриба (агротехник кураш)	Назорат	Тажриба (агротехник кураш)	Назорат	Тажриба (агротехник кураш)
1 V	14	16	9	11	-	-	-	-
1 VI	34	34	14	16	24	3	-	-
1 VII	71	68	20	22	8	10	4	5
1 VIII	90	89	8	10	9	10	10	9
1 IX	-		5	4	4	5	11,0	12,5

Бизнинг шароитимизда 1-чи кўсаклар август ойининг 1-ўн кунлигида очила бошлайди ва августни 3-чи ўн кунлигида 70-80% кўсаклар очилиб бўлади. Биринчи йиғим-теримга август ойининг охирида киришилди.

5.2. Ғўза шираларини ривожланиш динамикаси

Бизнинг шароитимизда ғўза ширалари сони кам бўлсада ғўза ўсишдан то ҳосил йиғиб олгунча ривожланиб зарар келтиради. Ғўза шираларини ривожланиш динамикаси қуйидаги жадвалда кўрсатилган. Кузатишларимиз шуни кўрсатадики ғўза шираларидан биринчи бўлиб беда шираси зарар келтира бошлайди. Шу даврда у билан биргаликда полиз шираси ҳам ривожланиб зарар келтира бошлади. Ғўза шоналаш даврига келганда бу ширалар сони бир ўсимликда 35-38 донагача етди. Ғўза гуллаш даврига келиб ширалар сони камайиб бориб беда шираси умуман йўқолиб кетди. Ғўза ҳосил тугиш даврига келиб полиз шираси билан биргаликда ғўза катта шираси ҳам зарар келтира бошлади. Бу даврда ширалар сони бир ўсимликда

20-24 донагача етилганлиги аниқланди. Булардан биз шундай хулосага келдикки :

Вўза шираларини ривожланиш динамикаси
(1-ўсимлик хисобида дона)

жадвал 5.2.1

Кузатиш кунлари	Назорат ҳеч қанақа кураш олиб борилмаган	Тажриба агротехник кураш аммофос 10% ли
	Беда, полиз ва катта ғўза шираси	Беда, полиз ва катта ғўза шираси
10. V	4,5	5,0
20. V	20,0	18,0
1. VI	35,0	38,0
10. VI	31,0	05,0
20. VI	36,0	4,0
1. VII	20,0	14,0
10. VII	14,0	5,0
20. VII	6,0	5,0
1.VIII	4,0	4,0
10.VIII	11,0	7,0
20.VIII	10,0	5,0
1.IX	18,0	10,0

Вўза ўсиб ривожланиб то ҳосил йиғиб олгунга қадар ғўза ширалари бир-бирини ўрнини алмашиб ривожланади ва зарар келтиради. Шуларни ҳисобга олиб биз тажрибамизни 2-чи вариантида ғўза шираларини сонини чегаралаш учун ғўза шоналаш даврида ғўза шираларига қарши агротехник кураш 10% ли аммофосни пуркалди.

5.2.1. Тажриба майдонида ўрганган энтомофаглари ривожланиш динамикаси

Табиий энтомофаглар ғўза шираларини сонини камайтиришда катта аҳамиятга эгадир. Тажриба майдонимизда шираларни асосий энтомофаглар кузатилди ва олтин кўз кўпроқ учради. Энтомофаглардан биринчи бўлиб хон қизи пайдо бўлди. Унинг ривожланиши май ойининг 2-чи ўн кунлигида бошланди. Хон қизини энг кўп учраган вақти июнь ойига тўғри келди. Бунда 100 – ўсимликда 52 та хон қизи борлиги аниқланди. Кейин хон қизини сони камайиб борди. Лекин мавсум охиригача кам миқдорда бўлсада учраб турди. Олтинкўз тажриба майдонида июнь ойининг бошларида пайдо бўла бошлади. Июнь ойининг бошларида олтинкўзни сони 43 дона (100-ўсимлик ҳисобида) га етди ва шундан кейин секин камайиб борди. Лекин олтинкўз ҳам мавсум охиригача тажриба майдонида учраб турди.

Ўза шираларини табиий қушандаларини ривожланиш динамикаси (100-ўсимлик ҳисобида дона)

Жадвал 5.2.1.1

Кузатиш кунлари	назорат		Тажриба 10% аммофос	
	Хон қизи	олтинкўз	Хон қизи	олтинкўз
10. V	-	-	-	-
20.V	8	3	8	4
1.VI	24	18	29	19
10.VI	39	22	37	19
20.VI	47	33	52	28
1.VII	36	38	41	43
10.VII	32	32	28	29
20.VII	21	23	19	21
1.VIII	24	15	27	12
10.VIII	13	18	8	10
20.VIII	22	22	34	14
1.IX	8	15	16	14

5.2.2. Ғўза шираларига қарши уйғунлашган кураш чоралари

Ҳозирги вақтда ўсимликлар химоясида ташкилий агротехника, кимёвий биологик ва бошқа кураш тадбирларини такқослаб қўллаш яъни уйғунлашган химоя системасини кенг қўллашга катта эътибор берилмоқда. Уйғунлашган курашни қўллаш фақат ҳосилни сақлабгина қолмасдан уни оширади, табиатдаги мувозанатни сақлайди, табиатдаги фойдали хашаратларни кўпайишига ёрдам беради ва энг асосийси атроф-мухитни захарли моддалар билан ифлосланишини кескин камайтиради.

Уйғунлашган кураш усулида ташкилий хўжалик ва агротехник тадбирларни айниқса зараркунандалар ва уларни табиий кушандаларини қишлоқ қалинлиги ва қишладан чиққандан кейинги миқдори ва тарқалиш майдонини аниқлаш экинлардан бўшаган ерларни ўз вақтида ва сифатли шудгорлаш ва бошқа агротехник чораларни ўз вақтида ва сифатли ўтказиш зараркунандаларни сонини камайтиришда аҳамиятга эга.

Кимёвий кураш услуби

Ғўзани сақлашга доир тадбирлар системасида кимёвий усул етакчи ўринни эгаллайди. Кўпчилик олимларни фикрича пахтачиликда кимёвий воситалар ишлатиш натижасида йилига ҳар гектардан 4-5 ц ҳосил сақланиб қолинади. Шу билан бирга зараркунандаларга қарши курашга сарфланган маблағ 5-6 баробар қопланиб кетади.

Бироқ бу усулни афзалликларидан ташқари камчиликлари ҳам бўлиб, асосан атроф мухитни ифлослантиради, иссиққонли хайвонлар ва одам учун кучли зарар келтиради. Сурункасига бир хил препарат қўлланавериш натижасида хашоратларни уларга чидамлилиги ошиб кетади. Бундан ташқари табиатдаги фойдали хашоратларни ҳам кескин йўқолиб кетишига олиб келади. Шунинг учун ғўза зараркунандаларига қўлланилаётган кимёвий воситаларни тактикасини такомиллаштирган ҳолда қўллаш мақсадга мувофиқдир.

Ҳозирги вақтда энг яхши самара берувчи ва табиатда унга зарар келтирмайдиган пиретроидли препаратлар ғўза зараркунандаларига қарши қўлланилмоқда. Умуман ғўза зараркунандаларига уйғунлашган қарши кураш системасида кимёвий кураш ҳам муҳим ўрин тутди аммо бу усулни жуда зарурият туғилганда яъни зараркунандалар зарарлилик иқтисодий чегарасидан ошганда қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Агротехник кураш усули

Уйғунлашган кураш системасида агротехник усул асосий омиллардан бири ҳисобланади. Агротехник усул ғўзада унинг зараркунандаларга қарши қўлланилаётган кимёвий воситаларни кескин камайтиради. Шу билан биргаликда ғўза ҳосилини оширади.

Ўз вақтида ерни шудгорлаш зараркунандаларни қишлоқ фазасини 50% гача йўқотади. Ўз вақтида ерни ишлаш ва бегона ўтлардан тозалаш зараркунандаларни ривожланиш сонини кескин камайтиради.

Ҳозирги вақтда ғўзани сўрувчи зараркунандаларига қарши агротехник кураш чораси яъни ғўзани барг сатҳидан озиқлантириш усули кенг қўлланилмоқда. Бунда 10% аммофос билан ғўза барг сатҳидан озиқлантириш натижасида ғўзани ҳосили ошади. Шу билан биргаликда ундаги сўрувчи зараркунандалар сони 2-баробарга камаяди. Бундан ташқари бу усулни қўллаш ҳисобга кимёвий воситаларни қўллаш бир неча баробар камаяди.

Биологик кураш усули

Ќўзани зараркунандалардан химоя қилишда биологик кураш ҳозирги даврни асосий воситаларидан бири ҳисобланади.

Уйғунлашган кураш системасида биологик усул зараркунандаларни йўқотишда табиий кушандалардан ҳамда микробиологик препаратлардан фойдаланишга асослангандир. Биологик усул амалда бирор зараркунанда кўпайиб кетиш хавфи бўлган жойларда ана шу хашоратларнинг кушандаларини сунъий равишда ўрганиш ва далага чиқариш йўли билан амалга оширилади.

Умуман юқоридагилардан кўриниб турибдики кимёвий агротехник ва биологик курашларни ўзига хос фойдаланилади. Бироқ шу курашларни уйғунлашган системага солиб яъни курашларни керакли вақтида зараркунандаларни зарарлилик иқтисодий чегарасини ҳисобга олган ҳолда ишлатилса зараркунандалар йўқотилиб ҳосил ошади балким шу билан биргаликда табиат атроф муҳитни ифлосланишини ва табиатдаги муҳитни ифлосланишини ва табиатдаги агробиоценозни бузилишини олдини олишда ҳам муҳим қадам бўлади деб ўйлаймиз.

5.3. Ғўза шираларига қарши қўлланилган агротехник кураш усулини биологик самарадорлиги

Тажриба ғўза шираларига қарши қўлланилган агротехник кураш усулини биологик самарадорлигини аниқлаш қўлланилган 10% ли аммафосни (22 кг 1 га) қанчалик ширалар сонини камайтириш билан белгиланади.

Тажрибада қўлланилган агротехник курашнинг биологик самарадорлиги қуйидаги формула бўйича ишлаб топилади.

$$BC = \frac{A-B}{A} \times 100 \text{ ф}$$

Тажрибамизда 3 июнь куни шираларга қарши 10 % ли аммофос билан барг сатхидан озиклантирдик. Бу даврда ширалар сони 1-ўсимликда 38 дона борлиги аниқланди. Қарши кураш ўтказилгандан кейин эса 10-июнь куни қайта текширувлар олиб борилганда 1-ўсимликда 15,0 дона қолганлиги аниқланди. Кейинги кузатувларда ширалар сони зарарлилик иқтисодий чегарасидан ошмаганлиги кузатилди. Натижада бошқа кураш чоралари олиб борилмади. Жадвал № 6.3.1 қўлланилган агротехник кураш усулини биологик самарадорлиги 60,5% фоизни ташкил этди.

**Вўза шираларига қарши қўлланилган агротехник курашни
биологик самарадорлиги (%-хисобида)**

жадвал 5.3.1

Вариантлар	Текширув кунлари	Воситалар қўлланилгунга қадар бўлган зараркунан далар сони (1- ўсимлик хисобида дона)	Воситаларни ишлатилгандан кейинги қолган зарар- кунандалар со- ни (1-ўсимлик хисобида дона)	Биологик самарадорлик (%-хисобида)
I Назорат ҳеч қандай кураш чораси қўлланилмайди	3.06	37,0	-	-
	10.06	-	28,0	
II Тажриба агро- техник кураш 10 % ли аммофос 22,0 кг/га	3.06	39,0	-	60,5
	10.06	-	15	

5.4.Тажриба натижаларини математик тахлили

Биз тажрибамиздан олинган маълумотларни ҳосилдорликни ва қўйилган тажрибани қанчалик тўғри олиб борилганлигини билиш учун, тажрибадан олинган маълумотларни математик йўл билан Доспехов (1985) услуби бўйича тахлил қилдик. Бу қуйидагича амалга оширилди.

Тажрибада қайтариқлар бўйича ҳосилдорлик (ц/га)

Жадвал 5.4.1

вариантлар	Қ а й т а р и қ л а р				йиғинди	ўртача
	I	II	III	IV		
I - назорат	30,4	31,6	33,5	34,1	129,6	32,4
II-тажриба	34,2	34,7	37,1	38,0	144,0	36,0

$\pm 3,6$ ц/га

НСР_{05%} - 22

НСР_{05 ц/га} – 0,87

5.5. Шираларга қарши қўлланилган агротехник курашни иқтисодий самарадорлиги

Биз тажрибамизда ғўза шираларига қарши агротехник кураш яъни 10 % ли аммофосни (22 кг/га) суспензиясини қўллаб назоратга нисбатан 3,6 ц/га қўшимча ҳосил олдик.

1. Ҳосилдорлик.

а) назорат – 32,4 ц/га

б) тажриба – 36,0 ц/га

II. Ҳосилдорликни вариантлар бўйича фарқи

а) назорат – 0 ц/га

б) тажриба – 3,6 ц/га

III. Хўжаликда пахтани сотиш баҳоси 1 центнери ўртача 87253 сўмни ташкил этди. Бизда

1 ц – 87253 сўм

3,6 ц – х

$$X = \frac{87253 \times 3,6}{1} = 314110 \text{ сўм}$$

IV. Қўшимча ҳосил ҳисобига ялпи даромад олинди.

а) назорат – 0 сўм

б) тажриба - 314110 сўм

V. Етиштирилган қўшимча ҳосил учун кетган харажатлар

5.1. Ўсимликларни химояси учун. Тажриба вариантимида ғўза шираларига қарши 10% ли аммофосни (22 кг/га) суспензияси қўлланди. 1 кг аммофос суспензияси тайёрлаш учун ва ишлов бериш билан биргаликда 1400 сўмга тўғри келди. Демак:

1 кг – 1400 сўм

22 кг - X

$$X = \frac{1400 \times 22}{1} = 30800 \text{ сўм}$$

5.2. Қўшимча хосилни ташиш учун кетган харажатлар. Хўжаликда 1 тонна пахтани ташиш учун 6130 сўм тўланди. Демак :

1 т - 6130 сўм

0,36_т - X

$$X = \frac{6130 \times 0,36}{1} = 2206 \text{ сўм}$$

5.3. Қўшимча хосилни қуриштиш ва юклаш учун кетган харажатлар. Хўжаликда 10500 сўм тўланди.

1_т - 10500 сўм

0,36_т - X

$$X = \frac{10500 \times 0,36}{1} = 3780 \text{ сўм}$$

5.4. Қўшимча хосилни териш учун кетган харажатлар. Хўжаликда 1 кг пахтани териш учун 150 сўмдан тўланди

1 кг - 150 сўм

360 кг - X

$$X = \frac{150 \times 360}{1} = 54000 \text{ сўм}$$

5.5. Тажрибада бошқа харажат 15000 сўм бўлди.

VI. Жами харажатлар.

$$30800 + 2206 + 3780 + 5400 + 15000 = 105786 \text{ сўм}$$

VII. Соф даромад.

$$314110 - 105786 = 208324 \text{ сўм}$$

VIII. бир сўм харажат хисобига фойда.

$$208324 : 105786 = 2,0 \text{ сўм}$$

Иқтисодий самарадорлик

жадвал № 5.5.1.

№	Кўрсаткичлар	бирлиги	Вариантлар	
			назорат	тажриба
1	Хосилдорлик	ц/га	32,4	36,0
2	Қўшимча хосил	ц/га	-	3,6
3	1ц пахтани давлатга сотиш бахоси	сўм	87253	87253
4	Ялпи даромад	сўм	-	314110
5	Жами харажатлар	сўм	-	105786
5.1.	Ўсимликларни химояси учун	сўм	-	30800
5.2.	Ташиш учун	сўм	-	2206
5.3.	Қуритиш ва юклаш учун	сўм	-	3780
5.4.	Териш учун	сўм	-	54000
5.5.	Қўшимча харажатлар	сўм	-	15000
6	Соф даромад	сўм	-	208324
7	Бир сўм харажат ҳисобига олинган фойда	сўм	-	2,0

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Тажриба натижасидан қуйидагича хулса қилиш мумкин. Бизни хўжаликда ғўза ширалари (беда, полиз ва катта ғўза) ғўзанинг асосий зараркунандаларидан ҳисобланади. Улар ғўза чинбарг чиқаргандан то ҳосил йиғиб олингунга қадар кучли зарар келтиради.

Бизни шароитимизда ғўза шираларидан биринчи бўлиб беда қора шираси пайдо бўлиб зарар келтиради. Унинг зарари 1, 1,5 ой давом этади. Шу қисқа муддатда бу шира ғўзани ёш ниҳолларига кучли зарар етказди. Полиз шираси баҳорда ғўза чинбарг чиқаргандан бошлаб шоналаш давиргача ўсимликни ўсиш ва ривожланишига катта зарар етказди. Ёзда эса ўсимликни ҳосил органларини тўқади. Кузга келиб полиз шираси зарари натижасида пахта толаси ифлосланади.

Ќўза гуллаш даврига келиб ғўза катта шираси ривожланади ва зарар келтиради. Умуман ғўза ширалари мавсум давомида ғўзага сезиларли даражада зарар келтиради. Бу шираларга ўз вақтида қарши курашилмаса улар ғўза ҳосилини 30-50 % гача айрим йиллари ёш ниҳолларни умуман йўқотишга олиб келади. Ќўза шираларига агротехник усулини (суспензия) қўллаш энг самарали усуллардан ҳисобланади. Тажрибада ғўза шираларига қарши қўлланилган 10 % ли аммофосни суспензиясини биологик самарадорлиги 60,5 % ни ташкил этди. Агротехник кураш ҳисобига тажриба майдонидан назоратга нисбатан 2,2 ц/га қўшимча ҳосил олишга эришилди. Ҳар гектар ҳисобига 208324 сўмдан соф даромад қилинди ва 1 сўм харажат ҳисобига 2,0 сўмдан фойда олинди.

Шулардан келиб чиқиб биз фермер хўжалигида уйғунлашган кураш системасини қўллашни таклиф этамиз. Бунда кўпроқ эътиборни агрохимик ва биологик курашга қаратиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Бу ҳосилдорликни оширишга атроф муҳитни тоза сақлаш ёрдам беради. Умуман зараркунандаларга айниқса шираларга уларни зарарини аниқлаб мавсум давомида камида икки марта суспензия билан ишлашни таклиф қиламиз.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Алимухаммедов С., Хўжаев Ш. “Ѓўза зараркундалари ва уларга қарши кураш чоралари” “Ўзбекистон” Тошкент 1991 й.
2. Алимухаммедов С. ва бошқалар “Ѓўзани биологик усулда химоя қилиш” меҳнат Тошкент 1989 й.
3. Берим И.Г. “Ўсимликларни химоя қилиш” Москва 1985 й.
4. Давлетшина А.Г., Журовская С.А. “Ѓўза ширалари ва унга қарши кураш чоралари” Тошкент 1953 й.
5. Давлетшина А.Г. “Ўзбекистон шароитида ғўзанинг асосий зараркундаларини энтомофаглари” Тошкент 1972 й.
6. Давлетшина А.Г. ва бошқалар “Беда қора ширасини ёппасига ривожланиши” Биология журнали № 3 1980 й.
7. Дерябен В.И. “Ѓўзани сўрувчи зараркундаларига қарши уйғунлашган химоя чораси” Тошкент 1981 й.
8. Доспехов Б.А. “Дала тажрибаси методикаси” Москва 1985 й.
9. Кан А.А., Ким Ч.Н. “Ѓўза зараркундаларини уйғунлашган усулда химоя қилиш” Тошкент “Меҳнат”
10. Кан А.А. ва бошқалар “Фарғона водийси шароитида ғўзани сўрувчи зараркундалари” Тошкент 1992 й.
11. Мигулин А.А. “Қишлоқ хўжалик энтомологияси” Москва 1983 й.
12. Насруллаев Д.Н. “Қишлоқ хўжалик экинлари зараркундалари касалликлари ва уларга қарши уйғунлашган кураш чоралари” Самарқанд 1992 й.
13. Норзикулов М.Н. “Полиз шираси биалогияси” Сталинобод 1948 й.
14. Нарзикулов М.Н. “Ѓўза ва беда шираларига қарши кураш чоралари” Сталинобод 1956 й.
15. Нарзикулов М.Н. “Ѓўза шираларининг иқтисодий зарарланиш чегараси” Душанба 1985 й.
16. Насритдинов К. “Ѓўза зараркундалари ва касалликларига қарши кураш

17. Невский В.Г. чоралари” Тошкент 1976 й.
“Ўзбекистонда ғўза ширалари”
Тошкент 1942 й.
18. Танский В.И. “Зараркундаларни зарарланиш
даражасини биологик асослари”
Москва 1988 й.
19. Хамраев Ф.Х. “Ўзанинг барг сатхидан
озиклантиришни унинг сўрувчи
зараркундаларига таъсири”
Ленинград 1990 й.
20. Хадасиевич Н.И. “Ўзадаги полиз ширасининг
иктисодий зарарланиш чегараси”
Москва 1973 й.
21. Хушвақтов Қ.Х. “Зарафшон воҳаси шароитида
ғўзанинг асосий
зараркундаларига қарши
уйғунлашган кураш чораси”
Санктпетербург 1994 й.
22. Майхов Э.Т. ва бошқалар “Пахтачилик” Тошкент Мехнат
1990 й.
23. Швецова О.Н. “Ўзани барг сатхидан
озиклантириш унинг сўрувчи
зараркундаларига
чидамлилигини оширади”.
Тошкент 1982 й.
24. Юзбошьян О.Ш., Хамроев Ф.Х. “Ўзанинг сўрувчи
зараркундаларига уйғунлашган
ҳимоя чораси” Тошкент 1982 й.
25. Хўжалик маълумотлари 2011-2013
йй.