

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚИШЛОҚ ВА СУВ ХЎЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ
САМАРҚАНД ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ИНСТИТУТИ

Ш. Амиров

ҚОРАМОЛЧИЛИК
(МАЪРУЗАЛАР ТЎПЛАМИ)

Самарқанд-2010

Кириш Қорамолчиликнинг ҳолати ва ривожланиш истикболлари.

Режа:

1. Қорамолчиликнинг халқ ҳужалигидаги аҳамияти.
 2. Чорвачиликни ривожлантириш бўйича Президент фармонлари ва ҳукумати қарорлари.
 3. Бозор иқтисодиёти шароитида чорвачилик .
 4. Ўзбекистонда қорамолчиликнинг аҳволи ва ривожланиши истикболлари.
- Кушимча адабиётлар:
1. Олий мажлис I чақириқ X , XI ,XIV ва II чақириқ V-VI сессиялари ҳужжатлари .
 2. Президент фармонлари ва ҳукумат қарорлари.
 3. Расмий ташкилотларнинг чорвачилик бўйича ҳисоботлари.

Мавзунини урганиш учун таянч иборалар :

- чорвачилик тушунчаси ;
- чорвачилик ва халқ ҳужалиги;
- чорвачиликнинг ҳолати;
- чорвачиликни ривожланишда Президент фармонлари ва ҳукумат қарорлари;
- чорвачиликда истикбол тушунчаси ;
- ер юзида озик-овқат занжири;
- чорва маҳсулотлари бозори;
- чорва маҳсулотлари мулкчилиги ва халқ фаровонлиги

I. Чорвачилик кишлоқ ҳужалигининг ажралмас бир қисми бўлиб , халқ ҳужалигидаги алоҳида аҳамияти касб этади.

Чорвачиликдан инсонлар учун зарур озик-овқат бўлган сўт , гушт ва тухум маҳсулотлари олинади. Бу қурсатгич орқали мамлакат аҳолисининг фаровонлиги ҳақида фикр юритиш мумкин .

Бундай ташқари чорвачилик саноат учун ҳам ашё манбаи ҳисобланади . Уларга жун, тери, барра тери , шох, туёқ ва бошқа маҳсулотлар қиради .

Чорва ҳайвонлари ва паррандалари чиқиндилари маҳаллий уғит сихатида ер унумдорлигини оширишда бекиёс урин тутади . Бир сигирдан бир йилда олинган гўн билан 1 га ерни маҳаллий уғитга бўлган талабини қондириш мумкин .

Шу боисдан чорвачиликнинг асосий вазифаси чорвачилик маҳсулотларини қупайтириш эвазига халқнинг озик-овқат , саноатни эса хоматё билан таъминлашдан иборатдир.

Бунинг учун табиий озик-овқат занжирининг барча халқаларини мустаҳкам боғланишига эришиш керак. Бу занжир: тупроқ-уғит-усимлик-ҳайвон-одамдан иборат бўлиб , доимо фан ва техник янгиликларига муҳтож.

Кишлоқ ҳужалик – деҳқончилик ва чорвачилик соҳалари бир-бири билан узвий боғлиқ бўлиб , бир-бирини тулдириди , улар бир-бирисиз ижобий натижаларга ҳеч қачон эриша олмайдилар.

Табиий манбаалар ва экилган ерлардан олинган маҳсулотларнинг 75% инсон туғридан – туғри истеъмол қила олмайдиган , шунинг учун уларни албатта қ-х ҳайвонлари ва паррандаларининг танаси орқали утқазиб сўт, гушт, тухум каби ноёб маҳсулотлар олинади .

Уз навбатида хайвонлар ва паррандалар истеъмол килган озикалари таркибида 40% органик ва 70% минерал моддаларини танасига сингдираолмай ташки мухитга чикари юборадилар. Бу чиқиндилар чунг сифатида тупрокдаги микроорганизмлар учун озика булиб , унинг унумдорлигини оширишда асосий омил булиб қолади.

II. Мустақил Ўзбекистон халқ хужалигининг ажралмас қисми , қишлоқ хужалигининг ривожланиши, халқимиз фаровонлигини таъминлашда алоҳида урин тутди .

Бу борада мамлакатимиз Президенти И.А. Каримовнинг қишлоқ хужалигида туб ислохотларни утқизишда собитқадамлик билан олиб бораётган сиёсати , қишлоқ хужалиқ маҳсулотларини ишлаб чиқаришни қупайтиришда бош омил булмокда.

Президентимиз И.А. Каримовнинг буборадаги фармонлари ва Вазирлар маҳкамасининг қарорлари бу соҳадаги ислохотларни босқичма-босқич олиб боришнинг имкониятларини очиб берди .

Ўзбекистон Олий Мажлисининг I чақирик X сессиясида мамлакат Президенти И.А. Каримовнинг “Қишлоқ хужалигида ислохотларни чуқурлаштириш серобчилик манбаи” мавзусида қилган маърузасида қишлоқ хужалигининг ёш мустақил давлат иқтисоди ва сиёсатида аҳамиятига бафуржа тухтаб утдилар .

Ўзбекистонда умумий аҳолининг 60% ва ишга яроқли аҳолининг 40% қишлоқ хужалиғи билан боғлиқлиги бу соҳанинг дорзарблигидан далолат беради . Бундан ташқари Президентимиз қишлоқ хужалигида ерга , хайвонларга, асосий ишлаб чиқариш воситиларига эгалликни таъминлаш кераклиғи тугрисида гапирдилар .

Ўзбекистон Олий Мажлисининг I чақирик XI сессиясида янги қонунлар – “ Ер тугрисидаги қонун “ , ”Қишлоқширкат хужалиқлари тугрисидаги қонун “ , “ Дехқон хужалиғи тугрисидаги қонунлар қабул қилиниши қишлоқ хужалиғини , шу жумладан қорвачиликни янада ривожлантириш имкониятларини очиб беради .

Ўзбекистон Президенти Ислам Каримовнинг мамлакатимиз Олий Мажлисининг I чақирик XIV сессиясида “ Ўзбекистон XXI асрга интилмокда “ мавзусида қилган маърузасида республикаимизнинг мустақиллигининг 8 йилида қилинган ишлар сарҳисоб қилиниб , XXI асрда қилиниши зарур ишлар уз аксини топган.

Айниқса мамлакатдаги сиёсий , ижтимоий ва иқтисодий узғаришлар чуқур таҳлил қилиб берилган.

Президент фармонлари билан бир қаторда Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари қишлоқ хужалигидаги ислохотларни утқизишда асосий омиллардан бири булиб ҳисобланади.

1991 йил 30 декабрда 315 сонли қарор : “ Республикада дехқон хужалиқларини янада ривожлантириш ва мустаҳкамлаш қоралари ҳақида

1993 йил 15 мартдаги “ Республикада қорвачилиқдаги иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш қора-тадбирлари ҳақида”.

1994 йил 21 январь 74 сонли қарор “ Иқтисодий ислохотларни янада чуқурлаштириш , хусусий мулк манфаатларини ҳимоя қилиш ва тадбиркорликни ривожлантириш қора – тадбирлари тугрисида ларни қурсатиш мумкин.

III. Бозор иқтисодиёти шароитида қорвачилиқнинг ривожланиши узигв ҳос ҳислатларга эга. Улар мулкни давлат тасарруфидан чиқарилиб хусусийлаштирилиши , турли мулк шаклидаги қорвачилиқ хужалиқларининг фаолият қурсатиши , қорва маҳсулотларига давлат харид нархларини ва режаларини бекор қилиниши , барча қорвачилиқ хужалиқлар уртасида одил , эркин рақобатни ташкил қилишдан иборатдир .

Бозор иқтисодаёти шароитида қорвачилиқ фермалари давлат режаси асосида эмас , маҳсулот ишлаб чиқаришни бозор талабидан қелиб қикиб ташкил қилади . Бу эса бозорда қорвачилиқ маҳсулотларини талаб ва тақлиф нисбатида олиб бориши тоқозо этади.

Бозор иқтисодиёти шароитида Ўзбекистонда давлат , жамоа, шурхат, ёрдами, фермер ва дехқон хужалиқлари бемалол фаолият қурсатишлари мумкин. Бозор иқтисодиёти шароитида ишлаб чиқарилган маҳсулот нисбатида хусусий мулкнинг улуши ортиб бораверади . Бу эса бозорда сифатли ва арзон қорва маҳсулотлари турларини таъминлайди .

Бозор иқтисодиёти шароитида барча турдаги мулк шаклидаги хужалиқларнинг эркин рақобат қилишлари учун ҳуқуқий ва иқтисодий асослари яратиб берилади.

Барча мулк шаклидаги хужаликларда ишлаб чиқаришни тугри ташкил қилиш натижасида чорвачилик маҳсулотларини таннархини камайтириш , бозор имкониятларидан келиб чиқиб сотишни ташкил қилиш , ҳамда асосий чорва маҳсулотларини хужаликни узида қайта ишлаб тайёр маҳсулот ҳолида сотишни тақоза этади . Бу борада янги маҳсулотлар турларини тайёрлаш уларнинг сифатини жаҳон андозалари талабларига жавоб берадиган ҳолатга келтиришни талаб этади.

IV.Ўзбекистонда чорвачиликни ривожланиши учун мустақиллик йилларида барча шарт шароитлар яратиб берилди. Унинг ҳуқуқий ва иқтисодий асосларини ҳукумат томонидан яратилиши чорвадорларни эркин фаолият курсатишлари учун имкониятлар яратиб берди .

Мамлакат чорвачилигида сифат узғаришлар рўй бермокда ёки мулк давлат тасарруридан чиқариб хусусийлаштирилмокда , бу эса унинг ижобий натижаларини бермокда.

Қушлаб фермалар ҳиссадорлик , хусусий мулкка айланди, янгидан минглаб фермер ва деҳқон хужаликлари барпо этилмокда.

Мамлакатимизда чорвачиликни тақдирини албатта хусусий мулкка асосланган чорвачилик хужаликлари ташкил қилиши аниқ.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда 18500 дан ортиқ фермер ва 3 млн. дан кўпроқ деҳқон хужаликлари мавжуд бўлиб улар чорвачилик билан шугулланмокдалар. Шунинг унинг йилдан-йилга чорва бош сонлари кўпайиб, чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришкўпайиб бермокда , бу асосан хусусий мулкка асосланган чорвачилик хужаликлари эвазига рўй бермокда .

Шундай қилиб , чорва бош сонларининг асосий қисми хусусий мулк эгалари ҳисобига тугри келмокда ёки қорамолларнинг 95% , сигирларнинг 96,2% қўйлар ва эчкиларнинг 65,7%, чўчкаларнинг 39,9% ,ойларнинг 66%, паррандаларнинг 60% хусусий мулк эгалари қўлида жамланган . Шу боисдан чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда ҳам хусусий мулк эгаларининг нисбати анча юқори бўлмокда .

Мамлакатда ишлаб чиқарилган сутнинг 96,7% қўштни 96,1% тухумнинг 64,6%, жуннинг эса 56,9% нодавлат чорвачилик нодавлат чорвачилик қорхоналарида ишлаб чиқармокда . Бу жараён шундай кейин давом этиб, нодавлат қорхоналар нисбати ортиб бораверади. Айниқса фермер ва деҳқон хужаликларининг нисбати ортиб бораверади.

Ҳозирги кунда мамлакатдаги чорвачиликнинг аҳолини қониқарли деб бўлмайди.

Бундай аҳолини чорва ҳайвонларни маҳсулдорлигида қўриш мумкин.

Ўтган йилларда ҳар 100 бош сигирдан 49 бошдан қўз , 100 бош қўвқдан 98 бош қўзи, ёки 100 бош чўқадан 341 чўқа боласи олиниши қандай баҳолаш қерак .

Ёки сўйилган 1 бош қорамолнинг тирик вазни 193 кг, қўй ва эчкининг 31 кг , чўқани 32 кг бўлганини тушунтириш қийин .

Бундай қўсатқичларнинг паст бўлиши асосан ташкилотчиликни етишмаслиги , қўрлик имкониятлар оқилона фойдаланишнинг , ўтиш даври қўсурларини курсатиш мумкин.

Қейинги йилларда чорвачиликни ривожлантириш 3 илдизга сўянган ҳолда олиб қўрилиши шарт. Биринчи навбатда мамлакатимизда муштақам ем-ҳашак базасини яратиш бўлиб, бу масалани амалга ошириш учун алмашлаб экиш, оралик ва тақрорий эқмнларни жорий этиш. Ҳашаки экинлар ҳосилдорлигини ошириш эвазига ҳар гектар ҳашаки экин майдонидан 100-150 оз.бр. олишни таъминлаш қерак.

Фермерларни наслдор қоллар билан таъминлаш учун барча мулк шаклидаги чорвачилик хўжаликларида наслчилик ишларини андозалар асосида йўлга қўйиш .

Турли мулк шаклидаги хўжаликларда янги жадал технологияларни жорий қилиш асосида жаҳон андозалари даражасида маҳсулот ишлаб чиқаришни ташкил қилиш.

Айниқса, фермер хўжаликларида янги жаҳон тажрибасида синовдан ўтган технологияларни жорий қилиш бу соҳани обрўйини оширади. Бунинг учун мамлакатда ҳар бир сигирдан соғиб олинаётган сутни дастлаб ҳеч бўлмаганда 3 минг кг. етказиш икки қаробар сут етиштиришни қўпайтириш имқонини беради ва халқимизни сут маҳсулотларига бўлган талабини тўлиқ қондиришни таъминлайди.

Қўшт учун топшириладиган чорва ҳайвонларининг ўртача вазнини ошириш бу борада бош оқил бўлмоғи қерак. Ёки қорамоллар вазни 400-450 кг, қўйларни 50 кг, чўқаларни 120-

130 кг.га етказиб топшириш камида икки баробар гўшт етиштиришни кўпайтириб халқимиз талабини қондиради.

Назорат саволлари :

- 1.Мутахасисни шаклланишида чорвачиликнинг урни.
- 2.Чорвачилакнинг халқ хужалигидаги аҳамияти.
- 3.Чорвачиликнинг таърифи.
- 4.Чорвачилиқдан олинадиган озик-овкат маҳсулотлари.
- 5.Чорвачиликни ривожлантириш борасидаги Президент фармонлари ва ҳукумат қарорлари.
- 6.Чорвачиликнинг аҳволи ва ривожланиш истикболлари.

Мавзу: **Корамолларнинг келиб чиқиши**

Режа:

- 1.Корамолларнинг келиб чиқишини урганишининг аҳамияти.
2. Корамолларнинг келиб чиқишини урганишининг усуллари.
- 3.Корамолларнинг хонақилиштириш ва уларнинг узғариши.
- 4.Корамолларнинг ёввойи уруғаймоқлари.
- 5.Корамолларнинг классификацияси.
- 6.Корамолларнинг биологик хусусиятлари.

Қушимча адабиётлар:

- 1.Наумов И.Г.Умурткалилар зоологияси Т. Ўқ.1991 й
- 2.Красота В.Ф, Лобанов М.К. 1983.й
- 3.Лисицин А.Б. Разведение сельскохозяйственных животных. М.К. 1987.й

Таянч иборалар:

- ёввойи аждодлар.
- Кулга ургатиш .
- Хонакелаштириш.
- Эволюция.
- Зоологик классификация.
- Кронологик классификация.
- Хужалик классификацияси.
- Бизонлар.
- Зебу.
- Буйвол
- Гаур
- Гаял

1.Кишлок хужалик хайвонларини келиб чиқишини урганиш назорат ва амалий аҳамиятга эга. Хайвонларнинг келиб чиқишини урганиш билан уларнинг эволюцион жараёнда руй берган узгаришларни илгаш билан бирга амалий аҳамиятга эга яъни ёввойи аждодлардан фойдаланиб янги зотлар яратиш ёки мавжудларини такомиллаштириш имкониятларини беради.

Куйидаги хайвонлар учрайди:

А. Ёввойи хайвонлар табиат махсулоти булиб химоя туси кузгалувчан нерв тини ва кам махсулот , кеч етилиши билан таърифланади.

Б. Кулга ургатилган хайвонлар – туткинликда купайиш ва авлод колдириш имкониятларидан махрум.

В. Уй хайвонлари- хонакелаштирилган ва инсон меҳнати сингган хайвонлар . Ер юзида 1,5 млн жонзод тури мавжуд шундан 56640 тасини умурткалилар ташкил қилади.

Г. Кишлок хужалик хайвонлари- хонаки хайвонлар булиб, инсонларнинг чорва махсулотларига булган талабларини кондириш мақсадида ишлаб чиқаришда фойдаланидилар .

Инсонлар томонидан ёввойи хайвонларни хонакилаштириш ибтидоий одамларни ов қилиши билан боғлиқ булиб , у бундай 10-12 минг йил олдин бури ва шакалларнинг авлоди булган итлардан бошланган .

Бунинг асосий сабаби ов қилиш давомида яраланган бушашган хайвонларни туткинликда ишлашдан мақсвд хардоим янги гуштга эга булиш эди. Хайвонларни чуқурлар қазиш , тусиклаш ,аркон ёрдамида ишлаганлар кейин кураларда горларда туткинликда асраганлар .Купинча бундай хайвонлар хайрат учун ҳам сакланганлар бундай хайвонлардан баъзан авлод олиш ҳам руй берган. Ёш ёввойи хайвонлар кулга осонроқ урганган .

Уй хайвонларининг келиб чиқиш минталари уларнинг ёввойи аждодларини тарқалишига қараб руй берган. Асосий хонакилаштириш минтақалари булиб Евррат ва Тигр дарёлари сохиллари , хиндистон ,хитой, Шимолий шарқий Африка – Нил дарёсининг қуйи оқиши , Кавказ орти ҳисобланади.

Купчилик хайволар осийда кулга ургатилиб хонакилаштирилган ит, қорамол, от ,кутас,эчки,қуй,чучка , бугу, товуқлар ҳисобланади . Европада ит ,қорамол, от ,кутас,эчки,қуй,чучка , бугу, товуқлар , зебралар , ва бошқа хайвонлар .

Австралияда фақат нанду товуқлари хонакилаштирилган. Ёввойи хайвонларнинг хонакилаштирилиши қатар фанлар ва ушуллар ёрдамида иккиламчи курсаткичлар асосида урганилади : Археологик , анотомик, физиолагик, этнографик.

Физиологик усул ёрдамида ёввой хайвонлар оксили таркиби ва кони билан хонаки хайвонларники билан солиштирилиб уларнинг келиб чиқишини аниклаш мумкин .

Этнографик усул эса аجدодларимизнинг хайвонларнинг тасвирини тоғ тошларига ва турли ашёларга тушурилишига караб аникланади. Бу жараёнда хайвонларнинг жуссаси ,махсулотнодори , феъл – ахлоқлари , тана тузилиши хусусиятларида узгаришлар руй берганлигига гувоҳ буламиз .

Ёввойи қорамол турлар йирик бўлиб тирик вақти букаларда 1000 кг яғрин баландлиги 190-200см ташкил қилиб , жуда йирик бўлган , тур букаси отни шоҳида қутариб улоқтириб , ёки 4 буруни юзидан жароҳат етказиб қураш олиб борган. Уларнинг қалласи катта , шоҳларининг узунлиги 1,5 м оғирлиги 15 кг дан ошган.Эволюцион жараёнда эса хайвонларни чегараланган майдонларда сақлашни , йирткич хайвонлардан

химояланиши , меъёрий сақлаш усуллариининг яратилиши хайвонларнинг уларга керак бўлмаган белги ва хусусиятлар ҳолсиз бўлиш , белгиларни пайдо бўлишига олиб келган.

Хонақилаштириш давомида ёввой қорамоллар жуссаси кичиклашган , қалласи тананага мутаносиб бўлиб шоҳи қалталашган , танана мутаносиб ривожлана бошлаган , териси юпкалашиб юмшоқ бўлиб тери ости ёғ қатлами яхши ривожланган , мускуллар бушашган унда ёғнинг миқдари қупайган , суяклар юмшоқлашган , ошқозон ҳажми қатталашиб , ичаклар қисқарганлигига гувоҳ буламиз. Эволюцион жараёнда махсулдорлик кескин ошган .

Ёввой қорамол аجدодлари 300-400 кг сўт берган , хонаки сигирларнинг сўт махсулдорлиги 8-13 баробар қупайган .

Хонақилашган хайвонларда жинсий ва жисмоний балоғат ёки икки баробар қашайган , ёки улар тезетилувчан бўлган . Жинсий фаолиятининг мавсумлиги йуқолган , ёки сигирларда йил бўйи бузук олиш мумкин .

Хонаки хайвонлар юввош бўлиб ёввойи аждодларидаги хурқатли , қурқаш ва баъзи шартли ва шартсиз рефлекслар юқолган .

Хонақилаштириш натижасида руй берган узгаришларнинг сабаби қуйидагила ҳисобланади:

1.Харакатланишнинг чегараланиши.Хайвонларнинг эркинликни йуқотиши организмда узгаришларга сабаб бўлди , мускуллар иши қамайганлиги учун унда ёғ тупланди , скелет бушашди , юрак , упка ва бошқа аъзолар ривожланиши қисқарди .

2.Озиқланиш шароитини узгариши . Озиқлантириш ҳажми ва таркиб жиҳатдан хайвон талабларига тулик жавоб бериши уларнинг пропорционал ривожланиши ва юқори махсулдорлигига сабаб бўлади .

3.Хайвонларни одамлар уз химоясига олиши , уларнинг бушашимига , тиббий танлаш таъсирини йқотди.

4.Инсонлар хайвонларнинг танлаш натижасида узига керакли хайвонларнигина олиб қолган.

5.Хайвонларнинг бир жугрофий ҳудуддан бошқа ҳудудга , бир қиътадан иккинчи қиътага олиб утилиши уларнинг эволюцион жараёнига таъсир этган.

6.Хайвонларни фавқулодда турли тур , зот, типларни қатиштириш уларнинг шаклланишига сабаб бўлган .

Қорамолларнинг энг яқин уруғ-аймоқлари бўлиб зебу , қутос , бантенг ,бизон ва бўйволлардир .

Бизон энг йирик буқасимонлар вақили ҳисобланади.

Америка бизони – бу ёввойи буқа Американинги урмонлари ва тинч океан соҳилларида урқиган . Жуда қучли, бақувват , бўйи 200 см қалласи катта , шоҳи йирик орқага эгилиб қетган .

Бизонлар Америка очилганда жуда қуп бўлган .1492 йилда улар бошсони 60 млн .бош бўлган .Европалықлар Америкага қелб бизонларни қира бошлади.1870 йилга қелиб қакат 5.5 млн . бош бизон қолди , лекин уларни қириш давом этиб 1895 йилга қелиб қакат 800 бош бизон қолди .

Хуқумат тадбирлари натижасида улар сони орта борди , 1918 йилга қелиб 4000 , ҳозир эса 30 минг бош АКШда , 20 минг бош Канадада мавжуд .

Бантенг – Зонд букаси . Купчилик олимлар хулосаларига караганда бантенг хинд ва африка зебулари , ҳамда осие корамолларнинг уругбошиси ҳисобланади . Бантенг ёвойи ва хонакилашган ҳолда мавжуд. Уртача жуссага эга бўлиб мускуллари яхши ривожланган . Ярим баландлиги сигирларида 140, буқкаларида 160 см ташкил қилади. Сигирларнинг вазни 450-500 кг , сутдорлиги 450-500 кг , ёглиги 4,5-5,0% .

Улар ҳозир ява , Суматра ороллари ва малак яриморолида яшайди. Корамол билан чатиштирилганда пушдор авлод беради.

Гаур – улар хиндистоннинг тоғ урмонларида , жанубдан тортиб ҳумолай тоғларида тарқалган . У йирик хайвон , калласи катта , танаси йирик , оёқлари мустаҳкам , кучли. Ягрин баландлиги 170-180 см , вазни 1000 кг атрофида . Сутдорлиги 300-400 , ёглиги 5-6 %

Гаял – гаурнинг хонакилиштирилган. Йирик бўлиб , ягрин баландлиги буққаларда 150-160 см , сигирларида 140-150 см ташкил этади . Тана тузилиши бўйича узини ёввойи аждодини эслатади. У қочонлардир хонакилиштирилган .

Сути жуда ёгли. Корамол билан чатиштиришда пушдор авлод беради. У асосан Хиндихитой яриморолида тарқалган .

Зебу – осие – африкада кенг тарқалган хонаки корамол ҳисобланади . Олимлар хикрича у бантенгдан келиб чиққан . Унинг тана тузилиши хусусияти ягринида урқач бўлиб унда мускул толалари ёғ билан бирга учрайди.

Урқач хайвон учун озик – овқат ва сув захираси ҳисобланади.

Урқач 5-8 кг бўлиб , тана вазнини 2-3% ташкил қилади. Жаҳонда улар сони 300 млн ни ташкил этиб , улар хиндистонда , Африкада , Американинг тропик ва субтропик ҳудудларида ҳамда яқин шарқда учрайди.

Корамол билан яхши чатишади ва пушдор авлод беради. Дурагайларнинг сут маҳсулдорлиги 3000-3500 кг , ёглиги 4,2-4,5 ташкил этади.

АҚШда зебунни корамоллар билан чатиштириш натижасида қатор зотлар санта - чертудра , бифмастер , брафорд , брангус ва бошқалар .

Кутос – мунгул букаси – Унинг ватани Тибет ясситскисми. У кучли йирик хайвон бўлиб , калласи катта , бўйникалта бўлади . Кутослар Монголияда собик иттифок ва Ўзбекистонда тарқалган .

Хонаки кутос , ёввойисига нисбатан майдарок бўлади: Ягрин баландлиги 108-110 см , ёввойиларида эса у 200 см ни ташкил этади . Шохи калта , қулинча туқал бўлади. Оёқлари мустаҳкам , туёқлари каттик , ранги қора , қунгил ва қуланг.

Буйволлар – улар ҳозир ёввойи ва хонаки ҳолида учрайди . Уларнинг 2 хили учрайди : Африка ва Осие Буйволлари . Африка буйволларига каффр , кизил ва қалташоҳ буйволлар қиради .

Осие буйволларига хиндистон ёвойи буйволи қиради.

Африка буйволлари ёввойи бўлиб , эндиgina қулга ургатиш бошланди.

Хонаки буйвол йирик , кучли , танаси муттаносиб ривожланган , оёқлари бироз йугон. Ягрин баландлиги 125 – 130 см. Суяги кучли бели тугри , қорни жамли. Вўяга етганлари 450 – 500 кг , туғилганда 25 – 30 кг тош босади. Қари хайвонлари гушти каттик , ёш буйволлар гушти корамол гушtidан қолишмайди. Сўйим чиқиши 45 – 50% .

Буйволлар лактацияда уртача 600 – 800 сут беради , яхши ҳужалиқларда 1500 – 2000 кг га етади ёглиги 7-8 % . Бугўзлиги 300 кун давом этади. Улар жуда соғлом бўлиб озикаларга талабчан эмас .

Корамолларни классификациялаш муҳим назорат ва амалий аҳамиятга эга.

Корамолларнинг зоологик , қраниологик ва ҳужалиқга фойдали белгиларига , қараб амалга оширилади.

Корамолларнинг зоологик классификацияси.

Синф – сут эмизувчилар

Туркум – жуфттуёқлилар

Кенжа туркум – қовмовчилар

Оила – қувшоқлилар

Қабила – буқалар

Тур – тур

Хонаки қорамоллар

Краниологик классификация .

1.Топ пешона *Bos primigenius* , бу осие қорамоллари аجدодлари, қора – ола голланд қулранг украин қорамоллари.

2.Кенг пешона *Bos frontosus* , бу тпга хос қорамоллар пешонаси яхши ривожланган, кенг ва узун бош суяги эга , симлиентал зот.

3.Қалтабош – *Bos brachycephalus* , бош суяги қалта қуз қосаи оралиги кенг бўлади , қизил қорбатот зоти.

4.Қалташох – *Bos brachyceros* , бош суяги шох қалта ва тик қикқани билан таърифланади , қунгир зотлар.

5.Тугришох – *Bos indicus*- Бош суяги узун ва топ , қамик зоти.

VI. Туқал – *Bos okerator* – шахсиз қорамол.

Хужалиқ учун фойдали белгилари бўйича қорамоллар қуйидагича бўлинади.

1.Сутдор қорамоллар

2.Қушмахсудор қорамоллар

3.Қуштдор қорамоллар.

Назорат саволлари:

1.Келиб қикқишни ўрганишнинг ахамияти.

2.Ўрганиш усуллари.

3.Қорамолларнинг ёввой аждодлари.

4.Қорамоллар классификацияси.

5.Қорамолларнинг биологик хусусиятлари.

Мавзу: Қорамолларнинг екстерери, интерери ва конституцияси.

Режа:

1)Мавзуни урганишнинг ахамияти.

2)Қорамолларнинг ташки тани тузилиши.

3)Қорамоллар интерери ва унинг ахамияти

4)Қорамолларнинг конституцияси ва унинг ишлаб қикаришдаги ахамияти.

Қўшимча адабиётлар:

1.Собиров П.С., Қохоров А.Қ., Дўстқулов С.Д., “Қорва ҳайвонларини урқитиш ” Т.

2003

Таянч иборалар:

-Экстерер, ўлчам, индекс, график, интерер, қон, тери, суяқ, конституция, дағал, нозик, зич, бўш.

1.Ҳайвонларнинг ташки тана тузилишини урганиш муҳим назорат ва ахамият қасб этади.

Экстерер – ташки тузилиши бўлиб , ҳайвонларда маълум шароитда ирсият таъсирида шаклланиб , ёши утиши билан узғаради.

Экстерер – угрисидаги фан к – х хайвонларини уларнинг ташки тузилишига қараб ҳужалик ва насл қийматини аниқлашнинг асоси бўлади.

Танаси учбурчак , баъзи суяклар бурсиб туради .Териси юпка бурмали , эгилувчан осон тортилади. Уларга сут ҳосил қилиш аъзолари ва қорни жуда яхши ривожланган .Боши узун ва тор . Кукраги яхши ривожланган .Оёқлари мустаҳкам , тугри қуйилган , бироз гуштдор қорамолларга нисбатан узунроқ бўлади.Гуштдор қорамоллар танаси чуқур ва кенг , қуғли ривожланган мускул ва тери ости ёғ қатламига эга, териси юмшоқ , нозик.Боши енгил қалта , кенг .Орка қисми узун кенг текис бўлиб мускуллари билан туғилган.Оёқлари қалтароқ бўлиб , кенг қуйилган , қупинча эгилган бўлади.

Ташки тана тузилиши.қорамолнинг жинсига қараб ҳам фарқланади.Эркак ва ургочи қорамолларнинг баъзи тана қисмлари фарқланади.

Шунингдек ташки тана тузилиши хайвоннинг ёшига; мустаҳкамлиги ва соғлиги ; ривожланганлик ёки ривожланмаганлик ; зоти ; муайян ҳужаликдаги озиклантириш ва саклаш усуллари тирик вазнига боғлиқ .Хайвонлар ташки тузилиши фақат унинг маҳсулдорлик йуналишини аниқлаб бериши мумкин, маҳсулот миқдори ва сифатини белгилаб бераолмайди .

Экспертни қуш билан қамалаб , улчам олиш , тана индекслари , график , рсмга тушириш биланурганилади.

Қуш билан қамалаб баҳолашда тананинг пропорционал ривожланиши ва алоҳида тана қисмларини ривожланиши , умумий қуриниши урганилади .Бу йил билан хайвоннинг уш маҳсулот йуналишига мослиги ва фойдаланиш имкониятлари белгиланади.Ушбу усулнинг қамчилиги унинг субъективлигида , чунки хайвоннинг ижобий ва салбий белгиларини аниқ баҳолаш имконияти йук.

Қуш билан баҳолашда пунктир ёки балл тизими анча аниқ ҳисобланади.

Буқалар экстерери бўйича 30 баллиқ , сигирлар 10 баллиқ шкала асосида баҳоланади.

Ёш қорамоллар 10 баллиқ шкала бўйича баҳоланади.

Асосий тана қисмлари умумий ривожланиши, экстерер тана – қисмлари : боши ва бўйни , қукраги , яғрини ва бели , тананинг урта қисми , орқаси, елин ва суртқичлар қисмларининг нуксонлари бўлиши мумкин .

Қорамоллар экстерерини урганишда уларни тана қисмларини улчаш билан унинг қамларини улчаш билан аниқроқ маълумотлар олиш мумкин.

Тана индексларини ҳисоблаш асосида унинг хусусиятларини яхшироқ урганиш имконияти мавжуд . Қорамолларда 10 тана индекслари ҳисоблаб чиқарилади.

График усул , хайвонлар улчаш қуратқичлари бир – бирига солиштириб урганилади.

Расм тушириш асосида хайвоннинг тана тузилиш хусусиятларини қочлаган маҳалда урганиш мумкин .

Чирвинский – Маамигонов қонунияти – маълум даврда етарли озиклантирмаслик шу даврда жадал усадиган азo ва қисмларга салбий таъир қуратади.

Хайвонлар танасининг ички тузилиши.

Тана ташки тузилиши ва аъзо, туқималар фаолияти бир-бири билан узвий боғлангандир, шу боисдан хайвонларнинг интерьер фарқи маҳсулдорлик юналишини ақс еттириб, уларнинг соғлигини белгилайди.

Бир зотга мансуб гуштдорлик томонига оған сигирларнинг вазни 719 кг, ойлик суги 304 кг, бўлгани қолда сугдор тип сигирларининг вазни 664 кг, ойлик суги 571 кг ни таъқил қилиб қони еритроситлар билан қупроқ тугинган бўлган. Сермаҳсул сигирларда еритроситлар ва гемоглобин миқдорининг қамлигига қарашдан юрак уриши ва нафас олишининг тезлиги улар модда алмашинувининг юқорилигидан қололат беради.

Л.В.богданов танада айланаётган қон миқдори билан суг маҳсулдорлигини ижобий қоррелатив боғланишини исботлаган.

Мухим интерер қуратқичлардан елининг туқималар нисбати ҳисобланади, серсуг сигирларда 75-80% без туқималаридан фақат 20-25% бириктирувчи ва ёғ туқималаридан таъқил топади.

Суг йуналишидаги сигирлар териси йупка бўлиб, тери ости ёғ қатлами қам бўлади, бу қуратқич гушт йуналишидаги қорамолларда қупроқ бўлади.

Овкат хазм килиш аъзоларининг хажми ва фаолияти сут йуналишидаги корамолларда яхшироқ ривожланганлиги аниқланган.

Гуштнинг сифати унинг морфологик, кимёвий таркиби ва гистологик тузилишига боғлиқ. Корамол гушти мускул, ёғ, суяк ва бириктирувчи туқималар нисбатига қараб сифати белгиланади. Кимёвий таркиби бўйича еса таркибида қуруқ моддалар, шу жумладан оксил микдорининг қуплиги гуштнинг йуқори сифатини белгилайди.

Гушт толаларининг ингичкалиги, улар орасида ёғ пардаларининг борлигини гистологик усул билан аниқлаш билан корамолнинг гуштининг сифати ҳақида фикр юритиш мумкин.

Интерер курсаткичлар корамолларнинг баҳолашда, маҳсулот юналишини белгилашда, соғлиги ва шароитга мослашишгани аниқлашда муҳим урин тутади.

Конститутсия—хайвонлар ташки тузилиши, уларнинг ички аъзолари ва туқималарининг тузилиши фаолиятининг мажмуасидир.

Е.А.Борисенко бўйича конститутсия хайвонларнинг морфофизиологик ва биохимик хусусиятлари бўлиб, ирсият ва ташки табиатда шаклланиб, маҳсулдорлик ва ташки муҳитга жавоби билан белгиланади. Зоотехния да конститутсиянинг турли усуллари таъриф қилинган, уларнинг ичида асосланган ва амалий аҳамиятга ега Кулишов П.Н. томонидан тафсия қилинган скласификатсия хисобланади. У тананинг асосий тана қисмлари ва аъзоларининг маҳсулот йуналишига қараб фарқ қилишини исботлаган.

Сут юналишидаги корамоллар териси юпка, пишиқ, егилувчан, мускулатураси зич, ёғги кам, суяги каттик ва ингичка сут безлари яхши ривожланган, ички аъзолари кучли ривожланган. Гушт юналишидаги корамолларда еса териси юпка, буш, ёғ катлами калин, мускуллари яхши ривожланган, суяги ингичка, лекин буш, ички аъзолар айниқса овкат хазм қилиш ва сут аъзолари кучли ривожланган.

Юқориладагиларга асосланиб П.Н. Кулишов хайвонлар тузилишининг дағаллиги, нозиклиги, зичлиги ёки бушлигига қараб 4 хил конститутсия типини ажратган.

Нозик зип тип. Бу типга сут юналишидаги корамоллар қиради. Уларда моддалар алмашинуви юқори бўлиб тез семирмайди, қузғалувчан нерв системаси, тетик ва ҳаётчан бўлади. Боши енгил. Буйни юпка. Қуқраги энсиз, қуқур, узун ва яхши ривожланган оёқлари ингичка, мустаҳкам, туёги каттик, оёқлари узун, мускулатураси қоникарли ривожланган. Тери ости ёғ катлами қучсиз ривожланган.

Нозик буш. Бу типга гуштор корамоллар мансуб. Уларда модда алмашинуви секин кечади натижада улар тез семириб, ёғ туплайди, нерв системаси секин қузғалувчан, биров хайот фаолияти бушашган. Териси юпка, буш, сийрак, нозик, юмшоқ жун билан қопланган. Боши енгил, қалта. Буйни қалта, қуқраги қалта, қенг, қуқур, думалоқ, суяги ингичка енгил, туёги юмшоқ қидамли емас.

Дағал зич. Бу типга шу корамоллар қиради.

Бу хайвонлар уртача қузғалувчи нерв системасига ега, хайотчан ва ишчан бўлади, ҳаракатчан қидамли ва шароитга талабчан бўлмайди.

Териси қалин, зич, ёгон, дағал толалар билан қопланган, қалласи қатта, дағал, буйни қатта югон. Тананинг олдинги 3/1 қисми қучли ривожланган, югон. Тери ости ёғ катлами яхши ривожланган.

Дағал буш—бундай хайвонлар қеч етилувчан озикага ёмон ҳақ тулайди, қамҳаракат, тез қасаллиқга қалиниди, шунинг учун ҳужалиқ нуктаи назардан мақсадга мувофиқ емас. Уларда нерв системаси буш, модда алмашинуви буш, пушторлиги паст, териси қалин. Мускуллари яхши ривожланган ва буш.

Хайвонларнинг конститутсияси билан уларнинг соғлиги маҳсулдорлиги, тез етилувчанлиги, бурдоқиланиши, ҳаракатчанлиги, серпуштлиги, қидамлиги, узок яшаши, акклиматизатсия хусусиятлари узвий боғлиқдир.

Барча конститутсия типига мансуб хайвонлар мустаҳкам тана, уртача нерв системаси билан тарифланиб узок вақт юқори маҳсулдорлик ва пушторликка ега бўлишлари қерақ.

Наслчилик ишини бузилиши қуйидагилардан иборат:

А) қатор бугинларда қариндош урқитишни қуллаш,

Б) бирёқлама танлаш ва жуфтлаш,

В) хайвонларни жуфтлашда уларнинг конституция хусусиятларига етибор бермаслик,

Г) катор бугинларда меёрда озиклантирмаслик.

Д) сурункали касалликлар.

Е) моционнинг юклиги.

Бушашган конституция типига мансуб хайвонлар биринчи навбатда подадан чикарилади.

Хайвон кондицияси:

А) завод

Б) иш

В) кургазма

Г) бурдоки –суким

Д) оч (голодное)

Назорат саволлари:

1. Тана тузилишини урганишнинг аҳамияти.
2. Турли юналишдаги қорамоллар тана тузилиши.
3. Интерер ва маҳсулдорлик.
4. Конституциянинг тафсифи.
5. Конституция типлари.

МАВЗУ: ҚОРАМОЛЛАРНИНГ СУТ МАҲСУЛДОРЛИГИ.

Режа:

- 1) Сут ҳақида тушунча ва унинг аҳамияти.
- 2) Сутнинг таркиби ва ҳоссалари.
- 3) Сутнинг ҳосил бўлиши.
- 4) Сутнинг ажралиши.
- 5) Сигирларнинг сут маҳсулдорлигига таъсир қилувчи омиллар.
- 6) Сигирларни оғиш.
- 7) Сутдорлик ва сутнинг таркибий қисмларининг наслга берилиши.
- 8) Лактация турлари ва табиати.

Қўшимча адабиётлар:

- 1) Эрнст Л.К. “Скотоводство” М. Колос 1984

Таянч иборалар:

сут; сут озиқ – овқат; ўғиз сути; сут ёғи; таркиби; сут оксиллари; сут қанди; минерал моддалар; витаминлар; сутнинг органолептик хусусиятлари; сутнинг зичлиги; сутнинг тўйимлилиги; сут алвеолалари; елин; сут цистернаси; найча ва каналлар; елин индекси; елин шакллари; елин сўрғичи; шакллари, сут бериш тезлиги.: наслдан-наслга берилиши; асосий белгилар; ирсият коэффиценти; узгарувчанлик коэффиценти; лактация; сервис даври; сутдан чиккан давр; сутдан чиқариш; лактация эгри чизиги; лактациянинг тургунлик коэффиценти; лактациянинг тулакийматлик коэффиценти; ирсий омиллар; ташки омиллар.

1. Сут оқ рангда биологик мураккаб суюқлик бўлиб сут эмизувчи урғочи ҳайвонлар туққанидан кейин ўз болаларини боқиш учун ишлаб чиқаради.

Сут ёш бузоқнинг яшаши учун зарур бўлган барча тўйимли моддалар ва энергия манбаи бўлиб ҳисобланади. Иш боисдан сут инсонлар учун муҳим озиқ-овқат, тўйимли моддалар манбаи бўлиб ҳисобланади. Унинг таркибида инсон учун зарур кўпчилик тўйимлик моддалар бўлиб улар бошқа озиқ-овқатлар таркибидаги тўйимли моддалардан осонроқ ҳазмланади.

Мамлакатимиз аҳолисини сут ва сут маҳсулотлари билан таъминлаш чорвадорларнинг асосий вазифаларидан ҳисобланади.

Ҳозир мамлакатимизда 3,5 млн. тонна атрофида ёки киши бошига 140 кг атрофида сут ишлаб чиқарилмоқда. Илмий асосланган меёрларга биноан 405 кг ёки мамлакатимизда 10.1 млн. тонна сут ишлаб чиқариш талаб этилади. Бунга бир сигирдан соғиб олинадиган сутни 1250 кг дан 4040 кг га етказиш билан эришиш мумкин.

Бунинг учун барча хўжаликда сигирларни озиқлантириш ва сақлаш шароитларини яхшилаш, насилчилик ишини меёрлар даражасида йўлга қўшиш билан эришиш мумкин.

Сутнинг таркибида 200 дан ортиқ, тўйимли моддалар мавжуд. Шунинг учун ҳам сут одамлар учун қимматли, ноёб, парҳез озиқ – овқат ҳисобланади, чунки унинг тўйимли моддалари тез ҳазм бўлиши қобилиятига эга. сутнинг таркибида асосий тўйимли моддалардан ташқари Гохил витаминлари, Зоҳил ферментлар, 10 макро ва 20 микроэлементлар мавжуд. Сут ёғининг таркибида эса 150 хил ёғ кислоталари, сут оксида эса 20 хилдан иборат аминокислоталар мавжуд.

Сут икки қисмдан иборат сув ва қуруқ моддалар, қайсики 12,5 – 13% ташкил қилади.

Шундан: ёғ – 3,8 %

оқсил – 3,5%

қанд – 4,6%

кул – 0,7%

Сутнинг таркибида ёғ, оқсил, қанд 95, 95, 98% ҳазмланади.

Сутнинг таркибида ёғ дағал дисперс ҳолда ёки майда ёғ заррачалари ҳолида сузиб юради (2 – 10ку) шунинг учун осонгина сепаратор ёрдамида ажратиш олиш мумкин.

Сут оксида эса молекуляр дисперс ҳолида бўлиб ажратиш олиш қийин.

Сут қанди ва кул эриган ҳолда бўлади.

Сигир туққанидан кейин 6-8 кун ўғиз сути беради. Бу сут таркибида (қуруқ моддалар 25,0%), ҳоссалари (қуюқ, нордон, сарғиш) билан оддий сутдан ажралиб туради ва янги туғилган бузоқлар учун ягона озиқа манбаи ҳисобланади.

Ўғиз сутида оддий сутга нисбатан оқсиллар 4 – 5 баробар кўп бўлиб (15%), айниқса унинг таркибида албулин ва Глобулин оқсиллари 20 – 25 баробар кўп бўлиб бузоқнинг резистентлик хусусиятини шакллантиради. Унинг нордонлиги 50 60⁰Т бўлиб ошқозон – ичак тизимидаги зарарли микроорганизмларни ўлдиради.

2. Сут ҳосили бўлишида нафақат елин қатнашмай барча тана аъзолари фаол иштирок этади.

Сут қон таркибидаги тўйимли моддалардан елиндаги сут безларининг сут алвиолаларининг миоэпителияларида ҳосил бўлади. Бу жараён мураккаб биохимик жараён ҳисобланади. Ҳосил бўлган сут майда найчалардан катта найчаларга ва йўлларга очилиб сут цистернасига қўйилади.

Сут ҳосил бўлиши токи елин идиши тўлгунча қадар давом этади. Елин идиши тўлгандан кейин сут ҳосил бўлиши у бўшатилмагунча тўхтаб туради ёки марказий нерв системаси томонидан бошқариб турилади. Идиш бўшагандан яна янги сут томчилари ҳосил бўла бошлайди. Шунинг учун айниқса сермахсул сигирлар елинини тез – тез бўшатиб туриш керак. 1 л сут ҳосил бўлиши учун елиндан 400 – 500 л қон оқиб ўтади.

Сут ажралиши мураккаб нерв – гуморал жараён бўлиб тананинг кўпчилик аъзолари қатнашади. Сигир соғиш бошланиши (уқалаш, ювиш)билан ленсга хабар беради ва гипофиз безига бўйруқ бериши натижасида ундан окситацин гармони ажралиб қонга қўйилади ва қон

орқали елинга боради, елин кўндаланг мускуллари, сўргич мускуллари қисқариши натижасида сут ажрала бошлайди.

Лекин окситацин гормонининг таъсири фақат 5 – 6 минут давом этади, агар шу даврда сутнинг асосий қисми соғиб олинмаса, у ушланиб қолади. Қолдиқ сутни соғиб олиш шарт, чунки у энг ёғли сут (11 – 12%).

Сигирларни соғишнинг икки хил усули бор.

Елиннинг шакли: ваннасимон, косасимон, думалоқ, эчки елин, яхши ривожланмаган елин.

Елин тўрт бўлакдан иборат олдинги ўнг олдинги чап, орқа ўнг, орқа чап.

Елин индекси олдинги бўлмалар сутини жами сутга нисбатини фоиздаги ифодаси (45 – 47%).

Елин сўргичлари: цилиндрсимон, конуссимон, ноксимон, бутилкасимон, қаламсимон шаклда бўлади.

3. Сигирларнинг сутдорлиги уларнинг асосий хусусиятларидан ҳисобланиб уларни баҳолашнинг асоси ҳисобланади.

Сигирлар сутдорлигини наслдан – наслга жуда мураккаб муаммо бўлиб у охиригача очиб берилмаган. Унинг мураккаблиги шундаки у бутун организм фаолиятининг натижаси ҳисобланади. Бундан ташқари сигирларнинг сут маҳсулдорлиги ирсий белги бўлмаган кўп омиллар таъсир этади. Кўпчилик дунё миқёсидаги тури зотларда олиб борилган тадқиқотлар сутдорлик, сутнинг таркибидаги ёғ ва оксил ирсий белги эканлиги тан олинган. Бу маълумотнинг асослигини бирхил озиқлантириш ва сақлаш шароитидаги бир зотга мансуб тури қаторлар, оилалар, тури буқалар қизларининг маҳсулдорлигини ва уларнинг сутининг таркибини фарқ қилишини мақуллаш мумкин. Сигирларнинг сут белгилари оралиқ ирсий кўрсаткич ҳисобланади. Кейинги йиллар тадқиқотлари шундан далолат берадики, баъзи ҳолларда курсаткич оралиқ ирсий кўрсаткичликдан кўпроқ ота – оналарнинг насл потенциясига кўпроқ боғликлиги исботланган.

Ирсий ва ирсий бўлмаган белгилар сигирларнинг сутдорликнинг айрим белгиларига бир хилда таъсир этмайди. Сигирларнинг сутдорлигига ташқи муҳит кўпроқ таъсир этса, унинг таркибида сут ёғи ва оксил миқдори кўпроқ ирсиятга боғлиқ. Сигирлар сутдорлигининг қайси белгиларининг наслдан – наслга берилишини ирсият коэффиценти орқали белгилаш мумкин. ирсий коэффицент ўнлик бутун сонларда ифодаланади.

Меҳнат: Сут миқдорининг наслдан – наслга берилиши 0,3 – 0,4; сут ёғи – 0,5 0,6, оксил эса – 0,4 – 0,5 бўлади.

Ирсият коэффицентининг 1 га яқинлашиши шу белгининг наслдан – наслга юқори даражада берилишидан гувоҳ беради. Шу боисдан сутнинг миқдorigа нисбатан унинг ёғи ва оксилнинг ирсий коэффиценти анча юқори ҳисобланади. Агарда ирсий коэффицент қанча юқори бўлса унинг ўзгарувчанлик коэффиценти шунчалик паст бўлади, ёки у ташқи муҳит таъсирида камроқ ўзгаради. Ташқи муҳит омилини яхшилаш билан сигирларнинг сутини ёғи ва оксилни маълум давргагина кўпайтириш мумкин. Сигирлар сутининг ёғи ва оксилнинг ирсий коэффиценти анча юқори ҳисобланади. Агарда ирсий коэффицент қанча юқори бўлса унинг ўзгарувчанлик коэффиценти шунчалик паст бўлади, ёки у ташқи муҳит таъсирида камроқ ўзгаради. Ташқи муҳит омилини яхшилаш билан сигирларнинг сутини ёғи ва оксилни маълум давргагина кўпайтириш мумкин. Сигирлар сутининг ёғи ва оксилни қатор буғинларда ушбу белгилар билан чуқур ишлаш натижасида ошириш мумкин. Бу ишни режа асосида мақсадни қилиб ўтказиш керак.

Насилчилик ишларини режалаштиришда насилчилик ишининг генетик асосларини қуrol қилиб олиш керак.

4. Сут беzi бошқа безлардан ўларoқ доимий эмас, балки даврий ишлайди. Сигир туққандан сутдан чиққунгача давр лактация деб аталади. Сигирнинг сут ишлаб чиқаришини тугаши сутдан чиқиш дейилади. Сигир сутдан чиққандан то туққунгача давр куриқлик даври ҳисобланади. Сервис давр эса сигир туққандан оталангунгача бўлган давр ҳисобланади. Ҳозирги замонавий зотларда сигирларни яхши боқиш ва сақлаш натижасида лактация даври 300 ва ундан кўпроқ кунни ташкил қилади. Агар сигир 300 – 305 кун соғилса бу меёр

ҳисобланади, бу ҳолда сутдан чиққан давр 60 – 65 кунни ташкил қилади, бу тизимда ҳар йилда бир бош сигирдан биттадан бузоқ олиш таъминлайди.

Лактация давомида бир кунда соғиб олинадиган сут миқдори ўзгариб боради. Бутун лактация, соғим ойлари, декадалари ва кунлари бўйича сут миқдорини ўзгаришнинг лактация эгри чизиғи орқали ифодалаш мумкин. тури зотларга мансуб сигирларни лактация эгри чизиғи бир ғ биридан фарқланади. Баъзиларида ўзгариш кескин бўлса, баъзиларида секин кечади.

Лактация эгри чизиғи сигирнинг сут маҳсулдорлиги, индивидуал хусусияти, физиологик ҳолати ва албатта озиклантириш, сақлаш шароитларига боғлиқ.

Лактация эгри чизиғининг табиатига қараб сигирларнинг куйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин:

1. Баланд турғун лактация эгри чизиғи ёки фаолияти;
2. Баланд, турғун бўлмаган тез пасаядиган лактация. Тукқандан кейинги баланд кунлик соғим тез пасайиб кетади. Бунинг асосий сабаби нозик, юрак – қон томирлари мукамал ривожланмаган сигирлар узоқ вақт юқори сут бериш қобилиятига эга эмас.
3. Турғун паст лактация. Бундай сигирлар табиий равишда кам маҳсулдор бўлади.

Лактация эгри чизиғи сигирнинг сут маҳсулдорлиги, ирсий хусусиятлари, физиологик ҳолати, озиклантириш ва сақлаш шароитлари, ҳамда сигирларни йдириш (раздой) тизимида боғлиқ. Лактация табиатига сигирларнинг

Даври ҳам таъсир этади. Бирхил шароитда меёрда саыланиб, озиылантилган сигирларнинг лактация фаолиятида ыайта фарыни кузатиш мумкин.

Айникса ката фарқ турғун ва турғун бўлмаган лактацияга мансуб сигирларда учрайди.

Турғун лактацияга эга сигирлар бирхилда сут беради ва лактация давомида кунлик сут секин пасайиб боради, турғун бўлмаган сигирларда эса 1 ойдаги баланд сут маҳсулдорлиги кейинги ойларда кескин пасайиб кетади. Шу боисдан ҳардам турғун лактацияга эга бўлган сигирлар, турғун бўлмаган лактацияга мансуб сигирларга нисбатан кўпроы сут беради, кўпинча турғун бўлмаган лактацияга мансуб сигирлар муддатидан олдин сутдан чиқиб кетади.

Лактация эгри чизиғи унинг бошида юёори бўлади. Бу даврда кунлик сут миқдори ортиб бориб 2 – 3 ойда энг юқори нўқтага этади. Шундан кейин баъзиларида секин, баъзиларида тез пасаяборади, айниыса бу жараёнга навбатдаги бугозлик таъсир этади, баъзиларида сутнинг миқдори тез камайиб бориб сутдан чиқиб кетади. Сигирнинг лактация давомида берган сутнинг миыдори баланд нўқтага эришишнинг давомийлиги, ҳамда унинг пасайиш хусусиятига боғлиқ.

Илғор чорвадорлар сигирлардан юқори сут маҳсулдорлиги олишга эришганлар.

Нитка ва борба лақабли Кострома зотга мансуб сигирларнинг биринчисида турғун лактация бўлгани учун 12168 кг, борбада эса баланд турғун бўлмаган лактация натижасида фақат 7318 кг сут берган холос.

Сигирлар серсутлигининг 25% энг юқори суткалик сутга ва 75% лактация эгри чизиғининг пасайишига боғлиқ. Мустаҳкам конституцияга мансуб сигирлар кўпинча баланд суткалик сут ва турғун лактация эгри чизиғига мансуб бўлади. Серсут сигирларда энг баланд кунлик сутдан кейинги ойларда пасайиш 6%, камсут сигирларда эса 9 % ташкил этади. Лактациянинг тавсифи уни турғунлиги билан ифодаланади. Унинг турғунлиги иккинчи 90 – 100 кунликдаги сутни биринчи 90 – 100 кунликдаги сутга нисбатини фоиздаги ифодасига айтилади.

Серсут сигирларда лактациянинг турғунлик коэффиценти 97 – 99%, камсут сигирларда эса 75 – 78% ташкил этади. Лактациянинг турғунлиги В.Б.Веселовский формуласи асосида лактациянинг тўлақийматлили кўрсаткичини ҳисоблаш мумкин:

Бу кўрсаткич турғун лактацияга эга сигирларда 70 ва ундан кўп бўлиб, тез пастлайдиган лактация эгри чизиғига эга сигирларда 50 ва ундан паст бўлади.

Лактация эгри чизиғи тавсифи билан сигирларнинг сут маҳсулдорлиги ўртасида ўзвий боғлиқлик бўлгани учун танлаш ва жуфтлашда алоҳида эътибор беради.

Сигирларни баҳолашда нафақат энг баланд суткалик сут миқдори бўлиб ҳаммасидан унинг турғунлигига алоҳида эътибор берилади.

Бундай сигирлар фақат лактация давомида юори сут маҳсулдорлигига эга бўлиб олмасдан ҳаёти давомида ҳам кўп сут бериш обилиятига эга, шунинг учун бундай сигирлар насилчилик ишларида кенг фойдаланилади.

Сигирларнинг сутдорлиги уларнинг асосий хусусиятларидан хисобланиб уларни баҳолашнинг асоси булади.

Сигирлар сутдорлигини наслдан-наслга жуда мураккаб муаммо булиб у охиригача очиб берилмаган. Унинг мураккаблиги шундаки у бутун организм фаолиятининг натижаси хисобланади. Бундан ташкари сигирларнинг сут маҳсулдорлиги ирсий белги булмаган куп омиллар таъсир этади. Купчилик Дуне микёсидаги турли зотларда олиб борилган тадқиқотлар сутдорлик, сутнинг таркибидаги ёғ ва оксил ирсий белги эканлиги тан олинган. Бу маълумотнинг асослигини бир хил озиклантириш ва саклаш шароитидаги бир зотга мансуб турли каторлар, оилалар, турли букалар кизларининг маҳсулдорлигининг ва уларнинг сутининг таркибини фарк қилишининг маъқуллаш мумкин. Стгтрларнинг сут белгилари оралик ирсий курсаткич хисобланади. Кейинги йиллар тадқиқотлари шундан далолат берадики, баъзи холларда бу курсаткич оралик ирсий курсаткичлардан купрок ота-оналарнинг насл потенциясига купрок богликлиги исботланган.

Ирсий ва ирсий булмаган белгилар сигирларнинг сутдорлигининг айрим белгиларига бир хилда таъсир этмайди. Сигирларнинг сутдорлигига ташки мухит купрок таъсир этса, унинг таркибида су тёғи ва оксил миқдори купрок ирсиятга боглик. Сигирлар сутдорлигининг қайси белгиларининг наслдан – наслга берилишини ирсият коэффиценти оркали белгилаш мумкин. Ирсий коэффицент унлик бутун сонларда ифодаланилади. Масалан: сут миқдорининг наслдан-наслга берилиши – 0,3-0,4; сут ёғи – 0,5-0,6, оксил эса 0,4-0,5 булади.

Ирсият коэффиценти 1 га яқинлашиши шу белгининг наслдан – наслга юкори даражада берилишидан гувоҳ беради. Шу боисдан сутнинг миқдорига нисбатан унинг ёғи ва оксилнинг ирсий коэффиценти анча юкори хисобланади. Агарда ирсий коэффицент канча юкори булса унинг узгарувчанлик коэффицент шунчалик паст булади, ёки ташки мухит таъсирида камрок узгаради. Ташки мухит омилини яхшилаш Билан сигирларнинг су тёғи ва оксиллини маълум даврдагина купайтириш мумкин. Сигирлар сутининг ёғи ва оксиллини катор бугинларда Ушбу белгилар Билан чукур ишлаш натижасида ошириш мумкин. Бу ишни режа асосида мақсадли қилиб утказиш керак. Наслчилик ишларини режалаштиришда наслчилик ишининг генетик асосларини курул қилиб олиш керак.

Сут беэи бошка безлардан уларок доимий эмас, балки даврий ишлайди. Сигир туккандан сутдан чиккунча давр лактация даври деб айтилади.

Сигирнинг сут ишлаб чикаришинитугаши сутдан чиқиш дейилади. Сигир сутдан чиккандан то туккунгача давр куруклик даври булиб хисобланади. Хозрги замонавий зотларда сигирларни яхши боқиш ва саклаш натижасида лактация даври 300 ва ундан купрок кунни ташкил қилади. Агар сигир 300-305 кун согилса бу меъёр хисобланади, бу холда сутдан чиккан давр 60-65 кунни ташкил қилади, бу тизимда хар йилда бир бош сигирдан биттадан бузук олиш таъминланади.

Лактация давомида бир кунда соғиб олинадиган сут миқдори узгариб боради. Бутун лактация, соғим ойлари, декадалари ва кунлари буйича сут маҳсулдорлигининг миқдорининг лактация эгри чизиги оркали ифодалаш мумкин. Турли зотларга мансуб сигирларни лактация эгри чизиги бир- биридан фаркланади. Баъзиларида узгариш кескин булса, баъзиларида секин кечади.

Лактация эгри чизиги сигирларнинг сут маҳсулдорлигининг, индивидуал хусусияти, физиологик холати ва албаттақ озиклантириш, саклаш, шароитларига боглик.

Лактация эгри чизигининг табиатиға караб сигирларнинг куйдаги гурухларға булиш мумкин:

1. Баланд тургун лактация эгри чизиги ёки фаолияти;
2. Баланд тургун булмаган тез пасаядиган лактация. Туккандан кейинги баланд кунлик соғим тез пасайиб кетади. Бунинг асосий сабаби нозик, юрак-кон томирлари мукамал ривожланган сигирлар узок вақт юкори сут бериш кобилиятиға эга эмас.

3. Тургун паст лактация.. бундай сигирлар табиий равишда кам махсулдор булади.

Лактация эгри чизиги сигирнинг сут махсулдорлиги, ирсий хусусиятлари, физиологик ҳолати, озиклантириш ва саклаш шароитлари, ҳамда сигирларни йдириш тизимига боғлиқ. Лактация табиатидаги сигирларнинг туғиш даври ҳам таъсир этади. Бир хил шароитда меъёрга саклаб, озиклантирилган сигирларнинг лактация фаолиятида ката фаркни кузатиш мумкин.

Айниқса ката фарк тургун ва тургун булмаган лактацияга мансуб сигирларда учрайди.

Тургун лактацияга эга сигирлар бир хилда сут беради ва лактация давомида кунлик сут секин пасайиб боради. Шу боисдан ҳар доим тургун лактацияга мансуб сигирларга нисбатан сут купрок беради, купинча тургун булмаган лактацияга мансуб сигирлар муддатидан олдин сутдан чикиб кетади.

Лактация эгри чизиги унинг бошида юкори булади. Бу даврда кунлик сут микдори ортиб бориб 2-3 ойда энг юкори нуктага этади. Шундан кейин баъзиларида секин, баъзиларида тез пасая боради, айниқса бу жараёнга навбатдаги бугозлик таъсир этади, баъзиларда сутнинг микдори тез камайиб бориб сутдан чикиб кетади. Сигирнинг лактация давомида берган сутнинг микдори баланд нуктага эришишининг давомийлиги, ҳамда унинг пасайиш хусусиятига боғлиқ.

Илгор чорвадорлар сигирлардан юкори сут махсулдорлигини юкори сут махсулдорлиги олишга эришганлар.

Нитка ва борба лакабли Кострома зотга мансуб сигирларнинг биринчисида тургун лактация булгани учун 12168 кг, борбада эса баланд тургун булмаган лактация натижасида факат 7318 кг сут берган ҳолос.

Сигирлар серсутлигининг 25% энг юкори суткалик сутга ва 75% лактация эгри чизигининг пасайишига боғлиқ. Мустаҳкам конституцияга мансуб сигирлар купинча баланд суткалик сут ва тургун лактация эгри чизигига мансуб булади. Серсут сигирларда энг баланд кунлик сутдан кейинги ойларида пасайиши 6%, камсут сигирларда эса 9% ташкил этади. Лактациянинг тавсифи уни тургунлиги билан ифодаланади. Унинг тургунлиги иккинчи 90-100 кунликдаги сутни биринчи 90-100 кунликка нисбатини фоиздаги ифодасига айтилади.

Серсут сигирларда лактациянинг тургунлик коэффициенти 97-99%, камсут сигирларда эса 75-78% ташкил этади. Лактациянинг тургунлиги В.Б. Весаловский формуласи асосида лактациянинг тулакийматлилик курсаткичи ҳисоблаш мумкин:

$$ПП = \text{лактацияда соғиб олинган сут} \times 100 / \text{энг юкори кунлик сут} \times \text{лактация кунлари}.$$

Бу курсаткич тургун лактацияга эса сигирларда 70 ва ундан куп булиб, тез пастлайдиган лактация эгри чизигига эга сигирларда 50 ва ундан паст булади.

Лактация эгри чизиги тавсифи билан сигирларнинг сут махсулдорлиги уртасида узвий боғлиқлик булгани учун танлаш ва жуфтлашда алоҳида эътибор беради.

Сигирларни баҳолашда нафакат энг баланд суткалик сут микдари булиб қолмасдан унинг тургунлигига алоҳида эътибор берилади.

Бундай сигирлар факат лактация давомида юкори сут махсулдорлигига эга булиб қолмасдан ҳаёти давомида ҳам куп сут бериш қобилиятига эга, шунинг учун бундай сигирлар наслчилик ишларида кенг фойдаланилади.

МАВЗУ: ҚОРАМОЛЛАРНИНГ ГЎШТ МАҲСУЛДОРЛИГИ.

Режа:

- 1. Қорамол гўшти хакида тушунча.**
- 2. Қорамол гўшти хоссалари.**
- 3. Гўштнинг морфологик таркиби.**

Қўшимча адабиёт.

1. Эрнст Л.К., и др. Скотоводство М. Колос. 1984

Таянч иборалар:

Гўшт, тўкима, мускул, ёғ, суяк, бириктирувчи тўкима, тирик вазн, сўйим оғирлиги, сўйим чиқими, гўштнинг ейиладиган қисми, нимта, нимта бўлаклари, гўшtdорликнинг шаклланиши.

Ахолининг гўшт ва гўшт маҳсулотларига булган талабини кондиринишда қорамолчилиқни жадал ривожлантириш ва унинг маҳсулдорлигини янада ошириш, айниқса, катта ахамиятга эга. Чунки қорамол гўшти жамики гўшт етиштириш балансида (63-65%) салмоқли уринни эгаллайди. Гўшт инсон озиқасида муҳим ҳисобланади. Унинг таркибида организм учун керакли булган ҳаётбахш озиқлар - оксил, ёғ, минерал моддалар ҳамда А, Д ва В витамин гуруҳдаги куп микдорда мавжуд. Гўштнинг туйимли киймати унинг таркибидаги тулик кийматли оксиллар - глобулин, албумин, миозин ва бошқа оксил моддаларнинг микдорида боглик. Бу моддалар гўштнинг таркибида канча куп булса, шунча туйимли ва яхши хазм булиш хусусиятини эгаллайди. Гўштнинг организмда хазм булиш микдори уртача 95 фоизга тенг. Молларнинг гўшт маҳсулдорлиги курсаткичлари морфологик ва физиологик хусусиятлари билан белгиланади. Бундай хусусиятлар молларни парваришлаш даврида ирсиятлик ва озиқлантириш таъсирида шаклланади ҳамда ривожланади.

Гўшт маҳсулдорлиги сон ва сифат курсаткичлари билан характерланади. Сон курсаткичларига молларнинг тирик ва суйилгандаги вазни ҳамда суйим чиқими киради. Сифат курсаткичлари гўшт нимталарининг навли булаклари микдори, улар таркибидаги мускул, ёғ, суяк ва бириктирувчи туқималар нисбати, гўштнинг кимёвий таркиби ва калориялиги билан белгиланади. Молларнинг гўшт маҳсулдорлигини баҳолашда уларнинг бир килограмм семириши учун сарфлаган озиқа бирлиги эътиборга олинади. Шунингдек, тез етилувчанлиги, маълум бир давр оралигидаги усиш тезлиги ва семириш даражаси мутлоқ ва нисбий курсаткичларда аниқланади. Молларнинг тез етилувчанлик хусусиятлари куп ва сифатли гўшт олиш ҳамда уларни қайси ойлигида суйиш самарали эканлиги билан белгиланади. Гўшт маҳсулдорлигининг сон курсаткичлари, асосан молларни парваришлаш ва озиқлантириш даражасига боглик. Шулар билан бирга сифат курсаткичларига молларнинг зот хусусиятлари, жинси ва ёши катта таъсир курсади. Моллар суйилганда ёғ ва гўшtdан ташқари бошқа озиқ маҳсул-лотлари, хом ашё сифатида техникавий ва ички безлар олинади. Шулардан резги маҳсулотлари - калла-поча ва ички аъзолардан -жигар, буйрак, юрак, упка, корин ва бошқалар туйимлик даражаси билан икки категорияга булинади. Биринчи категориядаги резги маҳсулотларига жигар, буйрак, тил, юрак, елин ва бошқалар киради. Иккинчи категорияга эса корин, упка, талок ва бошқалар киради. Тери, шох, туёқ, жун, суяк техникавий хом ашё ҳисобланиб, енгил саноатда ишлатилади. Ички аъзоларнинг секрет чиқарувчи безлари - кориности, калконсимон, гипофиз ва бошқалар фармацевтик са-ноатида дори-дармонлар тайёрлашда кулланилади. Кондан кон уни ва албумин, суякдан эса суяк унлари ва гўшт-суяк унлари ҳамда елим олинади. Молнинг ички ёғлари озиқ-овқат тайёрлашда, ёғ олишда, совун ва глицерин ишлаб чиқаришда фойдаланилади.

Молларнинг гўшт маҳсулдорлиги уларнинг зотиға, ирсий хусусиятларига, озиқлантириш меъёриға, семириш ҳолатиға, ёшиға ва жинсига боглик узгаради. Шунингдек,

махсулдорликни характерловчи купгина белгилар наслдан-наслга утади. Лекии уларнинг наслга утиш даражаси турлича. Зот хусусиятларига боглик белгилари - гўшт нимталаридаги ёг тукималарининг микдори ва уларнинг тана буйлаб таркалиши, мускул ва ёр тукималарининг узаро нисбати, гўштнинг сифати ва усиши жадаллигининг наслга утиш коэффициента меъёри юкоридир.

Молларнинг озиклантириш меъёрига оид белгилар - семириш даражаси, озикаларнинг унумли сарфи, суйим чикими ва гўшт рангининг наслга утиш даражалари узаро кескин фаркданади. Бир хил белгиларда бу хусусиятлар паст булса, бошкаларида юкори булади. Шуни хам айтиш керакки, гўшт-махсулдорлиги курсаткичлари узаро узвий богликдир. Масалан, бузокларнинг тугилгандаги вазни зот хусусиятига ва сигирнинг катта-кичиклигига боглик. Молларнинг усиш тезлиги канчаки юкори булса, уларнинг семиришига шунча озикалар кам сарфланади. Ёш молларнинг бир килограмм усиши учун катта ёшдаги молларга нисбатан озикани кам сарфлайди. Шуни уктуриш керакки, озикалар харажати молларнинг семириш таркибига боглик. Ёш молларнинг семириши асосан мускул тукималари хисобига булса, катта ёшдаги молларда, эса, ёр тукималарининг купайиши хисобидан булади. Ёг тукималарининг хосил булиши учун мускул тукималарига нисбатан озикалар харажати 1,5-2,0 баравар ортик.

Қорамолларнинг гўшtdорлиги буйича селекция ишларини олиб боришда ва букаларни авлодининг гўшtdорлиги буйича бахолашда махсулдорлик хусусиятларининг наслдан-наслга утиши хамда уларнинг узаро корреляцияси хисобга олинади.

Гўштнинг морфологик таркиби

Гўштнинг таркибий кисми мускул, ёг, суяк ва бириктирувчи туки-малардан ташкил топган. Булар ичидан туйимлиги жихатидан мускул ва ёг тукималари мухим-ахамиятга эга. Гўшт сифати унинг морфологик ва гистологик белгилари, кимёвий хусусиятлари хамда таъми билан характерланади. Сифатни бахолаганда гўшт нимталаридаги мускул ва ёг тукималарининг узаро нисбатига эътибор берил ади.

Мускул тукимаси. Мускул тукимаси таркибига унинг туйимлилигини таъминловчи юкори сифатли аминокислоталардан - аргинин, лизин, метионин, триптофан, цистин ва бошка тулик кийматли оксиллар киради. Гўшт таркибидаги оксиллар микдори 15-25 фоизни ташкил этади. Унинг сифатини аниклаш белгиларидан бири - оксил-сифат курсаткичи (ОСК) хисобланади. Бу курсаткични аниклашда тулик кийматли оксил-триптофаннинг пай тукималари оксили - оксипролинга булган нисбати олинади. Нисбат курсаткичи юкори (4,8-5,0 ва ундан юкори) булганда гўштнинг биологик сифати, яъни оксил-сифат курсаткичи аъло даражада булади. Мускул тукималарининг усишига скелетнинг узгариши боглик. Эмбрионликдан кейинги усиш даврида узак-таянч скелетининг жадал усиши мускулларнинг ривожланиши ва катталашувини таъминлайди. Йирик мускуллар майда мускулларга нисбатан тез ривожланади.

Молларнинг усиши даврида мускул толалари йугонлашиб ва узунлашиб боради. Бузок тугилгандан кейинги биринчи ойида мускул толалари тез купаяди ва узаро бирлашиб, мускул тупламларини ташкил килади. Моллар усиб ва ривожланиб бориши билан улар катталашади хамда дагаллашади. Шунинг учун хам ёш молларнинг гўшти катта ёшдаги молларникига нисбатан майин ва ингичка толали булади. Ранги миоглобин микдорига караб узгаиб боради. Молларнинг ёши улгайиши, озиклантириш меъёрининг ошиши хамда мускулларнинг фаол ишлаши билан миоглобин микдори купайиб боради. Шунинг учун хам бузок ва тана гўштининг ранги катта молларникига нисбатан оч кизил рангда булади. Катта ёшдаги моллар гўшти - кизил, букаларники эса сигирларникига нисбатан тук рангда булади.

Гўштнинг ширалилиги унинг намни саклаб туриш хусусиятига хамда мускуллар оралигида хосил булган ёг микдорига боглик. Гўштнинг майинлиги эса бириктирувчи тукималарнинг сони, тар-калиши ва хусусиятлари, мускул тукималари ичида ва улар оралигида тупланган ёг микдори билан белгиланади.

Ёг тукимаси. Ёгнинг хосил булиши ва танада тупланиши хайвонлар хаётида мухим ахамиятга эга. Чунки ёр захираси озик мод-далар резерви сифатида хизмат килади.

Молларни озиклантириш ва саклаш шароитлари нокулай ва ёмон даврда организм уларни сарфлайди. Ёғнинг оксидланиши натижасида маълум микдорда сув хосил булади. Бундай хусусият молларни иссик ва курук иклимми минтакаларда урчитишда муҳим аҳамиятга эга. Шунинг билан биргаликда ёғ туқималари организмда куриклаш вазифасини бажаради. Гўшт нимталарини совитишда ва уни саклаб туришда хизмат килади ва тери ости ёғлари гўштни куриб ва котиб қолишдан асрайди. Ёғ туқималари ёғ хужайларидан ташкил топган бўлиб, улар узаро буш бириктирувчи туқималар билан ажралиб туради.

Ёғ туқималарининг кимёвий таркиби молларнинг ёшига боғлиқ узгариб туради. Ёш молларнинг ёғ хужайраларидаги ёғ соккачалари майда бўлиб, уларда катта ёшдаги молларникига нисбатан сув ва оксид микдори кўп. Кимёвий тоза ёғ микдори эса кам булади. Молларнинг ушиб улғайиши билан ёғ соккачалари катталашади, ёғ микдори кўпаяди, сув ва оксиднинг нисбий микдори эса камаяди. Ёғнинг ранги ҳам узгариб туради. Агарда бузоклардаги ёғлар ок ёки оч-сарик рангда бўлса, катта ёшдаги молларда ёғ билан биргаликда каротин тупланиши ҳисобидан ёғнинг ранги сарик ёки тук-сарик тусини олади. Суйилган моллар гўшт нимталаридаги ёғнинг солиштирма вазни молларнинг зотиға, озиклантириш меъёриға, ёшиға, жинсига қараб 3 фоиздан 55 фоизгача ва ундан ҳам юқори булади. Ёғ кам ёғ микдори ёш моллар танасида, ёғ кўп микдори бурдоқиланган ҳуқизлар танасида тупланади.

Ёғ тананинг қуйидаги қисмларида тупланади: қорин бушлигининг ички аъзоларида (бўйрак, юрак, қорин, ичак ва ҳоказо) тери ости хужайраларида тупланиб, тери ости ёғ туқламларини ҳосил қилади, мускуллар оралигида ва уларнинг ички тоалари оралигида тупланади. Гўштнинг сифатиға баҳо берилганда мускулларда ёғнинг тупланишлигиға алоҳида аҳамият берилади. Молнинг ушиб жараёнида ёғлар, аввало, ички аъзоларда, мускулнинг ичида ва оралигида, ундан сунг тери остида тупланади. Моллар рационида озика моддалари қамчил даврда биринчи навбатда тери ости ёғлари, сунгра мускул ёғлари ва ички аъзолардаги ёғлар ҳаражат қилинади. Мускуллар ва тоалар оралигида ёғларни пайдо бўлиши мармарсимон қуринишни ҳосил қилади. Гўштнинг мармарлиги уни майинлаштиради, юмшатади, таъми ҳамда тўйимлигини ошириб, сифатини яхшилади. Мускуллар оралигида ёғ қам тупланиши гўштнинг дағал бўлишиға ва таъмининг пасайишиға олиб қелади. Шунинг билан биргаликда танада ёғнинг ҳаддан ташқари кўп микдорда тупланиши гўштнинг таъмини, озик моддаларнинг ҳазм бўлишини ҳамда маҳсулотнинг овқатбўп хусусиятларини пасайтиради.

Ички ёғ, тери ости ва мускул оралигидаги ёғларнинг кимёвий таркиби ҳар хил. Ёғ қам соф ёғ микдори мускуллар тупланган ёғ сув ва оксиднинг нисбий микдори узгариб туради. Ички ёғлар юқори ҳароратда эрийди ва нисбатан йод сони паст булади. Шунинг учун ички ёғлар паст эриш ҳароратиға ва юқори йод сонига эға бўлган тери ости ҳамда мускул оралигидаги ёғларға нисбатан истеъмолға яроқсиз.

Моллар танасида туқималарнинг тупланиши ва мускуллар тулишганлигини семизлик даражаси билан аниқлаш мумкин. Молларнинг семизлиги ташқи қуринишда ҳамда тери ости хужайраларида тупланган ёғ туқималарини қўлда ушлаб қуриш услубида аниқланади. Танани қўлда тутамлаб қуриш усули ёғ туқималарининг ҳосил бўлиш навбати ҳамда тартибига қараб асосланган.

Моллар семириши билан ҳар хил тана қисмларида ёғ тупланиш жараёни бир хил ўтмайди. Ёғ қатламлари биринчи навбатда мол танасининг орқа, сунгра ўрта ва олдинги қисмида туплана бошлади. Шунинг учун молларнинг қанчалик эт олганлигини аниқлаш мақсадида ёғ туқламлари тананинг думғаза асосида, тос суяқ қўққиси қисмида, белида, охири қовурганинг ўртасида, қўлтиқ қисмидаги ўшловда, қўрак – елка бўғинида ва бўйнида тутамлаб ушлаб қурилади. Бу қисмлар салмоғи ва зичлиги қанча кўп бўлса, молнинг семизлик даражаси шунча юқори булади. Мускуллар ва тери ости ёғларининг яхши ривожланганлиги мол танасининг тулиштириб, ўнинг семизлик даражасини қўрсатади.

Молларнинг қуйдаги гуруҳлар – сигирлар, ҳуқизлар ва ёш моллар ўч ойлиғидан, то ўч ёшиға қадар семизлик даражаси бўйича ўч категорияға ажратилади. Юқори, ўрта ва паст категорияларға. Бўқа ва ўн турт қўнлиғидан ўч ойлиғиға қадар бўлган бузоклар биринчи ва иккинчи категорияларға бўлинадилар. Агар молларни ташқи қуриниши ва тана

кисмларидаги ёғ тупламларини ушлаб қуриш билан семизлик категориясини аниқлаш мумкин бўлмаса, у ҳолда моллар қушхоналар ёки гўшт комбинатларида назорат суйимидан утказилиб, давлат андозаси талаби асосида гўштнинг сифати аниқланган ҳолда молнинг семизлик даражаси белгиланади.

Бириктирувчи тукима. Бириктирувчи тукималар мол танасида, пай боғламлари ва фракцияларни ҳосил қилиб, ҳар хил аъзоларни бир-бири билан боғлайди ҳамда мускулнинг таянч таркиби бўлиб ҳисобланади. Бириктирувчи тукималарнинг асосий қисмини тулик қийматли бўлмаган оксиллар – коллаген ва эластин ташкил этади.

Бу оксиллар табиатдан паст туйимли бўлиб, гўштнинг сифатини пасайтиради ва унинг дағаллигини оширади. Гўшт нимталарининг ҳар хил қисмларидаги бириктирувчи тукималар уз таркиби билан бир-бирларидан ката фарқ қилади. Жумладан, семизлик даражаси юқори бўлган ва мускуллар яхши ривожланган моллар танасининг кет қисмида бириктирувчи тукималар миқдори энг кам. Бузоклар танасидаги бириктирувчи тукималар таркибида сув миқдори куп. Шунинг учун ҳам бузок гўшти ката ёшдаги моллар гўштига нисбатан анча Майин бўлади. Бириктирувчи тукималар миқдори ва унинг хусусиятлари купинча гўштнинг таъмини, ширалигини ва майинлигини таъминлайди. Бу курсаткичлар бир-бири билан боғлиқ бўлиб, мускул толаларининг диаметрига ҳамда гўштнинг таркибига сув ва ёғ миқдори ҳам алоқадор бўлади.

Суяк тукимаси. Суяк тукимаси моллар танасида факатгина таянч вазифасининг бажариб қолмай, балки минерал моддалар жамланмаси ҳисобланади. Унинг туйимлик сифати ута паст. Моллар танаси нимталарида суякнинг салмоғи 14% 27% гача. Суякнинг энг юқори нисбий оғирлиги бузоклар танасида кузатилади. Молларнинг усиши ва улғайиши билан суякнинг салмоғи пасая боради ва бу ҳодиса молларнинг биринчи 14 ойлигига қадар тез ўтади. Скелетнинг иликсимон ва ясен суяк қисмининг; усиши ҳар хил кечади. Ёш молларни усиш даврида скелетнинг иликсимон суяклари усиши жадалроқ ўтади. Ясси суяклар қисми эса нисбатан секинроқ ўсади. Шунинг учун ҳам ясси суякларнинг нисбий оғир-лиги иликсимон суяклар нисбий оғирлигидан паст. Скелетнинг бу икки суяк қисмлари усишининг ҳар хил тезликда ўтиши молларнинг тана тузилиши шаклига уз таъсирини курсатади. Гўштнинг маҳсулдорлик сифатини аниқлашда гўшт нимталари таркибидаги суякларнинг салмоғи ҳисобга олинади.

Назорат саволлар:

1. Гўшт ҳақида тушунча.
2. Гўштнинг озиқ-овқат қиймати.
3. Гўштнинг морфологик таркиби.
4. Гўштнинг кимёвий таркиби.
5. Гўштнинг гистологик тузилиши.
6. Гўштнинг тўйимлилиги.
7. Гўштдорликнинг шаклланиши.

Мавзу: Сут маҳсулдолиги

Режа:

1. Сутдорлик ва сутнинг таркибий қисмларининг наслга берилиши.
2. Лактация турлари ва табиати.

Назорат саволлари.

1. Сутдорликнинг наслдан-наслга берилиши.

2. Сутдорлик ва сутнинг таркибий кисмларининг наслга берилиши хусусиятлари.
3. Лактация таърифи.
4. Лактация турлари.
5. Лактациянинг хусусиятлари.

Таянч иборалар:

- наслдан-наслга берилиши;
- асосий белгилар;
- ирсият коэффиценти;
- узгарувчанлик коэффиценти;
- лактация;
- сервис даври;
- сутдан чиккан давр;
- сутдан чикариш;
- лактация эгри чизиги;
- лактациянинг тургунлик коэффиценти;
- лактациянинг тулакийматлик коэффиценти;
- ирсий омиллар;
- ташки омиллар.

Сигирларнинг сутдорлиги уларнинг асосий хусусиятларидан хисобланиб уларни бахолашнинг асоси булади.

Сигирлар сутдорлигини наслдан-наслга жуда мураккаб муаммо булиб у охиригача очиб берилмаган. Унинг мураккаблиги шундаки у бутун организм фаолиятининг натижаси хисобланади. Бундан ташкари сигирларнинг сут махсулдорлиги ирсий белги булмаган куп омиллар таъсир этади. Купчилик Дуне микёсидаги турли зотларда олиб борилган таджикотлар сутдорлик, сутнинг таркибидаги ёғ ва оксил ирсий белги эканлиги тан олинган. Бу маълумотнинг асослигини бир хил озиклантириш ва саклаш шароитидаги бир зотга мансуб турли каторлар, оилалар, турли букалар кизларининг махсулдорлигининг ва уларнинг сутининг таркибини фарк килишининг маъкуллаш мумкин. Стгтрларнинг сут белгилари оралик ирсий курсаткич хисобланади. Кейинги йиллар таджикотлари шундан далолат берадики, баъзи холларда бу курсаткич оралик ирсий курсаткичлардан купрок ота-оналарнинг насл потенциясига купрок богликлиги исботланган.

Ирсий ва ирсий булмаган белгилар сигирларнинг сутдорлигининг айрим белгиларига бир хилда таъсир этмайди. Сигирларнинг сутдорлигига ташки мухит купрок таъсир этса, унинг таркибида су тѐги ва оксил микдори купрок ирсиятга боглик. Сигирлар сутдорлигининг кайси белгиларининг наслдан – наслга берилишини ирсият коэффиценти оркали белгилаш мумкин. Ирсий коэффицент унлик бутун сонларда ифодаланилади. Масалан: сут микдорининг наслдан-наслга берилиши – 0,3-0,4; сут ѐги – 0,5-0,6, оксил эса 0,4-0,5 булади.

Ирсият коэффицентининг 1 га якинлашиши шу белгининг наслдан – наслга юкори даражада берилишидан гувох беради. Шу боисдан сутнинг микдорига нисбатан унинг ѐги ва оксилнинг ирсий коэффиценти анча юкори хисобланади. Агарда ирсий коэффицент канча юкори булса унинг узгарувчанлик коэффицент шунчалик паст булади, ѐки ташки мухит таъсирида камрок узгаради. Ташки мухит омилини яхшилаш Билан сигирларнинг су тѐги ва оксилани маълум даврдагина купайтириш мумкин. Сигирлар сутининг ѐги ва оксилани катор бугинларда Ушбу белгилар Билан чукур ишлаш натижасида ошириш мумкин. Бу ишни режа асосида максадли килиб утказиш керак. Наслчилик ишларини режалаштиришда наслчилик ишининг генетик асосларини курул килиб олиш керак.

Сут беи бошка безлардан уларок доимий эмас, балки даврий ишлайди. Сигир туккандан сутдан чиккунча давр лактация даври деб айтилади.

Сигирнинг сут ишлаб чикаришинитугаши сутдан чикиш дейилади. Сигир сутдан чиккандан то туккунгача давр куруклик даври булиб хисобланади. Хозрги замонавий зотларда сигирларни яхши бокиш ва саклаш натижасида лактация даври 300 ва ундан купрок кунни ташкил килади. Агар сигир 300-305 кун согилса бу меъѐр хисобланади, бу холда сутдан чиккан давр 60-65 кунни ташкил килади, бу тизимда хар йилда бир бош сигирдан биттадан бузук олиш таъминланади.

Лактация давомида бир кунда согиб олинадиган сут микдори узгариб боради. Бутун лактация, согим ойлари, декадалари ва кунлари буйича сут махсулдорлигининг микдорининг лактация ѐгри чизиги оркали ифодалаш мумкин. Турли зотларга мансуб сигирларни лактация ѐгри чизиги бир- биридан фаркланади. Баъзиларида узгариш кескин булса, баъзиларида секин кечади.

Лактация ѐгри чизиги сигирларнинг сут махсулдорлигининг, индивидуал хусусияти, физиологик холати ва албаттак озиклантириш, саклаш, шароитларига боглик.

Лактация ѐгри чизигининг табиига караб сигирларнинг куйдаги гурухларга булиш мумкин:

4. Баланд тургун лактация ѐгри чизиги ѐки фаолияти;
5. Баланд тургун булмаган тез пасаядиган лактация. Туккандан кейинги баланд кунлик согим тез пасайиб кетади. Бунинг асосий сабаби нозик, юрак-кон томирлари мукамал ривожланган сигирлар узок вакт юкори сут бериш кобилиятига эга эмас.
6. Тургун паст лактация.. бундай сигирлар табий равишда кам махсулдор булади.

Лактация ѐгри чизиги сигирнинг сут махсулдорлиги, ирсий хусусиятлари, физиологик холати, озиклантириш ва саклаш шароитлари, хамда сигирларни ийдириш тизимига боглик. Лактация табиидаги сигирларнинг тугиш даври хам таъсир этади. Бир хил шароитда меъѐрда саклаб, озиклантирилган сигирларнинг лактация фаолиятида ката фаркни кузатиш мумкин.

Айникса ката фарк тургун ва тургун булмаган лактацияга мансуб сигирларда учрайди.

Тургун лактацияга эга сигирлар бир хилда сут беради ва лактация давомида кунлик сут секин пасайиб боради. Шу боисдан хар доим тургун лактацияга мансуб сигирларга нисбатан сут купрок беради, купинча тургун булмаган лактацияга мансуб сигирлар муддатидан олдин сутдан чикиб кетади.

Лактация ѐгри чизиги унинг бошида юкори булади. Бу даврда кунлик сут микдори ортиб бориб 2-3 ойда энг юкори нуктага этади. Шундан кейин баъзиларида секин, баъзиларида тез пасая боради, айникса бу жараѐнга навбатдаги бугозлик таъсир этади, баъзиларда сутнинг микдори тез камайиб бориб сутдан чикиб кетади. Сигирнинг лактация давомида берган сутининг микдори баланд нуктага эришининг давомийлиги, хамда унинг пасайиш хусусиятига боглик.

Илгор чорвадорлар сигирлардан юкори сут махсулдорлигини юкори сут махсулдорлиги олишга эришганлар.

Нитка ва борба лакабли Кострома зотга мансуб сигирларнинг биринчисида тургун лактация булгани учун 12168 кг, борбада эса баланд тургун булмаган лактация натижасида факат 7318 кг сут берган холос.

Сигирлар серсутлигининг 25% энг юкори суткалик сутга ва 75% лактация эгри чизигининг пасайишига боглик. Мустахкам конституцияга мансуб сигирлар купинча баланд суткалик сут ва тургун лактация эгри чизигига мансуб булади. Серсут сигирларда энг баланд кунлик сутдан кейинги ойларда пасайиши 6%, камсут сигирларда эса 9% ташкил этади. Лактациянинг тавсифи уни тургунлиги билан ифодаланади. Унинг тургунлиги иккинчи 90-100 кунликдаги сутни биринчи 90-100 кунликка нисбатини фоиздаги ифодасига айтилади.

Серсут сигирларда лактациянинг тургунлик коэффиценти 97-99%, камсут сигирларда эса 75-78% ташкил этади. Лактациянинг тургунлиги В.Б. Весаловский формуласи асосида лактациянинг тулакийматлилик курсаткичи хисоблаш мумкин:

$$ПП = \text{лактацияда согиб олинган сут} \times 100 / \text{энг юкори кунлик сут} \times \text{лактация кунлари}.$$

Бу курсаткич тургун лактацияга эса сигирларда 70 ва ундан куп булиб, тез пастлайдиган лактация эгри чизигига эга сигирларда 50 ва ундан паст булади.

Лактация эгри чизиги тавсифи билан сигирларнинг сут махсулдорлиги уртасида узвий богликлик булгани учун танлаш ва жуфтлашда алохида эътибор беради.

Сигирларни бахолашда нафакат энг баланд суткалик сут микдари булиб колмасдан унинг тургунлигига алохида эътибор берилади.

Бундай сигирлар факат лактация давомида юкори сут махсулдорлигига эга булиб колмасдан хаёти давомида хам куп сут бериш кобилиятига эга, шунинг учун бундай сигирлар наслчилик ишларида кенг фойдаланилади.

Мавзу: Сут-гўшт йўналишидаги зотлар.

Режа:

1. Кушмахсулдор зотлар хусусиятлари.
2. Кунгир тусли зотли.
3. Мала-ола тусли зотлар.
4. Россиянмнг махаллий зотлари.
5. Генофонд зотлар.

Таянч иборалар:

Кушмахсулдор, кунгир, калташоҳ, қайиш, малла-ола, суяклари бакувват, хаётчан.

Кушмахсулдор ёки сут – гушт, гушт, сут, бошкача килиб айтганда универсал зотлар узига хос белгилар билан ажралиб туради.

Биринчи навбатда уларнинг танаси мутаносиб ривожланган, кукрак, корин ва сут аъзолари яхши ривожланган. Суяклари мустахкам, мускулатураси яхши ривожланган, оёклар кенг ва тугри куйилган, конституцияси мустахкам.

Ушбу зот корамолларида сут белгилари билан бирга гуштдорлик белгилари ҳам яхши ривожланган, шу боисдан сут ва гушт ишлаб чиқаришга ихтисослашган хужаликларда бу зот корамолларни урчитиш яхши натижалар беради.

Кушмахсулдор зотларнинг аксарияти тоғ ва тоғ ёнбағри шароитида яратилганлигини ҳисобга олсак улар тоғ ва тоғ ёнбағри шароитида, водийларда узини яхши ҳис этади ва юкори махсулдорлик курсатади.

Бу зотлар шароитга жуда ҳам талабчан эмаслиги, касалликларга чидамлилиги ва юкори сут ва гушт махсулдорлиги билан таърифланади.

Кушмахсулдор зотларга швиц, Кострома, олатов, карпан кунгир, Кавказ кунгир ва Урта Осиё шведлашган ва зебусимон кунгир корамоллар киради. Жамики кунгир тусли корамолларнинг уругбошиси булиб швиц зоти ҳисобланади, чунки у кухна зот ҳисобланади.

2.Швиц зоти дунёдаги энг кухна корамол зотларидан ҳисобланиб у швейцарияда яратилган ва дунёнинг купчилик мамлакатларига таркалган. В. Энглернинг маълумотларига Қарағанда, швиц корамоллари маҳаллий калташоҳли торфяник молларидан бундан 2000 йил олдин яратиш бошланган. Яъни маҳаллий корамоллар асрлар давомида корамолчилар томонидан мақсадли танлаш ва жуфтлаш натижасида соф ҳолда келтириб чиқарилган.

Селекциянинг дастлабки пайтларида серсут, сергушт ва кучли ишчи сифатларига эътибор берилган. Кейинчалик XX асрга келиб ишчи сифатларига ургу берилмай асосан сут ва гушт махсулдорлиги бўйича селекция ишлари олиб борилган. Танлов тадбирлари молларнинг кунгир туси бўйича алоҳида олиб борилган.

1879 йилда Швейцарияда швиц зотли корамолларнинг наслчилик китоби ва Ушбу зотни урчитиш ассоциацияси тузилган. Юкори махсулдор швиц зотлари дунёнинг купчилик мамлакатларига таркалган.

Хар хил табиий-иклим шароитида сақлаш ва озиклантириш технологияларида ва селекция услубида урчилган швиц зотли корамолларда турли хусусиятлар жамланган. Италия-Франция швицлари йирик, Австрия ва Германия кунгирлари компакт, серсут – сергушт.

Марказий ва Ғарбий Европа мамлакатларида урчирилаётган корамолларнинг сут махсулдорлиги 4200-5000 кг, сутнинг ёглилик даражаси 3,6-4,0% ташкил этади.

Ўзбекистон учун Ушбу зот режали бўлиб ҳисобланади. Унинг бузоклари 35-40 кг, сигирларининг вазни 450-500 кг, сут махсулдорлиги 2500-3500 кг, сутнинг ёглилиги 3,7%.

Швиц зотининг АКШ селекцияси.

Узининг сутдорлиги билан ажралиб туради. Сутдорлиги 5000-5600 кг, ёглилиги 4,0-4,1%.

Швиц зотининг Австрия селекцияси энг махсулдор гуруҳлардан ҳисобланади. Уртача сут соғими 4012 кг, сутнинг ёглилиги 4,0 %, оксил микдори 3,31%.

Урта Осиёдаги швицлаштирилган корамоллари .

Ўзбекистон, Тожикистон, Туркменистон маҳаллий зебусимон корамолларни швиц зоти билан частиштириш олиб борилган ва дурагай молларга оз микдорда бўлса ҳам олатов, кострома ва лебедин зотларнинг таъсири бор. Бундай частиштириш 1920-1930 йилларда режали тарзда олиб борилди. Натижада маҳаллий шароитга мослашган кунгир тусдаги дурагай сермахсул моллар подалари яратилади. Туркменистон ва Тожикистондаги шундай моллар « зебусимон-швиц» ва Ўзбекистон селекцияси – «швицлаштирилган» моллар деб юритилади.

Бу молларни яхшилашда швиц зотининг Америка ва Австрия селекцияларидан фойдаланиш яхши натижалар беради.

Кострома зоти. Зот XIX асрнинг охирларида Кострома губерниясида шакллланган. Бу маҳаллий қорамолларни Алгау ва Швиц қорамоллар билан чатиштириш натижасида моллар устида узок вақт селекция ишлари олиб бориш натижасида яратилган.

1934 йилда ташкил этилган Кострома давлат наслчилик рассадниги кунгир тусли молларни ҳисобга олиш ва зоотехния ишларини ташкил қилиш бўйича фаолият олиб борган. Бу зот 1944 йилда тасдиқланган.

Бузоқларнинг туғилганда 33-40 кг, сигирлари 500-600 кг, букалари 900-1100 кг, сути 3500-4000 кг, ёғлилиги 3,7-3,9%.

Олатов зоти. Ушбу зот Қирғизистон ва Қозғистоннинг Олатов тоғ олди минтақасида маҳаллий қирғиз молларнинг швиц зоти билан чатиштириш ва олинган дурағай молларнинг маҳсулдор гуруҳларини «уз ичида» урчитиш асосида яратилган. 1950 йилда зот деб тан олинган. Бузоқларнинг туғилгандаги вазни 30-35 кг, сигирлари 480-550 кг, букалари 850-1000 кг, сут маҳсулдолиги 3200-4000 кг, ёғлилиги 3,8-4,0%.

Лебедин зоти. Бу зот Украинанинг Сумек вилояти хужаликларида кул ранг Украина молларини швиц зоти билан чатиштириш натижасида келтириб чиқарилган. 1950 йили тасдиқланган. Бузоқлари 37-40 кг, сигирлари 550-600 кг, букалари 900-1000 кг, сути 3000-4000 кг, ёғи 3,8-4,1%.

Кавказ кунгир зоти. Маҳаллий қорамолларни швиц, Кострома, лебедин зотлари билан чатиштириш натижасида олинган дурағайларни «уз ичида» урчитиш билан яратилган. Бу моллар Арманистон, Гуржистон, Озарбайжон, Догистон хужаликларида яратилган. 400-500 кг, сигирлари, букалари 750-850 кг, сути 2500-3000 кг, ёғи 3,7-4,0%.

Карпат кунгир зоти –Карпат орти вилоят минтақасида маҳаллий рижка ва моқан молларини кунгир алп моллари билан чатиштириш натижасида келтириб чиқарилган.

Бузоқлари 30-36 кг, сигирлари 425-500 кг, букалари 700-800 кг, сути 3000-3500 кг, ёғлилиги 3,6-3,8%.

3 Малла тусли зотларнинг отаси швейцариянинг симментал зоти ҳисобланади. Бу зот швейцарияда келтириб чиқарилган, ягона фикр йук. Тахминга қура Y асрда шимолдан қучиб келган бургундлар молидан келиб чиккан.

1850 йилгача тана тузилиши ва туси бўйича бир хил бўлмаган.

Симментал зотли қорамоллар Европа ва Америка мамлакатларида кенг фойдаланмоқда.

Бузоқлари туғилганда 35-45 кг, сигирлари 550-600 кг, букалари 900-1000 кг. Суйим чикими 56-58%. Сути 3500-4000 кг, ёғлилиги 3,6-4,0%.

Малла ола зотлар –малла ола украин хили

Сичёв хили

Чул хили

Урал хили

Қолгабуйи хили

Сибир хили

Узок шарк хили

Қозоки хили

4. Россиянинг маҳаллий зотлари.

Бестужев зоти- маҳаллий қорамолларни шортгорн, голланд ва симментал зотлари билан чатиштириш натижасида келтириб чиқарилган.

Тамбов кизил зоти- маҳаллий қорамолларни тирол ва Пашков зотлар билан чатиштириш натижасида келтириб чиқарилган.

Кизил Горбатов зоти- маҳаллий қорамолларни тирол зоти билан чатиштириш натижасида келтириб чиқарилган.

Курган зоти- маҳаллий қорамолларни Тагил, симментал, Ярославл ва шортгорн зотлари билан чатиштириш натижасида келтириб чиқарилган.

Украина кулранг зоти.

Пинцгау зоти.

Юрин зоти.

Назорат саволлар:

1. Қўшмахсулдор зотлар таърифи.
2. Қўнғир зотлар.
3. Малла зотлар.
4. Маҳаллий зотлар.
5. Қўшмахсулдор зотлар афзалликлари.
6. Қўшмахсулдор зотлар тана тузилиши ва конституцияси.

Мавзу: Гўшт йўналишидаги зотлар.

Режа:

1. Гўштдор зотлар таърифи.
2. Англия ва Шотландия зотлари.
3. Франция зотлари.
4. Италия зотлари.
5. Дурагай зотлар.
6. Колмикистон ва қозоғистон зотлари.

Қўшимча адабиётлар.

1. А.Б. Ружевский, Д.Д. Рубан, П.П. Бердник. Породы крупного рогатого скота. Изд. Колос, 1980.

Таянч иборалар:

зот; зот яратиш; яратилиш сабаби, муҳит; зотга ҳос хусусиятлар; махсулдорлик кўрсаткичлари; наслчилик ишининг аҳоли; такомиллаштириш.

1. Гўштдор зотлар узига ҳос хусусиятларга эга. Улар узларининг тана тузилишлари, махсулдорлиги ва Гўштининг сифати билан қолган зотлардан фарқ қилади.

Улар тез етилувчанлиги, вазнининг катталиги, яйловдан яхши фойдаланиши, иқлим шароитларига мослашиши билан ҳам ажралиб туради.

Ушбу зотлар қорамол Гўшти етиштириш жараёнида биологик жиҳатдан мослиги билан урин тутади.

Жаҳондаги ҳар бир Гўштдор зот уз фазилатларига эга, яъни у ёки бу хусусиятлари билан бошқаларидан ажралиб туради.

Ҳар бири маълум минтақа, иқлим, озикалар шароитига мослашганлиги билан таърифланади.

Дунёда яратилган Гўштор зотли моллар минтакавий бир неча гуруҳларга бўлинади: Англия-Шотландия, Франко- Италия , Америка , Африка, Осиё ва хоказо. Бу минтакалардаги Гўштор зотлар узларининг келиб чиқиши, шароитга мослаштиш, махсулдорлик ва биологик хусусиятлари буйича бир бирларидан кескин фарк қилади.

Гўштор зотлар ичида яратилиш даври буйича қадимий ва қупчилиги учу нота зоти булганлари Англиянинг Гўштор зотлари ҳисобланади(герфорд, шортгорн, Абердин-ангус, галловей, хайланд ва хоказо).

Герфорд зоти. ХҮШ-ХІХ асрларида Англияда саноатнинг ривожланиши, ката шаҳарлар пайдо бўлиши, аҳолининг қупайиши Гўштга булган талабни оширди. Натижада Гўштор қорамоллар яратиш буйича наслчилик ишлари бошлаб юборилди. Шу йуналишда герфорд зоти ҳам шаклланади. У герфорд графлигида маҳаллий қорамоллар узок вақт давомида танлаб ва саралаб, махсулдор гуруҳларини «уз ичида» урчитиш натижасида яратилган. Бундай моллар доимо яйлов шароитида устирилган боич табиий – иқлим шароитига яхши мослашган, озиқаларга талабчан булмаган, чидамли моллар яратилган.

Қорамол эгаси Эйтон томонидан 1846 йили ташкил қилинган наслчилик китоби ката урин тутади, натижада наслчилик ишлари тугри йулга қуйилиб йирик ишчи моллари Гўштор молларга айлантирилди. Моллар танаси мутаносиб ривожланиб юкори Гўшторлик шаклланди. ХІХ асрнинг биринчи ярмида бошқа давлатларга, жумладан АКШ, Канада, Мексика, Австралия, Янги Зеландия ва Жанубий Америкага олиб кетилди.

Туси кизил, калласи, туши, корнининг паст қисми, оёқлари ва дум ок рангда.

Янги тугилган бузоклари 28-35 кг, сигирларининг вазни 600-650 кг, буқалариники 800-900 кг . суйим чикими 60-70 %. Гўштнинг сифати ва таъми буйича алоҳида ажралиб туради ва Абердин – ангус кейин иккинчи уринда туради. Сутдорлиги 1200-1800 кг, ёғлилиги 3,9-4,0%.

Шортгорн зоти. Бу зот Англиянинг шимолий- шарқий қисмида жойлашган Йорк ва Дурган графлигидаги Тиса дарёсининг бўйларида ХҮШ асрнинг охирларида урчитилган маҳаллий моллардан келиб чиққан. Молларни танлаш ва саралаш натижасида махсулдор моллар подалари шаклланган 1822 йилда наслчилик китобининг ташкил қилиниши зотни такомиллаштиришдаги асосий турткиларидан бири булди. ХҮШ асрнинг охирига келиб шортгорн моллари серГўшт ва серсутлилиги учун бошқа мамлакатларга кенг ёйилди. Ушбу зот АКШ, сунг Жанубий Америка ва австралияга олиб кетилиб соф ҳолда ва маҳаллий қорамоллар билан қатиштиришда кенг қулланилган. ХҮШ аср охири ва ХХ аср бошларида Англияда сутга булган талабининг ошиши сутдор хилини яратишга сабаб булди. АКШ фермер селекционер шортгорн зотли қорамолларни маҳаллий қорамоллар билан қатиштириш натижасида серсут хилини яратган.

Англия ва Шотландия Голловий ва хайланд зотларини шортгорн буқалари билан қатиштириш ишлари уларнинг Гўшт махсулдорлиги сифатини яхшилашга қаратилган. АКШда шортгорн молларини «браман» зебулари билан қатиштириш натижасида Санта – гертруда зоти яратилган. Шортгорн зотли қорамолларнинг асосий туси кизил ёки ок булади. Кизил ва ок тусдаги моллар урчитилганда кизил-ола, човқар ва бошқа рангдаги моллар олинади. АКШда асосан кизил тусли шортгорнларини урчитишга эътибор берилади. Шотландия ва Англияда шортгорн молларининг човқар ва ок туслари учрайди.

Шортгорн зоти сут ва Гўшт йуналишидаги ҳоллари булгани учун тана тузилиши фарк қилади.

Яъни тугилган бузокларнинг тирик вазни 27-32 кг, сигирларининг вазни 550-650 кг, буқалари 850-1000 кг, новвослари яйловда 1000- 1200 г сутқалик семиришга эришади, суйим чикими 65-72% . Сут – Гўшт йуналишидаги сигирлар 2700-3200 кг сут бериб ёғлилиги 3,7-3,9 %.

Абердин –ангус зоти. Бу зот Шотландиянинг шимолий-шарқий қисмида Абердин ва Ангус графликларида маҳаллий Гўштор қорамолларни яхшилаш асосида шакллантирилган ва шу икки графликлар номи билан аталган.

Зот билан наслчилик ишлари ХҮШ аср охирларидан бошланган. 1879 йили Шотландияда Ушбу зотни урчитиш жамоаси тузилган. 1862 йили биринчи наслчилик китоби чоп этилган.

АКШга биринчи Абердин – ангусс моллари 1873 й фермер Жорж Грант томонидан Канзас штатида олиб борилган ва маҳаллий моллар Билан чатиштиришда фойдаланилган.

Канадага Абердин – ангус зотли қорамоллар 1876 йили олиб борилган.

Ўзбекистонга 1955-1957 йиллардан бошлаб келтирилган ва маҳаллий қорамоллар Билан чатиштирилган.

Абердин – ангус зоти Гўштдор қорамоллар ичида энг тез етиладиган ва энг юкори сифатли Гўшт берадиган туркумига киради. Уларнинг асосий туси қора ва узлари тукол, яъни шохсиз.

Хозирги вақтда бу зотнинг кизил туси подалари ҳам яратилган.

Бузокларнинг тугилгандаги вазни 24-27 кг, сигирлариники 500-550 кг, букалари 800-950 кг. Жадал устирилган новосларнинг вазни 15016 ойлигида 450-465 кг етади, суйим чикими 65-70%.

2. Англия ва Шотландиянинг Гўштдор зотли қорамоллар генофондига хайланд, голловей, девон, ва суссекс зотларини киритиш мумкин.

Хайланд зоти. Бу зот Шотландия ва Англиянинг тоғ ҳудудларида учрайди. Ута чидамли, йил буйи тоғ яйловларида бокилади.

Голловей зоти. Бу молларнинг ватани Шотландиянинг голловей округи ҳисоланади. Голловей зоти Британияролидаги энг қадимги зот ҳисобланади. Шотландиянинг маҳаллий молларидан келиб чиққан ва тоғ шароитида шаклланган.

Янги тугилган бузокларининг вазни 25030 кг, сигирлариники 450-500 кг, букалариники 700-750 кг, суйим чикими 60-65%. Туси қора ёки кукиш жигар рангда.

Девон зоти. Ватани Англиянинг Девон графлиги ҳисобланади. Маҳаллий молларни танлаш ва саралаш натижасида келтириб чиқарилган. Туси кизил рангда . моллари йирик сигирлари 550-600 кг, букалари 900-100 кг тез етилади, бурдокиланади.

Суссекс зоти. Бу зотнинг ватани Англиянинг Ла-Манш бугози киргоқларида жойлашган Суссекс графлиги ҳисобланади. Улар маҳаллий молларни танлаш ва саралаш натижасида шаклланган.

Суссекс сигирлари арпушт, бузокларини яхши парвариш қилади. Сигирларининг вазни 550-600 кг, букалари 850-1000 кг . бу зотнинг тукол моллар подасин ҳам яратилган.

Франциянинг Гўштдор зотлари йириклиги, жадал узиш тезлиги, ҳам танасининг мускуллар Билан тулишганлиги ва Гўштида ёғ микдорининг нисбатан кам булиши Билан бошқа зотлардан кескин фарқ қилади. Франциянинг машҳур Гўштдор зотларидан шароле, лимузин ва ок аквитан қорамолларини келтириш мумкин.

Шароле зоти. Шароле зотининг ватани Франциянинг марказий қисмидаги Шарол вилоятим ҳисобланади. Бу зот маҳаллий моллардан келиб чиққан. Унинг шаклланишида симментал зотларнинг ҳам иштироки ҳақида маълумотлар бор. Дастлаб у моллар сут ва Гўшт йуналишида булиб, ишчи хайвон сифатида фойдаланган. Кейинги даврларида факат молларнинг Гўштдорлиги шакллантиришга қаратилиб, туси буйича ҳам селекция олиб борилиб ҳозирги шароле зоти пайдо булган. Бу борада 1864 йили Чоп этилган наслчилик китоби ҳам муҳим урин тутди.

Шароле зотли молларнинг туси сарғиш малла рангда, бурун кузгуси кизғиш, қалласи қиска, пешонаси кенг, буйни қиска, қуқраги чуқур кенг, лекин бироз эгилган, орқа қисми кенг. Шароле зоти йирик моллар гуруҳига киради, оёқлари уртача баландликда, танаси чузик, унинг олдинги, урта ва орқа қисми бир хил узунликда, суяги дағал, жун қоплами юпка. Моллар бақувват ва чидамли. Франция хужалиқларида 13-14 ёшга қадар 4, уринлардан бирини эгаллайди. Бундай меъёрадаги вазн узиш тезлиги уларнинг 2-3 ёшгача давом этади.

Янги тугилган бузокларининг вазни 40-48 кг, айримлари 60-65 кг боради. 8 ойлигида вазни 270-340 кг, 18 ойлик ургочи таналар 430-450 кг етади. Сигирларнинг вазни 750-1000 кг, букалариники 1200-1500 кг. Бурдокиланган моллар вазни асосан мускул туқимаси ҳисобида ортади, ёғ оз ҳосил булади. Сигирларининг сут маҳсулдорлиги 1800-2000 кг, ёғлилиги 3,9-4,0%.

Шароле зоти устида олиб борилаётган селекция ишлари зотнинг вазнини саклаш, Гўшт маҳсулдорлигини яхшилаш, серпуштлигини ошириш, кейин тугиш ҳолатларини камайитишга қаратилган.

Лимузин зоти. Лимузин зоти Франциянинг жанубий-гарбий ва марказий вилоятларида яратилган.

Келиб чиқиши маҳаллий қорамолларга хос булиб, Гўштдорлик йуналишида шакллантирилган.

Танаси йирик, тез етилувчан, мускуллари яхши ривожланган, суяклари ингичка. Бу моллар 1850 йиллардан яхши танилган. XIX асрга қадар Ушбу зот қорамоллардан сут ва Гўшт олинган. 1900 йиллардан бошлаб Гўшт махсулдорлигига ихтисослашган. Лимузин қорамолларнинг туси кизил, сарғиш кизил, кизил кунгир рангда. Бурун атрофий, куз атрофий сарғиш туклари билан копланган. Мустахкам конституцияси, танаси серГўшт, калласи қиска, пешонаси ва юзи кенг, кураги тулишган, елкаси ва бели тугри ва кенг, орка қисми чузиқ, мускуллари қучли ривожланган, оёқлари мустахкам, лекин бироз ингичка. Франция, АКШ ва Англияда қатор зотлар билан чаштирилмоқда.

Зот сигирлари серпушт, 6-8 ойлик бузоқлар 100 бошга 90 тани ташкил этади. Сут махсулдорлиги 1800-2000 кг, ёғлилиги 4,6-4,9%.

Молларнинг Гўштдорлик сифатлари юқори булишлиги билан ажралиб туради. Янги тугилган бузоқларнинг вазни 36-40 кг, 7-8 ойлигида 250-300 кг этади. Уртача кунлик семириш 900-1000 г. Букачалар жадал устирилганда 12 ойлигида 500 кг этади ва 70% суйим чикими боради. Сигирлар вазни 600-650 кг, букалари 1000-1200 кг. Фермер хужаликларида саноат чаштиришида фойдаланилса бўлади.

Ок аквитан зоти. Бу зот Францияда яратилган булиб йирик Гўштдор зот ҳисобланади. Молларнинг туси ок, тана тузилиши буйича лимузин молларига ухшаш. Лекин улардан йирик ва мускуллари нисбатан яхши ривожланган. Сигирларнинг тирик вазни 650-700 кг сут махсулдорлиги 1200-1500 кг. Молларнинг узиш тезлиги « Гўшт нимталарининг чикими» буйича шаролле, симментал ва мен-анжу зотларига яқин туради. Бу зотнинг яратилиши, биологик хусусияти, махсулдорлиги ва наслчилик йуналиши тугрисида ҳозирча бизга етиб келган аниқ ва тулиқ маълумотлар кам.

Мен- Анжу зоти. Бу зот Франциянинг шимолий-гарбий қисмида яратилган. Француз зотлари ичида вазни ва тана узунлиги буйича энг йириги булсада, лекин тананинг баландлиги буйича ок аквитан зотли молларидан кейин туради. Молларнинг туси кизил ола, сигирларнинг вазни 750-800 кг. АКШ тажриба хужалиги маълумотларига кура энг юқори кунлик узишга эга.

Гўштнинг морфологик таркиби буйича шаролле, симментал зотларига яқин. Сигирларнинг сут махсулдорлиги 2400-2700 кг, ёғлилик даражаси 3,6-3,8% бошқа зотлар билан саноат чаштиришида ота зоти булиб хизмат қилади. Мен-анжу зоти Франциянинг муҳим Гўштдор зотли генофондларидан ҳисобланади.

4. Италия қорамоллари Гўштдор зотлар ичида энг йириклари ҳисобланади. Улар буйдор, танаси Гўштдор, суяклари нисбатан енгил.

Киан зоти. Бу зот Италиянинг Валде Киан водийси ҳисобланади. Маълумотларга биноан Клан зоти бундан 3500 йил илгари маҳаллий қалта шохли ок тусдаги қорамоллардан келиб чиққан. Узок давр моллардан Гўшт олинган ва қишлоқ хужалиқ ишларида фойдаланилган. 1927 йилдан бошлаб Гўштдорлик белгиларини ривожлантириш буйича наслчилик ишлари олиб борилган.

1932 йили наслчилик китоби ташкил этилган. Ҳозирги кунда клан зоти юқори Гўштдорлик хусусиятларига эга, энг баланд буйли моллар ҳисобланади. Букаларнинг яғрин баландлиги 170-173 см, сигирлариники 160 см бўлади. Энг асосий белгиларидан бири-уларнинг жадал ва давомли узишидир. Тирик вазн буйича бу зотга етадиган зот йуқ. Рекордчиларнинг барчаси клан зоти вақиллари. Жумладан, молларнинг 6 ойлигидаги рекорд вазни- 429 кг, 12 ойлигида 695 кг, 15 ойлигида 905 кг, 18 ойлигида 1137 кг ва қата ёшдаги букалар вазни 1820 кг.

Клан зотли моллар Бразилия, Аргентина, Канада қаби мамлакатларда тарқалган. Туси кулранг – оқиш рангда. Бузоқлари сарғиш ва куз атрофий қора рангда. Бу ранг 3-4 ойгача сақланиб сунг оқариш бошланади. Молларнинг танаси узун, калласи уртача, шохлари қалта, елка ва бели кенг, тугри, мускуллар билан яхши тулишган, тананинг орка қисми тугри ва

узун, суяги ингичка лекин мустахкам. Яйлов шароитига яхши мослашган булиб, дагал озикалардан самарали фойдаланилади.

Янги тугилган бузокларининг вазни 42-55 кг, танаси ясси, энсиз, лекин оёклари узун ва нисбатан ингичка. Ёш молларнинг вазн усиши жадал булиб, уларнинг уртача кунлик семириши 1000-1400 г тугри келади. 6 ойлик бузокларнинг вазни 225-260 кг, сигирларининг вазни 680-750 кг, букалари 1300-1500 кг. Сигирлари 900 кг, букалари 1800 кг гача етади. Бурдокиланган молларининг суйим чикими 60-65 %. Молларнинг Гўшти Майин, юкори таъмга эга ва ширин, асосан мускуллардан иборат булиб, ёг тукималари кам тупланган булади.

Клан зоти холда урчитиш Билан бирга бошка зотларни такомиллаштиришда фойдаланишмоқда. Марказий Италияда махаллий мареман зотини чатиштиришда ишлатилган ва 1934 йили дурагай моллар асосида янги қорамол зоти «кианомареман» яратилган.

XIX асрнинг бошларида клан зоти яхшиловчи зот сифатида кулланилиб, романол ва кулранг подол қорамоллари билан чатиштиришдан қорамолларнинг Янги Гўштдор зоти маркеджан яратилган.

Ўзбекистонга клан зотли букаларнинг уруги 1970 йили олб келинган. ЎзЧИТИ олимлари томонидан кора – ола зотли сигирларни клан букалари Билан чатиштириш ишлари олиб борилган. Дурагай моллар она зоти тенгдошларига нисбатан 10-12% куп Гўшт берган.

Италиянинг Гўштдор қорамоллари генофондига Романол, Маркеджан, Пемонт зотларини киритиш мумкин. Бу зотли молларнинг яратилишида клан зоти катнашган.

Романол зоти. Бу зот Италиянинг ок ва кулранг зотларидан бирин хисобланади. Унинг териси қорамтир рангда, бурун кузгуси кора. Зотнинг чуқур ва оёклари калтарок. Сигирларининг вазни 650-700 кг. Бошка зотлар Билан чатиштиришда ота зоти сифатида фойдаланилади.

Маркиджан зоти. Бу зотли моллар подолск, романол, ва клан зотларини чатиштириш натижасида яратилган. У клан зотига нисбатан пастрок, енгил суяклилиги ва мускулларининг яхши ривожланганлиги Билан клан зотидан фарк килади. Сигирларнинг вазни 650-700 кг. Бошка зотлар Билан чатиштирганда ота зоти сифатида фойдаланилади.

Пемонт зоти. Бу зот қорамоллар бошка Италия зотларига нисбатан танаси кичик, лекин куш мускулли. Сигирларнинг тирик вазни 580-600 кг.

5. Американинг барча Гўштдор зотлари зебу моллари асосида келтириб чиқарилган. Зебуларнинг асосий хусусиятлари иссиқ иқлим, қон паразит касалликларига чидамлилиги ва дагал озикаларнинг самарали фойдаланиши Англия ва Италия Гўштдор зотлари Гўштдорлик ва Гўшт сифати олинган.

Барча зотлар Америка браманларини Англия, Франция Гўштдор зотлари Билан чатиштириш натижасида яратилган. Улар яратиш усули бир хил, яъни дурагайлашдан олинган молларда браман зотининг қони 3/8 ва маданий Гўштдор зотининг қони 5/8. қон даражаси шу меъёрга (3/8-5/8) бўлган моллар махсулдорлик ва биологик хусусиятлари Билан самарали деб топилган. Американинг Гўштдор дурагай зотларига қуйдагилар қиради: Санта-гертруда, брагус, браферд, бифмастер, шарбрей, барзона, бифалло ва хоказолар.

Америка брамани. Америка брамани(зебуси) биринчи маротаба Хиндистоннинг уч хил зебуси(гузур, нелор, гир) келиб чиққан ва уларга Бразилиянинг улкан бўйли индубразил зотининг қони қуйилган. Индубразил зоти ҳам гузур, нелор ва гирлар иштирокида яратилган. Маълумотлар бўйича Америка браман зотида тахминан 60% гузур зебусининг қони, 20% нелор зебусининг қони мавжуд. Зот Гўштдор зотларни яратишда ота ёки она зоти булиб хизмат килади.

Санта-гертруда зоти. У АКШ, Техас штати Санта –гертруда туманида яратилган. Ушбу зот браман ва шортгорн зотларини дурагайлагш натижасида яратилган. Дурагайларда 5/8 шортгорн ва 3/8 браман қони бор бўлган дурагайлар «уз ичида» урчитиш натижасида яратилади.

Зот яратиш ишлари 1920 йилда бошланиб ката миқдорда дурагайлар олиниб, уларни танлаш қаридош ишлари кенг фойдаланган. Гўштдор тана тузилишига эга бўлган моллар инбридинг саралашда фойдаланишган. Жумладан «манки» ва «ЭЛ капитал» лакабли

букаларнинг авлодлари якин кариндошлик урчитишда ишлатилиб, зотнинг шаклланишига муҳим аҳамият касб этган, 1940 йил зот деб тан олинган.

Санта-гертруда молларини Техас штатида яратилиши уларнинг иссиқ иқлим шароитига яхши мослашиши, хайётчанлиги, қон паразит кассалларига чидамлилиги, яйловларнинг дағал озикалардан фойдаланиш ва бошқа хусусиятларининг янада кучлироқ мустаҳкамланиши таъминланган.

Санта-гертруда зотли молларининг тана тузилиши мустаҳкам, Гўштдор. Молларнинг туси қон қизил, қизкиш тусдагилари учрайди. Териси тигиз, қалта жун билан қопланган.

Янги туғилган бузоқларнинг вазни 29-30 кг, 8 ойлигида 220-240 кг, сигирлар вазни 550-650 кг, букалари 900-1200 кг. Сигирларнинг сут махсулдорлиги 1500-1800 кг, ёғлилиги 4,5-5,0%. Гўштга парваришланган новвослари 15 ойлигида 400-550 кг етади. Уларнинг уртача қунлик усиши 1000-1200 грамм, суйим чикими 60-66%.

Кейиги 30 йилда Ушбу зот моллари 35 мамлакатга тарқалган.

1967 йилда Ўзбекистонда хусусан Бахмалхужалигида жойлаштирилади. Бу шароитга яхши мослашиб, насл ва махсулдорлик хусусиятларини тулик намоён қилди. Сигирларнинг вазни 500-700кг, букаларнинг вазни 950-1200 кг. Бу хужаликда маҳаллий қорамолларни Санта –гертруда зоти Билан яхшиланиш ишлари олиб борилган ва II-III бугин дурагайлар олинган. Бу дурагай моллар она зотига нисбатан икки барабар йирик бўлиб сифати кескин фарқ қилади. Ҳозирги кунда Санта-гертруда зотли молларнинг Янги олинган ва бу борада селекция ишлари олиб борилмоқда.

Брангус зоти . Ушбу зотнинг ватани АКШ нинг жанубий қисмидаги Луизиана, Техас ва Оклахона штатлари ҳисобланади. Унда 5/8 абердин –ангус, 3/8 браман қони бор. Иш 1940 йилда бошланиб 1949 йилда ниятига етказилган.

Брангус зотли қорамолларнинг туси қора ва тоқол. Қизил тусли моллар ҳали бор, ҳозир улар алоҳида подаларда парвариш қилинмоқда. Сигирларо вазни 530-600 кг.

Брафорд зоти. Бу АКШнинг Мексика қурғаси минтақасида яратилган. Бу иш 1925 йилда бошланиб 25 йилда ниятига етган. Унда 5/8 герефорд ва 3/8 браман қони бор. Туси қизил боши, қорнининг остки қисми ва оёқлари оқ рангда, танаси Гўштдор мутаносиб тузилишда. Сигирлар вазни 600-650 кг. Бу зот ҳам иссиқ иқлим шароити учун муҳим Гўштдор генофонд ҳисобланади..

Бифмастер зоти. АКШнинг Техас штатида яратилган. Унда 50% браман, 25% шортгорн ва 25% герефорд зотининг қони бор. Бу зот 1930 йилдан бошлаб Том Ластер томонидан шакллантирилган. Ластер 6 белгига эътибор берган: юввошлиги, хайётчанлиги, пуштдорлиги, вазни, тана тузилиши, сут махсулдорлиги. Туси бўйича танлашга эътибор берилмаган, шунинг учун туси хилма- хил-оқ, қунгир, қизил-қунгир. Моллар асосан шохли, шохсизлари ҳам учрайди.

Сигирларнинг тирик вазни 650-680 кг. Бу зотли моллар тана тузилиши бўйича йирик ва Гўштдор.

Шарбрей зоти. АКШнинг жанубий-шарқий ҳудудида яратилган. Шароле букалари Билан браман сигирларини қатиштириш натижасида олинган дурагайларни «уз ичида» урчитиш натижасида келтириб чиқарилган. Ушбу зотда 7/8 шароле ва 1/8 браман қони бор. Зот ҳили ёш бўлиб уни такомиллаштириш бўйича селекция ишлари олиб борилмоқда.

Барзона зоти. Бу зот африкандер, герефорд, Санта –гертруда ва Аббердин-ангус зотларини қатиштириш натижасида келтириб чиқарилган. Бу зот 1942 йили АКШнинг Аризона штатида Ф.Н . Бард томонидан герефорд зотли сигир ва ургочи таналарни африкандер букалари Билан қатиштириш амалга оширади. Олинган дурагайларни 2/3 қисми Санта-гертруда ва 1/3 қисм Аббердин-ангус букалари Билан қатиштирилган.

Бу икки усулдан олинган дурагай молларнинг энг мақбул гуруҳлари «уз ичида» урчилган. Молларнинг туси қон қизил, жигар рангда бўлади. Бу зотли моллар узларининг туси ва тана тузилиши Билан Санта – гертруда зотини эслатади.

Бирфало зоти . АКШнинг Калифорния штати трайс вилоятида яратилган. Бу зотли моллар энг ёш бўлиб, сунгги йилларда Бад Бисало томонидан шакллантирилган. Маҳаллий қорамоллар бизон Билан қатиштирилган дурагайлар яратилган.

Энг макбули 5/8 қорамол ва 3/8 бизон конли моллар танлаб олинган ва уларни энг махсулдорлари «уз ичида» урчитилган.

Бифало зотининг энг кимматли сифатлари кишининг огир шароитига чидамлилиги ва ута дагал, паст туйимли озикаларни хазм қилишлиги ҳисобланади. Бу зотли қорамоллар урмонзорлари минтакаларда Гўштдор қорамолчиликни яратиш ва уларни самарали узлаштиришда кул келади.

6. Колмигистон ва Қозоғистонда Гўштдор қорамолларнинг колмик ва козоги окбош зотлари яратилган.

Колмик зоти. Бу зот утмишда Осиё туридан келиб чиккан ҳамда Хитой ва Урта Осиёнинг тоғлик ва чул яйловларда шакллантирилган. Бу моллар кучмачи колмик кабилаларининг куп асрлар давомида асосий бойлиги булган. Кучмачи колмик кабилалари ХҲII асрнинг бошида Кулундук чулига ва унинг атрофидаги жойларга кучиб утишган ва бу минтақада 50 йил давомида кучмачи холда ҳаёт кечиришиб, қорамол купайтирилган. Шундан сунг улар Волга ва Дон дарёлари оралигидаги минтақага кучиб утганлар ва бу ер уларнинг доимий ватани булиб колган. Янги табиий-иклим шароитига колмик моллари тез мослашган. Ва такомиллаштирилган. Улар йил давомида яйлов шароитида сакланиши ва бокилиши Билан бошқа зотлардан фарк килади. Моллар мустаҳкам конституцияли булиб, шароитга чидамли, кам хосил яйловлардан самарали фойдаланиш, баҳор ва киш ойларида яйловда тез семириш хусусиятларига эга.

XIX асрнинг охири, XX аср бошларида Ростов ва Куйи Волга буйи хужаликларида, йирик мол олиш ва Гўштнинг сифатини яхшилаш мақсадида колмик зотига симментал ва шортгорн зотларининг кони куйилган. Лекин бу тадбир чегараланган тартибда булиб зотга сезиларли таъсир курсатмаган.

1918-1920 йиллардан бошлаб зотнинг наслчилик хужаликлари ва рассадникларини тузилиши зотнинг такомиллаштиришига ижобий таъсир курсатган. 1934 йили наслчилик китоби ташкил қилиниб наслдор моллар назорат қилина бошлади.

Колмик зотли моллар асосан кизил тусда булиб боши, танасининг остки қисми ок рангда булади. Молларнинг қалласи уртача қатталиқда, пешонаси қиска, юз қисми чузикрок, бурун кузгуси қора, шохлари пешонаси билан бир текисликда жойлашган. Моллар уртача қатталиқда(ягрин қаландлиги 126-127 см) танаси мутаносиб тузилишда (тана қия узунлиги 150-155 см) , ягрини, бели, елка тугри,кенг, куқраги чуқур(69-70 см)ва кенг (41-42 см), куқрак туш чуққиси яхши ривожланган, оёқлари мустаҳкам, тугри қуйилган, муқкуллари яхши ривожланган.. териси қиш фаслида қалин ва узун жун Билан қопланади. Зот тарқибиди икки хил моллар бор. Бир гуруҳи Гўштдор тез етилувчан, иккинчиси Гўштдор кеч етилувчан.

Биринчи хилдаги моллар иккинчисига нисбатан қичик булиб, вазни паст, етилиши тез, суяги енгил, териси юпка ва суйим қичими 2-4% юқори.

Янги туғилган бузукларнинг вазни 22-25 кг, 8 ойлигида 200-220 кг. Сигирлар вазни 450-500 кг, айримлари 650-700 кг етади. Озикалари 750-850 кг, айримлари 1000-1100 кг бу зот моллари жадал боқилганда тез усади ва Гўшт беради. Новвосқалари 16-18 ойлигида вазни 400-450 кг тугри келади.

Яйловда боқилган ахталар 700-800 г семириш беради. Суйим қичими 55-60%. Бурдоқи молларниқи 68-70% етади. Сигирларнинг сут махсулдорлиқи 1100-1500 кг, ёғлиқи 4,1-4,5%.

Ўзбекистонга 1957-1960 йилларда олиб қелинган ва Қорақолпоқистонга жойлаштирилиб маҳаллий молларни яхшилашда фойдаланилган, лекин қон паразит қасаллиқларига қидаммағанлиқи учун фойдаланиш тухтатилган. Колмик зоти устида олиб қорилаётган наслчилик ишлари уларнинг тез етилувчанлиқи ва Гўшт махсулдорлиқини, ҳамда Гўштнинг сифатини яхшилашга қаратилган.

Қозоқи окбош зоти. Бу зот қоззоғистрн ва Россиянинг жанубий-шарқий қисмида қескин иқлим шароитида яратилган. 1930 йилдан бошлаб Гўштдор зотли молларни яратиш мақсадида Қозоғистон ва Куйи Волга буйи хужаликларида қоқи ва колмик молларини қерефорд зотли буқалар Билан қатиштириш ишлари олб қорилди.

Олинган дурағай молларнинг асосан учинчи авлод махсулдор гуруҳлари танланиб «уз ичида» урчитилган. Буларни танлашда юқори Гўштдорлик сифатлари ҳамда маҳаллий иқлим

шароитига мослашганлик хусусиятлари эътиборга олинган. Натижада Гўшtdор моллар подалари шакллантирилган ва улар 1950 йили зот булиб тасдикланган. Зотнинг махсулдорлик сифатларини шакллантиришда танлаш ва саралаш ишлари ҳамда уларнинг саклаш тизими, бузоқларни сигирларга эмизиб парваришлаш усули хал килувчи омил булган.

Козоки окбош моллар табиий яйлоалардан унумли фойдаланиш ва кескин континентал иклимга мослашиши хусусиятга эга. Моллар ёзнинг иссик ва кишнинг совук кунларида ҳам яйловда сакланади. Яйловнинг туйимли даврида тез семиради ва юкори кобилиятини курсатади. Козоки окбош зотли молларнинг туси герефорд зотли молларга хос кизил рангда боши, тананинг корин ости кисми, оёклари ва думининг попик кисми ок рангда. Моллар уртача катталиқда(сигирларнинг ягрин баландлиги (123-125 см), кукраги чукур (68-70 см) ва кенг(42-45 см), танаси мутаносиб ривожланган(тана кия узунлиги 152-156 см), суяклари мустахкам, танаси кенг, мускуллари Билан яхши тулишган. Моллар кишга киришда калин ва узун жун Билан копланеди.

Янги тугилган бузоқларнинг вазни 27-30 кг, 8 ойлигида 220-240 кг етади. Сигирларнинг вазни 500-550 кг, букаларнинг вазни 800-900 кг, айримлари 1100 кг боради. Молларнинг Гўшtdорлик сифати яхши.

1957-1960 йилларда Ўзбекистонга олиб келиниб махаллий моллар билан чатиштирилган ва дурагай моллар олинган.

1980-1985 йиллардан бошлаб молларнинг наслдор гурухлари олиб келинган ва репродуктор фермалари мавжуд. Булар каторига Жиззах вилоятининг Зомин туманидаги «Беш булок», Хоразм вилоятидаги «Кизил жар», ҳамда Кораколпогистоннинг Бузатов туманидаги Гўштчилик хужаликларини келтириш мумкин. Чатиштиришдан олинган дурагай молларнинг тирик вазни, Гўшtdорлик хусусиятлари ҳамда Гўштнинг сифати кескин курсатилган. Зот устида олиб борилган селекция ишлари уларни соф холда урчитиш билан такомиллаштириш, вазн усишини тезлаштириш ва Гўшtdорлик шаклини яхшилашга каратилган.

Назорат саволлар.

1. Гўшtdор қорамоллар хусусиятлари.
2. Гўшtdорлик белгилари.
3. Бузоқларни ўстириш.
4. “Сигир бузоқ” тизими.
5. Урғочи таналар ва ғунажинларни ўстириш.
6. Ёш қорамолларни ўстириш, етилтириш ва бўрдоқилаш.
7. Яйловда боқиш.

Мавзу : Корамолчиликда наслчилик ишлари.

Режа:

- 1 . Наслчилик ишининг ахамияти.
2. Ўзбекистонда наслчилик ишининг ахволи.
3. Наслчилик ишининг ташкилий шакли.
4. Корамолчиликда наслчилик ишининг истикболлари.

Таянч иборалар:

наслчилик иши; - наслчилик заводи; - наслчилик хужалиги; - наслчилик идораси; селекцион марказ; элевёр; ирсият; узгарувчанлик; - корреляция.

1. Наслчилик иши билан шугулланмасдан туриб соҳада ижобий натижаларга эришиб булмайди. Кишлоқ хужалик хайвонлари асосий ишлаб чиқариш воситаси сифатида доимо такомиллаштиришга муҳтож, у канчалик серунум ишласа, шунчалик куп маҳсулот етказиш мумкин.

Хайвонлар канчалик такомиллашган булса улар шунчалик озикалардан самарали фойдаланадилар. Наслдор хайвонларгина куп сифатли маҳсулот бериш имкониятига эга.

Шу боисдан мамлакат микёсида, ёки аниқ бир хужаликда ҳар доим наслчилик иши билан шугулланиш, такомиллаштириш тинмай хайвонларни яхшилаш ва уларнинг маҳсулдорлигини тухтовсиз ошиб боришини таъминлайди.

Корамолчиликда ҳар бир хужаликни йуналиши, тизими, наслчилик ишининг ҳолатига қараб наслчилик ишининг у ёки бу хилини танлаб олишга тугри келади, ёхуд наслчилик ишида етарли самарага эришиб булмайди.

2. Ўзбекистонда наслчилик иши, айниқса корамолчиликда ҳозирги кун талаблари даражасида деб булмайди. Мамлакатимизда иқтисодий соҳада руй берган ислохатлар давлат мулкисининг хусусийлаштириш натижасида пайдо булган наслчилик корхоналари уз вазифаларини тулик бажармаяптилар. Мамлакат микёсида ягона соҳада наслчилик ишини олиб бориш режаси йук. Шу боисдан турли хил мулк шаклидаги хужаликларда тизимсиз наслчилик ишлари олиб борилмоқда.

Айниқса 1995 йил «Наслчилик хакида» ги қонуннинг ишлагаслиги натижасида купчилик наслчилик заводлари, хужаликлари асоссиз хусусийлаштириб юборилиши натижасида уларга асл подалар тугатиб юборилди, хайвонларнинг насл ва маҳсулдорлик қурбаткичлари кескин пасайиб кетди.

Шу қонун бўйича давлат наслчилик заводлари, зот бўйича таянч хужаликларининг давлат тасарруфида қолиши, уларнинг давлат томонидан қуллаб – қувватлаши хакидаги бандлари ҳам бажарилмай қолди.

Айниқса янгидан ташкил қилинган ширкат ва фермерн хужаликларида наслчилик ишининг асоси, бирламчи зоотехника ва наслчилик ҳисоб-китобларининг юритилмаслиги соҳани боши берк қучага қириб қолишга сабаб булмоқда.

Республика микёсида 10 йиллар мобайнида тнаслчилик ишининг асосий қуролларидан бири булган сунъий уруғлантириш умуман эътибордан четда қолмоқда, натижада машҳур буқалар уруғдари етарли микдорда республика уруғ банкида бўлишига қарамасдан, ширкат, фермер, ва дехқон хужаликларида сигирлар ва ургочи таналар қелиб қикиши номаълум, қупинча зотсиз буқалар билан уруғлантириши натижасида насл хусусиятлари паст, маҳсулдорлиги қам моллар подаси.

Республика, вилоят, туман микёсида наслчилик ишлари мувофиқлаштириш ишлари йулга қуйилмаган. Ширкат, фермер хужаликларида наслчилик сервис ҳолати йулга

куйилмаганлиги, Ушбу хужаликларида умуман наслчилик ишлари олиб борилмаётганидан далолат беради.

Янги мулк шаклидаги хужаликларида наслчилик ишларини юритишга илмий-тадқиқот ва олийгоҳлар олимларини ҳам жалб этишни такоза этади.

3. Барча чорвачилик соҳаларидаги наслчилик ишлари республика кишлоқ ва сув хужалиги вазирлиги бошчилиқ қилади. Унинг таркибидаги чорвачилик бош бошқармаси бу ишларга бош қош.

Давлат наслчилик инспекцияси – наслчилик бўйича республикада олиб бориладиган ишларга раҳбарлик ва назорат қилади, шунингдек « наслчилик бўйича» қонуннинг бажарилишини қафолатлайди.

Узнаслхизмат ва унинг вилоятларидаги булимлари, қорамолчилиқ хужаликларида наслчилик ишларини йулга қуйиш, сунъий уруғлантириш, бирламчи зоотехния ва наслчилик ҳисоб-китобларни юритиш, наслик моллар билан таъминлаш билан шугулланади. Бу тизим ҳусусийлаштирилган.

Давлат наслчилик бирлашмалари, бу ташкилот наслчилик сиёсатини утқазади, наслчилик хужаликларида билан ишлайди.

Зотларни туманлаштириш, бонитировка утқазиш, янги қатор ва оилалар яратиш ва бошқа ишлар билан шугулланади.

Давлат наслчилик заводлари – улар бир зотни такомиллаштириш, унинг Янги қатор ва оилаларни барпо этиш, наслдор буқалар етиштириш ва уларни авлодлари бўйича баҳолаш, наслдор моллар билан наслчилик хужаликларини таъминлаш билан шугулланади.

Наслчилик хужаликларида наслчилик заводларидан олган молларни тугри урчитиб, қупайтириб бошқа хужалиқларга сотади.

Бу хужалиқлар ҳам чуқур наслчилик ишлари билан шугулланадилар.

Элевер- бу ихтисослашган ташкилот бўлиб «буюртма» жуфтлашдан олинган 3-4 ойлик эркак бузоқларни жадал устириб 12 ойлигида баҳолашни амалга оширади. Шу пайтда уларнинг тирик вазни, экстерер ва конституцияси, жинсий фаолияти, улардан уруғ олиниб махсус хужалиқ сигирлари уруғлантирилади ва қизларининг махсулдорлиги бўйича баҳоланганга қадар 30-40 минг дона уруғ тайёрланади. Агар буқа яхшиловчи деб тан олинса улар уруғлари қенг фойдаланилади.

Селекция марказлари – улар бир неча чорвачилиқ соҳалари бўйича тузилади. Улар ИТИ ёки мустиқил бўлишлари мумкин.

Бу марказларини зотни наслчилик ишининг сиёсатини урнатади, уни такомиллаштириш режаларини тузиб уни бажаришни амалга оширади. Улар турли урчитиш усуллари ва наслчиликнинг бошқа қуролларидан фойдаланган ҳолда зотни такомиллаштиришга эришади.

4. Республикамиз қорамолчилигининг равнақи биринчи навбатда наслчилик ишига боғлиқ. Чунки ишлаб чиқариш воситасини (асосий пода) такомиллаштириш туриб махсулот ишлаб чиқаришни ва унинг самарадорлигини ошириб бўлмайди.

Шу боисдан биринчи навбатда давлат наслчилик бирлашмаси ва Узнаслхизмат қорхоналарининг фаолиятини жонлаштириш, уларни фермер – наслчилик хужалиқлари билан ишларини ташкил қилиш қерақ.

Наслчилик заводлари учун «наслчилик ҳақида»ги қонун талабларидан қелиб чиқиб уларга имтиёзли фаолият қурсатиш учун шароит ва давлат қуллаб – қувватлашни ташкил этиш.

Элеверлар ва селекция марказлари ишини давлат бюджети асосида қайтадан ташкил қилиш.

Мамлақат миқёсида наслчилик иши билан шугулланган шахсларни моддий ва манъавий рағбарлантириш.

Наслик моллар қурғазмалари ва қимошди савдоларини ташкил қилиш.

Қорамолчилиқда сунъий уруғлантиришни тиклаш.

Ёш наслдор молларни тугри устиришни ташкил этиш.

Чет эллардан зотдор моллар, уларнинг уруғларини олиб қелишни ташкил қилиш.

Назорат саволлари:

1. Наслчилик ишининг шакли ва тизими.
2. Наслчилик хизмати.
3. Наслчилик заводлари.
4. Наслчилик хўжаликлари.
5. Элеверлар.
6. Наслчилик ишининг истиқболлари.
7. Наслчилик ишида кўргазмалар.

Мавзу : Қорамолчиликда наслчилик ишининг назарий асослари.

Режа:

1. Наслчилик ишининг назарий асослари.
2. Урчитиш усуллари.
3. Буқа тизимлари.
4. Сигир оилалари.

Қўшимча адабиётлар:

1. Эрнст Л.К. Скотоводство. М. Колос. 1984.

Таянч иборалар:

Ирсият, ўзгарувчанлик, белгиларнинг қайтарилиши, корреляция коэффицентлари, соф зотли, чатиштириш, дурагайлаш, буқа тизими, завод тизими, генеологик тизим, сигир оиласи.

1.Сут ва гушт қорамолчилигида наслчилик ишининг назарий асосларини генетика-белги ва хусусиятларини, ирсияти ва ўзгарувчанлиги, органик оламни эволюциясини таъминловчи фан.

Қорамолларнинг насл ва махсулдорлик хусусиятларини такомиллаштиришда дастлаб микдорий белгиларга эътибор берилади, улар ирсият ва ташки мухит таъсирида шаклланади. Сутдор қорамолчиликда унга: тирик вазн,305 кунлик сут, сутнинг таркибидаги ёғ ва оксил микдори, сут бериш тезлиги ва бошқалар. Гушtdор қорамолчиликда эса тирик вазн, тез етилувчанлик ва 1 кг вазн ортириш учун сарфланган озика бирлиги.

Сутдор ва гушtdор қорамолчиликда селекция самараси генетик нуктаи-назардан белги ва хусусиятларни ўзгарувчанлик, ирсият, белгиларни такрорланиши ва корреляция коэффицентларига боглик.

Сут йуналишида ўзгарувчанлик коэффиценти: вояга етган сигирлар тирик вазни 10-15% ; лактация давомидаги сут микдори 20-30% ; сутдаги ёғ микдори 5-9%, оксил 4-9%, сут бериш тезлиги 10-15%.

Қорамолларда асосий белги ва хусусиятларнинг наслдан –наслга берилиши(ирсият коэффиценти) турлича булади. Сигир сутининг ёғлилиги ирсий коэффиценти (h^2) анча

юкори(0,6-0,78), худди шунингдек оксил буйича (0,5-0,7). Сут махсулдорлиги буйича ушбу курсаткич 0,3-0,42га тенг, вояга етган сигирлар тирик вазни буйича -0,37, сутга озика билан хак тулаш 0,2-0,48.

Белгиларни такрорланиш коэффиценти хам белгилар буйича бир хил булмайди. Сигирларда лактация сут микдорининг такрорланиши 0,59-0,73, сутнинг ёглилиги 0,49-0,74, оксиллиги 0,54-0,79 ; биринчи туккан сигирларнинг лактациясининг биринчи 3 ойдаги сут билан бутун лактация уртасидаги коэффицент 0,81-0,90, хайвонларнинг тугилгандаги тирик вазни билан вояга етгандаги вазни орасидаги коэффицент 0,19, гуштдор бузукларни онасидан ажратгандаги ва 13 ойлигидаги вазни орасидаги коэффицент 0,48.

Сутдор корамолчиликда уларнинг асосий белгиларининг коррелятив боғланишини билиш муҳим аҳамият касб этади, бундай боғланишлар тирик вазн ва сутдорлик, сутдорлик ва сутнинг ёглилиги, сутдорлик ва унинг таркибидаги оксилнинг микдори, сутнинг таркибидаги ёғ ва оксил, елинини ривожланиши ва сут махсулдорлиги ва хоказолар.

2. Урчитиш усуллари:

Соф зотли.

Урчитиш.

Чатиштириш.

Дурагайлаш.

3. Саралаш (жуфтлаш) кам ривожланган селекцион белги ва хусусиятларни кучайтириш учун кулланилади. Шу мақсадда кам махсул сигирлар ирсий хусусияти кучли букалар уруги билан сунъий уруглантирилади. Зотга янги ижобий хусусиятлар киритишда хам жуфтлаш кул келади. Маҳаллий молларни тез етилувчанлиги оширишда, тирик вазнини кучайтиришда гуштдор корамоллардан фойданилади. Белгилари мос булмаган хайвонларни жуфтлашга йул куймайди. Акс холда авлодда салбий белгилар буртиб чиқиши мумкин.

Наслчилик – селеция ишида мақсадга мувофиқ ва аниқ шароитда у ёки бу жуфтлаш усулини, ёки бир подада хам гомоген ва гетероген жуфтлаш усулини куллашни тоқозо этади.

Гетероген жуфтлаш гомоген жуфтлаш ва инбред депрессиясининг кунгилсиз ходисаларини тугрилашга имкон беради. Молларнинг мақсадга мувофиқ хилини яратиш учун олдин гетероген сунг гомоген жуфтлаш амалга оширилади. Наслчилик ишида гомоген ва гетероген жуфтлашни уз вақтида алмаштириб турилиши пода, тизим(линия) ва зотни жадал такомиллаштишига олиб келади.

Молларни бука тизимлари буйича урчитиш наслчилик заводлари ва наслчилик хужаликларида олиб борилади ва зотни такомиллаштиришни назарда тутаяди. Бир бука тизимида мансуб хайвонлар махсус танлаш ва жуфтлаш натижасида ирсияти бақувват моллар гуруҳи яратилади.

Бука тизими – зот ичидаги машҳур букадан таркалаган узига хос сифат белгиларга эга булган кариндош моллар гуруҳидир. Улар селекция йуналиши асосида уругбошиси селекцион белгиларини уз авлодларига утгазиб беради. Хар бар бука тизимида хос булган моллар, аввало, зотнинг асосий йуналишига жавоб бериши керак.

Корамолчиликда бука тизимлари буйича урчитиш илк бор Англияда ака-ука Колинглар, Т.Бетсон ва бошқалар томонидан Шортгорн зотида завод селекциясида куланган. Сунгра бу усул бошқа мамлакатлар селекционер олимлари томонидан бойитилган. Тизимлар, оилалар ичида урчитиш ва улар орасидаги кросслар хар хил чорва моллари ва парандаларда селекцион ишлар олиб борган Ўзбекистонлик олимлар А.А. Атбанян, Э.Ю.Карчевский, У.Н.Носиров, М.И.Самарцев, Р.Г.Василев, С.Азимов ва бошқаларни алоҳида курсатиш лозим. Зотни такомиллаштириш буйича 20-30 йиллик селекция ишлари натижасида яратилган тизим уз ичида урчитилади. Бука тизимлари ичида бир неча хилини курсатиш мумкин. Улар наслдорлик сифатлари, таркалиши, ва тан олинishiга қараб қуйидагиларга бўлинади.

Завод тизими. Махсус и/ч режасида, зот андозаси талаблардан анча устун турадиган бука ва унинг махсулдор авлодлари тизимини шаллантирилади. Бу тизим зотни такомиллаштиришга қаратилган барча селекцияон белгиларини мужассамлаштирган ва уларни авлодга утказиш қобилияти билан ажралиб туради.

Завод тизими давлат комиссияси томонидан урганиб чиқилади ва тасдиқланади. Хар бир зотда 3-4 тасдиқланган завод тизими бўлиши шарт.

Генеологик тизим. Бу тизимни бир насдор букадан тарқалган уларни махсулдор авлодлар гуруҳи ташкил этади. Генеологик тизим қўпинча формал тизим ҳам деб аталади. Чунки улар селекцияон белгилари бўйича танланмаган ва махсус жуфтлаш режаси асосида яратилган булмасада, наслчилик фермаларда қўпчиликни ташкил қилади.

Генеологик тизимидаги машхур букалар янги завод тизимини яратишга асос бўлиши мумкин.

Кариндош гуруҳ . Бу гуруҳ уз тана тузилиши ва наслдор сифатлари билан фаркланадиган айрим букаларнинг авлоди. Махсус селекция ишлари олиб борилганда ушбу гуруҳ завод тизимига айланиши мумкин. Завод тизими устида систематик равишда махсус режа асосида махсус селекцияон иш олиб борилмаса, у генеологик тизимга тушиб қолиши мумкин.

Завод ва генеологик тизимлар оралигида асосий фарқ тизим таркибидаги молларни сифатида ва ушбу тизимларни яратиш услубидадир. Аксарият генеологик тизимлар завод тизимига нисбатан узок давр мобайнида сакланади. Завод тизимида машхур букаларнинг 3-5 бугин авлоди қиради. Юкори савияда олиб борилган селекция ишлари завод тизими ҳаётини узгартириши мумкин. Улар ҳаётчанлиги тизим давомчиларининг танлаш ва авлодларини қўпайтиришга боғлиқ. Авлодлар сифатини доимо баҳолаб бориш асосида тизимининг наслдор давомчиларини уз вақтида аниқлаш, завод тизимининг ҳаётчанлигини 6-8 бугингача давом эттиради. Агарда, тизим давомчиси булган бука авлод бошиги нисбатан яна махсулдор ва наслдор авлод тарқатса, у ҳолда мавжуд тизим 2 шохга ажралади. Келгусида шу шохдан янги завод тизимининг шакллантириш мумкин.

Қорамолчилиқ соҳасида букалар тизимини яратиш жараёнини қўйидаги даврларга бўлиши мумкин:

1. Утқазилган синовларга қўра авлодининг сифати бўйича машхур булган бука тизим асосчиси қилиб ажратилади.

2. Бука берувчи гуруҳдаги сигирларни “бўюртма” услубида жуфтлаш натижасида янги ташкил қилинадиган тизим асос бўла оладиган букачалар олинади.

3. Тизимининг авлодбошиси деб танлаб олинган бука ва унинг угиллар махсулдорлиги, экстерерири ва конституция билан авлодбошининг қизларига ухшаш булган сигирлар билан қўмоген жуфтлаштирилади.

4. Бука тизимини давомчисини аниқлаш систематик равишда “бўюртма” жуфлаш ташкил қилиниб, ундан олинган букачалар қаторидан авлодининг сифати бўйича юкори баҳоланганлари ажратиб олинади.

5. Кейинги даврлардаги молларни саралаб жуфлашнинг энг маъқул усули танлаб олинади.

6. Ушбу тизимнинг ижобий сифатларини янада қўчайтириш мақсадида шу тизим авлодлари билан ирсий жихатдан мослашаоладиган бошқа тизим ва оилаларга мансуб булган машхур моллардан қўйдаланилади.

Тизимнинг мақбул сифатларини қўчайтириш учун ундаги молларни яхши озиклантириш ва саклаш, уларни алоҳида индивидуалтанлаш ва жуфтлашни доимо систематик равишда олиб боришни талаб этади.

Тизим ичидаги саралашда хар хил даражадаги инбридингни қўллаш мумкин.

Тизимдаги айрим моллар вакилларининг кийматли белгиларини кучайтириш ва мустахкамлаш учун тизим орасида инбридинглар кулланилади.

Тизим орасидаги инбридинглар асосан 3 варианты мавжуд: тизим бошловчиси, унинг давом эттирувчилари, мустахкамловчи. Улар ичида энг куп таркалган тизим бошловчисига инбридинг агарда тизимни давом эттирувчи тизим бошловчисига нисбатан сифат курсаткичлари устун турса, шундагина унга инбридинг кулланилади.

Тизим ичида инбридинг купинча 3 бугиндан бошланади.

Хар бир корамол зотида бир нечта тизимлар яратилиши ва ишлатилиши керак. Улар сонини канча булишлиги зотдаги моллар сони, уларнинг урчитиш минтакаларининг канчалик кенглиги ҳамда зотнинг сифатига боглик. Тизимлар куп булиши кроссларга имкон беради.

Чорвачиликда наслчилик амалиётида кроссларни бир неча хили ишлатилади. Улар молларнинг жуфтлаштириш хилига (инбридинг, аутбридинг) караб куйидагиларга булинади; аут-кросс, топ-кросс, бот-кросс, ин-кросс.

Аут-кросс. Аутбридли молларни жуфтлаштириш кенг таркалган булиб, кариндошлик жуфтлашни олдини олади.

Топ-кросс. Инбрид букани аутбрид сигир билан жуфтлаш. Бу кросс тизим ичида гетерозис олиш учун ишлатилади.

Бот-кросс. Инбрид сигирнинг аутбрид бука билан жуфтлаш. Конни янгилаш мақсадида ишлатилади.

Ин-кросс. Бир бирига кариндошликда булмаган инбрид молларни жуфтлаш билан аутбрид авлод олиш. Инбрид депрессиядан кутилиш ҳамда гетерозис самарадорлигини кутариш учун кулланилади.

Наслчилик ишлари амалиётида юкорида келтирилган кросслар вариантдан ташкари узаро кариндошлик алоқаси булган, лекин хар хил тизимда булган молларни жуфтлаш ёки стрен-кросс ҳам ишлатилади. Стен-кроссни куйдаги вариантлари мавжуд: кучайтирувчи, бойитувчи, воситачи.

4.Корамол зотлари ва подаларни такомиллаштиришдаги селекция ишларида нафакат бука тизимлари, шунингдек, сигирлар оилаларидан самарали фойдаланиш мумкин.

Сигирлар оилалари устида наслчилик ишлари режали равишда олиб бориш подадаги махсулдор моллар сонини купайтиришга юкори ирсий сифатларга эга булган наслдор букаларни олишга сабаб булади. Аксарият тизимнинг авлодбошчилари ва машхур булган букалар зотда машхур булган сигирлар оиласидан олнган. Бундай сигир оиласи купинча янги тизим яратишда асосчи булиб хисобланади.

Сигир подалари ичида мустахкам ирсий белгиларга эга булган сигир оилалари селекция ишларида, айникса кимматли хисобланади.

Хар хил оилага мансуб булган сигирларни бир тизимдаги букалар билан жуфтлашда уларни авлодларидан олинган селекцион белгиларни натижалари хар хил булиши мумкин.

Хужаликнинг завод селекцион ишларида маълум оилалари сигирларига уларни комплекс селекцион белгиларига мос келадиган хусусиятига эга булган бука тизимларининг икки ёки бир канча давомчи авлод букалари беркитилади. Уларни жуфтлашдан олинган натижа хар йили бахоланиб борилади. Бир оиладаги сигирларга икки ёки ундан ортик букаларнинг танланиши ушбу оилага ижобий мос келишлигини урганишда имконият яратади.

Назорат саволлар.

1. Ирсият коэффициенти.
2. Ўзгарувчанлик коэффициенти.
3. Белгиларни такрорланиш коэффициенти.
4. Кориляция коэффициенти.
5. Соф зотли урчитиш.
6. Чатиштириш.
7. Дурагайлаш.
8. Буқа тизимлари.
9. Сигир оилалари.

Мавзу : Корамолчиликда танлаш.

Режа :

1. Молларнинг асосий селекцион белгилари.
2. Букаларни баҳолаш ва танлаш.
3. Сигирларни баҳолаш ва танлаш.
4. Гуштдор зотли букаларни баҳолаш ва танлаш.
5. Букалар ва сигирларни препотентлигини аниклаш.
6. Бонитировка.

Қўшимча адабиётлар:

1. Собиров П, Кохоров А, Дўсткулов С. “Чорва молларини урчитиш”. Т. 2003.

Таянч иборалар:

Танлаш, келиб чиқиш, шахсий маҳсулдорлик, авлодлар сифати, тирик вазн, кунлик семириш, сутдорлик, сут сифати, технологик белгилар, якка, гуруҳлаб, бонитировка, насл гуруҳи, бошқа хўжалик гуруҳи, пучак гуруҳи.

1.Танлаш – келажакда урчитиш учун керакли белги ва хусусиятларга эга хайвонларни ажратиб олиш демакдир.

Талабга жавоб бермаган хайвонлар махсулот ишлаб чикаришда ишлатилади ёки пучак килинади.

Хили: табиий танлаш – табиий шароитлар таъсирида утиб у ёки бу турни яшовчанлигини белгилайди.

Сунъий танлаш инсон томонидан утказилиб хайвонларни махсулдорлик ва насл хусусиятларини яхшилашга қаратилган.

Шакли: Онгсиз танлаш.

Онгли-услубий танлаш.

Молларни танлаб олишдаги белгилар бир хил кийматда эга эмас. Улар икки гуруҳга ажратилади. Биринчи сифат белгилари – тери ва жун копламининг ранги, молнинг туси, оёқлари шакли, шохсизлиги ва бошқалар. Иккинчиси сон белгилари – соғим микдори, сут таркибидаги ёғ ва оксил микдори, тирик вазни ва бошқалар. Корамол зотларини такомиллаштиришда селекция ишлари асосан сон белгилари бўйича олиб борилади.

Молларни танлашда белгиларни кам булиши мақсадга мувофиқдир. Бир белги бўйича қисқа муддатда ижобий натижага эришиш мумкин. Белгилар сони куп бўлса ҳар бир белги самарадорлиги пасаяди. Танлаш самарадорлигининг ҳар хил белгилар бўйича пасайишини формула ёрдамида аниқлаш мумкин:

Селекцион белгилар сони биттадан турттага купайтирилганда танлаш самарадорлиги икки бараварга камаяди. Молларни фақат махсулдорлиги йуналишида танлаш улар конституциянинг нозиклашишига, физиолгик жараёнларни сусайишишига ва умуман зотни заифлашишига олиб келиши мумкин. Шу боисдан махсулдолик белгилари балан конституциясини ҳам ёддан чиқармаслик керак. Сер сут зотли сигирлар селекция ишларида куйидаги селекцион белгиларга асосий эътибор берилади: соғим микдори, сутнинг оксили, ёғ ва курук моддалар микдори, тирик вазни, ушиб жадалиги, сигимининг бир текислиги, озикага сут билан жавоб бериш, гуштдорлиги, хужаликжа фойдаланиш давомийлиги, касаликларга (елин касалиги, кон паразит касалликлари, лейкоз ва бошқалар) ва табиий иқлим шароитига чидамлилиги. Илгор технологиялар сут ишлаб чиқаришда кулланилганда куйидаги белгилар инобатга олинади: елиннинг шакли ва ҳажми, елин сургичларининг шакли, елин бўлмаларининг мутаносиб ривожланганлиги, сутнинг тулик ва тез ажралиши, елиннинг ҳамма бўлмаларидан бир хилда, тезликда ва даврда ажралиши, оёқларининг мустаҳкамлиги. Бу белгиларнинг аксарияти наслдан-наслга утиш хусусиятига эга.

Сутдор қорамолчиликда асосан соғим микдори, сутдаги ёғ ва оксил микдори инобатга олинади.

2. Букаларни баҳолаш ва танлаш. Қорамолчиликда букаларни насли сифати бўйича баҳолаш ва танлаш бир неча даврда утказилади, келиб чиқиши, шахсий махсулдорлиги ва авлодларнинг махсулдорлиги бўйича.

Сут йуналишидаги букаларини танлашда биринчи навбатда кизларнинг сут махсулдорлиги ҳисобга олинади. Ҳозирги замон кенг микёсли селекция талабларида сут ва куш махсулдор йуналишидаги зотларнинг букалари кизлари махсулдорлиги билан биргаликда эркак авлодларининг гушт махсулдорлик сифатлари бўйича баҳоланади.

Букаларни келиб чиқиши қараб баҳолаш ва танлаш. Аждодидаги ҳар хил гуруҳдаги букаларнинг белгиларига эътибор берилади. Аввало шажаранинг биринчи катори, сунг шажара иккинчи каторининг ота томон қурсаткичларига қупрок эътибор берилади. Чуқур селекция ишларида шажаранинг 3 ва 4 каторлари ҳам инобатга олинади.

Ф.Ф. Эйсернинг маълумотларига қура, симментал зотига мансуб бўлган 18 бош бука кизларнинг сут соғими билан опалари(ота томонидан) соғим оралигидаги корреляция коэффиценти +0.5, лебедин зотида 0.6 бўлган, бука кизлари ва ярим опалари сутидаги ёғлилик ижобий корреляция ($r=0.68$) аниқланган. “Яхшиловчи” деб тан олинган букалар қучли ирсий қобилятга эга. Улардан олнган букалар 60-70% ҳолатида “Яхшиловчи” бўлиб баҳоланаган.

Сут ва кушмахсулдор йуналишдаги букаларни махсулдорлиги бўйича баҳолаш ва танлаш.

Букаларни махсулдорлик сифатлари бўйича танлашда ушиб қуввати, тирик вазни,

экстерери, уруглантириш қобиляти ҳисобга олинади. Белгилар ирсий даражаси юқори

бўлгани учун катта эътибор берилади. Купинча вазни юқори букалардан вазни катта кизлар

устирилади. Сигирларнинг тирик вазни ва сут махсулдорлиги ижобий корреляцияда

булади. Шунинг учун букаларни жадал усиш ва вазни катталиги улар кизларининг жуссани катталиги ва сутининг куплигида акс топиши мумкин. Букачаларни тирик вазни бахоланганда уларнинг экстерер ва конституцияси ҳам инобатга олинади.

Букаларнинг авлодининг сифати буйича бахолаш ва танлаш. Сут йуналишидаги корамолчиликда букаларни бахолашда, биринчи навбатда кизларнинг сут махсулдорлиги инобатга олинади. Баъзи Европа мамлакатларида сут ва сут гушт йуналишидаги сигирларида сут махсулдорлигидан ташкари енгил тугиш, пушторлиги ва бузокларнинг хаётчанлиги назарда тутилади. Танлашга ажратилган 12-14 ойлик букачалар уригининг сифати бахолангандан сунг, 3-5 хужаликда 80-100 сигир кочирилади. Бу сигирлар махсулдорлиги буйича зот андозаларига мос ва зотдорлиги буйича иккинчи бугиндан паст булмаслиги керак. Букаларнинг кизларининг сути буйича бахолашда куйидаги усуллар ишлатилади: махсулдорлиги буйича кизларининг уз оналари билан таккослаш; кизларнинг тенгдошлари билан ёки бошка бука кизлари билан таккослаш ва хокозо.

Бука кизларини уз оналарини таккослаш узок давр озиклантириш бир хилда булгандагина утказиш мумкин. Бундай таккослаш купрок сутнинг ёглилиги буйича амалга оширилади, чунки озиклантириш бу белгига катта таъсир утказмайди.

Юкорида келтирилган хар икки усулда ҳам букаларга тугри бахо берилади ва уларнинг категориялари (“яхшиловчи”, “нейтрал” ва “ёмонловчи”) аникланади. Бахоланган букалар бир хужаликда “яхшиловчи”, бир хужаликда “нейтрал” ва бошка хужаликда “ёмонловчи” булиб чикиши мумкин. Бу кизларини тенгдошлари билан таккослашда ва уларнинг устунлигини аниклашда куйидаги формуладан фойдаланиш тавсия этилади:

Бунда: НК – буканинг насл киллиги; $НК = (К - Т) \times В$ кизларнинг махсулдорлик курсатгичи; Т-тенгдошларининг махсулдорлик курсатгичи; В - моллар сони буйича тузатиш коэффиценти. Бу коэффицент букаларни

15та кизи буйича бахолашда 0.58 га тугри келади,

25та булганда – 0.70 га,

50та булганда – 0.81 га,

100та булганда – 0.90 га,

300 та булганда – 0.99 га

ва хокозо.

$$НК = (4000 - 3800) \times 0.81 = 200 \times 0.81 = 162 \text{ кг}$$

Бука кизлари меёрда озиклантирилиши керак, улар 3 бугин ва ундан юкори булиши керак. Букаларнинг насл сифати кизларининг экстерер ва конституцияси, ҳамда сут махсулдорлиги билан бахоланади. Энг яхши букаларга насл категориялари берилади. Кизларининг согим микдори буйича А1, А2, А3 ва уларнинг сутидаги ёглилик даражаси буйича В1, В2, В3 категориялари.

3. Сигирларни бахолаш ва танлаш.

Наслдор сигирлар согимлиги, юкори махсулдорлиги ва конституциясининг мустахамлиги билан таърифланади. Сигирлар истеъмол килган озикаларга сут билан бериши, машина согимига мослиги, ҳамда узларининг сифат белгиларининг авлодларига утказиш кобилият ҳам инобатга олинади. Сут ва кушмахсулдор сигирларни бахолаш сут микдори, сутдаги ёг ва оксилнинг микдори ва катор согимларда энг юкори лактация курсаткичлари инобатга олинади. Биринчи уч лактация уртача курсаткичларига караб бахолаш анча аник хисобланади.

С.А. Рузский ушбу курсаткич билан хаёти давомида берган сути уртасида ижобий корреляция борлигини аниклаган (согим буйича $r=+0,82+0,91$, ёг микдори буйича $+0,82+0,98$).

Сигирларни хаёти давомида берган сути буйича баҳолаш муҳим аҳамиятга эга.

Сигирларни баҳолаш ва танлашда уларнинг экстерери ва конституциялари ҳам баҳоланади. Сигирлар экстерери ва конституцияси зот андозасига мос келиши керак.

Елин индекси 40% кам булган сигирларда бекор соғиш давомийлиги 2,5-2,6 мин, у 45% ва ундан юқори булганда атиги 0,6-0,7 мин булади. Биринчи гуруҳда сигирлар елинининг касалланиши 13-14% булганда, 2 гуруҳда 4-7% булади.

Сигирларнинг тулик соғиб олиниши ва сут бериш тезлигим косасимон елинли сигирларда «эчки елинли» сигирларга нисбатан анча юқори.

Елин сургичлари бир хил катталиқда, уртача узунлиқда ва цилиндрсимон шаклда булиши талаб этилади. Яхши сут бериш тезлиги 1 минутда 2,5 кг, уртача 1,5-1,8 кг ва коникарсиз 1 кг дан камлиги аникланган.

Сигирларни баҳолашда уларнинг пуштдорлиги ҳамда хаёти давомида берган бузоклар сони олинади. Бу курсаткич куйидаги формула ёрдамида аникланади:

$$BK = \frac{T}{\ddot{E} - 2}$$

Бунда: BK- бузок бериш қобиляти; T-туғимлар сони; $\ddot{E}$ - ёши.

Сигир 10 ёшда 7 марта туккан, шунда бузок бериш қобиляти

$$BK = \frac{7}{10 - 2} = 0.875 \text{ тенг.}$$

Сигирларни баҳолашда туғим ораллигини муҳим аҳамият касб этади, у 365 кунга тенг булиши керак, ёки ҳар йили биттадан бузок олиш керак. 10 ёшга кирган сигир 8 марта туғиб шунча бузок бериши керак.

Сут қорамолчилигида сигирларни авлодлари буйича баҳолаш ва танлаш мумкин. Ривожланган мамлакатларда авлодларининг сифати буйича комплекс танлаш усули мавжуд. Ю.А. Григорьев тажрибалари сигирларни авлод сифати буйича баҳолашнинг самарадорлиги курсатилган. Бунда МКУХ- сигирларнинг уз авлодига сут маҳсулдорлигини утказиш қобилятини уртача ҳисоби. Сигир кизининг, уз онаси ва ҳолалари ҳамда отаси оналарининг сут маҳсулдорлиги ҳисобга олинади. Ҳисоблашда ҳар бир келтирилган мол гуруҳларига тегишли коэффициентлар ишлатилади.

МНК – сут маҳсулдорлигини наслга бериш қобиляти. Бу куйидаги формула ёрдамида топилади:

Бунда, A- зотнинг андозаси; n- баҳоланадиган моллар сони(сигир, унинг кизлари); R- баҳоланадиган сигир ва қариндошларининг уртача маҳсулдорлиги.

$$MНК = \frac{A}{n + 1} + \frac{n}{n - 1} \times R$$

Наслдор букалар берадиган сигирларни танлаш.

Подаларни такомиллаштиришда уларнинг насл ва махсулдорлик белгиларини кутаришда сигирларни танлаш алохида урин тутати.

Асл сигирларни ажратиш ва уларни асл букалар билан жуфтлаш жуда муҳимдир. Чунки «буюртма» жуфтлашдан олинган наслдор букалар кенг микёсда селекциянинг сунъий уруглантириш усулидан фойдаланилганда, катта микёсда кутилган самарани беради.

Наслдор букалар олиш учун мулжалланган сигирларда куйидаги селекцион белгилари инобатга олинади: яхши ирсий асосга эга булиши, серсутлик, серёглилик ва юкори оксиллик, зотга мансуб тана тузилиши ва вазнга эга булиш, елин шакли, хажми ва унинг функционал хусусиятлари талаб даражасида ривожланганлиги ва хоказолар. Сигирларни уз махсулдорлигидан ташкари уларнинг оналари махсулдорлиги ва оталарининг насл сифатлари ҳам ҳисобга олинади.

Шундай қилиб, наслдор букалар берадиган гуруҳга ажратиладиган сигирлар юкори махсулдорлик ва насл хусусиятларига эга булган, зот хилига мос ҳамда машхур бука тизими ва сигир оилаларидан келиб чиккан булиши керак.

Серсут сигирларни келиб чиқиши ва биринчи тугим сут махсулдорлигига караб баҳолаш.

Сут йуналишидаги корамолчиликда сигирларнинг онасининг махсулдорлиги ва экстерерига караб ҳамда наслдор букаларнинг сифатини ҳисобга олган ҳолда танлашга асосланган. Шу билан биргаликда ҳужаликлар амалиёти натижаларига кура, биринчи туккан сигирларни махсулдорлигига караб баҳолаш сигирларни танлаш самарадорлигини янада оширади. Сигирларни биринчи лактация буйича баҳолаш бир неча авлодларда узлуксиз олиб борилса, танлашнинг самарадорлиги янада мустаҳкамланади.

Биринчи лактация буйича танлаб олинган сигирлар сут махсулдолигининг пода уртача курсаткичига нисбатан купайиши кейинги соғимлар давомида кузатилади.

4. Гуштдор корамолчиликда букаларни уз махсулдорлиги буйича баҳолаш алохида урин тутати. Чунки букалар ва авлодларнинг вазн усиши жадаллиги ҳамда уртача кунлик усиш даражаси юкори ижобий корреляция ($r = +0,7$ ва $+0,9$) курсаткичлари билант характерланади. Юкори усиш курсаткичлари билан характерланади. Юкори усиш курсаткичларига эга булган букалардан ҳамма вақт ҳам жадал усадиган авлод олинади. Зотдор зотли букачалар биринчи марта онасидан ажратилганда (6-8 ойлигида) уз махсулдолиги буйича назорат боқишга куйилади. Бу тадбир букахона ёки станцияда ташкил қилинади. Назорат боқими букачаларнинг 8-13 ойлиги даврида 150 кун давомида утқизилади. Бу даврда уларнинг озиклантиришг меёри 1200-1300 г вазн қушилиши мулжалланади ва бу тадбир тулик амалга оширилади. назорат боқими якунида букачалар куйидаги курсаткичлари буйича баҳоланади: мутлок ва уртача кунлик усиш; 1 кг усишга сарфланган озикалар харажати; тирик вазни, экстерери ва гуштдорлик шакли.

Гуштдор зотли букалар танлашнинг биринчи босқичида уз махсулдорлиги буйича, иккинчи босқичида эса авлодларининг гуштдорлик сифатлари буйича баҳоланади. Бунда ҳар бир синовда булган букалардан камида 10 бошдан угиллари боқиш синовига куйилади. Улар 8-15 ойлиги давомида, яъни 210 кун назорат боқимида булади. Букачалар потенциал усиш имкониятини руёбга чиқариш учун меёрдаги озиклантириш ва саклаш шароитлари яратилиб берилади. Улар назоратининг якунида уз махсулдорликлари буйича баҳоланади. Қушимча равишда гуштнинг вазни ва сифатини баҳолаш учун 15 ойлик букачалардан камида 3 боши назорат суйимидан утқизилади. Сунгра авлодининг сифати буйича танланадиган букалар куйидаги курсаткичлари буйича баҳоланади: авлодининг усиш ва бурдоқилашни жадалиги; бир кг семиришга сарфланган озикалар харажати; авлоднинг 15 ойлигида тирик вазни, суйим вазни, суйим чикими; гушт нимталарининг мускул туқималари билан тулишганлиги ва ларнинг устки қисмида ёғ туқималарининг туқланиши ҳамда тана буйлаб тарқалганлиги ва хоқозо. Авлоднинг комплекс курсаткичлари буйича юкори даражада баҳоланган букалардан наслчилик- селекция ишларида самарали фойдаланилади.

Хар бир наслчилик заводида гуштор зотли букалар уз махсулдорлиги буйича назорат боками асосида бахоланади. Букалар ургочи авлодларининг пушторлиги, сут дорлиги ҳамда бузокларининг хаётчанлиги, шамоллаш ва ичак касалликларига чидамлилиги учинчи боскичдаги бахолош курсаткичларига киради. Наслчилик заводларида букаларни юкорида келтирилган уч боскичли танловдан утказиш селекция самарадорлиги оширади, подалар ап зотни такомиллаштиришга имкон беради.

Гуштор зотли сигирларни бахолош ва танлаш

Гуштор зотли сигирларни танлаш асосий эътибор тананинг мутаносиб тузилиши, зот белгилари ва хилини яккол ифодаланишига каратилади. Сигирларни танаси кенг, мускуллар билан тулишган, суяклари мустахкам булиши керак. Жумладан ягрини кенг, сергушт, кукраги кенг ва чукур; елкаси, бели ва думгазаси тугри; оркаси яхши ривожланган, оёкларини тугри куйилган булиб туёкларини мустахкам, териси буш эгилувчан ва майин жунлар билан копланган булишлиги эътиборга олинади. Тирик вазн ҳам мухим ахамиятга эга.

Гуштор сигирларнинг сутдорлиги, соғлом ва хаётчан бузок беришлиги ва айникса уларнинг пушторлиги юкори селекцион белги хисобланади. Сигирларнинг сутдорлик даражаси уларнинг бузокларини сутдан чикиш якунидаги (7 – 8 ойлигида) тирик вазни билан белгиланади. Сигирларнинг пушторлик хусусияти, бузок бериш кобилияти ва бузокларнинг хаётчанлиги зоотехния ва ветеринария хисобот маълумотлари асосида аникланади.

5. Препотентность сузи рус тилидан олинган булиб, бука ва сигирларнинг юкори махсулдорлик ҳамда насл сифатларини уз авлодига тулик утказишдаги ирсий кобилияти тушунилади. Бу курсаткич, айникса, кенг микёсли селекция ишлатиладиган букалар учун жуда мухимдир. Моллар микдор курсаткичлари ирсияти оралик характерга эга. Шунга асосланиб, наслчилик самарадорлигини олдиндан аниклаш, насл киймат индекси, ирсиятни аниклаш усуллари ишлаб чикилган. Молларни препотентлиги буйича бахолошда куйдаги курсаткичлар инобатга олинади: она- кизи курсаткичларининг узаро корреляцияси; авлоднинг бир хиллиги; авлоди ва уларнинг оналари курсаткичларининг узаро корреляцияси, бир канча авлодлар каторидаги белгиларнинг ирсий даражаси, махсулдорлиги буйича авлоднинг уз тенгдошларидан устунлиги ва хокозолар. А.С.Рузский маълумотларига кура, она ва киз уртасидаги селекцион белгилар корреляциясининг пасайиши буканинг уз авлодидаги курсатган таъсирининг кучли эканлигидан дарак беради.

Бу эса буканинг юкори препотентлигига эга эканлигига дарак беради.

Селекция ишларида букалар ва сигирлар препотентлигидан самарали фойдаланилади. Препотентлик «Яхшиловчи», «Консерватив» ва «Ёмонловчи» булиши мумкин. Селекция аммалиётида «Яхшиловчи» препотентлик купрок кизиқиш уйготади. А.А. Кравченко препотентликни хисоблашда куйдаги формулани тавсия этган:

$$П = \frac{МК \times 100}{ЖК}$$

бунда , МК- уз она белгиларидан устун келган махсулдор кизлари; П- препотентлик; ЖК- жами кизлар сони.

Бу формула маълум селекцион курсаткичлар (сутнинг микдори, ёглилиги, оксил микдори) буйича уз оналаридан устун келган бука кизларнинг жами кизларига нисбати билан ифодаланади.

Наслчилик селекция ишларида молларнинг препотентлик хусусиятларини аниклаш ва улардан микёсли селекцияда фойдаланиш подадаги моллар ирсий хусусиятларини кучайтиради, препотентли моллар салмоги ошади, подп ва зотнинг махсулдорлиг кутарилади ва уларни жадал такомиллаштиришга эришилади.

6. Бонитировка наслчилик заводи, хужалиги, фермасы ҳамда наслчилик фермер хужаликлайда хар йили молларни баҳолаш, гурухларга ажратиш, наслчилик режаларини мулжаллаш, саралаш натижаларини аниклаш ҳамда жуфтлаш хилларини тузиш буйича утказиладиган чора-тадбир ҳисобланади. Уни утказишда молларнинг зотдорлиги, келиб чиқиши, махсулдорлиги, усиш ва улгайиши, экстерери ва конституцияси, авлоднинг сифати, уларнинг пушдорлиги ва хоқозо белгилари комплекс баҳоланади. Шунга асосан, моллар элита-рекорд, элита I ва II классизларга ажратилади. Наслдор буқаларнинг комплекс классларини аниклашда уларнинг келиб чиқиши, экстерери ва конституцияси ва наслдорлик сифатлари ҳисобга олинади.

Сигирларнинг насл гуруҳи. Насл гуруҳига ажратилган сигирлар сони подадаги моллар сонининг усиш режасига қараб белгиланади. Бу гуруҳга соғлом, зот андозаси талабларига жавоб берадиган, наслдор ва подани тиклашга мулжалланган, яхши ривожланган сигирлар киради. Улар каторига биринчи навбатта рекордчи ва давлат наслчилик китобларига ёзилган сигирлар киритилади.

Сигирлар подасининг тамирловчи наслдор ёш моллар гуруҳи. Наслдор ёш молларга талаб

олдиндан белгиланиб олинади. Сигирлар подасини тулдиришни келиб чиқиши,

махсулдор, яхши ривожланган ва наслдор ота-онадан олинган ургочи ёш моллар

ажратилади.

Саралаш жуфтлаш режаси. Хар бир наслчилик хужалиги, ферма ёки фермер хужалиги учун жуфтлаш режаси тузилади. Унда молларнинг наслдорлик ва махсулдорлик белгиларини яхшилаш инобатга олинади.

$$Пц = (Д - С) \times а$$

$$Вс = \frac{О}{В - 2}$$

Подани тиклаш қобилияти.
О- туғимлар сони.
В- ёши.

$$ЕТА = \frac{А}{n + 1} + \frac{n}{n - 1} \times R$$

ЕТА – сут махсулдорлиги авлодга ўтказиш қобилияти.

А - зотнинг ўртача кўрсаткичи.

n- баҳоланаётган ҳайвонлар сони.

R- баҳоланаётган сигир ва қариндошларининг ўртача махсулдорлиги.

Назорат саволлар:

1. Танлашнинг аҳамияти.
2. Танлаш хиллари.
3. Танлаш усуллари.
4. Ёш қорамолларни танлаш.
5. Сигирларни танлаш.
6. Буқаларни танлаш.

7. Танлаш самараси.

Мавзу: Корамолчиликда жуфтлаш

Режа :

- 1. Жуфтлашнинг ахамияти**
- 2. Жуфтлаш хиллари**
- 3. Жуфтлаш усуллари**

Қўшимча адабиётлар:

1. Собиров П.С, Қохоров А, Дўскулов С. “Чорва молларини урчитиш”. Тошкент. 2003.

Таянч иборалари:

Жуфтлаш, гомоген, гетероген, якка, гуруҳлаб, якка гуруҳлаб, соф зотли, чатиштириш, дурагайлаш, қариндош урчитиш.

- 1. Жуфтлаш наслчилик ишларини муҳим тадбири ҳисобланади.**

Жуфтлаш - бу белгиланган режага асосан, ота-оналарининг юкори белги ва хусусиятларини узини мужасамлаштирадиган янги авлод олиш мақсадида бука ҳамда сигирларни узоро жуфтлайдилар. Жуфтлаш туги танланганда молларнинг селекцион белгилари мустахкамланади ва янада ривожлантирилади. Жуфтлашнинг самарадорлиги унда иштирок этган молларнинг ирсий ва сифат курсаткичларига боглик. Чорвачилик амалиётидан маълумки, бука юкори ирсий хусусияти подадаги ургочи моллар ирсий курсаткичларига мос келганда юкори самара беради. Жуфтлашнинг муоффақиятли чиқиши учун, жуфтланадиган молларнинг мақсадга лойик хилин аниқлаб олиш талаб этилади. Бундай хилдаги молларни мавжуд экалогик хужалик шароитида урчитишга энг кулай юкори иктисодий самара бериши керак.

Жуфтлаш йуналишини белгилаб олишдан олдин подп ва зотнинг таркибий тузулиши хар бир молнинг келиб чиқиши урганилади. Уни ташкил қилиш жараёнида молларнинг энг юкори танланган селекцион белгилари ва хусусиятлари эътиборга олинади. Жумладан, сут йуналишидаги корамолчиликда сигирларнинг сутининг микдори, сутдаги ёғ ва оксил нисбати, машина соғимида яроқлилиги ва бошқалар. Гуштдор корамолчиликда эса тез етилувчанликка, тирик вазнга, тана тузилишига, озика харажатларини вазн ортиши билан копланишига ва хоказоларга қаралади.

Жуфтлаш самарадорлигини оширишда бир хил селекцион белгилари буйича бир неча йил давомида бир хилликда булган авлодларда жуфтлаш ишларини олиб бориш муҳим аҳамиятга эга. Саралаш омилларидан энг асосийси ота-оналарга хос булган селекцион белгилари янада мустахкамлаш ва мавжуд булган камчиликларни йукотишдир. Бу борада йуналишига хос булган ва унда тугри ишлатилаётган рекордчи ва машхур молларнинг энг яхши ва янги хусусиятларини букалар тизимида, подага ва зотгаи утқишига ҳаракат қилинади.

Наслдор «яхшиловчи» бука подага узининг бекиёс таъсирини утқазади. Шунинг учун ҳам жуфтлаштиришда қатнашадиган букалар узларининг селекцион белгилари билан она моллардан юкори булиши керак. Жорий саралаш ишларини ташкил этишда утган йили жуфтлаш натижасида, олинган авлоднинг сифат курсаткичлари, тизим ва оилаларни

жуфтлашда бир бирига мос келиши ҳамда жуфтланаётган моллар шажараси инобатга олинади. Бунда бука ва сигирларнинг узаро кариндошлик боғланишини бошқариб бориш керак. Селекция мақсадларига қараб жуфтлашда яқин, урта, узок ва кариндош булмаган жуфтлаш қулланилади. Жумладан, яқин кариндош жуфтлаш фақат наслчилик заводларида айрим ҳолларда ишлатилади. Одми хужаликларида бу тадбирга умуман йул қуйилмайди. Хужаликлар амалиётида уларнинг насл категорияларига қараб, ҳар хил шаклдаги саралаш ишлари олиб борилади. Индивидуал, гуруҳлаб ва индивидуал – гуруҳлаб саралаш хиллари қулланилади.

2. Индивидуал саралаш. Бу усул наслчилик хужаликларида қулланилади. Ҳар бир сигирга алоҳида бука беркитилади. Бунда уларнинг қайси тизим ва хилга ҳос бўлишлиги ҳисобга олинади. Саралашни амалга оширишда ҳар қайси молнинг индивидуал хусусиятлари, келиб чиқиши, экстерери ва махсулдорлигини билиш талаб этилади. Унда утган йилги жуфтлашнинг ижобий натижалари ва букалар авлоднинг сифатини инобатга олган ҳолда ишни ташкил қилиш мумкин. Индивидуал саралаш наслдор ва махсулдор бўлган сигирларда ҳамда биринчи навбатда «бўюртма» жуфтлашда наслдор букачалар берадиган сигирлар гуруҳида ташкил этилади. Бу саралаш усулини соф зотли ва чатиштиришда қуллаш мумкин. Жуфтлаш молларнинг белги ва хусусиятларини эътиборга олган ҳолда икки хилга ажратилади.

Индивидуал-гуруҳлаб саралаш бу купрок наслчилик фермаларида ва товар хужаликларида қулланилади. Бунда маълум гуруҳ ургочи хайвонларга мос бўлган бука беркитилади, унинг мақсади олинadиган авлодни янада такомиллаштиришни назарда тутди.

Гуруҳлаб саралаш – бу усул асосан товар хужаликларида, наслчилик ишининг дастлабки даврларида қулланилади. Бунда албатта букалар белги, хусусият ва махсулдорлигини ургочи хайвонлардан устунлигига эътибор берилди. Иложи борица подадаги сигир ва ургочи таналарнинг асосий курсаткичлари ва уларнинг қайсилари такомиллаштиришни эътиборга олиш фойдадан холи эмас.

3. Гомоген саралаш – бир хил белгиларга эга бўлган молларни жуфтлаш тушунилади. Бу саралашда молларнинг тана тузилиши, махсулдорлик даражаси ва йуналиши ҳамда уларнинг келиб чиқиши бир – бирига жуда ухшаш бўлиши керак. Бундай ухшашлик жуфтлашдан олинган аجدодларнинг белгиларини сақлаб қолиш ҳамда мақсадга мувофиқ бўлган моллар сонини қупайтириш, махсулдорлигини қутариш ва жуфтлашда қатнашадиган ота-онага нисбатан янада сермахсул бўлган авлод олишга ҳаракат қилинади.

Гомоген саралашда подада янада мустаҳкам ирсиятга эришилади, зотнинг завод константлиги(муқимлиги) ошади. Агарда жуфтланган молларнинг бир йула фенотип ва генотипи аниқланиб, сунгра жуфтлаштирилса, унда юқори ижобий самарага эришилади.

Гомоген саралаш селекцион белгиларни ривожланганлиги ва генетик ухшашлик бўйича амалга оширилади. Молларнинг ишлаб чиқариш хилларини шакллантиришда ижобий таъсир қурсатади. Жумладан, А.П.Солдатов швиц зоти устида олиб борган наслчилик ишида гомоген саралашдан олинган қизларида серсутли хилида бўлганлари 81,4% ташкил қилган.

Улар узларининг сут махсулдорлиги билан бошқача саралаш хилларидан олинган молларига нисбатан юқори бўлган. Саралашда селекцион белгиларининг ирсий даражаси гетерогенли саралашга нисбатан 1,5-2 баробар қучли бўлади. Лекин гомоген саралашни узок вақт қуллаш моллар конституциясининг нозиклашишига ҳамда махсулдорлигини пасайишига сабаб бўлиши мумкин. Шу боисдан унинг олдини олиш чораларини қуриш керак.

Гомоген саралашнинг самарадорлиги купчилик ҳолатда ташки шароитларга боғлиқ бўлади. Яъни, моллар ва улардан олинган авлодлар меъёри даражасида бўлмаган озиклантириш ва саклаш шароитида бўлиши гомоген жуфтлашдан ижобий натижалар кутиб бўлмайди. Шунинг учун гомогенли саралашнинг самарадорлигини оширишда улардан олинган ёш авлодларни юқори парвариш даражасида, гунажин ва сизирларга тўйимли озиклантириш ва яхши саклаш шароитларини ташкил этиш талаб этилади.

Гетероген саралаш – ҳар хил тана тузилишига ва маҳсулдорликка эга бўлган молларни жуфтлаш тушунилади. Гетероген жуфтлаш олинган авлодда гетерозиготаликни оширишга олиб келади. Гетероген саралашда олинган авлодда ота-оналари ҳамда ундан олдин утган аجدодларининг селекцион белгиларини янада кучайтириш мақсадида ҳар хил ижобий селекцион курсаткичларга эга бўлган моллар жуфтланади. Соф зотли завод усулида урчитишда гетероген саралаш генетик ухшашликка эга бўлган букаларнинг тизимлараро урчитишда уларнинг «крессида» фойдаланилади.

Саралаш чоғи молларнинг гетероген ҳар хил зотга мансуб бўлган молларни чатиштиришда, маҳсулдор моллар хили, подалари ҳамда янги зотлар яратишда яққол намоён бўлади. Жумладан, Германия ва Венгрияда кора-ола молларини аввал жерсей ва сунг голштин зоти билан чатиштириш натижасида серсут, серёғли, машина соғимида ярқли бўлган сут йуналишидаги корамоллар подаси яратилган.

Назорат саволлари:

1. Жуфтлашнинг таърифи.
2. Гомоген жуфтлаш.
3. Гетероген жуфтлаш.
4. Яққа жуфтлаш.
5. Гуруҳлаб жуфтлаш.
6. Яққа гуруҳлаб жуфтлаш.
7. Қариндош урчитиш.

Мавзу: Наслчилик ишларини режалаштириш.

Режа:

1. Наслчилик хужаликларда наслчилик ишларини ташкил қилиш.
2. Ширкат ва фермер хужаликларида наслчилик иши.
3. Зот бўйича наслчилик иши.

Қўшимча адабиётлар:

1. Эрнст Л.К. Скотоводство. М. Колос. 1984.

Таянч иборалар:

Режа, наслчилик, хўжалик, фермер, дехқон, шахсий ёрдамчи хўжалик, наслчилик корхоналари, оддий хўжаликлар, наслчилик ишлари турлари, режалаштириш муддатлари, хўжалик таърифи, пода таърифи, генеологик тасвир, озиклантириш, зот, зот таркиби, зот режаси, зот кенгаши.

1. Наслчилик хужаликларида молларнинг маҳсулдорлигини ошириш ва насл сифатларини яхшилашга қўлаб наслдор бузуклар олиш ва уларни режалаштирилган

парваришлаш технологияси асосида ҳамда аниқ ташкил килинган наслчилик иши натижасида эришилади. Шунинг учун ҳам бир подада наслчилик ишлари буйича режа тузиш муҳим аҳамиятга эга. Наслчилик режалари беш, ун йилга тузилади ва қуйдаги қисмлардан ташкил топади: хужаликнинг қискача тавсифи; қорамол подасининг таркиби; наслдор ёш қорамолларни парваришлаш режаси ва технологияси; сигирларни озиклантириш ва сақлаш шароитлари ва меъёрлари; поданинг генеологик таҳлили; подадаги наслдор букаларининг тавсифи; режали топшириқлар; танлашни режалаштириш; саралашни режалаштириш ва хоказолар.

Хужаликнинг қискача тавсифи. Наслчилик ишлари режасининг биринчи қисмида хужаликнинг номланиши, урнашган жойи, табиий иқлим шароити, тавсифи, жами ери ва шундан экин майдони, бир неча йил давомида олинган ҳосилдорлик, яйлов ва утлоқларнинг ҳолати молларни озикалар билан таъминланганлиги ва хоказо курсаткичлар. Шу билан бирга ҳамма турдаги молларнинг сони, сотиладиган чорвачилик маҳсулотларининг тури ва миқдори, чорвачилик бинолари билан таъминланиши, поданинг ветеринария-санитария ҳолати, технологик жараёнлари механизациялаш, кадрлар билан таъминланганлик, наслчилик ишининг аҳоли курсатилади. Наслчилик ишининг тарихи, танлаш ва саралаш натижалари келтирилади. Наслдор букалар ва уларни подага таъсири. Хужалик соҳаларининг ҳолати ва ривожланиши истикболари бериледи.

Қорамол подасининг тавсифи. Бу қисмда поданинг комплекс селекцион белгилари буйича сон ва сифат курсаткичларининг тавсифи бериледи. Поданинг таркиби тугрисидаги маълумотлар молларнинг жинси, ёши, авлодлари буйича зотдорлиги курсатилади. Сигирларнинг вазни, 305 кунлик сути, сутнинг ёғи ва оксиллиги кейинги 5 йиллик маълумотлар келтирилади.

Наслдор ёш молларни парваришлаш. Селекция режасининг бу қисмида ёш молларнинг жинси ва ёшига қараб (туғилганда 6, 12, 18 ва 24 ойлигида) тирик вазни келтирилади. Бунда ёш молларнинг вазн ўсиш тезлиги зот андозаси талабларига жавоб бериши керак. Ёш молларни парваришлаш ва танлаш хусусиятлари, парваришланган ва сотилган ёш молларнинг сони, уларнинг классификацияси ва қайси хужаликларга сотилганлиги курсатилади.

Сигирларни озиклантириш ва сақлаш. Бу қисмда ўтган йиллар буйича молларни қиш ва ёзда озиклантириш, сақлаш шароитлари ҳамда бўғоз сигирларнинг озиклантириш рационлари тугрисидаги маълумотлар келтирилади.

Поданинг генеологик таҳлили. Наслчилик ёзувлари, бонитировка ва наслчилик қитоблари маълумотларига асосланиб, молларнинг генеологик (қелиб чиқиши буйича) шажараси тузилади. Унда молларнинг ёши, жинси ва қелиб чиқиши ҳисобга олинган ҳолда уларнинг сони белгиланади ҳамда моллар подасидаги алоҳида бука тизимлари, қариндош гуруҳлари ва сигир оилалари салмоғи бериледи. Бундай гуруҳларни аниқлаш учун генеологик схема тузилади. Унда айрим молларнинг ўзаро қариндошлик боғланишлари, маҳсулдорлиги ва экстерер хусусиятлари келтирилади.

Подадаги наслдор букаларларнинг тавсифи. Подадаги ҳар қил наслдор букага уларнинг зотдорлиги, қелиб чиқиши, конституцияси, экстерери, тирик вазни ва авлоднинг сифати буйича тавсиф бериледи. Бунда буканинг қандай саралаш усуллари ҳамда яқин қариндошликка бўлган моллар сифати буйича баҳолаш айниқса, муҳим аҳамиятга эга.

Режали топшириқлар. Подани такомиллаштириш буйича режали топшириқлар белгиланиб олинади. Бу топшириқлар ҳар йил ва давр охири учун режалаштирилади. Биринчи навбатда подада олиб бориладиган наслчилик-селекция ишларининг йўналиши белгиланади. Моллар селекция гуруҳларининг маҳсулдорлик курсаткичлари келтирилади.

Авлодлар махсулдорлигини олдиндан белгилашда, улар оналарининг махсулдорлиги ва келиб чиқиши бўйича танланади. Бундай танлашда қуйдаги формуладан фойдаланиш мумкин:

$OM = M1 + CD2 \times h^2 + a(K1 - T)$ бунда, OM- олдиндан аникланадиган махсулдорлик; CD- селекция дифференциали; M1 – поданинг уртача махсулдорлиги; h^2 - ирсий коэффициент; $a(K1 - T)$ – буканинг насл қиймати, (K1) кизларнинг тенгдошларига (T) нисбатан устунлиги.

Танлашнинг режалаштириш. Ёш моллар, бука ва сигирларни танлаб олиш учун тегишли селекцион курсаткичлар белгиланади. Подада энг яхши тизим ва оилалар махсулдорлик ва тана тузилиши бўйича режа асосида танланади. Молларни танлашда уларнинг юқори сут махсулдорлиги, конституциясининг мустахкамлиги ҳамда бошқа белгилар ва хусусиятлар ривожланишига эътибор берилади. Бу хусусият ва белгиларга қуйидагилар қиради: сигирларнинг машинада соғишга яроқлилиги, озикаларга сут билан жавоб бериши, соғиш жараёнига асаб фаолиятининг сезгирлиги, гуруҳдаги молларнинг камлиги, елин шамоллаши ва бошқа касалликларга чидамлилиги, пуштдорлиги ва бузукларнинг ҳаётчанлиги қиради.

Саралашни режалаштириш. Подада тизимларни уз ичида урчитиш принципларига риоя қилган ҳолда саралаш ишлари ташкил қилинади. Тизим ичида саралаш ҳамда тизимлараро кросслар утказиш белгиланган режа асосида амалга оширилади.

2. Ширкат ва фермер нодавлат хужаликлари бўлиб, ўзбекистонда к/х борасида утқазилган иқтисодий ислохатлар даврида шакллантирилди. Хусусий мулкчиликда асосланган хужаликларда наслчилик ишини юритишнинг узига ҳос хусусиятлари мавжуд. Бу борада ривожланган мамлакатлар фермер хужаликларининг наслчилик ишини ташкил қилиш тажрибасини урганиб уни татбиқ қилиш муҳим ҳисобланади. Биринчи навбат хужалик йуналиши, табиий иқлим шароити ва иқтисодий омиллардан келиб чиққан ҳолда керакли зотларни танлаб олиш. Бу зотлар биринчи навбатда табиий-иқлим шароитига мос ва юқори махсулдор бўлиши шарт. Шунинг учун зотларни туманлаштириш шароитидан келиб чиққан маъқул.

Наслчилик ишларининг самарадорлигини ошириш учун ёш қорамоллар ва сигирларни меъёردа озиклантириш ташкил қилинади. Шу билан бирга пода тарқибини тартибга солиш билан муайян хужаликда сут ва гушт и/ч қупайтириш мумкин. Жумладан подада сигирлар вазнини 40-45% етказиш, подани тулдирувчи ургочи тана ва гуножинларни тугри устириш амалга ошириш керак.

Илк бор сигирларни махсулдорлик ва насл сифатларига қараб баҳолашни ташкил этиш керак.

Ширкат ва фермер хужаликлари сигирларини сунъий уруғлантиришда юқори махсулдорлиги «яхшиловчи» букалар уругидан фойдаланилади.

Барча турдаги зоотехния ва наслчилик бирламчи ҳисоб – китобларини юрғатиш.

3. Моллар махсулдорлигини ошириш зотни такомиллаштириш билан бевосита боғлиқдир. Шунинг учун зот устида наслчилик ишини тугри ташкил этиш назарий ва амалий аҳамиятга эга. Келгусида зотни такомиллаштиришдаги зоотехникавий узаро мувофиқлаш тадбири бўлиб, минтакалар ва зот бўйича наслчилик ишининг истикбол режаси хизмат қилади. Режа 10 йилга тузилади. Ушбу режани тузишда наслчилик заводи, наслчилик бўйича республика идоралари, ИТИ ва олий уқув юртлари қатнашади.

Зот устидаги наслчилик ишининг ҳолати. Бу қисмида зотнинг келиб чиқиш тарахи, яратиш усуллари ва унда хизмат килган букалар курсатилади. Шунингдек, етук наслчилик хужаликлари подаларининг ташкил этилиши тарифланади. Наслчилик заводлари ва наслчилик хужаликларда урчитилаётган шу зотли молларнинг сони ва жамики подада соф зотли молларнинг миқдори келтирилади. Зотни тарқатиш минтақалари харитаси илова қилинади.

- Наслчилик хужаликларида молларни сақлаш ва озиклантириш шароитлари.
- Поданинг зотдорлик ва махсулдорлик сифатларининг қисқача таҳлили.
- Подани такрор ишлаб чиқариш ва ёш молларни парваришлаш.
- Зотнинг генеологик тузилиши.
- Сунъий уруглантириш станциясида ишлатиладиган букалар тавсифи.
- Зотнинг насл ва махсулдорлик сифатларини такомиллаштириши бўйича тадбирлар.
- Бука тизимларини, сигир оилалари ва қариндош гуруҳлари бўйича наслчилик ишини режалаштириш.
- Наслдор ёш молларни парваришлаш ва улардан фойдаланиш режалари.
- Наслчилик қорхоналари ва сунъий уруглантириш станцияларини наслдор букалар билан тулдириш ҳамда букаларни авлодининг сифати бўйича текширишни ташкил этиш.
- Зот бўйича кенгаш.

Назорат саволлар:

1. Наслчилик ишини режалаштиришнинг аҳамияти.
2. Наслчилик хўжаликларида наслчилик ишлари.
3. Фермер ва деҳқон хўжаликларида наслчилик ишларини режалаштириш.
4. Наслчилик режаси ва унинг бандлари.
5. Истикболли режалар.
6. Зот таркиби.
7. Зотни такомиллаштириш режаси.
8. Зот бўйича кенгаш.

Мавзу: Подани такрор ишлаб чиқариш.

Режа:

1. Подани такрор ишлаб чиқаришнинг аҳамияти.
2. Қорамолчиликда пода таркиби.
3. Жинсий ва жисмоний балоғат ёши.
4. Қупайишнинг узига хос хусусиятлари.
5. Хомилани қучириб утқизиш.

Қушимча адабиётлар:

1. Содержание, кормление и важнейшие ветеринарные вопросы при разведении голштино-фризской породы скота.

Агрота, Венгрия, 1994 год.

Таянч иборалар:

Пода таркиби, ёш ва жинс гуруҳлари, жинсий цикл, куюкиш, қочириш, жинсий ва жисмоний балоғат ёши, ҳўжаликда фойдаланиш, қисирлик, қисирликка қарши кураш.

Подани такрор ишлаб чиқариш корамолчиликда энг долзарб муаммо ҳисобланади, ёки соҳа тақдири шу масаланинг ечимига боглик.

Сигирлардан сут ва бузукни устириб гушт ишлаб чиқариш учун сигир бугоз булиб тугиши керак, бу эса энг мураккаб, масъулиятли тадбир ҳисобланади, чунки у куплаб биологик, ташкилий омиллар билан чамбарчас боглик.

Хар бир сигир бир йилда битта ва гунажин бузук бериши шарт. Шу боисдан ҳўжаликда хар бир сигир ва гунажин ҳисоб-китобда булиши шарт, эътиборсигир ва таналар жинсий фаолиятини билмаслик, ёки менсимаслик куплаб сигирларни қисир қолиши ва ургочи таналарни қочирилмаслигига сабаб булади.

Афсуски кейинги 10 йилда бу масала ечилмай келаётир ёки республикамизда хар 100 бош сигирдан 30-50 бош бузук олинмокда. Бу дегани хар бир қисир қолган сигирдан 2000 кг дан 2 млн. тонна сут ва 500 минг букачадан 200 минг тонна қушимча гушт ишлаб чиқариш имконини берар эди, бу эса республика қорвачилигига 3 млрд. сум сутдан ва 10 млрд. сум гуштдан қушимча даромад олиш имкониятидан маҳрум қилмокда.

Хар бир қисир сигир ва қочмаган ургочи тананинг бир қунлик қаражати 500-800 сумни ташкил этади, юқоридагиларни инобатга олиб хар бир мутахассис ва фермернинг вазифаси фермада бирорта қисир сигир ва ёши етиб қочмаган ургочи танани қолдирмаслик керак.

2. Пода таркиби подадаги турли жинс ва ёшдаги ҳайвонларнинг нисбатига айтилади:

Корамолчиликда қуйдаги гуруҳлар ажратилади:

1. Букалар
2. Сигирлар
3. Гунажинлар
4. 2 ёшдан катта ургочи таналар
5. 1 ёшдан катта 2 ёшгача ургочи таналар
6. 1 ёшдан 2 ёшгача эркак таналар
7. Жорий йилда тугилган бузуклар
8. Бурдоқилар.

Пода таркиби ҳўжаликнинг йуналиши ва қуйилган мақсадга қараб фарқ қилади.

Сут йуналишидаги фермер ҳўжаликларида сигирлар нисбати 46-50% булгани мақсадга мувофиқ булади.

Гунажинлар 18-20%, 2 ёшдан катта таналар 20-25 %, 1-2 ёшдаги таналар 25-30% булиши керак.

Ихтисослашган сугчилик хужаликларида сигирлар нисбати 70-80% булиб, янги тугилган ургочи ва эркак бузоклар ихтисослашган хужаликларга жунатилади.

3. ургочи бузокларда 6-7, эркак бузокларда эса 7-8 ойлигида жинсий балогат кузатилади, ёки уларда жинсий фаолият бошланади. Шу даврга келиб ургочи бузокларда куюкиш ва тухумдонда тухум хужайраси етилади, эркак бузокларда эса уругдонда уруг етилиб кочириш кобилиятига эга булади, шунинг учун 6-7 ойлик эркак ва ургочи бузокларни ажратиб саклаш керак, акс холда кутилмаган бугозликларга эга булиши мумкин, кайсики мақсадга мувофиқ эмас. Чунки хали хайвонлар танаси меъёрда етилмаган, ёки бугоз булиши учун тана тайёр эмас. Бундай пайтда кочиб колган ургочи таналар усиш ва ривожланишдан қолади, сигирлар кичик, бугози кам тош босади, кам махсул булади ва купинча подадан чиқарилади. Шу пайтда эркак бузоклар ва таналарнинг уруги ҳам тулақонли бўлмайди.

Шунинг учун жисмоний балогат ёшини кутиш керак. Бу даврга келиб тана жисмонан етилиб, жинсий фаолият ҳам муҳимлашади, тана хомила кутаришга тайёр булади. Шу даврга келиб ургочи таналар ёши 16-18 ойлик, тирик вазни йирик зотларда 350-360 кг, кичик зотларда эса 320-340 кг ни ташкил этади.

Букачаларда бу курсаткич 13-14 ойлик даврда, вазни 500-550 кг да амалга оширилади.

4. Қорамолларда купайишнинг узига хос хусусиятлари мавжуд. Уларда куюкиш йил давомида(полиэкстеричность) такрорланади, шунинг йил давомида уларни тугдириш имконияти мавжуд. Жинсий фаолият даврий булиб 21 ± 3 фолликулалар етилиб чиқади. Шу давр 24-36 соат давом этиб куюкиш деб аталади.

Жинсий давр бошқаришни гипоталамо-гипофизар тизим бошқариб туради.

Гипоталамо-гипофизар тизимининг гормонлари булиб окситоцин ва вазопрессин ҳисобланади.

Гормонлар фолликулалар етилиши тезлаштирилади.

Тухумдондан экстроген ва прогестерон гармонлари ишлаб чиқилади. Прогестерон овуляциянинг таъминлайди, худди шундақ у жинсий фаолиятга ижобий таъсир этади.

5. хомилани кучириб утқазиш фан ва техниканинг катта ютуғи ҳисобланади.

Қиска муддатда мащхур буа ва сигирлардан купрок авлод олиб, бир хил сермахсул подалар яратиш имкониятини беради.

Таркибий тизими(жадвал)

Хомила кучириб утқазишнинг икки хил усули мавжуд:

1. қонли усул (жаррохлик усули)
2. қонсиз усул

Назорат саволлар:

1. Пода таркиби.
2. Қорамол гуруҳлари.

3. Жинсий ва жисмоний балоғат ёши.
4. Урғочи таналарни қочириш.
5. Ғунажинларни туғишга тайёрлаш.
6. Қочириш усуллари.
7. Ҳомилани кўчириб ўтказиш.

Мавзу: Ёш қорамолларни устириш.

Режа:

1. Ёш қорамолларни устиришнинг назарий асослари.
2. Соғлом бузук олиш.
3. Бузукларни профилактика даври.
4. Бузукларни сут даврида устириш.

Қўшимча адабиётлар.

1. Акмалхонов Ш.А, Аширов М.Э. “Ёш бузукларни ўстириш”. Тошкент. 1986.

Таянч иборалар.

Буғоз сигир, туғиш, ўғиз сути, профилактика, сут ичириш, энага сигар, бузуклар гуруҳи, бузуклар бокси, яйратиш, энага сигир, озиклантириш ва сут ичириш схемаси.

Қорамолларнинг ирсиятдаги сут ва гушт маҳсулдорлиги фақат маъкул ташки муҳит шароитлари уларни устириш ва фойдаланиш давомида яратиб берилгандагина руёбга чиқади.

Хайвонларда тугилгандан кейин юқори маҳсулдорлик ва сифатларни шакллантириш хайвонларнинг она қорнида ва тугилгандан кейинги ривожланиш қонуниятларига бўйсиниш керак.

Шахсий ривожланиш қонуниятларини ривожланишига Г.А.Шмидт, П.Д.Пшеничный, К.Б.Свечинлар катта хисса қўшганлар.

Она қорнидаги даври қуйидагилардан иборат: муртак, қомила олди ва қомила.

Муртак даври қорамолларда 34 кун давом этади. Асосий тана аъзо ва системалари шаклланади.

Қомила олди даврида туқима, аъзо ва системалар яна усади ва қомила шаклланади, ёки янги тугилган бузук қиёфаси пайдо бўлади, ва у 8-15 граммни ташкил этади. Ушбу давр 26 кун бўлади.

Қомила даври 61 кундан бошланиб бузук тугилганга қадар давом этади. Бу даврда қомила сифат ва миқдор жиҳатдан усади. Айниқса қомила вазни охириги 2 ойда жадал усади. Бу даврда қунлик вазн ўсиши 300-400 граммни ташкил этади. Ёки 5 ой охирида 2-4 кг бўлган

хомила 7 ойлигида 12-16кг, $9\frac{1}{2}$ 25-40 кг булади. Шундай килиб сунги 2- $2\frac{1}{2}$ ой ичида хомила вазни 13-24 кг, ёки $\frac{2}{3}$ қисмга (тугиладиган бузук вазнига) купаяди.

Тугилгандан кейинги корамоллар ҳаёти куйидаги даврилардан иборат: янги тугилганлик, сут,жадал узиш ва жинсий балогат, махсулдорликни жадал шаклланиши, фаолиятни гуллаб яшнаши, қарилик.

Янги тугилганлик даври жавобгарли давр ҳисобланади, чунки янги тугилган бузук хали ташки муҳит таъсирига тайёр эмас, аъзолар фаолияти тикланади. Янги шароитга бузук 7-10 кунда мослашади. Тезрок угиз сути бериш керак.

Сут даврида асосий озика сут ҳисобланади. 2-6 ойгача ичириладиган сут микдоридан келиб чиқиб давом этади. Озика хазм қилиш аъзоларини ривожланишига қараб усимлик озикаларига ургатилади.

Бу даврда усимлик озикаларини истемол қилган бузуклар жадал усади ва 10-12 ойлигида жинсий балогат руй беради.

Махсулдорлигини жадал шаклланиши жисмоний балогат ёшидан 1 туккунгача даврини ташкил этади. Бу даврда ёш корамол жадал усади, туғишга тайёрланади, ургочи тана ва гунажинларда елин усади.

Махсулдорлигини гуллаб-яшнаган даврида барча махсулдорлик сифатлари руёбга чиқади, энг куп сут махсулдорлиги бузук бериши қузатилади. Сигирларда 1-7 тугим, буқаларда 1,5-2 ёшдан 8-10 ёшгача.

Қарилик даврида модда алмашинуви сусайиб махсулдорлик қамайяди.

Онтогенез жараёнида барча аъзо ва туқималар бир хилда усмайди. Хомила давомида суяклар жадал узиб тугилгандан кейин секинлашади.

Эмбрион даврида най суяклари яхши ривожланиб туккандан кейин ук суяклари яхши ривожланади. Мускул туқимаси 12-14 ойликда жадал усади. Кейинчалик мускул туқимаси синтези қамайиб, ёғ туқимаси нисбати ортиб боради.

Яхши озиклантириш шароитида сут ва сут-гушт йуналишидаги ёш корамолларда 16-18 ойликкача оксил моддалар ёгга нисбатан купрок ҳосил булади.

Ёш хайвонларни юқори озиклантириш даражасида боқиш улар танасида эрта семиришни қақириб урчиш қобилятига салбий таъсир қурсатади.

Ёш корамоллар бир даврда узишдан қолиши кейинги даврда маълум даражада қоплаш ҳусусиятига эга.

Бунинг сабаби бироз узиш сусайишдан кейин жадал узишга танада мойиллик булади. Сут ва сут-гушт йуналишидаги бузуклар биринчи 2-3 ойлигида 500-600 г усса булади. 6-8 ойлигида жадал устирилган таналарнинг келгуси 6-7 ойлигидаги кунлик узиши 400-500 г булса қифоя. А.Гансон тажрибалари (Швеция) 10 ойликкача жадал, кейин уртача.

Подани тулдириш учун таналар турли жадалликда устириш мумкин.

Ёш корамолларни устиришда озиклантириш типи муҳим аҳамият қасб этади.

Ёш корамоллар узиш ва ривожланиши сақлаш шароитлари таъсир қилади. 10-12°C ҳарорат ва 75-80% нисбий намлик меёр ҳисобланади.

2. Хомиланинг она қорнида меёрда узишига она танасининг тайёрлиги ҳамда эрқак ва ургочи жинсий ҳужайраларнинг сифатига боглик.

Айниқса бугоз сигирларни озиклантириш бош мезон ҳисобланади.

Сигирларни қочириш даврида ва бугозликни бошида тенглаштирилмаган рационларда боқиш жараёнга салбий таъсир қурсатади.

Бугоз сигирлар рационига сифатли пичан, силос, илдизмева ва кам микдорда ем кифоя.

Хомиланинг яхши усишига моулон ижобий таъсир курсатади.

3. Сигирларни тугиш ва бузокларнинг 10-15 кун яшаши учун тугрукхона билан профилактория курилади.

Бузок тугилиб дам олгандан кейин, 1-1½ соат давомида дастлабки сут ичишини таъминлаш керак. Бунда йирик бузокларга 2 кг, кичикларига 0,75-1кг сут ичирилади. Кейинги кунларда профилакторияда бузокларга сут беришни тана вазнининг $\frac{1}{5}$ - $\frac{1}{4}$ қисмида бериш мумкин.

Янги тугилган бузокларнинг резистентлигини ошириш мақсадида витаминли препаратлардан фойдалинилади.

Бузоклар янги тугилганда уларнинг танасида терморегуляция тулик шаклланмаган булади, шунинг учун саклаш шароитларига каттик талаб қуйилади. Бузокларга тинчлик ва узоқ ухлаш керак, шунинг учунларга иссиқ ётиш жойлари булиши керак.

4. Бузокларнинг сут даврида уларнинг ошқозон-ичак тузилишини инобатга олган ҳолда озиклантирилади. Озиклантириш бакувват, мақсадга мувофиқ маҳсулдорликда устирилиши керак. Шу боисдан подани тулдириш учун мулжалланган таналар ва гушт учун устирилаётганёш қорамолларга турли даража ва типдаги рационлар фойдалинилади.

Сут ва сут-гушт йуналишидаги подаларда бузокларни икки хил усулда сут даврида сут ичирилади: қулдан ва энага сигирлар остида, гушт йуналишидаги ҳужаликларда эса тулик онаси эмдириш йули билан.

10-15 кунлик бузоклар профелакториядан умумий бузокхонага утказилади, 10-15 бошдан сут даврининг охиригача гуруҳлаб сакланади. Бир бош бузокка 1,5-2 м² майдон ажратилади. Гуруҳларда бузоклар ухшаш бўлсин, уларнинг фарқи 10-15 кундан ошмасин.

Бузокларга факат соғлом сигирлар суги берилади. Сут ва қаймоғи олинган сут микдори ҳужалиқда қабул қилинган схема асосида амалга оширилади. Сут ичириш даври 3-5 ой, қисқартирилган усулда 50-60 кунни ташкил этади.

Бу даврда бузокларни озиклантириш унинг зоти, насл қиймати, мақсади, тугиш мавсуми ва ҳужалиқ имкониятларига қаралади. Насл қийматига қараб бузокларга турли микдорда сут ва сут маҳсулотлари, пичан ва ширали озикалар берилади.

Дастлабки 30-40 кунда $\frac{1}{5}$ - $\frac{1}{6}$ тирик вазнга қараб сут ичирилади. Шундан кейин унинг ярми қаймоғи олинган сут билан алмаштирилади.

Пичан ейишга 10 кундан, ем 15-20 кунликдан, ширали озикалар 2 ойликдан берилади.

11 кундан бошлаб бузокларга ёғли сут алмаштирувчисини берса булади. Туйимлилиги бўйича 1,2 кг ёғли сут алмаштирувчиси 10 кг қаймоқли сутга тенг келади.

6 л гача сут ичирилганда 2 марта ичирилса етарли, бу тартибга 10-15 кунликдан утказган маъқул.

Киш пайтларида 10-15 кунликда бузокларни 10-20 минутдан бошлаб яйратилади, кейинчалик 2-4 соатга етказилади.

Ёзги пайтларда айвон ва яйраш майдончаларида устирилади.

Энага сигирлар остида бузоклар 60-70 кунликгача устирилади. Энага остидаги бузоклар сони сигир сутдорлигига қаралади, ёки бир бузокка 4,0-4,5 кг сут тугри келсин.

Янги тугилган бузокларни энага сигирлар тагига 5-6 кундан қуйилади. Гуруҳдаги бузоклар ёши 10 кундан, тирик вазни 10 кг дан қуп фарқ қилмасин. Хар бир сигир бузоклар билан алоҳида катакларда сакланади.

Назорат саволлар.

1. Буғоз сигирларни озиклантириш ва сақлаш.
2. Сигирларни туғдириш.
3. Соғлом бузоқ олиш.
4. Бузоқларнинг профилактория даври.
5. Бузоқларнинг сут даври.
6. Бузоқларни ўстириш усуллари.
7. Бузоқларни сақлаш усуллари.

Мавзу. Подани тулдириш учун ургочи тана ва ғуножинларни ўстириш

Р Е Ж А :

- 1.Мавзунинг долзарблиги.
- 2,Сигирлар подасини сермахсул I тугум сигирлар билан тулдиришнинг ахволи.
- 3.Подани тулдириш учун мулжалланган ургочи бузоқларни сут даврида устириш хусусиятлари.
- 4.6-12 ва 12-18 ойлик ургочи таналарни устириш тизими.
- 5.Жисмоний балогат ва ургочи таналарни кочириш муаммолари.
- 6.Гунажинларни асраш,.озиклантириш ва туғишга тайёрлашдаги зоотехникавий талаблар.

Кушимча адабиётлар

- 1.**Меркурева Е.К** Генетические основы селекции в скотоводстве. М .К о л о с. 1977
2. **Клейменов Н.И** Научные основы полноценного кормления с/х животных.Сборник научных трудов. М.Агропромиздат 1986
3. **Венедиктов А.Л** Минеральное питание скота на комп лексах и фермах.

Таянч иборалар

Подани тулдириш, пода таркиби, бузоқ, ургочи тана, ғуножин, подани тулдириш ва зот, увиз сути, каймоги олинган сут, бузоқларнинг сут даври, бузоқларни озиклантириш схемаси, бузоқларга сут ичириш схемаси, бузоқларнинг профилактория даври, бузоқларни сақлаш, ургочи таналарни сақлаш, сақлаш учун ажратилган майдон, очик

майдонча, бир бошга охур узунлиги, ёзги ва кишги рацион, тирик вазн, жинсий балогат, жисмоний балогат, жинсий хаёт, урчитиш.кочириш индекси.елинни ишлаш, тугишга тайёрлаш.

1.Сут корамолчилигини ривожлантириш мамлакатда ижтимоий ва иқтисодий муаммоларни ечишнинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

Сут етиштиришни қупайтириш ҳайвонларни тугри озиклантириш, наслчилик ишини тугри йулга қуйиб,ҳайвонларни ирсий имкониятларини руёбга чиқариш.янги технологияларни жорий этиш йули билан амалга оширилади.

Сут корамолчилиги Ўзбекистонда уз хусусиятларига эга.Ўзбекис-тонда сугориладиган ерлар асосан галла ва пахтага ажратилганлиги, алмашлаб экишга ту лик утилмаганлиги,суъний яйловлар ташкил қилиш-нинг қийинлиги,тез узгарувчан иқлим.қуёш радиацияси соҳа муаммола-ридан ҳисобланади.

Ҳозирги пайтда Ўзбекистонда сут,сут-гушт ва гушт йуналишидаги корамоллар урчитилади.Уларнинг аксариятини сут йуналишидаги қора ола ва қизил чу л зотиға мансуб корамоллар ташкил этади,кейинги уларнинг голштин ва ангелн зотлари билан дурагайлари ҳам урчитилмоқда.

Республикаимизнинг қупчилик ҳужалиқларида подани тулдириш учун мулжалланган ургочи тана во гуножинларни устириш меъёрда ташкил қилинмаслиги сигирлар подасини янгилашиш,подадар такомиллашиға махсулдорлигиний ошишиға тугонққ бўлиб ишлаб чиқарилган сут таннар-ҳини юқори бўлишиға сабаб булмоқда.

Сут корамолчилигини ривожлантиришнинг асосий омилларида қ бўлиб подани тулдирувчи ургочи таналарни устиришни такомиллаштириш сигирлар подасини сермахсул I тугум сигирлар билан тулдиришни такоза этади.

Бу муаммо Ўзбекистонда турли ҳудудларнинг иқлим, озика, ҳужалиқ имкониятлари даражасида ҳал этилмаган.

Турли ҳужалиқларда эскирган, одми ургочи бузқққ ва таналарнинг биологик имкониятларини инобатға олмаган озиклантириш ва саклаш усуллари қи куллашлари натижасида,ургочи таналарнинг қчириш ёшида вазни қИЧЙҚ,жуссаси бақувват булмаслиги устирирган сигирларнинг вазни қам,махсулдорлиги паст бўлишиға сабаб булмоқда.

Шу боисдан падани тулдириш учун ажратилган ургочи бузққққ ва таналарни илмий аоосланган, тажрибада синалган илгор технологиялар ердамида тарбиялашни талаб этади.

2. Дастлаб подани тулдириш учун ургочи насли бузқққққларни танлаш-дан бошлаш қерақ. Танлаш генотипи буйиқа подани тшнглашишиға ва ирсий имкониятларни мустанқамланишини таъминлайди. Подани тулдириш, шундай ҳайвонларни танлаш қераққи, улар албатта подадан чиқарилган ҳайвонларға шсбатан махсулдорлиги юқори булсин. Иложи бориқа подадан чиқарилиши қиуза тутилган сигирлар сонига нисбатан ургочи таналарни дастлаб танлашда оммавий танлаш асосида ишлаб чиқариш муаммоларини ҳал этишға қаратилмоғи қерақ.

Устириш давомида усишдан қолган, тана тузилиши нуқсонлари бор ва биринчи тугимда қам сут берган ҳайвонлар подадан чиқариб болилади.

Хозирча бизнинг фермер ва ширкат хужаликларида подада сигирлар

етишмаслигини инобатга олиб барча ургочи хайвонларни устиришга колдириб, кочириб, тукканидан кейин киска лактация асосида танлашни ташкил килган маъкул. Бундай усул факат сигирлар сонини купайтирибгина

колмасдан хужаликда бузук олишни купайтиришга ижобий таъсир курсатади.

Одатда подани тулдирувчи ургочи таналар жадал устирилганда уларнинг 25-30 зоотехника ва ветеринария сабабларга кура пучак килинади. Улар кочиб тукканидан кейин эса 32-34% махсулдорлиги камлиги учун пучак килинади.

Шунинг учун подани тулдириш учун ургочи таналарни устирганда нафакат сигирларни сут махсулдорлигини оширишни, балки подада сигирлар нисбатини кутаришга ҳам диққатни қаратиш керак.

Бузукларни танлашда 90 кунлигида вазни гуруҳдаги уртача тирик вазнининг 70-80% ташкил килганда улар усишдан колган хисобланади ва гуруҳдан пучак килинади.

Бузукларни якуний танлаш узок давом этиб, усишдан колган ва касалларини подадан чиқариш керак. Шундай каттиккулликни ургочи таналарни устиришнинг кейинги боскичларида ҳам амалга ошириш керак.

Устириш учун бузукларни танлашда уларнинг тана тузилиши инобат га олинади, чунки тана кисм ва аъзоларининг ривожланиши хайвонлар махсулдорлиги ва саломатлиги билан боглик. Бу уринда бузуклар жуссаси, тана улчамларига эътибор қаратилади.

Подани тулдирувчи ургочи таналарни устириш жараёнида шахсий ривожланиш қонуниятларига катъий риоя қилиш шарт: ривожланишнинг давомийлиги, тенг эмаслиги, ривожланишнинг корреляция ва интеграцияси, адаптацияси.

А.П.Бегучев (1971) маълумотларига қараганда турли тукима ва аъзолар узига хос ривожланадн, шунингдек тана, шаклланишининг

узғариши ва танада оксил ва ёғнинг тупланиши хайвон жинси, ёши, ҳамда озиклантириш типига боглиқдир.

Яхши шароитда устирилган бут ва сут йуналишидаги ургочи таналар 12-14 ойликкача танада асосан оксил моддаларини, кам микдорда ёғ туплайди. Ундан кейин танада ёғ ҳосил булиши жадаллашиб ургочи таналарнинг урчиш хусусиятларига салбий таъсир курсатади.

Шу боисдан ургочи бузуклар ва таналар усиш ва ривожланишини устириш усуллари қуллаб уларнинг тана ҳажми ва тирик вазнини узғартиришга эришиш мумкин.

Купчилик тажрибалар сигирлар сут махсулдорлигини шаклланишида таналарнинг биринчи қочириш ёшига нисбатан тирик вазни купрок аҳамиятга эга эканлиги исботланган.

Купчилик тадқиқотлар шундан дарак берадики, биринчи тукканда йирик зотлар гунажинларининг ёши 24-28 ой, вазни эса 470-550 кг булгани маъкул.

Биринчи тугимни сигирларнинг 24-25 ойлигида утказиш биологик жихатдан асосланган, иктисодий самарали ҳисобланади. Бу эса ургочи таналарни устиришни жадаллаштиришни такоза этади, ёки улар 15-16 ойлигида подадаги вояга етган сигирлар тирик вазнининг 65-70% ташкил этсин.

3. Янги тугилган бузokka караш-унинг тугри устиришдаги дастлабки кадам ҳисобланади. Янги тугилган бузok артилади, хомила олди суюкликларидан тозаланади, жуни куригилади, киндиги дезинфекция қилинади. Шундан кейин у профилакторияга утказилади. Бузok тугилгандан кейин 2 соат ичида унинг тирик вазнидан катъий назар 1,5-2 кг угиз сути ичирилиши керак.

ПРОФИЛАКТОРИЯ ДАВРИ. Бу даврнинг асосий хусусияти бузok дастлаб угиз сути, кейинчалик эса ёгли сут ичади. Бу даврда бузokларни якка катакларда саклаш уларнинг саломатлиги гарови булиб сут ичирилиши осонлаштиради. Угиз сути бу даврда ягона озика булиб уз таркибида узиш ва саломатлигини саклаш учун зарур моддаларга эга. Ёгли сутга нисбатан угиз сути таркибида курук моддалар, оксил, ёғ, минерал моддалар анча куп. Бундан ташқари у уз таркибида алохида модда гамма-глобулин саклайди.

Биринчи 24 соат ичида бузokларга сут энг камида 1,5 -2 л дан 3 марта ичириш тавсия этилади.

Иккинчи марта угиз сути бузokka биринчи ичиришдан кейин тугилгандан 6 соатдан кейин ичирилиши шарт. Бу даврда албатта бузokлар угиз сути ва сутни оналаридан олишлари керак. Бу давр 15 кун давом этади. Давр охирида бузokларни 2 маҳал сут ичиришга утказган маъкул.

Профилактория тугрик булими таркибига кириб у барча зоогигиеник талабларга жавоб бериши керак. Йил давомида харорат 10-15 С нисбий намлик 75% гача булиши таъминланиши керак.

Бу булимда якка катаклар 2 қатор жойлаштрилиб уртасида йулак булади. Катак деворлари темир, тахта ёки пластик ойнадан булиши мумкин, таги эса тиркишли булади, чунки ахлатлар доимий пастга тушиб туриши керак. Катакнинг олди қисмида охур, орқа қисмида эса эшик жойлашган.

Ўзбекистон шароитида бузokларни ёшлигидан бошлаб профилактория уйларда устириш имконияти бор. 100 бош қорамолга уртача 16 профилактория уйи тугри келади. Уйчалар бир-биридан 70-100 см ораликда жойлаштриилади. Бир уйчадан бир йилда 6 та бузok утади.

Уйча катак булиб (фанердан булса мақсадга мувофиқ) усти ёпилган булади. Улчамлари: узунлиги 220 см., эни 120 см, олди тусик баландлиги 120 см. орқаси 110 см. Уйчанинг ички қисмини полиэтилен пленкаси билан қоплаб қуйса фанер девор хул булмайди.

Уйчада дагал ва мирерал озикаларга охур, хамда сут ичириш учун мослама урнатилади. Уйча тагига 25-30 см калинликда киринди ёки 6-7 см килиб майдаланган сомон ёки похол тушалади.

Кейинчалик хар 2-3 кунда 1-2 кг сомон тушама солиб борилади. Курук тушама, елвизакнинг йуклиги, бузокларни уй-профилакторияларда очик хавода устириш имконини беради.

Уйчада олдинги деворнинг булмаслиги бемалол кириб-чикиб юриш имконини беради. Бузок эркин яйрэши учун уйчанинг олдинги кисмига 180-120 см сим тур ёки тэатадан тусик килиб олдинги кисмидан эшик куйилади. Ёмгир пайтида уйчалар тахта устига куйилади, у уйчанинг хар томонидан 10 см чикиб туриши, тахталар ораси 1,5-2 см очик колсин.

Киш пайтида уйчанинг олдинги кисми мато билан ёпиб куйилиши мумкин. Харорат - 10°C ошиб шамол булса мато ёпиб куйилади, лекин бузок бемалол кириб-чикиб тураверади. Агар харорат - 10°C паст булса мато очиб куйилади, акс холда уйча ичида зарарли газлар микдори ошиб кетиб бузок соглигига салбий таъсир курсатиши мумкин.

Угиз сути таркибида купинча витаминлар ва микроэлементлар етиш майди,бунда бузок конини текшириб ишонч хосил килса булади. Бундай пайтларда тугилганидан бошлаб 1,5-2 ойгача 6-7 кунда бир марта бир бошга 5 мл тривитамин ва I мл витамин B12 ни венасига юбориш, микроэлемент сифатида тузлар йигиндисидан 1 кунда 1 марта бериш керак .

Бузокларни озиклантириш улардан кунига 650-700 г кушимча вазн олиш юзасидан амалга оширилади.

10-15 кунгача бузок факат она угизи ва ёги олинган сути билан бокилади, кейин аралаш сутга утказилади. Хар бир бузокка алохида раками ёзилган сут ичириш идиш ва сургичи ажратилади, у ракам уй-про-филакторий ракамига тугри келиши керак.(У.Носиров ва бошкарлар,1989) Аралаш ёгли сут албатта соглом сигирлардан олинган булиши керак.

I - ЖАДВАЛ.

Ёши, кун	Киш фаслида					Ёз фаслида				
	Ёгли сут	Пичан кайнаг- маси	Омихт а ем	Беда пичан	ошпузи	Ёгли сут	Пичан кайнаг- маси	Омихта ем	Кук озика- лар	Ош тузи
2-10	5	ур-ш	ур-ш	ур-ш	5	5	0,5	ур-ш	ур-ш	хохлаг
11-20	7	0,5	-	-	хохлаг	7	0,5	0,2	-	-
21-30	7	0,5	0,4	0,5	-	7	0,5	0,2	0,4	-
31-40	6	1,0	0,4	0,7	-	6	1,0	0,3	0,6	-
41-50	6	1,0	0,5	0,8	-	6	1,0	0,4	0,8	-
51-60	5	1,0	0,6	1,5	-	5	1,5	0,5	1,2	-
58 кунда жами:	35,0	4,0	1,9	3,5	-	35,0	4,5	1,4	3,0	-

Бузоклар дагал озикаларга (сифатли пичан, сулитилган кук беда) 10 кунликдан ургатилади, дастлаб суткасига 100-150 г дан бериб, кейинчалик секин ошириб борилади, 2 ойлигида 800-1000 г етказилади, 35 кунда бузок 35 кг пичан истеъмол килади.

Омихта емга бузоклар 10 кунлигидан ургатилади, уларга дастлаб 100-150 г, кейинчалик унинг миқдори бир ойлигида 400-500 г, 2 ойлигида эса 1000 г га етказилади, 40 кун давомида 19 кг ем истеъмол килади.

Албатта бу рационга озикалар бузокнинг аъзоларининг анатомик ҳолати ва физиологик фаолиятини инобатга олган ҳолда амалга оширилади.

Наслчилик хужаликларида сут даврида 350 кг ёғи олинмаган ва 330 кг каймоғи олинган сут берилади.

Одми хужаликларда усиш жадаллигини инобатга олиб ёғи олинмаган сут миқдорини бироз қисқартириш мумкин.

Одми хужаликларда бир қисми ёғли сутни сут алмаштирувчи ҳолида бериш мумкин. (УзЧИТМ ишланмаси).

100 кг сут алмаштирувчиси тайёрлаш учун: пахта шроти 24-34 кг, арпа уни 25-27 кг, маккажухори уни 38-35, ачиткилар (курук) 5, беда уни 6, бур 1-1,5, туз 0,6 кг.

Ушбу аралашма каймоғи олинган сутда эритилади унга сув, балик ёғи, шакар, террамицин ва микроэлементлар кушилади (кобалт хлорид, марганец сульфат, мис, темир, калий йод).

Сунъий сут АЗМ-0,8 курилмасида тайёрланади. Технологик жараён куйидагича: аралаштиргичга 400 л сув куйилади (иложи бўрича кайноқ) унга шнек ёрдамида 100 кг омихта ем солинади. Аралашма 85-90°C иситилади, 1 соат давомида аралаштиргич ёрдамида куйилтирилади. Кейин у 75-70°C ҳароратга пасайтирилади ва 300 л каймоғи олинган сут кушилади.

Ёғ қушимчалар, антибиотик, микроэлементлар ва витаминлар аралашмаси ҳарорати 50°C пасайгандан кейин кушилади. Эмулгатор ёрдамида бир хил суюқликка айлантирилади, совитилиб бузокларга ичирилади.

Ҳар бир бузокка сут алоҳида пакирда ичирилади. Бузокларга ичириладиган сут, сут алмаштирувчиси, каймоғи олинган сут, янги ва тоза бўлиб ичириш пайтида биринчи ойда 30°C, иккинчи ойда эса 30-35°C, кейинги ойлarda 20-25°C бўлса булаверади.

Бузокларнинг биринчи 40-50 кунлигида бир кеча-кундузда тугилгандаги тана вазнининг 1/4-1/5 миқдорида берилиб, кейинчалик секин камайтирилади. Бузокларни озиклантириш уч маҳал.

Каймоғи олинган сут бузокларга 31 кундан бошлаб ичирилади. Бузокларни овқат ҳазм қилиш қобилятини кучайтириш мақсадида сут ичиргандан 1 соат кейин қайнатиб совитилган сув берилади, айниқса бу нарсани бизнинг шаротимизда езда эсдан чиқармаслик керак.

Бузокларни ёшлик пайтидаёқ эм, дагал ва ширали озикаларни ейишга ургатиш керак. Бу тадбир уларнинг ошкозон-ичак тизими хажмини катталашиши ва фаолиятини кучайишига олиб келади, бундай хайвонлар келажакда сигир булганида катта хажмдаги озикаларни истемол килиб, хазм килиш натижасида куп сут бериш қобилятига эга булади. Бу пайтларида бузоклар охурларида доим янги урилиб бироз сулитилган беда булиши мақсадга мувофиқдир. Дагал ширали ва ем озикалар 3 ойликкача аравачаларда келтириб берилади, кул билан таркатилади.

Ургочи таналарнинг 100 кг вазнига 7-12 ойлигида 2,4-3,0 кг курук модда, 13-18 ойлигида эса 2,1-2,5 кг сарфланади, ёки I кг курук модда таркибида 0,7-0,9 озика бирлиги булиши керак.

1 озика бирлигига 4 г фосфор, ёки I кг курук моддага 2,8-3,0 г фосфор тугри келиши керак.

Ургочи таналарнинг хазмланувчи протеинга булган талабини кондириш уларнинг жадал усиши ва етилишини таъминлайди. Шу боисдан I озика бирлигига :4-6 ойлигида 117-105 г; 7-9 ойлигида 100 г атрофида; 10-18 ойлигида эса 95-90 г булиши мақсадга мувофиқдир.

Ургочи таналар ҳаётини сақлаб туриш учун ҳар 100 кг тирик вазни учун 60 г хазмланувчи протеин кифоя, 1 кг семириши учун эса камида 500 г хазмланувчи протеин истемол килиши керак.

Бузоклар ва ургочи таналар рационидида углеводлар миқдорини алоҳида ҳисобга олиш керак. Курук моддага нисбатан клетчатка 3 ойгача 6-12%; 4-6 ойлигида 16-18%, 7-12 ойлигида 20-22%, 13-24 ойлигида 22-24% булиши керак.

Курук модда таркибида канд 3 ойгача 15-16,5%, 6 ойлигида 8,0-9,5%, 7-12 ойлигида 6,5-9%, 13-24 ойлигида 6,5-8,5%. Меъёрадаги канд протеин нисбати 0,8-1 даражасида туриши шарт.

Курук моддага нисбатан ёғнинг нисбати ёш бузокларда 22-24%, 6 ойликда 5-5,5%, катта ёшдаги ургочи таналарда 3% кифоя.

Ургочи таналарни устиришда минерал моддалар алоҳида урин тутати, уларнинг етишмаслиги, модда алмашинувини бузилиши, усишдан қолиш, иштахасини йуқолишига сабаб булиши мумкин.

Ургочи таналарнинг қушимча вазнининг 4-5% минерал моддалар ташкил килади. Бузокларнинг 6 ойлигида 6 кг минерал моддалар, I ёшида эса 9-10 кг минерал моддалар тупланади.

Рационда минерал моддаларнинг етарли булиши суякни яхши усиб мустаҳкам булишини, унинг соғлом булишини таъминлайди.

Ургочи таналарни устиришда микроэлементлар алоҳида урин тутати. Уларнинг етишмаслиги модда алмашинувига, махсулдорлигига, озикалар хазмланиши ва узлаштирилишига салбий таъсир қурсатади.

Ургочи таналарнинг микроэлементларга булган талабини кондиритиш учун 1 кг курук модда ҳисобига бўлиши керак, мг: темир 50-80; мис 5--10; рух 30-60; марганец 30-60; кебалт 0,4-0,7 ва йод 0,2-0,6.

Ургочи таналар меъёр даражасида устиши учун улар етарли миқдорда А ва Д витаминлар билан, ёшлигида эса катта қоринлар ривожланганлигига қадар В гуруҳ витаминлари билан ҳам таъминланиб турилиши керак .

Таналар учун каротин манбаи бўлиб усимлик озиқалари ҳисобланади.

6 ойлигида 1 кг курук моддага 26-37 мг каротин тугри келса, кейинчалик 22-25 мг керак.

Витамин Д етишмаса рахит касаллиги келиб чиқади. Ундан 6 ойда 0,6-0,9 минг МЕ; 6 ойдан кейин эса 0,4-0,5мМЕ керак.

Бу даврда ургочи таналар боғламасдан асралади. Улар молхона ва

яйраш майдонларида сақланади. Озика тарқатиш, гунгни йиғиштириш ва сугориш ишлари тулик механизациялаштирилган бўлмоғи керак.

Тажрибалар шундан далолат берадики меъёрда озиклантирилган

ва сақланган ургочи таналар 1 ёшда 250-300 кг вазнга зоришишлари мумкин. III у даврда уртача кунлик устиш 550-600 г ташкил қилиши тавсия эти

лади.

Киш пайтида озиқалар уч марта тарқатилиши мумкин. Эрталаб дастлаб ем озиқалар, кейин эса дагал ва ширали озиқалар берилади.

10 ойликдан бошлаб уларни бонитировка қилиб юқори классга қларини олиб қилиб қолганларини бурдоқилаб гуштга топшириш керак.

Таналар 12 ойлигида енгил яйраш майдонларига эга биноларга утқазилиб 18 ойликкача, 40-50 бошдан гуруҳлаб сақланади. Хар бир бош танага бино ичидан 4 м , яйраш майдонидан 6 м² юза ажратилади.

Меъёрда озиклантирилган ургочи таналар 18 ойлигида 350-400 кг тирик вазнига эга бўлади ёки кунлик вазн ортиши 500-550 г ташкил этади, ёки 1 кг семиришига 9,0 озика бирлиги 1000 г ҳазмланувчи протеин сарфлайди.

Уларнинг вазни 340-350 кг, ёки 17-18 ойлигида подадаги вояга етган сигирларнинг тирик вазнининг 65-70% етганида юқори махсулдор буқаларнинг музлатилган уруғлари билан сунъинг уруғлантирилади.

Ургочи таналарнинг ва гуножинларнинг устирига бўйича институт миқёсида қатор ишлар қилинган(И.МАКСУДОВ) улар тугрисда тухташ мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Биринчидан Ўзбекистон учун режали қора-ола зотли сермахсул сигирлар устириш имкониятлари очиқ берилган. Биргина қора-ола зотини қолштин зоти билан қатиштириб олинган дурагай таналар 18 ойлигида узларининг соф зотли тенг урларига нисбатан 2 кг.биринчи тукканда 37 кг қуп тош босиб 1 лактацияда 3601 кг ёки 161 кг қуп сүт берган.

Кафедрада подани тулдирувчи кора-ола зотли ургочи таналар ва гуножинларни турли саклаш усулларида устириш имкониятлари исботлаб берилди.

Ургочи таналар ва гуножинлар бинолар ичида яйраш майдончаси ва мажбурий хайдаш (2-3 км), бино ичи ва яйраш майдончаларида, ҳамда уч деворли айвонли, очик майдончаларда устириш натижалара куйидагилардан иборат булди, 18 ойликда улар вазни 319,344,341,336 кг булиб, биринчи тукканда эса 489,500,485,491 кг вазнга эга булиб, 1 лактацияда улар 3181,3453,3326,3435 кг сут бериб эркин харакатлантириш ва очик майдончаларда устириш ургочи таналар ва гунажинларни яхши ушиб юкори сут махсулдорлигини шакллантириш гарови булар экан.

Ёки ургочи таналарни кишда айвонли майдончаларда езда сунъий яйловларда устириш (И.МАКСУДОВ, Б.АБДУРАХИМОВ) нафакат соғлом ва сер махсул сигирлар устириш имкониятлари бериши исботланган, ёки бундай биринчи тугим сигирлар вазни анъанавий усулда устирилган сигирларнинг тирик вазнига нисбатан 30-50 кг, I лактациядаги сути эса 500-700 кг юкори булини аникланган.

Республиканиз шароитида емнинг чегараланганлиги ва кимматли

подани тулдирувчи ургочи таналарни устиришда ундан оқилона фойдаланишни такоза этади. Шу боисдан кафедрада ургочи таналар ва гуножинларни устиришда рацион тўйимчилигини 15,20,30,40% ем ташкил қилганда уларнинг ушиб ва ривожланишсини, ҳамда сут махсулдорлигини шаклланиши хусусиятлари урганилган. Шу аснода устирилган ургочи таналарнинг 18 ойликдаги тирик вазни 341,352,360 кг, I тукканда эса 433,

453 ва 481 кг ташкил этиб, 1 лактация натижаларига кура 3294,3403,3764 ва 3578 кг сут бериши, сермахсул сигирлар устиришда рацион таркибида 30% атрофида ем булиши сут махсулдорлигини шаклланишига ижобий таъсир этиши. ем 15-20% булганда тана ва гуножинларни ушибга салбий таъсир этиб, сут махсулдорлигини бироз паст булишига сабаб булади.

Рацион таркибида емни 40% булиши тана ва гуножинларни меъёрдан ошқича семиртишга сабаб булиб йирик сут-гушт типидagi сигирларни шаклланишига олиб келади ва сут махсулдорлигига ижобий таъсир этмайди.

Ўзбекистонда ургочи таналар ва гунажинларни устириш билан шугулланувчи хужаликларнинг озика захиралари ва имкониятлари бир хил эмас. Шунинг учун олиб кафедрада турли мулк шаклидаги, хар хил озика захиралари мавжуд хужаликлар ургочи таналар ва гуножинларни устириш йуллари аникланган. Бунда меъёр буйича устирилган; меъёрдан ошқича жадал устирилган; 6 ойгача жадал 6-18 ойликда меъёрда, 18 ойдан тукканча жадал устирилган; 18 ойликкача меъёрда 18 ойликдан тукканча жадал, 16 ойликдан тукканча уртача устирилган ургочи тана гунажинлар ушиб ривожланиши, ва сут махсулдорлигини шаклланиши урганилган.

Бу тадқиқотлар жадал устирилган таналар жуссаси йирик, вазни катта булиб, меъёрда устирилган таналарга нисбатан 18 ойлигида 28 кг I тукканда 36 кг куп тош босган, шунингдек бутун устириш давомида жадал усулни куллаш уларда юкори сут махсулдорлигини шаклланишига олиб келар экан.

Жадал устирилган биринчи тугим сигирлар энг куп 3640 кг сут бериб бошқа гуруҳларга нисбатан 520,292,437 ва 446 кг куп сут бериши аникланган.

Айникса бу усул озика етиштиришда муаммолари бор хужаликлар учун кул келиб узлари учун кулай усулларни танлаб олиш имкониятини беради.

Купайиш кишлок хужалик хайвонларида мураккаб биологик жараён булиб, подани кайта тиклашни таъминлайди.

Умуман бу жараён уз ичига жинсий цикл, бугозлик, тугиш, ва тугишдан кейинги даврни ташкил этади.

Жинсий балогат ёки авлод колдиришга кобилият, кишлок хужалик хайвонларида ривожланишнинг тугаши ва жисмоний балогат ёшига нисбатан анча эрта руй беради. Бузоклар тугилган кунидан уларнинг конида эстроген мавжуд булиб, 1,0-1,4 мкг., 2-3 ойлигида тухумдонларда узгаришларни сезиш мумкин эстроген гармонлар 1,6-1,8 мкг гача купаяди. 4 ойлигига келиб жинсий гормонлар конда 6,9 мкг, 6-7 ойлигида эса 22 мкг га етади.

Жинсий балогат ёшигача тухимдоннинг гормонол фаолияти жуда суёт булади. Шахсий ривожланишнинг даётлабки даврларида гормонлар хосил булиши унинг парааланишига нисбатан юкори булади.

Жинсий балогат ёши бузокларни озиклантириш меъёрларига ва сак лаш усулларига боглик. Етарли озиклантирилмаган рацион таркибида протеин, макро ва микроэлементлар витаминлар етишмаслиги жинсий бало гатга етишни 2-3 ойгааа кечиктириб юборади. Айникса бузокларни зич коронги, хавоси бузук, совук ва зах биноларда саклаш уларни жинсий фаолиятини шаклланишига салбий таъсир курсатади.

Ургочи бузоклар ва таналарни ёруг, яхши, шамоллатиш имконияти болирик, намлик меъёрда биноларда саклаш уларнинг жинсий жихатдан меъёрда уйгонишини таъминлайди. Айникса бузокларни яйратиш, хар куни 2-3 км мажбурий хайдаш очик майдончаларда устирига уларнинг жинсий фаолиятини гуркиратиб тез жинсий ва жисмоний балогатга етишига ижобий таъсир курсатади.

Бу уринда корамолнинг зоти хам жинсий балогат ёшига таъсир эта ди, тез етилувчан зотларда эртарок, йирик ва гушт йуналишидаги зотларда бироз кечрок руй беради. Умуман олганда жинсий балогат ургочи бузокларда 8-10 ойлигида руй беради, баъзида эса бироз эртарок хам руй бериши мумкин, шунинг учун кузда тугилмаган жуфтлашишларнинг олдини олиш 7 ойлигидан бошлаб эркак ва ургочи бузокларни алохида саклаш тавсия етидзди.

Жинсий балогатга етиши хамона тухумдонда даврий равишда фол-ликулалар хосил булиб, тухум хужайраси етилиб, жинсий аъзоларнинг эндокрин фаолияти кучаяди. Руй бераётган узгаришлар хар хайвон турига хос ташки феъл-атворда уз аксини топади, яъни уларда жинсий цикл кузатила бошлайди, жинсий куйикиш ва мойиллик аломатларини кузатиш мумкин, шунингдек ташки жинсий аъзоларда хам узгаришлар руй беради. Бу даврда ургочи таналар ва ёш таналарнинг фавкулудда жинсий ковушиши бугоз булишга олиб келади, бу холат хайвоннинг усиш ва ривожланишига салбий таъсир курсатади, тугиш кийин кечади, бундай сигирлар жуссаси кичик, махсулдорлиги паст булади. Шу боисдан ургочи таналарни кочириш албатта жисмоний (физиологик) балогатга етгандан кейингина эмалга опшрилици шарт. Бу даврда хайвонлар жуссаси катталашиб, мустахкамланади, жинсий фаолият муътадиллашади, хайвон оталааниш ва хомила кутаришга тайёр булади.

Жисмоний балогатга етишни ургочи таналарни жадал устириш ва яхши шароитларда саклаш тезлаштиради ва подани киска муддатларда сермахсул сигирлар билан таъминлаш имконини беради.

Купгина ривожланган мамлакатларда(Исроил, Европа, Шимолий Америка) ургочи таналар 13-15 ойлигида 350-400 кг вазнда кочирилмокда.

Ўзбекистон шароитида турли усулларда устирилган ургочи таналарни 16-18 ойлигида вазни 340-350 кг ёки подадаги вояга етган сигирлар вазнининг 65-70% булганда кочириш мақсадга мувофиқдир. Куп тажрибалар шундан далолат берадики, (М.МАКСУДОВ 1994) шу ёшда жинсий фаолият жуш урган булади, ургочи таналарда жинсий цикли уз вақтида утиб, куйиқиш ва мойиллик фаол кечади, натижада яхши уругланиб, оталаниш руй беради. Кочириш индекси борйуги 1,5-2 ташкил этади.

Ургочи таналарни иложи борича авлодларининг махсулдорлиги буйича баҳоланган ва яхшиловчи деб тан олинган букаларнинг музлатилган уруглари билан кочириш мақсадга мувофиқ хисобланади, фақат наслчилик хужаликларда биноан жуссаси кичик букаларни танлаш мақсадга мувофиқ хисобланади.

Сунъий уруглантириш ижобий шатижалар бермаган ургочи таналарни асл букалар билан кулдан кочириш самара беради.

Ургочи таналарни кочириш даврида мамлакатимизнинг иқлим ҳудудлари ва йил фасларини ҳам инобатга олиш мумкин.

Ургочи таналарни уз вақтида кочириб бугоз қилиш муҳим зоотехникавий ва иқтисодий омил булиб хисобланади. Чунки ургочи таналар ёши улғайиши билан уларнинг жинсий фаолияти сустлаша боради, қайсики оталаниш курсаткичларига салбий таъсир курсатади (И.А.Даниленко; 1978) маълумотларига Қараганда 18 ойлик таналар кочирилганда эталанмаганлари 4-8% булгани ҳолда 24 ойликда бу курсаткич 16--25% ташкил қилади.

Ургочи таналарни муддатидан утиб кочириш йил давомида сигирлардан олинган сут миқдорини камайишига ва сигир устириш харажатларини қупайишига сабаб булади.

Н.Г.Дмитриев ва И.М.Борисов(1982) маълумотларига қараганда- 24 ойлигида биринчи марта туккан сигир 10 йил хужаликда фойдаланиш мобайнида 36 ойлигида туккан сигирга нисбатан 60% куп сут , бузук ва 50% куп гушт бериши мумкин.

Шундай қилиб ургочи таналарни меъёردа устириб уз вақтида кочириш подани қайта тиклаш ва уни такомиллаштиришда муҳим омил булиб хисобланади.

6.УРГОЧИ ТАНАЛАРНИ ЖАДАЛ УСТИРИБ 16-18 ойлигида 350-360 кг тирик вазнда кочириш ҳам гуножинларни туғишга тайёрлаш коникарсиз

Булганда сермахсул сигир устириш имконини бермайди. Сутдор хайвонни шакллантириш ургочи танани кочиргандан сунг ҳам давом этиши шарт. Бу уринда гуножинларни туғишга ва лактацияга тайёрлаш бекиёс урин тутати, унинг сифати албатта туғиш бузук ҳолати, лактацияда соғиб олинган сутда уз аксини топади.

Гунажинларни туғишга тайёрланганлигини баҳолаш муаммоси мавжуд. Бунда биринчи навбатда гуножиннинг ташки белгилари, асосида амалга оширилади. Шу

боисдан гунажинларни тугишга тайёрлаш улар бугозлигининг биринчи ойдан бошланмоги керак, бу эса биринчи ва келгуси лактацияларда сигирларнинг куп сут беришига гаров булади.

Бизнинг шароитимизда биринчи тугим сигирлардан энг камида 3000 кг сут соғиб олишни ҳисобга олиб ҳаракат қилиш керак. Энг камида озиклантириш ва саклаш ушбу талабни таъминлаш даражасида ташкил қилиниши керак.

Ургочи тананинг бугозлиги аниқлангандан кейин (2-3 ой) гуножинлар гуруҳига утказилади ва бугозлишнинг охиригача сакланади. Дастлаб 6 ойликкача бугоз, кейинчалик эса 6-9 ойлик гуножинлар гуруҳи ташкил этилса мақсадга мувофиқ булади.

Гунажинларни молхона ва яйраш майдончаларида боғламасдан устириш керак. Уларнинг иложи борица купрок ҳаракат қилдириш чораларини қуриш керак. Бино ва яйраш майдончалари ери текис бўлиб тушама солинган бўлиши керак. Акс ҳолда гуножинлар йиқилиши натижасида жароҳат олишлари мумкин.

Бу гуруҳларда гуножинларга озикалар узиюлар озика таркатгичлар ёрдамида тарқатилади, гуног эса занжирли транспортёрлар яйраш майдонида эса сургичлар ёрдамида уларни сугориш ПА-х сугоргичлар ва сув охурлари ёрдамида амалга оширилади.

Бу даврда гунажинларни меъёрда саклаш, озиклантиришга алоҳида эътибор берилади. Ёз ойларида гунажинларни иложи борица очик майдонларда саклашга ҳаракат қилиш керак. Киш даврида эса гунажинларни айвонли очик майдончаларда саклаш яхши натижалар беради, айвон поли қалин тушамалар билан таъминланиши керак. Киш пайтида молхона ичида ҳам гунажинларни қалин тушамаларда саклаган маъқул.

Иложи борица ҳужаликларда гунажинларни яйловда саклаш уларнинг суягини мустаҳкамлаб, мускул туқималари ва ички аъзоларнинг яхши ривожланишини таъминлаб, касалликларга чидамлилигини ошириб, келгуси сигирхонада саклашга тайёрлигини оширади.

Гунажинларни катта қорнини ҳажмини меъёрдан ошиқ катта бўлиб кетмаслиги ва муддатидан оддин куп сут ҳосил бўлишини олдини олиш учун тугишга 10 кун қолганда рацион туйимлиги 50% қамайтирилиб, ундан ширали озикалар чиқариб ташланади.

Гунажинлар сакланадиган биноларда зооигиена талабларига риоя қилиб карбонат ангидрид газининг микдори ҳавода 0,25-0,3%, аммиак 0,01-0,02 мг/л ёруғлик коэффициентини 1:15 бўлиши лозим.

Тугишга меъёрда тайёрланган гунажинлар яхши ривожланган ва урта семизликда бўлиши керак, бундан ташқари унинг ташқи жинсий аъзолари ва елини рисоладагидек бўлиши керак. Уларнинг жун қатлами қуруқ ва дағал айрим жойларида дағал бўлиши мумкин.

Сермахсул подаларда тугиш олди шиши қучли булади. Чунки уларда елин туқималари жадал ривожланади.

Тугишга меъёрда тайёрланган гуножинларда қийин тугишлар қузатилмайди.

Кийин туғишлар хайвонда кучли хаяжон (стресс) чакириб, унинг кони таркибида глюкоза микдори 89 мг%, эозинофиллар микдори эса икки марта камайиб кетишига гувоҳ буламиз.

Оғир туғишлар биринчи туккан сигирнинг ҳолатига салбий таъсир отиб уни муддатидан илгари подадан чиқариб юборишга сабаб бўлади.

Гунажинларни туғишга тугри тайёрлаш туғиш жараёнларида уз аксини топади. Гунажинлар туғишга меъёрда тайёрланмаса биринчи туккан сигирларда йулдошнинг уз вақтида ажралмаслиги 2-2,5 баровар купайиб кетади.

Гунажинларни туғишга меъёрда тайёрламаслик биринчи туккан сирирларни уз вақтида кочмаслигига сабаб бўлади. Шу сабаб билан 40% биринчи туккан сигирлар подадан чиқиб кетиши мумкин.

Туғишга меъёрда тайёрланган гуножинлар ёмон тайёрланганларига нисбатан 15-20% купрок сут беради.

Туғишга яхши тайёрланган биринчи тугум соғин сигирларнинг лактациясини бошида ижобий курсаткичлар, яъни юкори сут маҳсулдорлиги ва уларнинг уз вақтида қочиши таъминланади.

Кафедрамаизда гуножинларни туғишга тайёрлаш буйича баъзи ишлар қилинган улар ҳақида тухтаб утишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайман.

Биринчи навбатда гунажинларни меъёрда озиклантиришга эришилган. Уларга рацион 23 хил курсаткичлар инобатга олиб тузилган. Рациони пичан, сенаж, силос, лавлаги ва емдан иборат бўлиб, туйимлиги 8,05 озика бирлигига тенг бўлиб, унинг таркибида 938 г ҳазмланувчи протеин бўлиб I озика бирлигига 115,52 г ҳазмланувчи протеин тугри келган.

Рацион таркибини 29,43% дағал, 46,23% ширали ва 24,3% ем озикалар ташкил қилган.

I кг вазн ошишига 11,12-13,03 озика бирлиги сарфланган.

Гуножинлар меъёрда сакланиш ва озиклантирилиши билан уларнинг елини уқаланган. Биринчи гуруҳ гуножинлар елини 7-9 ойларда кул билан уқаланган, иккинчи гуруҳ гунажинларнинг елинлари 7-9 ойлигида иссик ҳаво ва пневмомассажёрлар ёрдамида учинчи гуруҳ гунна жинларининг елинлари 7-9 ойлигида пневмомассажёрлар ёрдамида ва туртинчи гуруҳ гуножинларининг елинлари 6-9 ойлигида пневмомассажёрлар ёрдамида уқаланган.

Бундай тажриба асосида устирилган гуножинлар жуссаси йирик, тирик вазни қапа бўлиб усган, ёки 9 ойлик бугоз гунажинлар 477-482 кг тирик вазнга эга бўлганлар.

Гунажинларни меъёрда устириб елинини уқалаш елинни яхши ривожланиши билан унинг сут маҳсулдорлигига ижобий таъсир этганлигига гувоҳ буламиз. 305 кунлик лактация давомида улар 3291-3537 кг сут берганлар, ёки II гуруҳ биринчи тугим сигирлари биринчи тугим сигирларига нисбатан 246 кг куп сут берган.

Шундай килиб гуножинларни асраш, озиклантириш ва уларни туғишга тайёрлаш маъсулятли тадбир булиб ҳаётчан жуссаси йирик, мустаҳкам тана тузилишига эга, сермахсул сигирлар етиштиришнинг асосий омили булиб ҳисобланади.

Назорат саволлари

1. Подани тулдириш муаммоси.
2. Подани тулдириш учун бузокларни танлаш.
3. Бузокларни сут даврида устиришнинг хусусиятлари.
4. Ургочи таналарнинг 6-12 ойлигида устириш тизими.
5. Ургочи таналарнинг 12-18 ойлигида устириш тартиби.
6. ургочи таналар кочириш муаммолари.
7. Гуножинларни туғишга тайёрлаш сермахсул биринчи тугим сигирлар устириш гарови.

МАВЗУ: Сут ишлаб чиқариш технологияси (4 соат)

РЕЖА:

1. Технология тушунчаси
2. Сигирларни сақлаш тизимлари ва усуллари.
3. Сигирларни озиклантириш.
4. Сигирларни соғиш.
5. Сифатли сут олиш ва унга дастлабки ишлов бериш.
6. Сут ишлаб чиқаришни режалаштириш.
7. Сутчилик фермасида меҳнатни ташкил этиш.

Қўшимча адабиётлар.

1. Всяких А.С. «Саноат асосида чорвачилик маҳсулотлари етиштириш» Тошкент «Укитувчи» нашриёти 1983.

1. Чорвачиликда жадал технология деб хайвонларни тугри урчиш, озиклантириш, сақлаш, фойдаланиш натижасида улардан куп ва арзон маҳсулот олиш мажмуасидир. Табиат, иқлим ва иқтисодий омилларга асосан сут, суг-гушт ва гушт йуналишигидаги хужаликлар фаолият курсатишлари мумкин. Сут ишлаб чиқариш технологияси куйидагиларни кузда тутди:

- йирик подалар ташкил килиш натижасида меҳнат унумдорлигини ошириш ва ишлаб чиқариш рентабеллигини ошириш;
- сигирларни сақлашнинг маъкул усуллари куллаш;
- соғлом хайвон ва сифатли маҳсулот олиш учун ветеринария-санитария тадбирларини уз вақтида утказиш;
- юкори маҳсулдор ва урчиш қобилиятига эга подалар ташкил килиш учун наслчилик –селекция ишларини ташкил этади;
- яхши ташкил этилган озика етиштириш асосида сигирларни тулақимматли озиклантириш;

- меҳнатни ва ишлаб чиқариш жараёнларини ташкил этиш.

Технология соҳани юритиш жадаллиги билан белгиланади.

Қуйи жадалликдаги хужаликларда хайвонлар табиий шароитга яқин шароитларда кам ҳаражат килинади.

Қупрок уртача жадалликлардаги хужаликлар тарқалган. Подалар анча йирик булиб, лекин тулик ихтисослашмаган бинолар билан таъминланган. Яйлов ва экинлар, утлар ҳисобига сигирлар озиклантирилади.

Сунъий кочириш амалга оширилган. Механизация кам кулланилиши натижасида меҳнат сарфи юкори, маҳсулот таннархи баланд, фойда кам.

Энг илгор усул саноат усулида сут ишлаб чиқаришни ташкил этиш ҳисобланади.

Бу ҳужаликларда барча гуштлар механизацияланган ва қисман автоматлаштирилган.

Озика базаси серхосил экинлар ҳисобига яратилиб, сигирларни ту қийматли озиклантириш имкониятини беради. Наслчилик иши селекциянинг илгор усуллари билан йули билан амалга оширилади.

Фермер ва фермер ҳужаликлари ҳажми энг кам механизация куллаш имконияти даражасида ташкил қилиниши шарт. Асосий вазифа ҳар бир сигирдан соғиб олинadиган сут миқдорини ошириш эвазига озика сарфини камайтириб, таннархини пасайтириш бўлмоғи керак.

Исботланганки, 1 ц сутга ҳар бош сигирдан 200 кг сут олинганда, 1,3 – 1,35 ц озика бирлиги, 5000 кг да – 0,9 – 0,95 ц озика бирлиги сарфланади. Яъни 2000 кг дан 3000 кг гакутариш озика сарфини 18 – 20 % камайтиради, меҳнат унумдорлиги 1,5 баробар ортиб, таннарх 15-20% камаяди.

2. Сигирларни саклаш тизими қабул қилинган технологияга жавоб бериши керак:

а) сигирхона – яйлов тизими, кишда сигирхоналарда, ёзда табиий ёки экилган яйловларда саклаш.

б) сигирларда саклаш тизимида – сигирлар кишин-ёзин сигирхона ва яйраш майдонларида сакланиб, экилган утларни уриб едириш билан озиклантирилади.

Саклаш усуллари:

а) боғлаб саклаш;

б) боғламасдан саклаш;

в) аралаш усул (лактация 3 ойида боғлаб, қолган ойлари боғламасдан)

3. усиши тухтаган сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ошириш елин без ҳужайраларининг ривожланиш қонуниятларига боғлиқ. Айниқса без ҳужайралари туғишга яқин қолганда жадал усади, у эса тулакийматли озиклантиришга боғлиқ. Яхши озиклантирилган сигирлар елин без туқималари ёмон озиклантирилган сигирлага нисбатан 1,5-2 баробар яхши ривожланади. Бугоз сигирлар етарлиги ва тулакийматли озиклантирилиши шарт. Агарда лактация 3000-4000 кг сут берса, бугоз сигирлар рациони 7,5 – 8,003 бирлигини ташкил этса, 5000 кг ва ундан қўп бўлганда -9, -10 озика бирлигини ташкил этади.

Сигирларнинг сут маҳсулотдорлиги қўп жихатдан туғишдан кейинги дастлабки ойлар сут маҳсулдорлиги ва лактация табиатига боғлиқ. Шу боисдан захира тўйимли моддаларни бугоз сигир танасида бўлиши лактациянинг биринчи 15-20 кунида юкори сут маҳсулдорлигини таъминлайди.

Сермаҳсул сигирларни ийдириш (раздой) бугозликнинг иккинчи ярмидан рационга 1,5-2,003 бирлиги қўшиш билан бошланади.

Сигирларни туғишга меъёрда тайёраш билан бирга сигирлар лактация давомида қескин пасайишига йул қўймаслик керак.

Меъёрдагисигирлар рациони иштаха очадиган ва озикаларни яхши ҳазм бўлишини таъминлаши керак ва озика ҳазм қилиш аъзоларини зуриқтирмасин. Кишда силос ва лавлаги, ёзда Қўк утлардан қенг фойда – ҳазмланишни қўчайтириб қўрук моддалардан фойдаланишни 15-20% оширади. Ширали ва Қўк озикалар 1кг қўрук моддасини ҳазм қилишга 2,0-1,5 баробар кам ошқозон шираси дағал озикага нисбатан, емга нисбатан 1,4-1,6 баробар кам кераке.

Озикаларниҳазмланишни организмдан зуриқишни талаб этади. Рационнинг 1 кг қўрук моддасини ҳазм қилоиш учун сигир 7-10 кг ошқозон шираси ажратади.

Меъёрлаштирилган озиклантириш сигирлар сут маҳсулдорлигини оширишга хизмат қилади. Бугоз сигирлар рациони, 100 кг тирик вазнига 1,5-2,0 кг пичан 4-5 кг силос ёки 2,5-3,0 кг сенаж, 1,5-2,0 кг лавлаги туғри қелади.

Сигирларни сутдан чикаришда ширали ва ем-озикалар микдори камайтиради, 3-5 кунда сут ажралиш тухтагандан кейин тулик рационга утказилади.

Согин сигирлар рацион ширали, дагал ва ем озикалардан ташкил топади. 100 кг тирик вазнига 5-7 кг силос ёки 4-5 кг сенаж, сигир сути 10 кг дан ошганда хар 1 кг сут учун 1,0-1,5 кг лавлагини берилади. 100 кг вазнига 1 кг дагал хашак берилади.

Емни куп бериш зарарли, у катта корин фаолиятига салбий таъсир этади, ачиш жараёни бузилади, пропион кислотаси куп хосил булади. Бу эса сутдаги йод микдорини 0,5 % камайтириб юборади.

Сигирлар боглаб сакланганда сутининг микдори 2,3 кг фарк килган сигирлар гурухи ташкил килиниб, рационлар тузилади.

Юкори махсулдор сигирларга ем ва лавлагини алохида беради.

Богламасдан сакланган сигирлар дагал озикаларни 10-15% куп истеъмол киладилар, шу боисдан уларга рацион тузганда меъёрга 5-10% кушимча килинади.

Тукканидан кейин 7-10 кун тугрук булимида сакланади. Кейин улардан гурухлар тузилиб, сутдан чикканча бирга сакланади.

4. Сигирларни согиш елинини машк килдиради, аъзони устиради, без хужайраларини усишини ва жадал сут хосил булишини таъминлайди.

а) Кулда согиш

б) машинада согиш.

Кулда: бармоқлар ва мушт билан согиш.

Икки ва уч тактли согиш аппаратлари.

5. Сифатли сут олиш шартлари. Сутни сузиш, совутиш, саклаш.

6. Сут ишлаб чикаришни режалаштириш. Тугишни меъёрлаштириш.

Фасллар.

Лактация табиатини хисобга олиш.

7. Сутчилик фермасида меҳнатни ташкил этиш.

Мавзу. Узлуксиз айланма цехлар тизимида сут ишлаб чиқариш.

РЕЖА:

1. Узлуксиз цехлар тизими тушунчаси.
2. Сутдан чиккан бузук сигирлар цехи.
3. Тугдириш цехи.
4. Сигирлар серсутлиги ошириш ва уруглантириш цехи.
5. Сут ишлаб чиқариш цехи.

Кушимча адабиётлар:

1. Всяких А.С. «Саноат асосида чорвачилик махсулотлари етиштириш» Тошкент «Укитувчи» нашриёти 1983.
2. Всяких А.С. «Производство молока на промышленной основе» Москва «Колос» 1984г.
3. Байдюк А , Шулгин И.Э. Поточно-цеховая система производство молока. «Колос» М. 1986 г.

1. Сут ишлаб чиқаришнинг узлуксиз цехлар тизими сутчилик фермаси, ёки комплексидаги сигирларни уларнинг физиологик ҳолатига қараб алоҳида цехларда саклаш имкониятини яратди.

Ҳар бир цехда сигирлар гуруҳининг физиологик ҳолатига асосан озиклантириш ва саклаш шароитлари яратиб берилган. Бу тизим сигирлар серсутлигини оширишга ва подани такрор қайта тиклашни яхшилаш сигирлардан ҳужаликда купрок фойдаланиш имконини беради.

Унда қуйидаги туртта цех бўлади: сутдан чиккан бугоз сигирлар цехи, тугдириш цехи, серсутликни ошириш ва уруглантириш цехи, сут ишлаб чиқариш цехи. Сигирларни ҳар бир цехда саклаш уларнинг физиологик ҳолатининг давомийлигига боғлиқ. Ката сутчилик фермалари ва комплексларида ҳамма цехлар фаолият (200-400 бошга мулжалланган) курсатади, кичик фермалар ёки фермер ҳужаликларида 3 цех ёки гуруҳ фаолият курсатиши мумкин, ёки серсутликни ошириш ва уруглантириш цехи билан ва сут ишлаб чиқариш қўшилади. Шунда сигирларни 3 гуруҳли тизими ташкил этилади. Ўзбекистон шароитида урчитилаётган сигирларнинг махсулдорлиги ва ҳужалик имкониятларини ҳисобга олган ҳолда купрок шу тизим ишлайди.

Ушбу тизимнинг ҳар бир цехида сигирларни озиклантириш саклаш ва парваришлаш бўйича аниқ саволлар қўйилади.

2. Бугоз сигирларининг цехининг вазифаси: бугоз сигирлар ва гуножинларни насл олишга ва келгуси лактацияга тайёрлашдан иборат. Бунга биологик томндан туйимли озикалар Билан озиклантириш ва боғламасдан парвариш килиш натижасида яйратишни таъминлаш йули билан эришилади. Бу даврда сигирларни парваришлаш ута масъулиятли хисобланади, сигирларни утган лактацияда сут Билан ажратиб чиқариб юборган туйимли моддалар захираларини тулдириш ва хомилани меъёрда ривожланишини кузда тутати. Улар молхона ва яйраш майдончаларида бошвоксиз камида 50 кун сакланади. Шу давр ичида хомиланинг кунлик усиши 300 г дан 800 г гача ортади, ёки икки ойда хомила вазни 15,25 кг га ортади, яъни тугиладиган бузук вазнининг 2/3 қисми шу даврда шаклланади, анна шу учун энергетик, оксил, карбон сув, минерал моддалар ва витаминлар талаб этилади.

Сут соғиш цехидан бузук сигирлар цехига утиш даврида улар кони таркибида витамин А микдори назорат қилиниб, шу асосида озиклантирилиш ташкил этилади. Шу даврда сигир елимининг без хужайралари жадал усади.

Бугоз сигирлар қонида А витамининг микдори 15-45 мг (каротин эса 50-200 мг) % га тенг бўлишлиги ва рациондаги хар бир килограмм озика бирлигига 115-120 г хазмланувчи протеин ва 100-110 г канд моддаси тугри келиши керак.

Бугоз сигирларда минерал моддаларга талаб кучли бўлади. Шунинг учун хар 100 кг тирик вазн хисобига 10 мг дан йод, 40 мг дан кобальт, 55 мг дан мисс, 95 мг дан марганец, 10-12 г Ош тузи бериш керак. Рациондаги каротиннинг бир кунлик микдори 900-1000 мг ни ташкил этиши зарур. Цехда хар бир молний саклаш учун 5 м², сайр қилиш майдончасида эса 12 м² майдон ажратилади. Унинг умумий хажми подадаги сигирлар бош сонининг 14-15% ига тенг бўлади.

3. Тугдириш цехига бугоз сигирлар тугишига 6-8 кун қолганда утказилади. Тоза ва касалликдан холи сигирлар тугишга қадар гурухлаб молхона ва яйраш майдончаларида сакланади, иложи борица улар сайр қилдирилади.

Сигирда тулгоқ аломатлари пайдо бўлиши Билан махсус катақларга 3x2 ёки 2,5x3 0x1,8 утказилади. Бу катақлар обдон тозаланиб, дезинфекция қилиниб, дам олдирилиб (1 ҳафта) қалин тушама тушалади. Шу ҳоналарда сигирлар 2-3 кун сакланади, сигир бемалол эркин ташки иштироксиз тугади, керак бўлса ветеринар ёрдами курсатилади. Тугишдан кейин эса 10-12 кун шу бўлимда сигирлар боғлаб асралади ва сути уз бузукларига ичирилади.

4. Сигирлар серсутлигини ошириш ва уруглантириш цехида сигирлар 90 кун сакланади. Шу давр мобайнида сигирларнинг имконий сут махсулдорлигини руёбга чиқариш бўйича тадбирлар мажмуаси утказилади. Сигирлар иложи борица (серсут сигирлар) уч марта соғилади. Сутни қупайтириш учун керагича авнс озика берилади. Ййдириш натижасида 90 кун мобайнида уларнинг сут махсулдорлиги 30-40 % ортиши таъминланади.

Сигирлар шу цехда тулик уруглантирилиши шарт, бунинг учун барча зоотехникавий ва ветеринария тадбирлари утказилади.

Ўзбекистон шароитида Янги туқан сигирларни 50-60 кунда (иккинчи қуюқиш) сермахсул сигирларни эса 60-90 кунда эса уруглантириш мақсадга мувофиқ, яъни 305 кунлик тактация даври таъминланади. Шу даврда, яъни сутдан чиқариш даврида бугозликнинг 210-220 кунлигига тугри келади.

Серсутликни ошириш тадбирлари тугри ташкил қилинганда ва аванс озиклантириш хар 10 кунда назорат қилиниб борилса, дастлабки 100 кунлик лактация даврида сигирларнинг сут бериш микдори 40-45% кутарилади.

Серсутликни ошириш даврида озиклантириш рационларини тузишга алоҳида эътибор берилади. Асосий рационга қушиб бериладиган «аванс» озикалар меъёри омихта емлар ва лавлаги хисобига амалга оширилади. Жами омихта емлар лавлаги 0,8-1 кг бўлгани маъқул. Шу тарика рациондаги омихта емлар нисбати туйимлилиги бўйича 40-

45%, ширали озикалар 40-45% ва дагал озикалар 18-20% ни ташкил килиши керак. Бу даврда дагал туйимсиз озикалар сомон, похол, поя каби озикалар берилади.

Сут ишлаб чикариш цехига серсутлиги муҳим оталантирилган сигирлар утказилади. Ушбу цехнинг вазифаси мунтазам юкори су махсулдорлигини таъминлашдан иборат. Бундан ташкари юугозликни меъёрида кечиритиш таъминлаш, давр охирида андоза талаблари асосида сутдан чикаришни ташкил этиш ва келгуси цехга тайёрлаш. Сигирларни молхона – яйраш майдончаларида саклаш амалга оширилади. Киш пайтлари куннинг совук пайтларида молхонада саклаб, кундузи хаво илиганда яйраш майдончаларига чикарилади. Ёзда эса аксинча, кундузи молхона ичиджа боғлаб сакланади, кечаси яйраш майдонларига куйиб юборилади.

Цехнинг асосий вазифаси хар бир сигирдан имкони борича купрок сут соғиб олишни таъминлашдан иборат.

Ушбу цехда соғин сигирларни озиклантириш силос, сенаж, хашаки лавлагини ва 20-30% емдан ташкил топади. Рацион албатта сигирнинг сут махсулдорлигига караб тузилади ва озиклантирилади.

Хар бир кг соғиб олинадиган сут микдорига сигирларнинг махсулдорлигига караб, уртача 300-400 кг ем ва 700-800 кг лавлагини берилади.

Агарда озиклантириш рационига пичан, донли сенаж ва ем озикалардан ташкил этаса, унда силос ва лавлагини урнини донли сенаж эгаллайди. Донли сенажнинг туйимлилики даражаси маккажухори силосига нисбатан 2 ва хашаки лавлагига нисбатан 3,5 – 4,0 баробар юкори туради.

Сигирлар туғишига 50-60 кун колганда сутдан чикарилади. Шу цехда хама вақт доимий равишда клиник ва субклиник мастит борилигига текширишлар утказиб турилади. Зооветеринария мутахассислари ва машинада соғитиш операторлари ишини назорат килиб борадилар. Даставвал сигирларнинг уруглантирилган ва бугозлик кунлари, яъни уларнинг соғитишдан тугри чикариш текширилгандан кейин охириги назорат соғими утказилади ва сут микдори аникланади. Сут бериш микдори 6 кг гача булган сигирлар 2 кун мобайнида 10-12 кг ва ундан куп сут берадиган сигирлар 4-8 кун мобайнида сутдан чикарилади. Сутдан чикариш давомида сигирлар рационидан ширали ва ем озикалар олиб ташланади.

Сут ишглаб чикаришнинг узлуксиз – цехлар тизими жараёни тезлаштирилади, махсулот хажмини купайтириб, сифатини яхшилайти, хайвонларни подани тулдириш имкониятини оширади, касалликларни олдини олиб озикалар сарфини камайтириб меҳнатни ташкил этишни таъминлайди.

Мавзу: Қорамол гушти ишлаб чиқариш технологияси

4 соат

Режа:

- 1.** Қорамол гуштини купайтириш.
- 2.** Сутбоп қорамолчиликда гушт ишлаб чиқариш.
- 3.** Қорамолларни устириш ва бурдокилаш комплексларида гушт ишлаб чиқариш.
- 4.** Хужаликлараро корхоналарида гушт ишлаб чиқариш.
- 5.** Фермер ва дехкон хужаликларида гушт ишлаб чиқариш.

Қўшимча адабиётлар:

Таянч иборалар:

Технология, ўстириш, бўрдоқлаш, етилтириш, озиклантириш, саклаш, микро иқлим, сув билан таъминлаш, бинони тозалаш, кунлик семириш, тирик вазн, озиқа сарфи, иқтисодий самара.

Корамол гушти мамлакатимиз гушт балансида асосий (70%) уринни эгалайди.

У асосан сутбоп корамолчиликдан (99%) олинади. Унинг асосий қисми (70%) ёш корамоллар ва қлдган қисми (30%), пучак қилинган вояга етган(бука ва сигирлар) корамоллар ҳисобига етиштирилади.

Мухим вазифа гушти учун ажратилган ёш корамолларни жадал устириб юкори тош ва семизлик категорияларигача бурдоқлашни ташкил этиш.

Барча мулк шаклидаги хужаликлар уртасида мол гушти етиштириш бўйича эркин рақобат муҳитини яратиш.

Фермер ва деҳқон хужалиқларини қуп ва сифатли гушт етиштириш борасидаги ҳаракатларини моддий ва маънавий қувватлаш.

Фаолияти тухтаган гушт комплексларини мулкдорларини алмаштириш ёки чет эл инвестицияларини қритиш эвазига ишга солиш.

Ўзбекистоннинг тоғ, тоғ олди, чул ва Амударёнинг қуйи оқими ва Орол қули юзасида ҳосил бўлган қамишзор яйловлардан кенг фойдаланиб ихтисослашган гуштдор корамолчиликни ривожлантириш, бу борада давлат инвестицияларидан фойдаланиш.

2. Сутбоп корамолчилик мамлакатимизда етиштиралаётган корамол гуштининг асосий ишлаб чиқарувчиси ҳисобланади.

Сутбоп корамолчиликдаги гушт ишлаб чиқариш технологияси, аввало, жадал усулга асосланган ҳолда ташкил этилиши керак. Жадал технология ўз ичига қуйидагиларни олади:

- подани қайта тиклаш, тарқибини андоза даражасига етказиш, ҳар бош сигир ва гунажиндан бузук олишни таъминлаш;
- жадал технология талабларини қондира оладиган сермахсул молларни етиштириш тизимини яратиш,
- молларни тўйимли ва юкори меъёрга озиклантиришни таъминлайтиган озиқа захираларини яратиш.
- ишлаб чиқариш жараёнларини комплекс механизациялаш ва автоматлаштириш;
- моллар қасаллигини олдини олиш, меҳнатни оқилона ташкил этиш, атроф-муҳит муҳофазасини таъминлаш.

Корамол гушти етиштиришни жадал технологиясини 3 нусхаси тафсия этилади:

- Ёш молларни 15-16 ойлигида 420-450 кгга етказиш ва бурдоқлашнинг тулик тизими;
- Ёш молларни 18-20 ойлигига қадар 430-450 кгга етказишдаги урта меъёрга парваришлаш ва жадал бурдоқлаш;
- Ёш моллар ва қатта ёшдаги пучак қилинган молларни қунловчи бурдоқиллаш.

Ишлаб чиқаришнинг тулик циклидаги жадал технологияда ёш молларни махсус ферма ёки комплексларда 15-20 кунликдан бошлаб, 15-18 ойликгача устириб ва бурдокилаб, тирик вазни 420-450 кгга етказилади. Бу тизимди бузокларни мунтазам етказиб бериш ташкил қилиниши керак. Бузоклар соғломлиги бўйича танлаб олинади. Бузоклар тортилиб пластмасса тамга босилади. Бузоклар иллик сувда ювилиб, дезинфекция қилиниб қурилади, иссиқ, махсус хоналарга жойлаштирилади. Бундай хоналардан «хаммаси тула ҳам эмас» буш усулида фойдаланилади. Бузокларга келгандан кейин 7-8 соат совук сув ичирилмайди, сунг 2-5 литр микдорда 150 грамм хисобидан глюкоза ушилган сунъий сут ичирилади. Биринчи 30 кун бузоклар карантинда бўлади.

Букачалар ва подани тулдириш учун яроксиз ургочи таналар урта меъёрда боқиш учун уларни 6-10 ойлигида 120-180 кг уртача тирик вазнда устириш учун сотиб олинади. Уртача меъёрда устириш 210-380 кун бўлиб, молларни вазни 280-320 кгга етканга қадар давом эттирилади. Бу даврда уларнинг кунлик вазн қушиши 650-750 грамм, рацион тўйимлилиги 6,5-7,0 озика бирлигини ташкил этиш керак. Урта меъёрда устиришдан сунг, моллар 120-150 кун жадал бурдокилинади. Бу даврда уларнинг кунлик вазн қушиши 900-1000 грамм, бурдокилаш якунида тирик вазни 420-500 кг бўлиши керак. Моллар боғлаб асралиб, кунлик рационнинг тўйимлилиги 9-10 озика бирлиги тугри келади. Дагал ва ширали озикалар рацион тўйимлилиги 50-55%, ем эса 45-50% ташкил этади.

Сутбоп қорамолчиликда қорамол гушти етказувчи хужаликлар 3 хил бўлади:

Биринчиси- қорамол гушти и/ч учун бузук етиштирувчи репродуктор хужаликлар. Бунга сут и/ч ихтисослашган ширкат, фермер ва дехкон хужаликлари қиради. Улар узлари етиштирган бузокларни 2-3 ҳафталигида 45-50 кг вазнда гушт етиштиришга ихтисослашган хужаликларга сотади. Бундай хужаликларнинг асосий иш фаолияти подадаги сигирлар салмоғини қутариш хисобида суи и/ч қупайтириш қузда тутади.

Иккинчиси- ёш молларни гушт учун устириб, бурдокилашга ихтисослашган хужаликлар ва комплекслар, ёки хужаликлараро бурдокилаш қорхоналари.

Учинчиси- қорамол гуштини и/ч га ихтисослашган фермерлар бўлиши мумкин.

Мисоллар Тошкент вилояти Охангарон туманидаги 10 минг бошга мулжалланган Италиянинг «джи-джи» технологияси асосида ишлайдиган, Самарқандда оҳалик, Каттакургон гушт комплекслари.

3. Комплексларда жараёнлар давомийлиги ва ишлаб чиқариш ҳажми андоза талабида бўлади.

Комплекснинг йиллик махсулдорлик бўйича 1% чиқим ва 1,2 % пучак қилинади. Ушбу комплексларга бузоклар ҳар 13 кунда келтирилиб 360 бошни ташкил қилади. Цикл якунида ҳар 13 кунда 352 бош мол гуштга топширилади. Бузокларни топшириш – қабул қилиш шартлари комплекс ва репродуктор хужаликлари орасида тузиладиган шартнома асосида амалга оширилади.

Ёш молларни озиклантириш ва саклаш уч фазага ва икки даврга бўлинади. Ҳар фаза учун молларнинг ёши, анатомио-физиологик ҳолати ҳамда режалаштирилган вазн ўсишини эътиборга олган ҳолда озиклантириш меъёри ва хили мавжуд.

Ишлаб чиқариш циклининг биринчи даврида парваришлаш 115 кун ва иккинчи даврида 277 кун давом этади. Биринчи давр икки фазадан иборат: биринчи фаза 50 кун қаймоғи олинмаган сут урнига сунъий сут берилади. Иккинчиси фаза келгуси даврда озиклантириш учун бузоклар тайёрлаб борилади.. рацион моллар ёши ўсишига мос қилиб тузиладиган омехта емларнинг махсус тарқиб ишлаб чиқилган. 13-14 ойлик букачаларнинг тирик вазни 410-430 кг ни ташкил қилади.

Моллар хар куни 2 марта озиклантирилади. Ём таркатиш тулик механизациялашган. Бутун ишлаб чиқариш цикли мобайнида 1 бош молга 2379 озика бирлиги, ёки 1 кг семириш учун 6,3 озика бирлиги сарфлаш кузда тутилади.

Биринчи даврда бузокларга ичириладиган сунъий сутнинг асосий кисмини каймоги олинган сут (81%), корамол ва чучка ёғи (8%), усимлмк мойи (5%), маккажухори крахмали(2,45), премикс (2%), витаминли премикс(1%), минерал премикс ва кушимчалар (0,5) ташкил этади.

Сунъий сутнинг 1 кунлик меъёри икки марта 8 соат оралигида берилади. Бузоклар омихта емлари туйимли ва биологик фойдали таркибга эга. Ошкозон-ичак касалликларига чаланмайди. К-1 (биринчи давр омихта еми) таркиби: пустлоги олинган кутирилган арпа- 1,5%, курук каймоги олинган сут -18%, кунгабокар шроти- 14%, ут уни -4%, сахароза- 4%, озика хамиртуриши-5%, бур -1,35%, премикс- 1%, суяк уни-0,65%, ва ош тузи- 0,%. Премикс таркибига марганец, темир, магний, мис, кобальт, олтингугурт ҳамда А,Д,Е,В,РР витаминлари киради. Сунъий усулда куритилган беда пичанининг туйимлилиги 0,67 озика бирлиги, 0,94 гр хазм булувчи протеин ва 135 мг каротин тугри келади.

Иккинчи фазада майдаланган беда пичани ёки сенаж ва Кр-2 омихта ем берилади. омихта ем туйимлилиги буйича рационнинг 89-90% ташкил этади. Учинчи фазада озикаларни асосини Кр-3 омихта ем ва сенаждан иборат. Туйимлилиги буйича рационнинг 67% омихта емга ва 33% сенажга тугри келади. Омихта емлар аралашмасининг 19,4% озикалардан ва 69% дон шротдан ташкил топади. Сенаж сифатли булиши шарт.

Комплексга келтириладиган бузоклар бир-бирига туташган уч бинога жойлаштирилади. Хар бино уч секцияга булинади. Хар бир секцияда (360 бош) 20 тадан гурух хоналар (турт катор килиб жойлаштирилган) мавжуд. Хар бир хонада 18 бош бузок тиркишли бетон полда сакланади. Хар гурухга 2 тадан охур жойлаштирилади. Биринчи охурга сунъий сут солинган пакирчаларни куйиш ва пичан солиш учун, иккинчиси(кутисимон)- омихта ем солиш учун ишлатилади. Бузокларни сугориш учун бир хонада иккитадан косасимон автомат сув ичгичлар урнатилган.

Сунъий сут беришда бузокларнинг охирининг орка томонига урнатилган махсус фиксаторлар ушлаб туради.

115 кун утгандан сунг, бузоклар иккинчи давр биноларига утказилади. У ерда 11 бино мавжуд булиб, уларнинг хар кайсиси 2 секцияга булинган. Хар бир секция 20 хонага булинган. Хар хонада 18 тадан мол сакланади. Секциянинг урта кисмида 2 каторли охирлар куйилган. Уларга куракчали транспортёрлар урнатилган. Бир вақтнинг узида 15 молни озиклантириш мумкин. Биринчи даврдаги биноларда 1,7 м² ва иккинчи даврдаги биноларда 2 м² майдон тугри келади.

Бинолар орасида йулаклар мавжуд. Бу тизим бузокларни устириш ва бурдокилашда жараёнида катта микдорда ёмни талаб килади. Шу бойисдан бу усул нодавлат хужаликларда кенг тарқалишига тускинлик килмокда. Бу борада молларни 20-22 ойлигига кадар гуштга бокиш ва бурдокилаш технологиясига мулжалланган хужаликлараро бурдокичилик корхоналари маъкулрок.

4. Бу хужаликларда моллар рационининг асосий кисмини ширали ва дагал озикалар(60-65%) ташкил этади. Ишлаб чиқариш циклининг 1 чи парваришлаш даврида молларни озиклантириш рационини уларни хар куни уртача 600 грамм усишига мулжалланган. Киш фаслида рационининг 36% ширали, 34% дагал ва 30% ем озикалар, ёз фаслида эса 60% кук утлар, 10% дагал озикалар(сомон) ташкил этади. Устириш даврида озиклантириш меъёри оширилади, ем озикалар салмоги 40% гача кутарилади ва молларни кунлик уртача семириши 850 грамм атрофида мулжалланади.

Технологик жараёнининг бурдокилаш даври 150 кунни ташкил этади: бошлангич фазаси 30 кун, асосий кисми 60 кун ва якунлаш даври 60 кун. Озиклантириш рацонида ем озикалар салмоги 30% дан 60%гача ошириб борилади. Пахта шелухаси бурдокилашнинг асосий кисмида рационга кушилади ва унинг салмоги 10%, ширали озикалар 30%гача, пичан ва самон 16% ва ем озикалар 44%ни ташкил этади. Бу меъёрда озиклантириш ем хисобига кучайтиради ва пахта шелухасини ейишга ургатилади. Бурдокилашнинг якуловчи кисмида рацион туйимлилигининг 17% пахта шелухаси, 60% ем ва 23% силос ва сенаж. Ширали ва дагал озикалар(сенаж, пичан ва самон) озика цехларида майдаланиб, аралаштирилган холда молларга таркатилади.

Технологик даврнинг 1-2 кисмида моллар очик майдончаларда ҳамда бино ичида гурухлаб 40-60 бошдан боғланмасдан сакланади. Хар бир молга ёшига караб 4-7 м² майдон (шундан бино ичида 1,5-2м²) тугри келади.

Молларни озиклантириш очик яйратиш майдончаларида урнатилган бетон охирларда ташкил этилади. Бурдокилаш даврида моллар бинолар ичида боғлаб сакланади ва озиклантирилади. Ширали, сенаж ва дагал озикалар бурдокичилик корхонасининг узида етиштирилади. Бу корхоналарга 700 – 800 га ер ажратиб берилади. Бурдокичилик корхонасига 6-8 ойлик эркак бузокларни (ҳамда пучак килинган ургочи бузоклар ва сигирлар) шартнома асосида сотган репродуктор хужаликлар манфаатдорлигини ошириш учун корхона олган соф фойданинг 12% хужаликларга утказиб берилади.

Хар бир туманда бурдокилашга ихтисослашган хужаликлараро бурдокичилик ташкил этиш мумкин. Корхонанинг йиллик гушт и/ч хажми 850-900 тонна, вазн ошириш хажми 750-800 тонна ва молларнинг уртача гуштга топшириш вазни 450-500 кгни ташкил этади.

5. Ўзбекистонда якин йиллар ичида корамол гушти гуштчилик комплекслари ва хужаликлараро корхоналар билан биргаликда фермер ва дехкон хужаликлари томонидан куп микдорда етиштириш кузда тутилмоқда. Ишлаб чиқариш тугалланган, ёки тулик тугалланмаган цикли бўйича фаолият курсатиб уртача меъёрда жадал технологиядан фойдаланадилар. Молларни будокилашда енгил типдаги бинолар ишлатилиб, озиклантиришда асосан хужаликда етиштирилган сомон, пичан, сенаж ва ем озикалардан фойдаланилади. Шу билан биргаликда қайта ишлаш корхоналар томонидан ишлаб чиқариладиган пахта шелухаси, шроти, кепак ҳамда омихта емлар хисобига рационлар бойитилади. Дехкон хужаликларда корамолларни бурдокилашда асосан сомон, пичан, пахта шелухаси, шрот, омихта ем хужалик, боғ, полиз чииндилари фойдаланилади.

Гуштга боқиш учун 150-180 кглик ёш моллар танлаб олинади. Парваришлаш ва бурдокилаш муддати молларни зоти, семизлик даражаси ва ёшига боғлиқ бўлади. Бу муддат 7-8 ой ва бурдокилаш 3-4 ой давом этиши мумкин. Молларни ёз ойларида яйловларда боқиш имконига эга бўлган хужаликлар уларни яйловларда семиртириб, сунгра сентябр-октябрь ойларида бошлаб 280-300 кг вазнга етганларини бурдокига боғлашлари лозим. 4-5 ойлик жадал бурдокилаш даврида уларнинг вазни 420-450 кг ташкил этади. Ёш молларни гуштга парваришлашнинг 1 даврида рационнинг 75-80% ширали ва дагал озикалар ҳамда 20-25% ем ташкил килади. Бурдокилаш даврида озикалар салмоги 50-55% ва 45-50% га узгаради.

Фермер ва дехкон хужаликлари технологиясида энг муҳими – озикаларни ва айникса сомон, табиий пичан, чин ва бошка дагал озикаларни молга беришга тайёрлаш хисобланади. Озикаларга физик, кимёвий ва биологик ишлов бериш керак.

Назорат саволлар:

1. Гўшт учун қорамолларни ўстириш.
2. Етилтириш.
3. Бўрдоқилаш.
4. Фермер хўжалигида гўшт ишлаб чиқариш.
5. Дехқон хўжалигида гўшт ишлаб чиқариш.