

**Ўзбекистон республикаси Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлиги**

Жиззах Политехника институти

«Автомеханика» факультети

**«Фермер ва қишлоқ хўжалигини
механизациялаштириш» кафедраси**

**«ТУПРО+ШУНОСЛИК ВА ДЕЩ+ОНЧИЛИК АСОСЛАР»
фанидан**

МАЪРУЗАЛАР МАТНИ

Жиззах 2007 й.

МАЪРУЗА МАВЗУЛАРИ.

№	М а ъ р у з а м а в з у л а р и	
1	1.Кириш.Тупро= генезиси; эволюцияси,классификацияси, номенклатураси ва диагностикаси.	
2	2.Шўрланган тупро=лар ва шўрга чидамли ўсимликлар.	
3	3.Чўл минта=асининг тупроклари ва ўсимликлар олами.	
4	4.+уру= субтропик то\ олди чўл дашт зонасининг бўз тупро=лари.Оч тусли бўз тупро=лар ва бу ерда ўсадиган ўсимлик жамоаси.	
5	5.Типик ва тў= тусли бўз тупро=лар шамда бу минта=аларда ўсадиган ўсимликлар.	
6	6.Гидроморф тупро=лар.	
7	7.То\ тупро=лари ва ўсимликлар	
8	8.Дунё тупро=лари ва ўсимликлари.	
9	9.Тупрок мухофазаси.	
	Адабиётлар руйхати.	

КИРИШ.

Тупрокшунослик фани тупрокларнинг тупро=ларни пайдо =илувчи табиий шароитлар, тупро=ларни тузилишини, таркибини, тупро= типлари,

типчалари, уларнинг биологик, кимёвий ва физик хоссалари ҳамда тупро=ярни географик тар=алиш =онуниятлари ва =ишло= хўжалигида самарали фойдаланиш, уларнинг унумдорлигини ошириш юзасидан олиб бориладиган чора тадбирларни ишлаб чи=ишдан иборатдир.

ГЕОБОТАНКА - фитоценоз ёки ўсимлик гурухлари тугрисидаги фан бўлиб, унда фитоценознинг тузилиши, тара==иёти, тар=алиш =онуниятлари ва ундан фойдаланиш йўлларини ўргатувчи билимлар жамланган.

Тупро= билан УСИМЛИК бир-бирлари билан узвий боғланган, чунки ўсимлик илдизи билан тупро==а мустахкам бирикиб олиб, ундан ўзи учун керакли сув ва унда зриган минерал тузларни олиб туради.

Ўсимлик учун зарур бўлган тупро= омилларига тупро= тузилиши, унинг =алинлиги, фивикавий хусусияти ва кимёвий таркиби ҳамда унинг харорати киради. Ўсимлик ўсиши учун тупро=нинг механик таркиби ҳам муҳим роль ўйнайди. Тупро==а чиринди ҳосил қилишда эса ўсимликларнинг аҳамияти катта. Ўсимликларни =олди=лар: Илдизлар, тўқилган барглари, новдалари микроорганизмлар иштирокида парчаланиб аста-секин чириндига айланади ва тупро=ни сув сизими ҳамда емирилишини яхшилайдди ёки тупро= органик моддаси ми=дорини бойитади. Ю=орида =айд этилган фикрлардан кўриниб турибди-ки, тупро=шунослик геоботаниканинг асосидир. Шундай экан маъруъа матнини тузишда бу иккала фанни биргаликда ёритишга ҳаракат қилдик. Ушбу маъруъа матнида тупро=ларни географик тар=алиши, тузилиши, хосса-усусиятлари ва бу тупро= минта=аларида ўсадиган ўсимликлар жамоаси(фармацияси) ҳа=идаги тупро=шунос ва ботаник олимларнинг тад=и=отлари натижалари асосида берган илмий маълумотлари жамлаб тузилди. Ўйлаймизки ушбу маъруъа матнларидан керакли билимларни етарли даражада оласиз.

1.Мавзу.Тупро= генезиси, эволюцияси, классификацияси, номенклатураси ва диагностикаси.

РЕЖА:

1. Тупро=ларни келиб чи=иши ва риволаниши тупро= пайдо =илувчи омилларни ахамияти ва уларни ўзаро боли=иши.
2. Тупро= таснифи. Тупро=лар номенклатураси ва диагностикаси.
3. МДХ ва Ўзбекистон тупро=ларини районлаштириш.

Адабиётлар 1,2,4,5,6,7,8,10,12,16.

1.Тупро=ларнинг генезиси ва хоссалари билан тупро= пайдо омиллар орасида мустахкам ўзаро боли=ликни В.В.Докучаев ани=лади. Унинг тавсияси тупро= пайдо бўлишининг табиий шароитларини тупро= пайдо =илувчи омиллар деб юритиладиган бўлиб, уларга тупро= она жинси, и=лим, рельеф, ўсимлик ва хайвонот олами, тупро=нинг ёши кабилар киради. Кейинчалик ушбу таълимотни Н.М.Сибирцев, П.А.Костичев, Р.Вильямс, С.А.Захаров, С.С.Неструев ва бош=алар янада ривожлантирдилар.

Тупро= пайдо =илувчи она жинслар тупро= пайдо =илувчи омиллардан биридир. Улар кимёвий таркибига, механик ва минерологик таркибига, зичлиги тупро=нинг физикавий, физик-механикавий хоссаларига, сув-хаво, исси=лик, озу=ага ва туз режимларига ва шу билан тупро= унумдорлигига таъсир этади.

И+ЛИМ-тупрок хосил =илувчи муҳим омил бўлиб ўсимликлар ўсиб ривожланишида, тар=алишиди, тупро=даги биологик жараёнлар.сув.исси=лик,хаво, озу=а режимларига, нураш ва иш=орсиэвланишига, шўрланишига бевосита таъсир этади.Бу ўзгаришлар тупро=нинг механик таркибига богди=дир. Термик ва тупрокнинг номланиш шароитига кўра и=лим гушларни ажратилади.бу ерда асосий курсаткич-10°C дан ю=ори бўлган ўртача суткалик харорат хисобланади.

И+ЛИМ ГРУППАЛАРИ 10°C дан ю=ори бўлган харорат йигиндиси

СОВУ+ (куть)и=лим	600
МЎЪТАДИЛ СОВУ+(бореал)	600°-2000°
МЎЪТАДИЛ ИЛИ+(суббореал)	2000°-3800°
ИЛИ+ (субтропик)	3800°-8000°
ИССИ+	8000

Иклимнинг термик группадари ер шарнида минта=алар тарзида Тар=алгани учун.уларни биои=лим ёки тупро= биотермик минта=алари деб аталади.

Ёинлар билан намланиш шароитларига кўра и=лимнинг куйидаги 6 асосий группалари ажратилган.

Жуда нам (экстрагумид)	1,33
Нам (гумид)	1,33-1,00
Ярим нам(семигумид)	1,00-0

Ярим=уру=(семиарид)	0,55-0,33
=уру= (арид)	0,33-0,12

Жуда =урук (экетраарид) <0,12

РЕЛЬЕФ- уч группага:макрорельеф,мезорельеф ва микрорельеф-ларга ажратилади. Макрорельеф деганда текислик,баланд текислик,толар сингари йирик рельеф формалари тушунилади. Бу рельеф о=имининг харакатига таъсир зтиб.катта айдонлар и=лимини шакллантиришда иштирок этади.Мезорельеф баландликни кам ўзгара-диган адир-=ирлар паст баландликлар ва водийлар каби рельеф шакллари киради.Мезорельеф тупро=да ёруГлик.исси==

лик ва намни тўпланшини ва тар=алишда асосий роль ўйнайди.Микрорелъефнинг кичик паст жакллари бўлиб.уларга пасткам жойлар дўнгчалар ва ер юзаси нотекисликлари киради.Микрорельеф тупро=нинг нотекис намланиши,физик,химик хоссалари.ОЗУКА ва туз режимига таъсир =и-лади ва тупро=нинг комплекс холда тар=адишида асосий рол ўйнайди.**ЎСИМЛИК ВА ХАЙВОНОТ ОЛАМИ** – тупро= пайдо =илиш этувчи =удратли омиллардан бири-тирик организмлар яъни биологик омиллар.тупро=нинг пайдо бўлишининг бошлангич даври Хам турли организмларнинг тупрок она жинсларига таъсири билан бо`лик.Ўсимлик ва хайвонот оламининг тупрок пайдо бўлишидаги роли ва ахамияти ха=ида "Тупрокшунослик" фанида сиз билан батафсил танишганмиз.

ТУПРОКНИНГ ЁШИ- тупро= пайдо =илувчи жараёнлар маълум ва=т бирлигида кечади.МДХ ни жанубида бўз.каштан ва кора тупро=лар ёши Шимолидаги ўрмон-сур.подзол.тундра.арктика тупроклар ёшига нисбатан анча катта.Дарё террасаларида- дарё сохилларида энг ёш катта тупро=лар тар=алган,ундан кейин биринчи терраса,сўнгра иккинчи.учинчи ва хоказо.Террасалар бўйича ёши ошиб боради.Тупрокнинг абсолют ва нисбий ёш ажратилади.Тупро= пайдо бўлишидан бошлаб хозирга =адар ўтган ва=т абсолют ва=т хисобланади

Тупро= пайдо бўлиш жараёнлардаги турли бос=ичларнинг бир бири билан алмашинув ва=тини характерлайди.

Инсонлар ўзининг =ишло= хўжалигидаги фаолияти билан тупрок ва тупро= пайдо =илувчи табиий омилларга катта таъсир зтади.Шунинг учун юкрридаги 5 та омилларга яна бир омил антропоген омил кўшилади.тупро= табиий шароитларининг ўзаро биргали=даги таъсири натижасида шаклланади ва аста-секин ўзгаради.Инсонларнинг тупрок=а йўналтирилган таъсир этиш натижасида тез ва =иска муддатда ўзгариши мумкин.Инсонларнинг тупро= унумдорлигини оширишга =аратилган тадбирлар натижасида янги маданий.самарали ва потенциал унумдорлиги ю=ори бўлган тупрок юзага келади аммо тупро=даги нотўгри фойдаланиш аксинча тупро= унумдорлигини пасайишига олиб келади.Муайан табиий шароитларда тупро= пайдо =илувчи омилларнинг таъсирида турли она жинсларда тупро= профилининг шаклланиши тупрокнинг ривожланши дейилади. Эволюцияси деганда тўлик равишда яхши ривожланган тупро=ларнинг турли ва янги вужудга келадиган тупро= пайдо =илувчи омиллар таъсирида ўзгариши тушунилади.Бунинг натижасида муайан

генетик типчага кирадиган тупрок; бошка типчага ёки типга ўтади. Буларга сабаб: 1) Икклимнинг совиши ёки исши намликни ошиши ёки куруклашуви. 2) Рельефига кўра грунт сувларни ўзгарши. 3) Тупро= пайдо бўлиши жараёнлари натижасида тупрок таркиби ва тузилишида рўй берадиган ўзгаришлар.

2). Тупро=ларни ўхшаш белгилари. келиб чи=иши ва унумдорлиги каби хусусиятларга кўра муайян группаларга бирлаштиришга тупро= классификацияси (таснифи) дейилади. МДХ тупро=ларни классификаци-ялаш муамолари билан В.В. Докучаев. Н.М. Сибирцев. П.С. Коссович, Н.Д. Глинка, С.С. Неустроев К.К. Гедройц, Б.Н. Иванова, Н.Н. Розанов, И.П. Герасилов. А.А. Завалишина ва бош=алар. Ўзбекистон тупро=лари^ бўйича Республикамиз олимлари М.У. Умаров. С.А. Шувалов. Н.В. Кимберг. В.В. Горбунов. А.З. Генусов. Н. Попов ва бош=алар хизматлари катта бўлди.

ТИП-деб, деярли бир хилдаги тупро=; пайдо бўлиш жараёнлари кечадиган. ҳамда ўхшаш физик-географик шароитларда катта майдонлардан шаклланган конкрет тупрокларга айтилади. Тупро= типларнинг энг мухим белгилари: 1) тупро=да тўпланадиган органик моддалар ва улар парчаланиши. ўзгариш жараёнларининг деярли бир хил бўлиши; 2) тупро=^ минерал ва органик минерал моддалар синтезидаги жараёнларнинг бир хиллиги; 3) моддалар миграцияси ва 4) тупро=. профили тузюшшининг бир хилда бўлиши; 5) тупро= унумдорлигини ошириш тадбирлари ягона йўналишда олиб борилши. Тупро= типлари экологик-генетик синфлар ва каторларга бирлаштирилади. 8 та экологик-генетик синф ва 4 та генетик каторлар ажратилган. Хозирда МДХ да 100 га я=ин тупро= типлари. Ўзбекистонда 22 тип ва 59 типчалар ажратилган. **ТИПЧА**-тупрок типлари орасида ажратиладиган таксонимлик бирлик бўлиб. асосий ҳамда қушимча тупро= пайдо =илувчи жараёнларнинг боришидаги айрим сифатли фар=лар билан характерланади. Типчаларга бўлаётганда тупро= пайдо =илувчи жараёнларни зонал(шимолдан жанубга) =араб ўзгариши билан бирга фациал шар=дан \арбга =араб ўзгарши ҳам эътиборга олинади.

АВЛОД-типчалар орасидаги. Тупро= группаларини ўзига бирлаштиради. Тупро=ларнинг генетик хусусиятлари (она жинслар тузилиши ва таркиби. грунт сувлар таркиби) кўплаб маҳаллий шароитларнинг тупро= пайдо бўлиш жараёнларга таъсири натижасида (шўрхокланиш, шўртобланиш, карбонатланиш ва хоказо) юзага келади.

ТУР-авлодлар орасида ажратиладиган тупрок группалари бўлиб. тупро= пайдо =илувчи жараёнларнинг бориш жадаллигига кўра ажратилади (гумус тулланиш чу=урлиги. шўрланиш даражаси. эрозияланиш даражаси ва х.к.), тур тупро= пайдо бўлиш жараёнининг ми=дор жиҳатларини акс эттиради.

ТУР ХИЛИ- тупро=нинг ю=ори =атламлари ва она жинсларининг механик таркибига кўра ажратилади..

РАЗРЯД-тупро= она жинсларининг келиб чиқиши асосида бўлинади. Тупрокшуносликда номенклатура деганда тупро=ларнинг хоссалари ва классификациялашдаги муайян бўлимига киритиш учун имконини берадиган тупро=нинг алоҳида белгилари йи\индиси ҳисобланади.

3).Тупро=ларнинг кенглик бўйича тарқалишида маълум географик =онуният мавжуд.Текислик ҳудудлари бўйлаб тупро=ларнинг табиий шароитлари деярли бир хил бўлган муайян географик кенгликларда маълум тупро= типлар тар=алишини горизонтал зоналик дейилади.Тогли ўлкаларда тупро=ларнинг.текисликлардаги кенгликлар бўйлаб тар=алган тупро=лар сингари.вертикал йўналиш бўйича алмашилиши ва вертикал зоналик дейилади.Ҳозирги ва=тда тупро= географик районлаштиришда таксономик бирликларнинг қуйидаги системаси =абул қилинган тупро= биоиклим минта=аси.тупро=-биоиклим области.тупро= зонаси.тупро= зоначаси.биои=лим фацияси.тупро= провинцияси.тупро=округи ва тупро= райони.Тупро=-биои=лим минта=аси тахминан термик минта=аларга тўғри келади.Ушбу минта=а ўзининг атмосфера ёғинлари билан намланиш даражасига кўра =уйидаги областларга бўлинади нам (гумид ва экстрагумид),ўтувчи (субгумид ва субарид) ва қуруқ (арид ва экстраарид).

ТУПРОК ЗОНАСИ-текис ҳудудларини тупро= географик районлаштиришдаги асосий бирдик ҳисобланади.Тупро= зонаси муайян тупро=. типларини баъзан гидрозонал тупрокларни ўз ичига оладиган тупрок биообластлари майдонининг бир =исмидир.

ТУПРОК ЗОНАЧАСИ-тупро= зонасининг бир =исми бўлиб.зонал тупроклар орасида маълум тупро= типчалари ифодаланган бўлади.

ТУПРОК ФАЦИЯСИ-тупроклари ўзининг температура режими ва мавсумий намланиши билан фар= қиладиган тупрок зонасининг бир =исми ҳисобланади.

ТУПРОК ПРОВИНЦИЯЛАРИ-махаллий тупро= ҳосил бўлиш хусусиятлари билан фарқланади тупрок зона ёки зоначасининг бир қисмига айтилади.

ТУПРОК ОКРУГИ-тупро= провинциясининг бир =исми бўлиб.тупро= пайдо бўлшига таъсир этувчи омиллар жойнинг рельефи.иклими усимликлари.гидрогеологик сингари ўзига хос хусусиятлари билан характерланади.

ТУПРОК РАЙОНИ- тупро= округининг бир =исми бўлиб.тупро= =опламининг бир хиллиги билан ажралиб туради ҳамда тупро=нинг самарали унумдордигини оширишга =аратилган деярли бир хилдаги тадбирларни олиб боришни талаб этади.

МДХтерриториясида 1)совук(кутбий),2)Мўътадил совук(бореал) 3)мўътадил (суббореал), 4)мўътадил или=(субтропик) каби тупро= биоиклим минта=алари ажратилади.Ўзбекистонда иккита тупро= бииклими минта=асини ажратадиган мўътадил ва или= субтропик тупро= географик районлаштиришнинг умумий схемасига кўра Ўзбекистон территориясида ўзига хос провинция,27 округ ва 83 тупрок районлари ажратилади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

1МДХ да учрайдиган тупро=-биоиклим минта=аларини характерлаб беринг.

2. Чўл (арид) зонаси тупрокларининг морфогенетик хусусиятларидаги фарқлар асосида қандай провинцияларга ажратилади? 3. Интронизал тупроклар деганда қандай гуруҳлар тушуниладى?

2-МАВЗУ. Шўрланган тупроқлар ва шўрға чидамли ўсимликлар.

РЕЖА,

1. Шўрланган тупроклар тўғрисида маълумотлар. уларнинг майдонлари ва тарқалган ҳудудларикелиб қилиши тўғрисида фикрлар.

2. Шўрхоклар классификацияси, шўрхокли тупроклар типчалари. тузларнинг таркибига араб турларга бўлиниши. шўрхоклар мелиорацияси.

3. Шўртоблар ва шўртобли тупроклар. уларнинг келиб чиқиши тўғрисида К.К.Гедроев, В.Р.Вильямс, В.А.Ковдалар таълими,

4. Шўрға чидамли ўсимликлар ва уларни тупроқ унумдорлигига таъсири.

АДАБИЁТЛАР. :1,2,3,4,6,7,8,12,13.

1. Шўрланган тупроклар-шўрхоклар. шўртоблар ва салодлар қуриш климат зоналарида тарқалган бўлиб ер шарининг 240 млн. га МВД мамлакатларида 120,8 млн.га жумладан Ўзбекистонни сугориладиган ерларини 50 фоизга қилини. янги ўзлаштирилган ерларнинг 75 фоизи ҳар хил даражада шўрлангандир. Шўрланган тупроклар деб таркибида широк, хўжалик ўсимликлари учун зарarli миқдорда сувда осон эрувчи тузлар сарловчи тупроқларга айтилади. Шўрланган тупроқлар Козогистон. Марказий Осиё республикалари ва шимолий-шарқий Кавказ ҳудудларида ҳамда Волгабўйи оқими Жанубий-Украина ҳудудларида тарқалган. Шўрланган тупроқлар шўрхоклар Ўзбекистонда чўл ва бўз тупроклар зонасида-Амударе. Сирдарё. Зарафшон. Кашкадарё Сурхандарё бўйи қили оқимларида ҳамда Фаргона водийсида. ҳозирги ва қадимги дарё дельталарида ҳам учрайди.

Ўзбекистони сугориладиган ерларида шўрланган тупроклар 1970,7 мингга, жумладан, қам шўрланган 1117,7 мингга, ўртачаси 611,2 мингга. қучли шўрлангани 241,6 минг гектарни ташкил этади. Шўрланиш натижасида ҳар йили қарийб 500 минг тонна пахта қам олинади.

Ўрта Осиёда. жумладан, Ўзбекистонда шўрланган тупроқларни ҳар томонлама ўрганиш борасида

В.А.Ковда, В.В.Егоров, М.А.Панков. А.М.Расулов .О.К.Камилов ва бошқаларнинг хизматлари қаттадир.

2-Шўрланган тупроқларнинг келиб қилиши тўғрисида ҳозирги вақтда 5 та илмий фаразлар бор:

1) Она жинс таркибидаги сувда эрийдиган хар хил тузларни бўлишлиги шўрланш тури янгидан сугориладиган ерларимизни нотўғри ўзлаштиришда содир бўлишлиги. •

2) Денгиз ва кўл сохилларидаги тузли сув ўзанларини шамол билан учуриб келиши. экологик жараёнларнинг ёмонлашувига яъни Орол ва Каспий денгизи атрофларидаги шўрланган тупроқлар яъни шамол таъсирида тупро=юзасига тўпланиш кузатилади. Бу тузларни бир жойдан иккинчи жойга тенг ёки атмосфера ёгинлари натижасида кўчишини импульверизация ходисаси дейилади.

3) Кўпгина сувда эрийдиган тузлар вул=онлар билан отилиб чи=ишида газ ва бут тарзида хлоролтингугурт ажралиб хлорид ва сульфит туз биркмаларини ташкил этишлари мумкин ва бу туз тупро=ларни шўрлалшига сабабчидир. шурга чидамли ўсимликлар ёрдамида, яъни биологик жараёнлар тўплами, дашт ва чул зоналарида ўсадиган галофит ўсимликлар ўз илдизлари ор=али **чу=ур катламлардан** сувда эриган тузларни кабул килади ва=тлар ўтиши билан -усимлик =олдиклари чириши натижасида тузлар кўпая боради. В.И Ковда маълумотига кўра. ўсимлик колдигидан 1 гектар ерда 500 кг. гача туз йигилиши аниқланган.

5) Тупро=ларни шўрланшда ва шурхокланишида ер ости сувларининг таъсири остида ҳам бўлади. Булардан ташкари сугориш суви таркибидаги бўлган тузлар йигилиши сабаб бўлиши мумкин. В.А.Ковда маълумотига кўра. Мирзачўлда сугорш сувининг минераллашган 0,28г/л. бўлганда хар гектарига 2 тоннадан орти= туз тўпланиши аниқланган.

3. Шўрхоқлар классификацияси. тупроқлар шўрланиши натижасига кўра шўрланмаган, кучсиз шўрланган. ўртача шурланган, кучли шўрланган ва шўрхоқга бўлинади. Тупроқларни шўрланиш даражасига караб группаларга ажратишда. унинг таркибидаги сувда тез эрийдиган тузларнинг умумий микдорига эътибор берилади (.жадвалга қarang)

Шўрланган тупро=ларни устки =атламларида тузларнинг кўпи 2-3 фоиздан орти= (10-30 фоиз) кўп бўлса. бундай *тупроқлар* типик шўрхоқлар дейилади.

Шўрланган тупро=лар ва шўрхоклар таркибида учрайдиган тузлар асосан 3 катион Na^+ , K^+ , Ca^{2+} ва 4 анион Cl^- , SO_4^{2-} , HCO_3^- нинг химиявий бирикиши натижасида 12та туз ҳосил бўлган: NaCl , Na_2SO_4 , CaCO_3 , NaHCO_3 , CaCl_2 , Ca_3O , CaCO_3 , $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$; Бу тузларни юкоридаги 8 та хили ўсимликлар учун захарли, пастдаги, 4 хили деярли захарсиз В.А.Ковда маълумотига кўра ҳозирги вақтда тузларни йиғилишини 4 та вилоятга бўлган: 1. Тупрокларни хлорли шўрланиш вилояти бу шўрланиш Туркменистон жанубий-Гарбий-кисми Каспий бўйи киради.

2. Тупрокларнинг сульфат-хлорли шўрланиш вилояти-Амударё, Сирдарё, Вахш, Нуртоб ва Тажанг водийлари киради.

3. Тупрокларнинг хлор-сульфатли шўрланиш вилояти Козогистон чуллари. Фарғона водийси. Зарафшон ва Амударё водийлари киради.

4. Тупрокларнинг сульфат-содали шўрланиш вилоятига Европанинг дашт қисмлари. Волга дарёсининг ўрта қисми. Гарбий Сибирь киради. Булардан ташқари тузларнинг таркиби шўрланган тупрокларнинг морфологик белгиларига араб ҳам бўлилади =ат=алокли майин. хўл ва кора шўрхокларга бўлилади.

Шўрланган тупрокларнинг =ишло= хўжалик экинлари ҳосилдорлиги сифати камаяди ва ёмонлашади. Қучли шўрланган ерларда ўсимликлар ўсмай нобуд бўлади.

Шўрланган тупро=лар мелиорацияси-биринчи навбатда сувлардан тўғри фойдаланиш. завур ва коллекторларнинг ишини яхшилаш. доимий сизот сувлари оқиб туриши керак, тупрокдаги зарарли тузларни ювиш пахта-дон-беда алмашлаб экинни жорий қилиш. органик ва минерал ўғитлардан оқилона фойдаланиш далалар атрофига ихота дарахтзорлар барпо қилиш бу тупро=даги сувнинг бугланишни секинлаштиради. натижада шўрланиш камаяди.

4. Шўртоблар ва шўртобли тупро=лар асосан каштан тупроклар зонасида кенг тарқалган умумий майдони МДХ жумҳуриятларида 40 млн. гектарга яқин. Шўртоблар деб аллювиал =атламининг таркибида кўп микдорда сингдирилган Na^+ катиони. баъван Mg^{2+} садовчи тупро=ларга айтилади. Шўртобларни шўрхоклардан фарқи-шуртобларда сувда тез эрийдиган тузлар, шўрхокларда, тупро= устки =атламида эмас. балки бироз чуқурроқ сакланган бўлади. Шўртобларни келиб чиқиши тўғрисида бир қанча назариялар мавжуд. Академик К.К. Гедронец шўртобларни келиб чиқиши. шўрхоклардан натрий тузларини ювилишидан бўлганлигини тасдиқлайди яъни натрийли тузларни кўп саклайдиган тупрокларда натрий сингдирувчи комплексдаги кальций ва магнийни аста-секин сиқиб чиқаради. К. Гедронец бу жараёни ўзининг кўп йиллик экспериментлари асосида тасдиқланган. Академик К. Гедронец таълимотига кўра шўрхокларни - шўртобларни айланиши. барча тузларни 70 фоиздан кўпрогини натрий ташкил қилганда рўй беришлигини ҳам кўрсатган. В.Р. Вильямс шўртобларнинг пайдо бўлишда асосан биологик назарияга асосланган. яъни тупровдаги натрий тузларининг асосий манбаи шuvo=. шўра. қермек ва бошқа га-лофитли ўсимликлар ҳисобланиб бу

ўсимликлар парчаланиб.кўп микдорда тузлар.шу жумладан сода хосил бўлишини кўрсатган сувда осон эрийдиган тузларнинг кўпайши сингдирувчи комплекснинг натрий билан тўйинишига олиб келади ва натижада шўртобланмаган тупрок, аста-секин шуртобга айланишини тасдиқлаган.

В.А.Ковдани фикрича шўртоб тупроклар хосил бўлшида шўрхок боскичини ўтмасдан ҳам пайдо бўлишни исботлаган.Унинг тупрок эритмасидан сода хосил бўлишлиги айрим вақтларда эритмада сода кам микдорда бўлса ҳам сингдирувчи комплекс натрий билан тўйинишига богликлигини кўрсатган.Самаркандлик олимлар профКу-чучков.П.Узоковлар сўғориладиган тупрокларда сингдириш комплексидаги магний катионини таъсирида тупрок зичлиги ва ишкорийлиги кўтарилиб коллоид заррачаларини пастки катламга силжши содир бўлши ва натижада пастки шўртобли катлам хосил бўлишигши аниқлашган.Бўндай тупрокларнинг сув-физик хоссалари ёмонлашган

1) шўртоб тупрокар шўрланиш характериға кўра 3 хилға бўлинади:содали,сода-сульфат хлоридли.хлорид-сульфатли шўртобларға ажратидади;

2)шўртобланиш даражасига кўра 5 гурухға бўлинади: шўртобланган тупроклар-сингдириш сигимиға нисбатан сингдирилган натрий микдори.фоиз хисобида.

КУЧСИЗ ШЎРТОБЛАР - 5- 10%

ЎРТАЧА ШЎРТОБЛАР - 10 - 20%

КУЧЛИ ШЎРТОБЛАР - 20 -30% ШУРТОБЛАР >30%

3)шўртоб тупроклар сув режимиға караб гидроморф,яримгидроморф ва автоморф гурухдарға бўлинади (1-3;3-б; бм сизот сувини чуқурлигига караб);

4)шуртоблар тузли катламининг чуқурлигига кўра 3 га бўлинади: 1.Шуртоб-тузли катлами-30 см.гача. 2.Шуртобсимон тузли катлами-30-80 см.гача.

3.Шўртобли-тузли катлами-80 см.дан чуқур

5)Шуртоблар А гаризонти калинлигига караб кўра 3 хилға бўлинади: 1.

Каткалокли -А гаризонти калинлиги-15 см_ г.Юза : устинсимон (столбали)

А гаризонти калинлиги 5-12 см.

3.Чуқур устинсимон А гаризонти калинлиги 18-20 см. Шўртобли тупрокларда органик 5 моддалари кам.Айникса Ярим-чул зонасида (каштан тупрок зонасида) юкори катламларда 1,5-3% чиринди таркибида купрок фульва кислотаси,ўрмон-дашт зонасидаги шуртобли тупрокарда А чимли каватда 3-6 айрим 70%.

Шўртобли тупрокарда сингдирилган натрий микдори- кўпинча хамма катионларнинг 30-80% ва ундан кўпрокини ташкил этади.

Шўртоб тупрокларнинг физик хоссалари жуда огир-ёмондир. Биринчидан.шўртоб кават-В кўпчиб.ёпишкок (отлигация вязнсютью и минностью) 2- дан кам вактида кўпчиб куриганда тез зичланади.Жуда (каттик бўлиб хайдалса,жуда харсан тошдек ажралади. 3-дан тупрокнинг солиштирма ва хажмий огирлиги катта бўлиб говаклиги эса кам (низкая коризность).4-дан ёгин сувларнинг тупрок бетида кўп туриб колинишиға

устроб тупрокларнинг сув ўтказувчанлиги ёмонлашгандан дарак беради ва ўсимлик учун зарур бўлган физиологик сувларни етиб бормаслигидан дарак беради.

СОВОЛЛАР.

Ўрмон - дашт ва дашт зоналаридаги халқоб жойларда учрайдиган шўртоб тупроқларнинг остида ва устки катламида узок вақт сув тўпланши сабабли тупроқ сингдириш водород сиқиб чиқаради ва сингдириш комплекси водород билан тўйинади. Бунинг натижасида шўртоб солодга айланади.

Солодлар -гарбий Сибирда Днепр.Дон ва бошка дарёлар водийсида учрайди.Солодлар ишқорий мухитда вужудга келади.

Вақтлар ўтиши билан урмонлар йўқолиб улар урнида дашт ўсимликлари пайдо бўлиши натижасида чириндига бой қорамтир Чимли тупроқлар пайдо бўлади. Бу тупроқлардан чиринди микдорига қараб солодлашган ўтлоқ солоднинг сур тусли тупроқ ва бошқалар деб аталади.

Юқорида кўрсатиб ўтилганидек,бу тупроқларда реакция ишқори тупроқ, физик хоссалари оғир,сув-хаво режими ёмон бўлганидан ўсимликлар ўсиши кейин, шунинг учун шўртоб тупроқларнинг химиявий ва функциявий хусусиятларини яхшилаш учун бу тупроқларга гипс солиш тавсия этилади.

Бир гектар ерга солинадиган гипс микдори сингдириш комплексидаги Na микдорига қараб қуйидагича тавсия этилади. Ўтлоқ шўртобларга - 1 га 8-10т. Ўтлоқ чўл ва чўл зонасидаги 3-5т га.

Гипс солинган тупроққа қуйидаги реакцияга қараб гипс таркибидаги CaNa ни сиқиб

$Ca > 2Na$

$2Na$

Булардан ташқари агротехник тадбирлар шўртобли қават ағдариб чуқур хайдаш илдизи чуқур кетадиган ўтлар экиш, органик ва кислотали минерал ўғитлар солиш тавсия этилади.

Назорат учун саволлар:

- 1.Ўзбекистонда тарқалган тупроқларни қайси тип-типчалари шўрланшга чалинган ва уларнинг сабаблари.
- 2.Мирзачўлдаги оч тусли тупроқларни шўрланишига асосий сабабларини айтиб беринг.
- 3.Шўрга чидамли ўсимликларни тупроққа таъсирини айтиб беринг.
- 4.Шўрланган тупроқларни мелиоратив ҳолларини тубдан яхшилаш ва унумдорлигини ошириш учун қандай тадбирлар олиб боришни таклиф қиласиз.

3-МАВЗУ: ЧЎЛ МИНТАҚАСИНИНГ ТУПРОҚЛАРИ ВА ЎСИМЛИКЛАР ОЛАМИ.

РЕЖА:

1. Чўл зонасининг тупрок пайдо килувчи табиий шароитлари.
2. Сур кўнгир тусли чўл тупроклар классификацияси, хоссалари, ўсимликлари ва кишлок хўжалигида фойдаланиш.
3. Такирлар, уларни майдонлари, таркалиши, келиб чиқиши, классификацияси, таркиби, хоссалари, ўсимликлари ва кишлок хўжалигида фойдаланиш.
4. Кумли чўл тупроклар, уларни морфологияси, таркиби, хоссалари, ўсимликлари ва кишлок хўжалигида фойдаланиш.

1. Чўл зонасининг тупроклари жанубий минтакаларда Ўрта Осиёда, жанубий Қозоқистон ва Ўзбекистон паст текисликларида тарқалган.

Ўзбекистон Республикаси ер майдонинг деярли 70 фоизи чўл зонасида жойлашган бўлиб қизилқум, Устюрт, Маликчўл, Шеробод, Қарши чўлларини ўз ичига олади.

Чўл зонасининг майдони 130 млн. гектарни ташкил этади. Чўл зонасининг асосий тупроклари сур-кўнгир тусли тупроклар, такир ва такирли ва кумли чўл тупрокларидир. Чўл зонасининг тупрок пайдо килувчи табиий шароитлари:

Иклими - иссиқ ва қуруқдир.

Зонанинг шимоли қисмида (Қозоқистон)

ўрта йиллик $T^{\circ} +10 + 12 T^{\circ}$

январь $-10-12 T^{\circ}$ Ёгингарчилик 125-200 мм.

Ёгиннинг кўп қисми апрель - май ойида ёғади. $+ 5^{\circ}$ ю=ори қунлар 180-200 қунни ташкил этади.

Чўл зонасининг иклими бир қанча бир оз илиқ иссиқроқ урта йиллик $T^{\circ} 13-17^{\circ}$ июль $T^{\circ} +27+29^{\circ}$ январь $-1-2^{\circ}$ йиллик Ёгингарчилик анча кам 100-200 мм Ёгин асосан қишда ва баҳор оралигида, кўпинча март ойига тўғри келади.

$+5$ ю=ори қунлар -250 қундан кўпро=.

Чўл зонасининг нисбий намлиги жуда паст - ёзда 10% =ишда 30%, шунинг учун чўлда бўланиш қучли -10-20 баробар кўп.

РЕЛЬЕФИ. Туран пастекислиги рельефи жихатадан анча мураккаб, унда =адимий баланд текисликлар (платалар) паст то\ликлар, =ирликлар асосий майдонлар аллювиал текисликлардан иборатдир.

Бу зонада бир қанча баланд текисликлар мавжуд. Устюрт баланд текислиги, Заун\из-қора=умнинг шимолий =исми. =арши \арбий -жанубий Девхона баланд текислиги, Бетпақдала баланд текислиги ва бошқалар.

ЎСЖЛИКЛАРИ. Чўл зонасининг ўсимликлари табиий шароитга =араб-яъни тошлоқли сотупро=ли ва кумли чўлларда ўсимлик дунёси бир-биридан фар=илади. Устюрт ва Қозо\истон чўлларида оқушув=, биюргун, тош биюргун, боялич, саксовул, қунпек ўсимликлари ўсади. Тамарикс жанубий чўлларда кўпро= гифеопитлар (гинсли ерлар ўсимлиги) туятовон, шар хил шўралар ва =ўн\ирош эфемерлар ўсади.

=умли чўлларда галофитлар (=умли ер ўсимлиги) эфемерлардан кўн\ирбош (роавилвода),бу\дойайик ялтирбош, кўп йиллик ўсимликлардан =уёнсуяк, шўралар, о= саксауул ва бутасимон шўралар,шувоклар ўсади.

2. Сур-=ўнгир тусли тупроклар.

Сур =ўн\ир тусли тупро=лар кўп ва=тларгача алохида тупро= типига ажратилмаган С.С.Неустроев, Н.А.Димо "структурали" буз тупро= деб, А.Н.Розанов "кир" бўз тупро\и деб атаганлар. Кейинги йилларда И.А.Герасимов сур =ўнгир тусли тупрокларни алохида типга ажратиш фикрни билдирган. Сўнгра 1949 йил Н.В.Кимберг,С.А.Шувалов ва 1960 Е.В.Любовалар бу тупро=ни келиб чиқишини чу=ур шар томонлама ўрганиб алохида типга ажратдилар.

Сур =ўн\ир тусли тупроклар иссиқ ва қуру=. иқлимда шар шил жинсларнинг карбонатли, купинча шўрланган элювийси ва пролювийси устида сийрак ўсадиган шувок ва шуралар таъсирида пайдо бўлади.

Тупрокда биологик процесслар асосий бащор ва кузда бўлади. Ёзда ўсимликлар қуриб кетади, биологик процесслар тўхтайди-микроорганизмлар шунинг учун ҳам бу тупро=ларда органик моддалар кам тупланади. Классификацияси-сур-=ўн\ир тусли тупроклар икки типчага типик сур-=ўн\ир тусли ва оз карбонатли сур =ун\ир тусли тупро=ларга бўлинади. Биринчиси-Турон паст текислигининг \арбий чўлларида Устюрт баланд текислигида, иккинчиси эса Бетнак дала баланд текислигининг шар=ида ва Вал\аш атрофида тар=алган.

Сур =ўнгир тусли тупрокларни морфологик тузилиши ўзига хос тупро= юзаси 2-4 см (5 см гача) =алинли=да сар\иш бўз тусли майда \овакли.=ат=оло=ли уни остида тангача катламли 5-7 см А горизонти ажралиб туради. Бу горизонт пастада "В" оч жигарранг тусли зич баъзан темир оксидига бой, уво=ли призмали увркли горизонт.

Бу горизонтда о=иш до\лари, конкрецияли карбонатли учрайди. Профилни 18-25 см.чуқурлигида сар\иш тусли гипс кристалл гипс ва сувда тез эрийдиган тузлар жойлашган. Профилни 25-30 см. зичланган ковак бўлади.

Сур=ўн\ир тусли тупрокларни механик таркиби кўпроқ =умло= ва енгил кумоклидир. Тупроқар юзасида кўпинча кирриали тошлар бўлади. Бу тупрокларда гумус микдори кам (0.2-0.8 фоиз), гумус таркибида фульво кислоталар кўп. C:N нисбати 5-8, азот 0,02-0,06, фосфор 0,009-0,15, КЭЛИЙ 1,20-140 фоизни. Сингдириш сизими 100г тупрқда 5-8 мг/экв. ни ташкил этади. Сур кун\ир тусли тупро=ларнинг син\дирувчи комплексида кальций ва магний кўп (72-85, 11-20%). РН-ишқорий гипс кўп кўпинча 30-40 см чуқурликда учрайди. Сур =ўн\ир тусли тупрокларни кишлок хўжалигида фойдаланишда унинг ю=орида курсатилган шусусиятлари эътиборга олинши лозим. Бу тупрокларда гумус кам бўлганлиги сабабли тупрокни биологик активлиги ва энергетик шолатини яхшилаш учун органик ў\итлар солиш. ерни намлигида гипс катламларига эътибор бериш. дастлабки ўзлаштириш йиллари кўк яшил ўтлар, беда экиш, сидератлардан фойдаланш. Ерларни ёмғирлатиб томчилатиб, сў\ориш яхши натижа беради. Тажрибалар шунки кўрсатадики. маликчўлда ерларни отволсиз плуглар билан 70-80см чу=урликда юматилганда тупрокни сув-физик хоссалари яхшиланиб пахтадан ю=ори шосил олинган.

Т А = И Р Л А Р.

Та=ир тупро=лар-чўл зонасидаги юпкали заррачалардан ташкил топган бўлиб ер бети ўсимликсиз паркетга-ўхшаб ёрилиб-ёрилиб кетган бўлакчалардан иборат бўлади.

Е.В.Лобово. А.В.Хабаров 1983 йил маълумотларига кўра Осиё =исмида буларнинг майдони 1,1 млн.га ташкил =илади.

Та=ир тупроклар Ўрта Осиё территориясида Амударё ва Сирдарёнинг =адимги аллювиал текисли

кларда. =умликлар орасидаги текисликларда

Кизил=ум. Устюрт. Бетнакдала. Девхонага ўхшаган паст текисликларда катта майдонларни эгаллайди.

Та=ирлари келиб чи=иши тў\рисидаги маълумотларни биринчи бўлиб 1890 В.А.Обручев томонидан берилган кейинчалик С.С.Неструев ва И.П.Иросшов та=ирларни ёгин сочинларни =ияликлардан сувга лой=а билан о=иб келиб паст текисликларда йи\илиб тўхтаб =олиши ва=тлар ўтиши билан лой=а чўкиб йуқолиши натижасида шосил бўлган тупро= деб таъкидлайдилар. И.П.Иросимов. Бундай шароитда та=ир тупроклар юзини шўрли сувлар босиб, гош шури ювилиб-та=ир тупроклар зонал тупро= деб шисобланади.

Н.Н.Большеев .Н.И.Базилевич. В.А.Ковда ва бош=алар такир тупрок тубан ўсимликлар-сув ўтлари (волоросли) лишайниклар таъсирида. ер юзини ва=ти-ва=ти билан сув босишидан пайдо бўлган деб шисоблайдилар.

ТУЗИЛИШИ- Такир ва та=ирли тупро=лар бети урилиб-ерилиб 2-3 см дан 8 см гача кат=оло= бўлаклардан иборат. Буларнинг устида кўк яшил сув ўтлари кўп ўсганлиги таъсирида пушти рангда кўринади. =ат=ало= бўлакчалари зич =уру= шолда тагидан =аралса майда \алвино= тешикли бўлади. =ат=алок

тагида 5-8 см =алинликда бўлиб унга =ати= бўлмаган бўлакчадаги яъни структурали доналардан иборат бўлиб бу горивонтда туз кўп йи\илади.

Умуман та=ир тупро=лар кўпинча =атлам бўлиб шар хил таркибли бўлади. (Слондиа). Буларнинг механик таркиблари енгил о\ир бўлишлиги келтирилган лой=аларнинг сифатига бо\лик.Кўпинча лой=алар микдори 50% ундан ҳам кўп бўлади.<0,001 мм кичик бўлган заррачалар ми=дори 40-50% ташкил этади.

Та=ир тупроклар чиринди микдори 0,4-0,7% ,каикалок тагидаги каватларни механик таркиби канча о\ир бўлса, шўрланиш даражаси юкори бўлади. Такирли тупроклар шўрланиш-типи кўпинча Сульфат-хлоридли бўлиб факат =арши чўлида проф.А.Расулов маълумоти бўйича хлорид сульфатли бўлади.

Сингдирилган катионлар таркиби Са ва Mg - микдори 65-85% ташкил этади.Такир тупроклар Рн муштити 8,8-9,0 микдорли та=ир тупроклари физик хоссалари-механик таркибига бо\ли=, купинча механик таркиби огирлашган бўлади.

Такир тупрокларнинг огирлиги 1,4 дан 1,7 г/см³ =ат=ало=ли \овакли 42-46% пастки горец 47-49. Сувга чидамли 0,25 катта бўлган структурали агрегат-1-3% атрофида бўлади.

4. =умли чул тупроклари Ўрта Осиёда, жумладан Кора=ум, =изилкумда, =арши чўллари, Мирвачўл, Шеробод водийси Бухоро вошаси Фаррона водийси, Гарбий Копетда тог олди текисликларида кенг тар=алган. =умли тупрокларни МДШ да майдони 64,7 млн. Гектар,Ўзбекистон 1572 минг гектар ерни ташкил этади. Иклими жуда иссик ва куру=.ё\инлар микдори 80-120 мм. Майда заррали =умли тупро=ни нам-ланши 40-50 см, шарорат ўта юкори 60-80° гача, кизийди.кечаси тез совийди.Бахорда =ум бетини эфемер ва эфемероидлар =оплаб.кун исиши билан =ўришади.

Морфологик тузилиши - Агоризонти 5-6 см.см чириндили =атлами калинлиги 5-20 см дан ошмайди.В горизонти 20-30 см.=из\иш тусга эга.кўпинча темир оксиди ва о= до\лар шаклида карбонат до\лари учрайди. =умли тупрокларда гумус жуда кам (0,2-0,5 фоиз),азот 0,011-0,03, фоофор 0,03-0,05 фоиз.умумий калий 1,2-2 фоиз хара-катчан фосфор жуда кам 4-7 мг/кг. =умли чўл тупрокларда шўрланиш деярли бўлмайди. Сувли сурим таркибида сульфатлар купро=, гипс таркибидаги S04;Унча кўп эмас (0,01-0,05 фоиз).Унинг максимал ми=дори 30-40 см чукурли=да.=умли чўл тупрокларнинг сингдириш си\ими жуда кичик (3-4 мг.экв).Сингдирилган асослар таркибида кальций кўпро=. Бу тупрокар таркибида 50-70 фойзгача кварц.куп ми=цорда дала шпатлари.слюдалар бор.

=умли тупрокларни механик таркибида майда =ум (0,25-0,05 мм) ва йирик чанг (0,05-0,001 мм) фракциялар кўпдир.

=умли тупрокларнинг гумусга ва турли озик моддаларга камба\ал бўлганлигидан.органик ва минерал ўгитлардан кенг фойдаланиш.кўп йиллик ўтлар экиш зарур.Бу сохада =арши чўлида проф.А.М.Расулов томонидан ўтказилган дала тажрибалар шуни курсатадики .=умли тупрокаларида биринчи йилидаёк; 18-19 ц/га пахта щосили олишга эришган.

5. Чўл зонаси ўсимликларининг-Чўл минтақасининг турли хил тупроқлардан иборатлиги ундаги ўсимликларнинг ҳам турли-туман бўлишига сабаб бўлади. Масалан: шўрхок тупроқли ерларда шўра ўсимликлар.=ум тупроқли ерларда кумда яхши ўсувчи ксерофит ўсимликлар, гипсли ерларда шу шароитга мослашган баъзи ўсимликлар ўсади. Адир билан ю=ори чўл оралиқдаги чегара чизикларида эфемероидлар ўсади. Пастки чўлнинг ўсимликлари шарҳил бўлиб.бу ерда барг ва поялари семиз, яъни суккулент ўсимликлар ўсади. Уларнинг барг ва пояларида туз кўп бўлади. Ўсимликлар тузли. ўта шўрхок жойларда ўсмайди, фақат унинг чеккаларида ва атрофларидагина ўсади. Пастки чўлда энг кўп ўсадиган ўсимликларнинг баъзилари билан таншасиз. Корасаксовул. (*Haloxylon aphyllum* (Mirw.) Igin).шўрадошлар оиласидан бўлиб,бўйи-3-5 м диаметри 60-80 см га етадиган дарахт.=ора саксовул шўр тупроқда яхш ўсади. 30-35 йилда тўли= вояга етади.50-60 йилдан кейин =урий бошлайди.

Черкез (*Salsola vermiculata* Karst). шўрадошлар оиласидан.бўйи 1-2,5 м келадиган бутадир.Пояси тик шохланган.ў= илдизи узун бўлиб.тупроқ=ачу=ур киради.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР: 1.Чўл зонасига сур=ун\ир тусли тупро=улар негача икки хилли (яъни икки номли) тушунтириб беринг. 2.Таккир тупроқларни Козо\истон тупроқшунослик олим У.Усмонов нимага ўхшатган ва бу олимни шу соҳадаги илмий ишлари хақида гапириб беринг. 3.Чўл зонас=ца =андай ўсимликлар ўсади.Тушунтириб беринг.

4-МАВЗУ:=УРУ= СУПТРОПИК ТО\ ОЛДИ ЧЎЛ ДАШТ ЗОНАСИНИНГ БЎЗ ТУПРО=ЛАРИ;

Оч тусли бўз тупроқ ва бу ерда ўсадиган ўсимликлар жамоаси.

РЕЖА:

1.Бўз тупро=лар зонасининг табиий шароити.генезиси.

2.Оч тусли бўз тупроқлар тарғалиши ва хоссалари.

3. Су\ориладиган бўз тупроқларни ўзига хос хусусияти

4.Оч тусли бўз тўпроқларда ўсадиган ўсимликлар олами билан таншиш ва улардан фойдаланиш.

АДАБИЕТЛАР:1,2,4,5,7,12,13,16.

1.Бўз тупроқлар Ўрта Осиё ва =озогистон то\ олди зоналарида ҳамда Озарбайжон кура Аракс паст-текисликлар=да жойлашган.Бўз тупро=лар тупро= иқлим шароитига кўра денгиз сатхидан 250 дан 1400-1600 м баландликдан ўтади.

Бўз тупроқларини тарқалиш чегараси Ўзбекитонда ҳам бир хил эмас. Масалан.Тошкент вилояти =ўйи чегараси денгиз сатхидан 250-350м, Зарафшон водийсида 350-400,Сирдарё вилоятида 450-500м, \арбий Фар\онада

ташминан 500 м баландлида ўтади. Бўз тупроқларни турлича баландликлар бўйлаб тарқалиши, уларни Осиё =итъаси тоʻ системаси вертикал зоналик =онуниятига киради ва бўйсунди.

Тупроқ пайдо килувчи шароитларида вертикал зоналик хусусиятида яхши ифодаланган.

Илимий континентал. =уруқ, ва иссиқ бўлиб, киши анча юмшоқ ва илиқ.. Январ ойи ўртача шарорат +2 дан....5°C гача ва июлда 26-30°C га =адар иссиқ бўлади. 10°C дан юқори шароратли давр 170-245 кун бўлиб, харорат йигиндиси 3400-5400°C ни ташкил этади, йиллик ёғин миқдори 250-350 мм.дан 600 мм гача, ёғин асосан совуқ даврларда. ҳамда башор ойларида серёғин бўлиб, ёзда кам ёғин бўлади.

Зонанинг рельефи куплаб дарё ва сойлар билан бўлиниб, тоғ олди зоналарида киялик ва паст-текисликлардан иборат. Тоғларга я=инлашган сариқ=ияликларни ншаблиги ошади, адирлар, ун =ирли ерлар бошланади. Тупроқ пайдо =илувчи она жинслар асосан лёсс.лёмс-симон жинслар, то==а я=инлашган ерларда делювиал.пролювиалдир.

Бўз тупроқларнинг генезиси ва классификацияси шундаги дастлабки маълумотлар 1881 й. Николай Тейх Тошкент атрофида ўтказган текшириш ишарида, 1882 й.А.Миддендорф Фарғона водийсини тупроқларини текширганда маълум бўлган ва бу тупроқларни "Сарик тупроқ" деб атаган.

Бўз тупроқларни келиб чиқиши тўғрисида Н.А.Димо, Л.И.Просалов айтиша, С.С.Неуструевни 1908 йили Сирдарё вилояти олиб борган тадқиқотлари асосидаги "бўз тупроқлар" терминни таклиф қилган ва адабиётларга киритилган. Кейинчалик бўз тупроқларнинг генезиси соҳасидаги мукаммал тадқиқотлар Н.А.Разанов томонидан олиб борилди шунда унинг "Ўрта Осиё бўйича тупроқлари"1951й.Монографиясида батафсил баён этилди.Ўзбекистонлик олимларни кўплаб ишлари ҳам бўз тупроқларни ўрганишга ургатилган

(М.Баходиров,Б.В.Горбунов,Н.В.Кимберг,М.Умаров,А.М.Расулов ва бошқалар). Ўзбекистон тупроқшунослари бўз тупроқларни биологик ва илим шароитларини шар томонлама ўрганиб бўз тупроқлар классификациясини ишлаб чиққанлар улар учта типчага:0ч тусли бўз тупроқлар.типик бўз тупроқлар ва тўғ тусли бўз тупроқларга ажратилади..

2.0ч тусли бўз тупроқлар зонанинг анча =уруқ минтақасида тарқалган бўлиб.чўл зонаси билан туташган денгиз сатҳидан 250-300,айрим қуруқ минтакаларда (Фарғона.Сурхондарё-Шерободда) 400-500 м.гача баландликка кўтарилиб жойлашган.Оч тусли бўз тупроқлар тоʻ этаги ён бағирларида Мирзачўл.=арши чўлларида.Фарғона водийсининг ўрта қисмларида

.Сурхондарё.Кашкадарё шавзаси ва бошқа ҳудудларда тарқалган.Оч тусли бўз тупроқларни умумий майдони 2592 минг гектар.Оч тусли бўз тупроқларни марфологик тузилиши А+В горизонтини.қалинлиги 40-50 см., А гризанти 6-12 см, оч бўз-иш тусли ва горизонти 20-25 см бироз малла тусли.В12 карбонатли ок кузанақли-доғлари бор горизонти билан алмашинади. Тупроқни она жинс "С" сарғиш лёмшок; майда говақли горизонти.пастки 150-180 см. да гипс ва бошқа тузлар учрайди.

Оч тусли бўз тупрокларни ўзига хос хусусиятларидан бири чириндини камлиги. А горизонтида гумус миқдори 1,2-1,4 фоиз. пастки катламларида камайиб боради; озу=а моддалар азот 0,05-0,11 фосфор 0,10-0,14 ва калий 1,77-2,22 фоиз атрофида. Шозирги вақтда су\ориладиган ва лалми оч тусли бўз тупроклар ва кўрсаткичлар 30-50 фоизгача камайиб кетган. Кўпчилик майдонлардаги оч тусли бўз тупроклар шўрланган. механик таркиби енгил дефляцияга чалинган.

3. Су\ориладиган бўз тупроклар - «ишло» хўжалигида турли муддатларда фойдаланиб келаётган шароитда ривожланади.

4. Оч тусли бўз тупро=лар таркалган худудлар типик бўз тупроклар тар=алган майдонлар билан туташ бўлганлиги учун шамклими кескин континентал бўлиб. ундан кескин фарк қилмайди. Ёзи иссиқ киши сову= бақор ва «ишда» е\ингарчилик бўлади. Шавосининг намлиги. тупро\ининг унумдорлиги. ер ости сувларининг ер юзасига яқинлиги туфайли ўсимликлар «оплами турли-тумандир. Бу зонанинг усимликлари эрта бақорда яшил гилам шосил «иладиган ранг ва «ўн\ирбошдан иборат. К. Зокиров республикамизнинг адир минта=асига бақо бериб. уни эмероид-ранг ва «ўн\ирбошдан иборат бўлган эфемероидлар минта=а деб жуда тўғри бақолаган.

Оч тусли бўз тупрокларда ўсадиган ўсимликлар зонанинг абсолют баландлигига «араб ўзгаради. Зонанинг «ўйи «исмида 5-8 см. га зич гилам шосил «иладиган ранг-коврак. эфемер ва эфемероидлар бойчечак, чучмома, нухотак, сагон, лола=из\алдок, еввойи арпа ва бош=алар ўсади. Зонанинг ўрта ва баланд «исмдарида эфермерлар билан бирга оккурай, каррак, ялтирбош, бо\дойзорлар қизилқулоқ ўсади. То\ орали\идаги водийларда. терак. тоғ. жийда шамда паст бўйли чақалақзорлар учрайди.

Су\ориладиган бўз тупро=лар ўзининг «атор хусусиятлари профилининг горизонтларига яхши бўлиниб тўриши, гумусли горизонтини «алинлиги. чириндини кўп эмаслиги 1-1,8 фоиз. аммо су\ориш суви билан келтирилган «атламларда чириндини кўплиги ва горизонтларга тенг тарқалиши, карбонатли горизонтнинг яхши ифодаланмаганлиги билан шарақтерланади. «адимги су\ориладиган вошча бўз тупро=лари нинг профилида сопол идишларнинг синиклари. суяк. кўмир бўлақлари кенг тарқалган. ва бош=а уй буюмлари «ўшилмалари учрайди. Жонзотлар чувалчангларни актив фаолияти излари яхши кўриниб туради.

Сугориладиган бўз тупроклар ўзларининг хусусиятларига кўра:

1) Сугориладиган оч тусли бўз тупроклар

2) Сугориладиган типик бўз тупроклар

3) Сугориладиган тук тусли бўз тупроклар ва қадимдан

сугориладиган (вохабуз) тупрокларга ажратилади. Ўзбекистонда қадимдан дехқончилик қилиб келинаётган Хоразм. Зарафшон вохаларида қалин агроирригацион катлам 1-2 м дан ортик воха бўз тупроқлари тар=алган. Бу тупрокларни М.А. Орлов (1933 й) мадания су\ориладиган кейинчалик Р. Кузиев (1991 й) бу тупрокларни тажрибий ривожланиши ва унумдорлиги турисвда батафсил маълумотлар берган.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР:

1.Бўз тупроклардан оч тусли бўз тупрсадарда асосан =айси =ишло= хўжалик экинлари экилади ва фойдаланилади. 2.Оч тусли бўз тупро=лар кайси хосса-хусусиятлари билан бош=а типчалардан фар=ланади.

3.Усимликлари =айси =оида бўйича тар=алиб ўсади.

5-МАВЗУ:ТИПИК ВА ТУК ТУСЛИ БЎЗ ТУПРО+ЛАР, ХАМДА БУ МИНТА+АЛАРДА ЎСАДИЙГАН ЎСИМЛИКЛАР.

РЕЖА:

1.Типик бўз тупро=ар.тар=алши.тупрок; пайдо =илувчи табиий шароитлар.

2.Типик бўз тупро=ларни хоссалари.

3.Тў= тусли бўз тупро=лар табиий шароити ва хоссалари.

4.Типик ва ту= тўсли бўз тупро=лардан =ишло= хўжалигида фойдаланиш, эрозияга қарши кураш тадбирлари.

б.Типик ва ту= тусли бўз тупро=лар тар=алган ҳудудларда ўсадиган ўсимликлар ва улардан фойдаланиш.

АДАБИЁТЛАР:1,2,4,5,7,9,10,11,12,13,16,18.

1.Типик буз тупро=ларни, ўрта =исмидан эгаллаб денгиз сат=идан 350-800 м дан 600-800 м гача баландликда учрайди.

Типик бўз тупро=лар то\ олди текисликларнинг ўрта ва ю=ори =исмларида.дарё водийларининг юқори ва ўрта террасаларида.=исман адирларда ва паст то\ олдиларида тар=алган умумий майдони 3051 минг га.шундан 910 минг гектари сув эрозиясига ҳар хил даражада чалинган.Типик бўз тупро=лар Ўзбекистонда.Чирчи= ва Охангарон дарёларининг ю=ори террасаларида.Фар\она водийси атрофидаги то\-олди =умликлари ва адирларда.Зарафшон.Китоб-Шахрисабз.Сурхандаре то\ олди орали=ида ва шунингдек дарёларнинг ю=ори террасаларда тар=алгандир.

Типик бўз тупро=лар асосан лёсс,лёссимон ва делювиал она жинсидан ривожланган.Тог олди ва адирларда (Фар\она водийси)типик бўз тупро=лар она жинси скелет-майда заррачалири О\ир тошли ва ша\алли пролюай.делювий ва алювийлардир.

Тупро=нинг пайдо қилувчи табиий шароитлари типик бўз тупро=ларни оч тусли бўз тупро=ларга нисбатан анча юмшо= булади.Йиллик уртача температура 12° йиллик ёгин 300-500 мм.ёгин асосан киш ва баҳор ойларида егади.киши унча совук эмас.сернам.Баҳори или= ва сере\ин келади.ёзи исси=Ўсимликлари эфемер усимликлардан ялтирбош.ар-па,бу\дойи, кўп йиллик ысимликлардан-О==урай.Каррак ва бош=а чимли ўсимликлар ўсади.

РЕЛЬЕФИ. Паст-баланд текисликларга жойлашган бўлиб,=иялик-лари $2-3^{\circ}$ ва ундан ю=ори бўлган жойларда сув эрозияси ривожланиб типик бўз

тупро=лар эрозия бузилиш даражасига =араб кучсиз.ўртача ва кучли даражада учрайди,

2.ТИПИК бўз тупро=ларни морфологик тузилиши.оч тусли буз тупро=ларга нисбатан генетик горизонтлари анча яхши ривожлан-ган.Чириндили катлами 50-60 см.А горизонтини =алинлиги 4-6 см чимли кават бўз-сўр рангли яхши донадор структураси.Аз чим таги 8-9 см.оч кулранг.сувга чидамли донадор структурага эга.В, 18-35 см.Сур =ун\ир структурали.карбонатлар он ма=дорли.жониворлар изи пастга =араб карбонат тугунчалар бошланади,В2-36-65 (70)см.Оч кул-сар\иш рангли.чангсимон структурали.жониворлар чувалчанглар излари,(инлари)карбонатлар тугунчалари (желвачкали) В3-65-(70)-105см.Сар\иш рангли.бир хилда зичланган.карбонат тугунчалари пастга =араб камаяди,

106-(110)- см дан сари\ рангли лесс ва лессимон она жинслар.Типик тупрорарда чиринди мукдори майда тешикчаяи, зичланмаган.Ю=ори =атламларида 1,5-2,0 фоиз.яъни азот 0,1-0,110,умумий фосфор **P205**,15-0,25 фоиз.калий 2,1-3,0 фоизгача,сингдириш си\ими ю=ори =атламларида 10-12 мг-экв 100 гр.тупро=да.Сингдирилган катионларнинг 80-90 фоизи Ca^{++} ва 10-15 фоизи Mg^{++} га ту\ри келади.сингдирилган натрий кам 1-2 фоизни ташкил этади.

Типик бўз тупрорарни механик таркиби купинча кумокли, кам-P01\$ созли: бу тупро=га характерли йирик чангли кумо=ли бўлиши. Типик бўз тупро=ларнинг ю=ори горизонтларида зичлик унча ю=ори эмас зичлиги 1,17-1,22 г--см³, коваклиги 50-55 фоизни ташкил этади.

Хозирги ва=тда типик бўз тупро=ларни жуда катта майдонлари су\орилмо=да.сугориш натижасида бу тупрорар узининг катор хусу-сиятлари-.профилининг горизонтларига яхши таба=алашмаганлиги,чи-риндини анча камайганлиги.лекин чириндини профил буйича тенг ми=дорда (пастки горизонтларга секин камайиб бориши) тар=али-ши.карбонатли горизонтнинг яхши ифодаланмаганлиги билан харак-терланади.Сў\ориш даврига =араб янгидан.=адимдан су\ориладиган воха-бўз тупро=ларга ажратилади.

3.Ту= тусли бўз тупро=лар зонанинг энг ю=ори минта=аларида тар=алган бўлиб баланд ва паст ён ба\ирлари,дарё' водийларининг то\орали=ларидаги текисликларида денгиз сат=идан 700-1000 м дан айрим =ури= минтаъ=аларда 1400-1600 м гача бўлган баландликларда тар=алган.Умумий майдони 1055 минг гектар,шундан 867 минг гекта-ри.хар хил даражада сув эрозияга чалинган. Ту= тусли бўз тупро=ларни табиий шароити:

И=лими-ту= тусли бўз тупро=и ерларнинг и=лими юмшо=о= бўлиб.йиллик ўртача температура 10-12°,ёзи у =адар исси= эмас.киши эса хийла сову= хамда узо= давом этади.йиллик е\ин 400-500 мм ташкил этади.Шар=ий Фар\онада.Хисор водийсида 600 мм гача ёгин тушади.е\инни асосий =исми =иш ва бахор ойларига ту\ри келади.

Ўсимликлари асосан бу\дойик,ёввойи арпа,.Широч ,ўт,лола,паст бўйли дарахтлар.улар орасида эфемерлардан ялтирбош, исмалон; ва бош=алар ўсади.

Рельефи анча мураккаб баланб-паст енба\рли =ияликлардан иборат.

Ту= тусли бўз тупро=ларни сингдириш си\ими 100 гр тупро=да 12-15 мг-зкв.ни ташкил этади.Сингдирилган катионларнинг 80-90 фоизи Са++ ва 10-15 фоизи Мд-м- га тўри келади.бу тупро=инг пастки =атламларида сингдирилган магний кўп бўлиб.сингдириш си\имига нисбатан баъзан 45-55 фоизга етади.Сингдирилган натрий кам 1-2,5 фоизни ташкил этади.

Тук, тусли бўз тупро=ларни механик таркиби кўпро= оир хиллари ўчрайди.

4.ТИПИК бўз тупро=лар асосан су\орилиб дех=ончилик =илинади.Бу ерларда асосан пахтачилик ривожлангандир.

б.Типик ва ту= тусли бўз тупро=лар асосан адир ва ю=ори адир зоналарида кенг тар=алган бўлиб, унинг ююми чўл минта=сига нисбатан анча сал=ин,тез-тез шамоллар.чўл минта=асига я=ин бўлганлигидан хатто гармселлар эсиб тўради.Асосий ёгин =иш ва бахорда е\иб.=исман кузда ҳам тушиши мумкин.Из\ирин.буронли кунлар ҳам бўлиб тўради.Бу эса то\ минта=асини я=нлигини таъсирдир.Е\инлар ми=дори чўл минта=асига нисбатан анча ю=ори 300-500 мм га етади.Шу сабабли ҳам бу минта=ада су\ориладиган ерлар вамаданий экинлар майдони ҳам анчагина бор.Шунинг учун ҳам адир минта=аси ўсимликлар дунёсига бойлиги ҳамда дех=ончилик ва чорвачилик учун =улайлиги билан ажралиб тўради.М.Г.Попов бўз тупро=ларни адир минта=аси тавсифлаб: бу ерда ўсимликларнинг турли-туманлиги ва улар хосил =иладиган манзара бош=а бирор мамлакатда учрамайди.деб таъкидлаган.Бу минта=а Ўзбекистоннинг асосий лалмикор.пахтачилик ерлари хисобланади.Кўпгина текис адирларда \алла (арпа,.бу\дой,.маккажухори,.сули ва бош=алар)экилади.Дех=ончилик *кушт* учун яро=сиз бўлган нотекис ерлар.сув камчил адирлардан чорвачиликда кенг фойдаланилади.Ўзбекистон ю=ори адирлари учун характерли бўлган ўсимликлардан:Бодом,Терскен, Изень, О=шуво=, Ровоч, Газакут, Гулхайри, андиз, широч, ажри= ва бош=алардан иборат.Булардан таш=ари,маданий,ози=,-ов=ат,зиравор.доривор.витаминли.эфир мойли,талайгина,манзарали,ем-хашак ва дарахт ўсимликлари.ысади

Бу тупро=лардан самарали фойдаланишда ва унумдорлигини оширишга =аратилган тадбирлардан энг мухимлари:

Су\оришни ту\ри ташкил этиш: тупро=да чу=ур хайдашма =аватни яратиш:алмашлаб экиш (су\ориладиган ерларда \уза-беда.лалми ерларда донли зкинлар бу\дай арпа экинларни экишни) кенг жорий этиш, менерал ва органик ўгитлардан о=илона фойдаланиш;эррозияга =арши кураш ва бош=лар.

Бу минта=а тупро=ларида 2 хил сув эрозияси ривожланган. Типик буз тупрорарда су\ориш (ирригацион) эрозия.бу хил эрозия асосан =иялик ерларда су\ориш.яъни жуякларга сув миёрини ноту\ри танлаш натижасида рўй беради.шунинг учун типик бўз тупро=ларни су\оришнинг асосий калити жукуякларга тараладиган сувини миерини майдалаб тараш лозим.\узани

экишда иложи борица горизонтга я=ин =ияликни бурчагини пасайтирган холда олиб бориш; Лалмикор ерларда юза сув эрозияси ривожланиб бу ерларда хайдаш, экиш, ишлари горизонталга =ўялик тиклигини пасайтирган холда олиб бориш. Эрозияга чалинган тупрорарни унумдорлигини ошириш учун алмашлаб экиш даладаси беда, ва кўп йиллик ўтларни энг камида 3-4 йил буишлигини. органик ва минерал ўғитларни =иялик ерларга солиш тавсия этилади.

НАЗОРAT УЧУН САВОЛЛАР;

1. Типик ва тўқ тусли бўз тупро=ларни кайси бири экологик жихатдан бўзилишига. ифлосланишига чалинган ва унинг асосий сабаблари.
2. Ўзбекистонда лалми ва су\ориладиган бўз тупро=лар =айси • минта=аларга жойлашган. асосан улардан =ишло= хужалигида фойдаланиш йўналишларини айтиб беринг.

6-МАВЗУ:ГИДРОМОРФ ТУПРО+ЛАР.

РЕЖА:

1. Гидроморф тупро=лар. уларни хосил бўлиш шароитлари ва классификацияси.
2. Чул зонасининг гидроморф тупрокарлари классификацияси. хоссалари.
3. Бўз тупроклар зонасининг гидроморф тупроклар. классификацияси. хоссалари ва гидроморф тупроклардан кишлок хужалигида,

АДАБИЕТЛАР ! 1 2 4 7 8 12 13

1. Гидроморф тупроклар гидро- асосан сув таъсирида яъни сизот сувлари якин (0,5-3,0м) бўлган шароитда. доимий капиляр намлик таъсирида хосил бўладиган ўтлок, ботк, боткокўтлок тупроклар ва шурхоқлар киради. Гидроморф тупроклар чўл ва буз тупроклар зоналарида таркалган бўлиб. дарёларнинг бўйи террасалари. рельефи депрессиялари (чукмалари)да. кўл атрофи даре ва кўлларнинг куриб колган пастликлари ва тоғ олди кия текисликлари хам тоғ олди ейилмаларида катта майдонларни эгаллайди. Гидроморф тупроклар майдони Ўрта Осиенинг сугориладиган майдонларини ярмини. Ўзбекистонда эса 40 фоизини гидроморф тупроклар ташкил этади. Гидроморф тупроклар намланиш шароитига караб аллювиал режимдаги ва соз режимли тупрокларга ажратилади. Аллювиал режимдаги тупроклар дарё водийларида сизот сувлари баркарор бўлмаган шароитда юзага келади. Соз режимли тупроклар тоғ олди кия текисликларида ва ейилмаларида тоғлардан сизиб оқатган босимли сизот сувларнинг баркарор бўлган шароитда ххосил бўлади.

Ер ости сувлари яхшиокиб кетадиган шароитда.сизот сувлари одатда кам минераллашган бўлиб бу бўз тупрокларнинг юкори зоналари учун характерли бўлиб.одатда бундай шароитда гидроморф тупроклар шўрланмаган бўлади.Ер ости сувлари кам окиб кетадиган жойларда соз сувларнинг минераллашуви бўлганлиги сабабли.чўл

зонасидаги ва кисман бўзтупрокларнинг кўйи зоналарадаги гидроморф тупроклар турли даражада шўрлангандир.Гидроморф тупрокларнинг ривожланишига сизот сувларидан ташкари хар бир зонанинг табиий шароитлари иклим тупрок пайдо килувчи она жинслар таркиби.ўсимликлар коплами ва бошкалар таъсир зтади.Шунинг учун хам зонал жойлашувига кўра.чўл зонасининг ва бўз тупроклар зонасининг гидроморф тупро!\$ларига ажратилади.

Чўл ва бўз тупро^лар зонаси асосан гидроморф тупро=ларнинг типлари-ўтло=.бот=о=, ва шўрхок тупро=лари бўлиб.улар боткок-ўтлок,ўтло=(тгаик),шўрхок ва боиуж-шўрхок типчаларга ажратилади.Шўрланиш даражасига =араб:шўрланмаган,кўчсиз,ўртача ва кучли шўрланган тупро=арга ажратилади.Ўтлсаяуи тупрорар гумус ми=дорига кўра оч тусли (2фоизгача гумус бўлади) ва туч тусли (фоиздан кўп) турларга бўлинади.Гидроморф тупрорар су\ориш даврига =араб янгидан ва =адимдан су\ориладиган (воха)тупра=»ларга ажратилади.

2. Чўл зонасининг гвдроморф тупро=лари дарё' водийлари ва ирмсиларида кенг тар=алган бўлиб.уларншг асосий =исми аллювиал.камро= кисми соз режимли тупро=лар жумласига киради. Асосан аллювиал режимли гидррморф тупро=лари Амударё',Сирдарё',Зарафшон дарё водийларида.соз режишлилари асосан Зарафшон.Сурхандарёдаре' ёйшшаларида учрайди.

Чул зонасининг гидроморф гупро=рари:сохил(=айир)-аллювиал, аллювтал-ўтлок, 6011501 утло=, ўтло=-бот=о= шўрхокли.бош=-а тупро=лар ва шурхоклардан иборат.Чул зонасининг гидрсаюрф тупро=лари ўзига хос хусусияги.унда гумуснинг камлиги ва турли даражада шўрланганлигидир.Чўл аонасининг асосий гвдроморф тупро=ларнинг ваютлларини хуса-хусусиятларига тўхтаб ўтамыз.

Текисликларда бу тупро=лар 0,5-2 м чу=урлида шахал бўлган катламли ва созли етизикларда ривожланади.Бу тупро=лари морфологик тузшшши 12-25 см.Вўлган чимли =ават (А) ранги ту= бў\иш В горизонти оч =ўн\ир бўз\иш рангли.ува^пи чидамсиз структу-ра,пастки =исмида зангли до\лари бўлган кўкимтир глей горизонти бор.Гумусли горизонти =алинлиги 60-80 см ни ташкил этади.ўрик> ўтло=и тупро=лар чиринди му=дорига =араб 2 типга бўлинадк: гўн; тусли ўтло= тупро=ларда гумус 3-4 фоиз.оч тусли ўтло=и тупро=ларда 1,5-2,5 фоиз атрофида. Умумий азот 0, 086-0, 117фоиз,фосфор 0,13-0, 15 .калий 1,7-2 фоиздан иборат.

Су\ориладиган^ аллювиал ўтлор тупро=ларда гумус (1,7-2,0) фоиз бўлиб,ўтлор воха тупро=ларда гумус бироз камро= сингдириш си\ими ЮОг. тупро=да 10-12 мг/зкв% унинг тарихида кальций-магний кўп. Аллювиал бот=о=-ўтло= тупро=ларда сизот сувлари ер бетига жойлашган (0,7-1,2м) бу тупрсирар сохил усти терабаларининг пастлик жойларига жойлашган

тар=алган.Бу тупро=лар доим сернам бўлишлиги сабабли ўсимлик колди=ари кўпинча анаэроб шароитда парчаланди ва натижада гумус кўпро=тўпланади.Чимли {=атламда гумус ми=дори 5-7 фоизгача бўлиб пасти=атламларда кескин камаяди (0,5-0,7 фоиз).Шунга кўра ялпи азот 0,15-0,45 ялпи фос-фор 0,154-0,170 фоизни ташкил этади.Дех=ончиликда бу туп дан фойдаланишдан олдин зовурлар =азилиб ерларни замини лозим.

Ўтлок соз тупро=лар-Фар\она.Зарафшон водийларида то\ олди (=ияликларда яхлит минтаг=ани хосил =илиб тар=алган. Бу тупро=лар Зарафшон ва Фар\она водийларидагисоз режимли гидроморф тупро=ларда карбонатларнинг кўп тўпланиши билан характерлқдир. Гидро карбонатли сизот сувлари аста-секин ер бетига я=инлашиб чи=иши натижасида ва сув хароратини ўзгариши билан.тупро=ларда кальций-карбонат ва магний-карбонат тузлари кўпайиб.ўзига хос карбонатли шўрхоклар юзага келади. Кальций-карбонатли тузлар тупланганда 0,3-1,5 м чу=урликда олиш охакли конкрециялар ва цеменьланган ^атти"шух" деб аталадиган горизонт хосил бўлади.

Бу тупро=ларни хус-хусусиятларкни проф.Д.М.Кучуков,Ж.К.Савдов,Й.Узоковлар х,ар томонлама ўрганиб.ўзига хос мелиорациясини ишлаб чў=анлар.=адимдан су\ориб келаётган ўтло= воха тупро=ларни юкрри горизонтларда гумус 1,16-1,50 фоиз.азот 0,08-0,15 фоизгача бўлади.

Бу тупро=ларни физик хоссалари ўсимлик учун но=улайдир.Шунинг учун агромелиоратив тадбирлар олиб бориш зарур.Тупро=ларда шўр ювда ва бош=а умуман гидроморф тупро=лардан =ишло= хўжалигида она фойдаланиш учун пахта - дон-беда алмашлаб экиш.ерларни чу=ур хайдаш.агромелиоратив тадбирлардан зовур.коллекторларни ишларини.ўз ва угида тозалаб туриш.зах сувларни очириш.сизот сувларо=иб чи=ариб туриш лозим.ўсимликни ўсиш даврида су\ориш сунг.чу=ур культивациялар олиб бориш ва бош=а тадбирлар ўтказиш тавсия этилади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР: •

1.Чул ва бўз тупро=лар зонасидаги гидроморф тупро=ларни бир-биридан фар=лари.

2.Оч тусли бўз тупро=ларни гидроморф тупро=лар шароитига ўтиши ту\рисида нималар сабаб.шу тў\рисида гапириб беринг. ,

7-МАВЗУ: ТО/ ТУПРО+ЛАРИ ВА ЎСМЛИКЛАРИ.

РЕЖА:

1.Топ тупро=ларини тар==алши ва тупро= пайдо бўлиш шароитлари.

2.Пастки тог минта=асининг уру\ дашт ва йирик ўтли ярим саваналарнинг зкигарранг тупрорари.

3.Ўрта тог шнтакасининг ўтло=и дашт ва ўрмоя тупро=лари. , 4.Баланд то\ минта==асининг субальник, альник =ўн\ир тусли

то\ ўтло= ва ўтло=и дашт тупро=. б.То\ зонасида ўсадиган ўсимликлар дунеси.

АДАБИЁТЛАР:1,2,4,12; =ўшимча адабиётлардан -9.

1.То\ тупро=лари МХД лар территориясининг учдан бир =исмини (30,3%) эгаллайди.То\ тупро=лари МХД нинг харбий чегарасидан шарпа томон йўналган вертикал 15онунияти асосида жойлашган.худди шу 15онуният асрда Ўрта Осиё республикалари территориясидаги Памир.Памйр-Олой.Тянь-Шянь то\ системаларидаги тупро=ларни ўз ичига олади.То\ тутфоларини =исми текисликдан то\ чу=урдасига кўтарилган сари и=лим ўзгаради.температура пасаяди.атмосфера босими камаяди.хаво намлиги. ва ё\ин ми=дори кўпаяди. Баландликка кўтарилган сари хар 100 м да температура 0,4-0,6 градусга пасайиб.ё\ин ми=дори кўпая боради.То\ли районларнинг киши узо= бўлиб.=ор кўп е\ади.ёзи =ис=а бўлади.Вегетация даври 90 кун ва айрим то\ системасида ундан кам булиши мумкин.и=лим шароитнинг хилма-хиллиги ўсимликларнинг хам турли-туман бўлишига сабаб бўлади.

То\ли районларда рельеф тупро= та\ирини хал =илувчи фактор хисобланишини алохида эътиборга олинади.яъни ё\ин сувлари =ия-ликлардан тез 01916 ер юзасидаги майда заррачаларни кўп =исмини пастликларга о=изиб кетади.шу туфайли айрим тог системалардаги тупро=лар енгил механикли.тош ёки чо=иртошли бўлади.

То\ тупра=ларнинг она жинслари минералогик ва кимиевий таркиби хамда физикавий яоссаларига кўра хилма-хил. Тупро=; пайдо =илувчи она жинс бур.учламчи давр чу=индиси,о=инди то\ жинсларнинг нураш махсулотларидан иборат.Тог орали=идаги водий ва пастликларда хар хил =алинликда турли механик таркибли туртламчи давр дёслёссмон ёткизликлардан иборат.Шундай =илиб.то\ тупро=ларини табиий шароити хар хил баландликда жойлашган бўлиб денгиз сатхидан 900 (1000-4000) 4100 метргача жойлашган бўлиб.у =аердан ю=ориға кўтарилган сари и=лими.ўсимлик дунёси ва тупро=лари билан бир-биридан кескин фар= =илувчи бир неча минта==а ажратиш мумкин.Ушбу пайтда келтириладиган маълумотлар асосан Ўзбекистон то\ минта=асидаги тупр=ларини табиий шароити ва хосса хусусиятлари ту\рисида.

2.Пастки то\ минта=асининг чу=ру дашт ва йирик ўтли ярш саваналрнинг **згарранг** тупро=лари.Бу минтака денгиз сат=идан 900 (1000-1200)-1200 метргача баландликда жойлашган.Йиллик ўртача хаво харорати 3-10 градус Сер.ёгин сочинлар ми=дори 400-600 мм.егин сочинлар асосан куз ва бахор фасллариға тугри келади.Бу ерларнинг тупро=ларида =алин ўсган баланд буйли ўтлар-бу\дойик.ёввойи арпа хамда буталар,дўлана,наъматак,ёввойи бодом ва то\ олчалари ўсади.Бу ерларда жигарранг тупро=лар пайдо булиб,А-В гумусуш горизонти 80-100 см.=алинликда бўлиб.чиринди ми=дори 4-5 фоиз морфологик тузилиши жигарранг чириндили =атлам А. бу горизонти остида "В" карбонатлар бир мунча пастга ювилган.ёнгся^зимон кесакдор структураға эға.бу =атлам пастида сер-карбонатли Вг-ВК =атламлар мавжуд/'С" горизонти сар\иш

рангли лёссшон она жинсдан иборат. Бу ерларда сув эрозияси кенг тарқалган. Олидини олиш учун табиий ўт ўсимликларини сақлаш, бутазорлар ва мевали дарахтзорлар барпо қилиш керак. Чорва молларини тартиб асосида олиб борилши лозим.

3. Ўрта то'минта=асининг ўтло=и дашт ва ўрмон тупрoсфари. Ўрта то'минта=аси тупро=дори денгиз сат=идан 120(^300 метргача баландликга жойлашган.

а) жигарранг то' - ўрмон тупро=лари тупро=- и=лим шарoитлари ҳамда то'ларнинг жойлашишига =араб денгиз сат=идан 800 метрдан 1200-1500 метргача баландликда жойлашган. Рарбий Тянь-Шянь системасидаги тупро=лар 800-ЮООм. Зарафшон то' системасида -1200, хисорда 1200-1500 м. баландликда жойлашган, бу жигарранг тупро=ларни денгиз сат'идан ҳар хил баландликда бўлишги кучли шамол ва и=лимни *^ури^ригига* бо'ли=дир.

Ўрта то' минта=асининг типик жигарранг тупро=лари бир мунча сийраклашган урмон остида ҳосил бўлиб, морфологик тузилши анча яхши ривожланган. Тупро= бетида 3-4 см.=алинликда чала чириган урмон =ийи учрайди.=атлами.райги *окрпп* сари=. Бу тупро=нинг чиринди ми=дори 4-10 фоизгача умумий азот- 0,20-0,59 %, фосфор 0,25-30%, калий 2,0-2,5 % ни ташкил этади, сингдириш си\ими 100 гр. тупро=лар 20-27 мг/экв. Бу ерларда бо'дорчиликни кенг ривожлантириш мумкин, ноту\ри фойдаланиш натижасида тупро= сув эрозиясига чалиниб, яро=сиз ерларга ўтиб =олмокда.

в) =ора=-ун\ир то' ўрмон Яупрйўшири. Бу тупро=лар денгиз сат'идан 1200-2000 метр баландликда жойлашган. =ўнгир то' -ўрмон тупро=лар жигарранг то' ўрмон тупро=лари билан бир =аторда ўрта то' минта=асининг сернашш Пскел ва Угам то'лари ёнба\ирларида ривожланган. Бир йилдик ёин ми=доридори 900-1000 мм. дан ошади.

Йиллик ўртача температура 8-12 градус С атрофида. Ўрмонлар бу ерда жуда яхши ривожланган бўлиб, асосан ен\ок, олма, то' олча, буталардан наъматак, дулана кабилар куп тарқалган. Бу тупрокларни морфологик хусусиятлари -ю=ори чимли =авати тў= =ўн\ир тусли рангли.

Морфологик кўрсаткичлардан шуни таъқвдлаш лозимки =ора кун\ир то' =урмон тупро=ларини чириндили (=авати, жигарранг тупро=га нисбатан анча =алин $A+B^+B_{г}$ 100-150 см. ташкил этади, ю=ори каватларида чиринди ми=дори 6-8% ойлик ҳолларда 15 % га етади, умумий азот 0,244-0,461, фосфор 0,171-0,218, калий 2,35-2,52 % ташкил этади. Бу тупро=лар нейтраль реакцияга эга бўлиб. сингдириш си\ими жуда катта 100 грамм тупро=да 26-40 мгэкв. Бу зонани табиий урмонларши саргаш айни=са ён\окзорларни янги дарахтзорлар мевали боғлар барпо этиш борасида ишлар олиб бориш керак.

4. Баланд минта=асининг (субальник альник)кўн\ир тусли то' ўтло\и ва ўтло\и дашт тупро=ни бу минта=а тупро=лари зчгар-бий Тяньшанни Зарафшон, Хисор тоғларининг сув айиргичлари ва унга ёндошган =ияликларда жойлашган. Улар денгиз сат=идан 1800-2000 метрдан баланд ва ундан ҳам баланд то'ларда ривожланган.

Субаль зонани и=лими муътадил совук;: ёзи исси=а ва сал=ин ёзи ми=дори 4Шмм. дан 300мм.гача етади. Бу ерларда баланд бўйли хилма- хил

Ўсимликлар .Шу шароитда то\ ўтла=-дашт кўн\ир тусли ва оч тусли =ўн\ир тупро=лар тар=алган. То\ ўтло=-дашт =ўн\ир тусли тупро=лар кўпро= сернам ён ба\ирларда оч=ўн\ир тусли тупро= эса бирмунча =уру= ён ба\ирларда учрайди. субальн тўъ рангдаги =ун\ир- тусли тупро=ларда гумус 4-5% атрофида бўлади айини=са азотга бойдир{0,46-0,55%}. Бу тупро=лар яйлов сифатида фойдаланилади.

б.Республикамиздаги то\ларнинг энг ю=ори (=исми доимий музликлар билан =опланиб ётган осмон ўпар =оялар билан туташ.Ўзбекистон географик жойлашиши жихатидан экваторга я=нлиги.=уёш радиациясининг тик тушиш.климига таъсир =ушади.Шу сабабдан ҳам то\ларнинг хавоси анча *сурурир*.

Ўзбекистон худудини то\лар 2-3 *фсишк* эгаллайди. То\ минта=асининг икки минта=ага: пастки ва ю=ори то\ минта=аларга бўлиб ўрганилади.

Партки тор минтакаси ю=ори адир билан туташ бўлиб.узо=. вак=т кукариб турадиган эфемерларнинг кўплиги билан белгиланади.Эфемерлар жуда кам бўлиб.чала бута.бута ва дарахтлар тагида ўсади.Пастки то\да бир йиллик ва кўп йиллик ксерофлйг ўтлардан-.бу\дойи,эспарцет,шуво=,тошқакра,бозулбонг,чалов кабилар анча кўп ўсади.

Республикамизнинг \аша то\ларида ҳам бир хилдаги ўсимликлар ўсмайди.Чул минтан=сига якин жойлашган то\ларда (Нурота.Ок-тог.Буканто= кабиларда) бу\дойидар деярли учрамайди.

то\ минта=асининг асосий белгиси бу ерда эфемерларнинг йўклигидир.Ўсимликлар =атламини асосий =исмини бута ва дарахтлар ташкил =илади.Буларданг савуарча.Ён\о=.Иргай.Луке=оч.Заранг.Наъмат.Кўнгир наъмат.Чия.=изилча.^эра^ёк.Тарон каби кўп йиллик ўсшликлар ўсади.Бўта ва дарахтлар катта массивда ассоциация ва формациялар ташкил килашади.

НАЗОРAT УЧУН САВОЛЛАР:

1.Ўзбекистон Республикаси ми=ёсида =андай то\ларни биласиз. г.Ўзбекистон то\ зонасида =андай то\ тупро=лари таркалган.улар =андай тип ва типчаларга бўлинади. 3.Ўзбекистонни қайси то\ зонасида то\-\ўрмон-мелиоратив станцияси бор ва унинг асосий вазифалари тў\рисида гапириб беринг.

8-МАВЗУ:ДУНЁ ТУПРО+ЛАРИ ВА ЎСИМЛИК +ОПЛАМИ.

РЕЖА

- 1.Дунё тупро=лар ва уларни тупро=-и=лим шароитига кўра бў-линиши.
- 2.хар бир минта=а тупро=ларини ўзига хос тавсифи.
- 3.Дунё ўсимликлар =оплами ва мухофазаси.

АДАБИЁТЛАР:2,4,6,7,13.

1.Хозирги вақтда дунёда ер фондининг тупрок қоплами жуда хилма-хил.У 100 дан ортиқ тупроқ типларини ўз ичига оладиган бир неча минг тупроқ тури ва хилларидан иборат.Бутун дунёдаги қуруқликнинг умумий майдони 13414млн.гектар бўлиб.шундан 10290 млн. гектари (76,7%),текисликлардан 3124 млн. гектари (23,7%) тоғликлардан ташкил топган.Бутун дунёдаги текисликлардан тарқалган тупроқлар асосан 5 та тупроқ-ирим МИНТАКАСИДА жойлашган.

1.Тропик майдони -4910 млн.га

2.Субтропик -1820 млн.га

3.Суббореал -1530 млн.га

4.Бореал - 1564 млн.га

5.Поляр-466 млн.га

+Хуёйда бутун дунё ерларининг тупроқлари тарқалишида қисқача маълумот берилади.

1.Тропик минтақасининг тупроқлари.бу минтақада дехқончилик қилшадиган майдонлар 4,5 фоизини ташкил қилади.Тропик минтақаси тупроқ-иқлим шароитига кўра 3 та гуруҳга бўлинади.

1)Тропик нам ўрмон области-бу областга Америка.Марказий ва Жанубий Америка - Конго дарёлари хавзаси.Австралия.Осиё.Хиндистон ва Хинди Хитойни бир қисми.Австралия шимолий қирғоғи ва ороллари қиради.

Бу тропик нам ўрмон области асосан 2 та тупроқ зонасидан ташкил этган-кизил-сариқ.ферралит ва қизил тупроқ зонасидан иборат.

+қизил-сариқ ферралит тупроқлар.Бу тупроқлар иссиқ ва сернам шароитда пайдо бўлган.йиллик ва сутка тумператураси $25-27^{\circ}$ атрофида.Йиллик ёғин 1800-2500 мм, шундан 20% жала ҳолида ёғида.шу сабабли бу ерларда тупроқ эрозияси ривожланган.

Ўсимликлари асосан тропик ўрмон дарахтларидан иборат.Чиринди катламининг каллиниги 10-15 см.чиринди миқдори 1-3%,РНсингдириш сиқими кам 100 гр тупроқда 3-6 мг/экв.

+қизил ферралит тупроқлар.Бу тупроқнинг гумусли қоплами қалинлиги 30-40 см.чиринди миқдори 45 гача тупроқ рангига темир оксидининг таъсири туфайли қизил бўлади.Бу тропик сернам-ўрмон областда энг кўп ўзлаштирилган ерлар Жанубий Америкада.энг кам ўзлаштиришчан ерлар Австралиядадир.

2)Бу ерларда жами.шакар қанди,какао,кофе ва бошқа ўсимликлар экилади.Тропик ксерофитли- ўрмон ва саванналар-умумий майдони 1460 млн.га Хинд-АфрикаАвстралия.Сан-Франциско дарё водийси.Ўрбий Жанубий Бразилия ва Анд тоғ олди ерлари қиради.Йиллик ёғин 1000-1300 мм. бу ерларда бута дархтлари ўсади.Асосий тупроқ-и жигарранг.қизил тупроқлар чириндилли қоплами 25-30 см.чиринди миқдори -2% атрофида,РН-5-6.Сингдириш сиқими кам 100 гр.тупроқда мг/экв, механик таркиби оғир.

3)Тропик ярим қўл ва қўл области-бу энг куруқ қисми бўлиб.бу зонада қизил.қўл.қўл ва қўл тупроқлар тарқалган шўрланган ва серкарбонатлидир.

2.Субтропик минтақа тупроклари майдони 1820 млн.гектар бўлиб.субтропик сернам ўрмон области.субтропик ксерофит ўрмон ва бута чўл области ва субтропик ярим чўл областларига бўлинади.

1)Субтропик сернам ўрмон области умумий майдони 370 млн. га.бу областга Шимолий Америка (штатлари)Шарқий Осиё (Хитойнинг ш-ж вилоятлари),Тайвань ороли.Жанубий Бразилия.Уругвай.Парагай ва Австралияни бир қисми.Бу ерда йиллик ёғин 1000-2500 мм.Асосий тупроклари-изланиш ора,чириндили катлами 50-60 см.чиринди миқдори 10% кўп,РН-4,2-4,8.

2)Субтропик ксерофит урон ва бута-чўл области-умумий майдони 560 млн.га.Бу ерларга ўрта ер денгизи,Шарқий Осиё.Хиндистон,Покистон,Бирма,Хитойни катта майдонлари.Шимолий Америка (Техас, Нью-Мексика, Аризона, Калифорния штатлари) Австралия, Жанубий Америка қиради.Бу ерларда жигарранг,оч жигарранг.қора субтропик ва аллювиал ҳамда дарё водийларининг ўтлоқли жигарранг тупроқлар кенг тарқалган.

Жигарранг тупроқларда чиринди қатламнинг қалинлиги 40-45 см.чиринди миқдори 4-7%,оч жигарранг тупроқларда чириндили қатлами 30-40 см.чиринди миқдори эса 2-4 фоизни ташкил этади.Бу тупроқларда ишлоқ хўжалик экинларидан пахта,бугдой анжир.узум.цитрус ва бошқа экинлар ўстирилади.

3)Субтропик ярим чўл ва чўл областларининг умумий майдони 890 млн.гектарга яқин бўлиб.Африка Осиё саҳрои Кабирнинг Шимолий қисми.Арабистон ярим оролининг шимолий қисми олд Осиё чўли.Австралия.Жанубий Америка ва Жанубий Африкани ўз ичига олади.Бу ерлар (75%), асосан тош ва тошли саҳро тупроклари ва кумлоқлардан иборат, (25%). туз тупроқлардан иборат.Чўл тупроклари орасида кичик майдонларда тақир тупроқлар ҳам учрайди.Бу тупроқлар орасида 30 млн.га тропик аллювиал ва сугориладиган воҳа тупроқларида хурмо дарахти ўстирилиб деҳқончилик қилинади.

3.Суббореал минтақасининг тупроклари.Бу минтақа Евроосиё ва шимолий Америка территорияларини ўз ичига олиб майдони 1530 млн.гектарни ташкил этади.Шундай 45 фоиз дашт31 фоизи чала чўл ва чўл,24 фоиз ўрмонлардан иборат.Дунёдаги деҳқончилик қилинадиган ерларнинг ярим шу суббореал минтақасида жойлашган.Бу минтақа ҳам 3 та областдан:1)Суббореал ўрмон области;2)Суббореал-дашт области;3)Суббореал чала чўл ва чўл областларидан иборат.

1)Суббореал ўрмон областига Гарбий ва Марказий Европа ва МХД нинг Гарбий-жанубий районлари.АҚШ нинг шарқи-шимолидаги штатлари қиради.МХД мамлакатлари шарқий Осиё.шимолий Япония.Шарқи-шимолий Хитой ва Жанубий Америка (Чилининг жануби), Австралия (Янги Зеландия) нинг жанубий ороллариини ўз ичига олади.Бу ўрмон областининг умумий майдони 362 млн.гектра бўлиб.шундан 248 млн.гектар ўрмон-қўнғир тупроқлар майдон ташкил этади.Ўрмонсиз майдонларни 55 млн.гектар қора тупроқларга ўхшаш қора тупроқлар тарқалгандир.Бу областда 130 млн.

гектар(37%) ўзлаштирилган бўлиб купчилик ўсимликлар ўсиши учун тупрок юрим шароити яхши,

2)Суббореал дашт области.умумий майдони 704 млн. Гектар ташкил этиб.хозирги Россия Марказий ўрмон-дашт зонаси.\арбий Европа.Муглистон ва Хитойгача чўзилади.Дашт областини 240 млн. гектарда =ора тупроклар,258 млн.гектарида каштан тупро=лар.ўтло=ли крра ва ўтло= каштан тупро=лар 40 млн. шўртоб ва солодлар 28 млн.хамда аллювиал тупро=лар 30млн.гектарга я=ин майдонни згаллайди.Бу ерларда +ишло= хўжалигида бу\дой.жўхори.арпа.писта.=анд лавлагли.каноп сингари экинлар экиб фойдаланилади,

3)Суббореал чала чўл ва чул области Марказий Осиё МХД мам-лакатлар ва Хитойни бир =исмини ўз ичига олади.Бу областнинг чала чўл =исмида =ўн\ир тупр=лар.чўл кисмида эса сур =ўн\ир тусли =ум ва =умло= тупро=лар,та=ир ва шўрхоклар кенг тар=алган.Бу тупро=ларда асосан чорвачиликда яйлов ва пичанзорлар сифатида фойдаланилади.

4)Бореал (мўътадил) сову= минта=а тупро=лар.умумий майдони 1560 гектарни ташкил этади.Бу минта=а шимолий ярим шарга хосдир,2 та областдан 1)эрийдиган тайга урмон,2)доимий музлик ва =исман эрийдиган борал областлардан иборат.

1)Бореал эрийдиган тайга-ўрмон областининг умумий майдони 1150 млн.гектар бўлиб.бу ерлар Европанинг \арбий (Россияни шимолий тундрага чегарадош)кисмида жойлашган.Бу областда подзол ва чилли-подзол тупро=лар тар=алган.

2)Бореал доимий музлик ва =исман эрийдиган областнинг умумий майдони 410 млн гектар бўлиб.Россия марказий Сибирь (Марказий Якутия.Веркоянск) ва Шимолий Американи ўз ичига олади.Бу ерда нордон =ўн\ир типли тупро=лар таркалган.Бу ерлар ўрмончилик ва бурдойчиликда фойдаланилади. Аҳоли яшайдиган туманларда =исман сабзавот,картошка,сули,арпа ва хар хил ўтлар экилади.

5)Ер юзида ўсимликлар дунёси бепоёндыр.Бизнинг планетада деярли ярим миллион ўсимлик тури жойлашган.Ер юзасида ўсимлик. учрамайдиган жойни топиш =ийин.

Ўсимликлар дунесини геоботаник ну=таи назаридан текширганда таксономик бирликлар асосида ўрганилади:

1.ТИП

2.ФОРМАЦИЯ.

3.АССОЦИЦИЯ.

ТИП-(грекча типос-из.киефа) ўсимлик ва хайвон системасидаги энг йирик категориясидир. Тип жуда катта ўсишшклар =опламини ўз ичига олади.Чўл.адир ва то\нинг бир =исми ўрганилаётганда унинг ўсимликлари 3 ёки 5 типдан иборат бўлиши мумкин.Масалан адир минта=асининг бир бўлимида шундай тилларучраши мумкин: эфемер ўсшликлар,=ур\ок-бута ўсимликлари.хар хил ўтли-курук,бу\дойликларни ўсимликлар ва бош=алар.Типларнинг асосий белгиси ўсимликлар =опламида кўп таркалган ўсимлик турлари билан ани=ланилади.

ФОРМАЦИЯ-(лотинча формацио хосил бўлиш, шаклланиш) ўсимликлар оламида таксономик категория бўлиб, у домикат турлари билан бир-бирига ўхшаш бўлган ассоциациялар йиғиндисидан ташкил топган. Текширилаётганда аввало =айси тип эканлиги аниқланиди. Сўнгра уни формацияларга ажратиш мумкин. Формация бир-бирига ўхшаш доминант ўсимликлар йиғиндисидан иборат. Масалан: хар хил ўтли-рангзор, шувокли-аллазор, туворуш-буғдойзор, рангли актакзор каби формациялар.

АССОЦИАЦИЯ-(лотинча ассоциацио-сўзидан олинган бўлиб, бирлаш. жамоа деган маънони билдиради) деб муайян шароитда бир =анча турларга оид ўсимликларнинг =авм бўлиб ўсишига айтилади.

Ассоциация - ўсимликлар системасидаги энг кичик таксономик бирлик бўлиб. Ўсимликлар =авми, биргалашиб ўсувчи ўсимликларнинг табиий гуруҳларнинг тузилишига =араб тартибга солинади ва уларни ўрганишда кўп =ўлланиладиган мухим бирликдир. Ассоциацияларда ўсимликлар =опламининг ҳамма белгилари хисобга олинади.

Геоботаник изланишлар шўни кўрсатадики ўсимликлар =опламининг ўзгаришида ва=т ва масофа асосий роль ўйнайди. Ер юзидаги ўсимликларнинг hozirги табияй ўтиши билан ўсимликлар =оплами турли сабабларга, йил фаслларида об-хавонинг ўзгариши, ўша жой учун энг характерли ўсимликларни ўсиши, иклим шароитининг муттасил ўзгариб туршидир.

Юкорида =айд этилган шартларнинг бажарилишида инсоннинг ахамияти каттадир.

Инсон баъзан ўзи учун фойдали, лекин табияти учун зарарли шларни хам килади. Республикамизда бу ҳолни кўп учратиш мумкин. Кишилар янги ерлар очиш, деҳқончилик =илиш учун канчадан -канча фойдали ўсимларни сингдириб, йўқ =илиб юборган. Масалан: =уён суяк бундан 20-30 йил илгари чўлда ясуда кўп ўсарди. Эндиликда уни зўр\а топиш мумкин.

Чўлга =адам =уйишингиз билан чўлнинг исси=ига, шамолига бардую бериб, кўкариб ётган сакдовулзорш кўрардингиз. Энди-чи? камида чўлнинг 40-50 км ичкарасига кириб бормагунча, калин саксовулзорни учратиш =ийин.

Хуллас инсоннинг ўсимликлар дунёсига таъсири ўсимлик бойликларини ўзлаштирибгина =олмай, балки фойдали ўсимлик турлари сонини кўпайтириб боришдан хам иборатдир.

4) Поялар (кутб) минтақасининг тупроқлари. Умумий майдони (доимий музликлардан ташқари) 466 млн. гектари. Шимолий ярим шар 2 та =утб областига: 1) Европа, Осиё, 2) Шимолий Америка областларига бўлинади. Европа, Осиё =утб областида Арктика ва Тундра тупроқлари (Тундра-глейли, божок-глейли, боткок-торф-глейли тупроқдар тарқалган.)

Шимолий Америка =утб областида эса нордон ўтлоки чиринди-глейли тупроқлар тарқалган. Бу ерларда фақат овчилик =илиш мақсадида ҳамда буғдойчиликда фойдаланилади.

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР:

1.Кўрсатиб ўтилган дунё тупро=ларига кўра бизни минта=а тупро=лари =айси минта=а тупро=ларига оид?

2.Дунё тупро=лари ичида =айси област ё минта=а тупро=лари кўпро= дех=ончиликда фойдаланилади?

9-МАВЗУ: ТУПРО+ МУХОФАЗАСИ. .

РЕЖА:

1. Тупро=ни мухофаза =илиш хозирги жахоншумул муаммоси.
2. Тупро=шуносликдаги асосий экологик муаммолар.

АДАБИЁТЛАР :2,7,9,10,11,13,17,18,19,24,26,31.

Ердан о=лона фойдаланш ва тупро=ни мухофаза =илш табиий ресурсларини =ўриклаш ҳамда улардан фойдаланиш умумий муаммосида алохида ўрин тутди.Олимлар =айд этганларидек.бундай алохида ўрин энг аввало шу билан белгиланадики,инсоният ози=-ов=ат махсулотларининг 88 фоизини тупро= =атламига ишлов бериш натижасида олади:чорвачилик махсулотларини ҳам хисобга олганда бу ра=ам 98 фоизгача кўпаяди.Холбуки.тупрокринг =иймати ози=и-ов=ат; махсулотлари ва саноат учун хом-ашё етиштиришдаги фав=улодда мухим ахдмияти билан эмас.балки у куру=ли=даги барча биогеоценозлар ва умуман ер биосфераси хаётида ўйнайдиган буюк экологик рули билан ҳам белгиланади. .

Табиатшунослар олимлар экологлар,биологлар,тупрокшунослар,агрономлар.мелиораторлар тупро= катламининг тез ортиб ва баъзида ўрнини тўлдириб бўлмайдиган талафотлардан.шунингдек кенг таркалаётган тупро= ин=ирози ҳолатларидан чу=ур ташвишга тушиб =олишган.Бу ҳол тупро=нинг амалдаги ва эхтшол тутилган ҳосилдорлигини пасайтирди.Экология соҳасидаги замонавий билимлар сайёрамиз табиатида.биосферада.атроф муҳитда тупро= =атламини мутла=о алмаш-тириб бўлмаслик тўрисидаги ҳулосага олиб келади.Хатто биосферада тупро= =атламини алмаштириб бўлмаслик =онуни тўрисида ҳам гапириш мумкин.Сайёрамизнинг тупрок захиралари ўз майдони ва сифатига кўра чеклангандир.+уру\ликнинг 70 фоизга =адари яхшиланишини талаб этади ва мелиорацияга муҳтождир.Кейинги 75-100 йил мобайнида сайёрамизнинг тупро= =атлами тез камайиб борганлиги ҳам муаммони кескинлаштирмоқда.Бунга эътибор берилмаган эди.чунки тупро= катлами энг аввало дехкончилик ва ўрмон хўжалигида махсулот ишлаб чи=ариш учун бир замин сифатида "шахсий тагаб" ну=таи назаридан =абул =илиб келинди.Аммо кислород,озон ва угде-кислотанинг жахон балансида эҳтимол тутилган ўзгаришлар тоза сув захираларининг камайиши.сув хавзаларининг элтрофикацияси туфайли юзага келган ташвиш тупро= =атламининг

ахамиятига алохида зътибор беришга мажбур килди.Бугунги кунда тупро= =атлами емирилмокда,камайиб бормокда,тобора жадаллик билан таназулга юз тутмо=да.Тарихий давр мобайнида миллиард гектарга я=ин ердан махрум бўлинган (шахарлар манзилгохлар.иншоотлар.йўллар билан банд бўлган.эрозия емирган.шур босган.бу\ланган ва х.к).Хозирги вак=да бутун сайёрада 1,5 миллиард гектар ерга =ишло= хўжалик эинлари экилади.Хар йили жахонда 6-7 миллион гектаргача ердан махрум бўлинади.(Ковда 1978).Ер ахолисининг учдан икки кисми =ашшоклик ва очлик шараитида яшаётганлигини хисобга оладиган бўлсак.хозир сайёрамизнинг хар бир ахолисига хайдаладиган ер 10-20 йил аввалгидан камрок тў\ри келишини назарда тутсак.тупро= унумдорлигини ошириш.=ишо= хўжалиги экинларнинг хосилдорлигини икки карра.уч карра купайтириш энг я=ин келажакда дехкончиликнинг асосий вазифаси бўлиб қолиши лозимлиги я=кол намоён бўлди. Ер ресурслардан хар томонлама о=илона фойдаланмай.тупро= =атламини турли емирилиши ва бўлганишлардан мухофаза қилиш чораларини кучайтирмай,=ишло= хўжалиги билан ало=адор бўлмаган махсадлар учун ерларни тежаб-тергаб ажратмай туриб.бу \оят мушкул вазифани *хал* этишининг иложи йўк.

Ўзбекистон Республикаси 65-моддасига мувофиқ, табиий объектлар.жумладан ер.умумхал= бойлиги ва улар мухофазасида туради. Ўзбекистон Республикамиз исти=лолга эришиш ва *мустақил* суверен давлат деб зълон =илиниши ва *хуку=ий* жамият =уриши. ўз худудида ер муносабатларни тартибга солишда ва ривожлантиришда турли муста=илликага эришганлиги унинг =онунларни янгилаш ва такомиллаштиришни имкон беради.Мамлакатимиз аграр соҳасида ислохотларни *хуку=ий* жихатдан таъминлаш мақсадида бир =анча =онунлар ва уларнинг лойиҳалари ишлаб чи=илди.Шу жумладан.ер муносабатларни *хукуклик* асосида ривожлантириш ва тартибга солиш, ерлардан о=илона фойдаланиш ва мухофаза =илишга =аратилган Ўзбекистон Республикаси "Ер кодекси", "Ер кадастри" тў\рисидаги =онун ва бош=алар.

Тупро=ни эрозиядан са=лаш муаммоси дунёнинг арид и=лими минта=асида жойлашган купгина мамлакатлар учун.шу жумладан Ўзбекистон худуди учун ҳам долзарб муаммодир.Чунончи.Республикада эрозияга учраган ер майдонлари 1772,3 минг гектарни ёки хайдаладиган ерлар умумий майдонининг 40 фоизюга ташкил этади.Шулардан 721,9 минг гектари ирригация эрозиясига (Х.М.Махсудов,1989),салкам 50 минг гектари жарлик эрозиясига (А.Нигматов,1988),700,4 минг гектари лалми эрозиясига (Х.М.Махсудов,1989) ва 300 минг гектари шамол эрозиясига дучор бўлган (К.М.Мирзажонов,1976).Олимларнинг маълумотларига кўра,Ўзбекистон фойдаланиш учун яро=ли бўлган 3 миллион гектардан купро= лалми ерлар мавжуд,шулардан таъминланган ва ярим таъминланган лалми ерлар хиссасига садкам 1 миллион гектари тў\ри келади.

Ўзбекистонда эрозияга учраган тупро=ларнинг таснифи ишлаб чи=илган ва республикадаги эрозия хавф солаётган ерларнинг харитаси тўзилган.Эрозия ҳолатларининг таъсири остида бироз ювилган.ўртача

ювилган.кучли ювилган тупро= ва чукинди тупро=лар хосил бўладики.улар тупро= =атламининг =алинлиги.гумус.озу=а элементлари (макфо ва микро элементлар) захираси ва таркиб.микро-организмлар му=дори ва сифати,кимёвий ва физикавий хоссалар.биоэнергетика кўрсаткичлари ўзгарши туфйали унумдорлик даражалари

турлича эканлигидан далолат беради.Шу нарса маълумки.ирригация эрозияси натижасида тупро= ювилши хар йили гектарига 100-150 тоннагача ва ундан ҳам ошиб кетиши мумкин (нишаблиги 5°дан кўпро= бўлган =ияликларида гектарига 500 тоннага кадар боради),ана шу тупро= билан бирга гумуснинг йиллик нобудгарчилиги гектарига 500-800 кг.азот-гектарига 100-120 кг.фосфор 75-100 ва ундан кўпро= килограммни ташкил этши мумкин.Шуни =айд этиш керакки.эрозия жараёнлари тупро=даги экосистемалар биомассасида фойдаланилган =уёш энергияси ми=дорига ҳам таъсир ўтказади.Эрозия жараёнлари натижасида фитомассада, гумусда ва тупро=; таркибидаги микробларда ютилган куёш энергиясининг 30-50 фоиз ва ундан кўпро=и йукртилади,тупро=да содир бўладиган биологик.тупро=; жараёнларининг интенсивлиги асосан =уёш энергиясининг захиралари ва-сочаётган нур қуринишининг ўзгаришлар билан бо\ли= эканлигини эъти-борга олганда эрозия томонидан экосистемага етказиладиган зарар ми=ёсларини тасаввур этиш мумкин.

Су\орилиб дех=ончилик =илиннадиган майдонларда тупро=нинг иккиламчи шўрланши ва бот=о=ланиши жараёнлар кузатилмо=да. Дуне-бўйича су\ориладиган ерларнинг деярли 40 фоизи турли даражада шўрланган.Ўзбекистонда су\ориладиган ерлардан 2,0 млн.гектар атрофида шўрланган.бунга сабаб тупрок; хоссаларини ва грунт сувлар чу=урлигини ҳисобга олмасдан =ишлок хужаликда фойдаланиш.орти=ча су\ориш.коллектор-зовурлар системаси ёмон ишлаши ва бошқалар.Грунт сувлар кўтарилши сабабли тупро=лар баъзи ерлар ботко=ланиб кетган.Яна бир экологик муаммо-ерларни сахроланиши кучайши.ҳозир китъалар юзасининг 36-40% чўлга айланган.хар йили 25 млн.га ер сахроларга айланмокда.Гумус-тупро= унумдорлигини белгиловчи муҳим омилдир.лекин кейинги йилларда тупро=нинг ҳолати дегумификация жараёни натижасида гумуси Ўрта Осиенинг пахтачилик районлари тупро=ларида 40-50% га камайган.натижада тупро=нинг биологик фаоллиги пасайиб.физик хоссалари.сув ва ози=а режими ёмонлашиб кетган.Агрохимикатлар билан тупро= ифлосланиши яна бир муаммо.У\итлар нормадан ортиқ ишлатилса ва фойдаланиш технологияси бўзилса,тупро= ифлосланади,(фтор.радиоактив элементлар.нитратлар.о\ир металллар ва бош=алар).Ў\итлардан тупро= и=лим шароитлари ва етиштириладиган экинлар эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда фойдаланишга.ў\итлар ортиқча ишлатилмайди ва кам исроф бўлади.Кейинги йилларда дунё ми=ёсида .пестицидлардан фойдаланиш кўпайиб бормо=да ва улар билан тупро= ифлосланиши унинг биологик фаоллигига.экологик ҳолатига.унумдорлигига салбий таъсир этади.Тупрокнинг о\ир металллар билан ифлосланиши.уларнинг биосферада тўпланиши тирик организмлар мутаносиблигини бузиб турли салбий

о=ибатларга олиб келади.О'ир металллар пунгин пестицидлар,;фунгицидлар
о=ава сувлар таркибида учрайди.Инсон фаолияти таъсирида (завод,фабрика
чикиндилари.автомобиль газлари ва бош=алар) кўпчилик о'ир металллар
тупро==га келиб тушади.Фойдали =азилмалар очи= =азиб олиш.то\ =идирув
ишлари.нефть =азиб чи=ариш.йўл.саноат ва уй-жой кўрилишлари ва
бош=алар натижасида тупро= =опламининг бўзилиб йў=олиши "саноат
эрозиясига" учрашига олиб келади.Шундай =илиб тупро=ни мухофаза қилиш
(сув ва шамол эрозиялардан -, иккиламчи шўрланишдан; шўртабланишдан,
зичланишдан; бот=о=ланишдан; сахроланишдан; дегумификациядан;
агрохимикатлар,)хамда о'ир металллар ва радиоактив элементлар билан
ифлосланишдан; ва тупро=лар нордонланиши ва иш=орланишидан; "саноат
эрозиясидан" ва бош=алар)-хозирги куннинг \оят ўткир жахоншумул
муаммосидир.Тупро=ни мухофаза шунчаки бир махсад змас.Уни мухофаза
=илиш ва фойдаланиш яхлит бир бутун тадбир.ер ресурсларини мухофаза
қилишга.сифатини яхшилашга ва улардан оқилона фойдаланишга =аратилган
чора-тадбирлар тизимидир.Ву тизим тупро=; унумдорлигини са=лаб =олиш
ва ошириш учун.биосферани са=лаб туриш учун зарурдир.Шу нарса
равшанки.тупро=ди са=лаш.ер ресурсларида о=илона, тежаб-тергаб
фойдаланиш хозирги вақтда нафа=ат =ишло= хўжалиги.балки умумсайера
ахамиятига ҳам эгадир.Шу боис академик А.П.Виноградов: "Бугунги кунда
биосферага талу=ли нарсаларнинг ҳаммаси энг аввало ернинг тупрок»
=атламига талу=лидур деб таъкилангани тасодифий
эмас.Дарха=и=ат.одамларнинг та=дири кўп жихатдан ер ва тупро= та=дирига
бо'лиқдир

НАЗОРАТ УЧУН САВОЛЛАР

- 1.Тупро= мониторинги ва уншг вазифалари.
- 2.Тупро=лар рекультивацияси ва унинг турлари.
- 3.Тупро=лардан о=илона фойдаланиш ва мухофаза =илишга =аратилган:

.

АДАБИЁТЛАР:

1. Абдуллаев Х А. "Ўзбекистон тупро=лари" Т. 1973.
2. Бахрдиров М. , Расулов А. М., "Тупро=шуношлик", "Ў=итувчи" Т. 1975Й.
3. Бобохужаев И., Узоков Е "Тупро=нинг таркиби.хоссалари ва анализи"
Мехнат 1990й.
4. БобохужаевИ. .Узоков "Тупрошуношлик" мехнат. 1995.
5. /афурова Л. А. ,Махсудов Х М ,Пирмамедова . Я , "Эродирование
серозем развитие.на отложение неогена и пути повишения их
плодородия", "Узбекистан" 1999.
6. Добровольский Г. В. "География почв" М 1984.
7. Кауричев И. С. "Почвоведение" Колос" 1989. 3. Кимберг Е Е "Почвн
пустинной зонм Узбекистон" "Фан" 1975.

9. Махсудов Х. М. "Эрозия почв аридной зоны".1989.
10. Махсудов Х.М..АДИЛОВ А. "Эрозияшунослик" 1993.
11. Пэчвы! Узбекистана" проф. М. У. Умаров тахрири "Фан"1975-
12. Талипов Г. А., Гуламов Х.Г., Махсудов Ж. М. , Акрамов К. "Узбекистон Республикаси Ер кадастри" 1994.
13. Турсунов Л. Т. "Тупрок годезияси" "Мехнат"1998.
14. Ўзбекистон Республикаси "Ер кадастри". 1998.
15. Ўзбекистон Республикаси "Ер кадастри" тўрисидаги қонун-,1998.
16. 1998-2000 йиллардаги даврда қилган хўжалиги натижаларини ҳисоботлари,1998.
17. Горбунов Н И. "Менералогия и коллоидная химия почв1975.
18. Закиров Т. "Пахта даласи экологияси","Мехнат" 1991.
19. Ковда В А. "Основн учения о почве" Т-1-2,1973.
20. Ковда В А. "Происхождения и режим засоленных почвы
21. Расулов А. М. "Засоленных почвы Каршинской етепи и пути их освоения и повышения плодородия,1969.
22. Рафурова Л А. "Махсудов Х М. "Эрозияга учраган неогин ёт-қизилларда шаклланган бўз тупроқларнинг биологик хўжалиги Ўзбекистон" 1999.
23. Е Хамдамов. П Шукруллаев. Е. Тарасова. Ю +урбонов. А. Умрзонов. - Ботаника асослари. Тошкент "Мехнат" 1990 й.
24. К. Хайдаров. К Х Хожиматов – Ўзбекистон ысимликлари. Тошкент "Ўқитувчи" 1992 й.
25. И. Ф. Голубев. - Почвоведение с основами геоботаники. Из-во "Колос". Москва 1970 г.
26. А. Хамидов . М. Набиев. Т. Одилов - Ўзбекистон усимликлари аниқлаги - Тошкент "Ўқитувчи" 1937 й.

МУНДАРИЖА

1.Кириш. Тупроқ генезиси, эволюцияси.классификацши, номенкатураси ва диагностикаси. 3 •

2. Шўрланган тупро=лар ва шўрга чидамли ўсимликлар. . . . 10.

.3. Чўл минтакасининг тупро=лари ва ўсимликлар олами. . . 16 •

4. +уру= субтропик то\ олди чўл дашт зонасининг бўз тупроклари. Оч тусли бўз тупро=лар ва бу ерда ўсадиган ўсимлик жамоаси. 21.

5. Типик ва тў= тусли бўз тупро=лар ҳамда бу минта=аларда ўсадиган ўсимликлар.25

6. Гидроморф тупро=лар.29

7. Тог тупро=лари ва ўсимликлари. 33 .

8. Дуне тупро=лари ва ўсимликлари. 39-.

9. Тупро= мухофазаси. 42.