

ТЕРИНИНГ ВИРУСЛИ КАСАЛЛИКЛАРИ




**СОБІРОВ СУЮНБОЙ
ПИРИМКУЛОВИЧ**

2012 йил

СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)

Терида пайдо буладиган юкумли
хавфсиз усмалар.

Сугаллар катталиги бир неча
миллиметрдан 1—2 см ча келадиган
эпидермал усмалар.




СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)



Аксарият болалар ва усмирлар
орасида кенг тарк,алган.


РОРОВА туркумига мансуб
фильтрланувчи вируслар
кузгатади.



СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)




Кузгатувчисининг хусусиятларига
караб акантоматоз, папилломатоз
ва киритма (вакуола) хосил
килувчи штаммалари бор.



СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)




Касаллик юкумли булиб, соглом
одамга бемордан тугридан-тугри
мулокатда булганда ёки беморнинг
рузгор буюмлари оркали юкиб
колади.



СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)



Одам терисидаги яра-чакалар,
тирналишлар, ишкдланишлар, сув-
липид алмашинувининг бузилиши
сугал тошишига мойил килиб
куядиган омиллардандир.




СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)



Сугаллар жойлашиши, кузгатувчиси ва
қуринишига қараб турлича бўлади:


1. Оддий сугаллар
2. Усмирларнинг ясси сугаллари
3. Оёқ. қафти сугаллари
4. Кексалар сугаллари
фарқланади.



СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)




Барча юкумли касалликлардаги
сингари сугалда хам инкубацион
(бир неча хафтадан 2—3 ойгача),
ПРОДРОМАЛ, ТОШМАЛАР
ЧИКИШИ, СУСАЙИШ ва
ТУЗАЛИШ каби даврлари бор.



СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)

ОДДИЙ СУГАЛЛАР


Яллигланишга алокаси йук, тугунчалар
куринишида булиб, катталиги тарик ёки
нухат донидек келади, зич, яримшарсимон
ёки ясси шаклли, нормал тери рангида ёки
корарок булади. Уларнинг юзи
гиперкератоз туфайли нотекис.



СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)



ОДДИЙ СУГАЛЛАР

Кул панжасининг орка юзаси, кафт, юз ва баданнинг бошка жойларида энг куп учрайди. Улар одатда огримайди, лекин тирнок болишларида булса, ишкаланиш туфайли огриб туриши мумкин.





СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)

УСМИРЛАРНИНГ ЯССИ СУГАЛЛАРИ





СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)

ОДДИЙ СУГАЛ



СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)

ОДДИЙ СУГАЛ




СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)

ДАВОСИ:

Психотерапия, гипноз яхши наф беради.

ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ,
ДИАТЕРМОКОАГУЛЯЦИЯ, КРИОТЕРАПИЯ,
СУЮК АЗОТ, УЧ ХЛОРСИРКА кислотаси билан
куйдириш буюрилади, 2% ли ОКСОЛИН, 1—3% ли
«ФЛОРЕНАЛЬ», ГОССИПОЛ билан ФОВЛЕР
эритмаси (40% ФЕНОЛ, 60% ТРИКРЕОЗОЛ) ва
ИНТЕРФЕРОН, КОЛХИЦИН моддала-ри бор
малхамлар ишлатилади.




СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)



УСМИРЛААРНИНГ ЯССИ СУГАЛЛАРИ

Тери дамидан кутарилиб турадиган,
оч пушти ёки саргиш рангдаги,
майда-майда эпидермал усмалардир.
Уларнинг юзи одатда силлик,
булади.




СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)





УСМИРЛАРНИНГ ЯССИ СУГАЛЛАРИ

Юзда (лунж, пешона, энгакда),
буйинда, кул панжасининг орка
юзасида учрайди. Баъзан сугаллар
катор булиб жойлашади. Сугалнинг
бу турига диагноз куйиш кийин
эмас.



СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)

УСМИРЛАРНИНГ ЯССИ СУГАЛЛАРИ



СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)

ОЁК, КАФТИ СУГАЛЛАРИ


Оёк кафти терисининг энг кун босилиб турадиган жойларида пайдо булади, юрган вақтда безиллаб туради ва ранги саргимтир жигарранг, шакли юмалок ёки овал, катталиги тангадек келадиган тери калинлашмасидан иборат булиб, кадокларга ухшаб кетади, бу сугаллар сургичли усимталари (акантоз, папилломатоз, гиперкератоз) борлиги билан кадоклардан фарк, килади.



СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)



ОЁК, КАФТИ СУГАЛЛАРИ

Пойафзални нотугри кийиш,
товоннинг чакаланиши ва
гипергидроз оёк кафти
сугалларига сабаб булади.



СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)

ОЁК, КАФТИ СУГАЛЛАРИ




СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)



КЕКСАЛАР СУГАЛЛАРИ

Ёши 40 дан ошган одамларда,
тана, буйин ва юзда кул ранг,
жигарранг ёки кора, усти ёг
билан копланган доглар
куринишида
вужудга келади.




СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)

ДАВОСИ:

СУЮК АЗОТ эритмаси (криотерапия),
КОЛХАМИН малхами ишлатилади,
ПОДОФИЛЛИН нинг 10—20% ли
эритмаси суртилади.

Куйидаги куйдирувчи моддалар
аралашмасини куллаш мумкин



СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)

ДАВОСИ:


Куйидаги куйдирувчи моддалар
аралашмасини куллаш мумкин:

Rp: *Ac. salicylici* 1,0

Ac. acetici 9,0

Collodi elastici 10,0


M.D.S. сиртга суртиш учун.



СУГАЛЛАР (*VERRUCAE*)

ДАВОСИ:

Икки хафта давомида 50 Р дан рентген
нурлари бериш, ЭЛЕКТРОАКУСТИКА
килиш, МУЗ СИРКА кислотаси,
ФОВЛЕР эритмаси суртиш. хадеганда
тузалавермаса ЖАРРОХЛИК йули
билан олиб ташлаш тавсия этилади.



ЭЪТИБИРИНГИЗ УЧУН ТАШАККУР

