

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА УРТА МАХСУС ТАЪЛИМ
ВАЗИРЛИГИ.**

КАРШИ МУХАНДИСЛИК ИҚТИСОДИЁТ ИНСТИТУТИ.

ФИТОПОТОЛОГИЯ
(маъруза матнлари туплами).

КАРШИ – 2004.

Сизга тавсия этилаётган маъруза матнлари тасдиқланган намунавий дастур асосида ёзилган булиб, ушбу фанга доир асосий тушунча ва маълумотлар киска баён этилган. Табиийки, ундага фикрлар фанни тулик ёритмайди. Шунинг учун фанни янада муккамал эгаллаш мақсадида Сизга адабиётлар руйхатини тавсия этамиз.

В – 5620200 – «Агрономия», В – 5620300 – «Усимликларни химоя қилиш», В - 5620500 «Кишлок хужалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш технологияси» таълим йуналишига мулжалланган.

Тузувчи:

Биология фанидан номзоди, доцент **Н. ЭШОНКУЛОВ**

Такризчилар:

«Агрономия» фанлари кафедрасини мудир, доцент М.Мираков, «Кишлок ва сув хужалиги» бошкармасининг булим бошлиги Ш.Донаев.

Маъруза матни «Агрономия фанлари». Кафедрасининг 2004 йил 2 сонли ва технология факультети кенгашининг № сонли ҳамда институт укув услубий кенгашининг № сонли қарорлари билан маъқулланган.

Аннотация

Фитопатология фани усимлик касалликлари тугрисидаги фан булиб касал усимликларда руй берадиган патологик жараённи содир булиши, унинг келиб чиқиши сабаблари, хосил булиш қонуниятлари, тарқалиши, касалликни олдиндан айтиш, зарари ва сабабларини навларнинг чидамлилиқ даражасини касалликни олдини олиш. Йулларини ва қураш қораларини урганади. Маъруза матнида усимликнинг химоясига оид барча муҳим масалалар замонавий талаб даражасида мужассамлаштирилган.

Аннотация

Предмет «Фитопатология» являясь предметом о заболевания растений также изучает патологические процессы, возникающие у больных растений, причины заболеваний, их распространения, предукреждение заболеваний, их вред, степень выносливости сортов растений к различным заболеваниям и меры поборьбе с ними.

В сборнике лекций на современном уровне представлены все важные проблемы, связанные с защитой растений.

Annotation

Phitopotology, the subject about disease of plants, deals with happening of pathological pprocesses occuved diseased plants reasons of its origin,bases of existing, spreading, predict the disease, harms and their reasons, levets of types' stvength, ways of preventing from diseases and fighting against diseasing.

All important matters about protection of plants are described in modern demand in the follwing collection of lectures.

МАЪРУЗАЛАР МАВЗУЛАРИ.

№	Маъруза мавзулари	Соат	Амалиёт	Жами
1.	Кириш. Фитопотология фаннинг максоди ва вазифалари.	2	2	4
2.	Усимликнинг юкумли ва юкумсиз касалликлари ҳамда уларга қарши кураш чоралари.	2	2	4
3.	Галла донли экинлар касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари.	2	4	6
4.	Гуза касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари.	2	4	6
5.	Беда усимлиги касалликлари.	2	2	4
6.	Помидор касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари.	2	2	4
7.	Картошка касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари.	2	2	4
8.	Полиз экинлари касалликлари.	2	4	6
9.	Мевали усимликларнинг касалликлари ва уларга қарши чоралари.	2	4	6
10.	Ток ва тут касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари.	2	2	4
11.	Иссик хоналардаги усимликларни касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари.	2	2	4
ЖАМИ:		22	30	52

АДАБИЁТЛАР:

1. Кишлок хужалигида иктисодий ислохатларни чуқурлаштириш дастури – Т.: «Ўзбекистон» 1998.
2. Головин П.Н., Арсеньева М.В. и др. Практикум по общей фитопотологии. – Л.: «Колос» 1977.
3. Дементьева М.И. Фитопотология. – М.: «Колос» 1977.
4. Демидова Л.И. Болезни огурцов в защищенном грунте.-Л.: «Колос» 1975.
5. Дьяченко В.С. болезни и вредители овощей и картофеля при хранении. – М.: «Агропромиздат» 1985.
6. Исаева Е.В. Болезни плодовых и ягодных культур-К.: «Урожай»1972
7. Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопотология. – М.: «Колос» 1982.
8. Попкова К.В. и др. Болезни картофеля.-М.: «Колос» 1978.
9. Практикум по сельскохозяйственной фитопатологии \ Под ред. К.В.попковой.-М.: «Колос» 1976
10. Родигин М.Н., Арциховская Е.В.Аксенова В.А. Биохимия и физиология иммунитета растений.-М.: «Высшая школа» 1975
11. Хохряков М.К., Потляйчук В.И. и др. Опреилитель болезней сельскохозяйственных культур.-Л.: «Колос» 1984.
12. Шералиев А. Тутнинг фузариоз касаллиги, Т.: «Фан» 1992.

1 – Мавзу: Фитопотология фанининг максоди ва вазифалари.

Режа:

1. Кишлоқ хужалигида иктисодий ислохотларни амалга оширишда фитопотология фанининг аҳамияти.
2. Фитопотология фанининг предмети ва булимлари.
3. Фитопотология фанининг вазифалари.
4. Усимлик касалликларини квалификацияси.
5. Фитопотология фанининг ривожланиш тарихи.
6. Фитопатология нечта булимга бўлинади.
7. Фитопотология фани қайси фанлар билан боғлиқ
8. Фитопотология фани неча турга бўлинади.
9. Юкумли ва юкумсиз касалликлар тугрисида тушинча.

Адабиётлар: 3, 7.

Таянч иборалар:

Авлод (насл)	-	Жонивор ёки усимлик ривожлана бошлаганда то вояга етган давргача ҳаёти.
Агробιοοcenoz	-	Экинзорларда ва боғларда организмлар (усимликлар, ҳайвонлар жумладан ҳашоратлар микроорганизмлар)нинг ҳамкорликда ҳаёт кечириши. Лиоценонинг бир формаси
Антагонист	-	Бошқа микроорганизм (турларининг ҳаёти кечиришини секинлаштирадиган ёки тухтатадиган микроорганизм)
Вилт	-	Сулиш
Иммунитет	-	Организмнинг маълум бир касалликка умуман чалинмаслиги, иммун организм-касallикка чалинмайдиган организм.

Кишлоқ хужалигини ислох қилишнинг устивор вазифалари Республика иктисодий мустақиллигини таъминлаш ва кишлоқ хужалигининг барча тармоқларид ислохотни босқичма – босқич амалга ошириб боришнинг муҳим аҳамиятга эга эканлигидан келиб чиқмоқда.

Иктисодий ислохотларни чуқурлаштириш дастури Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг маърузасига қайд қилинганидек, кишлоқ хужалигида барча агротехника ва агрокимё чора тадбирларини илм – фан тавсияномаларига ва илгор тажрибаларга оид утқизиш, бегона жорий қилиш муаммоларини ечишда мутлақо янгича ёндошув бўлиши кераклигини такозо қилади.

Белгиланган вазифаларни амалга ошириш максодида ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ҳукумати томонидан қабул қилинган «Фермер хужалиги тугрисида», «Дехкон хужалиги тугрисида», «Кишлоқ хужалиги кооперативи тугрисида» қонунлар ва 1998 – 2000 йиллардаги даврда кишлоқ

хужалигидаги иктисодий ислохатларни чуқурлаштириш Дастурида кишлоқ хужалигида куп тармоқли иктисодиётни ривожлантириш билан бирга, уни илмий асосада ташкил этиш билан боглик булган катта имкониятларни очиб берилган.

Кабул килинган конун ва қарорларда усимликларнинг ҳосилдорлигини кутариш, касалга чидамли навларни яратиш, маҳсулот сифатини яхшилаш асосида жаҳон андозалари талаби даражасига эришиш вазифаси белгилаб берилган.

Республика иктисодий истикболига кишлоқ хужалигини интенсив ривожлантириш асосида, аҳолини озик – овқат маҳсулотлари билан тулик таъминлаш асосида эришиш мумкин. Бу муаммоларни муваффақиятли ҳал қилишда кишлоқ хужалигини механизациялаштириш, сугориш тармоқларини яхшилаш, усимликларни ҳар хил замбуруглар келтириб чиқарадиган касалликлардан, ҳашоратлардан ва бегона утлардан химоя қилиш муҳим урин тутди. Бу ишларнинг тугри ташкил қилиниши ва унинг деҳқон – фермер хужаликларида қулланилиши, минглаб центнер микдоридаги қушимча аъло сифатли ҳосил олишга имкон, ҳамда ҳосилнинг беҳуда нобуд бўлишига барҳам беради.

Усимлик касалликлари Республикамиз шароитида экологик шароитга боглик равишда турли муддатларда турлича зарар келтирмоқда. Баъзан маҳсулот сифати, ҳосил микдори кескин камайиб кетмоқда.

Ҳозирги кунда усимликни химоя қилиш масаласи энг долзарб масала ҳисобланади. Ҳар бир фермер, кишлоқ хужалик мутахассиси ҳозирги замон талаби даражасида усимликларнинг касалликларини аниқлай билиши, унга қарши қураш олиб бориши ва ҳосилни сақлаб қолишнинг йулларини билиши зарур.

Шунинг учун фитопотология фани усимликларни химоя қилиш мутахассислигидан ташқари барча агрономлик мутахассисликлари учун зарур фан ҳисобланади.

Фитопотология фани усимлик касалликлари тугрисидаги фан бўлиб касал усимликларда руй берадиган патологик жараённи содир бўлиши, унинг келиб чиқиш сабаблари, ҳосил бўлиш қонуниятлари, тарқалиш, касалликни олдиндан айтиш, зарари ва сабабларини навларнинг чидамлик даражасини, касалликни олдини олиш йулларини урганади.

Фитопотология туртга бўлимга бўлинади:

1. *Диагностика – касалликнинг ташиқи белгиларни аниқлаш.*
2. *Этиология – касаллик сабабларини аниқлаш.*
3. *Профилактика – касалликни олдини олиш.*
4. *Терапия – касалликни даволаш.*

Фитопотология фани қуйидаги фанлар билан боглик:

Микология, Кишлоқ хужалиқи бактериологияси, Фитовирусология, Фитонематодология, Фитопатогенез, Патология ва физиология, Фитоиммунология, Фитопрофилактика, Фитотерапия.

Фитопотология фани куйидаги иккитта турга булинади:

1. *Умумий фитопотология.*
2. *Хусусий ёки кишлок хужалик фитопотологияси.*

Умумий фитопотология усимликлар касалликларнинг келиб чиқиши, тарқалиши касаллик кузгатувчиси ва уларни химоя қилиш усуллари урганади.

Хусусий фитопотология маълум турга мансуб усимликда касаллик булгиларининг намоён бўлиши, касаллик кузгатувчиси ва уларга қарши кураш чораларини урганади.

Фитопотология фанининг вазифалари: ҳар қандай усимликларнинг ҳосилдорлигини ошириш билан бирга унинг касалликларига чидамлилигини ҳам ошириш керак.

Усимликларни химоя қилишнинг асосини чидамли навларни яратиш, юксак агротехник тадбирларни қўллаш ва касалликнинг тарқалишини олдини олиш каби тадбирлари ташкил қилади.

Республикамізда фитопотология фани белгиланган вазифаларни амалга оширувчи Усимликларни химоя қилиш илмий текшириш институти, Селекцияси ва уруғчилик институти, УЗРФА Ботаника институти ва Ботаника боғидаги Микология лаборатория олимлари фаолият қўлатмоқда.

Олимлар олдидаги асосий вазифа усимликларни химоя қилишнинг техник ва иқтисодий самарадорлигини оширишдир. Бунинг учун атроф муҳит ва инсон саломатлиги учун безарар бўлган химиявий кураш ва биологик кураш чораларини ишлаб чиқиш, ҳамда қўллашдан иборатдир.

Масалан, бугдой уругини экишдан олдин фунгицидлар билан ишлаш натижасида ҳосилдорлик 15 – 25 %, картошка туганатини цинаб фунгициди билан ишлов берилганда 1 га ердан 135 ц. ёки 15% дан ортиқча ҳосил олинган. Қанд лавлаги уругини дорилаб экиш туфайли ҳосилдорлик 15 – 20 ц. га ортган.

Шундай қилиб фитопотология фанининг асосий вазифаси усимликлар ҳосилини ортиши учун нобудгарчилигига йўл қўймасликдан иборатдир.

Касаллик тугрисида тушунча. Касаллик деганда патоген ёки ноқулай шароит туфайли усимликдаги нормал физиологик жараёнларнинг бузилишига айтилади.

Физиологик жараёнларнинг бузилиши: фотосинтез, фермент жараёни, ҳужайранинг утказувчанлиги, осмотик босими, нафас олиши, углевод ёки оксил синтези, сув баланси, ва устириш моддаларнинг таъсири натижасида ривожланишнинг бузилишида намоён бўлади. физиологик жараённинг бузилиши уз навбатида усимликнинг анатоми – морфологик хусусиятларнинг узғаришига, ўсиш ва ривожланишига таъсир қилади.

Патоген микроорганизмларнинг салбий таъсири туфайли усимлик ҳужайралар шакли қатталашади, ҳужайралар микдори ортиши, ҳужайралар шакли қичиклашиши, некроз ҳужайралар ҳосил бўлиши ва ҳужайралар пўстининг бўшашиб қетишига сабаб бўлади. Усимлик органларидаги анатоми – морфологик хусусиятларнинг узғариши улар юзида доғланишнинг ҳосил бўлиши, қириш, ўсмаларни ҳосил қилиниши, шакл узғаришига сабаб бўлади. усимликлардаги физиологик ва морфологик узғаришлар усимлик

хосилдорлигига таъсир килиб, микдорини камайтириб, сифатини бузилишига олиб келади.

Усимлик касалликларининг классификацияси. Хар кандай усимликлардаги касалликни урганишда унга карши кураш чораларини ишлаб чикаришда касаллик сабабларини тугри билиш махсадга мувофикдир. Касалликларни классификация килишда унинг асосий сабабларини аниқ белгилаб олиш керак. Усимликларнинг касалликларни куйидаги иккита гурухга булиш мумкин.

- *Юкумли касалликлар.*
- *Юкумсиз касалликлар.*

Юкумсиз касалликлар деб – усимликдан усимликка таркалиш имкониятига эга булмаган касалликларга айтилади. Бунга асосий сабаб нокулай шароит келтириб чикарувчи юкори ёки паст харорат, намлик, озик моддалар микдори ва таркиби, тупрок холати, микроэлементлар сабаб булади.

Юкумли касалликларни келтириб чикарувчилари замбуруглар, бактериялар, актиномицетлар, вируслар ва гуллик паразитлар булиши мумкин. Юкумли касалликларни келтириб чикарувчи микроорганизмлар турли воситалар ёрдамида бир усимликдан иккинчисига таркалиш хусусиятига эга булиб кишлок хужалигига катта иктисодий зарар етказди. Юкумли касалликларни келтириб чикарувчи микроорганизм турига боглик равишда уларни номланади.

Назорат саволлари:

1. Кишлок хужалигида иктисодий ислохатларни амалга оширишда фитопотология фанининг ахамияти кандай?
2. Фитопотология фанининг вазифаси нима?
3. Фитопотология фанининг махсади нима?
4. Касаллик белгилари кандай намоён булади?
5. Усимлик касалликлари кандай турларга булинади?
6. Фитопотология фанининг ривожланишида Республика олимларнинг кушган хиссаси кандай?

2 – Мавзу: Усимликларнинг юкумли ва юкумсиз касалликлари.

Режа:

1. Юкумли касалликлар кузгатувчиларни биологик хусусиятлари.
2. Патогенлик жараённинг келиб чиқиши.
3. Юкумли касалликлар экологияси ва диагностикаси.
4. Касалликларни намоен булиши.
5. Юкумсиз касалликлар ва уларнинг келиб чиқиш сабаблари.
6. бирламчи ва иккиламчи инфекциялар тугрисида тушунча.

Адабиётлар: 3, 3, 5, 6, 7, 9.

Анеридий	-	Оомицетлар синфига оид тубон замбуругларининг эркаклик жинсий органи
Аск	-	Аскомицетлар синфига мансуб юкори замбуругларнинг халтача шаклидаги жинсий купайиш органи.
Аскомицетлар	-	Жинсий купайиш халтача (аск) лар ичида ривожланувчи спора (аскоспора)лар воситасида амалга ошувчи мицелийси куп хужайрали, юкори замбуруглар синфи
Инкубацион давр	-	Касалликнинг «яширин) дпври-усимлик паразит билан зарарланиши хамда касалликнинг биринчи ташки белгилари пайдо булиши орасида утган давр.
Усимликлар уйгушлашган химояси.	-	Зарарли организмлар билан курашда барча мумкин булган усулларни (агротехника кимёвий биологик ва хакозо хамда табиий тартибга солишни) биргаликда кулланишга мухим ёндашив, зараркунанда, касаллик кузгатувчилар ёки бегона утлар популяциясини иктисодий зарар келтирадиган даражага етказмаслик учун, кам харажат килиб, мунтазам равишда олиб бориладиган хавфсиз химоя тизими.

Юкумли касалликлар деб усимликдан усимликка юкиш хусусиятига эга булган касалликларга атилади. Юкумли касалликларни келтириб чиқарувчилари: замбуруглар, бактериялар, вируслар, актиномецетлар, микоплазмалар ва гуллик паразитлар булиши мумкин. Юкумли касалликларнинг келиб чиқишида усимлик ва паразит орасидаги асосий муносабат озикланишнинг паразит (текинхур) лик йули билан амалга ошиши асосида булади.

Усимликлардаги юкумсиз касалликлар куйидаги факторлар таъсирида вужудга келади: нокулай тупрок шароити; нокулай метереологик шароит; усимлик туқималарининг механик парчаланиши; хаводаги зарарли моддалар; ренген нурлар таъсири.

Тупрокда учрайдиган патоген микроорганизмлар сапрофит организмлардан усимликларга таъсир этиш хусусиятига караб фарк килади. Сапрофит микроорганизмлар узи хаёт кечираётган хужайра хаётига салбий таъсир курсатади ва уни ривожланишини тухтатади. Патоген микроорганизмлар эса хужайра ривожланишини тухтатиб куяди, унинг хисобига хаёт кечириб уни халок килади ёки бошка патологик жараённи келтириб чиқаради. Табиатда учрайдиган микроорганизмлар хаёт кечириш усулига караб уларни куйидаги гурухларга булиш мумкин:

- *Хакикий паразитлар;*

- *Шартли сапрофитлар;*
- *Факультатив паразитлар.*

Курсатилган хусусиятларнинг намоён булиши замбуругларнинг патогенлик, втрулентлик ва агрессивлик хусусиятлари билан боғлиқдир.

Патогенлик – микроорганизмларнинг касаллик келтириб чиқариш хусусиятидир. Унинг зарари ва таъсир тезлиги патогенлик даражаси ва хусусиятига қараб ортиб боради.

Вирулентлик – микроорганизмларнинг маълум турдаги ёки навдаги усимлигида вилт касаллигини келтириб чиқарадиган *V.dahlia* замбуруги факат урта толали гуза навларини касаллантиради. Бу замбуруг гузанинг ингичка толали навларини касаллантирмайди.

Агрессивлик (тажовускорлик) – патогеннинг касалликка чидамли булмаган усимлик органларида қупайиш хусусияти назарда тутилади. Агрессив турлар узок масофага тарқалиш, ноқулай шароитга мосланиш хусусиятига эга бўлади.

Касаллик қузгатувчисининг усимликка кириб келиши, тарқалиши ва касаллик белгиларнинг намоён булиши патологик жараён дейилади. Патологик жараён қуйидаги босқичларда амалга ошади: усимликка касалликнинг юқиши, патогеннинг инкубация даврини утиши, касалликни давом этиши, касаллик белгиларининг намоён булиши ва тарқалиши. Касалланиш (заражение) деб инфекциянинг касалга берилувчан навдаги усимликка кириб келиши, спорасининг усиб, унинг хужайраси ичида ривожланиб, усимликнинг химоя қилиш хусусиятини қолиб қиқишга айтилади. Касалланиш жараёнини механик зарарланишдан фарқ қила билиш зарур. Касалланиш жараёнини тасаввур қилиш учун қаттиқ қора қуя замбуругнинг бугдой уругини касаллантириш механизмини қуриб қиқамиз. Қалла экин қалаларидаги қора қуя замбуругининг спора қопчалари ёрилиб, спора уруг юзасига тушади. Лекин бу касалланиш жараёни ҳисобланмайди. Тупроққа эқилган угур униш жараёнида тупроқдаги қора қуя замбуруги спораси ҳам униб ҳосил қилган мицелий усимлик усимтаси ичига кириб у билан бирга ривожлана бошлайди. Бу жараёнга касалланиш дейилади. Усимликнинг касалланиши учун турли экологик шароит зарурдир. Қупчилик зумбуруглар 100% намликда ривожланса, вирус касалликларини қузгатувчилари учун 30 – 60 % намлик микдори етарли ҳисобланади.

Касалликнинг қелиб қиқишда касалликни тезлаштирувчи ёки қегароловчи факторлар ҳам муҳим роль ўйнайди. Масалан, айрим усимликлар хужайрасидан биологик актив моддалар ёки антибиотиклар ишлаб қиқилиши мумкин. Шунингдек усимликнинг нави, ёши ҳам касаллик микдорига таъсир қурсатади. Ёруглик замбуруглар тарқалишига таъсир қурсатмаса, бактерияга салбий таъсир қурсатади. Қислороднинг мавжудлиги барча микроорганизмлар учун зарур ҳисобланади. Қислород микдори етарли бўлган шароитда улар тез ривожланади.

Касаллик қузгатувчисининг усимликка кириб келиши. Қупчилик патоген микроорганизмлар усимликлардаги табиий йулар – устицалар, қечевичқалар орқали кириб қелади. Масалан, мевали усимликларнинг сохта ун шудринг замбуруги, қарамнинг бактериози касаллигини қузгатувчилари асосан

устицалар оркали кириб келади. Факультатив паразитлар усимликнинг механик зарарланган жойлардан кириб келади.

Патогенлик механизмининг келиб чиқишида – купчилик микроорганизмлар ҳосил қилган ферментлар, токсинлар биологик актив моддалар ҳам муҳим роль уйнайди. Ферментлардан – целлюлоза, пектиназа, ксиланза патоген микроорганизмларнинг усимлик хужайрасига кириб келишида ва усимлик қолдиқларини тупрокда парчалашда асосий восита ҳисобланади.

Фитоксинлар хужайрани ҳалок бўлишига сабаб бўлади ва касалликнинг ички, ташқи белгиларининг ҳосил қилади. Касаллик кузгатувчиларнинг усимликда яшаш жойига қараб ташқи паразитлар, ички паразитларга бўлинади. Масалан, гузанинг вилт касаллигини кузгатувчиси усимлик поясидаги туқималарда, мевали усимликларнинг ун шудринг, галла экинларининг занг қолдиқлари усимлик баргининг устида ҳаёт кечирилади.

Касаллик кузгатувчисининг инкубацион даври – купгина усимликларда касаллик кузгатувчиси уни касаллантирилгандан кейин маълум даврдан бошлаб белгилари намоён қилади. Инкубацион давр деб – касаллик кузгатувчисининг усимликка кириб келгандан бошлаб дастлабки белгиларни ҳосил қилган даврача ўтган муддатга айтилади. Инкубация даври бир ҳафта, ойлаб, баъзан ундан қўш муддатда бўлиши мумкин. Инкубация даврининг узун – қисқалиги патогеннинг агрессивлик даражасига, усимликнинг чидамлилигига хусусиятига боғлиқдир.

Юқумли касалликларни намоён бўлиши уни келтириб чиқарувчи патогенга боғлиқдир. Натижада усимликда ўзига ҳос ташқи ва ички белгилар қўшга ташланади.

Сулиш касаллиги – усимлик илдизидаги, поясидаги патоген микроорганизмнинг хужайра деворини парчалаб, ўтказувчи пайларни тўсиб қўйиши натижаларида қўтарилиш оқимидаги сув микдори баргга қўланаётган сув микдоридан қамайиб қетади. Патогеннинг таъсирида қўда некроз ҳосил бўлса, токсинлар таъсирида баргга қизғиш доғларни ҳосил қилади.

Доғланиш касаллиги баргга, мевада ҳосил бўлади. Масалан, бодиринг баргининг бурчакли доғланиши, олманинг қўнгир доғланиши, нокнинг оқ доғланиши, қўлупнайнинг оқ ва қўнгир доғланиши.

Пуфакланиш касаллиги барг ва меваларда қўринади. Масалан, ун шудринг касаллиги шафтоли, олмада, қўл тўшиш ўзумда ва қарамда қўзатилади. Пуфакларни ҳосил бўлишида қамбўруг мицелийси ва ҳосил қилган қўралар йиғиндисидан асосий рол уйнайди.

Қўриш меваларда, қўлиз экинлари ва қамбўвот экинларида қўзатилади. У юмшққ ва қаттиқ, қўрук ва қўл қўриш бўлиши мумкин. Қўл қўришга қисол қилиб, хужайра қўсти қарчаланиши натижасида унинг қўтоплазмасидан ҳам қарчаланиб қетади. Масалан, қартошқанинг бактериал қўриши.

Қўрук қўришга қартошқанинг фўзариоз қўриши, ёғқларнинг туртовиклар таъсирида қўриш қисол бўлади.

Шакл ўзгариш натижасида қамбалланган усимлик қисмидан гадир – бўдир бўлиб, барглар ипсимон шаклга қиради, гулларнинг, меваларнинг шакли ўзгариб қетади.

Ёстикчалар хосил булиши занг замбуруги спораларининг ёйгилишидан узига хос буртиклар хосил булади. Буртиклар эпидермиснинг тагида хосил булиб унинг ичида куп микдорда хамбуруг спораси жойлашади.

Касалланган тукималарнинг халок булиши – галла экинларининг каттик ва чанг кора куя касаллиги билан касалланишидан намоён булади.

Мевалардаги яралар (ковун, тарвуз, ловия, узумда) антрокноз касаллиги туфайли хосил булади.

Хлороз – касаллик кузгатувчисининг салбий таъсири натижасида баргдаги хлоропластлар микдорининг камайиб кетиши натижасида барг зарарланиб саргайиб қолади. Бунда касаллик вируслар ёки микоплазмалар воситасида, баъзан темир, марганец етишмаслигидан келиб чиқади. Бундай белгиларни аниқлашда уларнинг топувутини билиш муҳим аҳамиятга эга.

Хар қандай инфекцион касалликнинг инкубацион даври касаллик белгиларининг намоён булиши билан тугалланади. Касалликни намоён булиши чириш, догланиш, сулиш, бужмайиш, пукакланиш холида намоён булади. Касалликни намоён булиши замбуругнинг спора хосил қилиш билан тугалланиб, усимликда ташки ва ички белгиларни хосил қилади. Масалан, гузадаги вилт касаллиги туфайли усимликнинг махсулдорлиги пасайиб, ҳатто айрим қисмларини халок булишига олиб келади.

Купчилик усимликларни касалликларнинг манбайи тупрок, усимлик қолдиқлари ҳисобланади. Айрим касалликлар уруглар, қучатлар воситасида тарқалади: алтернариоз, бактериоз қарам қучатлари, фитифтора, кора сон картошка туганаги орқали тарқалади. Купчилик замбуруглар тупрокда бир неча йилдан, 10 йилгача сақланиши мумкин.

Бирламчи инфекция касалликларнинг дастлаб пайдо булишига, мавсумда айрим усимликларда янгидан хосил булишига олиб келади. Олма паршаси аскоспорасини қолган баргларда хосил қилади ва бошқаларига тарқалади.

Иккиламчи инфекциянинг намоён булиши занг замбуруги мисолида қуйидагичадир. Бирламчи инфекция телейспораларда хосил бўлган базидиоспоралар воситасида зарарлайди. Иккиламчи инфекция – эцидия ва уредоспораларда хосил бўлган спора воситасида амалга ошади.

Усимликларнинг касаллиқлари маълум ҳудудда, айрим муддатларда тарқалади. Касаллик ареали деб – касалликнинг табиий тарқалиш чегарасида айтилади.

Бундай касалликларнинг келиб чиқиши экологик шароит билан узвий боғлиқдир. Улар микдорнинг куплиги ёки озлиги усимлик учун узига хос салбий таъсир қурсата бошлайди.

Озик моддаларнинг етишмаслигидан келиб чиқадиган касалликлар мевали дарахтларнинг темир етишмаслигидан хлороз, азот етишмаслигидан ушибдан қолиш, барглари майдалашиб, оч яшил рангга кириб, пояснинг нимжон булиб, тезда синиб кетишига сабаб булади.

Фосфор етишмаслигидан мевали дарахтларнинг генератив қуртқалари етилмаганлигидан мева шохлари хосил бўлмаёди, барг томири қизғиш рангга қиради, барглар қичрайтириб қолади, ранги бронза рангида булади.

Картошканинг туганагида зангга ухшаш доғлар ҳосил бўлса, дуккакдошларда уруглар тулик пишиб етишмайди.

Калий етишмаса барг пластинкаси кирралари саргайиб, кейин жигар рангга киради. Барг юзасида саргиш доғлар ҳосил бўлади. мевали усимликларда ҳосил бўлган куртаклари кичрайиб қолади. Узумда барглар кунгир рангга кириб, куриб қолишига олиб келади.

Магний етишмаса пастки ярусидagi усимлик барглари­нинг барг томири орка томони саргаяди. Кейинчалик улар тушиб кетади.

Кальций етишмаса усимлик илдизи усмай унинг учи ривожланмай қолади. Ер устида барглар шакли майдалашиб, юзасида саргиш доғлар пайдо бўлади.

Рух этишмаса усимлик у­сиш нуктаси у­сишдан қолади. Барглари ингичкалашиб, буралиб кетади. Бундай касаллик олма, нок, карам, кунгабокарда яққол сезилади. Лавлагининг узаги чикиб кетади. Мис етишмаса, барг сул­иёди, поя усмайди, уруг ҳосил қилмайди.

Иқлим ва тупрокдаги ноқулай шароитдан келиб чиқадиган касалликлар. Республика­миз шароитида ҳаво ҳарорати ва тупрокдаги намлик ун­гдаги усимликларга турлича таъсир қурсатади. Тупрокда намликнинг кам бўлиши, ҳароратининг юқори бўлиши галла экинларига салбий таъсир қурсатади. Озиқ моддаларнинг усимликка кам кириб келиши ҳосил миқдорини пасайишига, уругларнинг нимжон бўлишига олиб келади. Уругларнинг сут пишиши даврида намлик миқдорининг қуп бўлиши усимликлардаги ферментат жараёнга салбий таъсир қурсатади. Натижада крахмал урнига канд моддаси ту­планиб уруг қусти ёрилиб кетади. Ер ости сувлари ер юзасига яқин жойлашса илдиз системаси мевали дарахтлар илдиз системасини куриб қолишига сабаб бўлади.

Тупрокда намликнинг камайиб кетиши қсимлик у­сишини чегаралаб қуяди. Помидорда поя қириши касаллигини қелтириб қикаради. Намликнинг қескин узғариб туриши мева ва дарахт пояларининг ёрилиб кетишига сабаб бўлади.

Экологик шароитининг ёмонлашиши туфайли турли усимликларда узи­га ҳос қасалликлар салбий таъсир қурсатувчи моддалар миқдорининг қуплиги натижасида таъсир қурсатади. Масалан, Орол денгизи атрофидаги Na ва Cl тузларининг қупайиши. М.Турсунзода шаҳридаги Аллюминий заводининг Сариосиё районидаги усимлик ва ҳайвонларга таъсири, Охангарон районидаги цемент заводининг атроф муҳитга таъсири, Моржонбулок, Зарафшон шаҳарларидаги сульфит қислотасининг усимликларга салбий таъсири.

Назорат саволлари:

1. Юқумли қасалликларни қузғатувчи микроорганизмлар биологик ҳусусиятларига қура қандай турларга бўлинади?
2. Патологик жароён деб нимага айтилади?
3. Қасаллик қузғатувчиларнинг усимликка кириб келиши ва инкубация даври нима?
4. Юқумли қасалликларнинг белгилари қандай?
5. Қасалликнинг намоён бўлиш босқичларни қурсатиб беринг?
6. Юқумсиз қасалликлар деб қандай қасалликларга айтилади?

7. Микроэлементлар етишмаслигидан усимликларда қандай касалликлар келиб чиқади?
8. Макроэлементлар етишмаслигидан усимликларда қандай касалликлар келиб чиқади?
9. Хаво ҳарорати ва тупроқдаги ноқулай экологик шароитдан қандай касалликлар келиб чиқади?

3 – Мавзу: Галла донли экинларнинг касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари.

Режа:

1. Галла экинларининг қора қуя касаллиги ва унинг зарари.
2. Галла экинларининг қаттиқ қора қуя касаллиги белгилари, касаллик кузгатувчиси ва унинг зарари.
3. Маккажухорининг пуфакли қора қуя касаллиги ва унинг зарари.
4. Қора қуя касалликларига қарши кураш чоралари.
5. Галла экинларининг занг касаллиги ва унга қарши кураш чоралари.
6. Галла экинларининг илдиз чиқиш касаллиги.
7. Галла экинларнинг фузариоз касаллиги.
8. Занг касалини тарқатувчи замбуриғни ривожланиши стадияларини санаб беринг.
9. Занг замбуриғини 2 та ривожланиш стадияси қайси усимликда утади.
10. Галла экинларида занг замбуриғини қайси стадияси текинхурлик қилади.

Адабиётлар: 1, 2, 3, 7, 9, 11.

Таянч иборалар:

Базидиомицетлар	-	Махсус орган (базидия) ёрдамида жинсий қулаювчи мицелийнинг куп хужайрали юкори замбуруғлар синфи.
Базидиоспора	-	Базидия устида ҳосил булган спора
Базидия	-	Базидиомицетлар синфига оид замбуруғларнинг одатда 4 та бир хужайрали спора (базидиаспора) ҳосил қилувчи жинсий қулайиш органи
Бактерия	-	Қупинча бир хужайралар-қобиғига эга, аммо типик ядроси хлорофилли ва палстидлари булмаган, булиниб қулаювчи микроорганизм.
Склероций	-	Замбуруғ гифалари жуда зич жойлашиб ҳосил қиладиган танача, - замбуруғ узок вақт сақланиши учун хизмат қилади. Микросклероций-улчами кичик склероций.

Республикамізда галла мустакиллігини таъминлаш мақсадида ҳар йили 5 миллион тонна галла етиштириш режалаштирилган. Шу мақсадда ҳар йили урта ҳисобда 1 миллион 340 минг га. ерга бугдой экилиб мул ҳосил олиш чора тадбирлари қурилмоқда. Галла экарининг ҳосилдорлигини камайтиришда, маҳсулот сифатини ёмонлаштиришда уларда учрайдиган касалликлар асосий урин эгаллайди.

Галла экинларида учрайдиган касалликлар қаторига қуйидагиларни киритиш мумкин.

- *Кора қуя касаллиги*
- *Занг касаллиги*
- *Илдиз чириш касаллиги*
- *Фузариоз касаллиги*
- *Гельментоспориоз касаллиги*
- *Ун шудринг касаллиги*
- *Шолининг пирикулярноз касаллиги.*

Галла экинларининг кора қуя касаллиги. Касаллик асосан донли усимликнинг бошогини, қисман поя ва барғни зарарлайди. Касаллик белгиларининг намоён бўлишига қура 2 хилга бўлинади.

- *Каттик кора қуя*
- *Чанг кора қуя*

Каттик кора қуя касаллигидан зарарланган доннинг ички қисми замбурғ спорали билан тулган бўлса у очилиб кетмайди. Бундай донлар ҳосилни йиғиштириш ёки янчиш давридагина парчалаб споралар таркала бошлайди. Чанг кора қуя касаллиги эса спораларнинг вегетация даврида сочилиб туриши билан характерланади. Касаллик қузғатувчиси: Базиомицентлар синфи – Basidiomycetes кора қуялар тартиби Ustilaginales киради.

Каттик кора қуя касаллиги белгилари усимликда дон етилиш даврида намоён бўлади. касалланган бошқлар шакли кичиклиги, донлар шаклининг нотекислиги, қузинчок шаклда бўлиши билан характерланади. Тош (каттик) кора қуя касаллигини икки турга мансуб замбурғ келтириб чиқади. *Tilletia caries* ва *Tilletia levis* турлари спораларнинг шакли билан фарқ қилади.

Биринчи тур республиканинг шимолий районларида, иккинчиси жанубий районларда кенг тарқалган. Тош кора қуя замбурғи ривожланиш даврида 2 та босқичда бўлади: Хломидоспора босқичи; Базидияли босқич.

Дон ичида тупланган споралар хламидоспора деб юритилади. Хламидоспоралар упуг устида, тупрокда, меҳнат қуролларида сақланади. Қулай шароитда хламидоспоралардан бузидиоспоралар ҳосил бўлиб унинг воситасида уруг қуртақдан ҳосил бўлган пояни зарарлайди. Зарарланган поя бўйлаб замбурғ мицелийси бошққа қадар усиб боради. Бошқда гул банди орқали тугунчага келиб у ерда қуп микдорда хламидоспоралар ҳосил қила бошлайди. Касалликнинг тарқалиши учун тупрок шароити ва уруг сифати асосий роль уйнайди. Тупрокда ҳарорат 8 – 9 °C бўлган шароитда усимлик замбурғ билан тез зарарланади.

Чанг кора куя касаллиги – асосан бугдойнинг бошогини зарарлайди. Касалланган усимликнинг бошоги барг култигидан чикишидан олдин зарарланиб, бугдой кипиги ривожланишдан орқада қолади. Гулнинг тугунча қисми чанг ҳосил қиладиган донга айланади.

Касаллик кузгатувчиси *Ustilago tritici*. Бу замбуруг факат бугдойга мослашган паразит бўлиб, усимликни гуллаш даврида касаллантиради. Ҳосил бўлган споралар шамол воситасида тарқалиб соғлом усимлик гул тугунчасига кириб қелади. Бундай донлар нормал ривожланиб эндосперм, қақопча ҳосил қиладди. Ундай уруғлар келгуси йилда экилганда спорадан ҳосил бўлган мицелий поя бўйлаб кутарилиб қўп микдорда спора ҳосил қиладди. Шундай қилиб касаллик иккита вегетация даврида намоён бўлади. Биринчи йил уруғнинг зарарланиши ҳосил бўлса, иккинчи йил у спора (чангни) ҳосил қиладди.

Касалликнинг тарқалишида юқори намлик ва ҳарорат (18 – 24 °С) усимликнинг гуллаш даврида юзага қилиши кенг имконият беради. Уруғнинг униш давридаги паст ҳарорат, майсанинг униш давридан бошқоқ ҳосил қилгунча бўлган даврда қўргончилик ҳам унинг кенг тарқалишига сабаб бўлади.

Маққажухорининг пуфакли кора қўя касаллиги. Бу касаллик маққажухорининг ер усти аъзоларини – поясини, сутасини, майсасини зарарлайди. Касалликнинг асосий белгиси зарарланган аъзоларда пуфакчалар ҳосил қиладди. Дастлаб бу пуфакчалар қўнгир – оқш ёки бинафша рангда бўлиб, устки томонидан бпқа парда билан қўпланган бўлади. Пуфакча этилганч у кора рангга қиради. Бу касаллик тўпроққа уруғ экилган қўндан бошлаб то уруғ пишиб этилган қўнга қадар давом этади. Майса вақтида усимликнинг илдиз бугизи ёки илдизи зарарланади. Кейинчалик барги ва пояси зарарланади. Баргда касаллик барг томири орасида ҳосил бўлади. пояда пуфакчалар шакли йирик, думалоқ, бугин атрофида ҳосил бўлади. Сутада эса айрим донлар зарарланади. Касаллик кузгатувчиси *Ustilago zeaе* замбуругидир. Замбуруг мицелийси усимликнинг туқималарида пуфакчалар ҳосил қиладди. Пуфакчалар ёрилиб унда этилган споралар тўпроққа тушади ва базидийларни ҳосил қиладди. Базидийлар қўртақланиб қўп микдордаги қонидийларни ҳосил қиладди. Бу қонидийлар шамол воситасида тарқалиб соғлом усимликларни зарарлайди. Пуфакли кора қўя касаллиги ҳавода нисбий намлик микдори қамайган вақтларда кенг тарқалади.

Касалликка қарши қўрашнинг асосий мақсади уруғ фонддини зарарламасдан сақлаш ва устиришини таъминлашдан иборат. Айника элита навларини ва биринчи репродукцияларни уруғини тоза сақлаш қерак.

Қарши қўраш қоралари: Уруғ учун экинзорларни апробация қилиш, уруғни зарарсизлантириш, агротехник тадбирларни қўллаш, дезинфекция қилиш, қидамли навларни экиш.

Занг касаллиги. Занг касаллиги барча галла экинларининг ер усти органларини зарарлайди. Касаллик усимлик органларида занг рангидаги ёстикча шаклида қўзга ташланади. Касаллик кузгатувчиси базиомицетлар синфи *Uredinales* тарқиб вақилларидир. Касаллик кузгатувчилари иккита

хужайинли паразит булиб дуланада эцидия боскичини, маданий усимлик – бугдойда телейтоспорани хосил килади.

Занг касаллигининг таркалишида метеорологик шароит асосий роль уйнайди. Усимликнинг зарарланиши вегетациянинг турли даврларида руй беради. Касалланган усимлик усишдан оркада колади, дон ва бошогининг сонини камаяди. Занг касаллиги касаллик кузгатувчининг турига караб куйидаги турларга булинади: чизикли занг – *Puccinia graminis*, *P.graminis* f. *Secalis*, *P.g.f. avenae*; кунгир занг – *Puccinia triticea*; сарик занг – *Puccinia striiformis*.

Карши кураш чоралари: агротехник тадбирларни уз вактида утказиш; оралик хужайин экинларини (зирк ва кораканд) уз вактида йук килиш, уругларни кулай муддатда экиш, уругларга экишдан олдин микроэлементлар билан ишлов бериш, фосфорли ва калийли – угитларни куллаш, хосилни эрта йигиштириш, чидамли навларни экиш.

Илдиз чириш касаллиги. Бу касаллик галла экинларининг илдизи ва илдиз бугзида кунгир доғларни хосил килишдан бошланади. Касаллик майса униш даврида илдиз бугзида жигар рангда намоён булади. Бундай усимлик куриб колади. Катта усимликларда биринчи бугинчага булган жойлар жигар рангда куринади. Касал усимлик усишдан оркада колади ёки бошок хосил килмайди. Касалланган донлар нимжон, униш кобилияти паст булади. касаллик кузгатувчиси – *Hilminthosporium sativum*, *Fusarium culmorum* замбуруглари хисобланади. Касаллик таркалишига нам тупрок ва хаво таъсир курсатади. (20 – 25%). Бундай шароитда усимлик усишдан оркада колиб, озик моддалар алмашиши бузилади.

Касалликка карши кураш чоралари: алмашлаб экишга амал килиш (маккажухори, кунгабокар силос учун, дуккакдилар куп йиллик утлар билан экиш), уругга экишдан олдин ишлов бериш, микроэлементлар билан ишлов бериш (100 г. микроэлемент - 100 кг. донга), фосфорли, калийли угитларни куллаш, уругни тупрокка эрта экиш, хосилни уз вактида йигиштириб олиш, уругни тезда куриштиш, тупрокни чукур хайдаш.

Фузариоз касаллиги. Республикамиз шароитида галла экинларида энг куп учрайдиган касалликлар каторидан урин олади. Касаллик туфайли галла экинларининг уругининг унувчанлиги, масайларнинг куриб колиши, бугдойнинг сулиши ва илдиз чириши кузатилади. Касаллик таркалган хужаликларда хосил микдори ва сифати кескин камайиб кетади. Касаллик гуза урнида экилган галлазорларда куп учрайди. Касалликнинг келиб чиқишда *Fusarium* замбуругининг бир неча турлари катнашади. Бу касаллик маккажухорининг сутасида, илдизида ва поясида хам намоён булади. касалланган усимликнинг илдизи бинафша ранг хосил булиб, унинг устида окиш мицелий коплами куринади. Касаллик кузгатувчиси *F. moniliforme*.

Карши кураш чоралари: уругни экишдан олдин навларга ажратиш, уругни фунгицидлар билан доритлаш, экинларни уз вактида йигиштириш, уругни саклаш шароитини яхшилаш, чидамли навларни экиш.

Назорат саволлари:

1. галла экинларининг кора куя касаллигини белгилари, касаллик кузгатувчисининг биологиясини айтиб беринг.
2. Галла экинларининг кора куя касаллигини келиб чиқиши, тарқалиши ва иктисодий зарари қандай?
3. Кора куя қассалигига қарши қураш қораларини моҳияти нима?
4. Галла экинларининг занг қассалигига қарши қураш қораларини қурсатинг.
5. Галла экинларнинг илдиз қириш қассаллигини қузгатувчисини белгиларини, зарарини ва қурш қораларини айтинг?
6. Галла экинларининг фузариоз қассаллигини қузгатувчисини, белгиларни, қарши қураш қораларини айтинг.

4 – Маъзу: Гуза қассаллиқлари ва уларга қарши қураш қоралари.

Режа:

1. Гузанинг вилт қассаллиги ва унга қарши қураш қоралари.
2. Гузанинг илдиз қириш қассаллиги.
3. Гузанинг гоммоз қассаллиги ва унга қарши қураш қоралари.
4. Вилт қасали қандай юқади.
5. Вилт қасали билан гуза қачон қасалланади.
6. Вилт қасали билан қасалланган гузани қандай қиламиз.
7. Вилт қасали ичкими ёқи ташқи қасаллик.
8. Вилт қасали билан оғриган пахта неча фоиз пахта йуқолади.

Адабиётлар: 1, 3, 7, 9, 11.

Таянч иборалар:

Биопрепарат	-	Микроорганизмлар ёқи улар фаолияти натижасида ҳосил бўлган маҳсулотлардан тайёрланган, зарарли ҳашаротлар (қамрок ҳолларда қасаллиқлар ва бегона ут) ларга қарши қурашда қулланиладиган препаратлар (биоинсектицид, биофунгицид ва биогербицидлар: микробиологик препарат).
Битоксибацилин	-	Бактериал инсектицидли препарат <i>Bacillus thuringiensis</i> бактерияси биринчи серотипи асосида яратилган. Споралардан, эндотоксин ва экзотоксин кристалларидан ташкил топган. Қурук парожок ҳолида ишлаб қикарилиб, 1 грамида 45 млрд спора, экзотоксин миқдорида 0,6-0,8 фоиз, сакланиш муддати 1 йил. Препарат одамга, умурткали ҳайвонларга, фойдали умурткасизларга қам захарли, ипақ қурти учун

		хавфли. Картошка ва помидорда колородо кунгизининг 1-2 ёшларидаги личинкаларига карам туплами, кусак курти ва барг кемирувчи бог зараркунандаларининг 1-2 ёшдаги куртларига карши курашда ишлатилади. Зараркунанда турларига караб препарат гекторига 2-4 кг сарфланади. Кусак курти ва ургимчакканага карши бир йула ишлатилса, препарат нормаси 4-6 кг булиши керак.
Аскоспора	-	Халтача ичида ривожланадиган спора .
Аскокорп	-	Халтача (аск) хосил килувчи юкори замбуруглар синфига оид замбуругларнинг жинсий йул билан ривожланадиган мева таначаси.
Вирулентлик	-	Микроорганизмларнинг усимликларда ва жониворларда касаллик кузгатиш кобилияти. Вирулент (ёки вирулентлиги баланд) микроорганизмкасаллик кузгатиш кобилияти баланд, кузли паразит, овирулент микроорганизм – касаллик кузгата олмайдиган микроорганизм.
Гифалар	-	Замбуругларнинг вегетатив фазаси (мицеллей) ни ёки мева таначаларини хосил килувчи бир ёки куп хужайрали микроскопик иплар.

Гуза усимлигида замбуруглар, бактериялар ва гуллик паразитлар касалликлар келтириб чиқади. Бу касалликлар кучат сонини самайтиради, хосил микдори ва сифатини ёмонлаштиради.

ёмонлаштиради. Гузанинг юкумли касалликларига – вилт, гоммоз, илдиз чириш, кора илдиз чириш касалликларини, кусак ва тола касалликларига – кунгир чириш, кизгиш чириш, альтернариоз, мукариоз, кора шира касалликларини, юкумсиз касалликлар хлороз, кузги сулиш, гаримсел, барг кизариши, барг шакл узгариши каби касалликларни киритиш мумкин. Гузанинг карантин касалликларига барг бужмайиши, Техас илдиз чириши, антрокноз киритилади.

Гузанинг сулиш ёки вилт касаллиги. Касаллик кузгатувчисининг турига караб сулиш касаллиги вертициллийоз ва фузариоз вилтига бўлинади. Касалликнинг ташки белгилари усимликнинг гунча ёки гуллаш фазасида намоён бўлади. Дастлаб пастки ярусдаги баргларда куп бурчакли ёки доирасимой, оч-яшил, кейин саргиш доғлар пайдо бўлади. Белгилар барг киррасидан барг томири ораллигида ёки бутун барг юзасида хосил бўлади. Зарарланган барг кунгир рангга кириб, курий бошлайди ва тушиб кетади. Касаллик кучли булганда бутун усимлик баргсиз қолади. Бундай усимликларда кусаклар тулик етилмайди., курийди ва очилиб кетади. Баъзан тушиб кетган барглар урнида янги барг хосил булиб, мева туплашни сустлаштиради. Касалликнинг ички белгиларини касалланган усимлик поясини кундаланг кесилганда, унинг ёгочлик кисми корайиб некроз хосил килганда куриш мумкин.

Вертициллийоз вилт касаллигини кузгатувчиси Таккомиллатмаган замбуруглар синфи, Nuythomycetales тартиби, Verticillium dahliae турига мансуб замбуруг келтириб чиқаради.

Замбуруг мицелийси рангсиз, конидиялар тармокланган конидия бандларида хосил бўлади. Тупрокда хосил килган микросклероцийлар ва

хламидоспоралар ҳосил қилади. Замбуруғнинг ривожланишига зарур бўлган минимал ҳарорат 5-7 С, оптимал ҳарорат 23-26 С, максимал ҳарорат 31-32 С ни ташкил қилади. Тупроқдаги намлик миқдори 60-70 % бўлганда замбуруғ тез ривожланади. *V. dahlia* замбуруғи 38 оилага мансуб бўлган 700 ортик утсимон, дарахт усимликларни касаллантиради. Республика шароитида *V. dahlia* замбуруғининг 2 та расаси мавжуд бўлиб, 1-расаси гузанинг 108-Ф ва Тошкент навларини, 2 – расаси эса барча чидамли навларни касаллантиради. Вертициллийоз вилт касаллиги пахтачилик учун зарарли касаллик ҳисобланиб, унинг таъсирида 22-70 % ҳосил нобуд бўлади.

Фузариоз вилти – Такомиллашмаган замбуруғлар синфи, *Fusarium turkumii*, *F. oxysporum* f. *vasinfectum* замбуруғи келтириб чиқаради.

Касаллик ингичка толали гузанинг кучатлар пайдо бўлган давридан бошланиб, бутун вегетация давомида кузатилади. Касаллик белгиси кучатларнинг баргларида сарғиш доғлар пайдо бўлиб, барг томири турга ухшаб қуринади. Дастлаб касалланган усимликларнинг бугин оралари қисқариб, илдиз бугизи йугонлашади, учки барглари зарарланмай сакланиб қолади. Гунча ҳосил қилиш даврида касалланган усимликларнинг барги – гунчаси, гули тушиб кетади, пояси нозик бўлиб қолади. Қусак ҳосил қилиш даврида касалланган усимликлар пояси қуриб қолсада, қусаклар тулик пишиб етилмаганлигидан очилмай қолади. Касалликнинг ички белгилари поянинг қорайиши – некроз ҳосил қилиш билан характерланади. Замбуруғ тупроқда ярим сапрофит ҳаёт кечирсада, усимликка илдиз орқали кириб уни зарарлайди.

Гузанинг илдиз чириш касаллиги. Республика шароитида гузанинг оддий, қора ва склероциал илдиз чириш касалликлари учрайди. Касаллик чигит унган даврдан бошлаб 6-8 та хакикий барг ҳосил қилганча давом этади. Касалликнинг дастлабки белгилари кучатларнинг илдиз бугизида тук жигар рангдаги доғ ҳосил бўлишдан бошланиб, кейинчалик чириydi. Касалланган усимликнинг илдизи қорайиб, чириб кетади. Бундай усимлик барги рангсизланиб, қуриб қолади ва тушиб кетади, пояси жигар рангга қиради. Илдиз бугизида поянинг йугонлашиши ёки поянинг буралиб кетиши кузатилади.

Касаллик кузгатувчиси тупроқдаги турли микроорганизмлар бўлиб улар орасида энг кенг тарқалганлари қаторига *Rhizoctinia solani*, *Thielavopsis basicola*, *Sclerotium bataticola*, замбуруғлари асосий рол уйнайди. Бу замбуруғлар мицелийси тупроқдан усимлик илдиз бугизи орқали илдизга кириб келади. Инфекция манбайи асосан тупроқда ва касалланган усимлик қолдиқларида ҳаёт кечириётган замбуруғлар ҳисобланади.

Қарши қураш чоралари: агротехник тадбирларга амал қилиш, аъло сифатли дориланган уруғларни экиш, ятана ва қатқолокка қарши қурашни уз вақтида утказиш, алмашлаб экишга амал қилиш ва гуза поя қолдиқларини илдизи билан даладан чиқариб ташлаш.

Гоммоз касаллиги. Касаллик усимликнинг барча ер усти аъзоларини, барг, ёнбаргчалар, поя, гул, қусак ва толасини касаллантиради. Касалликнинг асосий белгиси, усимликнинг зарарланган органларида ёғсимон томчиларнинг ҳосил бўлишдан бошланади. Баргда дастлаб бурчакли доғлар пайдо бўлади. Барг юзаси шакли узғариб, барг бандида қунгир доғларни ҳосил қилади.

Касалликнинг энг хавфли шакли поя гоммози ҳисобланиб, зарарланган жойдаги поя ва новдалар ингичкалашиб, жигар рангга қиради ва сарғиш суюқлик оқиб чиққан жойида қотиб қолади. Поянинг юқори қисмидаги новдалар зарарланганда усимлик устидан орқада қолади, гунча ва мева ҳосил қилмайди. Усимлик вегетациянинг кейинги босқичларда зарарланса гүлқосабарг, қусак ва толани ҳам касаллантиради. Касалланган қусаклар ривожланмайди, толалар бир бирига ёпишиб, чириб кетади. Касалликни келтириб чиқарадиган бактериялар уруғ қустида сакланади. Касалланган новда ва пояда тук яшил рангдаги доғлар пайдо бўлиб, уни ингичкалаштиради, буралиб устига сабаб бўлади.

Касаллик кузгатувчиси – *Xanthomonas campestris malvacearum* бактерияси бўлиб минимал ҳарорат 10, оптимал ҳарорат 25-28 С да нормал ривожланади. Касалликнинг тарқалиши учун усимлик органлари устида ҳосил бўлган ёғсимон моддадаги тупланган бактерияларнинг сўв ва шамол воситасида ва ҳашоратлар ёрдамида амалга ошади.

Инфекция манбаи тупрокдаги касалланган усимлик колдиклари ва улардап тайёрланган уруг хисобланади. Гоммоз касаллиги туфайли усимлик тола узунлиги 8-25 % га, пишиглиги 1, 5-2% га, узиловчанлиги 8-20 % га пасаяди.

Карши кураш чоралари: азотли ва калийли угитлар усимликнинг касалликка чидамлилигини оширади, гуза далаларига бедани алмашлаб экишда фойдаланиш касалликни камайтиради, уругни соглом усимликлардан тайёрлаш, уругни экишдан олдин фунгицидлар билан ишлов бериш (фентуран 10 кг 1 т), тупрокни чукур хайдаш, гузани колдикларини йиштириб олиб даладан чикариб ташлаш, далага кишда яхоб сувини бериш керак.

Назорат саволлари:

1. Гузанинг кандай юкумли ва юкумсиз касаллари мавжуд?
2. Вертициллийоз вилт касаллигининг келиб чиқиши, белгилари ва уларга қарши кураш чоралари.
3. Фузариоз вилт касаллигининг келиб чиқиши, белгилари ва уларга қарши кураш чоралари.
4. Илдиз чириш касаллигининг белгилари, касаллик кузгатувчиси ва уларга қарши кураш чоралари.
5. Гоммоз касаллигининг белгилари, касаллик кузгатувчиси ва уларга қарши кураш чоралари?

5– Мавзу: Беда усимлиги касалликлари.

Режа:

1. Беданинг ун шудринг касалликлари.
2. Беданинг занг касалликлари.
3. Беданинг қунгир доғланиш касаллиги.
4. Беданинг фузариоз касаллиги.
5. Беданинг вирус касалликлари.
6. Беданинг гуллик паразитлари
7. Ун шудринг касали кандай юқади.
8. Занг касалини зарари неча % бўлади.
9. Занг касали билан огриган бедани сифати кандай бўлади
10. зарпечак босиб кетса бедани кандай чора курилади.

Адабиётлар: 2, 3, 7, 11.

Таянч иборалар:

Спора	-	Замбуруглар (одатда вегетатив) купайиш учун хосил буладиган махсус микроскопик хужайра ёки танага ушиб ва ривожланиб, етилган замбуругга айтилади.
Эпифитотия	-	Усимлик касаллигининг битта хужалик, туман, вилоят ёки мамлакатда кенг тарқалиши.
Перетеций	-	Аскомицетлар синфига мансуб баъзи юкори замбуругларнинг усимлик туқималари ичида ривожланадиган, одатда куза, нок ёки бутилка шаклли, жинсий купайишига хизмат қилувчи мева таначаси (псевдотеций билан солиштиринг).
Зооспоро	-	Баъзи тубон замбуругларнинг жинсиз купайиши учун хизмат қиладиган, хивчинчаси ёрдамида сувда ҳаракатланадиган махсус хужайра (спора).
Зооспоронгий	-	Баъзи тубон замбуругларнинг ичида зооспоралар хосил буладиган жинсиз купайиш

органи.

Инокулюм - Касаллик кузгатувчи микроорганизмнинг экинларни зарарлаш ва янги экинларга таркатиш учун хизмат килувчи махсус хужайра ва таначалари (спора, конидия склероций, микросклероций ва х.з.)

Беданинг ун шудринг касаллиги. Касаллик усимликнинг барча ер усти органларида, баргида, поясида, дуккагида ок ёки окиш кунгир рангдаги могорни хосил килади ва уларни касаллантиради. Касаллик кузгатувчиси *Leveillula taurica* f *medicaginis* ва *Erysiphe communis* f *medicaginis* замбуруглари хисобланади.

Республикамиз шароитида беда усимлигининг касалланишида иккинчи турдаги замбуруг асосий рол уйнайди. Усимликнинг касалланган аъзоларида замбуруг аскоспоралари кора рангдаги нукталар шаклида пайдо булиб, ундан мицелий ривожланади. Замбуруг усимлик колдикларида аскоспоралар шаклида кишлайди. Касалланган барг остида ок рангдаги губор пайдо булиб, унинг остки гамонида замбуруг клейстотецийси хосил булади. Клейстотецийларда аскоспоралар етилади.

Касалликни таркалишига куп ёруглик ва юкори харорат сабаб булади. Касалланган усимлик биомассаси кескин камайиб, гул ва барглари тушиб кетади.

Карши кураш чоралари: усимлик колдинларини уз вактида йигиштириб олиш, урурглик бедаларни касаллик намоён булгандан кейин 7 - 10 кун утгач фунгицидлар билан ишлов бериш зарур. Бунинг учун охак олтингугуртнинг 1500 - 2000 л. эритмаси 1 га. ерга ишлов бериш учун фойдаланилади, касалликка чидамли навларни экиш, ем хашак учун экилган беда ва уруглик беда орасидаги масофани 1, 5 – 2 км масофада жойлапгариш максадга мувофикдир.

Беданинг занг касаллиги. Бу касаллик беданинг барча ер уста аъзоларини зарарлайди. Касаллик зарарланган жойда кунгир рангдаги ёстикча шаклида хосил булади. Касалланган усимликнинг барглари тушиб кетади, пояси тезда синади. Касаллик кузгатувчиси *Uromyces striatus* замбуруги булиб, у 2 та хужайин усимликда хаёт кечиради. Ривожланишнинг биринчи боскичида замбуруг эцидиялари сутламада, уредо ва телейтоспораси бедада ривожланади. Касалланган сутлама усимлиги усишдан оркада колади, барглар гадир – будир булади. Споралардан хосил булган замбуруг мицелийси сутламанинг илдизига кириб келиб кишлайди, эрта бахорда ундан эцидийлар хосил булган эцидиоспоралар касалликни бедага таркалиш манбайи килади. Касалланган беда усимлиги аъзоларида дастлаб кунгир рангдаги уредоспоралар ёстикчаларини, кейинчалик кора рангдаги телейтоспоралар ёстикчаларини хосил килади.

Иссикиклик шароитида занг касаллиги вегетациянинг бошида намоён булади. Касаллик бедазорларга сув берилганда айникса тез ривожланади.

Занг касалликлари кузгатувчилари беда усимлигининг колдикларида телейтоспоралар холида кишлайди. Эрта бахорда улардан хосил булган базидиоспоралар сутлама усимлигини зарарлайди. Замбуругнинг хаётий жараёнини куйидагича ифодалаш мумкин. Бахорда эцидиялар - сутламада хосил булса – уредоспоралар бедада хосил булади. Кузда телейтоспоралар усимлик колдикларида кишлаб, бахорда базидиоспораларни хосил килади.

Карши кураш чоралари: касалланган усимлик колдикларини уз вактида йигиштириб олиш, сутлама усимлигини бедазорлардаги даладан йигиштириб олиш, ёввойи бедани дала атрофида таркалишига йул куймаслик, бедани кенг саторлаб экиш, фосфорли - калийли угитларни куллаш, касалланган бедани силос учун эрта йигиштириш, олтингугурт охак эритмасини ёки олтингугуртни кукунини 30-40 кг. микдорда 1 га ерга сепиш чидамли навларни экиш.

Беданинг кунгир догланиш касаллиги. Касаллик усимлик баргини, поясини, дуккагини зарарлайди. Касаллик пастки ярусдаги баргларда пайдо булиб, кейинчалик юкори ярусдаги баргларга таркалади. Барг орка томонида

кунгир – сарик доғлар пайдо булиб, барг юза кисмида саргиш кунгир рангда куринади. Зараланган баргларда замбуругнинг мева танаси хосил булади. Бундай барглар тезда тушиб кетади.

Касаллик кузгатувчиси *Pseudoperiza medicaginis* замбуруги хисобланади. Касалланган баргларда аскоспоралар хосил килиш боскични, мева таналарда эса бир хужайрали споралар хосил килади.

Касаллик апрел ойларида кузга ташланади ва июл ойларида кенг таркалади. Инфекция манбайи касалланган усимлик колдигидан иборат булиб, у уругга ҳам тушиши мумкин. Касаллик баҳор фаслида ёгингарчилик куп булганда кучли зарар етказади.

Карши кураш чоралари: уругни уз вактида саралаш инфекция манбаларини экинзорлардан йук. килиб ташлаш, бедани галла экинлари билан аралаштириб кенг каторлаб экиш, уругни кулай муддатларда тупрокка экиш, касалликка чидамли булган навлардан Полтовская 256, Зайкевич навлардан экиш, уруглик ва хашаки беда орсидаги масофани 1, 5 – 2 км. дан уёкда жойлаштириш.

Беданинг гуллик паразитлари. Беда усимлигида дала зарпечаги, беда зарпечаги, Хитой зарпечаги, Европа зарпечаклари учрайди. Уларнинг пояси ипсимон булиб, сарик ёки пушти рангида булади, барги булмайди, гули майда, ок пушти, уруги майда булади. Пояси ва уруги билан купаяди. Сургичлари воситасида поядан озик моддаларни суриб, уни куритади. Уруги хайвонлар овкат хазм системасида ҳам парчаланмайди ва уруги воситасида кенг таркалади. Республикамиз шароитида зарпечакнинг 2 та турлари: *Cuscuta epithymum* ва *Cuscuta arvensis* куп учрайди.

Зарпечак тушган усимликлар усишдан оркада колиб, пояси чириб кетади. Уруги гунгда ва тупрокда, усимлик колдигида кишлайди.

Карши кураш чоралари: зарпечакнинг таркалишини олдини олиш учун усимлик 15-20 см булганда, гуллашдан олдин ва уруг хосил килишдан олдин текшириб чикилади, экинзорни, унинг теvarак атрофини зарпечакдан тозалаш, оловли култиватор билан ишлов бериш, зарарланган уругларни бошка районларга таркатмаслик лозим. Зарпечакка карши 20% амиакли силитра ёки 4 % ли нитрофен билан ишлов бериш керак (75 кг эритма 1 га ерга фойдаланилади).

Беданинг вирус касалликлари. Беда усимлигида вируслар куйидаги касалликларни келтириб чикаради.

Беданинг мозаика касалликлари, Беда поясининг буралиши, Карликовост ёки пакана буйилик касалликлари.

Мозаика касаллиги. Вируслар келтириб чикарган касалликлар бедада куйидаги шаклда учрайди: губорлик; баргда узгариш килмайдиган, баргнинг буралиши.

Касаллик белгиларига эга булган усимликлар усишдан оркада колади, барглари майда булади. Касаллик асосан усимлик бити, дала бургалари каби хашоратлар ва зарпечаклар воситасида таркалади.

Касалликка карши кураш чоралари: агротехник тадбирларга амал килиш, ширага уз вактида карши курашиш, зарпечак бор далаларни оловли култиваторда ишлов бериш керак.

Беданинг фузариоз касаллиги. Бу касаллиги такомиллашмаган замбуруглар синфи вакили *Fusarium* туркумига мансуб 10 га, якин турдаги замбуруглар томонидан келтириб чикаради. Беданинг фузариоз касаллиги илдиз чириш ва сулиш шаклида иамоён булади.

Илдиз чириш касаллиги беда илдизнинг ёгочлик тукималарини зарлаш иатижасида корамтир жигар рангга киритиб, флорманинг чириши билан намоён булади. Касалланган усимлик тупрокдан жуذا осон сугирилиб олинади. Касаллик кузгатувчилари тупрокда хаёт кечириб, биринчи йили усимликка кириб келади, иккинчи ва учинчи йилда уни нобуд килади. Бездорларда агротехник тадбирлар уз вактида утказилмаганда усимликлар куп зарарланади. Инфекция манбайи касалланган усимлик колдиклари ва тупрокдаги инфекция ва улардан тайёрланган уруглар хисобланади.

Фузариоз сулиш касаллиги бедами бутун вегетация даврида касаллантиради. Усимлик гуллаш ва гунча хосил килиш вактида барги, новдалари сулиб колади. Касаллик кузгатувчиси *F. oxysporum* тури хисобланиб, замбуруг мицелийси тупрокдан илдиз ериклари оркали поянинг ёгочлик

кисмига кириб келади. Натижада сув найлари тусилиб, сув ва унда эриган моддалар ҳаракати секинлашади. Сув баланси бузилгач ўсимлик сулиганга ухшаб қуринади. Касаллик хаво ҳарорати 27-30 С бўлганда, намлик камайганда эркин намаён бўлади.

Қарши қураш чоралари: уруғларни яхшилаб тозалаш, уларга фунгицидлар ва микроэлементлар билан ишлов бериш, тупрокка органик, фосфорли, калийли угитлардан зарур фурсатларда мейёрида фойдаланиш, беда уругини эрта баҳорда уртача чуқурликда галла экинлари билан бирга тупрокка экиш, алмашлаб экишга амал қилиш ва чидамли навларни экиш лозим.

Назорат саволлари:

1. Беданинг ўн шудринг касаллиги ва унга қарши қураш чоралари қандай?
2. Беданинг занг касаллиги ва унга қарши қураш чоралари қандай?
3. Беданинг фузариоз касаллиги ва унга қарши қураш чоралари қандай?
4. Беданинг аскохитоз касаллиги ва унга қарши қураш чоралари қандай?
5. Беданинг вирус касаллиги ва унга қарши қураш чораларини айтинг?
6. Бедада учрайдиган гулли паразитлар ва уларга қарши қураш чоралари қандай?

6 – Мавзу: Помидор касалликлари ва уларга қарши қураш чоралари.

Режа:

1. Помидорнинг фитофториоз касаллиги ва унга қарши қураш чоралари.
2. Помидорнинг макроспориоз касаллиги ва унга қарши қураш чоралари.
3. Помидор баргини ок доғланиш касаллиги ва унга қарши қураш чоралари.
4. Помидор баргининг кунгир доғланиш касаллиги ва унга қарши қураш чоралари.
5. Помидорнинг вируслар келтириб чиқарадиган касалликлар ва унга қарши қураш чоралари.
6. Помидорнинг илдиз чириш касаллиги ва унга қарши қураш чоралари.
7. Фитофториоз касаллигининг белгилари.
8. Савол. Помидорни вирус касалини белгилари.
9. Помидорни кунгир доғланиш касалини белгилари.
10. Макроспориоз замбуриги қандай қупаяди.

Адабиётлар: 3, 4, 5, 6, 7, 11.

Таянч иборалар:

Фунгицид - Касаллик чакирувчи замбуруғлар билан қурашда қулланиладиган махсус захарли кимёвий дори.

Республикаимиз шароитида тоmatдошлар оила вакилларида помидор, картошка, болгар калампири, баклажон каби ўсимликлар етиштирилади. Бу ўсимликларни етиштиришда агротехник тадбирлар ўтказиш муддатларига қараб ойнабанд иссик хоналарда ва очик жойларда амалга оширилади. Иссик хоналарда уларни етиштириш жараёнида намлик микдори 65-70 %, ҳарорат 22-26 С, ўсимликнинг гуллаш даврида ҳарорат 24-28 С бўлиши зарур. Тупрок ҳарорати 19-21 С ни ташкил қилиши керак.

Бу ўсимликларни очик жойларда етиштирилганда фитофториоз, септариоз, макроспориоз, қора бактериал доғланиш каби касалликлар билан касалланади.

Епик ойнабанд иссик хоналарда баргининг кунгир доғланиши, фитофториоз, мозаика ва учки чириш касалликлари билан касалланади.

Фитофториоз ёки меванинг кунгир чириши касаллиги Peronosporales тартиби, Оомицетлар синфига мансуб Phutophora замбуруғи келтириб чиқаради.

Касалликнинг таркалиши учун кулай шароит ёз ойларининг иккинчи ярмидан бошланади. Хаво ҳарорати кундузги 22 С, кечаси 10-12 С бўлганда замбуруғ споралари тез таркалади.

Касаллик баргда, пояда ва мевада намоён бўлади. Баргнинг киррасида кунгир рангдаги доғлар пайдо бўлиб, унинг орқа томонида оқиш рангдаги замбуруғ споралари етилади. Барг бандида, пояда кунгир доғ пайдо бўлади. Мевада турли даврларда кунгир доғлар унинг чиришига сабаб бўлади. Нам шароитда доғлардаги замбуруғ спораси ривожланиб мевани зарарлайди.

Касалликнинг бирламчи инфекция манбаи картошка экилган далалардаги касалланган усимликдан тупрокда тушган инфекция ҳисобланади. Иккиламчи инфекция манбаи эса касалланган усимликдаги замбуруғ спораси ҳисобланади. Устицадан ташқарига чиққан замбуруғ зооспоралари кулай шароитда ўсиб ривожланади. Иссиқ хоналарда касаллик картошка экин далаларидан таркалади.

Қарши кураш чоралари: помидор экиладиган далаларни картошка далаларидан ўзоклаштириш, калийли ўғитларни 150 кг гача қўллаш, экинлар чидамлилигини оширади, усимликни бордо суюқлиги (600 л/1 га), мис хлорид билан ишлов бериш, ҳосилни эрта йиғиштириш, чидамли навларни экиш, экин далаларидаги усимлик колдикларни ўз вақтида йиғиштириб олиш зарур.

Макроспориоз касаллиги. Макроспориоз касаллиги усимлик баргини, поясини ва мевасини зарарлайди. Касаллик қўзғатувчиси – *Hyphomycetales* тартиби такомиллашмаган замбуруғлар синфи вакили *Macrosporium solani* ҳисобланади. Касаллик қўзғатувчиси конидия ҳосили қилиб қўпаяди. Касаллик белгиси баргда қўруқ, думалок доғлар ҳосил бўлади. Касаллик барг бандини, мева бандини, поя ва мевани касаллантиради. Касалланган мевада думалок, кунгир доғлар пайдо бўлади. Усимлик турли даврларда касалланади. Замбуруғ асосан конидиялар ҳосил қилиб қўпаяди. Замбуруғ усимлик колдикларида ва тупрок юзасида ҳаёт кечирилади.

Қарши кураш чоралари: тупрокни чуқур хайдаш, усимлик колдикларини экин даласидан ташқарига чиқариб ташлаш, усимликка мис хлорид билан ишлов бериш (3-4 марта), чидамли навлар экиш, алмашлаб экишга амал қилиш (2-3 йил давомида бир далага помидорни қайта экмаслик), помидор уругини экишдан олдин фунгицидлар билан ишлов бериш.

Баргларнинг оқ доғланиш касаллиги - спиториоз. Касаллак қўзғатувчиси: такомиллашмаган замбуруғлар синфи, *Sphaeropsidales* тартиби вакили, *Septoria lycopersici* тури ҳисобланади.

Касаллик асосан очик далаларда ривожланади, баъзан иссиқ хоналарда ҳам бошланади. Касаллик асосан баргда, барг банди, поя ва меваларда намоён бўлади.

Касалликнинг ташки белгиси барг атрофида қорамтир нуқталар билан ўралган оқиш рангдаги доғлар ҳосил бўлишидан бошланади. Доғларнинг ўртасида кейинчалик замбуруғ пектинидиялари ҳосил бўлади. Ҳосил бўлган споралар рангсиз, ипсимон, қисман эгилган бўлади. Касаллик кенг тарқалганда доғлар тўпланиб кетиб бутун барг юзини ўраб олади. Касалланган барглар кунгир рангга кириб, қуриб қолади ва тушиб кетади.

Касаллик қўзғатувчиларнинг инфекция манбаи: усимлик колдигида кишлаб чиққан замбуруғ споралари бўлиб, қайта зарарлаш пекнидоспоралар воситасида амалга ошади. Касаллик 70-94% намлик ва 15-27 С тез ривожланади. Касалликка қарши кураш чоралари: усимлик колдикларини йиғиштириб олиш, тупрокни чуқур хайдаш, алмашлаб экишга риоя қилиш, фунгицидлар билан ишлов бериш (1 % борда суюқлиги, 80 % ли цинаб эритмаси билан 10-15 кунда ишлов бериш), чидамли навларни экиш.

Баргнинг кунгир доғланиши - Кладоспориоз. Касаллик қўзғатувчиси: такомиллашмаган замбуруғлар синфи *Hyphomycetales* тартиби вакили, *Cladosporium fulvum* тури ҳисобланади.

Кладоспориоз касаллиги белгилари усимликнинг баргда ва гуллаш даврининг дастлабки босқичида, гулда ҳамда меваларда ҳосил бўлади. Баргнинг ўстки томонида ҳар хил шаклдаги ва ўлчамдаги доғлар пайдо бўлади. Баргнинг орқа томонида эса яшил кунгир рангдаги доғлар ўстида замбуруғ мицелийсида ҳосил бўлган замбуруғ конидиялари воситасида тарқалади. Касалланган барглар сарғайиб қуриб кетади. Гул ва мевалар касалланганда ҳам ўлар кунгир ранга кириб, қурийди ва ҳалок бўлади. Касаллик иссиқ хоналарда 90-95 % намликда

ва 22 - 25 С хароратда тез купаяди, тупрокда 60-65 % намликда касаллик камаяди.

Инфекция асосан конидия шаклида усимлик колдикларида сакланиб қолади.

Касалликка қарши қураш чоралари: усимлик колдикларини ўз вақтида йиғиштириб ташлаш, вегетация даврида иссик хоналар намлигини 60-70 % саклаш, усимликни беномил (0,1 %), каптан (0,5 %) фунгицидлар билан ишлов бериш, касалликка чидамли навларни етиштириш.

Помидор усимлигидаги вирус ва микоплазма касалликлари каторига мозаика, стрик ва столбур кабилар киради. Мозаика касаллигини вируслар келтириб чиқаради.

Улар очик экин далаларида ва иссик хоналарда куп учрайди. Касаллик кузгатувчиси - ВТМ – Nicotiana virus бўлиб, касаллик белгиси асосан барг пластинкасида яшил рангли оч яшил ва сарғиш яшил билан алмашиши асосида намоён бўлади. ВТМ вирусининг айримлари меваларда узига хос некроз ҳосил қилади. Мева тубидан бошланган касаллик уруғ тусиклари бўйлаб барча паренхималарни касаллантиради. Касалликни келиб чиқишида баъзан картошканинг Х ва У вируси ва бодринг мозаикаси ҳам қатнашади. Бундай ҳолларда баргда, пояда ва мевада кизғиш қунгир рангдаги доғлар пайдо бўлади. Касалланган барглар нимжон бўлиб, кейинчалик қуриб қолади. Касалланган мевалар эса қунгир доғлар уни шаклини ўзгаришига олиб қелади ёки улар ёрилиб кетади. Касаллик усимлик ширасини ҳашоратлар шимганда улар воситасида тарқалади. Касалликнинг инфекция манбаи усимлик колдиклари ва касалланган уруғ ҳисобланади.

Қарши қураш чоралари: соғлом усимликдан уруғ тайёрлаш ва уруғга 1 % ли КМgО эритмаси (20 мин) ва 50-52 С буг билан ишлов бериш, иссик хона ва экин далаларини усимлик колдикларидан тозалаш ва 5% КМgО, 10% КРО эритмаси билан тупрокни порлаш, қучатларни дастлаб вакцинация қилиш зарур; агротехник тадбирлар: қучатларни ўз вақтида экиш, сўғориш, азотли ва фосфорли ўғитларни нормада қўллаш, теплицада нормал харорат, намлик, ёруғликни саклаш.

Илдиз чириш касаллиги. Касаллик кузгатувчиси Rhizoctonia solani ва Pythium ва Fusarium замбурўглари ҳисобланади. Касаллик асосан помидор қучатларини зарарлайди. Касаллик қучатларининг илдиз бугизини чириши шаклида намоён бўлади. Илдиз бугизи дастлаб оқ рангдаги замбурўг мицелийси билан қопланади. Зарарланган қисм юзасида ҳосил бўлган мицелийдаги конидиялар воситасида касаллик кузгатувчилари тупрокда тарқалади.

Илдиз чириш касаллиги очик далаларида куп учрайди. Зарарланган илдизлар қўстлоқ паренхимаси, флёма туқималари чириб илдизнинг қуриб қолишига сабаб бўлади. Касалланган усимлик ўсишдан орқада қолади, пастки яруслардаги барглар юзаси сарғайиб поянинг ер юзасига яқин қисмида қўшимча илдизларни қилади.

Қарши қураш чоралари: иссик хоналарда қучатларни пикировка қилишда уларнинг илдизини 3 % дезорал, фундазол фунгицидлари эритмасида 1 соат давомида саклаб кейин тупрокда экиш, тупрокдаги усимлик колдикларини ўз вақтида йиғиштириб олиш, тупрокда органик ўғитларни қўллаш керак.

Назорат саволлари:

1. Томатдошлар оиласи вакиллариининг фитотториоз касаллигининг кузгатувчисининг, биологиясини, зарари ва қарши қураш чораларини айтинг.
2. Помидорнинг оқ доғланиш касаллиги кузгатувчисини, белгиларини, тарқалиши, зарари ва қарши қураш чораларини айтинг.
3. Помидорнинг вирус касаллиги ва унга қарши қураш чоралари қандай?
4. Помидорнинг қунгир доғланиш касаллиги ва унга қарши қураш чоралари қандай?
5. Помидорнинг илдиз чириш касаллиги ва унга қарши қураш чоралари қандай?
6. Помидорнинг макроспориоз касаллиги ва унга қарши қураш чоралари?

7 – Мавзу: Картошка касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари.

Режа:

1. Картошканинг фитофториоз касаллиги ва унга қарши кураш чоралари.
2. Картошка раки ва унга қарши кураш чоралари.
3. Картошканинг ризоктониоз касаллиги ва унга қарши кураш чоралари.
4. Картошканинг фузариоз касаллиги ва унга қарши кураш чоралари.
5. Картошканинг бактериал касалликлари ва унга қарши кураш чоралари.
6. Картошканинг вирус касалликлари ва унга қарши кураш чоралари.
7. Картошканинг фузариоз касаллигини иктисодий зарари қандай?
8. Картошкада қайси вируслар паразитлик қилади?
9. Вирус касаллигини иктисодий зарари қандай?
10. Фомоз касаллиги белгилари қарши кураш чоралари?

Адабиётлар 3, 5, 7, 10.

Таянч иборалар:

Фунгистатик модда	-	Замбуругларнинг усиши ва купайишини тухтатувчи модда.
Хлороз	-	Усимлик органлари, асосан баргларида паразит микроорганизмлар билан зарарланганида ҳамда экинларга баъзи элемент (мисол учун темир, мис, калий) етишмаслигида ҳосил буладиган ок, оқиш-сарғиш ва сарик доғлар.
Экзотоксинлар	-	Айрим микроорганизм (бактерия)нинг усудаврида ташқи муҳитга ажратиб чиқарган токсин.
Касаллик кузгатувчи	-	Бошқа организм ҳисобига паразит ҳолда яшайдиган организм (мисол учун: усимликларда ва ҳашоротларда касаллик кузгатувчи микроскопик замбуруглар ва бактериялар) .
Макроконидиялар	-	Баъзи икки хил конидиялар ҳосил қилувчи юкори замбуруглар (қўпинча <i>Fusarium</i> туркуми намояндалари) нинг улчами каттарок ва қўп хўжайрали конидиялари (II макроконидия билан солиштиринг).

Картошка усимлиги усиш, ривожланиш ва туганакларни саклаш жараёнида турли замбуруг, бактериал, вирус касалликлари билан зарарланади. Замбуруг касалликларига фитофториоз, макроспориоз, парша; бактериал касалликлардан қора сон, доирасимон чириш ва мозаика касалликларини қўрсатиш мўмкин. Туганакларни оморхоналарда саклаш жараёнида фитофториоз, фузариоз, фомоз ва нам чириш касаллиги учрайди.

Картошканинг фитофториоз касаллиги. Фитофториоз касаллиги тўғайли 50% ҳосил микдори пасаяди. Касалликни Оомитетлар синфи, *Perenosporales* тартибига мансуб *Phytophthora infentans* замбуруг келтириб чиқаради.

Касаллик белгилари баргда ва тутанакда ҳосил бўлади. Касалланган барг чети бўйлаб қўнгир рангдаги доғ ҳосил бўлади. Баргнинг орқа томонида оқ

рангдаги могорга ўхшаш гўборда замбуруг зооспорангийсида зооспоралар ҳосил бўлади.

Бу касаллик туганакда кунгир чириш касаллигини келтириб чикаради. Зарарланган туганак пўстлогининг асосий қисмида унинг магзини чириган ҳолга келтиради.

Касалликнинг ривожланиши нам ҳавода, ҳаво ҳарорати 18 – 20 С. бўлганда яхши ифодаланади. Усимликка инфекциянинг кириб келиши барг ўстичалари орқали содир бўлади. Баргда ҳосил бўлган зооспоралар тупрокка тушиб, туганакни зарарлайди. Кейинчалик зарланган туганакда *Fusarium* замбуруги вакиллари кенг тарқалади. Картошка туганагининг чириган тукималар ўстини ок, сарик, бинафша рангдаги замбуруг мицелийси қоплаб олади.

Бирламчи инфекция манбайи зарарланган туганак ва усимлик қолдиқлари бўлиб у поя орқали баргга кўтарилиб боради ва соғлом усимликларни зарарлаш манбайи бўлиб хизмат қилади.

Касалликка қарши кураш чоралари: тупрокка соғлом туганакларни экиш, химиявий ишлов бериш (1 % ли бордо суюқлиги, 80 % цинеб, 90 % ли мис хлорид эритмасини 1 га ерга 500 – 600 л. микдорда ҳар 10-15 кунда сепиш), алмашлаб экишга риоя қилиш, NPK уғитларни комплексини қўллаш, микроэлементлар эритмаси билан ишлов бериш, картошкани қуруқ ҳавода йиғиштириб олиш, сақлаш режимида амал қилиш, чидамли навларни экиш.

Жанубий Америка картошқаси *Solanum demissum* маданий картошка *S. tuberosum* нави билан олимлар томонидан чатштирилиб фитопторга, совуқка чидамли, крахмалга бой навлар яратилган.

Картошка раки. Картошка рак касаллигини қўзғатувчиси Хитродо – мицетлар синфи, *Chytridiales* тартиби вакили *Synchytrium endobioticum* ҳисобланади. Касаллик асосан туганакни зарарлайди. Ундаги қуртақлар атрофида ўзига ҳос думалок усимталар пайдо бўлади. Улар картошка туганагини чиришига сабаб бўлади.

Инфекция манбайи – қуртақда қишлаган замбуруг зооспоралари ҳисобланади. Уларнинг чексиз бўлинишидан усимта ҳосил бўлади. Касалликни қўзғатувчисининг ривожланиши ва тарқалиши учун 16 – 20 С ва 70 – 80 % намлик зарурдир.

Касалликка қарши кураш чоралари: картошкани етиштириш бўйича агротехник тадбирларга амал қилиш (маккажўҳори, қарам, қакли ва галла экинларини алмашлаб экишдан фойдаланиш), чидамли навларни экиш (қўрьер, Столовой – 19, Зоурский), органик уғитларни қўллаш, тупрокка 20 – 25 % ли нитрофен билан химиявий ишлов бериш (20 л. эритма 1 м. жойга).

Ризоктониоз касаллиги. Ризоктониоз касаллигини қўзғатувчиси *Rhizoctonia solani* замбуруги бўлиб, касаллик 3 шаклда учрайди: туганакнинг қора паршаси, усимликнинг касалланиши ва поянинг ок чириши. Касаллик туганакларини, усимтани, пояни зарарлайди. Туганакда қора рангдаги доғлар пайдо бўлади. Ундан ҳосил бўлган склероцийлардан базидиоспоралар воситасида қўпаяди. Касаллик қўзғатувчиси мицелий, склероций ва базидия босқичларида ривожланади. Туганакнинг ўсишидан ҳосил бўлган столонлар ҳам қорайиб қуриб қолади. Споралар ёш туганакларни ҳам зарарлайди. Инфекция манбайи қасаланган туганак, усимлик ва бегона ўтларнинг тупрокдаги қолдиқларида ҳосил бўладиган замбуруг мицелийси ва склероцийлардир.

Қарши кураш чоралари: туганакни тупрок ҳарорати 7 С да 6 – 7 см чуқурликка экиш, тупрокда қатқалокка қарши ўз вақтида қўрашиш, 1 т туганакга 70 л фунгицид эритмаси билан ишлов бериш, алмашлаб экишга амал қилиш (галла, дукқакли экинларни 3-4 йилдан кейин экиш), бегона ўтларга қарши қўраш, чидамли навларни экиш.

Фузариоз ёки картошканинг қуруқ чириши. Бу касаллик туганакларни сақлаш даврида қўзатилади. Касалликни *Fusarium* турқумига мансуб бир неча турдаги замбуруғлар келтириб чиқаради. Касаллик ҳосил йиғилгандан кейин 2 – 3 ой муддатда сезилади. Туганак пўсти бўжмайиб, ўсти оқиб, қизғиб, кунгир рангдаги мицелий билан қопланади. Унда ҳосил бўлган қонидийлар воситасида соғлом туганаклар зарарланади. Намлик микдорини ортиши, зарорат 25 – 27 С да бўлиши замбуруғнинг тарқалишига сабаб бўлади. Инфекция манбайи тупрок заррачалари, омборхонадаги замбуруғ қолдиқлари ва тупрок инфекция манбайи ҳисобланади.

Қарши кураш чоралари: ўруғлик учун соғлом туганакларни сақлаш, уларни механик зарарланишига йўл қўймаслик, омборхоналарда ҳароратни мейёрида сақлаб билиш.

Фомоз касаллиги Такомиллашмаган замбуруглар синфининг вакили *Phoma exigua* замбуруги тамонидан келтирилиб чакарилади. Касаллик усимликнинг туганақ ва пояларни касаллантиради. Туганақда доирасимон дог хосил бўлиб бу дог борган сари чуқурлашиб кириб боради. Унинг юзасида кора рангдаги замбуруг пикнидияларида споралар хосил бўлади. Бахорга бориб бундай туганақлар чириб кетади.

Бирламчи инфекция манбайи экин далаларидаги тупрокда мавжуд бўлган замбуруг споралари хисобланади. Пояда касаллик барг бандининг хар хил доғларини хосил қилиш билан иомоён бўлади. Касалланган туқималарда замбуругнинг жигар рангдаги пикнициялар хосил бўлади. Касаллик туфайли картошканинг 25 % хосил микдори камаёди.

Қарши қураш чоралари: соғлом уруғларни экиш, алмашлаб экишга амал қилиш, усимлик қолдигини олиб ташлаш, туганақларни саклаш режимида амал қилган.

Бактериал касалликлар – Кора сон. Касаллик поя ва туганақни зарарланди. Касаллик қузғатувчиси – *Putobacterium phytophthorum* бактерияси хисобланади. Касаллик далада майса пайдо бўлгандан кейин намоён бўлади. Касал усимликнинг пояси қорайиб, қирий бошлайди. Юқоридаги барғлар оч яшил рангда бўлиб, сарғаяди ва қуриydi. Касалланган усимлик пояси тупрокдан тезда сугирилиб кетади.

Касаллик белгилари туганақда унинг қириган ҳолатида қузга ташланади. Туқималари юмшоқ, хидли, шилимшиқ бўлиб қолади. Ранги тўқ қўнгир рангда бўлади. Қириш омборхонада ҳарорат қутарилиб кетганда тез тарқалади.

Инфекция манбайи касалланган усимлик, усимлик қолдиқлари хисобланадн. Касаллик дастлаб поянинг пастки қисмини қорайтириб қиритади. Шунда усимлик гулламай ҳалок бўлади. Касаллик қамрок тарқалганда эса столонлар орқали туганаққа кириб боради. Туганақ соғлом туганақларга аралашганда уларни зарарлайди.

Касалликка қарши қураш: экиш ўчун соғлом усимликдан уруғлик туганақ олиш, туганақни саралаб қулай шароитда саклаш, агротехника (қам озот, қуя сўғориш) тадбирларига амал қилиш, касалланган туганақни ташлаб юбориш, усимликка қимёвий ишлов бериш, қидамли навлар экиш.

Вирус касалликлари. Картошқада бۇ касаллик барча ҳужайкаларда учрайди. Унинг зарари экологик шароит билан боғлиқ бўлиб, зарар даражаси усимлик нави, тупрок уруғлик сифати билан ўзғий боғлиқ.

Касалликни – вирус X – *Solanum virus1*, вируслар S, F, A, K, R келтириб чиқаради. Касалликни аниқлаш унинг ташқи белгилари бир хиллиги туфайли уни аниқлашни қийинлаштиради. Касаллик ўзғатувчисини аниқлашда электрон микроскопдан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Касалликнинг инфекция манбайи – касалланган усимликдан тайёрланган уруғлик туганақлар хисобланади. Инфекция бегона ўтларда ҳам сакланади.

Касалликни – вирус X – *Solanum virus1*, вируслар S, F, A, K, R келтириб чиқаради. Касалликни аниқлаш унинг ташқи белгилари бир хиллиги туфайли уни аниқлашни қийинлаштиради. Касаллик қузғатувчисини аниқлашда электрон микроскопдан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Касалликнинг инфекция манбайи – касалланган усимликдан тайёрланган уруғлик туганақлар хисобланади. Инфекция бегона ўтларда ҳам сакланади.

Вирус касалликлари орасида энг қўп тарқалган турлар қаторига – барғни бўқилишига сабаб бўлувчи лентасимон вирусни қиритиш мумкин. Касаллик белгиси барғ ва пояда некрозли доғларни хосил қилиш билан намоён бўлади. Некроз барғ бандида ва поясида ҳам қузатилади. Касалланган поя нимжон бўлиб, қуриб қолади ва осилиб туради. Инфекция поядан туганаққа ўтади. Касаллик ҳаво ҳарорати 25 С бўлганда ёрқин намоён бўлади. Барғнинг қуриши гуллаш фазасига қадар номоён бўлганда хосилни 50% га пасайтиради. Касаллик қузғатувчиси Y вирус бўлиб у помидор, мохорқа, болгар қалампирини касаллантиради ва улар воситасида тарқалади.

Касаллик қузғатувчисини тарқатувчиси ширалар бўлиб, усимликлар бир бири билан туташганда ҳам касалланиши мумкин. Касаллик асосан туганақда сакланади.

Назорат саволлари:

1. Картошканинг фитифторияз касаллиги қузғатувчиси, белгилари ва иқтисодий зарари қандай?

2. Картошканинг фитофториоз касаллигига карши кураш чоралари кандай?
3. Картошканинг ризокториоз касаллигига карши кураш чоралари кандай?
4. Картошканинг фузариоз касаллигини кузгатувчиси, белгилари, биологияси ва карши кураш чораларини айтинг?
5. Картошканинг бактериал касалликлари ва уларга карши кураш чоралари кандай?
6. Картошканинг вирус касалликлари ва уларга карши кураш чоралари кандай?

8 – Мавзу: Полиэкинларининг касалликлари.

Режа:

1. Полиэкинларининг ун шудринг касаллиги ва уларга карши кураш чоралари.
2. Полиэкинларининг фузариоз касаллиги ва унга карши кураш чоралари.
3. Полиэкинларининг сохта ун шудринг касалликлари ва уларга карши кураш чоралари.
4. Полиэкинларининг вирус касалликлари ва уларга карши кураш чоралари.
5. Полиэкинлари касалланганда кандай белгилар пайдо булади.
6. Ун шудринг касали ичкими ташки касаллики.
7. Касалликни юкиши кандай булади?
8. Касалликни юкишида бегона утларни роли?
9. Касалликни юкишида хашоротларни роли.
10. Касалликни олдини олишда навни роли.

Адабиётлар: 3, 4, 5, 7, 9, 11.

Таянч иборалар:

Клейстотеций	-	Халтача (акс) хосил килувчи ун-мудринг замбуругларининг жинсий йул билан ривожланадиган ёпик мева таначалари.
Микология	-	Замбуругларни урганувчи фан (ботаника фанининг булими). Микологик замбуругларга оид.
Коллония	-	Микроорганизм (микроскопик замбуруг, бактерия ва х.) ларнинг озук мухитида ушиб ривожланиши натижасида куролланмаган куз билан куринадиган тупи.
Конидиофора	-	Микроскопик замбуругларнинг оддий (шоҳланмаган) ёки шоҳланган хар хил шаклли ва улчамли, устки кисмларида конидиялар ривожланадиган микроскопик орган.

Полиэкинларидан: ковун, тарвуз, бодринг, ковок купгина юкумли касалликлар билан касалланади. Касалликнинг намоён булиши касаллик кузгатувчисининг тарлари таркибига, иклим шароитига, агротехник тадбирларни утказиш вақтига ва сифатига боглиқдир.

Полиэкинлари юкори намлик, 24 – 26 С хароратда яхши ривожланади. Уруги тупрокка экилганда харорат 17 С дан юкори

булганлиги микроорганизмларнинг ривожланиши учун кулай шароит яратилиб, уларнинг ер ости ва ер усти органлари тезда касалланишига сабаб бўлади.

Ун шудринг касаллиги. Полиз экинларида энг куп таркалган касалликлардан бири хисобланади. Касаллик кузгатувчиси: Акромицетлар синфи, *Erysiphales* тартиби, *Erysiphales cucurbitacearum* тури хисобланади.

Касаллик белгилари баргда оқиш, саргиш рангдаги замбуруг мицейлисини ривожланишидаг доғлар ҳосил бўлиши билан бошланади. Губор баргнинг юза қисмида купрок намоён бўлади. Касаллик баргдан барг бандига, пояда ва мевага утиши мумкин. Замбуруг конидиялари шамол ёрдамида таркалиб усимликларни янгида касаллантиради. Усимлик қолдиқлари тупрокда инфекциянинг сакланиши учун бирламчи инфекция манбайи бўлиб хисобланади. Замбуруг ривожланиши учун кулай ҳаво ҳарорати 16 – 20 С ни ташкил қилади.

Касаллик зарари қуруқ ва иссиқ ҳаво ҳароратида айниқса кучли бўлиб, инкубация даври 4-5 кунни ташкил қилади. Усимлик баргининг тургор ҳолати йуқолгандан касалликнинг намоён бўлиши кучайиб кетади. Иссиқ хоналарда инфекция асосан усимлик қолдиқларида, бегона ўтларда сакланиб қолади.

Қарши қураш чоралари: тупрокни чуқур хайдаш, тупрокни чуқур хайдаш, тупрокка ўз вақтида сув бериб туриш, усимликни беномил (1кг/га), 50 % ли деразол (2 кг/га), 70 % ли топсин (1 кг/га), олтингугурт қуқуни билан ишлов бериш (4 кг/ га) керак. Иссиқ хоналарда касалликни таркалишига йул қуймаслик учун уни яхшилаб тозалаш, экиш муддатини тугри аниқлаш, ҳаво ҳарорати ва тупрок, намлигини саклаш, касалланган усимликларга олтингугурт (2 кг /га), бенлайт (1 кг/га) фунгидидлари ва микро-элементлар эритмаси билан ишлов бериш керак.

Сохта ун шудринг касаллиги. Бу касаллик барча Ковокдошлар оиласи вакилларида учрайди. Касалликнинг намоён бўлиши нафакат очик шароитдаги далаларда, хатто иссиқ хоналарда ва плёнка остида экилган усимликларда ҳам кузатилади. Касаллик кузгатувчиси: Оомицетлар синфи, *Peronosporales* тартиби, *Pseudoperonospora cubensis* турига мансуб замбуруг хисобланади.

Касалликни ривожланиши учун юкори намлик ва 15-20 С ҳарорат зарур. Касалликнинг белгилари - баргининг ўтки томонида саргига - яшил рангдаги доғлар, пастки томонида эса саргиш бинафша рангдаги доғларни ҳосил қилиб, уларда зооспоралар этилади. Вегетациянинг ўрталарида саргиш доғлар бирлашиб, бутун барг юзасини қоплаб олиши мумкин. Баргдаги ассимиляция юзанинг қамайиши натижасида фотосинтез интенсивлигининг пасайиши усимликнинг ўсиши ва ривожланиши кескин сустлаштириб, ҳосилдорлигини қамайтиради.

Замбуругнинг таркалиши асосан барг орқа томонида ҳосил бўлган зооспорангидаги этилган зооспоралар воситасида амалга ошади. Касаллик кузгатувчиси ҳаво ҳарорати 18 С, намлиги 90-95%да нормал ривожланиб, инкубацион даври 3 кунда амалга ошади. Инфекциянинг сакланиши тупрокдаги зооспоралар воситасида бўлиб, усимлик қолдиқлари ҳам асосий роль ўйнайди. Тупрокда қулай шароит бўлганда зооспоралар ўсиб мицелий ҳосил қилади ва усимликнинг туқималарида ривожланади. Усимликнинг зарарланган жойидаги мицелийнинг ривожланишида зооспорангийлар ҳосил бўлиб ўндан: зооспоралар этилади.

Қарши қураш чоралари: тупрокдаги инфекция майбаига қарши қураш, иссиқ хона ҳаво ҳароратини 20-25 С да, намлигини 80% саклаш, касалланган усимликларга 1 % бордо суюқлиги билан ишлов бериш, чидамли навларни етиштириш.

Мозаика касаллиги. Мозаика – касаллигини Кововдошлар оиласи вакилларида *Cucurbita virus* келтириб чиқаради. Оддий бодиринг мозаикаси асосан очик жойдаги усимликларни касаллантириш хусусиятига эга.

Касаллик белгилари усимликлар 6-8 та барг ҳосил қилган даврдан бошлаб намоён бўлади. Касалланган барглар саргиш яшил рангда бўлиб, юзаси гадир-бүдир бўлиб қолади. усимлик ўсишидан орқада қолади, бўгинлари қискаради, меvasи қуримсиз бўлиб қолади. Вирус касаллиги билан касалланган қовунда-барг япроги жигар рангга кириб қолса, тарвўз барги мармарга ўхшайди, ёш барглари ва ўтки новдалари ҳалок бўлади. Бодиринг мозаикаси қўпгина усимликларни ва бегона ўтларни зарарлайди. Касаллик бир усимликдан иккинчи усимликка асосан ширалар воситасида тарқалади. Уруғ орқали тарқалмайди.

Карши кураш чоралари: экинзорлардаги бегона утларга ва шираларга карши кураш, касалланган усимликни бартараф қилиш, чидамли навларни экиш.

Назорат саволлар:

1. Полиэ экинларининг ун шудринг касаллигини кузгатувчисини, белгиларини, иктисодий зарарини ва уларга карши кураш чораларини айтинг.
2. Полиэ экинларининг фузариоз касаллиги кузгатувчисини, белгиларини, тарқалишини ва уларга карши кураш чораларини айтинг.
3. Полиэ экинларининг сохта ун шудринг касаллигини кузгатувчисини, белгиларини, тарқалишини ва карши кураш чораларини айтинг.
4. Полиэ экинларининг вирус касалликлари ва уларга карши кураш чораларини айтинг.

9-Мавзу: Мевали усимликларнинг касалликлари ва уларга карши кураш чоралари.

Режа:

1. Мевали усимликларнинг илдиз раки ва унга карши кураш чоралари.
2. Баргларнинг куйгир догланиши ва унга карши кураш чоралари.
3. Олма ва нокнийг парша касаллиги ва унга карши кураш чоралари.
4. Ун шудринг касаллиги ва унга карши кураш чоралари.
5. Монилиоз касаллиги ва унга карши кураш чоралари.
6. парши касали қандай йилларда жуда купаяди?
7. парши касаллигида инфекцияни биринчи манбаи нима?
8. Парши касаллигига чидамсиз навлар?
9. Касалликка чидамли навлар.
10. Қандай агротехник тадбирлар утказилади.

Адабиётлар: 2, 3, 6, 7, 9, 11.

Таянч иборалар:

Микробиологик кураш	-	Зарар кунандалар, усимликларда касаллик кузгатувчилар ва бегона утларга карши биопрепаратлар ёрдамида кураш.
Микроконидия	-	Баъзи икки хил конидиялар ҳосил қилувчи юкори замбуругларнинг улчами кичикрок ва одатда бир хужайрали конидиялари.
Микроорганизмлар	-	Курулланмаган куз билан курунмайдиган ва факат микроскопда куриш мумкин булган жуда майда организмлар: уларнинг каторига бактериялар, октиномицетлар микроскопик замбуруглар ҳамда микроскопик сув утлари ва бир хужайрали энг содда хайвонлар қиради.
Конидия	-	Замбуругларда жинсиз купайиш учун ҳосил буладиган махсус микроскопик бир ёки куп хужайрали танача
Ооспора	-	Оомицетлар гурухига мансуб тубон замбуругнинг зиготаси.

Мевали усимликлар купгина юкумли касалликлар билан касалланади. Касалликни намоён булиши экологик шароит, географик мухит, усимликларнинг касалликларга чидамлилики даражаси, усимлик ёшига боглик. Мевали усимликларнинг бир жойда узок муддат булган замбуруглар инфекциянинг тупланишига сабаб булади. Натижада бундай усимлик касалликлари билан химиявий усулда кураш олиб боришга тугри келади.

Шунинг учун асосий тадбирлар агротехник, касалликни олдини олиш, усимлик чидамлигини оширишга қаратилган бўлиши керак. Химиявий кураш чораларини куллашда унинг муддатларини ҳисобга олиш, такрорийлиги ва фунгицид микдорини ҳам назарда тутиш керак. Кучат хонадаги уругдан унган ва қайта экилган кучатларнинг касалликлари.

Питомникнинг кучат етказиладиган далаларида учрайдиган касалликларга парша, ун шудринг, илдиз раки ва вирус касалликларини киритиш мумкин.

Илдиз раки. Бу касаллик билан кучатларнинг 50-80 % гача зарарланади. Касаллик кузгатувчиси-*Agrobacterium tumefaciens* бактерияси бўлиб, у жуда куп мевали усимликларни касаллантиради.

Илдизни зарарланган қисмида ва илдиз тўқчаларидан кирган бактериялар илдиз хужайраларнинг тезда нобуд бўлишига сабаб бўлади ва куп микдордаги усмани ҳосил қилади. Касаллик тупрокда намлик кам бўлганда айникса кенг тарқалади. Касалланган усимлик тезда қуриб қолади. Касаллик кузгатувчиси тупрокда узок муддат давомида сакланиб 2-3 йилдан кейин ҳам уругдан унган кучатларни касаллантириши мумкин. Касалликнинг энг кучли қуриниши илдиз бўғизи ва ўк илдизнинг зарарланишида намоён бўлади. Касаллик тўғайли кучатларнинг сув таъминоти кескин бўзилиб, ўсиш, ривожлавишдан орқада қолади. Бундай кучатлар тупрокка ўтказилганда қуқариши жуда қийин бўлади. Илдиз раки асосан кучатлар, меҳнат қуроллари ва хашоратлар воситасида тарқалади.

Қарши кураш чоралари: кучатзорларни тупроғида бактерияси бўлмаган жойларда таш-қил қилиш, тупрокка ўз вақтида ишлов бериш, касал усимликни ва уларнинг илдиз қолдиқлар-ини йўқ қилиб ташлаш.

Баргнинг қунгир доғланиши. Касаллик мевали усимликларнинг асосан баргини ва новдаларини зарарлайди. Касалликнинг дастлабки белгилари май ойининг охири, июн ойининг бошларида баргнинг юза қисмида ва орқа тамонига қунгир рангдаги доғлар қуринишида пайдо бўлади.

Касаллик кузгатувчиси – *Entomosporium maculatum* турига мавсуб замбурўг бўлиб, такомиллашмаган замбурўглар синфига қиради. Касаллик ёш кучатларда куп учрайди. Замбурўгнинг конидия қосил қилиши зарарланган қисмларда чора рангдаги нуктачалар тарзида бўлиб, бу доғларда пекнидия спора етилади. Бундай доғлар барг бандида, пояда, мевада ҳам ҳосил бўлади. Замбурўг 0-5 °С ҳароратдан бошлаб ривожланади, 13-25 °С ҳароратда замбурўг тупрокда конидия ёки халтачаларни ҳосил қилади.

Қарши кураш чоралари: тупрокни чуқур ҳайдаш, касалланган новдаларни қиркиб ташлаш, усимликларга бордо суюқлиги билан ишлов бериш, кучатзорларни фосфорли ва калийли ўғитлар билан ўғитлаш, чидамли навларни экиш.

Олма ва нокнинг паршаси. Катта ёшли боғларда ўсаётган мевали дарахтларнинг асосий касалликларига парша, ун шудринг, меванинг чириши, цитоспориоз, баргнинг доғланиши қабилар қиради.

Парша касаллиги намлик куп бўлган йилларда, ёзнинг биринчи яримида кенг тарқалади. Касаллик зарари ҳосил микдорини камайтирибгина қолмасдан, унинг сифатини ҳам ўзгартиради. Шакли ўзгариб, ёрилиб кетади. Парша билан зарарланган гул ислари тушиб кетади. Касалланган баргларда ҳосил бўлган доғлар ассимиляция юзани камайтирганлигидан сув бўғланиши ёмонлашиб, кейинчалик тушиб кетади. Усимликларнинг совуқка чидамлилиги пасайиб кетади.

Парша касаллигини олмада халтачали замбурўглардан – *Venturia inaequalis*, нокда - *Venturia pirina* турлари келтириб чиқаради. Касаллик усимлик баргини, новдасини, мевасини, мевасини зарарлайди. Касаллик дастлаб яхши фойдаланмаган сарғишлар тарикасида намоён бўлади. Олма баргининг ўстида, нок баргининг остида замбурўг спора ҳосил қилиши қўзғатилади. Доғлар микдори, унинг ҳажми, усимлик навиға, иқлим шароитига боғлиқ бўлиб, шакли думалок, қора рангдаги авик хошиядор бўлади. Доғ ҳосил бўлган жойдан мева ёрилиб кетади. Новдада ҳосил бўлган шок, шаклдаги мева – танада кейинчалик споралар ҳосил бўлади.

Касалликнинг бирламчи инфекция манбаи касалланган барг ва новдалар ҳисобланади. Кишда уларда ҳосил бўлган халтачаларда споралар етилади. Псевдотецитлар етилиши баҳорни охири, ёзнинг бошиға тўғри келади. Аскоспоралар ёмғирдан кейин очилиб қўлаб спорани тарқатади.

Бирламчи зарарланган баргларда ҳосил бўлган мицелий эпидермис остида ривожланиб, конидий ҳосил қилади ва усимикларни иккиламчи зарарлайди.

Олма навларнинг Ренет, Симиренко, Кольвил, Белфир, Китанка навлари кучли касалланади.

Карши кураш чоралари: тупрокдаги ва усимлик колдикларидаги инфекцияни 2-3 % ли нитрофен эритмаси билан тупрокдан йук килиб ташлаш, касалланган усимликка бордо суюклиги билан ишлов бериш, чидамли навларни экиш.

Ун шудринг касаллиги. Ун шудринг касаллиги барча мева экиладиган хужаликлардаги боғларда учрайди. Айникса экинлар зичлаган далаларда катта зарар етказади. Касаллик барг, новда, гул ва мевасини зарарлайди. Касалланган ёш барг ва новдалар, барг банди оқиш могорли доғлар билан копланади. Касалланган барглар килади рангсизлаб, кейинчалик тушиб кетади. Новдалар усишдан оркада қолади. Устки томонида хосил булган мицейлисида етилган конидиялардан унинг рангини узгартиради. Касаллик кузгатувчиси ун шудринг замбуругига мансуб булган – *Podosphaera leucotricha* тури хисобланиб, касаллик кузгатувчиси конидияли ва халтачали боскичларида ривожланади.

Замбуруг мевали усимликларнинг касалланган аъзоларида мицелий холида куртакда кишлайди. Куртакда хрсил булган клейстоцидлардан конидия хосил булади. Касаллик кучат хоналардаги усимликларни ҳам зарарлайди.

Касаллики таркалишига курук, иссик шароит кулайдир. Касалликка чидамли навлар: Шафрон, Ренет, Шампанский, Кандель, Китайка.

Карши кураш чоралари: мевазор боғларда юксак агротехника коидаларига амал килиш, уз вактида сугориш, касалланган усимликнинг куриган новдаларни йук, килиш, дарахтларга олтингугурт ва фунгицидлар билан ишлов бериш, чидамли навларни экиш.

Монилиоз касаллиги. Касаллик зарарланган жойда кунгир рангдаги доғланиш билан бошланади. Мева магзи кунгир рангга кириб, юмшок булиб қолади, мазаси йуқолади. Меванинг устида хосил булган ёстикчаларда замбуруг спораси етилади. Касаллики *Hyphomycetella* тартибига мансуб, *Monilia fructigena* замбуруги келтириб чиқаради. Касаллик занжирсимон тузилишдаги конидиялар воситасида купаяди. Касаллик кузгатувчиси мевали зарарланган жойидан кириб келади. Споранинг ривожланиши нам шароитда амалга ошади.

Инфекциянинг бирламчи манбайи касалланган мева колдиги булиб, уларда хосил булган пюралар турли йуллар билан таркалиши хисобига амалга ошади.

Карши кураш чоралари: меванинг механик зарарланмаслик чора тадбирларини куриш, касалланган меваларни йигиштириб олиб ташлаш, усимликларга 1 % ли бордо суюклиги билан ишлов бериш керак.

Назорат саволлар:

1. Мевали усимликларнинг кучатхоналарида кандай касалликлар учрайди ва уларга карши кураш чораларини айтинг.
2. Мевали усимликларнинг кунгир доғланиш касаллиги ва уларга карши кураш чоралари кандай?
3. Олманинг парша касаллиги кузгатувчиси, белгилари, иктисодий зарари ва карши кураш чораларини айтинг.
4. Мевали усимликларнинг ун шудринг касаллиги ва уларга карши кураш чораларини айтинг.
5. Мевали усимликларнинг монилиоз касаллиги ва уларга карши кураш чоралари кандай?

10 – Мавзу: Ток ва тут касалликлари ва уларга карши кураш чоралари.

Режа:

1. Токнинг ун шудринг касаллиги ва унга карши кураш чоралари.
2. Токнинг антракноз касаллиги ва унга карши кураш чоралари.
3. Токнинг сохта ун шудринг касаллиги ва унга карши кураш чоралари.
4. Токнинг ок чириш касаллиги ва унга карши кураш чоралари.
5. Токнинг церкоспориоз касаллиги ва унга карши кураш чоралари.
6. Тутнинг юкумли ва юкумсиз касалликларининг турлари.
7. Тутнинг бактериал касалликлари ва уларга карши кураш чоралари.
8. Тутнинг цилиндропориоз касаллиги ва унга карши кураш чоралари.
9. Тутнинг ун – шудринг касаллиги ва унга карши кураш чоралари.
10. Тутнинг вил касаллиги ва унга карши кураш чоралари.

Адабиётлар: 2, 3, 6, 7, 9, 11.

Таянч иборалар:

Мицелий	-	Замбуругларнинг жуда микроскопик узун иплари (гифлар) дан иборат вегетатив танаси; ривожланган пайтда оддий кузга куринадиган холга келади (мисол учун, барг устидаги ун-мудринг катламлари, хар хил могорлар, тоза мухитдаги колониялари ва х.з.)
Оогоний	-	Оомицетлар синфига мансуб тубон замбуругларининг ичида бир ёки бир нечта тухум хужайраси ривожланадиган, одатда бир хужайрали ургочи жинсий органи.
Оомицетлар	-	Жинсий купайиш оогомия типиди ва жинссиз купайиш зооспоралар ёрдамида амалга ошириладиган тубон замбуруглар гурухи.
Осмофил замбуруг	-	Нисбий номлиги паст булган мухитда ҳам яшай оладиган замбуруг.
Пестицид	-	Усимликларни ёки хайвонларни зарарли организмлардан химоя килувчи кимёвий ёки биологик модда; уз ичига инсектицид, акарицид, фунгицид, гербицид ва х.з.

Ток усимлиги купигча касалликларга берилувчан булиб улар орасида: оидум ёки ун шудринг, актракиоз, церкоспориоз, кора чириш, бактериал рак ва хлороз касалликлари куп учрайди.

Ун – шудринг оидум. Касаллик кузгатувчиси – *Uncinula necator*, *Erysphales* таркиби, конидияли фазаси – *Oidium tuckeri* деб номланади. Оидиум Марказий Осиё Республикаларидаги ток усимлиги поясини, мавасини, баргини зарарлайди. Касаланган усимлик кисмлари ок, кул-кнгир ранг билан копланиб, мицелий ва конидиялар билан уралган булади.

Касалликни дастлабки белгилари еш новдаларда хосил булади. Замбуруг мицелийси асосан барг ва куртак орасида хосил булади. улар касалликнинг келажакда таркалишига манбайи булиб хисобланади. Новдада мицелийнинг хосил булиши эрта бахордан гуллашгача еки гуллагандан кейин булади. Кейинчалик касаллик мевани, новдани ва баргни зарарлайди. Касаллик эрта номаён мева усишдан тухтатилади, куриб колсада, тушиб кетмайди. Касаллик кеч намоён булганда касаланган мева ёрилиб, уруги очилиб колади. Кузда нам купайиб кетса мева чирий бошлайди. Новдаларда окиш унсимон губор хосил килади, губор остида жигар рангдаги корамтир дог хосил булади. Бундай новдалар ёмон ёгочлашади, тезда совук уради, келгуси йили ёмон хосил беради. Баргнинг хар икки томонида окиш губор хосил булиб, кейинчалик у кунгир рангга киради, касалликка ок мускат, Танфи навлари берилувчандир. Касаллик 70% намликда тез ривожланади, касаллик кузгатувчисининг мицейлиси 11 –12 С да усишни бошлайди, 18 – 25 С да эса тез ривожланади.

Касалликнинг инфекция манбайи – касалланган новда ва куртак пустида жойлашадиган мицелий хисобланади.

Карши кураш чоралари: куртаклар очилгунча эрта бахорда охак – олтингугурт эритмаси билан ишлов бериш, фунгицидлар билан 3 – 4 марта ишлов бериш (3-4 та барг хосил килгунча, гуллангандан кейин, ёш мева хосил булганда). Олтингугурт кукини билан 20 –25 кг га микдорда, коллоид олтингугурт билан 9 –12 кг. га микдорда, Топсин – М билан 1 – 1,5 кг. га, Бенлайт билан 1,5 кг. га микдорда ишлов бериш керак; агротехник тадбирларни уз вактида утказиш, бегона утларга карши кураш, хотмок, новда боглаш, соглом усимликлардан кучат тайёрлаш ва чидамли навларни етиштириш зарур.

Церкоспориоз касаллиги. Касаллик кузгатувчиси – *Cercospora vutis* ёки *Cercospora Rosleri* замбуруги булиб, касаллик асосан баргни, новдани, мева банди ва мевани зарарлайди.

Касалликнинг белгиси – баргни орка томонида яшил – бинафша рангдаги думалок нукталар хосил булади. Касалланган мева банди куриб колади ва меваси тукилиб кетади. Узум меваси кук рангда курийди. Касаллик кузгатувчиси конидиялар шаклида куриб колган баргларда сакланади.

Ок чирши касаллиги. Касаллик кузгатувчиси Такомиллашган замбуруг синфи вакили – *Coniothyrium diplodiella* замбуруги булиб конидияли ва склероциали боскичларда ривожланади. Конидиялар пекнидияларда хосил булиб, улар мевада ривожланади. Курук хавода мевада склероциялар хосил килади. Усимликни баргини, поясини, новдасини зарарлайди. Меванинг механик зарарланишидан касаллик келиб чиқади. унда дастлаб сарик, кейин кук – кунгир доглар пайдо булади. Мева пустида куп микдорда пикнидиялар хосил булиб уларда хосил булган пинидияспоралар соглом мевани зарарлайди. Касаллик кузгатувчиси тупрокда кишлайди.

Карши кураш чоралари: Токзорлар тупрогини чукур хайдаш, усимликка бардо суклиги билан (3-4%) ишлов бериш, новдани боглаш, хомток килиш ва киркиш ишларини уз вактида утказиш, чидамли навларни етиштириш.

Антрокноз касаллиги. Бу касаллик ток усимликнинг барча ер усти аъзоларини, айникса новдасини кучли зарарлайди. Касалланган новларнинг паренхима тукималари кучли зарарланиб, ёгочнинг утказувчи найлари соглом булади. Касалланган новдалар кунгир дог хосил килиб, чукур яраларга айланади. Новдалар корайиб ривожланмайди, буралиб айрим жойларида коварик юза хосил булади. усимлик барги тук жигар рангдаги учбурчак доглар тукималарни халок килиб, тушиб кетишига сабаб булади. Барг банди ва томирида хам яралар хосил булади. Туп гуллар ва мевалар зарарланганда улар тезда тушиб кетади.

Касаллик кузгатувчиси *Sphaceloma ampelinum* замбуруги булиб, Такомиллашмаган замбуруглар синфига киради. Касаллик кузгатувчиси вегитация даври давомида конидиялар хосил килиб купаяди. Конидиялар зарарланган жойда кунгир рангдаги ёстикчаларда хосил булиб, вегитация охирида склероцийларга айланади. Эрта бахорда улардан янги конидиялар хосил булади.

Антракноз касаллиги иссиқ нам ҳавода тез ривожланади. Масалан: 24 – 30 С да ёмғир ёққан даврларда касаллик кузгатувчисининг инкубация даври 3-4 кунни ташкил қилади. Республикамиз шароитида антракноз касаллиги вегетациянинг биринчи яримида, айниқса гуллаш даврида катта зарар етказади.

Қарши қураш чоралари: қаламча тайёрлашда соғлом усимликлардан фойдаланиш, агротехник тадбирлардан: хомтоқ қилиш, шакл бериш, усимликнинг аэрация ҳолатини ҳисобга олиб утқизиш мақсадга мувофиқ, касаллик белгисига эга навдаларни йиғиштириб олиб, ёқиб ташлаш керак.

Қимёвий қураш чораларидан 3% ли мис хлорид, 0,4% ли цинаб, 50% ли эритувчан олтингугурт эритмасидан фойдаланиб 2 – 3 марта ишлов берилади. Қасалликка Сапериави, Рислинг навлари чидамли ҳисобланади.

Сохта ун шудринг касаллиги. Қасаллик кузгатувчиси Фикомицетлар синфи вакили *Plasmopara viticola* замбуруги булиб, паразит қуйидаги босқичда ривожланади: қонидиялар ва жинсий (ооспора).

Қонидия ҳосил қилиш усимликнинг зарарланган қисмида оқ рангдаги могор ҳосил қилишдан бошланади. Могор тармоқланган қонидия бандидан иборат булиб, бир хужайрали, овалсимон, рангсиз қонидияларни вегетация давомида ҳосил қилади. Кузга бориб усимликнинг зарарланган қисмларида қишлоғчи ооспоралар ҳосил қилади. Баҳор фаслида ооспоралар ушиб макроқонидияларни ҳосил қилади. Улар ушиб зооспорага айланади. Зооспоралар сув томчиси билан барғ юзига тушиб, ёстикчалар орқали усимликни зарарлайди.

Қасаллик белгилари: усимликнинг барча ер усти аъзоларини баргини, новдани, гунчани, гул ва мевасини зарарлайди. Зарарланган барғ юзасида дастлаб бурчакли думалок доғ ҳосил қилади. Нам ҳавода барғни орқа томонида оқ могор ҳосил булади. Барғ юзасида жигар, қунғир рангга қиради. Тоқнинг қолган қисмлари зарарланганда улар ҳам оқиш доғ билан қопланиб кейин қуриб қолади. Зарарланган мевада қуқиш ботик доғлар пайдо булиб, улар туқилиб қетади.

Қарши қураш чоралари: Америка – Европа гибридарни: Рқацителли, Матрасса, Сапираови қабил навлар қасалга чидамли ҳисобланади. Соғлом усимликлардан қаламча тайёрлаш, усимлик қолдиқларидаги ооспораларни 3% ли нитрафен (1 га ерга 300 л.) билан ишлов бериши керак.

Тут қасаллиги ва уларга қарши қураш чоралари. Тут дарахтининг ҳосилдорлигини оширишда серҳосил навларни етиштириш, қулай агротехник тадбирларни қуллаш билан бирга унинг қасалликларга қураш чораларини илмий асосда ишлаб қикариш зарур. Тут барғи ҳосилини ошириш пиллачилиқни озика базасини мустанқамлаш билан боғлиқдир. Кейинги йилларда тутнинг қасаллиқлари туфайли уругнинг унувчанлиги, қучатлар нобуд булиши, барғ ҳосил миқдори пасайиши ҳоллари қузатилмоқда.

Қузатишларнинг қурсатишича тут усимлигида 40 дан ортиқ қасаллиқлар аниқланган. Улар қуйидаги гуруҳларга ажратилади:

Юқумли қасаллиқлар: бактерия, замбуруг, вирус, миқопозмалар қелтириб қикарадиған қасаллиқлар ва гуллиқ паразитлар (зарпечак, сувчечак, шумгия).

Юкумсиз касалликлар: об – хавонинг нокулай келиши, гаримсел, кишнинг совук келиши, тупрокда айрим моддаларнинг етишмаслиги ёки ортиклиги.

Республикамиз шароитида тут усимлигида бактериоз ва бактериал рак касалликлари учрайди. Тутнинг бактериоз касаллигини кузгатувчиси – *Bacterium moti* бактерияси булиб, касаллик Урта Осиё, Закавказье, Япония, Европа, Ж.Африка, Америка, Австрия шароитида куп учрайди. Республикамиз шароитида бу касаллик 1931 йил Н.Г.Запрометев томонидан аниқланган.

Касаллик туфайли тутнинг энг учки барглар, бир йилликновдаси ва куртаклар зарарланади. Касал баргларда окиш хошияли кейинчалик корамтир ёгсимон доғлар хосил булади. Бог усти корамтир сргиш ёпишкок модда билан копланди. Кучли зарарланган барглар саргайиб кейинчалик тушиб кетади. Касалланган новдаларда эса корамтир доғлар хосил булади. Куртаклар эса корайиб курийди. Касаллик кузгатувчиси кислота ва куёш нурига чидамли, 10 – 35 С хароратда усади, унинг ривожланиши 25 – 30 С да жуда яхши, 51 С да халок булади. Киш фаслида – 30 С совукка чидамли.

Касаллик кузгатувчилари усимликка барг устицидлари, новдадаги ёриклар ва ушиб нуктаси оркали киради. Касаллик белгилари усимлик турига караб 4 – 18 кунда намоён булади. Касалликнинг тарқалишига касалланган новда, барг, кучат, усимлик колдиги асосий манъба хисобланади. Касаллик ёмгир, шудринг, шамол, токайчи кайчи воситасида тарқалади.

Тут дарахтини бактериоз билан касалланиш даражасига караб 3 гуруҳга булинади:

- 1. Керу – нави 2 баллга касалланди – 50%;**
- 2. Кокосу – 70, Кокосу – 13, Сиозисо, Фусамаро, Кокросо навлари – 1 баллга касалландаи – 1-34%;**
- 3. Хасак, Ўзбекистон, Восток, САНИИШ навлари кам касалланади.**

Касалликка қарши кураш чоралари: Касалликнинг олдини олиш: кучат, ниҳол ва каламчалардан пайванлашда фойдаланмаслик; 1 га ерга 6060 дан ортик кучат экмаслик; 1 га ерга 180 кг азот, 90 кг фосфор 45 кг калий уғитларини тупрокка солиш; тутзорлардаги тупрокни кузда чуқур ҳайдаш. Тутзорлардаги бегона утларга қарши курашни ўз вақтида утқизиш. Тутнинг касалланган новдаларни ердан 20 см юқорида қирқиб олиб усимлик колдикларни еқиб юбориш. Касаллик намоён бўлган тутзорларга 100 л сув да 1 кг мис, еқи 1 кг оҳак аралаштириб пурқаш.

Тутнинг бактериал касалликлари ва унга қарши кураш чоралари. Тутнинг юкумли касалликлар орасида энг куп учрайдиган касалликлар замбуруглар томонидан келтириб чиқарилади. Улар барг хосилини қамайтириб колмасдан, сифатига ҳам салбий таъсир қурсатади.

Цилиндроспориоз касаллиги *Culindrosporium maculans* ва унга қарши кураш чоралари. Касаллик 1814 йил Италияда, 1918 йил Урта Осиёда, 1975 йил Ўзбекистонда Н.Г. Запрометов томонидан аниқланган. Касалликни келиб чиқиши, иктисодий зарари ва систематикасини олимлардан С.Ф.Морозов, Михайлов Е.Н.Ашкинадзе қабилир урганган.

Касаллик белгилари баргнинг орка томонида хар хил шаклидага кунгир доглар хосил килиб унинг атрофи кора хошия билан уралган булади. бу доглар замбуругларнинг окимтир шаклдаги конидиал могор мева танасини хосил булади. доглар хосил булган барглар вақт утиши билан саргайиб тушиб кетади.

Касаллик кузгатувчи – *Culindrosporium maculans* замбуруги хисобланади. Касаллик кузгатувчи 25 – 27⁰С хароратда яхши ривождаланади. Тут дарахтининг цилиндроспориоз билан зарарланиши 3 билл шкала билан хисобланади.

1 балл баргда кичик доглар пайдо булади.

2 балл баргнинг 25 фоизи зарарланади.

3 балл баргнинг 75 фоизи зарарланади.

Касаллик кучли ривожланган йилларда бир туп тут дарахтидан 16-20 кг хосил олиш урнинга хосилдорлик 4-8 кг га тушиб кетади. Касаллик баргда хосил булган кониядиялар хисобига шамол ва сув воситасида таркалади.

Касалликка Хасак, САНИИШ – 3,5 Жар арик тут навлари тезда берилувчандир. Кокус – 70, Сиозисо, Восток ва Грузия навлари кам саналади.

Карши кураш чоралари:

1. Тутзорга мулжалланган 1 га ерга экиладиган кучатлар сони 6600 тадан ошмаслиги керак.
2. Тутзорларнинг 1 га сига минерал угитларни куйидаги микдорда куллаш тавсия этилади: N – 120-180, P – 60-90, K – 30-45 кг.
3. Тутзорлар тупрогини и 25 – 30 чукурликда хайдаш.
4. Тутзор ва кучат етиштириладиган далалардаги усимлик хамда бегона утлар колдикларини екиб ташлаш.

Химиявий усулда кураш.

1. Касаллик белгилари пайдо булган усимликларга олтингугурт – охак эритмаларидан пуркаш. (5 градусли охак эритмаси тайерлаш учун 1 кисм охак, 2 кисм олтингугурт ва 17 кисм сув) туп дарахтга 2 л микдорида сепилади.

2. Касалланган усимликларга 0, 3 – 0,4% ли цинеб фунгициди эритмаси сепилганда касаллик 80-85 % пасаяди.

Унг шудринг касаллиги ва унга карши кураш чоралари. Республикамиз шароитида бу касалликни урганишда Н.Г.Запромешов ва Е.М.Ашкинадзе катта хисса кушган. Ун шудринг касаллиги тутнинг барг ва барг япрогини касаллантиради. У жинсий – клейтокарпиал купайиш хусусиятига эга. Замбуруг мицелийси тутбарги устицалари оркали унинг ичига кириб орка томонида окиш унсимон могорни хосил килади. Барг юзасида эса кунгир дог хосил булади.

Клейтокарпийлар ок могор устида олтин сарик рангдаги нукталарни хосил килади. Клейтокарпийлар устида хосил булган таянч нукталар ичида 5-40 тагача аскоспора етилади. Клейтокарпийлар тупрокда усимлик колдигида хаёт кечириб у тезда июл – август ойлари охирида соглом усимликларга таркалади.

Касалликка чидамли навлар: Хасак, Кокусо – 70, Кокусо – 13, Кинуру.
Касалликка чидамсиз навлар: Тожикистон ургусииз тути, Езги, Балки тут, Узбекистан, Восток навлари.

Ун шудринг касаллигининг зарарини аниклашда 3 балл схемадан фойдаланилади:

1 Балл барг хажмиги кisman зарарлайди; 2 балл баргни 50 фоизни зарарлайди; 3 балл баргни хamma кисмини зарарлайди.

Карши кураш чоралари:

1. Озика учун мулжалланган тутзорларнинг 1 га 6600 туп кучат экилган булиши керак;
2. Тутзорларга агротехник тадбирларни уз вактида сифатли утказиш керак;
3. Касаллик белгилари намоён тутларга 5 даражали ИСО эритмаси билан ишлов бериш.

Тутнинг вилт касаллиги. Бу касаллик такомиллашмаган замбуруглар томонидан келтириб чиқарилиб, касалликни кузгатувчи замбуругларга караб вертициллийоз ва фузариоз вилтга булинади. Н.Г.Запрометовнинг 1945 йилдаги маълумотига кура, тутнинг фузариоз вилти – *Fusarium lateritium* ва *Fusarium sp.* Замбуруглари келтириб чиқаради. Аммо бу касалликка 1970 йилгача кам ахамият берилганлигидан у тут ниҳолларига, кучат ва катта дарахтларга маълум даражада зарар етказган. шУни ҳисобга олиб 1969 – 1982 йиллар давомида профессор С.Рамазанова ва В.И.Билай раҳбарлигида Э.Азимжонов, А.Шералиев ва И.Элланскаялар томонидан илмий текшириш ишлари олиб борилиб, силт замбуругларининг 20 тур ва 16 та тур хиллари аниқланди. Вилтнинг бу иккала хили тутни алоҳида – алоҳида эмас, балки биргаликда касаллантириши маълум бўлади. юкоридаги муаллифлар ва жумладан А.Шералиевнинг (1984) жумхуриятнинг ипакчилик хужаликлари, кучатзорлари ва пахта далалари атрофида каторлаб экилган дарахтларни текширишлари асосида жанубий вилоятларда, шимолий вилоятларга нисбатан езу ривожланиши кулай муҳитга эгадир, деган хулосага келдилар. Шу сабабли шимолий вилоятларда фузариознинг 4-5 та тури, жанубий минтакаларда эса 10 тури учрайди. Шимолий, урта ва жанубий минтакаларда тегишлича ниҳоллар 35 – 45 – 60% гача, кучатлар 20 – 30 – 38% гача, катта дарахтлар эса 15 – 25 – 36% гача фузариознинг ҳар хил турлари туфайли ҳалок бўлган. Усимликнинг нобуд бўлишига яна нокулай шароити ва илдиз чириш ҳамда бошқа касалликлар ҳам таъсир қилган бўлиши мумкин.

Уруг сепилгандан кейин униб чиққан ниҳоллар бир ой ичида энг куп (45-50%) касалланиб, нобуд бўлган. Ниҳоллар турли қуринишда ҳалок бўлиши мумкин. Масалан, Жарқургон ва Қарши ипакчилик хужалигида ниҳоллар ерга етиб қолиб, барглари саргайган, айрим майдонларда уругпалла ва биринчи чинбарг чиқиши билан қуриydi. Бунда барглари бўжмаяди, танаси ва илдизи қуриydi. Шу хужаликларда тут кучатларининг илдиз чириш фузариознинг бир неча тури туфайли руй беради. Илдиз пусти атрофи қук еки пушти ранг, егоччилик қисми тук тук жигар ранга айланиб, қуйганга ухшаш бўжмайиб қуриydi.

Катта дарахтларда (юкоридаги хужалик ва Шахрисабз тут кучатзорида) бу касаллик туфайли бирглар қисман саргаяди, унинг кирралари қурийди ва кучли зарарланган барглар бўжмайиб тукилади. Бу ходиса айниқса дарахтнинг юкори қисмидаги новдаларда яққол қуринади. Тана ва новда қешиб қурилганда унинг егочлик қисми қунгир тусга айланганлигини, узаги қирганини қуриш мумкин.

Бизнинг текширишимиз бўйича фузариоз билан касалланган тут уруғларининг ушиб энергияси қескин пасайиб, униш даражаси забуруғ турига қараб 17 – 65 % атрофида (назоратда 98%) бўлган. Бу забуруғ билан касалланган барг ипак қуртига берилганда уни иштаха билан емаган, қурт боқиб муддати 5-6 қунга қузилган, қусти қиралашган, қилла массаси 20 – 25% га қамайган. Фузариоз зумбуруғлари қуртни еки қумбакни оқ юмшак қогор билан қоплаб, қурт уруғининг касалланишига ҳам сабабчи бўлади. лекин қапалақда бу касаллик учрамайди. Фузариоз билан касалланган баргларни истеъмол қилган қуртлар қалок бўлади.

Вилт қасаллиғи Грузия, Қирғистон, Украина ва Малдавия шароитида ҳам учрайди. Қасаллик қарорат 18 дан 25 даражагача, тупрок намлиғи 60 – 80% атрофида бўлганда тез ривожланади. Забуруғ –20 даража совуқда ҳам қалок бўлмайди. Тупрокда, усимлик қолдиғида ривожланаётган вилт забуруғи қоглом усимлик шикастланган илдиз орқали қириб, юкорига сув найчалари орқали қутарилади ва зарарлантиради.

Усимлик баргалари қастдан юкорига қараб зарарланади, егочлик сув найлари деволлари қораяди, апстки баргларида қарик доғлар қайдо бўлиб, сунгра улар қунгир тусга қиради, бўралади ва қурийди.

Қасалланган тут ниқолининг илдизи қирийди, қораяди ва усимлик сулийди. Қучатларда эса барглар сулийди. Лекин туқилмай новдада қолади. Қуп йиллик тутларда баргнинг қирралари қарайиб, барг сатҳида қунгир доғлар қосил бўлади, сунгра сулийди. Ўзбекистонда бу қасалликдан дурағай қучатлар, айниқса Пионер ва Шотут навлари қупрок зарар қуради. Фузариоз вилти билан Грузияда айрим ийлари 70-80% гача ниқол ва қучатлар қобуд бўлиб, қатта дарахтларнинг новдалари қуриши қисобига барг қосили қамайи, сифати емонлашган.

Қарши қураш қоралари: Грузия усимликларни қимоя қилиш илмий текшириш институти қодимлари уруғни экиш олдидан унинг 1 қг ни 2,5 г ТМТД препаратни билан аралаштириш: ниқол ва қучатнинг усув даврида эса 3 марта дорилашни тавсия этадилар. Биринчи дорилаш 5-6 барг қайдо бўлгач, кейингилари шундан 20 – 25 қун утгандан кейин утқайлади. Бунда қуйидаги препаратлар эритмаси –0, 7% ли қаптан еки 0,3% ли беномил еки бўлмаса 0,4% ли поликарбосилл еки 0,5% қенеб сеқилади. Озика тутзорларга 0,7% ли қаптан еки 0,3 % ли беномил қурқайлади. Препаратлар билан ишлов берилгандан 10 қун утгач, тут барғини ипак қуртига берса бўлади.

А.Л.Злотина, Л.С.Қуприянованинг (1984) олиб борган тадқиқотлари маълум бўлишича, Украина шароитида тутнинг трахеомикоз (фузариознинг бир тури) қасаллиғи туфайли бута тутзордаги тутларнинг новдалари қуриб қолишига қарши қурашиш учун бир гектар тутзорга қар уч йилда 40 т қунг еки

хар йили 20 т гунг е булмаса хар йил 10 т гунгга соф вазинда 60 кг азот, 30 кг фосфор солинганда ва натижада угит солинмаган (назорат) жойдагига нисбатан баргли новдаларнинг куриш 10 – 11% камайган, хосил эса 16 – 17% ошган.

Илдиз чириш касаллиги. Тут касаллигида илдиз чириш касаллигини куйидаги замбуруглар келтириб чикаради: 1) пластинкали еки калпокчанили (*Armillaria mellea* Quel); 2) ок илдиз чириш (*Rosellinia necatrix*); 3) *Mucelia sterilia*; 4) Мосино (*Helicobasidium mompa*) замбуруглари келтириб чикаради.

Тут дарахти етиштирилган давлатларда 20 – 60% гача тут дарахтларини нобуд килади. Касаллик белгиси апрель – май ва июн ойларида куринади. Бунда барглар сулийди лекин тукилмайди, дарахт енгил кимирлатилса тана асоси ёки томири дан синади. Касалланган илдизлар ва тана кунгир тусга кириб, укланиб кетади; илдиз ва тананинг ичида ипсимонларда ва ризоморфлар хосил булади.

Карши кураш чоралари. Н.Г.Запрометов тавсияси буйича кучли касалланган майдондаги тутларни купариб ташлаб, чукурларга хлорли охак ёки хлоропикрин ёки булмаса тупрокнинг 1 м. сатхида 60 майдонга тут экилмай, галла экинлари экиш тавсия килинади. Лекин уни кукартириш куп вакт (2 –3) йил талаб этилади ва уни амалга ошириш анча мураккабдир. Г.Р.Ибрагимов ва Т.З.Аскерованинг (1963) тажрибаларига кура, фаскомилон протарати нихолзорнинг 1 м. сатхига 75 г. хисобида сепилганда, уругнинг усиш энергияси ошиб ва вақтда нихолларда илдиз чириш касаллиги 81,8% га камайган.

Назорат саволлари:

1. Токнинг ун шудринг касаллигини кузгатувчисини, белгиларини, таркалишини ва кураш чораларни айтинг.
2. Токнинг антрокноз касаллигини кузгатувчисини, белгиларини. Зарарини ва карши кураш чораларини айтинг.
3. Токнинг церкоспориоз касаллигининг кузгатувчисини, белгиларни, иктисодий зарари ва кураш чораларини айтинг.
4. Токнинг ок чириш касаллигини кузгатувчисини, белгиларни, иктисодий зарари ва карши кураш чораларини айтинг.
5. Тутнинг юкумли касалликларига кандай касалликлар киради.
6. Тутнинг юкумсиз касалликлари кайсилар.
7. Бактериоз касаллигининг кузгатувчиси ва белгиларини тушунтириб беринг.
8. Бактериоз касаллигига карши кураш чоралари.
9. Цилинрозсориоз касаллигига карши кураш чораларини айтинг.
10. Ун шудринг касаллигига чидамли навларини аникланг.
11. Ун шудринг касаллигига карши кураш чоралари кандай.
12. Тутнинг вилт касаллигини кандай замбуруглар келтириб чикаради.
13. Тутнинг фузариоз вилт касаллигининг белгилари кандай.
14. Тутнинг вертициллиоз касаллигининг белгилари кандай.
15. Тутнинг вилт касаллигини кузгатувчиларининг биологик хусусиятлари кандай.
16. Тутнинг вилт касаллиги усимликка кандай зарар етказади.

17. Тутнинг вилт касаллигига карши кураш чоралари кандай.

11 – мавзу: Иссикхонадаги усимликларни замбуруг касаллик кузгатувчилари ва уларга карши кураш чоралари.

Режа:

1. Илдиз чириш касаллигини ривожланиш хусусиятлари.
2. Фитофтороз касаллигини ривожланиш хусусиятлари.
3. Макроспориоз касаллигини ривожланиш хусусиятлари.
4. Сиптопиоз касаллигини ривожланиш хусусиятлари.
5. Илдиз чириш касаллигини тушунтиринг?
6. Фитофтороз касаллигини тушунтиринг.
7. Макроспориоз касалини тушинтиринг?
8. Уругни кандай дорилар билан дориланади.
9. баргни сипториоз касаллиги?
10. Баргни кунгир догланиш касалини тушунтиринг.
11. Усимлик касалланмаслиги учун иссик хона намлиги ва t^0 кандай булиши керак.

Адабиетлар:

1. Демедова Л.И. Болуни бурцов в защищенном грунте. Л.: «Колос», 1975.
2. Пересыпкин В.Ф. сельскохозяйственная фитопатология. М.: «Колос», 1982.

Илдиз чириш касаллиги. Касаллик кузгатувчиси *Rhizoctonia solani* Pythium ва *Fusarium* замбуруглари хисодланади. Касаллик помидор кучатларини зарарлайди. Касаллик кучатларининг илдиз бугзини чириш шаклида намоён булади. илдиз бугизи дастлаб оқ рангдаги замбуруг мицелийси билан копланadi. Зарарланган қисм юзасида ҳосил булган мицелийсидаги конидиялар воситасида касаллик кузгатувчи тупроққа таркалади.

Илдиз чириш касаллиги очик даладарда қўп учрайди. Зарарланган илдизлар қўшқоқ парехимаси, флoэма туқималари чириб илдизни қўриб қўлишга сабаб булади. касалланган усимлик усьшдан орқада қолади, пастьки яруслардаги барглар юзаси саргайиб қўрийди, поянинг ео юзасига яқин қисмида қўшимча илдизларни ҳосил қилади.

Қарши қўраш чоралари: иссик хоналарда қўчатларни пиқировка қилишда уларнинг илдизини 1% дерoзал, фундазал фунгицидлари эритмасида олиб, тупроққа эқилади ва тупроқдаги усимлик қолдиклари ўз вақтида йиғиштириб олиш, тупроққа органик угитларни қўллаб қувватлаш керак, айниқса қалий угитлари солинади. Бу касаллик кузгатувчиларига қарши помидорни вегетация даврида 50% фундозолни гектарига 2 кг дан 3 марта 4 – 5 та қин барг қикарганда, шoналаш фазасида ва гуллашдан олдин ишлаш тавсия этилади.

Фитофтороз. Республикамиз шарoитида бу оила вақилларидан помидор, картошка, балгар қалампири, баклажон қаби усимликлар етиштирилади. Бу усимликларни етиштиришда агротехник тадбирлар утқазиш муддатларига қараб ойнабанд иссикхоналарида ва очик жойларида амалга оширилади. Иссикхоналарда уларни етиштириш жараенида намлик миқдори 65 – 70%

харорат 22-26⁰С гуллашда харорат 24-28⁰С булиш зарур. Тупрок харорати 19-21⁰С ни ташкил килиши керак.

Бу усимликларни очик жойларда етиштирганда фитофтороиз септороиз, макроспориоз, кора бактериал догланиши каби касалликлар билан касалланади.

Фитофтороиз еки меванинг кунгир чириш касаллиги Peronosporales таркиби. Оамицетлар синфига мансуб Phetophora intestans замбуруги келтириб чикаради. Касалликни таркатиш учун кулай шароит ез ойларининг иккичи ярмидан бошланади. Хаво харорати кундузи 22⁰С кечаси 10-12⁰С замбуруги булганда споралар тез таркалади.

Касаллик баргда пояда ва мевада намоен булади. баргнинг киррасида кунгир рангдаги доглар пайдо булиб, мевада турли даврларда кунгир доглар мевани чиришга сабаббулади. Нам шароитда догларни замбуруг спораси ривожланиб мевани зарарлайди.

Касалликнинг бирламчи инфекция манбаи эса касалланган усимликдаги тупрок тушган инфекция хисобланади.

Иккинчи инфекция манбай эса касалланган усимликдаги замбуруг зооспоралари кулай шароитда ушиб ривожланади. Иссикхоналарда касаллик картошка экиш далаларидан таркалади [1,2].

Кариш кураш чоралари: помидор экиладиган далаларни картошка далаларидан узоклаштириш, камайли угитларни ортикча – 150 кг/га куллаш экинлар чидамлигини оширади, усимликни 1% бордос суюклиги (600 л 1 га) 0,4% миснинг хлорли оксиди билан ишлов бериш, хосилни эрта йигиштириш, чидамли навларни экиш, далалардаги усимлик колдикларни уз вактида йигиштириб олиш зарур.

Макроспориоз касаллиги. Макроспориоз касаллиги усимлик баргини, поясини ва мевасини зарарлайди. Касаллик кузгатувчиси – hyphomycetales тартиби такомиллашган замбуруглар синфи вакили Macrosporium solani хисобланади. Касаллик кузгатувчи конидия хосил килиб купаяди. Касаллик белгиси: баргда курук, думалок доглар хосил булади. Касаллик баргбайни, мева бандини поя ва мевани касаллантиради. Касалланган мевада думалок кунгир доглар пайдо булади. усимлик турли даврларда касалланади. Замбуруг асосан конидиялар хосил килиб купаяди.

Касаллик усимлик кордикларида ва тупрок юзасида хаёт кечиради [1,2].

Кариш кураш чоралари: тупрокни чукур хайдаш. Усимлик колдикларни чикариб танлаш, 0,4% ли миснинг хлорли оксиди билан ишлов бериш (3-4 марта) чидамли навлар экиш, алмашлаб экишга амал килиш (2-3 йил давомида бир далага помидорни кайта экмаслик) уругни экишдан олдин фунгицидлар билан ишлов бериш.

Баргларнинг септориоз касаллиги. Касаллик кузгатувчиси такомиллашмаган замбуруглар синфи, Sphaeropsidales тартиби вакили, Septoria lycopersici тури хисоланади.

Касаллик очик мухитда ва иссикхоналарда ривожланади. Касаллик асосан баргда, барг банди, поя ва меваларда намоен булади. касалликнинг ташки белгиси барг атрофида корамтир пунктлар билан уралган окиш рангдаги доглар хосил булишидан бошланади. Догларни уртасида кейинчалк замбуруг

пектицидиялари ҳосил бўлади. ҳосил бўлган споралар рангсиз ипсимон қисман эгилган бўлади. касаллик кенг тарқалган доғлар тупланиб кетиб бутун барг юзини ураб олади. Касалланган барглари кунгир ранга кириб, қуриб қолади ва тушиб кетади.

Касаллик кузгатувчиларнинг инфекция манбаи: усимлик қолдиғида кишлаб чиккан замбуруғ споралари балиб, қайта зарарланган пектидиоспоралар воситасида амалга ошади. Касаллик 70-94% намлик ва 15-27⁰С тез ривожланади касалликка қарши қураш чоралари усимлик қолдиқларини йиғиштириб олиш тупрокни чуқур ҳайдаш алмашлаб экишга риоя қилиш, фунгицидлар билан ишлов бериш (1% бордос суюқлиғи билан 10-15 кунда ишлов бериш) чидамли навларни экиш.

Баргнинг кунгир доғланиши клафаспориоз касаллик гуллаш даврининг дастлабки босқичида меваларда ва баргларида ҳосил бўлади. биргнинг устки томонидан томонидан ҳар хил шаклдаги ва улгандаги доғлар пайдо бўлади. баргнинг орқа томонида эса ҳосил бўлган замбуруғ қонидиялари воситасида қупаяди.

Касалланган барглари саргайиб қуриб кетади. Гул ва мевалар касалланган барглари саргайиб қуриб кетади. Гал ва мевалар касалланганда ҳам улар кунгир қонга кириб қуриб ва ҳалок бўлади. Касаллик иссиқхоналарда 90-95% намликда ва 22-25⁰С ҳароратда тез қупаяди, тупрокда 60-65% намликда касаллик қамаяди. Инфекция асосан қонидия шаклида усимлик қолдиқларида сакланиб қолади [1,2].

Касалликка қарши қураш чоралари усимлик қолдиқларини ўз вақтида йиғиштириб ташлаш вегетация даврида иссиқхоналар намлигини 60-70% саклаш усимликни топсин (0,1%) фундазол (0,1%) фунгицидлар билан ишлов бериш, касалликка чидамли навларни етиштириш.

Назорат саволлари:

1. Иссиқ хоналарда қандай замбуруғ касалликларини биласиз?
2. Усимликларга зарарланиш йулларини айтинг.
3. Замбуруғ касалликларига қандай қураш чораларини қўлайсиз?

12 – мавзу: Иссиқ хона усимликларининг бактериал ва вирусли касаллик кузгатувчилари ва олдини олиш чоралари.

Режа:

1. Бактериал рақ касаллигини хусусиятлари.
2. Стрик касаллиғи.
3. Мозайка касаллиғи.
4. бактериал рақни белгилари.
5. Инфекция манбаи нима?
6. Стрик касали қандай касал?

7. Стобур касали кандай касал.
8. Мозайка касали кандай касал.

Адабиетлари:

1. Демедова Л.И. Блоуни бурцов в защищенном грунтею Л.: «Колос», 1975.
2. Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология. М.: «Колос», 1982.

Бактериал рак. (*Cosynebacterium michganense*) касаллигини бактерияси кузгатади. Бу касалликнинг шакли икки хил куринишда. Биринчи шаклидаги касалликнинг белгиси кучатни эккандан кейин икки hafta утгандан сунг намоен булади. бунда бактериянинг таъсирида усимлик уткузвчи тукималари зарарлангандан сунг помидор барги билан шохлари сулийди. Пояни кундалангига кесиб курилганда уткузвчи тукимани кунгир тусдалиги курилади. Шундай зарарланган усимлик сулиб колади [1].

Иккинчи шаклда зараланган помидорнинг шохида, баргида, мевасида ботик яралар куринади. Усимлик поясида ва мева бандида узунчок кунгир чизиклар хосил булади.

Касаллик авжаги олган сайин ярача урнида ериклар курамиз ва ериклардан бактерия споралари ташкарига таркайди. Зарарланган меванинг уртаси тук, атрофи окиш доглардан иборат булад. Помидорнинг маъсаси бузилади ва уткузвчи тукима найлари сарик тусга киради. Инфекция манбаи булиб зарарланган уруг ва усимликнинг колдиги хисобланади.

Стрик.

Касаллик кузгатувчиси – *Nicotiana virus* вируси. Бу касаллик помидорнинг ер устки аъзоларини зарарлайди.

Зарар теккан баргларида кизгиш – кунгир тусли, майда турли шаклларда доглар хосил булади. бу касаллик куиши натижасида барглар уз холатини йукотади, курийди. Пояси хамда шохлари тез синувчи булади. помидорни мевасида ботик йул – йул кунгир доглари булади.

Стобур.

Касаллик узгатувчиси микроплазма хисобланади. Бу касаллик билан помидор, балгар калампири, баклажон зарарланади. Касалликни бир белгиси зарарланган помидор усимликнинг гул аъзолари бирикиб ушиб кетади. Бунда гултожи барги умуман хосил булмайди еки ушиб чикканда хам майда ва яшил рангда булади.

Чангчиси билан уругчисида деформацияланиб, кичиклашиб кетади. Касалланган гул чангланмайди. Гул чангланиб булгандан кейин зарарланса, у вақт мева хосил булади, лекин хосил булган меваси сифатли булмайди ва бу меваени истеъмол килиб булмайди.

Мозайка касаллиги.

Бутун усув даврида касаллик билан помидор, асосан барги зарарланади. Касалланган баргларда яшил ранг бир вақтда оч яшил еки саргиш ранг галланиб жойлашади ва мозайкани яратади.

Усимликни усиши учун нокулай шароит юзага келганда помидор барглари деформацияланади еки папоротниксимон шаклга киради. Усимликда хосил

булган помидор кичиклашиб колади. [1,2]. Инфекция уругда ва зарарланган усимликни колдикларида, ҳамда бегона утларнинг илдизида сакланиб колади.

Назорат саволлар:

1. Иссиқхоналарда қандай бактериялар касалликларини биласиз?
2. Иссиқхоналарда қандай вирусли касалликлар мавжуд?
3. Уларга қарши қандай кураш чоралар қўлланилади?

**МАЪРУЗА МАТНИДА ИШЛАТИЛГАН МАХСУС АТАМАЛАРНИНГ
ИЗОХЛИ ЛУГАТИ.**

Авлод (насл) –	Жонивор ёки усимлик ривожлана бошлангандан то вояга етган давргача ҳаёти.
Агробийоценоз –	Экинзорларда ва боғларда организмлар (усимликлар, ҳайвонлар жумладан ҳашоротлар микроорганизмлар)нинг ҳамкорликда ҳаёт кечириши биоценознинг бир формаси.
Антагонист –	Бошқа микроорганизмлар (турларининг ҳаёти секинлаштирадиган ёки тухтатадиган ёки тухтатадиган микроорганизми).
Антеридий –	Оомицетлар синфига оид тубон замбуругларининг эркаклик жинсий органи.
Аск –	Аскомицетлар синфига мансуб юкори замбуругларнинг ҳалтага шаклидаги жинсий қупайиши органи.
Аскомицетлар –	Жинсий қупайиши ҳалтага (аск) лар ичида ривожланувчи спора (аскоспора) лар воситасида амалга ошувчи мицелийси қуп ҳужайрали, юкори замбуруглар синфи.
Аскоспора –	Ҳалтача ичида ривожланадиган спора.
Аскокорп –	Ҳалтача (аск) ҳосил қилувчи юкори замбуруглар синфига оид замбуругларнинг жинсий йул билан ривожланадиган мева таначаси.
Базиомицедлар –	Махсус орган (базидия) ёрдамида жинсий қупаровчи мицелийси қуп ҳужайрали юкори замбуруглар синфи.
Базидиоспора –	Базидия устида ҳосил булган спора.
Базидия –	Базиомицетлар синфига замбуругларнинг одатда 4 та бир ҳужайрали спора (базидия спора) ҳосил қилувчи жинсий қупайиш органи.
Бактерия –	Қупинча бир ҳужайрали ва ҳужайра қобилигига эга аммо типик ядроси хлорофилли ва палстидлари булмаган, бўлиб пулоговчи микроорганизм.
Биопрепарат –	Микроорганизмлар ёки улар фаолияти натижасида ҳосил булган маҳсулотлардан тайёрланган, зарарли ҳашоротлар қамрок ҳолларда касалликлар ва бегона

	утларга карши курашда кулланиладиган препаратлар (биоинсектицид, биофунгицид ва биогербицидлар; микробиологик препарат).
Битоксибациллин –	Бактекриал инсектицидли препарат <i>Bacillus thuyvingiensis</i> бактерияси биринчи серотипи асосида яратилган. Споралардан, эндоксин ва экзотоксин кристалларидан ташкил топган. Курук порошок хакида ишлаб чиқарилиб, 1 граммда 45 млрд. спора, экзотоксин микдори – 0,6 – 0,8 % сакланишмуддати 1 йил. Препарат одамга, умурткали хайвонларга, фойдали умурткасизларга кам захарли, ипак курти учун хавфли. Картошка ва помидорга колорадо кунгизининг 1 – 2 ёшлардаги личинкаларига карам туплами, кусок курти ва барг кемирувчи бог зараркунандо, парининг 1 – 2 ёшдаги куртларига карши курашда ишлатилади. Зараркунанда турларига караб препарат гекторига 2 – 4 кг. сарфланади. Кусок курти ва ургимчакканда карши бир йула ишлатилса препарат нормаси 4 – 6 кг. булиши керак.
Вилт –	Сулиш.
Вирулентлик –	Микроорганизмларнинг усимликларда ва жониворларда касаллик кузгатиш қобилияти. Вирулент (ёки вирулентлиги баланд) микроорганизм – касаллик кузгатиш қобилияти баланд, кузли паразит; овирулент микроорганизм – касаллик кузгата олмайдиган микроорганизм.
Гифолар –	Замбуругларнинг вегетатив фазаси (мицелий)ни ёки мева танагаларини ҳосил қилувчи бир ёки куп хужайрали микроскопик иплар.
Зооспоро –	Баъзи тубон зам – парнинг жинссиз қупайиши учун хизмат қиладиган, хивчинчаси ёрдамида сувда ҳаракатланадиган махсус хужайра (спора).
Зооспорангий –	Баъзи тубон замбуругларнинг ичида зооспоралар ҳосил буладиган жинсиз қупайиши органи.
Иммунитет -	Организмнинг маълум бир касалликка умуман қалинмаслиги; иммун организм касалликка қалинмайдиган организм.
Инкубацион давр –	Касалликнинг «яширин» даври – усимлик паразит билан зарорарланиши ҳамда касалликнинг биринчи ташқи белгилари пайдо бўлиши орасида ўтган давр.
Инокулюм –	Касаллик кузгатувчиси микроорганизмнинг экинларини зарарлаш ва янги экинларга тарқатиш учун хизмат қилувчи махсус хужайра ва танагалари (спора, кондия, склероций микросклероций ва хокозо).

Касаллик кузгатувчи –	Бошка организм хисобига паразит холда яшайдиган организм (мисол учун: усимликлардо ва хашоратларда касаллик кузгатувчи микроскопик замбуруглар ва бактериялар).
Клейстотеций –	Халтача (аск) хосил килувчи ун – шудринг замбуругларининг жинсий йул билан ривожланадиган ёпик мева топачалари.
Коллония –	Микроорганизм (микроскопик замбуруг, бактерия ва хокозо) ларнинг озука мухитда усиб ривожланиши натижасида, курулланмаган куз билан куринадиган тупи (тудаси).
Конидиофлра –	Микроскопик замбуругларнинг оддий (шоҳланмаган) ёки шоҳланган хар хил шаклли ва улчамли, устки кисмларида конидиялар ривожланадиган микроскопик орган.
Конидия –	Замбуругларда жинсиз кулайми учун хосил буладиган махсус микроскопик бир ёки куп хужайрали танага.
Макроконидиялар –	Баъзи 2 хил конидиялар хосил килувчи юкори замбуруглар (купинча <i>Fusarium</i> туркуми намояндалари) нинг улчами каттарок ва куп хужайрали конидиялари (микроконидия билан молиштиринг).
Микология –	Замбуругларни урганувчи фан (ботаника фанининг булими) микологик – замбуругларга оид.
Микробиологик кураш –	Зараркунандалар, усимликларда касаллик кузгатувчилар ва бегона утларга карши биопрепаатлар ёрдамида кураш.
Микроконидиялар –	Баъзи 2 хил конидиялар хосил килувчи юкори замбуругларнинг улчами кичикрок ва одатда бир хужайрали кониялари.
Микроорганизмлар –	Курулланмаган куз билан курунмайдиган ва факат микроскопда куриш мумкин булган жуда майда организмлар: уларнинг каторига бактериялар, октиномицетлар микроскопик сув утлари ва бир хужайрали энг идда хайвонлар киради.
Мицелий –	Замбуругларнинг жуда майда микроскопик узун иплари (гифолар)дан иборат вегетатив тоннаси; ривожланган пайтда оддий кузда куринадиган холга килади. (мисол учун, барг устидаги ун – шудрингкатламлари, хар хил мозорлар, тоза мухитдаги копониялари ва хокозо).
Оогоний –	Оомицетлар синфига мансуб тубон «замбуругларнинг ичида бир ёки бир нечта тухум хужайраси ривожланадиган, одатда бир хужайрали ургоги жинсий органи.

Оомицетлар –	Жинсий купайиши оогомия тилида ва жинсиз купайиши зооспоралар ёрдамида амалга ошириладиган тубон замбуруглар гурухи.
Ооспора – зиготаси.	Оомицетлар гурухига мансуб тубон замбуругнинг
Осмофил замбуруг –	Нисбий номлиги паст булган мухитда ҳам яшай оладиган замбуруг.
Пестицид –	Усимликларни ёки хайвонларни зарарли организмлардан химоя қилувчи кимёвий (ёки биологик модда; уз ичига инсектицид, акарицид, фунгицид, гербицид ва хокозо).
Перетей –	Аскомицетлар синфига мансуб баъзи юкори замбуругларнинг усимлик туқималари ичида ривожланадиган, одатда куза, нок ёки бутилжа шаклли, жинсий купайишига хизмат қилувчи мева таначаси (псевдотей билан солиштиринг).
Пикнидо –	Замбуруглар усимлик туқимаси ичида ёки туқимасининг сиртки қисмида ривожланадиган, ичида споралар ҳосил буладиган, одатда думалок шар, ноксимон ва хокозо шаклардаги, вегетатив купайиши учун хизмат қилувчи микроскопик танача.
Псевдотей –	Аскомицетлар синфига мансуб баъзи юкори замбуругларнинг усимлик қобиғининг устида ривожланувчи одатда куза, нок, ёки бутилка хизмат қилувчи мева танача.
Склеротий –	Замбуруглар гифалари жуда зич жойлашиб ҳосил қиладиган танача: замбуруг узок вақти саклансин учун хизмат қилади. Микросклеротий – улчами кичик склеротий.
Спора –	Замбуруглар (одатда вегетатив) купайиши учун ҳосил буладиган махсус микроскопик хужайра ёки танача ушиб ва ривожланиб, ётилган замбуругга ой-ди.
Токсинлар –	Келиб чиқидан батериал усимлик ёки жониволар моддалари булиб, тирик организмлар физиологик фаолиятига ҳалокатли таъсир қилиб уларни касалликка чалинтиради ёки улимига олиб келади. Айрим токсинлар микробиологик химоя воситаларининг тақибига кириб у дастлабки таъсир этиш хусусиятига эга.
Триходермин –	Биологик препарат булиб, <i>Trichoderma lignorum</i> замбуруги асосида яратилган сабзавот экинлари илдиз чириш (иссик хоналада) гузанинг вилт, картошшканинг ризоктопиз касалликларига қарши қўллаш мумкин. Препарат тупрокка солиниши ёки уруг ва қўзат

	экилишидан олдин бу препарат билан ишланиши мумкин.
Фунгистатик модда –	Замбуругларнинг усиши ва купайишини тухтатувчи модда.
Фунгицид –	Касаллик чакирувчи замбуруглар билан курашда купланиладиган махсус захарли кимёвий дори.
Хлороз –	Усимлик органлари, асосан багларида паразит микроорганизмлар билан зарарланганида ҳамда экинларига баъзи элементлар (мисол учун темир, мис, калий) етишмаслигида ҳосил буладиган ок оким – саргиш ва саик доғлар.
Штамм –	Маълум бир субстратда аникланган ёки субстратдан (мисол учун тупрок сувдан ёки касаллик билан заарланган экиндан) ажратиб олинган узига ҳос физиологик – биокимёвий хусусиятлага эга булган. Микроорганизмларнинг тоза культураси.
Экзотоксинла –	Айрим микроорганизм (бактерия) нинг усув давида толики муҳитга ажратиб чикаган токсин.
Этифитотия –	Усимлик касаллигининг битта хужалик, туман, вилоят ёки мамлакатда кенг такалиши.
Усимликлар уйғунлашган химояси –	Заали организмлар билан курашда бача мумкин булган усулларни (агротехника кимёвий биологик ва хокозо, ҳамда табиий тартибга солишни) бигаликда куллашга муҳим ёндашиб, зарар кунда, касаллик кузгатувчи ёки бегона утла популяциясини иктисодий заар келтирадиган даажга етказмаслик учун, кам хаажат килиб, мунтазам равишда олиб бориладиган хафсиз химоя тизими.

М У Н Д А Р И Ж А

1	Фитопотология фаннинг максоди ва вазифалари.....	6-9
2	Усимликларнинг юкумли ва юкумсиз касалликлари.....	9-15
3	Галла донли экинларнинг касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари.....	15-19
4	Ўза касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари.....	19-22
5	Беда усимлиги касалликлари.....	22-25
6	Помидор касалликлари ва уларга қарши кураш	25-27
7	Қартошка касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари.....	28-31
8	Полиз экинларининг касалликлари.....	31-33
9	Мевали усимликларнинг касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари	33-35
10	Ўқ ва ўт касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари.....	35-43
11	Иссиқхонадаги усимликларни замбурут касаллик кузгатувчилари ва уларга қарши кураш чоралари.	44-46
12	Иссиқ хона усимликларининг бактериал ва вирусли касалик кузгатувчилари ва олдини олиш чоралари.....	46-48

**«Микробиология ва вирусология асослари» фанидан адабиётлар
руйхати.**

1. Ахмаджонов Ю. Микробиология ва вирусология асослари. Тошкент, 1964 йил.
2. Бурхонова х.К., Муродова М.М. Микробиология, Токент, 1975 йил.
3. Буланова П.А. и Колетка О.И. Общая микробиология. Минск, 1969 г.
4. Генкель П.А. Микробиология с основами вирусологии. Москва, 1974 г.
5. Гуриев Б.Г. Микробиология. Тошкент, 1990 йил.
6. Иногорова М. Микробиология ва вирусология асослари. Тошкент. Укитувчи, 1983 йил
7. Мустакимов Г.Д. Усимликлар физиологияси ва микробиология асослари. Укитувчи, 1995 йил.
8. Мишустин Е.Н. и др. Микробиология. Москва, 1970 г.
9. Мудрецова – Висс К.А. Микробиология. Москва, 1978 г.
10. Работнова И.Л. Общая Микробиология. Москва, 1996 г
11. Фёдоров М..
12. В.Микробиология. Ташкент, 1966 й