

O`zbekstan respublikasi xalq bilimlendiriw ministrliqi

A`jiniyaz atındag`ı No`kis ma`mleketlik pedagogikalıq institutı

Zoologiya kafedrası

**B 403400 – biologiya ha`m adam tirishiligi iskerligin qorg`aw
bakalavr` bag`darı boyınsha**

PİTKERİW JUMISI

**Tema: “ Shomanay rayonı shalı ha`m onın` tamır do`geregi
fitonematodaların u`yreniw ”**

Kafedra bashg`ı:

b.i.k. Atanazarov Q.

İlmiy jetekshi:

b.f.n.,dots. Allamuratov Sh.T.

Pitkeriwshi talaba:

***IV-a qq toparı talabası
Amanbaeva Nazira Jan`abaevna***

No`kis – 2011 jıl

MAZMUNI

KIRISIW.....	3
BAP-1. SALI O`SIMLIGI HA`M ONIN` TAMIR DO`GEREGI TOPIRAQLARININ` NEMATODALARI (A`debiyatlardı sholıw)...	6
BAP-2. MATERIAL, METODIKA HA`M İZERTLEW ORNI.....	10
2.1. İzertlew ornının` topıraq-ıqlım sha`riyatlarına qısqasha sıpatlama.....	10
2.2. Material ha`m metodika.....	10
BAP-3. ShOMANAY RAYONI SALI O`SIMLIGI HA`M TAMIR DO`GEREGI TOPIRAQLARININ` NEMATODALAR FAUNASI.....	12
BAP-4. TABILG`AN TU`RLERDİN` SİSTEMATİKALIQ JAG`- DAYI HA`M TA`RİPLEMESİ.....	18
BAP-5. SALI NEMATODALARININ` EKOLOGİYaLIQ TOPARLA- RI.....	42
JUWMAQLAW.....	45
A`DEBİYaTLAR.....	46

KIRISIW

Temanın` aktualıg`ı. Prezidentimiz 2012-jıldı «Bekkem shan`araq» jılı dep belgilewi awıl turmısın, a`sirese diyqansılıq penen shug`ıllanıwshı xojalıqlardag`ı jas shan`araqlarg`a da unamlı ta`sirin tiygizedi (Karimov, 2011). Sebebi geypara du`niya ma`mleketlerinde ekonomikalıq- sotsiallıq krizis dawam etip atırğ`an da`wirde awıllarda jergilikli shiyki zatlardan tayar o`nimler islep shıg`arıwshı mini texnologiyalardı en`giziw, barların modernizatsiyalaw, import o`nimlerinin` ornın basa alatug`ın zatları islep shıg`ıwday a`hmiyetli ua`ziypalar awıl-xojalıg`ı xızmetkerleri menen birge bizin` keleshegimiz bolg`an awıl jaslarına da ju`klenedi.

Ha`zirgi bazar ekonomikası da`wirinde xalıqtın` sotsial ekonomikalıq jag`dayının` ko`teriliwinde awıl xojalıq eginleri o`nimlerin jetilistiriw a`hmiyetli orın iyeleydi. A`sirese ha`zirgi uaqıtta da`n o`nimlerine talap qu`nnen-ku`nge ku`sheyip barmaqta. Sonın` ishinde salı osimligi bir neshe tu`rdegi xalıq xojalıg`ı ushın kerekli o`nimlerdi islep shıgarıw, sonday-aq mal-sha`ruashılıg`ı ushın ot-jem qorın tayarlaw bul eginnen mol zu`ra`a`ıt alıwg`a talaptın` ku`sheyip baratırğ`anılıg`ı, bizin` aldımızg`a ko`p wazıypalardı ju`kleydi. Sol wazıypalardıń biri salı o`simliginen mol o`nim alıwda olardıń zıyankesleri ha`m parazitlerine qarsı gu`resiw bolıp tabıladı. Zıyankeslerdin` ishinde do`n`gelek qurtlar (nematoda) a`hmiyetli orın tutadı. Sebebi nematodalar o`simlikke zıyan berip qalmastan olardı bakteriya, zamarrıq ha`m virus keselliklerinin` o`simlik denesine kiriw da`ruazasın ashadı.

Fitonematodalarg`a qarsı gu`resiwdi durıs ju`rgiziw ushın fiogel`mintologiyalıq izertlewlerdin` ekologo-faunalıq bag`darı boyınsha u`yreniwler alıp barıw u`lken orın tutadı.

Qaraqalpaqstanda salı ha`m onın` tamır do`geregindegi topıraqtın` nematodalar faunası az u`yrenilgen.

Salının` xalıq xojalıg`ındag`ı a`hmiyeti, ha`m onın` nematoda faunasının` az u`yrenilgenligi bizin` temamızdın` aktualıg`ın belgilep beredi.

İzertlew maqseti ha'm uaziypaları. Salı o'simligi zıyankeslerinin` ishinde tabiyatta ken` tarqag'an ha'm ekonomikalıq jaqtan zıyan keltiretug'in wa`killerinin` biri bul hayuanlardın` do'n`gelek qurtlar yamasa nematodlar klassının` u'a`killeri bolıp esaplanadı.

Qaraqalpaqstan Respublikasında atap aytqanda Shomanay rayonu aymag`ında xojalıq eginlerinin` ishinde ayırım tu`rleri, a`sirese salı o'simliginin` zıyankes nematodlar fauanası ju`da` az izertlengen. Sog'an baylanıslı bizler Shomanay rayonu M.Abdullaev atındag`ı xojalıq atızlarındag`ı salı o'simligi ha'm onın` tamır do`geregi topıraqlarındag`ı nematodlardın` tu`r quramın izertlewdi o`z aldımızg`a maqset etip qoydıq.

Bizin` izertlew jumıslarımızdın` waziypalarına to`mendegiler kiredi;

1.Qaraqalpaqstannın` arqa batıs zonası sha`rayatında salının` ha'm onın` tamır do`geregindegi nematodalar faunasın u`yreniw.

3. Ekonomikalıq ahmiyetke iye bolg'an parazit nematodalardıń tu`r quramın belgilew.

**İlimiy jan`alıqlar.** Qaraqalpaqstan respublikasının` arqa batıs zonasında salı o'simligi ushın nematodalar faunasının` ha'r qıylı ha'm o`zine ta`nligi anıqlandı. Atız agrotexniksının` jag`dayı, nematoda tu`rleri ha'm san ko`rsetkishinin` aldın`g`ı egilgen o'simlik tu`rine baylanıs-lılıg`ı belgilendi. Salı o'simligi ha'm onın` tamır do`geregindegi topıraqlarda anıqlang'an nematoda tu`rleri Shomanay rayonu aymag`ı ushın birinshi ma`rtebe anıqlanbaqta.

A`meliy a`hmiyeti. İzertlew na`tiyjeleri boyınsha Qaraqalpaqstan respublikasının` arqa batıs zonasındag`ı parazit ha'm basqada tu`rdegi nematodalardıń tarqalıwı anıqlandı, bul olarg`a qarsı gu`resiwdin` bunnan keyingi bag`darların anıqlap alıwda mu`mkinshilik jaratadı. Shomanay rayonu ushın salı o'simligi ha'm onın` tamır do`gereginde dizimge alıng'an tu`rlerdin` ta`riplemesi ha'm suwretleri keltirildi. Bul mag`lumatlardı zoologıyanın` tiyisli temaların oqıtıwda jergilikli materiallar retinde paydalanıw mu`mkin.

BAP-1. SALI O`SIMLIGI HA`M ONIN` TAMIR DO`GEREGI TOPI- RAQLARININ` NEMATODALARI (A`debiyatlardı sholiw)

G`a`rezsiz Ma`mleketlerdin` dosliq awqamı (G`MDA) ellerinde salı nematoda kesellikleri ju`da` az u`yrenilgen. Birinshi ret salı fitonematodları boyınsha 1935 jılı Arqa Kavkazda M.M. Levashov ta`repinen izertlew jumısları ju`rgizilgen. Bul izerlew barısında salı o`simliginde parazit nematodlardın` to`mendegi tukımlasları anıqlang`an: *Cephalobidae*, *Tilenchidae*, *Aphelenchoidae*.

O`zbekistan Respublikasında birinshi ret Zarafshan oypatlıqların-da 1949 jılı A. T. Tulaganov ta`repinen o`simlik fitonematodları izertle-ne basladı. A. T. Tulaganov mag`lıwmatı boyınsha da`nli o`simliklerdin` tamırı ha`m tamır a`tırıp topıraqlarında jasap tirishilik etiwshi nematodlardın` 88 tu`ri ko`rsetilgen. A`sirese bulardın` ishinde, salı o`simligin - 60 tu`r, biydayda -16, arpada - 12, tu`r anıqlang`an. Bulardın` ishinde to`mendegi parazit nematodlar ko`rsetilgen: *Anguillulina angusta*, *A. Dipsaci*, *A. multicinta*, *A. Pratensis*, *A. Tritic*.

Z. İ. Mamonov ta`repinen 1956 jılı salı fitonematodların izert-lew dawam ettirildi. Ol Bashkurstan selektsiya stantsiyasında salı atızların tekserip parazit *Aphelenchus avenae* nematodası salı o`simligine u`lken zıyan keltirgenligin atap ko`rsetti.

Qaraqalpaqstan Respublikasında, atap aytqanda Qıpshaq, Qon`ırat, Shomanay ha`m Xojeli rayonlarında S.M. Karimova ta`repinen 1957 jılı awıl-xojalıq eginlerinin`, sonın` ishinde da`nli o`simliklerdin` nematoda fauanası boyınsha alıp barg`an izertlew jumısları zıyankes parazit nematodalardı tekseriw boyınsha birinshi qa`demlar bolıp esaplanadı. Sondayaq bul jerde awıl xojalıg`ı o`simliklerinin` zıyankes nematodaları ha`m olarg`a qarsı gu`res ila`jleri boyınsha A.T.Tulaganov (1958) ko`plegen ilimiy jumıslar alıp bardı ha`m basshılıq etti. Ol A`miw`daryanın` on` jag`alawında jaylasqan bes rayondı Kuybıshev, Kegeyli, Shomanay, Shabbaz ha`m To`rtkul rayonlarındag`ı da`nli o`simliklerdin` nematodı faunasın izertlew na`tiyjesinde bul rayonlarda 92 tu`r parazit nematodanı anıqladı ha`m olardın` tu`r quramı ko`birek ha`r qıylıraq bolıp ushırasatug`ın parazit

nematodalar to'mendegi tuwıslarg'a kiretug'ınlıg'ın ko`rsetip berdi: *Ditylenchus*, *Rotylenchus*, *Pratylenchus*, *Aphelenchus*, *Aphelenchoides*.

1960 jılı Rossiya federatsiyasının` oraylıq regionları bolg`an Moskva, Lipetsk, Smolenskiy, Gor`kiy oblastlarında T.S. Skarbilovich, G.T.Ovechnikov ha`m D.İ.Afanas`evlar da`nli eginler,sonın` ishinde salı nematodalar faunasın tekserip, izertlengen ulıwma o`simliklerdin` 1,8 % paqal nematodası - *Ditylenchus dipsaci* (Kuhn, 1957) menen, 80 % paqaldın` to`mengi ta`repi geksatilen - *Hexatylenus vigisi* (Skarbilobih, 1952) ha`m 7 % o`simlik ag`zaları tolıq afelenxoy nematodası - *Aphelenchoides spinaedatus* (Skarbilobih, 1957) menen ziyanlang`an. Bul avtorlar da`nli o`simliklerden tabılg`an nematodalar dizimin 18 tu`rge ko`beytti. Usılardın` ishinde 3-tu`ri parazit nematodlar, atap aytqanda *Ditylenchus dipsaci*, *Aphelenchoides spinacandatus* bolıp esaplanadı.

O`zbekistanda salı o`simligi ha`m onın` rizosferasındag`ı nematoda-lar faunası haqqında V.F.Maslennikova ko`plegen jumıslar issledi (Maslennokova 1963, 1965 a,b, 1966).

Son`g`ı da`wirlerde G`MDA ha`m shet el ilimpazları ta`repinnen salı o`simligi ha`m onın` tamır a`tirapı topıraqlarında parazit nematolardın` bar ekeneligi ha`m olardın` zu`ra`a`tki keri ta`sir etetug'ınlıg`ı haqqında ko`plegen mag`lumatlar keltirilmekte. Bul derekler boyınsha salnınn` jer u`sti er astı bo`legi ta`n patogen effektke iye *Aplenchoides besseyi* ha`m *Ditylenchus angustus* nematoda tu`rleri menen ziyanlanatug'ınlıg`ı anıqlang`an. A`sirese salnınn` qa`wipli ziyakesi salı afelenxı - *Aplenchoides besseyi* bolıp esaplanadı.

Salı o`simliginin` jer astı bo`legin qubla bo`rtpe nematodası - *Melodogyne incognita* kesellendiredi (Adilova 1965,1966,1967; Kmuzova 1965; Eroshenko 1967; İvanova 1968; Kmuzova,Tixonova 1969; Rasulov 1970).

Qaraqalpaqstan Respublikası jag`dayında salı o`simligi ha`m onın` tamır a`tirapı topıraqlarının` nematoda faunası boyınsha 1967 jılı A.Utambetov ta`repinen ko`plegen ilimiy izertlew jumısları alıp barılğ`an. Onın` tiykarg`ı ilimiy izertlewleri Shıbay rayonının` Mayjap, Oktyabr, Taxtako`pir rayonının` Qarao`zek, Madeniyat, Qon`ırat rayonının` Altınko`l, Rawshan, Chapaev, Shomanay

rayonının` Sarı altın ha`m Kegeyli rayonının` Shortanbay xojalıqlarının` salı atızlarında ju`rgizilgen.

A.Utambetovtın` mag`lıwmatı boyınsha izertlengen xojalıqlarda salı o`simligi ha`m onın` rizosferasınnan nematodalardıń 95 tu`ri dizimge alıng`an. Bul nematodalardıń 22 tu`ri salı o`simligi ha`m onın` tamır do`geregi ushın birinshi ma`rtebe dizimge alıng`an, al 11 tu`ri buring`ı awqam faunası ushın taza bolıp esaplang`an ha`m ol 203 tu`rge jetken. A.Utambetov tapqan nematodalar faunası tiykarınnan 4 otryadka kiredi, atap aytkanda: xromadridalar otryadına 9 tuwıs ha`m 26 tu`r, enoplidalar otryadına – 14 tuwıs ha`m 24 tu`r, ravditidler toparına 14 tuwıs ha`m 26 tu`r ha`mde tilenxidalar otryadına 8 tuwıs ha`m 19 tu`r kiredi.

Bizin` izertlew jumıslarımız joqarıda keltirilgen ilimiy jumıs mag`lıwmatlarına qosımsha boladı dep esaplaymız. Bizin` izertlew jumıs-larımız salı o`simligi ha`m onın` tamır do`geregi topıraqlarındag`ı nematodalar faunasın, sondayaq zıyankes parazit tu`rlerin anıqlawdan ibarat ha`m bul mag`lıwmatlardı jergilikli material retinde oqıw barsında qollanıw mu`mkinshiliklerin izlewden ibarat.

BAP-2. İZERTLEW ORNI, MATERIAL HA`M METODİKA

2.1. İzertlew ornının` topıraq-ıqlım sha`riyatlarına qısqasha sıpatlama

Bizin` ilimiy izertlew jumıslarımız salı o`simliginin` tamır ha`m tamır do`geregi topıraqlarının` nematodalar faunası bolıp esaplanadı. Mag`lıwmatlar toplaw tiykarınan salı o`simliginin` ha`m onın` tamır do`geregi topıraqları bolıp, bul tiykarınan Shomanay rayonının` Q.Abdullaev atındag`ı xojalıq aymag`ında jaylasqan eki (0,18+0,14 ga) jeke menshik iyelerinin` ja`mi 32 akr jerinde alıp barıldı.

Meteostantsiyanın` mag`lıwmatları boyınsha bul rayonda hawanın` ortasha jıllıq temperaturası 8,0-10,1 °S tı quraydı. Maksimal` temperatura iyul` ayında +42,4 °S, al minimal temperatura yanvar` ayında -25,9 °S tı quraydı. Gu`zgi birinshi ton`law protsessi noyabr` ayında bolıp, son`g`ı ton`lıw baha`rgi mart-aprel` ayında bayqaladı. Jıllıq jawın shashının` mug`darı ortasha 100,7 mm bolg`an. Ko`pshilik mug`darda jawın shashının` bolıwı ba`ha`r ma`wsiminde - 42,2 mm, qısta -24,0 mm, gu`zde -17,4 mm, jaz aylarında-12 mm bolg`an. Birinshi qar tu`siw noyabr`-dekabar` keyingi qar jabıw mart ayına tuwra keledi. Suw menen ta`miynlew derekleri Suwenli kanalı, jer astı ha`m jer u`sti qatlamlarının` suwları bolıp esaplanadı. Bulardın` tiykarı A`miwdar`yanın` suwı bolıp esaplanadı. Topıraqtın` mexanikalıq quramı boyınsha ılaylı (glinistiy) ha`m suglinistiy, ayırım orınlarda supeschanıy topıraqlar ushırasadı, al ayırım jerler shor ha`m qumlu qatlamlardan ibarat.

2.2. Material ha`m metodika

Nematodalardı analiz islew tiykarınan 2011-jıldın` iyul`, avgust ayında salı o`simliginin` Avangard sortının` rawajlanıw basqışlarında alıp barıldı. İzertlew da`wirinde 25 proba, yag`nıy tamır do`geregi topıraq qatlamlarının` 0-10 sm, 10-20 sm ha`m 20-30 sm teren`liklerinin` ha`r birinnen 5 probadan, 5 proba o`simlik

tamırınnan ha`mde 5 proba paqal ha`m japıraqlardan alındı ha`m bul probalardıń barlıg`innanda nematodalar tabıldı (1-Keste).

1 - Keste. Salı o`simligi ha`m onıń rizosferasınıń nematodalar faunasın izertlew ushın alıń`an probalar sanı.

№	Nematodalardı anıqlaw ushın tekseriwge alıń`an u`lgilerdin`			
	Ornı	Sanı	Nematoda barı	%
1.	Tamır	5	5	100
2.	Paqal ha`m japıraqlar	5	5	100
3.	Topıraq qatlamları:			
	00-10 sm	5	5	100
	10-20 sm	5	5	100
	20-30 sm	5	5	100
	JA`MI:	25	23	100

Topıraq ha`m salı o`simligi denesinnen nematodalardı ayırıp alıw ushın bizler, Bermannın` modifikatsiyalang`an Sharshar metodınan paydalandıq. Ha`r bir analizlengen o`simlik bo`limleri suw menen juwıldı. Salı o`simliginin` jer u`sti ha`m tamır organların 0,5 sm uzınlıqta mayda bo`lekshelerge bo`lemiz ha`m marlı salfetkag`a salıp awzın sabaq penen baylap, suwı bar sharsharg`a jaylastıramız. Sharshardın` to`mengi ushına rezina tu`tik tutastırıp, ol zajim menen qısıp qoyıladi. Bir sutkadan keyin zajim ashıladi, suyıqlıq penen nematodalar probirkag`a tu`sedi ha`m 4 % formalinge fiksatsiya etiledi. Nematodalardı ayırıw Binokulyar mikraskop ja`rdeminde bolıp, jin`ishke tintiwshi iyne ja`rdeminde alıp barıladi. Nematodalar oyıs aynag`a o`tkerilip taza suw tamızıladi. Nematodalardı probadan ayırıp alg`annan keyin spirt ha`m glitsirin (1:1) quyıladi ha`m bir sutka qoyıladi. Tayar preparat tayarlaw ushın nematodalardan ha`m og`an bir tamshı glitserin-jelatına tamızılıp u`stinen jabıwshı ayna jabıladi.

Ha`r bir uaqıtsha preparatqa bizler 5-6 nematoda salıp tayarladıq ha`m nematodanın` tu`r atı, tabılğ`an jeri jazıp qoyıldı. Tayar preparattın` etiketkasına proba alıń`an nomeri, nematoda sanı, rayonı, uslang`an ku`ni ha`m jıynag`an adamnıń ismi sha`ripi jazıp qoyıladi.

BAP-3. SALI O`SIMLIGI HA`M ONIN` TAMIR DO`GEREGI TOPIRAQLARINDAG`I NEMATODALAR FAUNASI

Shomanay rayoni M.Abdullaev xojalig`indag`i sali o`simligi ha`m onin` tamir do`geregi topiraqlarindag`i nematodalar faunasi bizin` mag`lumatlarimiz boyinsha eki kishi klassqa, 4 toparg`a, 10 tukimlasqa ha`m 15 tuisqa kiretug`in 21 tu`r ekenligi aniqlandi (Keste 1).

Rhabditida toparina 2 tukimlasqa (*Panagrolaimidae*, *Cephalobidae*), 5 tuwisqa (*Panagrolaimus*, *Heterocephalobus*, *Cephalobus*, *Eucephalobus*, *Acrobeloides*) kiretug`in 7 tu`rdegi nematodalar belgili bolip bul uliwma aniqlang`an nematodalar tu`rinin` 33,3 % tutadi ha`m uliwma nematodalar saninin` 35,0 % quraydi.

Keste-1. Sali o`simligi ha`m onin` tamir do`geregi topiraqlarinda tabilg`an nematoda tu`rlerinin` sapa ko`rsetkishleri

№	Topar	Tukimlas		Tuis		Tu`r		Osoblar sani	
		sani	%	sani	%	sani	%	dana	%
1	<i>Rhabditida</i>	2	20,0	5	33,3	7	33,3	79	35,0
2	<i>Enoplida</i>	1	10,0	1	6,6	1	4,8	7	3,1
3	<i>Dorylaimida</i>	3	30,0	4	26,6	7	33,3	64	28,3
4	<i>Tylenchida</i>	4	40,0	5	33,3	6	28,6	76	33,6
Σ	4	10		15		21		226	100

Enoplida toparinda jalg`iz bir *Onchulidae* tukimlası bolip, og`an tek bir tu`r-*Prismatolaimus dolichurus* kiredi ha`m ol aniqlang`an uliwma nematodalar tu`rinin` 4,8 % , al saninin` 3,1 % tutadi.

Dorylaimida topari 3 tukimlasqa (*Prodorylaimidae*, *Discolaimidae*, *Qudsianematidae*) 4 tuwis (*Prodorylaimus*, *Discolaimum*, *Eudorylaimus*, *Labronema*) ha`m 7 tu`rdi o`z ishine alip bul uliwma aniqlang`an nematoda tu`rinin` 33,3 % ha`m osoblar saninin` 28,3 % tutadi.

Tylenchida toparina 4 tukimlasqa (*Hoplolaimidae*, *Tylenchidae*, *Aphelenchidae*, *Aphelenchoididae*) 5 tuisti (*Tylenchorynchus*, *Tylenchus*,

Ditylenchus, *Aphelenchus*, *Aphelenchoides*) o'z ishini alıp 8 tu'r kiredi. Bul ulıwma anıqlang'an nematoda tu'rinin` 27,6 %, jami osoblar sanının` 30,9 % iyeleydi (Keste 1 ha`m 2).

Keste- 2. Salı o`simligi ha`m onın` rizosfera topıraq`ındag`ı nematodalar faunasının` lokalizatsiyası

№	Nematoda tu`rleri	Lokalizatsiya					
		Topıraq qatlamı, sm			O`simlik ag`zası		Ja`mi
		0-10	10-20	20-30	Paqal, japraq	Tamır	
	I. Topar. Rhabditida						
	1. Tukımlas. Panagrolaimidae						
	Tuis. Panagrolaimus						
1	<i>Panagrolaimus rigidus</i>				4	10	14
2	<i>P. armatus</i>	6	3	1			10
3	<i>P. longicaudatus</i>	4	2	1			7
	2. Tukımlas. Cephalobidae						
	Tuis. Heterocephalobus						
4	<i>Heterocephalobus elongatus</i>				4	15	19
	Tuis. Cephalobus						
5	<i>Cephalobus persegnis</i>		1		2	4	7
	Tuis. Eucephalobus						
6	<i>Eucephalobus striatus</i>	2	4				6
	Tuis. Acrobeloides						
7	<i>Acrobeloides clavicaudatus</i>	1	2	2	2	9	16
	II. Topar. Enoplida						
	3. Tukımlas. Onchulidae						
	Tuis. Pristomatolaimus						
8	<i>Pristomatolaimus dolichurus</i>	3	2	2			7
	III. Topar. Dorylaimida						
	4. Tukımlas. Prodorylaimidae						
	Tuis. Prodorylaimus						
9	<i>Prodorylaimus longicaudatus</i>					12	12
	5. Tukımlas. Discolaimidae						
	Tuis. Discolaimium						
10	<i>Discolaimium cylindricum</i>	3	2	2			7
	6. Tukımlas. Qudsianematidae						
	Tuis. Eudorylaimus						

11	<i>Eudorylaimus monohystera</i>				2	3	5
12	<i>E. paraobtusicaudatus</i>	4	3	1	1	3	12
13	<i>E. parvulus</i>	5	2	2			9
14	<i>E. similis</i>	4	1	1			6
	Tuis. Labronema						
15	<i>Labronema eudorylaimoides</i>	1	4	2	2	4	13
	IY. Topar. Tylenchida						
	7. Tukimlas. Hoplolaimidae						
	Tuis. Tylenchorynchus						
16	<i>Tylenchorynchus tener</i>				3	7	10
	8. Tukimlas. Tylenchidae						
	Tuis. Tylenchus						
17	<i>Tylenchus davainei</i>	6	4	4			14
	Tuis. Ditylenchus						
18	<i>Ditylenchus dipsaci</i>				4	14	18
	9. Tukimlas. Aphelenchidae						
	Tuis. Aphelenchus						
19	<i>Aphelenchus avenae</i>	1	2		2	6	11
	10. Tukimlas. Aphelenchoididae						
	Tuis. Aphelenchoides						
20	<i>Aphelenchoides kuehnii</i>				2	8	10
21	<i>A. parietinus</i>				3	10	13
I. Jami tu`rler sanı, dana:		12	13	10	12	13	21
%		57,1	61,9	47,6	57,1	61,9	100
II. Jami osoblar sanı, dana:		40	32	18	31	105	226
%		17,7	14,5	8,0	13,7	46,4	100

Salı tamırı a`tırıpı **topırag`ının` 0-10 sm** shuqırlıq qabatındag`ı nematodalar faunası 12 tu`rden ibarat bolıp ulıuma turler sanının` 57,1 %, al` osoblar sanının` 17,7 % in, yag`nıy 12 dana nematodadan ibarat bo-ladı.

Joqarıda, 2- kestede korsetilgen nematodalar ishinde, *Panagrolaimus longicaudatus* salı o`simliginin` tamır a`tırıpı topıraqlarında Qaraqalpaqstan ushın birinshi ma`rtebe esapqa alındı ha`m ol basqa topıraq qatlamlarında da ushırasadı.

Bul topıraq qatlamında tiykarınan to`mendegi 4 tu`r: *P. armatus*, *P. longicaudatus*, *E. parvulus*, *Tylenchus davainei* ko`birek ushırasadı. Bul qatlamda *Acrobeloides clavicaudatus*, *Labronema eudorylaimoides* ha`m *Aphelenchus avenae* nematodaları kem xarakterli boldı.

Tamır do`geregı **topıraqlarının` 10-20 sm** teren`liktegi qatlam-larınan 13 tu`r tabılıp, ulıwma izertlengen nematodalar sanının` 14,5 % quraydı.

Usı topıraq qatlamında *Eucephalobus striatus*, *Labronema eudorylaimoides* ha`m *Tylenchus davainei* tu`rleri ko`birek ushırastı, al *Cephalobus persegnis* ha`m *E. similis* tu`rleri tek jalg`ız danadan ushırastı. Bul topıraq qatlamında tiykarınnan *Panagrolaimus*, *Cephalobus*, *Eucephalobus*, *Acrobeloides*, *Discolaimium*, *Eudorylaimus* ha`m *Aphelenchus* tuwıslarının` tu`rleri bolıp esaplanadı (2-Keste).

Joqarıda keltirip o`tken 2-keste mag`lıwmatlarında ko`rsetkenimiz-dey salı o`simliginin` tamır a`tırıpı **topıraq teren`liginin` 20-30 sm** qatlamında nematodalar faunası 10 tu`rdi (47,6 %) qurap, ulıwma tabılğ`an nematoda osoblar sanının` 8,0 % quraydı.

Bizin` izertlewimiz na`tiyjesinde *Tylenchus davainei* nematodası-nın` usı topıraq qabatında jiyirek, al qalg`an nematoda tu`rlerinin` 1-2 danadan ushırasatug`ınlıg`ı ma`lim boldı.

№ 2 kestedegi mag`lıwmatlar boyınsha salı o`simliginin` **paqal ha`m japıraq`ınan** 12 tu`rge kiriwshi, 31 dana nematoda anıqlandı. Bul ulıwma nematodalar sanının` 13,7 % quraydı. Bulardan 3 tu`ri *Panagrolaimus rigidus*, *Heterocephalobus elongatus* ha`m *Ditylenchus dipsaci* basqalarına qarag`anda jiyirek ushırastı. Qalg`an 9 tu`r bolsa 1-2 danadan tabıldı (2- keste).

Joqarıda keltirip o`tkenimizdey 2 - kestedegi mag`lıwmatlar boyın-sha salı o`simliginin` tamır sistemasının` nematodalar faunası salıs-tırmalı tu`rde anag`urlım da`rejede tıg`ız bolıp, bul jerde 13 tu`rge kiriwshi 105 dana (46,4 %) nematoda anıqlandı ha`m 1 tu`r - *Prodorylaimus longicaudatus* nematodası basqa topıraq qatlamlırında ha`mde paqal ha`m japırqta ushıraspadı.

A Utambetovtın` (1971) Qaraqalpaqstan salı o`simligi ha`m onın` tamır do`geregı topıraqlarındag`ı nematodalar faunası boyınsha berilgen mag`lıwmatı menen bizin` izertlew na`tiyjelerin salıstırg`anımızda sapa ko`setkishleri keskin parıqlanbaytug`ınlıg`ı belgili boldı.

Solay etip, salı o`simligi ha`m onın` tamır do`geregi topıraqlarının` nematoda faunası u`yrenilgen Shomanay rayonu M.Abdullaev xojalıg`ı ushın bizin` bul mag`lumatlarımız birinshi ret izertlengen bolıp esaplanadı.

BAP-4. TABILG`AN TU`RLERDİN` SİSTEMATİKALIQ JAG`DAYI HA`M TA`RİPLEMESİ

Shomanay rayonında izertlengen bizin` mag`lıwmatlarımız boyınsha salı o`simligi ha`m onın` tamır do`geregi topıraqlarında ushırasqan nematodalar sistematalıq jaqtan bir kishi klassqa 4 toparga, 10 tuxımlas ha`m 15 tuwısqa kiretug`ın 21 tu`rden ibarat (Keste 3). Sonnan to`mendegi 5 tu`r: *Panagrolaimus armatus*, *P. longicaudatus*, *Prismatolaimus dolichurus*, *Discolaimium cylindricum*, *Aphelenchoides kuehnii* izertlengen aymaq ushın salı o`simligi ha`m onın` tamır do`geregi topıraqlarında birinshi ret esapqa alındı. Biz to`mendegi 3-kestede tabılğ`an don`gelek qurtlardın` sistematalıq klassifikatsiyasın keltirip o`temiz:

Keste – 3. Salı o`simligi ha`m onın` rizosfera topırag`ındag`ı nematodalar faunasının` sistematalıq klassifikatsiyası

№	Topar	Tukımlas	Tus	Tu`p.
1	<i>Rhabditida</i>	<i>Panagrolaimidae</i>	<i>Panagrolaimus</i>	<i>Panagrolaimus rigidus</i>
2				<i>P. armatus*</i>
3				<i>P. longicaudatus*</i>
4		<i>Cephalobidae</i>	<i>Heterocephalobus</i>	<i>Heterocephalobus elongatus</i>
5			<i>Cephalobus</i>	<i>Cephalobus persegnis</i>
6			<i>Eucephalobus</i>	<i>Eucephalobus striatus</i>
7			<i>Acrobeloides</i>	<i>Acrobeloides clavicaudatus</i>
8	<i>Enoplida</i>	<i>Onchulidae</i>	<i>Prismatolaimus</i>	<i>Prismatolaimus dolichurus*</i>
9	<i>Dorylaimida</i>	<i>Prodorylaimidae</i>	<i>Prodorylaimus</i>	<i>Prodorylaimus longicaudatus</i>
10		<i>Discolaimidae</i>	<i>Discolaimium</i>	<i>Discolaimium cylindricum*</i>
11		<i>Qudsianematidae</i>	<i>Eudorylaimus</i>	<i>Eudorylaimus monohystera</i>
12				<i>E. paraobtusicaudatus</i>
13				<i>E. parvulus</i>
14				<i>E. similis</i>
15			<i>Labronema</i>	<i>Labronema eudorylaimoides</i>
16	<i>Tylenchida</i>	<i>Hoplolaimidae</i>	<i>Tylenchorynchus</i>	<i>Tylenchorynchus tener</i>
17		<i>Tylenchidae</i>	<i>Tylenchus</i>	<i>Tylenchus davainei</i>
18			<i>Ditylenchus</i>	<i>Ditylenchus dipsaci</i>
19		<i>Aphelenchidae</i>	<i>Aphelenchus</i>	<i>Aphelenchus avenae</i>
20		<i>Aphelenchoididae</i>	<i>Aphelenchoides</i>	<i>Aphelenchoides kuehnii*</i>
21				<i>A. parietinus</i>
Σ:	4	10	15	21

Esletpe: *- Shomanay rayonı ushın salı ha`m onın` rizosfera topıraqlarında jan`adan dizimnen o`tken tu`rler.

Biz salı ha'm onın tamır do'geregi topıraqların izzertlew na'tiyje-leri boyınsha anıqlang'an nematodalardıń sistematalıq tu'r quramının ta'rtibin Gudeyding izbe-izlik dizimi boyınsha beremiz (Goodey,1963).

Tu'rlerdi ta'riplewde tiykarınan nematodalardıń geografiyalıq tarqalıwı ha'm olardıń dene o'lsheimleri basqa avtorlardıń mag'lıwmat-larına salıstırılıp keltirildi. Nematodalardı o'lshew De Man (De Man, 1884) formulası boyınsha orındandı, bunda a = vul'va a'tirapındag'ı dene ken'liginin, nematoda denesinin ulıwma uzınlıg'ına qatnası; s = ulıwma dene uzınlıg'ının, quyırıq uzınlıg'ına qatnası: V = denenin aldındag'ı bo'liminen jınıs tesigi aralıg'ının, ulıwma dene uzınlıg'ına protsentte ko'rsetilgen qatnasın bildiredi.

Solay etip biz anıqlag'an 21 nematoda tu'rine fitogel'mintologiya iliminde, nematodalardıń sistematikasın islep shıg'ıwda u'lken miynet etken du'nyag'a belgili ilimpazlar Goodey (1963), E.S.Kir'yanova ha'm E.L.Kral' (1969, 1971), A.T.Tulaganov, A.Z.Usmanova (1975, 1978) lardıń sistematikag'a arnalğan kitaplarınan paydalanıp to'mendegishe qısqasha anatomo-morfologiyalıq ha'm sistematalıq ta'ripleme berip o'temiz.

Tip *Nemathelminthes* Schneider 1866.

Klass *Nematoda* Rudolphi 1808.

Kishi klass *Sesernentea* (Von Sinstow) 1905.


Otryad *Rhabditida* (Oerlew 1880) Chitwood 1933.

Tuxımlas *Panagrolaimidae* Thorne 1930.

Tuus. *Panagrolaimus* Fuchis 1930.

1. Tu'r. *Panagrolaimus rigidus* (Schneider, 1866) Fhorne,1937. **(60).** A.T.Tulaganovtın 1972 jılğ'ı mag'lıwmatı boyınsha $L=480$ mki, $a=24$ mki, $B=3,4$ $C=10$, $V=62,5\%$ (2-t, tab-12, 60).

Bizin mag'lıwmatlarımız boyınsha $L = 484$ mkm, $a = 24,1$ mkm, $B = 3,2$ $c = 3,2$, $V = 63,2 \%$ (1-su'wret).



1-Su`wret. *Panagrolaimus rigidus* (A.Schn.,1866)Thorne,1937(60).

Thorne,1937, A.T.Tulaganov, 1972 boyınsha(60): 60-uliwma ko`rinisi, 60a-bası, 60a- samkanın` quyrig`ı, 60v-sametstin` quyrig`ı.

Sırtqı kutikula qabarı mayda juqa do`n`gelek saqiynalardan ibarat. Bas ha`m erin papillaları kelte. Stoması onsha teren` emes. O`n`eshi kushli rawajlang`an, panagrolanmoyd tipinde. Nerv saqiynası istimustın` ortasında jaylasqan. Vul`va postekvatorial` turde jaylasqan. Samkasının` quyırıq bo`limi jin`ishkereyip, ushlı ha`m o`tkir bolıp keledi, terminusqa quramalı emes, jen`il ornasqan.

Devisoprobiont ekologiyalıq toparına kiredi, bul tur uvikovist bolıp ken` tarqalg`an.

Amerika, Angliya. GMDA da Rossiyanın` Moskva, Amurskiy, Primorskiy kraylarında, Moldaviya ha`m Orta Aziyada ken` tarqalg`an.

O`zbekstan Respublikasında Namangan, Andijan, Tashkent oblastlarında, Qaraqalpaqstan Respublikasının` Qanlıko`l, Taxtako`pir, Kegeyli, Qon`irat rayonlarında dizimge aling`an.

Biz bul turdi izertlew barısında salı o`simliginin` paqal-japıraq ha`m tamır sistemasında esapqa aldıq.

2. Tu`r. *Panagrolaimus armatus* (Fgorne 1937) Riim 1956 (52).

E.S.Strepkovanın` 1973 jılg`ı mag`lıwmatı boyınsha (2-t, tab-10, 52):

$L = 652 \text{ mki}$, $a = 18 \text{ mkm}$, $B = 4,7$ $c = 10$, $V = 57 \%$. (2-t, tab-10, 52)

Bizin` mag`lıwmatlar boyınsha: $L=638 \text{ mkm}$, $a=17 \text{ mkm}$, $B = 4,0$ $C=9,7$ $V = 56,0\%$.

Kutikulası bir tegis mayda saqiynalardan turadı. Stoması dorsal` ha`m eki subventeral` o`simshe-tissheler menen qurallang`an, bul tissheler qozg`almalı bolıp awqatlıq zatlardı o`n`eshke maydalap jiberiwde xızmet etedi. Kardial` bul`bustın` ken`ligi dene eninen 2-3 ese u`lken. Vulvası ma`yeklik tiykarınan shama menen anus aralıg`ının` ten` yarımına shekem sozılğ`an. Quyırıq bo`limi samka ha`m sametslere qalqan sıyaqlı bolıp ushlı terminustan ibarat.

Bul tu`r *devisaprobiont*, bolıp Amerika, Germaniya, ha`m Kuba Respublikası territoriyalarında belgili. G`MDA aymaqlarında Dag`ıstan Respublikası, Rossiyanın` Chelyabinsk, Kirov oblastlarında ha`m Qırğ`ızstan ma`mleketlerinde belgili.

O'zbekstan Respublikasida paxta, jon'ishqa, la'blebi, qulpinay, ha'm basqa o'simliklardin` paqal, japıraq, tamır ha'm tamır a'tirapında topıraqlarda Samarqand, Ferg`ana ha'm Namangan oblastlarında Qaraqalpaqstan Respublikasının` Qon`ırat, Shomanay (Qanlıko`l), Kegeyli rayonlarında tarqalg`an.

Bul nematodanı bizler izertlengen barlıq topıraq qatlamlarında, a`sirese 0-10 sm qabatta ko`birek ushıratıq.

3. Tu`r. *Panagrolaimus longicaudatus* Sumenkova 1965, (55).


A.Utambetovtın` 1971 jılğ`ı mag`lıwmatı boyınsha (2-t, tab-11, 55) L=784 mkm, a=29,2 mkm, B=5,5 C=9,8 (2-su`wret)..

Denesinin` bas ha'm quyırq bo`limleri jin`ishkelenip tarayg`an. Sametslerinin` pishini du`ziw ha'm jin`ishke bolıp quyırq bo`liminin` ekinshi yarımı jin`ishkelenip, ushlı bolıp keledi. Kutikulası mayda jin`ishke saqıynalı. Bastın` en`se bo`limi jaqsı rawajlang`an. O`n`esh panagrolaymoyd tipinde du`zilgen. Spikulası enli, iri korpuslı.

Devisaprobiontlar ekologiyalıq toparına kiredi. O`zbekstanda salı atızlardan, g`arbizdın` tamır ha'm do`geregi topıraq qatlamlarınan, juzim ha'm gladiolus o'simliklerinde bar ekenligi esapqa alıng`an.

Ferg`ana, Samarqand oblastlarında, Qaraqalpaqstan Respublikasının` Kegeyli, Qon`ırat, Shomanay ha'm Taxtako`pir rayonlarında tarqalg`an.

Bul turdi bizler salı o'simliginin` tamır do`geregi topıraqlarının` barlıq shuqırılıqtag`ı qatlamlarında esapqa aldıq.



2-Su`wret. *Panagrolaimus longicaudatus* Sumenkova 1965, (55).

Sumenkova, 1965 boyinsha: 55- denenin` aldın`g`ı bo`limi, 55a-vul`va oblasti, 55b-samkanın` quyrig`ı, 55v- sametstin` qyrig`ı.

Tuximlas *Cephalobidae* Filipjev 1939.

Tuus *Heterocephalobus* (Brzeski 1960) Brzeski.

4. Tu`p. *Heterocephalobus elongatus*. 1967 (66).

A.U.Tulaganovtın` 1972 jıl g`ı mag`lıwmatı boyınsha $L = 432-1100$ mkm, $a = 24-38$ mkm, $B = 3,9-5$, $C = 11,3$, $V = 54,0-65,0\%$ (t-2, tab-13, 66).

Bizin` mag`lıwmatlarımız boyınsha $L = 502$ mkm, $a = 32,0$ mkm, $B = 3,1$, $C = 11,6$, $V = 61,3\%$ (3-su`wret)..


Kutikulası jin`ishke. Bastın` aldın`g`ı jag`ı jalpayg`an, erni to`men tu`sin`ki. O`n`esh durıs du`ziwine jaylasqan, gewdesi tsilindr formasında. Nerv saqıynası ha`m bo`lip shıg`arıw tesigi meta korpustın` qatarında jaylasqan.

Devisaprobiont. Oraylıq Evropa ha`m Amerikada belgili, G`MDA da Gruziya, Qazaxstan, Azerbaijan, Estoniya, Rossiyanın` Vladimirskiy, Tomskiy, Moskva oblastlarında, biyta`rep Turkmenistan mamleketinde tarqalg`an.

O`zbekstan Respublikasında asqabaq, g`awasha, tarı, juweri ha`m baklajan o`simliklerinin` paqal, japıraq, tamır ha`m tamır do`geregi topıraqlarınan anıqlang`an.

Namangan, Tashkent, Samarqand, Sırdar`ya oblastlarında, Qaraqalpaqstan Respublikasının` Qon`ırat, Shomanay, Kegeyli, Taxtako`pir rayonlarında tarqalg`an.

Bizler bul turdi salı o`simliginin` paqal-japıraq ha`m tamır sistemasında tawıp anıqladıq.



**3-Su`wret. *Heterocephalobus elongates* (de Man, 1880)
Andr. 1967(66).**

Andrassy, 1967; A.T.Tulaganov, 1972 boyınsha (66): 66- denenin` aldın`g`ı bo`limi, 66a- denenin` bas bo`limi, 66b- vul`va oblast`ı, 66v-66g- quyırıqtın` ha`r qıylı formaları, 66d-sametstin` quyırığ`ı, 66e- spikula ha`m rulek.

Tuis: *Cephalobus* Bastian 1865.

5. Tu`r. *Cephalobus persegnis* Bastian 1865.

A. T. Tulaganovtın` 1972 jılğ`ı mag`lıwmatı boyınsha: $L=514-800$ mkm, $a=17-27$ mkm, $B=3,9-5$ $C=16-18$, $V=69,1\%$.

Denenin` aldındıg`ı ha`m keyingi ta`repleri az-azdan tarayg`an ha`m qursaq ta`repke qaray iyilgen. Kutikulası saqıynalı. Stoması uzın, korpus tsilindr formasında, o`n`esh tuwrı jaylasqan. Bulbus onsha ulken emes. Nerv saqıynası ekskretor pora qatarında jaylasqan.

Devisaprobiont. Amerika, Afrika, Oraylıq Evropa, GMDA da, Estoniya, Qırğ`ızıstan, Turkmenistan, Tajikistan, Rossiyanın` Tomskiy, Moskva, Amurskiy wa`layatları territoriyalarında esapqa alındı.

O`zbekstan Respublikasında pomidor, sliva, ayva, qıyar, zemlyaniki, kapusta, g`arbız, qant qamısı o`simliklerinin` paqal, japıraq, tamır ha`m tamır do`geregi topıraqları qatlamlarınan esapqa alındıg`an.

Bul nematoda Sırdar`ya oblastının Urgut, Samarqand rayonlarındı, Qaraqalpaqstan Respublikasının` Qon`ırat, Shomanay, Xojeli Kegeyli, rayonlarında ken` tarqalg`an.

Bul turdi bizler salı o`simliginin` paqal-japıraq, tamır sistemasında anıqladıq.

Tuis. *Eucephalobus* Steiner 1936.

6. Tu`r. *Eucephalobus striatus*, (Bastian 1865). Therne 1937.

A.T.Tulaganovtın` 1972 jılğ`ı mag`lıwmatı boyınsha: $L= 405-660$ mkm, $a= 18-25$ mkm, $B = 3,5-4$, $C = 10,2-14,0$, $V = 65,0 - 72,0 \%$.

Bizin` mag`lıwmatımız boyınsha: $L = 507$ mkm, $a = 22,4$ mkm, $B = 3,2$ $c = 12,5$, $V = 68,0 \%$

Denesi kem-kemnen tarayg`an. Kutikulasi juqa. Stoması a`zzi skeletlen-ip uzun ha`m jin`ishkelew boladı. O`n`esh tsilindr formasında, bul`busı kishkene do`n`gelek.

Devisoprobiont. Oraylıq Evropa ellerinde belgili. GMDA da Qazaxstan, Dag`ıstan, Bashkiriya Respublikalarında, Rossiyanın` Moskva, Tomskiy, Novosibirskiy, Primorskiy kraylarında tarqalg`an.

O`zbekstan Respublikasında shabdal, sliva, ayva, g`arbız, qawın, g`awasha jantaq, podorojnik, o`simliklerinin` paqal, japıraq, tamır ha`m tamır do`geregi topıraqlarının` anıqlanıp esapqa alındı.

O`zbekstan Respublikasında Ferg`ana, Zarafshan oypatlıg`ında Namangan oblastında Qaraqalpaqstan Respublikasının` To`rtko`l, Shabbaz ha`m Shoma-nay rayonlarında tarqalg`an.

Bul turdi bizler tamır sisteması do`gereginin` 0-10 sm ha`m 10-20 sm topıraq qatlamında taptıq.

Tuus. *Acrobelloides* Cobb 1924.

7. Tu`r. *Acrobelloides clavicaudatus* (Thorne, 1925) Thorne,

A.T. Tulaganovtın` 1972 jılg`ı mag`lıwmatı boyınsha $L=552$ mkm, $a=27,6$ mkm, $B=3,6$ $C=17,5$ $V=63,0\%$.

Bizin` mag`lıwmatımız boyınsha: $L = 541$ mkm, $A = 26,7$ mkm, $B = 3,1$ $C = 16,9$, $V = 61,2\%$

Kutikulasi ha`r turli saqıynadan ibarat. Erin probolı to`men jin`ishke tu`rde do`n`gelek plastiklardan ibarat. Prostoması jin`ishke ha`m uzun, xeylorabdionı juwanayg`an, xeylostoması prostomdan enli. Amfidiyası bas eninin` 1/3 bo`limine tuwra keledi. Denesi du`zilisi jag`ınan *Acrobelloides biltschlii*q nematodasına usaydı, biraq keyingi erin konusının` baslanıwı menen, *Acrobelloides clavicaudatus* tın` quyırqlı bolıwı ha`m denesinin` kishkeneligi menen ayrıladı. Sametsi ele tabılmag`an.

Devisaprobiont. Kaliforniyada belgli. G`MDA da birinshi ret jabayı zlak o`simliklerinde, a/x eginlerinnen lyutserina, g`awasha ha`m baw-bag`sha palız o`simliklerinin` paqal, japıraq, tamır ha`m tamır a`tırıpı topıraqlarınan anıqlang`an. Sırdar`ya oblastında İl`chevsk, Gulistan rayonları, Tashkent oblastının Aqqurg`an ha`m Joqarı Shırshıq rayon-larında tarqalg`an.

Bul turdi bizler topıraqtın` barlıq qatlamlarında ha`mde salı o`simliginin` paqal, japıraq ha`m tamır sistemasınan anıqladıq.

Topar. *Enoplida* (Baird, 1857) chitwood, 1933.

Tuxımlaska *Onchulidae* Andrassy, 1964.

Tuis *Prismatolaymus* de Man 1880,

8. Tu`r. *Prismatolaimus dolichurus*. De Man 1880.

A.Z.Usmanovtın` 1968 jılg`ı mag`lıwmatı boyınsha: $L = 571,1 \text{ mkm}$, $a = 39,1 \text{ mkm}$, $B = 4,5$, $C = 2,5$, $V = 36,3\%$.

Bizin` mag`lıwmatlarımız boyınsha $L = 553,4 \text{ mkm}$, $a = 38,4 \text{ mkm}$, $B = 4,2$, $C = 2,4$, $V = 35,9\%$

Denesi bir tegis duziw. Kutikulası jin`ishke saqıynalı. Stoması juqa diywallı. O`n`esh tsilindr ta`rizli. Ma`yeklik simmetriyalı bolıp jaylasqan bir juptan ibarat. Samka ha`m sametslerdin` quyırq bo`limleri biraz uzın boladı.

Bul tur *para-rizobiontlarg`a* kiredi. Topıraqta, suwda ha`m ko`pshilik o`simliklerdin` fizosferalarında ushıraydı. Oraylıq ha`m batıs Evropada, Kubada ma`mleketinde belgili. G`MDA da Rossiyanın` Kareliya, Qırğ`ızıstan, Gruziya Respublikaları territoriyalarında esapqa alıng`an.

O`zbekstan Respublikasında g`arbiz, qıyar, sliva, chereshnya, kartoshka, geshir, salı, kenaf, salı, ha`m g`awasha o`simliklerinin` rizoferalarınan tabılğ`an.

Samarqand oblastının` Pastargom, Samarqand, Urgut rayonlarında, Qaraqalpaqstan Respublikasının` Qıpshaq, Shomanay, Qon`irat, rayonlarında tarqalg`an.

Bul turdi bizler izertlengen barlıq topıraq qatlamlarında dizimge aldıq.

Otryad. *Dorylamida de Man, 1876.*

Tuxımlaska *Prodorylaimidae* Andrassy, 1969.

9. *Tu`r.Prodorylaimus longicaudatus* (Biitschli,1847) Andrassy,1959, (251).

A.Z.Usmanovanın` 1968 jılg`ı mag`lıwmatı boyınsha: $L = 1435,2$ mkm, $a = 34,5$ mkm, $B = 5,3$, $C = 4,8$, $V = 35$ %, (2-t, tab-63, 251).


Bizin` mag`lıwmatlarımız boyınsha: $L = 1303$ mkm, $a = 33,1$ mkm, $B = 5,0$, $C = 4,9$, $V = 34,8$ % (4-su`wret)..

Denenin` alding`ı ha`m keyingi ta`replerindegi kutikulası jin`ishke. O`n`esh biraz ken`eygen. Samkanın` quyırq bo`limi uzınlaw. Dene konturınan bası bo`limi azmaz anıq ko`rinetug`ın bolıp bo`leklengen, eni 20-21 mkm. Amfida dene eninin` yarım qatnasına iye aralıqtı iyeleydi. Kardiy uzın. Bul`va ayrıqsha skeletlengen. Vagina denenin` ten` yarımına jetedi.

Para-rizobiont. Topıraqta ha`m suwda tirishilik etedi. Afrika ha`m Evropag`a belgili. Litvada, G`MDA da Rossiyanın` Kaliningrad, Novosibirsk ha`m Tomskiy wa`layatlarına, Kareliya, Qazaxstan ha`m Pamir tawlarında tabılg`an.

O`zbekstanda zemlyanika, turpi, piyaz, pomidor, kartoshka, salı o`simliklerinin` tamır ha`m tamır a`tırıp topıraqlarınan esapqa alıng`an. Tashkent, Ferg`ana oblastı Marg`ulon rayonlarında tarqalg`an.

Bul turdi bizler salı o`simliginin` tamır sistemasında ushıratıq.



4-Su`wret. *Prodorylaimus longicaudatus* (Biitschli,1847) Andrassy,1959, (251).

Andrassy 1959; A.Z.Usmanova 1968 boyınsha: 251-denenin`aldın`g`ı bo`limi, 251a-vul`-va oblasti, 251b-samka quyriq bo`shlimi, 251g-supplementler, 251d-sametstin`anal`oblasti, 251e-sametstin`kuyriq bo`limi

Tuximlas *Discolaimidae* Siddigi, 1969.

Tuis *Discolaimium* Thorne, 1939.

10. Tu`r *Discolaimium cylindricum* Thorne, 1939 (296).

I. B. Adilovanin` 1973 jilg`ı mag`lıwmatı boyınsha: $L=1460$ mkm, $a=45$ mkm, $B=3,9$; $C=33$; $V=46,6\%$ (2-t, tab-77, 296).

Bizin` mag`lıwmatlarımız boyınsha: $L = 1404$ mkm, $a = 44,0$ mkm, $B = 3,6$; $C = 29,0$; $V = 46,1 \%$.

Denesi tsilindr ta`rizli. Kutikulada kese jolaq sızıqshalar jaqsı ko`rinedi. O`n`esh uzınlaw bolıp, onın` aldın`g`ı bo`limi tsilindr pishinde. Samka ha`m sametstın` quyırq bo`limi qayırıl`an, terminustın` ushı topır pishinde ornalsaqan.

Para-rizobiontlar toparına kiredi. Ha`r tu`rli awıl xojalıq eginlerinin` rizofera topıraq qatlamlarında tirishilik etedi.

İtaliya, İspaniya ha`m AQSh ma`mleketlerinde belgili. O`zbekstan Respublikasında Tashkent oblastlarında, VASXNİLdin` kortofel` ha`m bawbaqsha - palız eginleri instituti ilimiy-izertlew stantsiyası atızlarında esapqa alıng`an.

Biz bul tu`rdu`yrenilgen barlıq topıraq qatlamlarında dizimge aldıq.

Tuximlaska *Qudsianematidae* (Jairajpuzi, 1965) Sidderi, 1969.


Tuis. *Eudorylaimus* Andrassy, 1959.

11. Tu`r. *Eudorilaimus monohystera* (de Man, 1880) Andrassy. 1959.

A.T.Tulaganovtın` 1972 jilg`ı mag`lıwmatı boyınsha: $L = 900,2$ mkm, $a = 33,9$ mkm, $B = 4,3$; $C = 27,2$; $V = 34,8-45,5\%$.

Bizin` mag`lıwmatlarımız boyınsha: $L = 902,1$ mkm, $a = 33,6$ mkm, $B = 4,4$; $C = 28,0$; $V = 39,0 \%$ (5-su`wret)..

Nematodanın` denesi juwan. O`n`esh ken`eygen. Samka ha`m sametslerdin` quyırıg`ının` ush bo`limi ke-kem su`yirlengen ha`m arqa ta`repke qaray iyilgen.



Su`wret- 5. Tu`r *Discolaimium cylindricum* Thorne,1939 (296).

Thorne 1939; Adilovanin` 1973 boyinsha: 296-samkanin` quyriq bo`limi, 296a-, 296b-tu`rli jag`dayda bastin` ko`rinisi, 296v-o`n`eshtin` aldın`g`ı bo`limi, 296g-vul`va ha`m vagina, 296d-sametstin` quyriq bo`limi, 296e-denenin` aldın`g`ı ushınin` dorzal` ta`repi.

Nematoda *para-rizobiont* toparına kiredi. Topıraqta, dushshı suvlarda ha`mde ayırım jag`daylarda o`simlik tamırlarında tirishilik etedi.

Mongoliya ha`m Evropa ma`mleketlerinde anıqlıng`an. Belarussiya, Litva, Estoniya, G`MDA da Tajikistan, Turkmenistan, Qırg`ızistan, Ukrayna, Moldaviya, Kareliya, Bashkiriya respublikaları, biyta`rep Turkmenistan territoriyalarında esapqa alıng`an.

Samarqand oblastının Postargom, Urgut ha`m Samarqand rayonlarında, Qaraqalpaqstan Respublikasında Taxtako`pir, To`rtkul, Shomanay, Qon`ırat, Kegeyli rayonları territoriyalarında tarqalg`an.

Bul turdi bizler salı o`simliginin` pakal-japıraq ha`m tamır sistemalarında ushirattıq.

12. Tu`r. *Eudorylaimus paraobtusicaudatus* (Micoletzke, 1922) Andrassy, 1954.

A.T.Tulaganovtın` 1972 jılg`ı mag`lıwmatı boyınsha: L=1550-2200 mkm, a=20,7-29,6 mkm, B=3,7-4,0; C=46-71; V=54-60%.

Bizin` mag`lıwmatlarımız boyınsha: L = 1542 mkm, a = 24,1 mkm, B = 3,7; C = 55,2; Denedegi bas bo`liminin` keyini jin`ishkerip tarayg`an. Kop`esi kishkene, onın` uzınlıg`ı erin a`tırıpının` eni menen ten`. Samka ha`m sametstın` quyırq bo`limi topırlang`an bolıp, oraylıq sıızıqtan arqa ta`repi kesilgen.

Para-rizobiontlar toparına kiredi. O`simliklerdin` tamır ha`m tamır do`geregi topıraqlarınan ha`m siyrek paqalında tirishilik etedi.

Evropa ellerine belgili, G`MDA da Turkmenistan, Qırg`ızistan, Azerbaijan, Qazaxstan, Gruziya respublikalarında, Rossiyanın` Tomsk, Novosibirsk, Kurskiy, Chelyabinsk oblastlarında, biyta`rep Turkmenistan ma`mleketlerinde esapqa alıng`an.

O`zbekstan Respublikası territoriyasında baklajan, jon`ishqa ha`m jabayı o`simliklerden paqal, japıraq, tamır ha`m tamır do`geregi topıraqlarınan esapqa alıng`an.

Samarqand oblastının Urgut, Pastargom, Samarqand rayonlarında, Qaraqalpaqstan Respublikasının Qon'irat, Kuybishev, Kegeyli, Shomanay rayonları territoriyalarında tarqalg'an.

Bul tu'rди bizler salı o'simliginin tamır do'geregi topıraqlarının barlıq qatlamlarında, ha'mde o'simlik organlarında dizimge aldıq.

13. Tu'r. *Eudorilaimus parvulus* (Fhorne, swanger, 1936) Andrassy, 1959.

P. K. Erjanovanın mag'lıwmatı boyınsha: $L=800$ mkm, $a=28$ mkm, $B=37$; $C=30,7$; $V=56,2\%$.

Bizin mag'lıwmatlarımız boyınsha: $L = 796$ mkm, $a = 27,7$ mkm, $B = 35,1$; $C = 30,2$; $V = 55,4 \%$.

Denenin turqı kishkene. Papillası onsha bilinbeydi. O'n'eshtin keyingi bo'limi ken'eygen. Quyırq bo'limi topır bolıp tamamlang'an, onın uzınlıg'ı denenin anus a'tırapı enine ten'.

Para-rizobiontlar toparına kiredi. Ten'iz suw otlarında, ha'r tu'rli o'simliklerdin tamır ha'm tamır a'tırapı topıraqlarında tirishilik etedi. AQSh ta belgili.

G'MDA territoriyalarında qulpınay, salı, g'awasha o'simliklerinin rizosfera topıraqlarında anıqlang'an.

Samarqand, Tashkent wa'layatları ha'm Ferg'ana oypatlıqlarında ken' tarqalg'an.

Bul tu'rди bizler tamır do'geregi topıraqlarının 0-10, 10-20 sm ha'm 20-30 sm shuqırılıqtag'ı qatlamlarında dizimge aldıq.

14. Tu'r. *Eudorylaimus similis* (de Man, 1876) Andrassy, 1959.

Andrassy, 1959 jılg'ı mag'lıwmatı boyınsha: $L=2270-3190$ mkm, $a=27,4-50$ mkm, $B=4,3-5,0$; $C=30-50$; $V=50-53\%$.

Bizin mag'lıwmatlarımız boyınsha: $L = 2268$ mkm, $a = 27,2$ mkm, $B = 4,4$; $C=43$; $V=52,0\%$.

Dene gewdeli, qursaqlar ta'repine birqansha iyilgen, bas betine qaray biraz jin'ishkeren. Jutqinshaqtin' tu'bi erin ta'repine salıstırg'anda 3 esege enli. Erin ta'repi bo'leklenge, erin ha'm erin papilleri jaqsı rawajlang'an. Nayza jin'ishke, 25-28 sm mkm uzınlıqta. On'esh samkalarda 54 %, sametslerde 49-52% kem-kemnen ken'eyip baradı.

Para-rizobiontlar toparına kiredi. Mox, topıraq ha'm tamır dogereginde jasadı. Evropa, G'MDA ellerinde belgili. O'zbekstanda Samarqand, Buxara, Tashkent oblastlarında ha'm Qaraqalpaqstanın' Kuybıshev rayonlarında esapqa alıng'an.

Biz bul turdi tekserilgen barlıq topıraq qatlamında taptıq.

Tuis. *Labronema Frone*, 1939.

15. Tu'r. *Labronema eudorylaimoides* E. Yeraerty, 1962.

E. Yaraitidin' 1962 jılg'ı mag'lıwmatı boyınsha: $L=1158$ mkm, $a=22,7$ mkm, $B=3,77$; $C=37,2$; $V=51,72\%$.

Bizin' mag'lıwmatlarımız boyınsha: $L = 1076$ mkm, $a = 21,5$ mkm, $B = 3,6$; $C = 36,6$; $V = 50,6 \%$.

Dene kem-kemnen aldın'g'ı ta'repke qaray tarayg'an. Kutikulası 3 mkm qalın'lıqta. Stoma aldın'g'ı jag'ınan 6 kutikulyar o'sindi menen qurallang'an. Quyırq arqa ta'repke oralıw menen tamamlang'an. Terminde do'n'gelek.

Para-rizobiontlar toparına kiredi. Topıraqta ha'm o'simliktin' tamır a'tirapında tirishilik etedi. Kuba ha'm Kongo ma'mleketlerinde belgili.

G'MDA territoriylarında, O'zbekstan Respublikasında Tashkent oblasti Ordjonikidze ha'm Joqarı Chırshıq rayonlarında pomidor ha'm g'awasha o'simliklerinin' tamır ha'm tamır a'tirapı topıraqlarınan esapqa alıng'an.

Bizler bul turdi izertlegen barlıq tamır do'geregi topıraq qatlamlarında ha'm salı o'simliginin' tamır, paqal ha'm japıraqlarında esapqa aldıq.

Otryad *Tylenchida* (Fylepjev, 1934) Fhorne, 1949.

Tuxımlaska *Hoplolaimide* Fylepjev 1934.

Tuis *Tylenchorynchus* Cobb, 1913.

16. Tu`r. *Tylenchorynchus tener*. Erzhanova, 1964 (32).


P. K. Erjanovanın` mag`lıwmatı boyınsha: $L=552-640$ mkm, $a=27,6-32,0$ mkm, $B=5,3-9,8$; $C=15,3-22,6$; $V=56-64\%$ (1-t,tab-12,35).

Bizin` mag`lıwmatlarımız boyınsha: $L = 548$ mkm, $a = 27,7$ mkm , $B = 6,2$; $C = 15,0$; $V = 57,1 \%$ (6-su`wret)..

Kutikulası saqıynalang`an. Kutikula saqıynaları dene uzunlıg`ının` barlıq jerinde anıq bilinedi. Stilet bekkem turde ornasqan. O`n`esh korpusı, jin`ishke, metakorpal` bul`bus do`n`gelek. O`n`eshtin` keyingi bo`liminde anıq tu`rde ulken bez ornasqan.

Spetsifikalıq emes ta`sir etiwshi *fitogel`mintler* toparına kiredi. O`zbekstan Respublikası territoriyalarında Samarqand oblastında Samarqand, Urgut, rayonlarında kartoshka, temeki ha`m g`awasha o`simliklerinin` tamır do`gereklerinen P. K. Erjanova anıqlag`an ha`m esapqa alg`an.

Bizler bul turdi paqal-japıraq organları ha`m tamır sistemasında ushıratıq.



6-Su`wret. 16. Tu`r. *Tylenchorynchus tener*. Erzhanova, 1964 (32).

Erjanova, 1964 boyinsha: 35-samkanin` ulıwma ko`rinisi, 35 a - samkanin` aldın`g`ı bo`lim, 35 b- vul`va a`tirapı, 35 v- samkanin` quyırq bo`limi.

Semeystva *Tylenchidae* Filipjev, 1934.

Tuus *Fulenchus* Bastian, 1865.

17. Tu`r. *Tylenchus davainei* Bastian, 1865.

A.T.Tulaganovtin` 1958 jilg`ı mag`lıwmatları boyınsha: $L = 454-1450$ mk, $a = 30-43$ mkm, $B = 4,4-8.5$; $C = 6,3$; $V = 61,3\%$.

Bizin` mag`lıwmatlarımız boyınsha: $L = 472$ mkm, $a = 33,4$ mkm, $B = 6,2$; $C = 6,1$; $V = 60,5 \%$.

Bas deneden sezilersiz bo`leklengen. Kutilulanın` saqıynaları juwanıraq. Denenin` ortan`g`ı bo`liminde sakıynalardıń eni $1,7-2,0$ mk. Stilet iri $15,8-17,6$ mk. Stilettin` bası yakor` ta`rizli. O`n`esh tsilindr ta`rizli. Nerv saqıynası istmustın` keyninde. Deyrid jaqsı ko`rinedi. Bursa saqıynalı, qurıq uzınlıg`ının` $4/1$ jetedi.

Para-rizobiont. Tamır do`geregindegi topıraqlarda ushırasadı. Geografiyalıq ubikvist. AQSh, Norvegiya, Shvetsiya, Daniya, Bolgariya, Angliya, Germaniya, Gollandiya, Frantsiya, Ruminiya, Polsha, Grenlandiya, Vengriya, Avstraliya, G`MDA ellerinde belgili.

O`zbekstanda Tashkent, Samarkand, Qashqadar`ya, Surxandar`ya, Andijan oblastlarında ha`m Qaraqalpaqstan respublikasında tabılg`an.

Bizler bul tu`rdi tekseriwge alg`an tamır a`tırıp topıraqlarının` barlıq qabatlarında anıqladıq.

Tuus *Ditulenchus* Filipjev, 1934

18. Tu`r *Ditylenchus dipsaci* (kiihni, 1857) Filipjev, 1936 (93).

Filipevtin` 1945 jilg`ı mag`lumatı boyınsha: $L=1000-1300$ mkm, $a=36-40$ mkm, $L=1000-1300$ mkm, $a=37-41$ mkm, $V=6,5-7,3$; $S = 12-15$; $V=80\%$.

Bizin` mag`lıwmatlarımız boyınsha: $L = 982$ mkm, $a = 38,5$ mkm, $V = 7,1$, $S = 13$; $V = 79,5 \%$

Nematodanın` denesi du`zew, bas ha`m quyriq bo`limi tarayg`an. Kutikulası jin`ishke saqıynalı. Sırtqı korpus tsilindr sıyaqlı. Nerv saqıynası kardial` bul`bustın` aldına jaqın jaylasqan. Quyriq bo`limi eki jınıstada kelte ha`m ushına qaray kem-kemnen tarayg`an. Quyriq terminusı ushlı.

Bul tur *spetsifikalıq patogen* ta`sir etiwshi *fitogel`mintler* toparı quramına kiredi. Gollandiya, FRG, Frantsiya, Kanada, Daniya, G`MDA da Rossiya, Tu`rkmenistan ha`m Tajikistan Respublikalarında belgili.

O`zbekistanda Samarqand oblastının Urgut ha`m Samarqand rayonlarında, Buxara oblastının Buxara rayonında, Qaraqalpaqstan Respublikasının` Kuybıshev, To`rtkul, Shomanay, Kegeyli rayonlarında tarqalg`an.

Bul tu`r di bizler salı o`simliginin` paqal-japıraqlarında ha`m tamır sistemasınan taptıq.

Tuxımlas. *Aphelenchidae* (Fuchs,1934) Steiner, 1949

Tuis. *Aphelenchus* Bastian, 1985.


19. Tu`r *Aphelenchus avenae* Bastian, 1985

A.T.Tulagonvtın` 1958 jılg`ı mag`lıwmatı boyınsha: $L = 630-1075$ mkm, $a = 25,0-36,2$ mkm, $V = 7,0-13,3$; $S = 23,4-33,8$; $V = 70-80\%$.

Bizin` mag`lıwmatlarımız boyınsha: $L = 984$ mkm, $a = 34,1$ mkm, $V = 10,3$; $S = 29,1$; $V = 77,4 \%$ (7-su`wret)..

Denenin` aldın`g`ı ta`repi jin`ishkelengen. Bası tegis ha`m deneden an`sat bo`leklengen. Sırtqı korpus tsilindr sıyaqlı bolıp metakorpal` bul`bustın` aldın`g`ı ta`repiyen tarayıp baslag`an. Samkanın` quyrıg`ı topır bolıp dugalang`an ha`m anal` tesigi aylanasınnan bir qansha uzag`ıraқта jaylasqan.

Bul tu`r *spetsifikalıq emes* patogen ta`sir etiwshi *fitogel`mintler* ekologiyalıq toparına kiredi. O`zbekistanda chereshnya, shabdal, g`awasha, piyaz, qıyar, kenaf eginleri ha`m podorojnik o`simliklerinin` paqal, japıraq, tamır ha`m tamır do`geregi topıraqlarınan anıqlang`an.



7-Su`wret. *Ditylenchus dipsaci* (Kiihn,1857) Filipjev, 1936 (93).

Thorne, 1945 boyınsha: 94z-kartofel` ditilenxozi, 95-Samkanın` ulıwma ko`rinisi, 95a-bas, 95b-bastın` apikal` beti, 95v-kardial` oblast`, 95g- samets quyrıg`ı, 95d-spikula, 95e-fazmid, 95j- 4 intsizuralı qaptal qırı, 95z- eki kishkene qosımsha intsizuralı aberant qaptal qırı.

Samarqand oblastının Samarqand, Pastdargom rayonlarında, Tashkent oblastının Chirshiq rayonlarında, Qaraqalpaqstan Respublikasının Taxtakopir, Shomanay rayonlarında tarqalgan.

Bul turdi bizler sal o'simliginin paqal-japraq ha'm tamir sistemasi, sondayaq tamir atirapindagi topiraqlardın 0-10 ha'm 10-20 sm. shuqirlıqtagi qabatlarinnan anıqladiq (8-suwret).

Tuxımlas. *Aphelenchoididae* Skarbilovich, 1947

Tuis *Aphelenchoides* Fischer, 1834

20. Tur Aphelenchoides kuehnii Fischer, 1894 (156).

A.T.Tulaganovtın 1972 jılgı maglıwmatı boyınsha: L=555-800 mkm, a=30-33 mkm, B=7-10, C=12-15, V=65-70% (t-2, tab-43,158).


Bızın maglıwmatlarımız boyınsha: L = 774 mkm, a = 32,1 mkm, B = 8,4, C = 13,5 (8-su`wret)..

Denenin sırtqı kutikula qabatı saqıynalardan ibarat. Bası dene konturınan bo`leklenip jaylasqan. On`eshtin` aldın`gı bo`limi jin`ishke uzın, bul`bus bası ken`eygen. Metakorpal` bulbus` oval` pishinde.

Spetsifikalıq emes potogen ta`sir etiwshi fitogel`mintler toparına kiredi. O`zbekistan Respublikası territoriyasında g`awasha o`simliginin paqal, japraq, tamir ha'm tamir do`geregi topiraqlarında esapqa alındı. İndoneziya ma`mleketlerinde belgili. G`MDA da Rossiya, Belarussiya, Tajikistan Respublikalarında belgili.

O`zbekistanda Fergana oypatlıg`ında, Samarqand oblastının Samarqand, Urgut rayonlarında, Tashkent oblastlarında, Qaraqalpaqstan Respublikasında Kuybishev, To`rtkul, Shomanay rayonlarında tarqalgan.

Bul turdi bizler sal o'simliginin paqal-japraq ha'm tamir sistemasınan anıqladiq .



Suʻwret - 8. *Aphelenchoides kuehnii* Fischer, 1894 (156).

Tulaganov, 1972 boyinsha: 158-deneninʻ trofik-senzor boʻlimi, 158a- samets quyrigʻininʻ lateralʻ koʻrinishi.

21. *Tu`r Aphelenchoides parietinus* (Bastian, 1868). Steiner 1932 (162).

A.T. Tulagonvtin` 1972 jilg`ı mag`lıwmatı boyınsha: $L = 350-1050$ mkm, $a = 13,0-46,9$ mkm; $B = 7-16,1$; $C = 10-21$, $V = 64-80$ %.

Bizin` mag`lıwmatlarımız boyınsha: $L = 766$ mkm, $a = 28,4$ mkm, $B = 14,0$, $C = 14,6$; $V = 68,1$ % (9-su`wret).


Bası qaptal ta`repinen ishke qaray iyilgen bolıp, denenin` ulıwma konturı tawlanıp jaylasqan. Dene sırtındag`ı kutikulası saqıyna ta`rizli. O`n`eshtin` sırtqı korpusı tsilindr sıyaqlı. Metakorpал` vul`bus qaptalında an`sat bo`leklengen. Metakorpал` bul`bus oval` ta`rizli vul`var quwıslıg`ının` oraylıq bo`liminde jaylasqan. Quyırq tıg`ız bekkem belshe menen tamamlang`an

Spetsifikalıq emes potogen ta`sir etiwshi *fitogel`mintler* toparına kiredi. Oraylıq Evropa, Angliya, Kanada, G`MDA da Belorussiya, Litva, Turkmenstan, Qırğ ızıstan Respublikaları territoriyalarına belgili.

O`zbekistan Respublikası territoriyasında g`arbız, salı, g`awasha o`simliklerinin` paqal, japıraq, tamır ha`m tamır do`geregi topıraqlarında esapqa alıng`an.

Ferg`ana oblastının` Marg`ulan, Ferg`ana, Samarqand oblastının Kattaqorg`an rayonının` ashıq dalan`lıqlarında Qaraqalpaqstan Respublikasının` Kuybıshev, Kegeyli, Shomanay, Shabbaz, To`rtkul rayonlarında tarqalg`an.

Bul turdi bizler salı o`simliginin` paqal, japıraq ha`mde tamır sistemasınan anıqladıq.



Su`wret -9. *Aphelenchoides parietinus* (Bastian, 1868). Steiner 1932 (162).

Franklin 1950; Tulagonv 1972 boyinsha: 164- samkanin` ulhwma ko`rinisi, 164 a-qaptal qırı, 164 b- metakorpall` bul`bus` a`tirapı, ekskretor tesikshe ha`m nerv saqıynası, 164 v- bas, 164 g- bas kapsulasının` tayanış skeleti, 164 d- stilettin` kese kesimi, 164 g- awız do`gereginiñ` tayanış skeleti.

BAP-5. SALI NEMATODALARININ` EKOLOGIYA LIQ TOPARLARI

Topıraqtıń shuqır qatlamlarında, sondayaq o`simlik denesinde jasawshı nematodalardıń tu`rleri barlıq basqa hayuanatlar siyaqlı sırtqı ortalıq faktorları ha`m basqada tiri organizimler, sonıń ishinde o`simlik-xojeyinleri menen ha`r turli o`z-ara qatnasta boladı. Bul o`z-ara qatnaslar nematodalardıń bir talay tirishilik ushın kerekli iykemlesiw-lerin boldıradı, a`sirese olardıń duzilisin, fiziologiyasın, minez-qulqınıń qaliplesiwinde tiykarg`ı faktorlar bolıp esaplanadı.

Bizin` izertlewlerimiz na`tiyjesinde anıqlang`an barlıq nematoda tu`rlerin A.A. Paramonovtıń (1952-1970) ekologiyalıq toparlarga bo`liw printsipleri tiykarında, olardı para-rizobiontlar, eusaprobiontlar, devisoprobiontlar, ha`m fitogel`mintler (o`zine ta`n ha`m ta`n emes kesel pay-da etiwshi nematodalar) toparlarına ajıratıp bo`liwge boladı.

Para-rizobiontlar - bular tamır do`gereginde, topıraqlarda erkin jasaytug`ın nematodalar. Para-rizobiontlarg`a ta`n belgilerden biri kushli skeletleniwden nayzası anıq bilinip turadı ha`m onıń aqır su`yirlenip ushlı bolıp keledi. O`simliklerdi nayzası arqalı tesip, jırtıp, para-rizobiontlar infektsiyalardıń (juqpalı kesellilerdin`) kiriw jolına u`lken da`rwaza ashıp beredi.

Biz usı gruppaga kiriwshi 9 turdin` 85 danasın taptıq, yag`nıy bul nematodalardıń ulıwma tu`r sanının` 42,8 % tin, al osoblar sanının` 37,6 % tutadı (Keste 4).

Eusaprobiontlar - bul toparg`a tiykarınan tek saprobiont nematodalar kiredi. Sırtqı ortalıqta tirishilik etiwı ushın qolaylı jag`daylar bolıwı menen o`simliklerdin` vegetativ organları ha`m tkanlarında saprobiontlardıń oshag`ın payda etedi. Eusaprobiontlar- bular o`simliklerde infektsiya payda etedi biraq, o`simlik organların jaraqatlay almaydı.

Bul toparg`a tek 1 tu`r tiyisli bolıp ol ulıwma nematodlar sanının` 6,2 % in quraydı.

Keste 4. Nematodalardın` ekologiyalıq toparları

№	Nematodalardın` tu`r atamaları	Sanı, dana	Ekologiyalıq toparları	Sanı, %
1	<i>Panagrolaimus rigidus</i>	14	Eusaprobiontlar Osoblar – 14 (6,2%) Tu`rler – 1 (4,8%)	6,2
2	<i>P. armatus*</i>	10	Devisaprobiontlar Osoblar - 65 (28.8%) Tu`rler - 6 (28.6%)	4,4
3	<i>P. longicaudatus*</i>	7		3,1
4	<i>Heterocephalobus elongatus</i>	19		8,4
5	<i>Cephalobus persegnis</i>	7		3,1
6	<i>Eucephalobus striatus</i>	6		2,7
7	<i>Acrobeloides clavicaudatus*</i>	16		7,1
8	<i>Prismatolaimus dolichurus*</i>	7	Para-rizobiontlar Osoblar – 85 (37.6%) Tu`rler – 9 (42.8%)	3,1
9	<i>Prodorylaimus longicaudatus*</i>	12		5,3
10	<i>Discolaimium cylindricum*</i>	7		3,1
11	<i>Eudorylaimus monohystera</i>	5		2,2
12	<i>E. paraobtusicaudatus*</i>	12		5,3
13	<i>E. parvulus*</i>	9		4,0
14	<i>E. similis</i>	6		2,7
15	<i>Labronema eudorylaimoides*</i>	13		5,8
16	<i>Tylenchus davainei</i>	14		6,2
17	<i>Tylenchorynchus tener</i>	10	Fitogel`mintler</b> Osoblar - 62 (27.4%) Tu`rler - 5 (23.8%)	4,4
18	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	18		8,0
19	<i>Aphelenchus avenae</i>	11		4,9
20	<i>Aphelenchoides kuehnii*</i>	10		4,4
21	<i>A. parietinus</i>	13		5,8
	JAMI : 29	226	4	100

Devisaprobiontlar – bul toparg`a saprobiotikalıq ortalıqta tirishilik etetug`ın nematoda tu`rleri kiredi.

Bizler bul topardan 6 tu`r nematoda anıqlap, olar ulıwma nematodlar sanının` 28,8 % in tutadı.

**Fitogel`mintler** – bul toparg`a o`simlik tkanlarında parazitlik etetug`ın nematodalar tu`ri kiredi. Bular o`simliktin` tkanları menen awqatlanıp ha`r qıylı da`rejede ko`rinetug`ın potologiyalıq keselliklerdi payda etedi ha`m eginshilik xojalıqlarına u`lken za`rer keltiredi.

Bul ekologiyalıq toparg`a tiyisli 5 tu`r anıqlanıp, olar ulıwma nematodalar sanının` 27,4 % uslaydı.

Solay etip ekologiyalıq toparlardın` ishinde nematodalarg`a tu`r ja-g`inan en` ko`birek toparı para-rizobiontlar 42,8 % (9 tu`r), ortasha devi-saprobiontlar 28,6 % (6 tu`r) ha`m fitogel`mintler 23,8 % (5 tu`r) ha`mde en` azı eusaprobiontlar toparı 4,8 % (1 tu`r) boldı.

JUWMAQLAW

1. Bizin` izertlewlerimiz na`tiyjeleri boyınsha Qaraqalpaqstan Respublikası Shomanay rayonu jag`dayında salı o`simligi ha`m onın` tamır do`geregi topıraqlarında nematodalardıń 1 kishi klassqa, 4 toparg`a, 10 tuxımlaskag`a, 15 tuis kiretug`ın nematodalardıń 21 tu`ri esapqa alındı.

2. Ekologiyalıq toparlardıń ishinde nematodalarg`a tu`r jag`ınan en` ko`biregi para-rizobiontlar 42,8 % (9 tu`r), ortasha devisaprobiontlar 28,6 % (6 tu`r) ha`m fitogel`mintler 23,8 % (5 tu`r) ha`m en` azı eusaprobiont 4,8 % (1 tu`r) toparları boldı.

4. İzertlengen xojalıqta tekseriw na`tiyjesinde salı o`simligi ha`m onın` tamır do`geregi topıraqlarında o`simlikke ziyanlı parazitler 6 tu`r-din`, atap aytqanda *Tylenchorynhus tener*, *Tylenchus davaineii*, *Ditylenchus dipsaci*, *Aphelenchus avenae*, *A. Kuehnii*, *A. parietinus* bar ekenligi esapqa alındı.

A`DEBIYaTLAR

1. Karimov İ.A. 2011. «2012 - Bekkem shan`araq jılı» O`zbekstan Respublikası Konstitutsiyasının` 20 jıllıq yubileyindegi bayanatı. Erkin Qaraqalpaqstan gazetası, 2011 j.
2. Baranovskaya İ.A. 1958. Zakonomernosti i faktori dinamiki fauni nematod pshenitsı. sb. rabot molodıx fitogel`mintologov. M. kuz`minki.
3. Borovkova A.M. 1967. Risoviy afelenx v SNG i bor`ba s nimi. V sb. Nematodnie bolezni sel`xozrasteniy. M. İzd-vo. Kolos.
4. Eroshenko A.S. 1967. Fauna nematod osnovıx zernovıx kul`tur Primorskogo morya. Avtoreferat dissertatsii. Vladivostok. M.
5. Kir`yanova E.S. i Kral` E.L. 1963 b. Devastatsiya pshenichnoy nematodi v SNG i drugix stranax. V sb. Gel`mintı cheloveka, jivotnıx i raste-niy i bor`ba s nimi. M. İzd-vo Rossii.
6. Kir`yanova E.S. i Kral` E.L. 1969. Paraziticheskie nematodi rasteniy i merı bo`bı s nimi. Tom 1. İzd. «Nauka» LO AN R. L. 447 str.
7. Kir`yanova E.S. i Kral` E.L. 1971. Paraziticheskie nematodi rasteniy i merı bo`bı s nimi. Tom 2. İzd. «Nauka» LO AN R. L. 521 str.
8. Karimova S.M. 1957. Nematodi sel`skoxozyaystvennıx kul`tur levoberej`ya nizov`e Amudar`i. V sb. Paraziticheskie kruglie chervi-nematodi Uzbekistana, Tashkent. İzd-vo AN Uzb.
9. Kmuzova S.İ. i Tixonova L.V. 1969. Sravnitel`no ekologicheskiy analiz fauni fitonematod zernovıx kul`tur v Bashkirii. Materialı nauchnoy konferentsii Vsesoyuznogo obshestva gel`mintologov AN Rossii. Ch 1.m. str. 123-128.
10. Kmuzova S.İ. 1960. Paraziticheskie vidi nematod zernovıx nematod Bashkirii. Materialı nauchnoy konferentsii Vsesoyuznogo obshestva gel`mintologov AN Rossi M.dekabr`.
11. Mamonova Z.M. 1960. Ovsyanaya nematoda (*Heterodera avena*) vreditel`

- yarovoy pshenitsı Bashkirii. Materialı u Vsesoyuznogo soveshaniya po izucheniyu nematod. Tezisi dokladov. İzd. SamGU.
12. Matmuratov J. 1989. Agroklimaticheskie rayoni RKK. Nukus İzd. Karakalpakstan.
13. Tulaganov A.T. 1958. Nematodı sel`skozyaystvennix kul`tur Uzbekistana i bor`ba s nimi. İzd. SamGU.
14. Tulaganov A.T. 1960. Nematodı sel`skoxozyaystvennix kul`tur Uzbekistana i bor`ba s nimi. İzd. SamGU.
15. Tulaganov A.T. Usmanova A.Z. Fitonematodı Uzbekistana 1 chast`. İzd. Tashkent. 1975,
16. Tulaganov A.T. Usmanova A.Z. Fitonematodı Uzbekistana 2 chast`. İzd. Tashkent. 1978.
17. Utambetov A. 1968. K izucheniyu nematod risa v KK ASSR. Materialı nauchnoy konferentsii obshestva gel`mintologov Uzbekistana. Tashkent. str.125-126.
18. Utambetov A. 1970. Nematodı fauni risa i prikronevoy pochvi KKAR. Nauchnie trudi TashGU (aspirantov). Vıp.178.str.45-52.
19. Utambetov A. 1971. Fauna nematod risa i ee dinamika po fazam razvitiya v usloviyax KKASSR. «Uzb. Biol. jurnal» N6.
20. M.M.Levashov «Materialı i izucheniyu nematod rastenii v Abxazii i na Chernomorskom poberej`e severnogo Kavkaza»M.L. 1935.
21. Paramonov A.A. Osnova fitogel`mintologii. Tom 1-2. 1962.
22. İvanova T.S. 1968. Nematodı zernovix kul`tur Zarafshanskoy dolini Dushanbe. AN. Tadj. 3-82.