

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
Андижон давлат университети Табиий
фанлар факультети Биология йўналиши

Султонова Дилрабо нинг
Одам анатомияси фанидан

РЕФЕРАТИ

Мавзу:Ички секреция безлари.

Бажарди:

Текширди:

Мавзу: Ички секреция безлари.

Режа.

- 1. Ички секреция безларининг эмбрионал такомил этиши.**
- 2. Гипофиз, эпифиз безларининг жойлашуви ва тузилиши.**
- 3. Қалқонсимон, қалқон орқа ва олди безларининг ошқозон ости буйрак усти ва жинсий безларининг жойлашуви, биологик ахамияти.**

Ички секрециябезлари эмбрионнинг харучала қаватидан такомил этади ва қайси эмбрион қаватида хосил бўлишига қараб, асосанқ уйидаги 5 группага бўлинади.

Энтодермадантакомил етувчилар.

Буларбошичакважабраравоқларисоҳасидантакомил этганлигиучунбронхиогенгруппадейилади.

Бронхиогенгруппақақалқонсимонбезнингорқабезиваайрисимонбезкиради.

Энтодерманингичакқисмидантакомил Этувчилар.

БуларгамеъдаостибезинингЛангергансоролчаларикиради.

Мезодермадан такомил етувчи ички секрециябезларигабуўракустибезинингпўстлок қисмиважинсийбезларкиради.

Эктодермадан,яъниоралиқмиядантакомилқилувчиларневрогенгруппаде йилиб, бунгагипофизва эпифизкиради.

Эктодермадан, симпатик элементлардантакомилқилувчиларгабуўракустибезинингмағизқисмихромофи ндоначаларикириб, буларниадренал система деб юритилади.

Одаморганизмидабир группа безлар бўлиб, булар ички секрециябезлари дейилади. Уларни ташки секрециябезларидан фарқи шундаки, ички секрециябезларидансекретчиқарувчи найлар бўлмайди.

Ички секрециябезларидаишлангангармонсекрет-гармондебаталади. Ичкисекрециябезларидаишлангангармонбевоситақонгақуйилади.

[illegible]

Гипофтиз-хйноплийсис серебряяни,

пасткимияортиғиасосийсуякдагитурк

эгарининггипофизчукурчасидакўрувбўртиғинингосткисоҳасидажойлашган.

Безнингҳажмиунчакаттабўлмасданкаттаёшли кишиларда хаммаси бўлиб 1.5-2-0.5смниташқилқилади. Лекин,вазифасижихатиданбошқабезларнингорасида энгюкориўриндатуради.

1. Аденогипофиз (безлигипофиз).
2. Нерогипофиз.

Гипофиз 3 бўлакдан: олдинги, ораликваорқа бўлақдани борат. Гипофизнинг олдинги бўлағидан соматотропин, пролактин, фоллитропин, гютропин ва липотропин гармонлари ишлаб чиқарилади. Ўрта бўлағи эса мелотанин гармонини ишлаб чиқаради.

Сомототропингармониоксилларсинтезинитезлатадиваунингпарчалани
шиданхосилбўлганаминокислоталарнихужайрақобиғиданосонўтиб,

хужайрада бўладиган жараёнларнинг тезлата дива организмни ўсишини таъминлайди.

Картикотропин гармони (АКТГ)

буйрак усти безидагитутамли ват ўрсимон қисмларига тасир этиб, уларда гармонлари шлаб чиқарилишини таъминлайди.

Мелатонин гармонитерининг пигмент билан таъминлашини бошқариб туради.

Нейрогипофиз гармонлари

Вазопрессин ва окситоцин гармонлари супраоптика паравентрикуляр ўзакларнинг нейросекретор хужайралари дани шлаб чиқарилади.

Вазопрессин буйрак найчаларига сувнинг қайта сўрилишини кучайтиради, яъни антидиуритик тасир эта диванати жадасийдикка мажралади.

Окситоцин гармони бачадон мушаклариники сқартириб туғиш жараёнида иштирок этади.

Шишасимон тана (эпифиз) -

оралиқ мия сохаси да мия ярим шарларининг остки қисмида жойлашган.

эпифиз хажми жихатдан унчалик катта бўлмай катта ёшли одамларда 0.2 гр, узунлиги 8-10 мм, қалинлиги, 4 мм бўлади шакли тухумсимон, юзасига дирбудур,

ранги қизғиш кулранг бўлади. Уташқитомондан юпқа бириктирувчи тўқимали па

рда билан ўралган. Бунда без тўқимаси ичига кириб,

тўсиқлар хосил қила дива унмай да бўлакларга бўлиб юборади. Бўлакчалар

эса пуфакчалар, яъни фоликулалардан тузилган.

Без дани шлаб чиқарилган гармон мелотанин организм ва жинсий аъзоларни

нғүсишинимеёрлаштирибтуради.

Ишлабчиқарилган

секретайримичкисекрециябезларинингмасалан,

жинсийбезларнингўсишиниваишфаолиятинитўхтатибтуради.

Қалқонсимонбез

-гландулатхйроидеа

ички

секрециябезлариичидадеярли

энгйиригихисобланиб,

бўйинсохасидахиқилдоқнингшуномлитўғайданбошланади,

хиқилдоқниолдингиваёнтмонлариданёпибтуради.

Қалқонсимонбезнингоғирлигикаттаёшдагиодамларда 30-50 грдир.

Безнингичкитузилишигакелсак,

уалохидабезпупақлариданиборат,

бупупақчаларфолликуладейилади.

Улараксаришарсимонбўлиб,ташқитомонданкубсимон

эпителийбиланқопланган.

Фолликулалар

ичисуюқколлоидмоддабилантўлганбўлиб,

унингтаркибидаёдтиреоглобулиндебаталувчиёдгабойоксилмоддасибор.

Ишлабчиқарилгангармонлар

(тироксин,

триёдтироксин)

тўқималарнингкислородгабўлган

талабчанлигини

оширади.

Гармонлароксилларсинтезитезлигинитезлаштириборгаинизмнингўсишжараён
иникучайтиради.

Қалқонсимонорқабезлари

4

тадан

8

тагачабўлиб,

қалқонсимонбезбўлаклариорқаюзасинингюқоривапасткиқисмларигаичёпиш

ганхолдажойлашади. Шаклжихатиданюмшоқёкиузунчоқ бўлиб, оғирлиги -

0,05 гр.

қалқонсимонорқабезлариолибташлансаорганизмдакалий миқдори камаяди ва

суякларнингўсишибузилади.

Марказийнервтизиминингқўзғалувчанлигиошади.

Мушаклар, тирсаквауларнингтортилишикузатилади.

Айринсимонбез-

*тхй*мускўксоралиғининголдингиюқориқисмидажойлашган.

Шакланкаттавақалинёкиингичкаваузунбўлади.

Айрисимонбезолдинданорқагакарабяссиланганбўлиб,

иккитаўнгвачапбўлакларданиборат.

Бездакўкракбабўйинқисмларигафарқкилинади.

Айрисимонбезнингоғирлигиёшгакараб, турличабўлади.

Янгитуғилганболаларда 12грбўлиб, болаўсгансарибезоғирлигихамўсаборади.

Нихоятбалоғатга етишолдида 35-40грга етади. Балоғатга

етгандансўнгайрисимонбезсекин-астақайтатарақкиётгаучрайди 25 ёшда 25гр,

60 ёшда 15грва 70 ёшдансўнг бргатушибқолади.

Айрисимонбезлимфоситишлабчиқаради.

Аммобубезлимфоситданташваригармонишлабчиқарадихам.

Буйракустибези

-

*гландуласупрареналис*чапваўнгбуйракларникалпоқхолидакоплабтурадиганж

уфторгандир. Ўнгбуйракустибезиучбурчаксимоншаклдабўлса,

чапдагияримойсимоншаклдабўлади.

Буйракустибезиниустиданфибаркапсулаўраганбўлиб,

букапсулабезиичигаўсиқларберади.

Натижада,

безбирнечабўлакларгабўлинади.

Буйракустибезиникесибқараса,

унингташқисарғишпўстлоққисмиданваичкиқорамтирмияқисмиданиборат

эканиникўрамиз.

Пўстлоққисмивамияқисмитузилишитакомил

этишивафункциясижихатидабир-бириданкаттафарқилади.

Пўстлоққисмилипоиддоначаларвахолестерингабойбўлиб,

буқисмнитузилишижихатиданучзонагабўлишмумкин.

Буйракустибезинингмиясимонмоддасихромлитузларёрдамидасарикқўн

ғирранггабўялувчихромафин

элементларидантузилганбўлиб,

нервтолалариваганглиознервхужайраларигабойдир.

Буйракустибезинингмияқисмиқонгаадреналинишлабчиқаради.

Адреналинсимпатикнервсистемасинингтонусинисақлабтуради,

контомирларниторайтиади.

Буйракустибезинингпўстлоққисмилипоидлар

- лисетин,

холестеринянахолин,

кортинхамишлабчиқаради.

Холинпарасимпатикнервсистемасидатаъсирловчивазифанибажаради. Кортин

эсаорганизмдапигменталмашинувинитаъминлайди.