

O`ZBEKISTAN RESPUBLIKASI
XALIQ BİLIMLENDIRIW MINISTRLIGI

A'jiniyaz atindag'1 No'kis ma'mleketlik pedagogikalıq institutı

F.T.O'tenova, Sh.B.Tamambetova, A.T.Guldursunbayeva

«O'SIMLIKLER GEOGRAFIYASI»

pa'ninen oqıw-metodikalıq qollanba

NO'KIS – 2016

Du`ziwshiler: **F.T.O'tenova, Sh.B.Tamambetova, A.T.Guldursunbayeva**

Oqıw-metodikalıq qollanba joqarı oqıw orınlarınan' biologiya ta'lim bag'darı talaba-ları ushın mo'lshehlengen bolıp, ol joqarı h'a'm orta arnawlı bilimlendiriw ministrıligi ta'repinen tastıyıqlang'an u'lgi bag'darlama tiykarında jergilikli sha'rayattı esapqa alg'an h'alda jazılǵ'an.

Qollanbada ha`zirgi waqıtta ta'biyg'ıy sharayattag'ı o'simlikler du'nyası, o'simliklerdin` tu`rleri, tuwıs, tuqımlasları, olardın` ta'biyatta tarqalıw nızamlıq-ları, bul tarqalıwg`a sebep bolatug`ın jag`daylar, ha`r qıylı territoriyalarda tarqalıw quramı, tarqalıw arealı, a'hmiyeti haqqında keltirilgen.

JUWAPLI REDAKTOR:

M. Baltabaev - A'jiniyaz atındag'ı No'kis ma'mleketlik pedagogikalıq institutı biologiya oqıtıw metodikası kafedrası docenti, biologiya ilimleri kandidadı

PIKIR BILDIRIWSHILER:

G. Serekeeva - Berdaq atındag'ı Qaraqalpaq ma'mleketlik universiteti, biologiya kafedrası docenti, biologiya ilimleri kandidadı

R.Atamuratov - A'jiniyaz atındag'ı No'kis ma'mleketlik pedagogikalıq institutı, biologiya oqıtıw metodikası kafedrası docenti, biologiya ilimleri kandidadı

Oqıw-metodikalıq qollanba A'jiniyaz atındag'ı No'kis ma'mleketlik pedagogikalıq institutı ilimiy-metodikalıq ken'esinin'

11 - mart 2016-jıl №9 bayanlaması menen baspag'a usınıldı.

Kirisiw

O`simlikler geogafiyası jep betinde o`simliklerdin` (tu`rler, tuwıslar, tuqım-laslar) tarqalıw nızamlıqların, sonday-aq ha`r qıylı territoriyalardın` florasının` quramın u`yrenedi. Onın` wazıypasına ha`zirgi waqıtta o`simliklerdin` tarqalıwı haqqında anıq materiallardı toplaw ha`m juwmaqlaw menen usı tarqalıwg`a sebep bolatug`ın ayqın sebeplerdi tabıwlar kiredi. O`simliklerdin` geogafiyalıq tarqalıwı ha`zirgi waqıt (klimat, topıraq ha`m tariyxıy (materiklerdin` konfiguratsiyası, muzlıqlardın` ta`siri h.t.b.) faktorları menen anıqlandı.

O`simliklerdin` geogafiyası sonday-aq jer sharının` ayırım rayonlarının` (kontinentler, iri ta`biyiy oblastlar h.t.b.) florasında izertleydi. Floranı tolıq ha`m ha`r ta`repleme analizlewıdin`, tiykarında floralıq rayonlarg`a bo`liw islep shıg`arı-ladı (floranın` quramı boyınsha ajralatug`ın territoriyalar bo`linip shıg`ıladı).

Qa`legen pa`nler sıyaqlı o`simlikler geogafiyası da basqa ilimiy distsiplinalar menen tıg`ız baylanısta g`ana rawajlanadı. Ol basqa ilimlerden tu`sindiriw ushın kerek faktlerdi aladı, olarg`a juwmaq jasaydı ha`m nızamlıqlardı anıqlaydı. O`simlikler geogafiyası ko`bine o`simlikler sistematikası menen baylanıslı bolıp, odan ha`r qıylı taksonlardın` (anaw yamasa mınaw tuwıstag`ı, tuqımlastag`ı h.t.b. tu`rler sanı) du`zilisi tuwralı, taksonlardın tuwıslıq da`rejesi tuwralı mag`lıw-matlardı aladı. Ol qazılma o`simliklerdi u`yrenetug`ın, a`yyemgi geologiyalıq, a`sirlerde o`simliklerdin` geogafiyalıq tarqalıwı boyınsha a`hmiyetli mag`lıwmatlar beretug`ın, anaw yamasa mınaw taksonlardın` jasın anıqlaytug`ın paleobotanika menen tıg`ız baylanısta.

O`simlikler geogafiyası klimatologiya, geomorfologiya ha`m topıraq tanıw ilimler menen de baylanıslı, sebebi jer betinde o`simliklerdin` ha`zirgi da`wirde tarqalıwı klimatlıq, orografiyalıq ha`m topıraq jag`dayları menen anıqlanadı.

O`simlikler geogafiyası o`simliklerdin` ha`r qıylı tu`rlerinin` ekologiyalıq o`z-geshelikleri, olardın` qorshag`an ortalıqqa bolg`an talapları haqqındag`ı mag`lıw-matlarg`a iye o`simliklerdin` geogafiyası menen baylanısı anıq.

Ha`zirgi waqıttag`ı o`simliklerdin` geogafiyalıq, tarqalıwın paleogeogafiyalıq mag`lıwmatlardı esapqa almay tu`sindiriw mu`mkin emes. Bul ilim (a`yyemgi) buring`ı geologiyalıq a`sirlerdegi materiklerdin` kelbeti, muzlıqlardın` tarqalıwı ha`m .t.b. mag`lıwmatlardı beredi.

O`simlikler geogafiyası ba`rinen burın introdukciya menen, yag`nıy adamlar ushın paydalı. Mısalı; miyweli, texnikalıq ha`m manzaralı h.b. o`simliklerdi ma`deniylestiriw menen a`meliy baylanısta. O`simlikler geograftsyasın u`yreniw jer sharının` bir rayonınan ekinshi rayonına olardı "qonıslandıırıw", introdukciyanın` na`tiyjeligin ha`m ilimiy da`lillewge mu`mkinshilikler beredi.

1-tema: O`simlikler geogafiyası rawajlanıw tariyxı

Reje:

1. O`simlikler geogafiyasının` tiykarın salıwshılar.
2. O`simlikler geogafiyası rawajlanıwına u`les qosqan alımlar.

O`simlikler geogafiyası da o`z tariyxına iye. O`simlikler geogafiyasın ilimpaz-lardın` birewleri ju`da` eski pa`n dese, ekinshileri jas ilim deydi. Bulardın` ekewi de durıs. Bunın` eski pa`n bolıw sebebi o`simlikler geogafiyası haqqındag`ı pikirler a`yyemgi Gretsiya, Rimde Aristotel`, Teofrast da`wirinen baslanadı. Biraq, ol waqıtta grekler o`z elindegi o`simliklerdin` geogafiyasın u`yrenip, basqa jerler menen salıstırıp ko`rmegen.

Aleksandr Makendonskiy (334-327 j.b.) Persiyag`a, Hindistang`a qılğ`an ju`ri-sinde o`zi menen birge ko`p ilimpazlardı alıp shıqqan. Olar sol ju`ris waqtında pa`nnin`, ha`r qıylı tarawı boyınsha ju`da` bay materiallar toplag`an. Botanikler o`zleri tapqan o`simliklerdin` qa`siyetin ko`rsetip, o`simlikler geogafiyasına ju`da` qımbatlı pikirler kirgizdi. Bul materiallardı Teofrast izertlep o`zinin` 10 tomliq kita-bın jazdı. Bul materiallardı o`z elindegiler menen salıstırıp o`simlikler geogafiya-sının` areologiya, a`sirese ekologiya bo`limine tiyisli ju`da` ko`p pikirler do`retken. Solay etip bul ilim a`yyemgi ilimler qatarına jatadı.

Jas ilim dewshiler onı jaq`n waqıtlarg`a shekem ayırım pa`n retinde oqıw orınlarında ju`rgizilmegenligi menen da`lilleydi.

Teofrastan 2000 jıl keyin 1807 jılı A.Gumbol`dt o`zinin` ko`p jerlerge islegen sayaxatına su`yenip "Fitogeografiya haqqında pikirler" degen kitabın jazdı.

A.Gumbol`dt tek g`ana botanika boyınsha islep qoymastan klimatologiya, meteorologiyag`a tiykar salg`an ilimpaz. Ol o`z o`mirinde putkil Amerikag`a, Altay, Sibir`, Kaspiy boylarına sayaxat qılğ`an. Sol jerde o`simliklerdin` ha`r qıylı formada ushırasatug`ınlıg`ın ha`m bir neshe o`simliklerdin` simbio`z tirishiligin ko`rsetip 1-ret assotsiatsiya degen termindi kirgizdi. O`simlikler ja`miyeti (birles-pesi) haqqında qımbat bahalı pikirler ayttı. Sonlıqtan onı o`simlikler geogafiya-sının` tiykarın salıwshı dep ataymız.

Akademik P.Pallas "Rossiya florası" degen Rossiyanın` o`simliklerine qarap bir neshe rayonlarg`a belgen. Akademik Glemin "Sibir` florası", S.Krashennikov "Kamchatka jerin sıpatlap jazıw" degen miynetlerinde sho`l, suw, taw o`simlik-lerinin` bir-birinen qanday ayırmashılıg`ının` barlıg`ı haqqında bahalı pikirler ayttı.

Shet el ilimpazlarınan Vimdenov (1792) "O`simlikshiliktin` tiykarları" degen kitabında o`simliklerdin` tarqalıwı, ekologiyası ha`m sol o`simliktin` kelip shıg`ı-wına baylanıslı ju`da` ko`p mag`lıwmatlar bergen. 1822-jılı Daniyalı ilimpaz Skau "O`simlikler geogafiyasının` tiykarları" degen kitap jazıp ekologiyag`a ha`m floristik geogafiyanı bir qansha mag`lıwmatlar menen bayıttı.

XVIII-XX asirlarda o'simlikler geografiyasina tiyisli izertlewler ju'da jaqsı rawajlandı. Professor Ledebur "Rossiya florası" degen kitap jazıp, Rossiyanın o'simliklerine qarap u'iken 16 oblas'tqa bo'ledi.

Fitogeografiyanın rawajlanıwında Ch.Darvinnın (1854) miynetide ullı. Onın "Tu'rlerdin ta'biyy tan'law jolı menen kelip shıg'ıwı yamasa jasaw ushın gu'reste tan'lang'an porodalar saqlaw" kitabı shıqqan son usı waqıtqa shekem u'stemlik etip kelgen ilimdegi natuwrı tu'sinikler alıp taslanıp durıs jolg'a salındı.

Ruprext (1866) Rossiyanın qara topıraqlı jerlerinin o'simliklerin izertlegen. Onın payda bolg'an o'simligin izertlep, onı tariyxıy sebeplerge baylanıstıradı so'ytıp tarixıy geografiyag'a sebep salg'an. Bunın pikirlerin Litvinov, Ko'zo-Polyanskiy, Lavrenko, Tolmachev xa'm basqa ilimpazlar rawajlandırdı ha'm taza materiallar menen bayıttı.

1895-jılı Varming "O'simliklerdin ekologiyalıq geografiyası" degen miynetin jazdı. Bunda o'simliklerge ha'r qıylı ekologiyalıq faktorlar: suw, hawa, rel'ef, klimat ta'sirinde bolatug'ın o'zgerislerdi ko'rsetti. Sonlıqtan onı ekologıyanın atası dep ataymız. Onın teoriyaların rawajlandırıwda Maksimov, Shimper Kellerdin miynetleri ullı.

O'simlikler geografiyası pa'nin rawajlandırıwda N.I.Vavilov, E. V.Vul'f, A.A.Grossgeym, A.N.Krishtofovich, N.I.Kuznetsov, D.M. Jukovskiy, V.V.Alexin, M.G.Popov, A.I.Tolmachev, A.L. Taxtadjan h.b. ko'p xızmetler etti.

O'zbekistanda osimlikler geografiyasın rawajlandırıwda E.P.Korovin, K.Z.Zakirov, I.I.Granitov ha'm basqalardın miynetleri ullı. E.P.Korovin "Orta Aziya ha'm Qubla Qazaqstannın o'simlikleri" degen kitabında Orta Aziyanı bir neshe gorizontal zonag'a bo'ledi. K.Z.Zakirov "Zaravshan florası ha'm o'simlikleri" degen kitabında vertikal zonalarg'a bo'lip u'yrenildi.

Belgili territoriyanın o'simlikler geografiyasın u'yreniw onı xalıq xojalıg'ına paydalanıwda u'iken a'hmiyetli juwmaqlardı beredi.

O'z betinshe tayarlanıw ha'm qadag'alaw ushın sorawlar.

1. O'simlikler geografiyasının tiykarın salıwshılar kimler?
2. Teofrast neshe tomlıq kitap jazdı?
3. 1807 jılı A.Gumboldt o'zinin sayaxatları tiykarında qanday miynetin jazg'an?
4. 1895-jılı Varming "O'simliklerdin ekologiyalıq geografiyası" degen miynetinde qanday mag'lumatlar keltirgen?
5. O'simlikler geografiyası rawajlanıwına u'les qosqan O'zbekistanlı alımlardan kimlerdin miynetlerin bilesiz?

2-tema: Areallar haqqında ta'limat (Areologiya)

Reje:

1. Areallar haqqında ulıwma tu'sinik
2. Areallardıń tipleri, formaları, ko'lemi.
3. Areallardıń payda bolıwı.
4. Waqıtlar o'tiwi menen areallardıń o'zgeriwi, areallar diz'yunkciyası.
5. Relikt areallar ha'm relikht o'simlikler
6. Endemizm ha'm vikarizm qubılısı.

Areallar haqqında ulıwma tu'sinik. Ha'r bir o'simlik jer betinde belgili bir jer-de taralıp, belgili bir orındı iyeleydi, ol jer sol tu'rdin` arealı dep esaplanadı (area-maydan). O'simlik arealın bilmey turıp sol o'simlikti u'yreniw, ol haqqında tolıq mag'lıwmatqa iye bolıw qıyın. Areal tek g`ana tu'r ushın belgilenbesten o'simlik-lerdin` tuwısının`, tuqımlasının`, ja'miyetinin` (birlespesinin`) arealıda boladı.

Jer ju'zinde o'simliklerdin` taralıwı ha'r qıylı. Bul a'sirese ekologiyalıq sebep-lerge baylanıslı. Geybir o'simlikler jer ju'zinin` belgili territoriyasında ushırap, basqa jerlerde ushıraspaydı. Al geybir o'simlikler jer ju'zinin` barlıq jerinde ushı-rasadı. Bunday o'simliklerge *kosmopolit* o'simlikler deymiz. Bul o'simlikler jer tan'lamaydı, azg`ana o'zgerislerge shıdam berip o'sip rawajlanıp kete beredi. Mısalı, qamıs-**phragmites communis**, qoyma-qoshqarma (oduvanchik- **Jaraxacum vulgare**. chastuxa-**Alisma plantago**; mokritsa-**stellaria media**, osot-**Sonchus oleri-ceus** h.t.b. barlıq jerde tarqalg`an. Usınday ken` arealg`a iye o'simlikti **Ebbpuxor** (evri-ken`, xoros-taralg`an) o'simlikler delinedi.

Geybir o'simlikler bunday tarqalıwg`a iye bolmay, tar arealg`a iye boladı. Bunday o'simliklerdi stenexor (stenos-tar) o'simlikler delinedi. Mısalı, **Pinus eldarica**-Gruziyada, **Pinus stankebichi**-Qırımnda, **Abies gracilus** (pixta)-tek Kam-chatkanın` shıg`ıs jag`asında ushırasadı. Stenexor o'simlikler tek g`ana belgili jerde ushırap, basqa jerde ushıramaydı.

Tek g`ana belgili bir territoriyada o'sip, basqa jerlerde o'speytug`ın o'simliklerdi **endemik** o'simlikler deymiz. Mısalı, **juniperus serawchanica** - zaravshan arshası, bul zaravshannan basqa jerde o'speydi. Ken` arealg`a iye o'simliklerdi-**evriton**, tar arealg`a iye o'simliklerdi -**stenoton** o'simlikler deymiz.

Areallardıń tipleri, formaları, ko'lemi. Areallar o'zlerinin` formasına, jayla-sıwına qarap bir-birinen parıq qıladı. Usıg`an qarap areallardı u'lken 3 tipke bo'lemiz.

1. Tutas areallar
2. Tarqalg`an, ajıralg`an areallar
3. Lenta sıyaqlı areallar.

Geybir o`simlikler ken` tarqalg`an ha`m ken` ko`lemdi iyeleydi, yag`nıy areal-ları ken` tutas bolıp keledi. O`simliklerdin` bunday tarqalıwı tutas areallar boladı. Mısalı: **Haloxylon persicum**-aq seksewil, **Tamarix ramosissima**- jın`g`ıllar tutas ken` arealg`a iye.

Geybir o`simlikler jer sharının` barlıq jerinde derlik shashırandı tu`rinde ushı-rasadı, bunday o`simliklerge ajıralg`an areallar deymiz. Mısalı, emen, g`oza, smoro-dina, magnoliya, h.t.b. g`o`za o`simligi Orta Aziyada, Yaponiyada, Qıtayda, AQSh-ta ajıralg`an tu`rinde ushırasadı. Sudet paporotnigi- Cystopteris sudetica-Sudet, Karpat, Ural ha`m Sibir`de ajıralg`an tu`rde ushıraydı.

Geybir o`simliklerdin` arealı jın`ishke, uzın bolıp keledi. Bular lenta sıyaqlı areallar bolıp, olar da`r`ya, ko`l ten`iz jag`alarında ushırasadı. Mısalı, torang`ıl, jiyde, h.t.b.

Areallardın` bunday bolıp keliwi bir qansha ekologiyalıq faktorlarga`a (klimat, topırak, biotik faktorlar, mexanikalıq ta`sirler, t.b.) baylanıslı. Usı faktorlar ta`biyat-ta arealdın` formalanıwına jeke ta`sir etpesten birgelikte kompleks tu`rde ta`sir etedi. Usınday sebepler menen formalang`an (du`zilgen) areallar turaqlı ha`m turaqsız bolıp keledi. Egerde bir o`simlik arealı ken`eyiwi yamasa tarayıwında o`z shegine jetse, sırtqı ekologiyalıq jag`daylardın` o`zgeriwine berilmese, bunday o`simlik arealın turaqlı areal dep ataymız.

Bazıbir o`simliktin` arealı ken`eyiwi yamasa tarayıwı shegine jetip, ma`lim bir formaga`a kelmegen boladı. Bular sırtqı jag`daylar ta`sirinde o`zgerip, bir formadan ekinshi formaga`a o`tedi. Bunday arealg`a turaqsız areal dep ataymız.

*Areallardın` payda bolıwı.* Areallar bir neshe jollar menen payda boladı. Ko`bine areallar migraciya (migratsio-ko`shiw) jolı menen, yag`nıy bir jerden ekinshi jerge keshiwi arqalı payda boladı. Ko`shiw bir neshe agentler ja`rdeminde a`melge asırıladı. Mısalı, samal, suw haywanlar arqalı taralıwı mu`mkin. O`simlik-lerde usı agentler arqalı ko`shiwge iykemlesiw bar. Mısalı, aqbas, kekire, qa`lwen`, qoyma-qoshqarma, t.b. o`simliklerinin` miywesi parashyutları arqalı samal menen tarqaladı, al oshag`an haywanlarga`a jabısıp tarqaladı.

Areallardın` payda bolıwı o`simliklerdin` o`zgeriwinen de boladı, yag`nıy bu-rın bir tutas arealg`a iye bolg`an tu`r ma`lim bir jag`day ta`sirinde o`zgeredi, yama-sa bir tu`rden ekinshi tu`r payda boladı.

Usı qubılıstı birinshi ret izertlegen Pachoskiy degen ilimpaz esaplanadı. Mısalı: qurtqa shash (**iris songarica**) degen o`simlik O`zbekistannın` ayırım jerlerinde ken` tutas arealg`a iye, al geybir jerlerde negizgi tu`rge usamaytug`ın aq gu`lli, sarı gu`lli taza tu`rin ko`remiz. Bul qubılıstı polikroizm qubılısı dep ataymız.

Usı payda bolg`an jan`a tu`r o`z arealına iye boladı. Usınday jollar menen payda bolg`an areallardın` orayı qalay belgilenedi? Bul sorawg`a 3 topar ilimpazlar 3 tu`rli juwap beredi:

1. Arealdın` orayın geometriyalıq jol menen belgilew kerek;

2. Arealdın` orayı osimliktin` da`slepki payda bolg`an jeri bolıwı kerek;

3. Ayırım bir ilimpazlar qay jerde tu`r en` ko`p tarqalg`an jeri sol arealdın` orayı boladı deydi. Bul pikir haqıyqatlıqqa jaqın. Mısalı, Orta Aziyada piyazdın` 70 tu`ri bar. Jer ju`zinde bunday jer joq. Demek, piyazdın` arealının` orayı Orta Aziya esaplanadı.

Waqıtlar o`tiwi menen areallardın` o`zgeriwi, areallar diz`yunkciyası. Tu`r-lerdin` arealları uzaq waqıtlar dawamında o`zgermesten qalmaydı. Olardın` may-danları bir jag`daylarda ken`eyedi, bir jag`daylarda qısqaradı. Da`slep, o`zinin` payda bolıw momentinde tu`rdin` arealı maydanı boyınsha ko`birek kishkene boladı (da`slepki areal). Keyin ala, eger jag`day qolaylı bolsa, tu`rlerdin` tarqalıwı baslanadı ha`m arealı a`ste-aqırın ken`eyedi. Aqırında tu`r o`zinin` tarqalıwının` shegarasına jetedi, arealı maydanı boyınsha u`lkeyiwi toqtaydı ha`m olardın` shegaraları a`ste-a`ste turaqlasadı.

Biraq, areallar kerisinshe maydanları qısqarıp, regrissiv o`zgerislerge de ushı-rawı mu`mkin. Bul tu`rge qorshag`an ortalıqtın` kolaysız bag`darg`a o`zgeriwi (mısalı, klimattın` qattı suwıtıwı yamasa qurg`aqlasıwı) aqıbetinde bolıp o`tedi. Na`tiyjede burın ken` maydandag`ı arealdan, onın` kishkene bir bo`limi qalıwı mu`mkin. Bunday areallardı relikt (qaldıq) areallar dep ataladı. Bunday areallarg`a iye bolg`an o`simliklerden mamont ag`ashı, tyul`pan ag`ashı-Liriodendron tulipi-fera, batpaq kiparisi-Jaxodium distichum h.b. misal boladı.

Waqıtlardın` o`tiwi tekte areallardın` ken`eyiwi ha`m kishireyiwine alıp kelip qoymastan, olardın` formasının` o`zgeriwine de alıp keledi. Geyde da`slepki ken` tutas areal keyin ala bir qansha bo`leklerge ajırılıwı mu`mkin. Bul ko`binese tuwıslardın` areallarına tiyisli (tuwıstın` bir tu`rleri arealdın` bir bo`limin, basqaları ekinshi bo`limin iyeleydi). Mısalı, Magnoliya-Magnolia tuwısının`, arealı eki bo`limnen tu`rıp, olardın` birewi Arqa Amerikada, ekinshisi-Qubla Shıg`ıs Aziyada. Bunday awhallar katal`pa-catalpa ha`m basqa da tuwıslarda bar. Bunday tuwıslar 150 den aslam. Bul kontinentler aralıq diz`yunkciyag`a misal boladı.

Relikt areallar ha`m relikt o`simlikler. Geybir o`simliklerdin` arealı barg`an sayın ko`lemi jag`ınan kishireyip baradı. Bunday o`simlik arealın relikt (qaldıq) areal, al o`simlik tu`rin relikt o`simlik deymiz.

Relikt areal menen relikt o`simliklerdi belgilew tek g`ana paleontologiyalıq materiallarg`a tiykarlanadı. Mısalı, ginkgolar, sagovnikler relikt o`simlikler esapla-nadı. Bul o`simlikler da`slep ju`da ken` tarqalıp, son` arealı tarayg`an tar shashı-randı halda ushıraydı. Ginkgo mezo`zoy erasında jasag`an, ha`zirgi o`simlik-lerdin` jas jag`ınan bunnan u`lkeni joq. Sonlıqtan Ginkgo belovanı tiri qazılma o`simlik deydi. Ag`ash deneli o`simliklerdin` reliktligin qazılma qaldıqlarına qarap belgi-leymiz. Sho`p deneli o`simliklerdin` reliktligin

filogenetikaliq sistemadag`ı tutqan ornına ha`m tu`rinin` azayıp barıwına qarap belgileymiz.

Relikt o`simliklerdin` jasın belgilewde ha`r qıylı boladı. Mezazoy ha`m u`sh da`wirden qalg`an reliktlar muz da`wirinen qalg`an reliktlar. Muz basıw da`wirin-de Evropanın` tu`sligin, Kavkazdın` batısın, Volga boyı biyikligin muz baspag`an. Sonlıqtanda bul jerlerde ken` japıraqlı ag`ash deneli o`simlikler ushırasadı. Misalı, Bagul`nik, brusnika, qısqa boylı qayın, pushnitsa h.t.b o`simlikler bar.

*Endemizm ha`m vikarizm qubılısı.* Geybir o`simlikler jer ju`zinin` belgili jerin-de taralıp, tek g`ana sol jer ushın xarakterli bolıp basqa jerlerde o`speydi. Bunday o`simlikler endemik dep, al qubılıstı endemizm deymiz. Endemler tekte tu`rler arasında bolıp qoymastan, basqada taksonlarda da (tuwıslar, tuqımlaslar h.t.b.) boladı.

Jer sharının` bir rayonı endemlerge bay ekinshisi azlaw, u`shinshisinde endemler bolmawı mu`mkin. A`yyemgi ten`iz atawlarının` florasında endemik o`simliklerdin` u`lesi ju`da` ko`p boladı. Misalı, Jan`a Zelandiya florasında 75% ke jaqın endemik tu`rler bar. A`yyemgi atawdın` endemlerge bay bolıwının` ayırıqsha sebepleri, olardıń o`simlikler du`n`yası ju`da` uzaq dawam etken waqıtlar ishinde basqa jerlerden ajıralg`an ha`m ol jerlerdin` o`simlikleri menen almasıqta bolma-g`an. Usı jag`daylarda atawda evolyuciya barasında jan`a tu`rler payda boldı. Sonın` menen birge bul jerde jer sharının` basqa territoriyalarında o`lip ketken o`simlikler saqlanıp qalıwı mu`mkin .

Sonday-aq endemik o`simliklerdin`, joqarı procenti a`yyemgi tawlar sistema-sının` joqarg`ı poyasında (subal`p xa`m al`p) derlik ko`p. Bul qubılıstın` sebebi tawlardın` qorshag`an tegislik territoriyalar o`simlikleri menen qatnasıg`ının` bol-mawı. Taw to`beleride okeanlardın` atawları sıyaqlı floraları bo`leklengen. Tawlar sistemasında ju`da` jas jastag`ı endemler sanı az.

Endemik o`simlikler eki tipke-paleoendemik ha`m neendemik bolıp ajıraladı.

Paleoendemikler ju`da` a`yyemgi o`simlikler bolıp, ha`zirgi waqıtta ha`mme jerde o`lip bolg`an, qandayda kishkentay territoriyalarda saqlanıp kalg`an o`simlikler. Misalı, mamont ag`ashı, batpak kiparisi h.b.

Sonday-aq o`simliklerde vikarizm qubılısı bar. Vikarizm (usas tu`rler) dep, morfologiyalıq belgileri boyınsha az ajıralatug`ın ha`m o`z ara tuwıslıq jaqtan jaqın, biraq territoriyaları bo`leklengen tu`rlerge, taksonlarg`a aytamız. Ha`r bir takson o`zinin` ayırıqsha territoriyaların iyeleydi.

Taksonlar vikarizminin` payda bolıwı, ko`binese birinshi (da`slepki) pu`tin areallardın`, bo`liniwi na`tiyjesinde o`tedi.

Bo`liniw faktorlarının` qatarına ten`izlerdin` ajıralıwı emes, al sonday-aq tawlar payda bolıwı, muzlıqlardın` basıwı h.t.b. xızmet etedi.

O`z betinshe tayarlanıw ha`m qadag`alaw ushın sorawlar.

1. Areallar neshe tipke bo`linedi?
2. Areallardın` qanday formaları bar?
3. Areallar diz`yunkciyası degenimiz ne?
4. Qanday o`simliklerdi kosmopolit o`simlikler deymiz?

3-tema: Flora haqqında ta`liymat

Reje:

1. Flora haqqında ulıwma tu`sinik.
2. Floralar analizi, floranın` geografiyalıq elementleri.
3. Floralar quramındag`ı endemler ha`m reliktler
4. Anıq (konkret) floralar.
5. Adamlardın` florag`a ta`siri

*Flora haqqında ulıwma tu`sinik.* Belgili bir territoriyada ushırasatug`ın o`simlik tu`rlerinin` jıyındısı flora dep ataladı. Orta Aziya florası, O`zbekistan florası, Qaraqalpaqstan florası h.t.b. dep atawg`a boladı. Floranın` quramına ha`r qıylı tuwıstag`ı ha`m tuqımlastag`ı, o`zlerinin` ekologiyalıq o`zgeshelikleri, geografiya-lıq tarqalıwı, kelip shıg`ıwı h.b. boyınsha ha`r tu`rli o`simlikler kiredi. Floranın` payda bolıw barısında quramalı ha`m ha`r tu`rli processler, yag`nıy taza tu`rler payda bolıp, eskilerinin` o`liwi ha`r qıylı bag`darg`a tu`rlerdin` migraciyası esabı-nan o`simliklerdin` quramının` o`zgeriwi h.t.b. bolıp o`tti. Floralar qorshag`an ortalıqtın`, ba`rinen burın klimatlıq faktordın` ta`sirinen payda boldı. Solay etip, flora ekologiyalıq ha`m tariyxıy sebepler na`tiyjesinde payda bolg`an quramalı qubılıs.

Ha`r qıylı territoriyalardın` florası olardın` tu`rlerinen turatug`ın sanı boyınsha basqasınan a`dewir ajraladı. Bul ba`rinen burın territoriyanın` ko`lemine baylanıs-lı. Territoriyanın` ko`lemi kansha u`lken bolsa, tu`rler sanıda ko`p boladı.

Floralardın` baylıg`ı basqada bir qansha faktorlar menen, a`sirese territoriyalar ishindegi ta`biyiy jag`daylar klimatlıq, orografiyalıq, edafikalıq faktorlardın` ha`r tu`rliligi menen anıqlanadı. Ortalıq jag`dayları qansha ha`r qıylı bolsa, ha`r qıylı o`simliklerdin`, jasawı ushın mu`mkinshiliklerde ko`p boladı, florada sonsha bay keledi. Biyiklik poyaslıg`ı jaqsı bilingen, tik jarlılıg`ı ha`m janbawırları tu`rlishe ekspozitsiyag`a iye bolg`an iri tawlar sistemasının` florası ju`da` bay boladı. Mısalı, Kavkazda 6000 nan aslam tu`rler bolsa, Rossiyanın` evropalıq bo`liminin` orta polosalarının` ken` tegisliklerinde 2300 tu`r ushırasadı. Floranın` baylıg`ına tariyxıy sebeplerde ta`sir etiwı mu`mkin. Jasları ko`plegen million jıllar menen o`lshenetug`ın ju`da` a`yyemgi floralar tu`rleri menen ayrıqsha bay. Bul jerlerde klimattın` suwıtıwı, muz basıwı aqıbetinen basqa oblastlarda o`lip ketken

o`simlikler saqlanıwı mu`mkin. Bunday a`yyemgi floralar uzaq Shıg`ıs, Batıs Zakav-kaz`yada ushırasadı. Jaqın waqıtlarda payda bolg`an jas floralar tu`rleri ju`da` az boladı.

*Floralar analizi, floranın` geografiyalıq elementleri.* Floranı izertlegende birinshi gezekte olardıń sistematikalıq quramına analiz jasaladı, yag`nıy florada qanday tuqımlaslar bar, olar neshew, olar qaysı tuwıslardı qamtıydı, ha`r bir tuqımlasta neshe tu`rler barlıg`ın anıqlanadı. Tu`rler sanı ko`p bolg`an u`lken tuqımlaslar bo`lip shıg`arıladı. Ha`r qıylı territoriyalardıń floraları arasında olardıń sistematikalıq belgilerinde: u`lken tuqımlaslardıń diziminde, olardıń izbe-iz almasıwında (tu`rler sanının` to`menlewi boyınsha h.b. aytarlıqtay ayırmashılıq bayqaladı. Ha`r tu`rli floralardı analizlew olardıń uqsaslıg`ı ha`m o`zgeshelik da`rejesi tuwralı ko`zqaras beredi.

Sunday-aq floralardı analizlegende o`simliklerdin` ha`r qıylı tirishilik formalarının` ekologiyalıq toparlar (gigrofitler, mezofitler, kserofitler, psammofitler h.t.b.) qatnasatug`ınıg`ı anıqlanadı.

Floralardı analizlew olarg`a kiretug`ın tu`rlerdin` geografiyalıq tarqalıwı ko`z-qarasında u`lken a`hmiyetke iye. Ayırım tu`rler bul jag`ınan ku`shli ajıraladı. Bir tu`rlerdin` arealı flora iyelegen territoriyag`a jarım-jartı kirse, ekinshilerinın` arealı kerisinshe floranın` barlıq territoriyasın iyeleydi ha`m onın` shegarasınan uzaqqa shıg`ıp ketedi. Floranı du`zetug`ın o`simlikler arasınan areallarının` ulıwma belgileri uqsas tu`rler toparın bo`lip shıg`arıwg`a boladı. Tu`rlerdin` bunday toparları floranın` geografiyalıq elementleri degen at aladı. Floranı analizlegen waqıtta onın` quramına qaysı geografiyalıq elementler kiredi ha`m olardıń ha`r qaysısının` u`lesi qansha ekenligi ajratıladı.

Barlıq G`MA floraları ushın ju`da` ko`plegen geografiyalıq elementler ajratıladı. Olardan bir qanshasın atap o`teyik:

1. Arktika tu`rler toparı. O`simliklerdin` arealları Arktikada jaylasqan (G`MA da ha`m odan shette). Mısalı: Dyupontsiya g`a`llesi.

2. Boreal` (arqa) tu`rler toparı. Arealları Evraziya ha`m Arqa Amerikanın` iyne japıraqlı tog`aylar polosasına tuwra keledi.

3. Orta Evropa tu`rler toparı. Arealları Evropanın` shet elleri menen G`MANın`, Evropalıq bo`liminin` ken` japıraqlı tog`aylar oblastın` qamtıydı. Mısalı, qa`dingi emen-Quercus robur.

4. Ponti tu`rler toparı. Arealları Evraziyanın` dala zonası menen baylanıslı. Mısalı, dala shiyesi-Cerasus fruticosa, ba`ha`rgi adonis-adonis vernalis., t.b.

5. Orta jer ten`izi tu`rler toparı. Bug`an Orta jer ten`izi ha`m Qara ten`iz boyı elleri (Kavkaz, Qırım, t.b.) kiredi. Mısalı, Camshit-Buxus, t.b.

6. Atlantik tu`rler toparı-G`MDA nın` evropalıq bo`liminin` batıs`n iyeleydi.

Misali, Lobeliya, voskovnik.

7. Orayliq Aziya tu`rler topari-Pamir-Alay, Tarbagatay tawlarin iyeleydi.

8. Turan tu`rler topari-bug`an Orta Aziya sho`llerinde o`siwshi Aral-Kaspiy qumlarinda o`siwshi sho`l o`simlikleri kiredi. Olar haqiyqiy kserofitler. Misali, Artemisia, t.b.

9. Man`juriya tu`rler topari. Bug`an Uzaq Shig`istin` qublasinin` o`simlikleri kiredi. Bunda ag`ashlar menen qatar ken` japaraqli putalar ko`p ushirasadi. Misali, Man`juriya g`o`zasi, Barxat ag`ashi.

Anaw yamasa minaw rayonnin` floralar quramina o`zlerinin` kelip shig`iwı ha`r qiyli bolg`an o`simlikler kiriwi mu`mkin. Floranin` bir qansha tu`rleri jergilikli bolip, avtohtonlilar dep ataladi. Olardin` kelip shig`iwı ha`m tarqaliwı berilgen floranin` territoriyası menen baylanisli. Ekinshi bir tu`rler kerisinshe basqa rayonlarda payda bolip, keyin ala odan tarqala baslaydi. Bul tu`rler allohtonlar dep ataladi. Kelip shig`iwı birdey bolg`an tu`rler topari floranin` genetikaliq elementleri dep ataladi.

Floralardin` payda bolıwı processi quramalı, ha`r qiyli jag`dayda da ol ha`r qiyli keledi. Egep de bir territoriyanin` klimati birden o`zgerse, bir flora ekinshisi menen almasadi. Buring`ı floranin` tu`rlerinin` bir qanshası o`lip ketedi, ekinshileri basqa rayonlarg`a ko`ship o`tedi, bir qanshalari jan`a jag`daylarg`a beyimlesedi ha`m kalip qoyadi. Sonin` menen o`zgergen ta`biyat jag`dayına jaqsı beyimlesken basqa oblastlardan ko`plegen o`simlikler payda boladi. Olar jan`a floranin` tiykarin quraydi.

Floralar quramındag`ı endemler ha`m reliktler. Qa`legen floranin` en` bir a`h-miyetli o`zgesheligi, onda endemik relikt o`simliklerdin` qatnasıwı bolip tabiladi. Bul o`simlikler floranı analizlegende u`lken a`hmiyetke iye. Olar o`simliktin` jasın, kelip shig`iwın, basqa floralar menen genetikaliq baylanısın h.t.b. anıqlawda ja`rdem etedi.

Endemik o`simlikler tuwralı aytilsa, ko`bine paleoendemlerdi tu`siniwimiz tiyis. Olardin` ko`p mug`darda qosılıwı floranin` a`yyemgiligin ko`rsetedi. Bul usı floranin` uzaq waqıtlar boyı basqa o`simlikler du`n`yasınan bo`linip rawajlang`an-lig`ının` guwası. Bir qansha a`yyemgi atawlar florasında endemik tu`rler emes, sonday aq tuwıslar, ha`tte tuqımlaslarda bar. Misali, Madagaskarda bir qansha en-demik tuqımlaslar gezlesedi. Ju`da` arıda yamasa bermanda bo`lingen geologiyalıq a`sirlerde birinshi jasaw orınlarında saqlanıp qalg`an a`yyemgi o`simliklerge relikt-ler delinedi. Floralarda reliktlerdin` qatnasıwı onin` a`yyemgiligin ko`rsetedi.

Geologiya tariyxının` anaw yamasa minaw da`wirlerinde saqlang`an ha`r qiyli jastag`ı reliktler ajratiladi. A`yyemgi reliktler jer sharının` florasında mezo`zoy erası dep belgilenedi. Bunday reliktlerge a`yyemgi jalan`ash tuqımlı o`simliklerden

ginkgo- ujingko biloba, sonday aq mamont ag`ashı jatadı. G`MA florasında mezozoy reliktləri joq.

U`shinshi da`wirdin` ju`da` ko`p sandag`ı reliktlərinin` jası onsha u`lken emes. Jıllı klimatı menen ayırılğ`an u`shinshi da`wir o`simlikleri jer sharı territoriya-larında ken` tarqalg`an (a`sirese Evraziya ha`m Arqa Amerikada). Keyin ala muz-lıqtın` basıwı, klimattın` ulıwma suwıtıwınan jıllılıqtı su`yiwshi u`shinshi da`wir flolararının` wa`killeri ko`plegen rayonlarda o`lip ketti. Klimatı onsha ko`p o`zger-megen ayırım baspana (ubejitse yamasa refugium) larda saqlanıp qaldı.

Arqa yarım shardın`, u`shinshi da`wir flolararının` baslı refugiumı Arqa Amerikanın` qublı-shıg`ısında, Yaponiya ha`m Qıtayda saqlang`an. Arqa Amerika territoriyanında u`shinshi reliktlərdən tyul`pan ag`ashı, batpaq kiperisi, magno-liyalar h.b. o`simlikler saqlang`an. Yapon-Kıtay refugiumı u`shinshi reliktlərgə ju`da` bay (emennin`, buk, kashtan, magnoliya tu`rləri). G`MA florasında ju`da` ko`p u`shinshi reliktlər bar. Olar bir qansha refugiumlarda jıynalg`an. Olardın` birewi Batis Zakavkazı. Bul jerde haqıyqıy kashtan, lapin, pontiy rododendronı, samshit h.b.saqalang`an.

Kaspiy ten`izinin` batis jag`alarının` uzaq qublasında jaylasqan refugiumda reliktlərdən temir ag`ashı, kaspiy gledichiyası, lenkoron (jipek) akaciyası h.b. ushı-rasadı.

Uzaq Shıg`ısta (Primor`ede) u`shinshi reliktlər ju`da` ko`p. Olardan amur bar-xatı, jen`shen` h.b.aytıwg`a boladı.

U`shinshi reliktlər Qırımın` Qubla jag`aları, Orta Aziyanın` tawlı flolararında bar. Orta Aziyada jan`g`aq-miywe ag`ashları, Kavkazda, mısalı, Azerbayjanda gir-kon tog`ayı.

Qaraqalpaqstanda u`shinshi da`wir reliktlərinin` - myagko`plodnik kritmolis-tıy, elek qandım, Tu`rkmen palatısı h.t.b. ushıraydı.

Muzlıq da`wirinin` reliktləri elede kishi jasqa iye. Bul derlik suwıqqa shıdamlı o`simlikler territoriylardı muz basqan da`wirde jasap, muz benen qaplanbag`an jerlerde o`sip, muzlar ketkennen keyin olar o`z orınlarında qaladı. Mısalı, G`MA da bagul`nik, klyukva, brusnika, t.b.

En` aqırında en` "jasları" bolıp muz basıwdan keyingi reliktlər yamasa kseroter-mikalıq da`wir reliktləri esaplanadı.

Anıq (konkret) flolarar. Floristlik izertlewler waqtında ko`birek anıq yamasa elementar flora dep atalatug`ın ob`ekt xızmet etedi. Anıq (konkret) flora dep ta`-biyiy qatnasta derlik birgelikli bolıp, u`lken emes territoriya dag`ı o`simliklərdin` jıyındısına aytıladı (tegisliliklerde derlik 100-500 km²). Bunda klimattın` ulıwma bir-geliki keliwinen o`simliklərdin` ayırım tu`rləri tekte edafik jag`daylar ha`m ayırıqsha rel`efke baylanışlı tarqaladı. Anaw yamasa mınaw jasaw orınlarının` uq-sas jag`daylarında tu`rlərdin` belgili jıyındısı derlik tolıq qaytalanadı. Konkret

flora territoriyasın dıqqat penen u`yrengende bul jerdegi o`siwshi barlıq ayqın anıq-lanadı.

Anıq floralar G`MA nın` ha`r qıylı, ta`biyiy zonaları ishinde tu`rlerdin` ulıwma sanı boyınsha tiykarınan ajraladı. Mısalı, tundra rayonlarında **100-350**, tog`ay zonasında derlik ko`p **500-700** tu`rler bar. Anıq floranı u`yreniw usılı ha`r qıylı territorilardın`, ulıwma floralıq baylıg`ın salıstırğ`anda paydalı.

*Adamlardın` florag`a ta`siri.* Adamlardın florag`a ta`siri ha`zirgi da`wirde ju`da` ku`shli ha`m onın` ko`lemi mudamı ko`beymekte. Ta`biyiy o`simlikler qap-lamı joq etilgen territoriyalar maydanı jıldan-jılğ`a artıp barmaqta. Ta`biyiy o`simlikler iyelegen maydanlardın` qısqarıwı aqıbetinen ko`plegen jabayı o`siwshi o`simlikler tu`rlerinin` o`siw mu`mkinshiligi keskin azaymaqta, olardın` jasawı ushın ke-rekli orınlar qısılmaqta. Floralardın` quramına u`lken maydanlarda jerlerdi su`riw, tog`aylardı shabıw, mallardı bag`ıw h.b. ju`rgizilip atırğ`an isler ta`sir jasamaqta. Sonday-aq florag`a massalıq turizm, gu`llerdi, da`ri-darmaqlıq, o`simliklerdi jıy-naw h.b. ku`shli ta`sir etedi. Adamlar iskerliginin` bul formaları ayırım tu`rlerdin` sanının` azayıwına, ha`tte kishkene territoriyalar florasının` joq bolıp ketiwine alıp keledi.

Sonın` menen birge adamlar iskerligi floralar quramına bul jerlerge ta`n bolma-g`an jan`a o`simliklerdin` payda bolıwın tuwdıradı. Bular a`kelingen yamasa ad-ventiv tu`rler. Olar adamlardın` iskerligi menen baylanısta bolg`an avtomobil` ha`m temir jollardın` boylarında, atızlardın` shetlerinde, elatlı punktlerde ha`m basqa da jerlerde ken` tarqaladı. Bunday o`simliklerdin` tuqımları tosattan uzaq jerlerden, ha`tte basqa kontinentlerden keltiriledi. Mıs:, iyisli romashka Arqa Amerikadan keltirilgen. Son`g`ı jılları qalalardın` floraları adventiv o`simlikler menen bayımaqta.

Jergilikli flora adamlardın` basqa jerlerden, a`sirese jer sharının` uzaq rayon-larınan paydalı o`simliklerdi (azıq- awqatlıq, ot-jemlik, manzaralı h.t.b.) a`kelip ar-nawlı egip o`siriwi na`tiyjesinde tolıqpaqta.

Solay etip, adamlardın` iskerligi ha`zirgi da`wirde floranı aytarlıqtay o`zgeris-lerge a`kelmekte. Bir ta`repten jabayı floranın` quramınan og`an tiyisli bir qansha o`simlikler joq bolmaqta. Ekinshi ta`repten flora ko`p sandag`ı taza o`simlikler menen bayımaqta.

O`z betinshe tayarlanıw ha`m qadag`alaw ushın sorawlar.

1. Floralar analizi degenimiz ne?
2. Floranın` geografıyalıq elementleri qanday formada boladı?
3. Anıq (konkret) floralar qanday floralar?
4. Endemik o`simlikler degenimiz qanday o`simlikler?
5. Adamlardın` florag`a ta`sirinin` qanday formaları bar?

4-tema: Jer sharın floristikalıq rayonlarg`a bo`liw

Reje:

1. Floristikalıq rayonlarg`a bo`liw haqqında tu`sinik.
2. Golarktikalıq du`n`ya
3. Paleotropikalıq du`n`ya
4. Neotropikalıq du`n`ya
5. Kap du`n`yası
6. Avstraliya du`n`yası
7. Golantarktikalıq du`n`ya

*Floristikalıq rayonlarg`a bo`liw haqqında tu`sinik.* Floristikalıq rayonlarg`a bo`liw dep jer sharı betin ha`r qıylı rengadag`ı (fitoxorin) floristik regionlarg`a bo`liwge aytıladı. Ha`r bir region o`zinin` territoriyasına iye bolıp, onın` florası azlı-ko`pli birgelki, bir tipte, o`zinin` o`zgesheligine iye ha`m basqa regioldın` flolararınan u`lken yamasa kishi da`rejede ajıraladı.

Floristikalıq rayonlarg`a bo`liwde en` u`lken birlik bolıp patshalıq (tsarstvo) esaplanadı. Jer sharı altı patshalıqqa du`n`yag`a bo`lingen: Golarktikalıq, Paleotro-pikalıq, Neotropikalıq, Kap, Avstraliya ha`m Golantarktika.

Patshalıqqa bo`lgen waqıtta birinshi na`wbette derlik joqarı rangadag`ı takson-lar-tuqımlaslar ha`m tuwıslar dıqqatqa alınadı. Ha`r bir patshalıq ko`p yamasa az sandag`ı endemik, o`zine ta`n tuqımlasqa, sonday aq tuwısqa iye.

Floristikalıq patshalıq oblastlarg`a bo`linedi. Oblastlarg`a bo`lgende ba`rinen burın endemik tuwıslar ha`m tu`rler sanı esapqa alınadı. Endemizm bularda ju`da` ko`p boladı al endem tuqımlaslar joq yaki ju`da` az. Ha`r qıylı ilimpazlar ta`repinen jer sharındag`ı bo`lip shıg`arılğ`an floristikalıq oblastlar sanı 29 dan 43ke shekem baradı. Ataqlı geograf, akademik A.L.Taxtadjyan 34 oblastı bo`lip shıg`ardı.

Floristikalıq oblastlar o`z gezeginde provintsiyalarg`a, al olar okruglerge bo`li-niwi mu`mkin. Joqarıda ayılğ`an floristikalıq rayonlarg`a bo`liw birlikleri menen qatar aralıq kategoriyalarg`a poltsarstva, podoblast` h.t.b. boladı.

Ta`biyatta ayırım territoriyalıq boyarlikler (patshalıq, oblast` h.t.b.) arasında anıq belgilengen shegaralar joq, olardı tek sha`rtli tu`rde ju`rgiziledi. Ken`islikte flolarar quramı geyde tez geyde a`ste o`zgeredi, biraq ko`bine a`ste-aqırın o`tedi.

Floristikalıq patshalıqlar florası boyınsha bir-birinen ku`shli ajıralatug`ın terri-toriyalar bolıp tabıladı. Bul o`zgesheliklerdi qanday da bir ha`zirgi faktorlar menen, mısalı klimatlıq jag`daylar menen da`lillewge bolmaydı. Bir ekvatoryalıq-tropikalıq poyastın` o`zinde flolararı ju`da` ha`r qıylı bolğ`an ha`r tu`rli floristikalıq patsha-lıqlar (mısalı, Paleotropikalıq, Neotropikalıq, sonday-aq Golarktikalıq) jaylasadı. Sonın` menen birge bir floristikalıq patshalıqtın` ishine

(mısalı, Golarktikalıq) ha`r qıylı klimatlıq poyaslar ha`m ta`biyy zonalar (tundradan sho`llikke shekem) ushı-rasadı. Basqasha aytqanda patshalıq penen klimatlıq jag`daylar arasında hesh qan-day uqsaslıq joq.

Anaw yamsa mınaw patshalıqtın` florasının` payda bolıwında sheshiwshi rol`di tariyxıy faktorlar oynag`an. Ha`r bir patshalıqtın` florası o`z jolı menen, ko`bi-nese u`lken yamasa kishi bo`lekleniw jag`dayında payda bolg`an. O`simliklerdin` erkin almasıwına, olardın`, migratsiyasına kontinentlerdi bo`lgen ten`iz ken`islik-leri, olardın` tarmaqları, tawlar dizbekleri, ken` sho`listanlıqlar h.t.b. keri ta`sir etken. Jer qabıg`ındag`ı dinamikalıq processlerde a`hmiyetli bolg`an. Geologiyalıq tariyklar dawamında materiklerdin` kelbeti o`zgerip otırg`an. Da`slepki waqıtlar-dag`ı pu`tin kontinentler keyin ala bo`limlepge ajralg`an, al qurg`aqshılıqtın` ken` massivleri bir materikten ekinshisine o`tken (mısalı, ha`zirgi Hindistan Yarım atawı). Jer qabıqlarının` gorizontal` awısıwı menen birge vertikal` awısıwlarda bolıp o`tken. Qurg`aqılıqtın` uchastkalarının` to`men tu`sip ketiwin ten`izler trans-gressiyasına, ko`teriliwi-tawlardın` payda bolıwına alıp kelgen. Usılayınsha ha`r qıylı geologiyalıq da`wrlerde o`simliklerdin` erkin ko`ship-qonıwı, floralardın` almasıwı ushın tosquinlıqlar kelip shıqqan.

Joqarıdag`ı aytilg`an jag`daylar menen bir qatarda o`simlikler du`n`yasının` ulıwma evolyuciyası, yag`nıy taza tu`rler ha`m basqada taksonlardın` payda bolıwıda u`lken a`hmiyetke iye. Floralardın` almasıwının` bolmawınan ha`r qıylı ajralg`an territoriyalarda evolyuciya ha`r tu`rli jollar menen o`tti, bir-birine uqsamag`an taksonlar ju`zege keldi. Bul o`z gezeginde ha`r bir bo`lingen territo-riyanın` o`zine ta`n florasın do`retti. Aqırında, geologiyalıq tariyklar dawamında belgili taksonlardın` o`lip ketiwi bolıp o`tti. Qanday bolsada bir tu`r, tuwıs h.t.b. bir regionda tolıq joq bolıp, ekinshi regionda saqlanıp qalıwı mu`mkin. Bul floralardın` o`zgesheliklerinin` ja`ne bir sebebi.

Bir patshalıqtın` o`zinde bir-birinen ju`da` qashılıqta bolg`an kontinentler-din` ha`r qıylı bo`limleri bolıwı mu`mkin (mısalı, Paleotropik patshalıq). Sonın` menen birge bir kontinenttin` o`zinde bir qansha patshalıq jaylasıwı mu`mkin (mısalı, Afrikada, Qubla Amerikada, Aziyada). Bul faktlerdin` ha`mmesi flolarar-dın` payda bolıwında tariyxıy faktorlardın` sheshiwshi rolin ko`rsetedi.

Golarktikalıq du`n`ya. Bul patshalıq maydanı boyınsha qalg`an barlıq patshalıqlar arasında en` ko`lemlisi. Ol jer sharı barlıq qurg`aqılıg`ının` yarımınan aslamın iyeleydi. Onın` territoriyası derlik arqa yarım sharda jaylasıp, barlıq Evropanı, Arqa Afrikanı, Aziyanı (en` qubla bo`liminen basqasın), derlik barlıq Arqa Amerikanı qamtıydı.

Golarktikalıq patshalıqta tu`tiksheli o`simliklerdin` 30 dan aslam endemik tuqımlasları bar (ginkgolar, evkommiyalar, pionlılar, diapensiyalar, adokslar,

susaklar (suwpiyazlar) h.t.b.). Biraq bul tuqımlaslardıń ha`mmesi mayda, wa`killerinin` sanı boyınsha ju`da` az, geyde tekte bir tu`rdi tutadı.

Golarktikalıq patshalıqtıń florasın bir qansha endemik emes, biraq ken` tarqalg`an tuqımlaslar ju`da` jaqsı sıpatlaydı. Olar salıstırma tu`rde iri tuqımlaslar. Bul tuqımlaslardıń basım ko`pshilik tu`rleri Golarktiske tuwra keledi. Bunday tuqımlaslarg`a sarıg`aldaq gu`lliler (lyutikler), qayın`lar, mıyıq gu`lliler, soralar, grechixa gu`lliler, tallar, atanaq gu`lliler, sayaman gu`lliler h.t.b. jatadı. Iyne japıraqlılardan qarag`aylar (qarag`ay, shırsha, pixta, listvennitsa, t.b.) ha`m kiparisler (mojjevel`nik, kiparis, tuya, t.b. tuwıslar) tuqımlasların atawg`a boladı.

Golarktikalıq patshalıqtıń florasında ju`da` ko`p endemik tuwıslar bar. Olar Golarktis territoriyasında ushırasatug`ın ko`plegen tuqımlaslarda bar. Endemikler qatarına qurama gu`lliler tuqımlasınan-chesnochnitsa (Alliaria) lunnik (Lunaria), birinshi gu`llilerden-sol`danella (Sohdanella), sayaman gu`llilerden-snıt` (Aegopodium), kupır` (Anthriscus), burachniklerden- medunica (Pulmonaria), t.b. tuwıslar jatadı.

Tu`rler da`rejesindegi endemizmge kelsek, olda bul jerde ken` ushırasadı. Endemik tu`rler sanı ju`da` ko`p.

Golarktikalıq patshalıq u`sh: Boreal`, a`yyemgi orta jer ten`izi ha`m Madrean (Sonor) kishi patshalıqlarg`a (pod tsarstvag`a) bo`linedi.

Boreal` kishi patshalıg`ı podtsarstvo (arqa yarımpatshalıq) -maydanı boyınsha en` u`lken. Onıń quramına derlik barlıq Evropa, Aziya ha`m Arqa Amerikanıń ko`p bo`limi kiredi. G`MA territoriyası (Orta Aziya ha`m Qazaqstannan basqası) tiykarınan usı podtsarstvog`a tuwra keledi. Bul podtsarstvo basqa eki podtsarstvo menen salıstırğ`anda florasınıń ko`birek bay ekenligi menen xarakterlenedi. Bul jerde endemik tuqımlaslar menen tuwıslar ju`da` ko`p. Kishi patshalıq (podcarstva) 4 oblastqa bo`linedi.

1. Cirkumboreal`lıq oblast` derlik barlıq Evropanı (uzaq qubla rayonlardan basqa), Arqa Aziyanı (shama menen 50° arqa ken`likke shekem), al Arqa Amerikada derlik barlıq Alyaska menen Kanadanı qamtıydı. Bul jer sharınıń en` u`lken floristikalıq oblastı. Biraq onıń florasında endemik tuqımlaslar joq, al endemik tuwıslar salıstırmalı az. Bul oblastta ken` tarqalıwg`a iye bolg`an xarakterli tuwıslar ju`da` ko`p. Bular emen, qayın, ol`xa, klen, terek, tal, dolana, almurt, alma, ryabina h.b.

2. Shıg`ıs aziyalıq oblast` territoriyası boyınsha bir qansha kishi. Onıń quramına Gimalay ha`m Indoqıtaydın` kishkene bo`limi, Qıtaydın` shıg`ıs bo`limi, barlıq Koreya, Yaponiya, Saxalin, Primor`enin` bo`limi, Amur da`r`yası basseyini-nin` kishkene bo`legi kiredi. Bul oblasttın` florası ayırıqsha bay ha`m o`zgeshe. Onıń quramında 14 endemik tuqımlas bolıp, olar ginkgolar, nefalotaksler, troxodendronlar, tsertsidifiller, evkommiyalılar. 100 den aslam

endemik tuwıslar bar. Mısalı, ro`za gu`lliler tuqımlasınan eriobotriya (Eriobotrya), sobıqlılardan-Maakiya (Maackia) araliyalılardan-kalopanaks (Calopanax), krushinalılardan-xoveniya (Hovenia), qon`ıraw gu`llilerden-platikodon (Platycodon) tuwısları. Endemik tuwıslardıń basım ko`pshiligi a`yyemgi tuqımlaslarga`a jatadı. Bul floranıń pu`tkilley a`yyemgiligin ko`rsetedi. Shıg`ıs aziyalıq oblastta endemik tu`rler sanı ju`da` u`lken. Bul oblasttıń florasının` baylıg`ı ha`m o`zgesheligi ba`rinen burın basqa territoriyalarda tolıq o`lip ketip, bul jerde u`shinshi ha`m odan buring`ı da`wirlerden ko`plegen o`simliklerdin` saqlang`anlıg`ının` da`lili.

3. Atlantika-Arqa Amerika oblastı-Amerikanın` ko`p bo`limin: shıg`ısta Atlantika okeanı jag`alarınan batısta (Velikiy ravnin) Ullı tegisliklerge shekem ha`m Meksika qoltıg`ı jag`alarınan Kanadanın` qubla rayonlarına shekem iyeleydi. Bul oblasttıń florası ju`da` bay ha`m joqarı endemizmligi menen ajraladı. Bul jerde tek bir endemik tuqımlas (leytneriyalılar) bolıp, biraq 100 den az emes endemik tuwıslar bar. Tu`rler endemizmi ju`da` joqarı. Bul oblasttıń florası Shıg`ıs Aziya florası menen ko`plegen uqsaslıqlarg`a iye, biraq Shıg`ıs Aziya ju`da` bay ha`m erte da`wirler formaları ko`p florag`a iye.

4. Jar taslı tawlar (skalistıx gor) oblastı-Arqa Amerikanın` uzaq batısınin` kishkene territoriyasın iyeleydi. Ol Batis Kanadanın` tawlar sistemaların ha`m Alyaskadan N`yu-meksikag`a shekemgi AQShın` batis bo`limlerin o`z ishine aladı. Bul territorianın` florası Tsirkumboreal` oblasttıń florasına ju`da` uqsas, biraq sonın` menen derlik o`z ta`biyatına ta`n. Ol endemik tuqımlaslarga`a iye emes, biraq bir qansha onlag`an endemik tuwıslardı tutadı. Bunday tuwıslarg`a: atanaq gu`lliler tuqımlasınan-stanleyya (Stanleya) tasjararlardan - litofragma (Lithofragma), norichniklerden-kordilantus (Cordilanthus), qon`ıraw gu`llilerden-gitopsis (ujithopsis) h.t.b. jatadı. Endemik tu`rler, a`sirese olardıń arasında iynejapıraqlılar (qarag`ay, shırsha, pixta, listvennica, tiss, psevdotsuga, cuga, arsha, kiparis tuwıslarınan) ju`da` ko`p.

A`yyemgi orta jer ten`izi kishi patshalıg`ı (podtsarstvosi) u`lken territorianı o`z ishine alıp, Arqa Afrikanı, Evropanın` uzaq qublasın, Aldıng`ı, Orta ha`m Oraylıq Aziyanı shıg`ısta Gobi sho`line shekem iyeleydi. Bul territoriyalardıń barlıg`ı derlik azlı-ko`pli qurg`aq (aridniy) klimatı menen xarakterlenedi. Tekte usı jerde jerdin` en` iri sho`listanlıqları jaylasqan. Bul podtsarstvonın` floralarının` payda bolıwında por da`wirinde Qubla Evropa menen Arqa Afrikadan Qıtayg`a shekem u`lken ken`islikti iyelegen a`yyemgi Tetis ten`izinin` qurg`ag`an ultanında qon`ıslang`an o`simlikler u`lken rol` oynag`an. Bul flora tiykarınan migrattsiya esabınan, arqa boreal` ha`m qubla qubla tropikalıq floralardıń wa`killerinin` kelip-qon`ıslanıwınan o`sip barg`an. Podtsarstvonın` basım ko`pshilik o`simlikleri

boreal', siyrek shıg'ıs aziya flolararınan kelip shıg'ıwg'a iye. Kishi patshalıq (Podtsarstvo) 4 oblastqa bo'linedi.

1. Makaroneziya oblasti kishkene territoriyanı iyeleydi (zelenıy mıs, kanar, Madeyra, Azor atawları). Endemik tuwıslar derlik ken`emes (40 qa jaqın), a`sirese olardıń ko`pshiligi Kanar atawına tiyisli. Endemik tu`rler protsenti ju`da` joqarı. Florası bir qansha ju`da` a`yyemgi o`simliklerdi qamtıydı. Kanar atawının` florası o`zine ta`n.

2. Ortajer ten`izi oblasti Qubla Evropanın`, Kishi Aziyanın` ha`m Arqa Afrikanın` (batista Ispaniya ha`m Portugaliyadan baslap shıg`ısta Siriya menen Livang'a shekem) Ortajer ten`izi jag`alarının` ken` polosaların o`z ishine aladı. Oblasttın` florasında tek bir endemik tuqımlas (afillantlar) bar, biraq endemik tuwıslar sanı ko`p (150 ge jaqın) Olardıń arasınan pal`ma tuqımlasınan xamerops (Chamaerops) tuwısın atawg'a boladı. Bul tuwısqa Evropada jabayı o`siwshi bir pa`skeltek xamerops (Chamaerops humilis) pal`ması jatadı. Makaroneziya oblastının` florası menen salıstırg`anda ol jerde a`yyemgi, u`shinshi reliktler kem, sonın` menen birge jas, ko`beyip baratırg`an endemler ko`p. G`MA ishinde Ortajerten`izi oblastına Qırımın` Qubla jag`aları (Sevastopoldan Feodosiyag'a shekemgi tar jag`alıqlar boyı polosalar) ha`m Anapadan Tuapse do`geregine shekemgi Kavkaz jag`alarının` kishkene bo`limi kiredi.

3. Saxara-Araviya oblasti-Arqa Afrikanın` (20° Arqa ken`islikten Arqag'a) ha`m Araviya yarım atawının` ko`p bo`limin o`z ishine aladı. Oblasttın` florası bay emes (1500 tu`rge jaqın). Endemik tuwıslar az bolıp, olardıń ko`pshiligi bir tu`rden turadı. Endemik tu`rler 300 den artıq.

4. Iran-Turan oblasti-Kishi, Orta ha`m Oraylıq Aziyanı o`z ishine alıp Gobi sho`line shekemgi (olda kirip ketedi) ken` territoriyanı iyeleydi. G`MA ishinde bul oblastqa Shıg'ıs Zavkavkaz`ya, Kaspiy ten`izinin` batıs jag`aları, barlıq Qazakstan ha`m barlıq Orta Aziya respublikaları jatadı. Oblasttın` florası ju`da` joqarı tuwıslıq endemizm menen xarakterlenedi. Endemik tuwıslar qatarına: xamamelisler tuqımlasınan parrotiya yamasa temir ag`ash (Parrotia), soralardan- kumarchik (Agriophyllum), nanofiton (Nanophyton), atanaq gu`llilerden-sameariya (Sameraria), Stroganoviya (Stroganovia), sobıqlılardan- qum akatsiyası (Ammodendron), eremosparton (Eremosparton) jatadı. Ayırıqsha ko`p endemik tuwıslarg'a iye atanaq gu`lliler, sayamangu`lliler, quramalıgu`lliler, eringu`lliler, soralar, mıyıqgu`lliler, burachnikler tuqımlasları bolıp esaplanadı. Endemik tu`rler 25% dey. Iran ken` tawlıqları florag'a ko`birek bay, Oraylıq Aziya florası ko`birek jarlı.

Madrean (sonor) kishi patshalıg'ı (podtsarstvası). Jan`a Du`n`yada ornalasıp, Arqa Amerikanın` qubla-batıs bo`limin iyeleydi. Ol jer sharının` usı bo`liminin` qurg`aq oblastların, sonın` ishinde Sonor sho`lin o`z ishine aladı. Bul

podtsarstvonin` florası a`yyemgi orta jer ten`izi florasına baylanıssız rawajlang`an, biraq onın` menen uqsaslıq belgileri bar. Mısalı, uqsas tuwıslar zemlyanichnik (Arbutus), bagryanik (Cercis), fistashka (piste-pistacia) h.b. bar. Bir qansha endemik tuqımlaslar bolıp, bul usı territoriyanın` uzaq waqıtlar o`z aldına bo`leklenip rawajlang`anın da`lilleydi. Tuwıslıq ha`m tu`rlik endemizmi joqarı (10 % tuwıslıq, 40 % tu`rlik).

Paleotropikalıq du`n`ya. Bul patshalıq (carstva) Go`nedu`n`yanın` materik ha`m atawlarınin` u`lken territoriyların iyelep, tek Golarktikalıq tsarstvadan qalıadı. Ol Afrikanı (arqa bo`limi menen uzaq qublasınan basqa), Madagaskar, Hindistan, Indeqıtay atawların, Aziya menen Avstraliya arasında ko`p sandag`ı u`lken ha`m mayda atawlardı, Tınısh okeannın` arqada Gavay atawlarınan baslap qublada Fidji ha`m Jan`a Kaledoniya atawlarına shekem) ko`p atawların o`z ishine aladı. Solay etip patshalıqtın` territoriyası ku`shli ajıralg`an, ha`tte onın` ayırım bo`limleri tropikalıq poyas shegarasında-Afrikadan Polineziyag`a shekem qashıq shashaw jaylasqan. Sonın` menen birge patshalıqtın` ha`r qıylı rayonlarınin` florası ko`plegen uqsaslıqlarg`a iye.

Bul patshalıq territoriyanın` florası ju`da` bay ha`m on mın`lag`an tu`rleri ushırasadı. Patshalıqtın` florasında 40 qa jakın endemik tuqımlaslar bar. Mısalı, nepentesler (nasekoma jewshi o`simlikler), bananlar, pandanuslar. Endemik tuwıslar, a`sirese tu`rlerdin` ko`pligi sonday, ha`tte esaplap bolaalmaysan`.

Bul patshalıqta tutlar tuqımlası, a`sirese **1000** nan aslam tu`ri **bar** fikus (Ficus) tuwısı bay keledi. Dipterokarpalılar, bal`zaminler, molochaylar, araliyalar, aroidlar h.t.b. tuqımlaslar ken` tarqalg`an. Paleotropikke pal`malardın` bir qansha tuwıları, sonday aq sırtqı ko`rinisi boyınsha pal`malardı esletetug`ın a`yyemgi jalańash tuqımlı o`simliklerden sagovniklerdin` ko`plegen tuwıları (tsikadalar) ushırasadı.

Paleotropikalıq floristikalıq patshalıq bir qansha ken` tarqalg`an ma`deniy o`simliklerdin` (mısalı, banan, kofe h.b.) watanı esaplanadı. Tropikalıq Aziyadan xosh iyisler beriwshi ko`plegen o`simlikler (qara burısh, gvozdika, koritsa, imbir`, muskat g`ozası h.b.) kelip shıqqan.

Paleotropik patshalıg`ı (carstvo) bir qansha podcarstvag`a bo`linedi. Afrika kishi patshalıg`ı (podtsarstvosi)-Afrikanıts ko`p bo`limin, sonday aq Arabiya yarım atawının` tropikalıq sho`llerin, Iran, Pakistan ha`m Arqa-Batis Hindistannı o`z ishine aladı. Bul jerde onnan aslam endemik tuqımlaslar, bir qansha onlag`an endemik tuwıslar bar.

Madagaskar kishi patshalıg`ı (podcarstvosi)-Madagaskar ha`m Hind okeanı-nın` og`an jaqın bir qansha atawların` qosıp aladı. Bul territoriyanın` florası ha`rtu`rliligi menen joqarı endemizmi menen xarakterlenedi. Olardın` quramında onlag`an endemik tuqımlaslar bar. Endemik tuwıslar 450 den az emes. Tu`rler endemizmi 86% ke jaqın.

Indo-Maleziya kishi patshalgıı-(podcarstvosi) ju`da` ken`, biraq ku`shli shashırandı jaylasqan (Hindistan ha`m Indoqıtay yarımatawları, Aziya menen Avstraliyanın` arasındag`ı ko`plegen atawlar ha`m Fidji menen Samoa atawlarının` shıg`ısına shekem jetip baradı). Kishi patshalıqtın` florası ju`da` joqarı endemizmi menen xarakterlenedi. Bul jerde tu`tiksheli o`simliklerdin` II endemik tuqımlası esapqa alıng`an. Endemik tuwıslar sanıda ayırıqsha ko`p. A`sirese Maleziya oblastının` florası ju`da` bay (25000 aslam tu`rler, 2 endemik tuqımlas ha`m 500 ge jaqın endemik tuwıslar bar).Hindistan ha`m Indoqıtay oblastlarının` da florası bay, biraq o`zgesheligi azlaw. Bul jerlerde endemik tuqımlaslar joq, sog`an qaramastan endemik tuwıslar sanı ju`da` ko`p.

Polineziya kishi patshalgıı. Tınısh okeannın` oraylıq bo`limlerindegi ken` territoriyalarda jaylasqan ko`plegen mayda atawlardı (arqada Gavay atawlarınan baslap kubada Tuamotu atawlarına shekem) qamtıydı. Bul atawlardın` florası salıstırmalı tu`rde jas.

Olar tiykarınan to`rtinshi da`wirdin` baslarında payda bolg`an ha`m o`zlerinin` kelip shıg`ıwı boyınsha indo-maleziya tuwındısı. Endemik tuqımlaslar joq, biraq tuwıslar menen tu`rler endemizmi joqarı. Kishi patshalıq eki oblastqa bo`linedi. Olardın` birewi Polineziya ju`da` az endemik tuwıslarg`a iye. Ekinshisi Gavayda tuwıslar bir qansha ko`p, al tu`rler endemizmi ju`da` joqarı (97% ten aslam tu`rler endemik).

Novokaledoniya kishi patshalgıı Avstraliyanın` shıg`ıs jag`alıqlarınan uzaqta emes jaylasıp, u`lken ataw Jan`a kaledonıyanı ha`m onın` a`tırıpındag`ı mayda atawlardı o`z ishine aladı. Bul territoriyanın` florası u`lken o`zgeshelikleri menen ajıraladı. Tu`tikli o`simliklerdin` bir qansha endemik tuqımlasları menen 130 dan artıq endemik tuwısları bar. Olardın` arasında paporotniklerdin` geypara a`yyemgi tuwısları (stromatopteris) iynejapıraqlar (austrotaksus), pal`malardın` 13 tuwısı (basseliniya) bar. Tu`rler endemizmligide joqarı. Tuqımlı o`simliklerdin` 2700 tu`rinen 2500 tu`ri (90% ten aslam) endemik .

Neotropikalıq du`n`ya. Bug`an Qubla Amerikanın` basım ko`pshilik bo`limleri (qubla ken`isliktin` 30° nan arqag`a qarap), Meksikanın` qublasına shekemgi, Karib ten`izinin` atawları menen Florida yarım atawlarının` qubla tumsıqları kiretug`ın Oraylıq Amerika kiredi. Neotropikalıq patshalıq maydanı boyınsha u`lken bolg`anı menen Paleotropika, a`sirese Golarktıkadan kishi Patshalıq florası ju`da` bay. Bul jerde bir qansha ju`zlegen tuqımlaslarg`a kiretug`ın ko`p onlag`an mın` sandag`ı tu`rler esapqa alınadı. Patshalıqtag`ı tu`rler baylıg`ı sonday, tek g`ana bir Braziliyanın` o`zi 40000 nan aslam tu`rdi tutadı.

Neotropikalıq flora paleotropikalıq flora menen kelip shıg`ıwı jag`ınan birdey (qubla Amerika ha`m Afrika bir waqıtları bir tutas qurg`aqlıq bolg`an). Bul kelip shıg`ıwdın` uqsaslıg`ın Eski ha`m Jan`a Du`n`yanın` tropikalarında tarqalg`an

ju`da` ko`p tuqımlaslar da`lilleydi. Mısalı: anonlılar, perechniyalar, strastotsvetnıx, rizoforlılar, anakardiyalılar, sapındalılar, pal`malar h.b. Uqsas tuwıslarda ju`da` ko`p.

Biraq neotropikalıq flora ju`da` uzaq da`wirler dawamında basqa floralardan ajralg`an jag`dayda o`zinshe rawajlang`an, sonlıqtan u`lken o`zgesheliklerge iye. Bunda 25 ke jaqın endemik tuqımlaslar, ju`da` ko`p sandag`ı endemik tuwıslar menen tu`rler esapqa aling`an.

Neotropikalıq patshalıq ushın endemiklerden, mısalı, markgraviyalılar, kario-kariyalılar, tovariyalılar, yulianiyalılar, xelikoniyalılar, kannler, tsiklantoviyalılar h.t.b. tuqımlaslar ta`n. Barlıq bul tuqımlaslar ortasha poyasta ushıramaydı.

Neotropikalıq patshalıqta endemik bolmag`an nasturtsiyalılar, kaktuslar, sinyuxalılar, aroidlılar, bromeliyalar, xrizobalanlılar, tsirilloviyalar tuqımlaslar ken` tarqalg`an.

Neotropik ushın iytju`zimler tuqımlasının ag`ash ta`rizli wa`killeri, mısalı, ag`ash ta`rizli ba`ngidiywana (durman drevovidniy-Datura arborea), tomat ag`ashı (Cyphomandra betasea) xarakterli. Shireli miyueleri bar mirtalar tuqımlasının` wa`killeri, mısalı, feyxo (Feijoa sellowiana) miywe ag`ashı ken` tarqalg`an. Neotropikag`a xarakterli tuwıslar qatarına begoniya, fuksiya, yukka, agavalar jatadı.

Neotropika bir qansha ken` tarqalg`an ma`deniy o`simliklerdin` watanı, mısalı, ananas, kakao, geveya. Bul jerden jıllılıqtı su`yiwshi ko`plegen dekorativ o`simlikler shıqqan, mısalı: nasturciya, kannler, fuksiyalar, monstera, begoniya, kaktuslar agavalar h.b.

Neotropikalıq patshalıq bes oblastqa bo`linedi:

1. Karib oblasti-Neotropikanın` arqa bo`limin-Meksika ha`m Floridanın` qubla-sınan baslap Qubla Amerikanın` arqa- batis tar jag`alı polosaların qosa o`z ishine aladı. Bug`an materiklik territoriyalar kirip qoymastan, ko`p sandag`ı atawlarda kiredi. Florası bay bolıp, eki endemik tuqımlası bar. Endemik tuwısları 500 den aslam. Solardan biri sagovniklerge jatatug`ın a`yyemgi mikrotsikas (Microcycas) tuwısı bolıp, Kubada tarqalg`an bir tu`rdi o`z ishine aladı.

2. Gviana jazıq tawlıqlar oblasti-qubla Amerikanın` arqasındag`ı kishkene tawlıq territoriyalardı o`z ishine aladı. Florası ju`da` bay, 8000 tu`rden aslam bolıp, olardıń jartısı endemler. A` sirese ko`p endemler joqarı tawlıqlarda ko`p (90- 95% ke shekem). Bir endemik tuqımlas, 100 ge jaqın endemik tuwıslar bar. Florası a`yyemgi bolıp, ko`p reliktlerge iye.

3. Amazonka oblasti-Neotropikanın` en` bir u`lken oblasti. Ol Amazonka ha`m Orinoko basseynlerinin` ko`plegen bo`limin iyeleydi. Territoriyası tiykarınan tegislik. Tekte ol jerde jawınlı tropika tog`aylarının` tiykarg`ı massivleri jaylasqan.

Oblastın bay florası tek bir g`ana endemik tuqımlastı, biraq 500 den ziyat endemik tuwıslardı tutadı. Endemik tu`rler 3000 g`a jaqın.

4. Braziliya oblastı-maydanı boyınsha bulda ken`. Bug`an tiykarınan Braziliya u`stirtlikleri kiredi. Florasında endemik tuqımlaslar joq biraq 400 ge jaqın endemik tuwıslar bar. Bir qansha a`yyemgi iyne japıraqlılar-uzınjapıraqlı araukariya (*Araucaria angustifolia*), podokarpustın bir qansha tu`rleri ushırasadı.

5. And oblastı - Qubla Amerikanın batıs jag`aların boylap tar polosadag`ı ju`da` u`lken uzınlıqqa sozılğ`an (Qubla tropikadan materiktin` arqa shetine shekem). Florası ju`da` bay emes, biraq o`zine ta`n. Bir endemik tuqımlas bolıp, bir neshe ju`zlegen endemik tuwısları bar. Neotropikalıq o`simlikler menen Golan-tarktikalıq elementlerde ushırasadı. And oblastına arqadan kirip keletug`ın golark-tikalıq elementlerdin` de roli u`lken. Olarg`a emen, mıtık, barbaris, gortenziya, qalın`a, smorodina tuwıslar jatadı.

Kap du`n`yası. Bul patshalıq barlıq patshalıqlar arasında maydanı boyınsha en` kishkenesi. Ol Afrikanın qublasının` en` shetki u`lken emes territoriyasın iyeleydi. Biraq florası dım bay (7000 jaqın tu`rler bar) ha`m o`zine ta`n. Ol arqasında jaylasqan kon`silas territoriyalardın` florasınan keskin ayırıladı. Bul jerde qubla yarım shardın` a`yyemgi floralarının` tuwındısı o`zine ta`n original` elementleri ko`p. Kap floristikalıq patshalıg`ında jeti endemik tuqımlaslar, 210 nan aslam endemik tuwıslar bar. Olardın` arasında atanaq gu`llilerden-6, vereskalılardan - 20, tolstyankalılardan-4, sobıqlılardan-14, rutalılardan-8, quramagu`llilerden-40 qa jaqın, irislerden-14 tuwıslar bar h.t.b. A`sirese endemik tuwıslardan proteya (*Rrotea*) ha`m leukadendron (*Leucadendron*) tu`rlerge bay bolıp, proteya-50, leukadendron-70 tu`rge iye.

Ha`r qıylı tuqımlaslarg`a kiretug`ın endemik emes tuwıslardın tu`rlerinde u`lken ayırmashılıq bayqaladı. Mısalı veresk (*Erica*) tuwısında 600 tu`rden artıq, pelargonum (*Pelargonum*) tuwısında 200 den ko`p tu`rler bar. Tu`rleri ko`p tuwıslarg`a krestovnik (*Senecio*), tsmın (*Helichrysum*), xavorciya (*Hawortia*), gosteriya (*Ujasteria*), romuleya (*Romulea*) moreya (*Mogaea*) h.t.b. jatadı.

Tu`rler ko`plegen amarillisler, irisler ha`m restionlar tuqımlaslarınada ta`n. Resitonlar tuqımlasının` wa`killeri sırtqı ko`rinisi boyınsha g`a`lleler ha`m o`len`lerdi elesletedi. Bul tuqımlaslarda Avstraliyada ken` tarqalg`an. Solay etip kap florasıda Avstraliya kontinentinin` florasına biraz uqsas belgileri bar. Bunı o`tken geologiyalıq a`sirlerde Afrikanın` qublası menen Avstraliya birigip a`yyem-gi Gondvan materigi quramına kirgenligi menen da`lillewge boladı.

Kap florasının` bir qansha elementleri qubla yarım sharg`a xarakterli. Mısalı, podokarpus (*Podocarpus*), atsena (*Asaena*) metrosideros (*Metrosideros*) tuwısının` tu`rleri, proteynler, restionlar, kunoniyalar tuqımlaslarının` wa`killeri. Basqa o`simlikler, kerisinshe, arqa yarım shardan kelip shıqqan. Bug`an karkas (*celtis*)

kliffortiya (cliffortia), padub (ilex) tuwısının` tu`rleri, vereskler tuqımlasının` bir kishi tuqımlası h.t.b. jatadı.

Kap patshalıg`ı florasının` o`zgesheligi, a`yyemgi bul territoriyanın` o`siimlik du`n`yasının` uzaq waqıtlar dawamında ajıralg`an jag`dayda rawajlang`anlıg`ı menen da`lilenedi. Bul ajıralıw ha`zirde saqlanbaqta. Ha`zirgi waqıtta Afrika kontinentinin` qalg`an bo`limlerinin` floraları menen almasıw ushın Kap patshalı-g`ının` arqa ta`repinde jaylasqan sho`llikler tosqınlıq etpekte.

Kap patshalıg`ının` bay ha`m o`zine ta`n florası ko`plegen dekorativ o`simliklerdin` deregi bolıp xızmet atqarmaqta. A`sirese bul jerden piyazshalı ha`m kartofel` tu`yneksheleli o`simlikler (amarallisler, klivayalar, gladioluslar x. t.b.) ko`p ma`deniylestirilgen.

Avstraliya du`n`yası. Bunın` quramına Avstraliya, qon`ısı Tasmaniya atawı, sonday aq bir qansha mayda atawlar kiredi. Avstraliya patshalıg`ı pu`tkilley ajıralg`an awhalg`a iye. Ol qurg`aqlıqtan ken` ten`iz ken`islikleri menen bo`lingen. Patshalıqtın` territoriayası ju`da` u`lken, ko`lemi boyınsha tek Evropadan az kishilew.

Avstraliya patshalıg`ının` florası ju`da` bay (15000 tu`rge jaqın), ayırıqsha o`zgeshe ha`m ko`plegen a`yyemgi o`simliklerdi tutadı. Onın` florası ju`da` joqarı endemizmligi menen ajıraladı. Bul jerde onnan aslam endemik tuqımlaslar bar. Mısalı, tsefalotlar, brunoniyalar, davidsoniyalar, tremandrlar, biblidler, akaniyalar tuqımlasları.

Endemik tuwıslar 570 ke jaqın. Olardın` arasında Avstraliya ushın xarakterligi bolg`an proteynler tuqımlasının` iri tuwısları: xakeya (Nakea), vertikordiya (Verticordia), konospermum (Conospermum), izopogen (jsopogon).Ipi endemik tuwıslar basqa da tuqımlaslarda-sobıqlılar, rutalar, mirtalar bar. Floranın` endemik tu`rleri ju`da` joqarı, olar 75-80%, ha`tte odan da joqarı.

Avstraliya florasına xarakterli tuqımlaslardan birinshi gezekte proteynler turıp, bul jerde onın` 700 den aslam tu`ri ja`mlengen. Sonday aq xarakterli tuqımlaslardan epakridalar, gudeniyalar ksantoriyalar, mirtalar, kazuarinlar, t.b

Avstraliya florası ushın en` xarakterli evkaliptler ha`m akatsiyalar dep esaplaw kerek. Bul jerde evkaliptlerdin` 600 den aslam tu`ri bar, (evkalipt tuwısı mirtagu`lliler tuqımlasına kiredi). Olardın` ko`pshiligi ag`ashlar, putalarda bar. Evkaliptlerdin` barlıg`ı derlik ma`n`gi jasıl o`simlikler.

Akaciyalarda ju`da` ko`p sanlı (500 den aslam) ha`m ha`rqiylı. Bulda ma`n`gi jasıl ag`ashlar menen putalar.

Avstraliya patshalıg`ı florasının` aytarlıqtay bir o`zgesheligi basqa kontinent-lerde ken` tarqalg`an bir qansha o`simlikler tuqımlaslarının` ha`tte u`lken taksonlar-dın` joqlıg`ı. Mısalı, xvoshlar, bambukler, rozagu`lliler tuqımlasının`

almalar kishi tuqımlası wa`killeri bul jerde joq. Sonday-aq vereskalılar, begoniyalar, valerianlılar, chaylar tuqımlaslarıda joq.

Avstraliya patshalıg`ı florası kap florası menen uqsas belgilerge iye. Qubla Amerikanın` qubla bo`limi florası menen uqsaslıg`ı budan da anıq. Bir-birinen qashıq eki territoriya ushın ulıwma bolg`an bir qansha tuqımlaslardı (arauka-riyalar, podokarpuslar, proteynler, restionlar h.b.) atap o`tiwge boladı. Tuwıs-larında da ko`p uqsaslıg`ı bar.

Golantarktikalıq du`n`ya. Bul patshalıq Qubla Yarım sharda, sonın` menen birge bir qansha biyik ken`likte jaylasqan. Ol Qubla Amerikanın` qubla bo`limi (shama menen 30° qubla ken`likten), Jan`a Zelandiyanı, muz benen qaplanbag`an Antarktidanın` az g`ana maydanın, Atlantika, Hind ha`m Tınısh okeanlardın` qubla bo`liminde jaylasqan ko`p sandag`ı mayda atawlardı o`z ishine aladı. Patsha-lıqtın` territoriıyası u`lken emes ha`m ju`da` ku`shli bo`lsheklengen. Patshalıqtın` ayırım bo`limleri bir-birinen ju`da` qashıq jaylasqan, olar u`lken ten`iz ken`islikleri menen ajralg`an. Usıg`an qaramastan qurg`aqlıqtın` uchastkalarının` florası uqsas belgilerge iye. Uqsas tuwıslar ha`m tu`rler ko`p. Mısalı mıyıq gu`llilerden kolobantus, sayaman gu`llilerden azurella tuwısların, tu`rlerge misal ushın paqalsız lyutik (*Ranunculus acaulis*), u`shbo`leklengen o`len` (*osoka-Sagex trifida*) kelti-riwge boladı.

Golantarktika patshalıg`ının` ayırım bolimleri floralardın` bir-birinen u`lken qashıqlıqta bolıwına qaramastan uqsaslıg`ın tariyxıy sebepler menen da`lillewge boladı. Bul patshalıqtın` ha`zirgi florası qubla yarımshardag`ı gigant Gondvan materiginde payda bolg`an a`yyemgi ortasha klimatı golantarktikalıq floradan kelip shıqqan. Sonın` ala materik ayırım bo`limlerge bo`leklengen ha`m olardıń florasının` araları u`zilgen. Qurıqlıqtın` bo`liniwi tiykarınan jerdegi o`simlikler du`n`yasında gu`lli o`simliklerdin` u`stinlik etip turg`an waqtı u`shinshi da`wirdin` birinshi yarımında bolıp o`tti.

Golantarktika patshalıg`ı tu`rleri sanı boyınsha basqa patshalıqtan biraz qalıadı. Bul jerde barlıg`ı bolıp 2000 nan artıq tu`r bolıp, floranın` o`zgeshelikleri bir qansha joqarı. On endemik tuqımlaslar (laktoridler, grizeliniyalar, mizoden-dronlar h.t.b.). Olardıń barlıg`ı az sandag`ı tu`rlerden, ha`tteki bir tu`rden ibarat. Endemik tuwıslar ju`da` ko`p, olardıń ko`pshiligi ajralg`an areallar menen xarakterlenedi. Mısalı, laureliya (*Laurelia*), grizeliniya (*ujriselinia*), psevdopanaks (*pseudopanax*), kolobantus, azurella. Tu`rler endemizmi ju`da` joqarı bolıp, 75% ge jaqın.

Golantarktika patshalıg`ı o`zine xarakterli tuwıs antarktika yamasa qubla buki (*Nothofagus*). Bul tuwıstın` wa`killeri ag`ash ha`m putalar bolıp arqa yarım shar-dag`ı buklerge jaqın turadı. Olardıń birewi ma`ngi jasıl, ekinshileri japıraqları tu`sedi. Buktin` antarktikalıq tu`rleri tek Qubla Amerika menen Jan`a

Zelandiyada ushırasadı. Rozagu'lliler tuqımlasının` atsenı tuwısı da xarakterli o`simliklerge jatıp, kishkene sho`p ta`rizli o`simlikler. Subantarktikalıq atawlarda ken` tarqalg`an. Golantarktika patshalıg`ının` florası arasınan iyne japıraqlı a`yyemgi podokarpus tuwısın atawg`a boladı. Podokarpustın` tu`rleri Qubla Amerika ha`m Jan`a Zelandiyada ushırasadı.

O`z betinshe tayarlanıw ha`m qadag`alaw ushın sorawlar.

1. Floristikalıq rayonlarg`a bo`liwde nelerge itibar beriledi?
2. Golarktikalıq du`n`ya neshe kishi patshalıq ha`m oblastlarg`a bo`linedi?
3. Paleotropikalıq du`n`ya neshe kishi patshalıq ha`m oblastlarg`a bo`linedi?
4. Neotropikalıq du`n`ya neshe oblastlarg`a bo`linedi?
5. Kap patshalıg`ının` qaysı o`simlikleri ma`deniylestirilgen?
6. Avstraliya du`n`yası qanday o`zine ta`n qa`siyetlerge iye?
7. Golantarktikalıq du`n`ya qaysı territoriyalardı o`z ishine aladı?

5-tema: Jer sharının` o`simlikler qaplamı

Reje:

1. Jer sharının` o`simlikler qaplamı haqqında tu`sinik
2. Ekvatorial`-tropikalıq poyas o`simlikleri.
 - 2.1. Ma`n`gi jasil jawınlı tropikalıq tog`aylar,
 - 2.2. Japıraqları yarım tu`setug`ın jawınlı tropikalıq tog`aylar,
 - 2.3. Ig`allı (mussonlı) japıraqları tu`setug`ın tog`aylar,
 - 2.4. Qurg`aq japıraqları tu`setug`ın (savannalı) tropikalıq tog`aylar,
 - 2.5. Savannalar,
 - 2.6. Tiken japraqlı kserofil` siyrek tog`aylar,
3. Tropikalıq poyastın` intrazonallıq o`simlikleri

Jer sharının` o`simlikler qaplamı. Jer sharının` ta`biyiy o`simlikler qaplamı zonalıq, intrazonallıq, ekstrazonallıq o`simliklerge ajıraladı. Zonalıq o`simlikler dep ortasha mexanikalıq quramdag`ı topırag`ı bar (sazlı-qumlı yamasa shege topıraqlı) jaqsı qurg`atılatus`ın suw bo`lgishlerge iye ken` tegisliklerdi iyelegen o`simliklerge aytiladı. Bunday o`simliklerdi geyde sha`rtli klimatlıq dep te ataydı, sebebi, onın` tiykarg`ı o`zgeshelikleri jergilikli klimat xarakteri menen (ko`binese jıllılıq ha`m ıg`allıq mug`darı) anıqlanadı. Zonalıq o`simlikler zonasın ajratıw ushın tiykar bolıp xızmet etedi. Mısalı, dala-dala zonasın bo`liw ushın zona dep zonalıq o`simliklerdin` tipi tarqalg`an u`lken yamasa kishi territoriyalardı ataw qabıl etilgen. Intrazonalıq o`simlikler dep berilgen zona ushın ayırıqsha ta`n bolmag`an qorshag`an ortalıqta rawajlanatus`ın (mısalı, ko`p ızg`arlang`an topıraqlarda) ha`m sonın` menen birge jerde o`zinin` ayırım zonasın (zonalıq emes) payda etpeytug`ın o`simliklerge aytiladı. Bug`an batpaklıqlar, suw alma jaylawlar, kebir, duzlı

jerlerdin` o`simlikler birlespesi misal boladi. Olar ha`r qiyli zonalarda, onnan tısqarı tu`si o`zgergen halda ushıraydı.

Ekstrazonalıq o`simliklerde ortalıqtın` ayrıqsha jag`dayları menen baylanıslı kelip, zonalıq o`simliklerdin` ulıwma fonında daqtay (tamg`aday) bolıp ushırasadı. Biraq ol o`zinin` ayırım zonasın du`zip alıw mu`mkinshiligi menen ajıraladı. Bug`an tog`ay zonasının` qubla ekspozitsiyasının` janbawırında rawajlanatug`ın dalanın` kishkene maydanları misal boladı.

Solay etip, zonalıq o`simlikler tiykarg`ı fondı du`zedi, al intra ha`m ekstra-zonalıqlar a`dette tamg`a tu`rinde ushırasadı ha`m ortalıqtın` qandayda ayrıqsha jag`dayları menen baylanıslı keledi. Ayırım o`simlikler zonalarının` iyelegen territoriýalarının` ko`rinisi biraz ha`r qiyli keledi. Ken` tegislikler zonasının` tu`si anıq an`latılğ`an poloslarg`a iye boladı.

Tawlar o`simliklerin ko`rip o`teyik. Tawlarda, eger olar jetkilikli biyik bolsa, o`simliklerdin` poyaslıq bo`liniwin, yag`nıy biyiklik poyaslıg`ın baqlawg`a boladı. Bul qubılıstın` sebebi klimattın` vertikal` bag`ıtqa o`zgeriwi bolıp tabıladı. Joqarı ko`terilgen sayın klimat suwıq boladı, vegetatsiyalıq da`wir qısqaradı, jıldın` jıllıq waqıtları kesh baslanadı. Sonday-aq ıg`allıq jag`dayı da o`zgeredi. (Jawatug`ın jawın- shashın mug`darı, jawın-shashın ha`m parlanıw arasındag`ı qatnas). Bir jag`daylarda joqarı ko`terilgen sayın klimat ju`da` ıg`allı, ekinshi jag`dayda kersinshe, ju`da` qurg`aq boladı.

Tawdag`ı o`simlikler poyası menen ken` tegisliktegi o`simlikler zonalarının` almasıwında bir qansha uqsaslıqlar bar. Misalı, Kavkaz tawlarına ko`terilgende G`MA nın` evropalıq bo`limindegi tegislikler boyınsha qubladan arqag`a qarap o`simliklerdin` almasqanınday almasıq baqlaymız. Eki jag`day da ken` japıraqlı tog`aylar iynejapıraqlı- ken`japıraqlı ha`m iynejapıraqlı tog`aylar menen almasadı, uzag`an sayın tog`ay tawsılıp, ornın tog`aysız ken`islikke beredi. Biraq joqarı poyaslıq menen ken`laq zonası arasında uqsaslıq bar. Misalı, G`MA nın` evropalıq bo`liminde iynejapıraqlı tog`ay tundra menen, al Kavkaz-biyik tawlar jaylawları menen almasadı. Tundra o`simlikleri birlespeleri subal`p ha`m al`p jaylawlarınan keskin ajıraladı, olar arasında uqsaslıq ju`da` az. Poyaslar menen zonalar arasın-dag`ı tag`ı bir ayırmashılıqtı belgilep o`teyik: zonalar a`dewir ken` bolıp, ken`islikte anag`urlım u`lken aralıqtı iyeleydi. Bug`an gorizontal` bag`darda vertikal` bag`darg`a qarag`anda klimattın` a`ste o`zgeriwi sebep boladı.

Ha`r qiyli o`simlikler zonasında jaylasqan tawlar sisteması o`simliklerdin` biyiklik poyasına qarag`anda o`z ayırmashılıg`ına iye boladı (poyaslar jıyındısı, olardın` ulıwma sanı, almasıwlar izbe-izligi h.t.b). Ha`r bir o`simlikler zonasına ha`m zonalar ishindegi ha`r bir u`lken regionların biyiklik poyasının` ayrıqsha tipleri ta`n. Biyiklik poyası okeanlıq bolıwı mu`mkin , eger taw sisteması okeannın`

jag`asına ornalassa, yaki eger tawlar okeannan qashıqlıqta materiktin` oraylıq bo`liminde jaylassa kontinental` bolıwı mu`mkin.

Jer sharı o`simlikler qaplamın qarap o`teyik. Bas dıqqat ha`r qıylı klimatlıq poyaslardag`ı Jer ju`zindegi tiykarg`ı o`simlikler zonalarına: ekvatoriya-tropikalıq, subtropikalıq, ortasha ha`m suwıq klimatlarg`a awdarıladı. Ha`r qıylı zonaldın` o`simlikler qaplamınun` tiykarg`ı belgileri klimattın` bas o`zgeshelikleri menen baylanısta ko`rip shıg`ıladı.

Ha`r qanday o`simlikler zonalıg`ının` xarakteri ba`rinen burın o`simlikler ala alatug`ın ha`m jıl ma`wsimleri boyınsha paydalana alatug`ın jıllılıq ha`m ıg`allıq mug`darı menen anıqlanadı. Jerdin` ha`r qıylı rayonlarında bul jag`daylardın` ha`r qıylı ekenligin ko`riwge boladı. Sonın` ushında o`simlikler zonalıg`ı ha`r qıylı bolıp keledi. Ol bir klimatlı poyastın` o`zinde de o`zgerip turadı.

Jer sharının` o`simlikler zonalarınun` ulıwma jaylasıw sxemasın jasaw erteden baslanadı. Bunda o`simlikler zonaların ideal kontinent dep atalıwshı bir pu`tin materik dep su`retlengen. Jer beti sha`rtli tu`rde tegis jazıqlıq, al barlıq qurg`aqlıq-kompaktli, bo`linbegen territoriya dep esaplanılğ`an.

Bul ha`r qıylı o`simlikler zonalarınun` tarqalıwının` tiykarg`ı nızamlıqların anıq ko`rsetiwde mu`mkinshilik berdi.

Ideal` kontinent sxeması birinshilerden bolıp Shveycariya botanigi G.Brokman-Erosh ta`repinen payda boldı. Keyin ala bunday sxemalar basqa alımlar ta`repinen, sonın` ishinde rus ilimpazları A.P.Shennikov, L.V.Shumilova h.t.b. islendi.

Ideal kontinenttin` en` jetistirilgen sxemasın nemets botanigi Karl Troll` usındı. Ol boyınsha ideal` kontinent eki yarım shardı-arqa ha`m qublanı qamtıydı. Kontinenttin` eni ha`r qıylı ken`likte ha`r qıylı boladı ha`m usı berilgen ken`liktegi qurg`aqlıq maydanının` real` mug`darına sa`ykes keledi. Troll`din` sxemasın keyin ala ekinshi nemets botanigi G.Val`ter bir qansha o`zgertti.

G.Val`ter boyınsha ekvatordın` uzınına, odan 5-10° ken`likti o`tip kontinenttin` batısınan shıg`ısına shekemgi jag`alawlarında ekvatorial ma`n`gi jasil jawın tog`ayı u`zliksiz bolıp sozılıp jatadı. Usı polosanın` arqası ha`m qublasına qarap jıldın` qurg`aq waqıtları japıraqların tu`siretug`ın tropikalıq japıraqlılar tu`setug`ın tog`aylar baslanadı. Olardı geyde jawınlı-jasil tog`ay depte ataydı, sebebi olar tekte jawın ma`wsiminde jasil tu`ske enedi. Bug`an savannanın` ıg`allı variantlarında qosıladı. Bunday o`simlikler eki ken` polosanı: birewi arqa yarımsharda, eknshisi qublada payda etedi. Polosalar ulıwma kontinenttin` batısınan shıg`ısına sozıladı. Ekvatordan budanda qashıqlıqta tropikalıq poyastın` en` qurg`aq rayonlarında qurg`aq savannalar menen tikenekli siyrek tog`aylar tarqalğan. Tropikalıq poyastın` ishinde kontinenttin` shıg`ıs jag`alawlarında ensiz polasa payda etetug`ın musson tipindegi jawınlı tog`aylar ushırasadı.

İdeal kontinentler sxeması jerde ha'r qıylı o'simlikler zonalarının jayla-sıwının tiykarg'ı nızamlıqları tuwralı jaqsı tu'sinik beredi. Ol ha'r bir o'simlikler zonalarının ken'lik jag'dayların, olardıń iyelegen maydanlarının ko'lemin, kontinentler ishinde zonaların jaylasıw o'zgesheliklerin (shetine jaqın, ortada, batista, shıg'ısta), onıń konfiguratsiyasın h.t.b. ayqın ko'rsetedi.

Ekvatorial'-tropikalıq poyas o'simlikleri. Bul jerde en' jıllı klimatlıq poyası. Biraq ıg'allıq jag'dayı boyınsha bul jerde de u'iken ayırmashılıq bayqaladı. Jılına birneshe mın' millimetr menen o'lshenetug'ın, ju'da' ko'p mug'darda jawın-shashın jawatug'ın rayonlar bar. Sonın' menen birge bir qansha rayonlarda ju'da' kem-100-200mm, ha'tte odan da az jawın-shashın jawadı. Bul ayırmashılıqlar arasında o'zgerislerde boladı. Jawın-shashın jawıwı muddetlerinde de ku'shli ayırmashılıq bolıp, jıl dawamında bir tegis emes jawadı. Ig'allanıw o'zgeshelik-lerindegi bul ayırmashılıq bir qansha da'rejede o'simlikler zonalıg'ının xarakterin anıqlaydı. Ekvatorial'-tropikalıq poyastın' jawın-shashını, bir tegis jawatug'ın ko'birek ıg'allı rayonlarında qalın' ha'm biyik ma'n'gi jasıl tog'aylar tarqalg'an. Klimattın' qurg'aqlasıwının' artıp barıwı menen jawın-shashınlardıń bir tegis jawmawı sebepli ma'n'gi jasıl ag'ashlar a'ste japıraqları tu'setug'ın ag'ashlar menen almasadı, al tog'aylar a'ste pa'skeltek bola baslaydı ha'm siyreklesedi. Keyin ala o'z ornın qalın putalarg'a beredi, o'simlikler qaplamı tag'ıda pa'skeltek ha'm ku'shli siyreklesedi.

Tropikalıq poyas tiykarınan mına o'simlikler zonalıg'ı tiplerine bo'linedi:

1. Ma'n'gi jasıl jawınlı tropikalıq tog'aylar,
2. Japıraqları yarım tu'setug'ın jawınlı tropikalıq tog'aylar,
3. Ig'allı (mussonlı) japıraqları tu'setug'ın tog'aylar,
4. Qurg'aq japıraqları tu'setug'ın (savannalı) tropikalıq tog'aylar,
5. Savannalar,
6. Tiken japraqlı kserofil' siyrek tog'aylar.

Ma'n'gi jasıl jawınlı tropikalıq tog'aylar. Bul tog'aylıqlar ha'r qıylı kontinent-lerde tarqalg'an. Olar ju'da' ko'p maydanlıqtı Qubla Amerikada Amazonkanın' ken' basseyini basqada ko'plegen territoriyalardı iyeleydi. Olar Aziyada (Hindistan, Shri-Lanka, Indoqıtaydın' bir qatar rayonları), sonday aq Aziya menen Avstraliya aralıg'ında jaylasqan atawlarda (Filippin, Indoneziya, Novaya Gvineya) ju'da' ko'p. Bul tiptegi tog'aylar Batis ekvatorial' Afrikada (Gvineya, Liberiyadan Kongo ha'm Zairg'a shekem), Oraylıq Amerikada, Avstraliyada ushırasadı. Jawınlı tropi-kalıq tog'aylar jer sharının' klimatı ju'da' jıllı ha'm ıg'allı bolg'an rayonlarında rawajlanadı. Ortasha jıllılıq temperatura a'dette 23-25" Jawın-shashın jılına 1800-2000 mm den kem jawmaydı ha'm olar ma'wsim dawamında bir tegis jawıp, barlıq waqıtta ızg'arlıq jetkilikli da'rejede boladı. Jıl dawamında o'simliklerdin' rawaj-lanıwı ushın jag'daylar jetkilikli. Jawınlı

tropikalıq tog`aylardın` topıraqları kızıl-kon`ır (ferrallitli), olar azıqlıq zatlarg`a jarlı keledi, biraq suw o`tkeriwshiligi jaqsı.

Jawınlı tropikalıq tog`aylardın` o`simlikler du`n`yası a`jayıp bay ha`m ha`r tu`rli. Barlıg`ınan beter ag`ash tu`rlerinin` ha`r qıylılıg`ı ju`da` u`lken. 1ga tog`ay maydanında olardın` 40, ha`tte 100 den aslamın sanaw mu`mkin. En` biyik ag`ashları 50-55, ayırımları 60 m biyiklikke jetedi. En` maydaları 2-5m den aspaydı.

Iri ag`ashlarının` sırtqı ko`rki o`zinshe kelip, olardın` bag`anaları du`ziw, sıpaq juqa qabıq penen jabılğ`an, turıqları jer betinen ju`da` joqarıda jaylasqan. Ko`plegen ag`ashlarının` japıraqları iri, jalpaq sonın` menen etli, tıg`ız. U`stki beti jılıraq, jılırawıq. Burtikleri qorg`aytug`ın qabırshaqlarg`a iye emes, sebebi jıllı ha`m ıg`allı klimat jag`daylarında olardın` keregi joq. Tropikalıq ag`ashlardın` rawajlanıwında periodlıq bayqalmaydı. Bir tu`rdin` ayırım ag`ashları jıldın` ha`r qıylı da`wirinde gu`lley beredi.

Jawınlı tropikalıq tog`aylarda barlıq o`simlikler tu`rlerinin` 70% ten aslamı ag`ashlardın` u`lesine tuwra keledi. Sho`plerdin` tu`plep quramı ju`da` az. Topı-raqta o`siwshi sho`p o`simlikler sayag`a shıdamlı, mısalı, aspidistra, xlorofitum, senpoliya.

Jawınlı tropikalıq tog`aylar ushın lianlar (shirmawıqlar) xarakterli bolıp, olar ko`p tu`rlerge iye ha`m ha`r qıylı tuwıslarg`a jatadı. Olar jaqtılıqtı su`yedi. Tropi-kalıq lianalar ag`ashlanatug`ın bag`anag`a iye ko`p jıllıq o`simlikler. Olar bizin` ag`ashlarg`a uqsap ekinshi juwanayıw qa`siyetine iye. Lianalardın` 90% ke jaqın tu`rleri usı jerde ushırasadı. Jawınlı tropikalıq tog`aylar epifitlerge bay bolıp olar paporotnik ha`m gu`lli o`simliklerden turadı. Olar ag`ashlardın` bag`anaları menen shaqalarında sulıw jaylasadı. Jawınlı tropikalıq tog`aylarda gu`lli epifitlerden orxideyalar menen bromeliyalardın` ko`p sanlı ha`m ha`r qıylı wa`killeri tarqal-g`an. Epifitli paporotniklerden «suwın shaqtı» ("oleniy rog"-platycerium tuwısınan) atawg`a boladı.

Jawınlı tropikalıq tog`aylar o`simliklerinin` qızıqlı toparın tunshıqtırıwshı ag`ashlar (derev`ya-dushiteli) quraydı. Olar o`z tirishiligin ag`ashlarda epifit tu`rinde baslaydı. Waqıttın` o`tiwi menen olarda eki tiptegi tamırlar rawajlanadı. Olardın` birewi to`menge qarap, topıraqtag`ı azıqlıq zatlardı alıw ushın o`sedı. Ekinshisi qalın` tor payda etip xozyain ag`ashtı orap aladı ha`m olardın` o`sip-juwanıwına mu`mkinshilik bermeydi. Na`tiyjede ag`ash o`ledi. Al tunshıqtırıwshı ag`ash o`siwin dawam etedi. Tunshıqtırıwshı ag`ashlar ha`r qıylı tuqımlaslarg`a jatıp, Go`ne du`n`yada ken` tarqalg`an fikus tuwısınan` ishinde ko`p wa`killeri bar. Jawınlı tropikalıq tog`aylardın` ko`p wa`killeri bar.

***Japıraqları yarım tu`setug`ın jawınlı tropikalıq tog`aylar.*** Bunday tog`aylar jawın-shashını jıl dawamında bir tegis jawmaytug`ın ıg`allı klimatlı (jawın-shashın mug`darı jıl dawamında 1500-2500 mm) rayonlarda rawajlanadı. Bul jerde

salıstırmalı qurg`aq ma`wsim bolıp, biraq ol az sezilerli ha`m 4-5 aydan ko`pke sozılmaydı. Ag`ashlıqlarda eki yarustı bo`lip shıg`arıwg`a boladı. Joqarg`ı yarustın` quramında japıraqları tu`setug`ın ag`ashlar ko`pke (tu`rlerdin` u`sh bo`limine jaqını), to`mengi yaruslarda olar az. Ig`allıq da`wirinde tog`aylar sırtqı ko`rinisi boyınsha ma`n`gi jasil tog`aylardan derlik ajıralmaydı. Japıraqları yarım tu`setug`ın tog`aylar Qubla Amerikada, Afrikada, Aziyada tarqalg`an.

Ig`allı japıraqları tu`setug`ın (mussonlı) tog`aylar. Ig`allı japıraqları tu`se-tug`ın (mussonlı) tog`aylar jawın- shashın mug`darı ko`p jawatug`ın, bir qansha ıg`allıg`ı menen ma`wsimli qurg`aqshılıg`ı jaqsı bayqalatug`ın tropikalıq rayonlar-da tarqalg`an. Qurg`aq ma`wsim 4-6 ay dawam etedi. Ig`allı ma`wsimde aspannan jawatug`ın, sonday- aq mussonlıq (jazda ten`izden, qısta qurg`aqlıqtan o`setug`ın samal) jawınlardın` ko`pligi menen baylanıslı. Jawınlı da`wirde ag`ashlar japıraqlar menen qaplanadı. Qurg`aq ma`wsimde olar japıraqların tu`siredi. Ig`allı japıraqları tu`setug`ın tog`aylar ma`n`gi jasil tog`aylarg`a usap qalın` emes. Japıraqların tu`siretug`ın ag`ashlar ko`p, sonday- aq to`mengi yaruslarında bir qansha ma`n`gi jasil ag`ashlarda bar. Bul tog`aylar tipi tropikalıq poyasta ken` tarqalg`an. Olar Qubla Amerika, Afrika (Gvineya), Hindistannın`, a`sirese Qubla-Shıg`ıs Aziyanın` (Indoqıtay) ko`p maydanların iyeleydi.

Jer sharının` ha`r qıylı rayonlarında bul tog`aylar sırtqı ko`rinisi boyınsha uqsas, biraq floristikalıq quramı boyınsha tiykarınan ayırıladı. Hindistan ha`m Indoqıtay tog`aylarında mısalı, verbenliler tuqımlasınan tik ag`ashı (Jectona grandis) ken` tarqalg`an. Bul ag`ash ju`da` biyik bolıp, kattı ag`ashı ushın bahalanadı.

Qurg`aq japıraqları tu`setug`ın (savannalı) tropikalıq tog`aylar. Bul tog`aylar ken` territoriyalardı iyelep, maydanı boyınsha ma`n`gi jasil jawınlı tog`aylarda qalıspaydı. Olardın` tarqalıwı ma`wsim boyınsha temperaturası ha`m jawın-shashın mug`darı aytarlıqtay o`zgerip turatug`ın rayonlar menen baylanıslı. Jıldın` jıllı waqtı jawın-shashın da`wirde salqın ha`m ju`da` qurg`aq hawa menen almasadı. Qypg`aq ma`wsim uzaqqa soziladı. Ulıwma jawın-shashın mug`darı ıg`allı japıraqları tu`setug`ın tog`aylarg`a qarag`anda az. Qurg`aq japıraqları tu`setug`ın tropikalıq tog`aylar Afrikada u`lken maydanlardı iyeleydi, sonday-aq Qubla Amerikada Amazonka basseyinin` qublası Oraylıq Amerika, Hindistan, Indoqıtay, Avstraliya ha`m basqada rayonlarda tarqalg`an.

Qurg`aq japıraqları tu`setug`ın tog`aylardı sonday aq savannalı tog`aylar dep te ataydı. Ha`r qıylı kontinentlerde olar bir qansha o`zgeshe kelip, o`zinin` ayırmashılıg`ı bar.

Savannalı tog`aylar keskin bir tegis ıg`allanbag`an salıstırmalı qurg`aq tropi-kalıq rayonlarda rawajlanadı. Klimattın` qurg`aqlıg`ı artqan sayın olar ta`biyiy kelip shıqqan haqıyqıy savannalar menen almasadı.

Savannalar. Savannalar ju`da` ko`p tarqalg`an tropikalıq o`simlikler tiplerinin` birinen esaplanadı. Olar Qubla Amerika, Afrika, Hindistan, Avstraliya jerlerinde bar. Savannalar ushın birgelki sho`pli qaplamlar (tiykarınan kserofil` g`allelerden turg`an) xarakterli bolıp, olardıń ishinde siyrek ag`ashlar menen putalar o`sedı. Savannalarda ag`ashlar biyik emes, joqarısı jalpaq zontik ta`rizli turıqqa iye. Ko`plegen ag`ash tu`rlerinin` japıraqları tu`sedi, biraq ma`n`gi jasil tu`rleride bar, mısalı, pal`malar. Sho`pler qaplamında ayırıqsha tropikalıq g`a`lle o`simlikleri u`stemlik etedi. Olar bir savannalarda biyik (3- 3,5m shekem), ekinshi birewlerinde pa`skeltek keledi. G`a`llesilerden basqada sho`p o`simlikleri ushırasadı, biraq olardıń xızmeti onsha emes.

Savannalar-sırtqı ko`rinishi boyınsha uqsas, biraq kelip shıg`ıw ha`r qıylı bolıp, ta`biyiy, antropogenlik, pirvgenlik savannalar) fitotsenozg`a birigiwshi o`simlikler tipinin` jıyındısı. Savannalar o`zlerinin` ekologiyalıq ta`biyatı boyınsha da (klimat-lıq, edafikalıq) ha`r qıylı. Jerdin` savannalar tarqalg`an rayonlarının` klimatında bir qansha uqsaslıqlar bar. (Ko`plegen aylar dawam etken keskin qurg`aqshılıq jawınlar ma`wsimi menen almasadı h.t.b.). Biraq ha`r qıylı rayonlarda anıq klimat-lıq ko`rsetkishler keskin o`zgerip otıradı. Mısalı, jıllıq jawın-shashın mug`darı 1500 den 600 mm ge shekem o`zgeredi, qurg`aq da`wir 4 aydan 7,5 ayg`a shekem dawam etedi. Ha`r qıylı kontinentler menen ayırım territoriyalardıń savannaları o`zlerinin` floristikalıq quramı ha`m basqa da o`zgeshelikleri menen keskin ajıraladı. Savannalar Afrikada haqıyqıy ko`rinishi beredi. Olar bul jerlerde u`lken maydanlardı iyeleydi. Afrika savannalarına ag`ashlardan bombaksler tuqımlasına jatatug`ın baobab (*Adansonia digitata*) xarakterli. Basqa ag`ashlardan miywe-lerinin` ha`m texnikalıq may alınatug`ın may pal`ması (*Elaeis guineensis*), o`rtke shıdamlı qanatlı lofira (*Lophira alata*) ushırasadı. Sonday aq afrika savannaları ushın onsha biyik emes, zontik sıyaqlı ko`rinishke iye, qurg`aq waqıtları japıraqları tu`setug`ın ag`ash ta`rizli akatsiyalar (*Acacia*) tu`rleri ta`n. Olardan: senegal` akatsiyası (*Acacia Senegal*), spiral miyweli akatsiya (*A. Spirocarpa*), aqshıl akatsiya (*Aalbida*) ko`p ushırasadı.

Afrika savannalarının` sho`pli yarusı ko`p jıllıq g`a`llesilerdin` tropikalıq tu`rle-rinen payda bolg`an. Ko`bine "pil sho`bi" dep atalatug`ın pennizetum (*Pennisetum*) ha`m andropogen (*Andropogon*) tuwısı tu`rleri tarqalg`an. Bul jerlerde g`a`llesilerdi basqa ko`p sandag`ı bir u`lesli o`simliklerde ushırasadı.

Shıg`ıs Aziyanın` (Hindistan, Indoqıtay) savannalarının` ko`p bo`limi adamlar ta`siri menen baylanıslı ekinshi kelip shıg`ıwg`a iye. Bul jerde ag`ashlardan bir tuqımlı buteya (*Dalbergia obtusifolia*), salo ag`ashı (*Shorea robusta*) h.b. ushırasadı. Sho`pler qaplamınan bir qansha biyik keledi (1,5-2m shekem). G`a`llesilerden alang-alang (*Imperata cylindrica*), jabayı qant kamısı (*Saccharum spontaneum*),

miskantus (*Miscanthus*) tu`rleri o`sedı. Hindistan yarım atawının` savannaları Afrika savannaları menen uqsas keledi.

Tiken japıraqlı kserofil` siyrek tog`aylıqlar. Tikenli japıraqlı kserofil` siyrek tog`aylıqlar savannalarg`a qarag`anda klimatı bir qansha qurg`aq rayonlarda rawajlanadı. Bul jerlerde jawın-shashın az jawıp, qurg`aqshılıq da`wiri uzaq keledi. Bunday o`simlikler barlıq kontinentlerdin` tropikalıq poyasında ushırasıp, savan-nadan sho`likke o`tiwdin` aralıq zvenosın elesletedi. Bug`an mısıl retinde Braziliya kırlarının` shıg`ıs ha`m arqa-shıg`ıs bo`limlerinde tarqalg`an Qubla-Amerika kaatingaların ko`rip o`teyik.

Jawın-shashın mug`darı ju`da` kem, jılına 140 tan 50-70 mm ge shekem, olar aylar dawamında bir tegis bo`linbey, jıl dawamında o`zgerip turadı. Qurg`aqshılıq da`wiri uzaq dawam etedi.

Kaatinganın` o`simlikler birlespesi ju`da` ha`r qıylı. Mayda shag`ıl taslı topıraqları tikenekli mayda putalar menen qaplanıp, ko`plegen sukkulentli ha`m ku`shli tu`kler qaplag`an o`simlikler gezlesedi. Olardın` u`stinen japıraqları qalın`, tıg`ız siyrek ag`ashlar boy ko`rsetedi. Jawın da`wirinde japıraqları saqlanıp, keyin tu`setug`ın ag`ashlarda bar.

Tropikalıq poyastın` intrazonalıq o`simlikleri. Tropikalıq poyasta zonalıq o`simliklerden basqa ortalıqtın` ayırıqsha jag`daylar menen baylanıslı bir qansha intrazonalıq birlespelerde ushırasadı. Bug`an mısıl ushın tropikalıq batpaqlıqtı jatqarıw mu`mkin. Bir qansha rayonlarda (Uganda, Qubla Sudan h.t.) olap ken` maydanlardı iyeleydi. Tropikalıq o`simliklerdin` en` ta`n intrazonalı tipleri bolıp qalın tog`aylar yamasa mangrlar esaplaydı. Bul o`simlikler birlespeleri ten`izlerdin` jag`alarına ja`mlenip, suwlardı tasqın ha`m qaytıw polosalarına tarqalg`an. Olar ma`n`gi jasil ag`ashlar menen putalardan turıp, topıraqtın` shorlanıwına ha`m ten`izlerdin` suw tasqınlarına jaqsı shıdaydı.

Mangrlerdi payda etetug`ın ag`ashlar menen putalardın` tu`rlik quramı ju`da` jarlı. Bunday jag`daylarda o`siwge biyimlesken 20 g`a jaqın tu`r belgili. Ag`ash-lardan rizofora (*Rhizophora*) tuwısının` tu`rleri. tarqalg`an bolıp, olar tiri tuwıwshı o`simlikler qatarına jatadı. Olardın` tuqımı analıq ag`ashtın` miywesi ishinde bolıp ko`gere baslaydı. Mangrli qalın tog`aylıqlarda sondayaq avitsenniya (*Avicennia*) tuwısının` wa`killeri ushırasadı.

Mangrli qalın tog`aylıqlar ekvatorg`a jaqın jaylasqan rayonlarda (Indoneziya, Jan`a Gvineya, Filippin h.b.) en` a`jayıp rawajlanıwg`a jetisedi. Ekvatordan uzaqlasqan sayın ag`ash tu`rlerinin` quramı azayıp baradı, al olardın` o`siwi to`menleydi.

Tropika tawlarındag`ı biyik poyaslıg`ı o`simliklerin ko`rip o`teyik. Ekvatorg`a jaqın jaylasqan tawlar sisteması polosasında ortasha aylıq temperaturanın` o`zge-riwi ko`p emes, olar sutka dawamındag`ı o`zgeristen kem. Tawlarg`a

ko`terilgen sayın da`sep, qa`de retinde jawın-shashın, mug`darı ha`m klimattın` ulıwma ıg`allıg`ı artadı. Tog`aylar tegislikke qarag`anda epifitlerge bay keledi. Belgili biyiklikten baslap turaqlı bultlar ha`m tumanlar poyası baslanadı. Bul jerde ıg`allıq ju`da ko`p, al tog`aylar epifitlerge ju`da bay. Ag`ashlardın` shaqalarına moxlar, al bag`analar menen putaqlardı mayda paporotnikler qaplaydı.

Bultlar ha`m tumanlar polosasınan biyiklikte jawın-shashın mug`darı birden azaya baslaydı, tog`aylar janbawırları boylap joqarı ko`terile beredi, biraq onın` sırtqı ko`rki menen o`simlikler quramı ku`shli o`zgeredi. Ag`ashlardın` japıraqları maydalanıp, kseromorf du`ziliske iye boladı. Iyne japıraqlı ag`ash tu`rleri payda boladı. Epifit moxlar lishaynikler menen almasadı. Odan joqarı tog`aylar joq bolıp, qalın putalıqlarg`a o`tedi.

Tropikalıq tawlardın` en` joqarg`ı o`simlikler poyası paramos degen at alg`an. Bul jer suwıq ayazlar bolıp, temperatura sutka dawamında ku`shli o`zgerip turadı. Ko`plegen o`simlikler ko`pshik ta`rizli formag`a iye bolıp, jerge tıg`ız jıg`ılğ`an, al o`simlikler qaplamı siyreklesken. Sonın menen birge biyik ag`ash ta`rizli o`simliklerde ushırasadı.

Tawlardag`ı tropikalıq poyastın` o`simliklerinin` joqarg`ı shegarası shama menen 4400-4500m biyiklikte jaylasqan. Endi ma`wsim boyınsha temperaturasınıń o`zgeriwi jaqsı bayqalg`an, ekvatorдан bir qansha uzaqlıqtag`ı tropikalıq poyasta jaylasqan tawlardı ko`rip o`teyik.

Shıg`ıs Gimalay tawının` qubla janbaurıların` jawınlı ha`m qurg`aq da`wir-lerde salo ag`ashları u`stemlik etetug`ın japıraqları tu`setug`ın ıg`allı tropikalıq tog`aylar tarqalg`an. 900 m biyiklikten baslap ag`ash ta`rizli paporotnikler menen aralasqan shima (Schima), kastanopsis (Castanopsis) h.b. tuwıslardıń wa`killerinen payda bolğ`an ma`ngi jasıl tropikalıq tawlı tog`aylar baslanadı. Bul poyasta qurg`akshılıq da`wiri joq, al jawın-shashın taw eteklerine qarag`anda ko`p jawadı. Budan joqarıda tumanlar polosasınıń ju`da` ıg`allı tog`ayları baslanıp ag`ashlarda epifit moxlar menen paporotnikler ku`shli rawajlang`an. Odan joqarı ko`terilgen sayın tog`aylardı du`zetug`ın japıraqlı ag`ashlar quramı o`zgeredi.

O`z betinshe tayarlanıw ha`m qadag`alaw ushın sorawlar.

1. Jer sharının` o`simlikler qaplamı haqqında nelerdi bilesiz?
2. Ekvatorial`-tropikalıq poyas o`simliklerinin` o`zine ta`n qanday qa`siyetleri bar?
3. Ma`n`gi jasıl jawınlı tropikalıq tog`aylar ha`m japıraqları yarım tu`setug`ın jawınlı tropikalıq tog`aylar bir birinenen ayırmashılıg`ı qanday?
4. Ig`allı (mussonlı) japıraqları tu`setug`ın tog`aylar, Savannalar ha`m qurg`aq japıraqları tu`setug`ın (savannalı) tropikalıq tog`aylar arasında qanday parıq bar?

5. Tropikalıq poyastın` intrazonalıq o`simlikleri qanday?

6-tema: Subtropikalıq poyastın` o`simlikleri

Reje:

1. Subtropikalıq poyastın` o`simlikleri haqqında tu`sinik,
2. Subtropiklerdin` baslı o`simlikler zonaları,
 - 2.1. Ig`allı ma`n`gi jasil subtropikalıq tog`aylar,
 - 2.2. Qattı japıraqlı ma`n`gi jasil qurg`aq tog`aylar ha`m putalı qalın`lıqlar,
 - 2.3. Yarım sho`ller ha`m sho`ller.

*Subtropikalıq poyastın` o`simlikleri haqqında tu`sinik.* Jer sharının` subtropi-kalıq rayonları arqa ha`m qubla ken`liklin` shama menen 30 ha`m 45 arasındag`ı onsha ken` bolmag`an eki polosasında jaylasqan. Olar ekvatorial`-tropikalıq poyas bolıp turadı. Tropika menen subtropika arasında anıq shegara joq.

Subtropikalıq rayonlardın` klimatı tropikag`a qarag`anda jıllılıg`ı biraz kem. Jıl dawamındag`ı temperaturanın` o`zgeriwiligi ay sayın bir qansha sezilerli. Jazı ıssı, al qısı bir qansha salqınlaw. Klimattın` ig`allıg`ı subtropikanın` ha`r qıylı rayon-larında birdey emes. Bul jerde de tropikadag`ıday ig`allı klimattan ju`da` qurg`aq klimatqa o`tiwler bayqaladı.

Jıl dawamında ko`p mug`darda jawın-shashın jawatug`ın subtropikalıq rayon-lar ig`allı subtropikler degen at alg`an. Ulıwma ko`p mug`darda emes jawın-shashın jawatug`ın, kontinental` ha`m qurg`aq klimat penen xarakterlenetug`ın subtropikalıq rayonlar qurg`aq subtropikler dep ataladı. Jawın-shashın jawatug`ın ma`wsimler anıq bilinetug`ın territoriyalar o`zgeshe jer-orta ten`izi klimatı tipine iye boladı. Bul jerdin` jazı ju`da ıssı ha`m qurg`aq, qısı salqın ha`m ig`allı keledi.

Solay etip, subtropikalıq rayonlarda u`sh tiptegi klimat ajıraladı. Olardın` ha`r birine belgili o`simlikler zonalıg`ı sa`ykes keledi. Subtropiklerdin` baslı o`simlikler zonaları:

1. Ig`allı ma`n`gi jasil subtropikalıq tog`aylar,
2. Qattı japıraqlı ma`n`gi jasil qurg`aq tog`aylar ha`m putalı qalın`lıqlar,
3. Yarım sho`ller,
4. Sho`ller.

Ig`allı ma`n`gi jasil subtropikalıq tog`aylar. Bul tog`aylar (lavrlar tipi tog`ayı) ig`allı subtropikanın` zonalıq o`simlikleri bolıp tabıladı. Olar ha`r qıylı kontinent-lerde ushırasadı.

Olardın` tiykarınan en` u`lken maydanlardı iyelep tarqalg`an rayonları Qubla-Shıg`ıs Aziya (Qıtaydın` qubla-shıg`ıs bo`limi, Orta ha`m Qubla Yaponiya, Koreya yarım atawının` qubla ta`repleri). Bul tog`aylar ten`iz betinen 1400-3500 m biyiklikte jaylasqan tropiaklıq poyastın` tawlarında da ushırasadı.

Qubla-Shıg`ıs Qıtay, Yantszı basseyninde ıg`allı subtropikalıq tog`aylar ag`ash tu`rlerine ju`da` bay. Olardın` ko`pshiligi ma`ngi jasıl, biraq japıraqları tu`setug`ın-ları da bar. Lavrlar, Magnoliyalar, bukler h.b. tuqımlaslardın` wa`killeri ko`p tarqalg`an. Bular joqarg`ı Yarustı du`zedi. Qubla-Shıg`ıs Qıtaydın` subtropikalıq tog`aylarının` to`mengi Yarusında ko`p sandag`ı ha`r qıylı kameliyalar (Camellia), padublar (Jlex), atirgu`lliler, araliyalar h.b. tuqımlaslardın` wa`killeri ko`p. A`yyemgi o`simlikler bolg`an jala`n`ash tuqımlılarg`a jatatug`ın Sagovniklerdin` tsikas (Cycas) tuwıslarının` wa`killeri, pal`malar tu`rleri ushırasadı. Sonday aq bul tog`aylarda tropikag`a ta`n bolg`an ag`ashlar, mısalı, fikuslar, sandal ag`ashı (Sanfalum alfum) h.b. Bul tog`aylar sırtqı ko`rinisi boyınsha tropikalıq rayonlardın` jawınlı tog`aylarına usaydı. Bunda lianlar, epifit paporotnikler, bambukler ko`p. Biraq ayırmashılıg`ı da bar; mısalı, ag`ashlardın` tu`rler baylıg`ı kem. Qublag`a qarap ıg`allı subtropikalıq tog`aylar tropikalıq poyastın` jawınlı tog`ayları menen almasadı. Biraq olar arasındag`ı almasıwlar a`ste-aqırın o`tedi.

Qubla Amerikada ıg`allı ma`n`gi jasıl subtropikalıq tog`aylar kontinentin batıs ha`m shıg`ıs ta`replerinde ushırasadı. Bul tog`aylarda agash tu`rleri ju`da ko`p. Bunda birinshi Yarustı biyik o`setug`ın lavrlar, magnoliyalar h.b. tuqımlaslardın` sonday aq pu`tin ma`n`gi jasıl tu`rleri tutadı. Endemik o`simlikler ko`p, mısalı, fitzroya (Fitzroya). Ag`ash ta`rizli paporotnikler ushırasadı, epifitler menen lianlar ko`p.

Qattı japıraqlı ma`n`gi jasıl qurg`aq tog`aylar ha`m putalı qalın`lıqlar. Qattı japıraqlı ma`ngi jasıl qurg`aq tog`aylar menen putalar qalın`lıg`ı ortajer ten`izi klimatı tipindegi oblastlardın` zonalıq o`simlikleri bolıp esaplanadı. Bul rayonlar ushın uzaq dawam etken ha`m keskin jazg`ı qurg`aqshılıq xarakterli. Biraq ag`ashlar menen putalar qurg`aqshılıq da`wirinde japıraqların taslamaydı ha`m jıl dawamında ma`ngi jasıl bolıp qaladı. Qattı japıraqlı tog`aylar menen putalar qalın`lıg`ı barlıq kontinentlerde ushırasadı.

Orta jer ten`izinde bul o`simlikler tipinın` tarqalıw oblastları ju`da u`lken bolıp, batista Ispaniya menen Marokkoda shıg`ısta Turkiya menen Livang`a shekemgi Ortajer ten`izinin` jag`alıq rayonların iyeleydi. Batıs Orta jer ten`izi Shıg`ıs ta`repine qarag`anda ju`da-ju`da ıg`allı klimatqa iye. Klimat shıg`ısqa qaray, a`ste-aqırın qurg`aklasa baslaydı. Usıg`an. baylanışlı o`simliklerdin` zonalıg`ı a`ste awmasadı: tog`aylar da`slep biyik ha`m qalın`, keyin ala siyrek ha`m pa`skeltek putalar menen awmasadı.

Batıs Orta jer ten`izinde o`simlikler zonalıg`ı bolıp ma`ngi jasıl ag`ash emen-nen turatug`ın tog`aylar esaplanadı. Bul tog`aylardın` ag`ashlıq yarusı qalın` bol-may, biyikligi 15-18m. Putalar yarusının` biyikligi 3-5m ge jetedi. Bul jerde ma`ngi jasıl samshit (Buxus sempervirens), lavr japıraqlı kalina (Virburnum tinus)

ma`ngi jasil krushina (Rhamnus alaternus), mastik piste (Pistacia lentiscus). putalar ushırasadı. Lianalar jimolost`, tuyesin`ir tu`rleri h.b. tutadı. Sho`p qaplamı a`zzi rawajlang`an.

Tas emennen turatug`ın haqıyqıy tog`aylar ha`zir tek Arqa Afrilkanın` tawla-rının` az g`ana rayonlarında saqlang`an. Basqa jerlerde olar adamlardıń shabıwı yamasa mallar bag`ıw na`tiyjesinde joq etilgen. Batis Ortajer ten`izinde tas emen-nen basqa probka emeni (Quercus suber) tarqalıp olar az tog`aylar payda etedi.

Ma`ngi jasil qattı japıraqlı putalı qalınlıqlardıń tag`ı bir tipi eringu`lliler tuqımlasınan turatug`ın pa`s putashalardan turatug`ın tomillyarlar bolıp tabıladı. Putashalardan ken` tarqalg`an tim`yannın` (Thymus) ha`r qıylı tu`rleri.

Ayrıqsha ku`shli jazg`ı qurg`aqshılıq jag`dayında, sonday aq tiykarg`ı o`simlikler qaplamı adamlar ta`repien joq etilgen jerlerdi qattı japıraqlı o`simliklerdin` kserofil` variantı-frigana rawajlanadı. Bul jerlerdin` o`simlikleri, ju`da pa`s ha`m bir-biri menen tutaspaydı. Shar tu`rindegi tikenekli putashalar menen sho`p o`simlikleri u`stemlik etedi. Bul tiptin` o`simlikleri yarım sho`lge o`tiwdegi basqısh bolıp tabıladı.

*Yarım sho`ller ha`m sho`ller.* Qurg`aq subtropikalarda yarım sho`ller menen sho`ller o`simlikler zonalıg`ı bolıp esaplanadı. Bul jerde 250-300mm, ha`tte budan az jawın-shashın jawadı. Klimattın` qurg`aqshılıg`ı na`tiyjesinde o`simlikler qaplamı siyrek, tutaspag`an. Subtropikalıq sho`ller Afrikada Aziyada, Amerikada ha`m Avstraliyada tarqalg`an.

Arqa Amerika subtropikalıq sho`ller kontinentin uzaq qubla- batis bo`liminde (Kaliforniya Yarımatawının ko`p bo`limi, Meksika kırlarının` bo`limi, h.t.b.) jaylas-qan. O`simlikler ko`pshiligi tikenli. Olar qurg`aqshılıq da`wirinde japıraqların to`gedi, ko`bine se rawajlang`an japıraqlarg`a iye bolmaydı.

Bul sho`ller ushın ha`r qıylı kaktuslar xarakterli, sonlıqtan olardı geyde kak-tuslı sho`ller dep ataydı. Derlik barlıq kaktuslar- paqallı sukkulentler, olar ha`r qıylı biyiklikte bolıp, bir neshe sm den 20m ge shekem jetedi. Iri ag`ashlı kaktuslardı dendrotsereus (Dendrocereus) ha`m karnegiya (Carnegia) tuwısları tutadı.

Arqa Afrika ha`m Arabstan yarım atawının` ken` maydanları tropika menen subtropikanın` bo`limleri bolıp tabıladı. Olar arasınan ayqın shegara o`tkeriw qıyın.

Du`n`yanın` en` u`lken sho`llerinin` biri Saxara. Ol tiykarınan qumlı, sonday aq taslı ha`m shag`ıl taslı ko`pshilik bolıp esaplanadı. Bul jerde o`simlikler qaplamı derlik jok. Saxarag`a xarakterli o`simliklerden jewge jaramlı lekanor lishaynigi (Lecanora esculenta), afrika jantag`ı (Alhagi africana), qanatlı efedra (Ephedra alata), aydarlı qandım (Calligonum comosum) h.t.b. ushırasadı. Sho`p o`simlikleri, mısalı, selewler tarqalg`an. Saxaranın` florası Orta Aziya sho`llerinin` florası menen uqsas.

Avstraliya da subtropikalıq sho`ller menen yarım sho`ller tiykarınan konti-nenttin` oraylıq rayonlarında tarqalg`an. Yarım sho`ller a`detde sho`ller menen birlikte o`simliklerdin` bir zonalıq tipine birigedi.

A`debiyatlar:

1. Толмачев А.И. Введение в географию растений. Л. 1974. 244 с.
2. Алехин В.В., Кудряшов Л.В., Говорухин В.С. География растений с основами ботаники. М.1961. 532 с.
3. КурнишковаХ Т.В., Петров В.В. География растений с основами ботаники. М. 1987. 20 с.
4. Гордеева Т.Н., Стрелкова О.С. Практический курс географии растений. М.1969. 335 с.
5. Тахтаджян А.Л. Флористические области земли. Л. "Наука" 1978.

M A Z M U N I

Kirisiw	3
O`simlikler geogafiyası rawajlanıw tariyxı	4
Areallar haqqında ta`liymat (Areologiya)	6
Flora haqqında ta`liymat	10
Jer sharın floristikalıq rayonlarg`a bo`liw.....	15
Jer sharının` o`simlikler qaplamı	26
Subtropikalıq poyastın` o`simlikleri	35
A`debiyatlar	38

Du`ziwshiler:

<i>Otenova Farida Tolegenovna</i>	- A`jiniyaz atındag`ı No`kis ma`mleketlik pedagogikalıq institutı Biologiya oqıtıw metodikası kafedrası docenti, b.i.k.
<i>Tamambetova Shaxigu`l Bayratdinovna</i>	- A`jiniyaz atındag`ı No`kis ma`mleketlik pedagogikalıq institutı Biologiya oqıtıw metodikası kafedrası assistenti.
<i>Guldursunbayeva Adima Talg`at qızı</i>	A`jiniyaz atındag`ı No`kis ma`mleketlik pedagogikalıq institutı Biologiya oqıtıw metodikası ta`lim bag`darı talabası

«O`SIMLIKLER GEOGRAFIYASI»

(oqıw-metodikalıq qollanba)

Bas redaktor	K.M.Koshanov
Tex.redaktor	E.K.Iskenderova
Korrektor	A.M.Sarıbaeva

A`jiniyaz atındag`ı NMPI redakciya – baspa bo`limi

**A`jiniyaz atındag`ı NMPI baspaxanasında basılğ`an, 2016-j
Buyırtpa №____ Nusqası 100 dana. Formatı 60x84. Ko`lemi 2,5 b.t.
230105, No`kis qalası, A.Dosnazarov ko`shesi-104. Reestr №____**