ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ
САМАРҚАНД ДАВЛАТ МЕДИЦИНА
ИНСТИТУТИ

ISSN 2181-5674

БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ МУАММОЛАРИ

ХАЛҚАРО ИЛМИЙ ЖУРНАЛ
№2.1 (95) 2017

PROBLEMS OF BIOLOGY AND MEDICINE

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ МУАММОЛАРИ

PROBLEMS OF BIOLOGY AND MEDICINE

ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ

Научный журнал по теоретическим и практическим проблемам биологии и медицины
основан в 1996 году
выходит ежеквартально

Главный редактор - А.М. ШАМСИЕВ

Редакционная коллегия:
А.В. Алимов, Ю.М. Ахмедов, А.И. Икрамов, З.И. Исмаилов, З.Б. Курбанязов (зам. главного редактора), Ф.Г. Назиров, У.Н. Ташкенбаев, Т.Э. Останакулов, А.М. Хаджибаев, Д.Х. Ходжаев, М.Х. Ходжибеков, Ш.А. Юсупов

ISSN 2181-5674

2017, № 2,1 (95)

УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА:

Самаркандский Государственный медицинский институт

Адрес редакции:
Республика Узбекистан,140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:
(99866) 233-36-79
Факс
(99866) 233-71-75
(99866) 231-00-39
Сайт
pbim.uz
e-mail
pbim.uz@gmail.com
sammi-xirurgiya@yandex.ru

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Подписано в печать 22.04.2017.
Сдано в набор 13.05.2017.
Формат 60×84 1/8
Усл. п.л. 6,6
Заказ 69
Тираж 100 экз.
Отпечатано
в типографии СамГосМИ.
140131, г. Самарканд,
ул. Амира Темура, 18

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
Н.А. Абдуллаев	(Самарканд)
А.Н. Аллаяров	(Самарканд)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
Т.А. Аскаров	(Бухара)
А.В. Девятов	(Ташкент)
И.И. Затевахин	(Россия)
С.И. Исмаилов	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
Rainer Riemmuller	(Австрия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
А.А. Хусинов	(Самарканд)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕЧЕНИЯ МЕСТО-РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ III И IV СТАДИИ

Кулиев А.А., резидент магистратуры СамМИ
Кафедра хирургических болезней №1 и онкологии (зав. каф. - доц. Курбаниязов З.Б.)
Научный руководитель: доц. Каримова М.Н.

Рак молочной железы занимает лидирующее место в онкологической заболеваемости и смертности среди женщин. Одним из основных факторов улучшения отдаленных результатов лечения является своевременная диагностика и радикаль-ное лечение на ранних стадиях заболевания. Цель исследования: Оценить результаты лечения местно-распространенных форм рака молочной железы при III и IV стадии. Материал и методы исследования: В исследование включены 84 женщин, наблю-давшихся в Самаркандском Областном Онкологическом Диспансере в период с 2013-2015 годы. Все пациентки в зависимости от стадии и методов лечения были разделены на две группы. В первую группу были включены больные с IIIа, б стадией, которым до оперативного вмешательства была проведена лучевая и неоадьювантная химиотерапия (56наблюдений 16,6%). Во вторую группу были включены женщины с IV стадией, которым до оперативного вмешательства была проведена только 1 курса неоадьювантной хи-миотерапии (16 наблюдений 50%) и (12наблюдений 33,4%)из-за невозможности проведения неоадьювантной химиотерапии (кровоте-чение и распад опухоли) было сразу проведено оперативное вмешательство с последующей адъювантной химиотерапией. Результаты и их обсуждение: После проведения всем двум группам комплексного лечения, проводилось тщательное наблюдение и обследование в течение года, которое показало следующие Результаты и их обсуждение: у женщин которые были включены в первую группу, за этот период рецидивов и отдаленных метастазов не наблюдалось. При наблюдении за второй группой женщин, у 45% были обнаружены рецидивы заболевания и у 20% отдаленные метастазы. Выводы: Таким образом, при лечении рака молочной железы с III стадией, лучшие показатели наблюдаются при проведении предоперационного курса лучевой-терапии в сочетании с хирургическим лечениеми послеоперационными курсами химиолучевой терапии. Если при раке молочной железы III стадии одним из вариантов лечения может оставаться комбинированный метод (предоперационный курс лучевой терапии в сочетании с хирургическим лечением), то при IV стадии заболевания, мы рекомендуем применение комплексного метода лечения, как наиболее оптимального и имеющего более высокие ре-зультаты выживаемости.