



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ  
САМАРҚАНД ДАВЛАТ МЕДИЦИНА  
ИНСТИТУТИ

ISSN 2181-5674

# ***БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ МУАММОЛАРИ***

ХАЛҚАРО ИЛМИЙ ЖУРНАЛ  
№2.1 (95) 2017

**PROBLEMS OF  
BIOLOGY AND MEDICINE**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ  
МУАММОЛАРИ**

**PROBLEMS OF  
BIOLOGY AND MEDICINE**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ  
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим  
проблемам биологии и медицины  
основан в 1996 году  
выходит ежеквартально

*Главный редактор - А.М. ШАМСИЕВ*

**Редакционная коллегия:**

*А.В. Алимов, Ю.М. Ахмедов, А.И. Икрамов,  
З.И. Исмаилов, З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),  
Ф.Г. Назиров, У.Н. Тамкенбаев, Т.Э. Останакулов,  
А.М. Хаджибаев, Д.Х. Ходжаев, М.Х. Ходжибеков,  
Ш.А. Юсупов*

## УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА:

Самаркандский Государственный  
медицинский институт

### Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,  
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

### Телефон:

(99866) 233-36-79

### Факс

(99866) 233-71-75

(99866) 231-00-39

### Сайт

[pbim.uz](http://pbim.uz)

### e-mail

[pbim.uz@gmail.com](mailto:pbim.uz@gmail.com)

[committee@pbim.uz](mailto:committee@pbim.uz)

Журнал зарегистрирован  
в Управлении печати и информации  
Самаркандской области  
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
Н.А. Абдуллаев	(Самарканд)
А.Н. Алпаяров	(Самарканд)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
Т.А. Аскарлов	(Бухара)
А.В. Девятков	(Ташкент)
И.И. Затевахин	(Россия)
С.И. Исмаилов	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
Rainer Riehmuller	(Австрия)
В.М. Розинков	(Россия)
Л.М. Рощаль	(Россия)
А.А. Хусинов	(Самарканд)

Подписано в печать 22.04.2017.

Сдано в набор 13.05.2017.

Формат 60×84 мм

Усл. п.л. 66

Заказ 69

Тираж 100 экз.

Отпечатано

в типографии СамГосМИ.

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

# РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ КАК ОТЯГОЩАЮЩИЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ И ТЕЧЕНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Хаятов Р.Б., асс., Тураев Б.Т. резидент магистратуры СамМИ  
Кафедра психиатрии, медицинской психологии и наркологии (зав. каф. – доц.  
Велиляева А.С.)

Научный руководитель: доц. Велиляева А.С.

Установлено, что у больных с расстройствами личности риск формирования алкогольной зависимости выше и течение её более злокачественное, чем у пациентов без личностных расстройств. Следует отметить, что у таких пациентов наблюдаются более тяжелые формы алкогольной зависимости, требующие особого подхода и более дифференцированного лечения. Цель исследования: Изучение клинко-психологических особенностей формирования и течения алкогольной зависимости отягощенной личностными расстройствами. И разработка на этой основе комплексных программ дифференцированной терапии. Материал и методы исследования: Обследовано на базе СОНД 65 больных с алкогольной зависимостью осложненной различными расстройствами личности. Средний возраст составлял от 22 до 50 лет. Больные предъявляли жалобы на головную боль различного характера и локализации - 97,1%; нарушение сна - 100%; вспыльчивость и раздражительность - 100%; чувство тревоги и внутреннего напряжения - 100%. Все выше перечисленные жалобы привели к снижению трудоспособности, соци-альной и бытовой дезадаптации больных. При оценке уровня тревожности по шкале самооценки Спилбергера- Ханина выявлены высокие показатели личностной тревожности — 56,8±0,6 баллов, ситуационной тревожности — 59,5±0,7 баллов. Диа-гностика расстройств личности базировалась на классическом клиническом подходе, опирающемся на критерии П. Б. Ганнуш-кина и О. В. Кербикова. Типологическая группировка личностных расстройств была проведена в соответствии с установивши-мися принципами клинического подхода - на основе учета доминирующей симптоматики, по облигатным клиническим призна-кам. Результаты и их обсуждение: Всех исследуемых пациентов разделили на три группы, которые отражают основные типы психических реакций: возбудимые - 50,7% (33 больных), неустойчивые – 26,1% (17 больных), тормозимые – 23,1% (15 боль-ных). У 84,5% больных (54 человека) была выявлена наследственная отягощенность. Наибольший удельный вес занимала отягощенность алкогольной зависимостью по линии отца - 50% (30 человек). Личностные девиации у отцов пациентов (рас-стройства личности, психопатические черты) отмечались в 54,5% случаев (35 человек). Алкогольная зависимость во второй линии родства встречалась в 7,5% случаев (9 человек). При сравнении выделенных групп, наибольшая наследственная отя-гощенность была выявлена в первой (87%) - у пациентов с алкогольной зависимостью, сформировавшейся на фоне рас-стройств личности возбудимого круга. Выводы: 1. Патологическое влечение к алкоголю у больных с алкогольной зависимо-стью, сформировавшейся на фоне расстройств личности, различно по психопатологической структуре. У

больных с расстрой-ствами личности возбудимого круга превалирует поведенческий компонент; у пациентов с тормозимыми расстройствами личности - аффективный компонент; у неустойчивых - идеаторный. 2. В структуре алкогольного абстинентного синдрома у паци-ентов с личностными расстройствами возбудимого круга преобладают поведенческие и дисфорические расстройства; у боль-ных с неустойчивыми личностными расстройствами - аффективные нарушения с ярко выраженными истероформными прояв-лениями и суицидальным шантажным поведением; у больных с тормозимыми личностными расстройствами - доминируют аффективные нарушения с преобладанием тревоги.