

**O`ZBEKSTAN RESPUBLIKASI AWIL HA`M SUW XOJALIG`I
MINISTRLOGI**

**Tashkent ma`mleketlik agrar universiteti
No`kis filiali**

Agronomiya ha`m awil xojalig`in mexanizatsiyalastiruv fakulteti

«O`simlikshilik ha`m o`simliklerdi qorg`aw» kafedrası

Bakalavr 5410400– « Awıl xojalıg`ı eginleri selektsiyası ha`m
tuxımgershiligi» ta`lim bag`darı
4-kurs studenti

**Reymov Quwatbaydın’
“ Jon`ishqa tuqımgershiligin arnawlı sho`lkemlestiriw
ilajları ” atamasındag`ı**

PITKERIW QA`NIYGELIK JUMISI

Basshi: TashMAU No`kis filiali
«O`simlikshilik ha`m o`simliklerdi qorg`aw»
kafedrası dotsenti,
a/x.i.k. _____ Q. Seypullaev

**Pitkeriw qa`niygelik jumısı kafedradan da`slepki
qorg`awdan o`tti**

«O`simlikshilik ha`m o`simliklerdi
qorg`aw» kafedrası
baslıg`ı, dotsent
_____ A.Utepbergenov
2014 jıl «____» _____

«Agronomiya ha`m awil xojalig`in
mexanizatsiyalastiruv» fakulteti
dekanı, b.i.k. _____
N.Abasttarov
2014 jıl «____» _____

No`kis – 2014 j.

MAZMUNI

	KIRISIW.....	3
1	A`DEBIYatLARG`A ShOLIW.....	5
1.1.	Jon`ishqa o`simligi o`mirinde sirtqi faktorlardin` roli.....	5
1.2.	Jon`ishqanın` awıl-xojalıq a`hmiyeti.....	8
1.3.	Jon`ishqanın` biomorfologiyalıq o`zgeshelikleri.....	11
2.	IZERTLEWLERDI O`TKERIW JAG`DAYLARI, SXEMASI HA`M METODIKASI.....	19
2.1.	2.1. Respublikanın` topraq klimat jag`dayları.....	19
2.2.	Ta`jiriybe jumıslarının` sxeması ha`m metodikası.....	26
3.	IZERTLEW NA`TIYJELERI	30
3.1.	Jon`ishqa tuqımgershiligi tiykarları.....	30
3.2.	Jon`ishqa agrotexnikası	36
3.3.	Jon`ishqa tuqımgershiligi	52
3.4.	Jon`ishqa zıyankesleri ha`m keselliklerine qarsı gu`res jolları..	56
	Juwmaqlaw.....	64
	Paydalınılg`an a`debiyatlar.....	66

KIRISIW

O'zbekstanda alıp barılıp atırǵan reformalar awıl xojalıǵı tarawında da o'zinin` unamlı na'tiyjelerin berip atır ha'm tarawǵa tiyisli bolǵan nızamlar (Jer kodeksi, «Fermer xojalıǵı haqqında», «Diyqan xojalıǵı haqqında») ha'm basqa da normativlik hu'jjetler menen bekkemlenedi. Prezidentimizdin` 2005- jıdın` 8- noyabrinde «2006-jıl awıl xojalıǵı shirketlerin fermer xojalıqlarına aylandırıw boyınsha ilajları haqqında» g`ı qararı tiykarında barlıq orınlarda fermer ha'm diyqan xojalıqları sho'lkemlestirip, olar o'zlerine tiyisli bolǵan egislik jer maydanlarına, kerekli texnikalarg`a ha'm awıl xojalıǵı mashinalarına iye boldı. Wa'layatlarda o'ndirilip atırǵan awıl xojalıǵı daqılları ha'm sharwa malları o'nimlerinin` derlik barlıǵı solardın` ku'shi menen jetistirilip kelmekte. Son`g`ı jılları jon`ishqashılıqtı a'sirese onın` tuqımgershiligin bunnan bılay rawajlandırıwǵa u'lken itibar qaratılǵan ha'm bul tarawda ilimge negizlengen aldag`ı texnologiyalardan u'nemli paydalanıw, jetistirilgen o'nimlerdin` ko'pshilik mug`darın sanaatlı tiykarda qayta islep, olardı basqa ma'mleketlerge eksportqa shıǵarıwdı jolg`a qoyıw usag`an a'meliy isler alıp barılmaqta. Ha`zirgi waqıtları Qaraqalpaqstan Respublikasında jon`ishqa tuqımgershiligi menen shug`ıllanatug`ın arnawlı fermer ha'm diyqan xojalıqları qayta sho'lkemlestirilgen. Olardın` materiallıq-texnikalıq bazaları jıldan-jılǵa bekkemlenip barmaqta. Bul xojalıqlarda jon`ishqanın` o'nimdarlı sortlarının` tuqımları jeterli mug`darda ta'miynleniwine itibar qaratılǵan.

Respublikamızda seleksionerlerimiz jon`ishqanın`, ot-sho'p eginlerinin` jan`a sortların jaratıp atır. Usı eginlerdin` tuqımlarınan joqarı zu`ra`a`tlı en` jaqsı tu`rleri o'ndiriske ken`nen endirilmekte, tuqımgershilik xızmeti sho'lkemlestirilgen. Degen menen alınıp atırǵan tuqımnın` zu`ra`a`tliligi ha'm onın` elede bolsa talap da`rejesinde emes. Rayonlastırılǵan awıl xojalıq o'simliklerinin` taza sortları o'ndiriste a`stelik penen engizilmekte. Ko'pshilik tuqımgershilik xojalıqları tuqım tayarlawdın` progressiv texnologiyası boyınsha islemey atır. Al onday texnologiyasız, tuqım sapasın jaqsılawǵa ha'm joqarı zu`ra`a`t alıwǵa erisiw

mu`mkin emes. Tuqımlıq eginlerdi o`sirip jetistiriw xızmeti o`z aldına arnawlı bo`lim yamasa uchastkalarg`a birlestiriwi kerek, jaylasıwı tiyisli qadag`alaw organları ha`m ilim izertlew institutları ta`repinen sortlıq tuqımlardı o`ndiriw boyınsha baqlaw, tekseriw jumısların qıyınlastırıp jiberedi.

Respublika boyınsha 2009-jılı 4726 fermer xojalıqlar, sonın` ishinde 268 fermer xojalıg`ı baw-baqsha ha`m palız, 604 fermer xojalıq bag`shılıq ha`m ju`zimgershilik penen shug`ıllanbaqta. ha`zirgi waqıtta esaptan o`tken 225478 diyqan xojalıqları ha`mde u`y qaptalı uchastkasına iye bolg`an ha`r bir puqara miywe agashları ha`m baw-baqsha eginlerin o`siriwge a`detlengen. Olar qıytaqlarınan mol o`nim jetistirip, o`nimlerdi bazarlarg`a shıg`arıp satıwdı a`melge asırıp, o`zlerinin` shan`araklarının` kem-kemnen qurg`ınlasıwın ta`miynlep kelmekte. O`tken 2008-jılı respublika boyınsha 8,7 mın` gektar maydang`a baw-baqsha eginleri egildi. Bul maydanlardın` 8,6 mın` gektarı fermer ha`m diyqan xojalıqlarının` u`lesine tiyisli. Ha`r bir gektar maydannan fermer xojalıqları 13,2 tonna, diyqan xojalıqları 14,9 tonna o`nim jıyanap aldı. Ulıwma 6,3 mın` gektar maydang`a palız eginleri egilip, ha`r bir gektar jerden 9,9 tonna o`nim jetistirildi. Barlıg`ı bolıp 2,9 mın` gektar maydang`a kartoshka egildi ha`m bul egilgen maydanlardın` ha`r bir gektarınan 7,7 ts o`nim jıynap alındı. Joqarıdag`ı keltirilgen mag`lıwmatlar aymaqta jasawshı xalıqlardı baw-baqsha ha`m palız o`nimleri menen ta`miynlewdirin` jeterli da`rejede emes ekenligin ko`rsetedi. Bul tarawdı rawajlandırıwda awıl xojalıg`ı o`ndirisnin` qa`nigeleri, fermer ha`m diyqan xojalıqlarının` aldında sheshimin ku`tip turg`an u`lken wazıypalar ju`klengen. Atap aytqanda bunnan bılayda baw-baqsha ha`m palız eginlerin o`siriwde jan`a texnologiyalardı endiriw arqalı, olardıń mug`darın ko`beytiw arqalı jıldın` barlıq ma`wsimlerinde xalıqtı bul daqıllardıń o`nimleri menen tolıq ta`miynlew bolıp tabıladı.

Bul pitkeriw qanigelik jumısında jon`ıshqanın` biologiyalıq o`zgeshelikleri ha`m olardıń tuqımgershiligin jetistiriw texnologiyaları boyınsha ilim ha`m o`ndiris ta`jiriybelerine tiykarlang`an mag`lıwmatlar beriledi.

1. A`DEBIYATLARDAN SHOLIW

1.1. Jon`ishqa o`simligi o`mirinde sırtqı faktorlardın` roli

Awıl xojalıq eginleri ushın topıraqtın` optimal ıg`allıg`ı na`tiyjesinde bir qansha ilimiy jumıslar islengen. O`simliktin` o`mirinin` suw menen tıg`ız baylanısta bolıwı topıraqtın` ıg`allıg`ın, suwg`arıw mu`ddetine egisten aldın teoriyalıq jaqtan biliwdi talap etedi. (Rınov 1953). Ko`p jıllıq izertlewlerdin` mag`lıwmatlarına qarag`anda egerde 70% topıraq ıg`allıg`ınan kem bolg`an jag`dayda o`simlik ushın kerekli bolg`an na`mliktin` kemip, jon`ishqa o`simliginin` rawajlanıwı a`stelik penen bolatug`ınlıg`ı, tup sanları o`nimdarlıg`ı kemeyetug`ınlıg`ı da`liylengen.

V.A.Kovdanın` (1967) pikiri boyınsha ku`shli shorlang`an topıraqlarda vegetatsiya da`wirinde topıraqtın` ıg`allılıg`ı sheklengen tıg`ız ıg`allılıg`ın 80-85% kem bolmawı kerek. Sebebi suwg`arıw da`wirlerinin` aralıg`ında topıraq qatlamındag`ı duz kontsentratsiyalarının` ko`terilip ketiwine jol qoymaw kerek.

N.R. Bepalovtın` (1963) pikirine tuwra keledi, onın` pikiri boyınsha jawınlatıp suwg`arıw taza topıraq sheklengen tıg`ız ıg`allılıg`ının` 70% al shorlanıwg`a beyimlesken jerlerdin` 75% (NV) qurawı kerek.

N.K.Nikolaevtın` (1956) pikiri boyınsha jer astı suwları jaqın jaylasqan jag`dayda jer qabatının` 0-60 sm qatlamın tapka keltiriw sheklengen tıg`ız ıg`allılıg`ın 70-75% a`tirapında bolıwı kerek. V.Radmistrov (1957), V.N. Xovinskiy (1955), N.V.Krasovskiyy (1985) ha`m basqada ilimpazlardın` jumıslarının` juwmag`ında paxta, jon`ishqa ha`m basqada eginlerdin` tamır sistemasının` rawajlanıwı tiykarınan topıraq ıg`allılıg`ının` o`siwine baylanıslı ekenligin ko`rsetedi.

V.Gadmistrovtın` ko`rsetiwi boyınsha o`simliktin` jas da`wirinde topıraqtı qoldan ıg`allandıırıw na`tiyjesinde 30-40 sm qatlamda tamır sistemasının` gorixontal rawajlanıwına mu`mkinshilik beredi. Topıraqtın` optimal ıg`allılıg`ın to`mengi shekte uslap turıw ushın shorlang`an topıraqlarda suwg`armastan

aldın`g`ı ıg`allıq taza topıraqlarg`a qarag`anda ko`p bolıwı kerek ekenligine a`debiyatlardı qısqasha sholıw arqalı ko`z jetkeremiz.

Klimat, topıraq ha`m meliorativ jag`daylarga qaray jon`ıshqanı suwg`arıw normaları V.R.Vilyans (1939) ma`deniy eginlerdin` suwg`a bolg`an talabı belgili da`rejede vegetatsiya da`wirinin` uzaqlıg`ına ha`m japıraq beti ko`leminin` ulıwma maydanına baylanıslı ekenligin atap o`tti.

Jerlerdi ulıwma suwg`arg`anda mo`lsherlengen suwdı jetkeriw din` jolların qarag`anımızda A.N.Kostenov (1951) qunarlıg`ı to`men da`rejede topıraqta suw jalpılamay qabıllaw menen onın` arasındag`ı belgili bir baylanıstın` bir ekenligin, sonday-aq joqarı qunarlıg`ı to`men da`rejeli topıraqta suwdı jawın-shashın mug`darın qısqanda joqarıdag`ı baylanıstın` bar ekenligin atap ko`rsetti yag`nıy usıg`an baylanıslı o`simlik tin` suwg`a bolg`an talabının` artıwına ha`m waqtında qanaatlandırğ`an jag`dayda o`simliklerden mol zu`ra`a` t alınadı. Beriletug`ın suwdın` mug`darı ha`r bir suwg`arılatus`ın ma`deniy eginnin` o`nimdarlıg`ına, agrotexnikasına topıraq qunarlıg`ı shamasına ten` keliwi kerek.

Keyingi jılları o`simlikti suwdı talap etiwine belgili ta`sir jasawshı parlanıwdın` shamasına, suw talap etiw din` shamasına u`lken kewil bo`linbekte. Jan`adan o`zlestirilgen jerlerde parlanıwshılıq boyınsha ulıwma suwg`arıw normasın esaplaw metodı usınıs etilgen. Esaplaw tiykarına temperatura ha`m parlanıwshılıqtın` ko`p jıllıq ko`rsetkishinen paydalang`anlıg`ı sebepli onı jeterli da`rejede da`lleylep ko`rsetilgen dep aytıw qıyın. Ta`jiriybede qorshag`an ortanın` ha`r tu`rligi berilgen ko`rsetpelerde da`l tekseriwdi talap etedi.

Jon`ıshqa ha`m ma`deniy basqa eginlerdin` paxta almaslap egiwdegi suwg`arıw rejimin differentsiyalaw V.M. Legastaevtin` (1935) ha`m Konenovanın` (1950) jumıslarında ken`nen ko`rsetilgen yamasa u`y klimatlıq zonag`a bo`lingen tu`slik, orta ha`m arqa zonalar. Bul zonalarda rayonlar on gidromodul rayonlarında differentsiyalanadı.

Suw talap etiwdi differentsiyalawda S.N.Rıjov (1948) vegetatsiya basında ha`m aqırında au`ısıq ıg`allılıq ha`m taza ıg`allıqtı topıraqtın` mexanikalıq quramındag`ı fizikalıq qa`siyetlerinen kelip shıg`adı dep ko`rsetken.

V.G.Ermenkanın` ko`rsetiwinshe klimatlıq ha`m gidrogeologiyalıq ayırmashılıqların egip almaslaw ha`m burınnan egilip kistırg`an paxta atızının` suwg`arıw normaların differentsiyalaw usınılg`an. Razmerlerdi differentsiyalaw za`ru`rli ha`m suwg`arıw rejimleri Qırg`ızstannın` taw aldı zonalarında topıraqtıg`ı ıg`allıq zonasına temperaturag`a ha`m suw menen ta`miynleniwine baylanıslı dep ko`rsetti.

A.A.Juryaev (1964-1965), S.P.Rıjov ha`m N.F.Bespalov ta`repinen (1972) gidromoduli qa`ddin ha`m topıraqtın` jaylasıwın esaplaytug`ın jan`a tu`rin usınıs etti. I. K.Kiselev, N.A.Lifchin (1971) Xorezm oblastı jag`dayında jer astı suwları teren`lik jag`dayında jer astı suwları 1-2 m teren`likte jatqanda jon`ıshqanın` ulıwma suwg`arıw normasın  $4000 \text{ m}^3/\text{ga}$  degen tu`sinik beredi. Onın` pikiri boyınsha topıraqtı shorlandırmaı uslap turıw ushın suwg`arıw normasın u`zliksiz arttırıp barıw kerek. Bul ko`z qaras ken` tarqalıp topıraqtın` shorlanıu`ına qarsı o`tkerilgen ilimiy konferentsiyag`a (1969) o`z ornın taptı.

P.S.Kolyujniy ha`m Yu.Tregulovtın` (1974) ha`m ashıq sho`listan jerlerde jon`ıshqanın` suwg`arıw norması 11000 dan $150 \text{ m}^3/\text{ga}$ bolıwı kerek degen usınıs bildirildi.

Samarqand oblastının` otlaqlı oblastlarında borozdkalap ha`m topıraqlardı jawınlatıp suwg`arg`anda suwg`arıw normaları to`mendegishe boladı:

Birinshi jag`dayda $3317 \text{ m}^3/\text{ga}$

Ekinshi jag`dayda $1730 \text{ m}^3/\text{ga}$

Al, o`nim bolsa tiykarınan 26,5-29,5 ts/ga boldı. Paxtadan ta`jiriybe stantsiyasında Soyuz NİXH (1972) Sredgaziv ha`m T.Bayqabulov jer astı suwları 3-4 m teren`likte jatqan ulıwma suwg`arıw norması 25%, al o`nimdi 0,3 ts/ga jetkergen.

Qaraqalpaqstan «Diyxanshılıq» ilim izertlew institutında Mambetnazarov B ha'm A.Xojasovalardıń o'tkergen ilimiy ta'jiriybelerinde (1984-1989) 7000-1000 m³/ga jon'ıshqanın' suwg'arıw norması boyınsha izertlew o'tkergende mexanikalıq quramı awır bolg'an jer astı suwları 15-20 m teren'likte jatqan ortasha shorlang'an topıraqlarda jon'ıshqanın' en' ko'p o'nimi ulıwma suwg'arıw norması 4000 m³/ga bolg'an bes suwg'arıwdan keyin alındı.

1.2. Jon'ıshqanın' awıl-xojalıq a'hmiyeti

Ma'deniy eginler o'zlerinin' tamır sistemasının' jaylasqan qabatında artıqmash duzlar jıynalg'an jerlerde to'men rawajlanadı. Topıraq qatlamlarındag'ı xlorlı-sulfat mug'darı 0,1% do'gereginde bolg'an jag'daylarda awıl xojalıg'ı o'simliklerinin' o'nimdarlıg'ına ha'm olardıń sapasına ko'p keri ta'sirin tiygizedi. Topıraq qatlamındag'ı toplang'an duzlardıń qattı mug'darı 0,3-0,5% bolg'anda o'simlik o'siw mu'mkin bolg'an en' joqarı mug'darı bolıp esaplanadı.

Eginlerdin' ishindegı en' duzg'a shıdamsız o'simlik jon'ıshqa o'simligi bolıp esaplanadı. Egerde topıraqtın' bir metr qabatında xlor duzının' mug'darı 0,030-0,045% bolg'anda paxta o'simligi normal o'sip shıg'atug'ın bolg'anda jon'ıshqa o'simligi topıraqtag'ı duzdın' mug'darı, tek 0,010-0,020% bolg'anda g'ana normal o'sip shıg'ıw mu'mkinshiligine iye boladı.

Joqarıdag'ı mag'lıwmatlarg'a qarag'anımızda jon'ıshqa o'simliginin' paxta o'simligine qarag'anda duzg'a shıdamlıg'ı eki ese to'men ekenligi ko'rinip turıptı. Jon'ıshqanı intensiv usıldı egip o'sirgen waqtımızda topıraq sostavındag'ı duzlardıń mug'darın azaytatug'ınlıg'ı belgili ha'm bul qubılıs usı o'simliktin' o'zinin' ayırmashılıqlarına baylanıslı bolıp keledi.

Birinshiden jon'ıshqa tuxımları qalın' ekenligi sebebinen tez arada topıraq betlerin o'zinin' ko'k massası menen bastırıp turadı, sonlıqtanda topıraq betlerin ko'p qazıwdan saqlanıp turılıp, olardıń betinen parlanıwdın' mug'darın azaytadı. Parlanıwdın' azaytıwı o'z gezeginde topıraqtın' to'mengi gorizontlarınan

duzlardın` joqarı ko`teriliwin toqtadı. Jon`ishqa o`simligi egilgen atızlarda temperatura, paxta o`simligi egilgen atızlardag`ı temperaturag`a qarag`anda 6-8⁰ S to`men boladı.

Ekinshiden jon`ishqanın` vegetatsiyalıq da`wirinin` ishinde jaz dawamında 5-6 ret suwg`arılğ`anlíg`ı sebepli topıraq sostavındag`ı duzlar to`mengi qatlamlarg`a juwılıp ketedi, demek olardın` tamirlarının` tiykarg`ı bo`lekleri jaylasqan gorizonttag`ı o`simlikler ushın zıyanlı bolg`an duzlar mug`darı azayadı.

U`shinshiden jon`ishqanı jaz ma`wsimi ishinde bir neshe ret orıp aladı.

Birinshi jılı 3-4 ma`rtebe, al ekinshi ha`m u`shinshi jılları 5-6 ret ha`m onnanda ko`p ma`rtebe orıp aladı. Jon`ishqanın` orıp alıng`an massası menen ko`p mug`darda olardın` denesindegi jıynalg`an duzlar atızdan alıp shıg`ıladı.

To`rtinshiden jon`ishqa o`simligi kop paqallı o`simlik bolg`anlíg`ı sebepli usı japıraq ha`m paqal massası arqalı ko`p mug`darda suw parlandıradı.

O`simliktin` transiratsiyalıq koeffitsienti 700-900 ha`m onnanda ko`p boladı.

Besinshiden jon`ishqa o`simliginin` ku`shli rawajlang`an tamır sisteması topıraqtın` teren` qabatlarına tarqaladı ha`m bul teren`lik 2-3 metr, al ayırım waqıtlarında 10 metrge deyin tarqaladı. Sonlıqtanda o`zlerinin` tamirları arqalı teren` qabatlardag`ı jaylasqan ıg`allılıqtan paydalanıp joqarı ko`teriletug`ın jer astı suqlarının` jılısıwin toqtatadı.

Jon`ishqa o`simliginin` topıraqtı duzsızlandırıwshı qa`siyeti o`simlik qalın`líg`ına ha`m orıp alıw waqtına baylanıslı bolıp keledi. Jon`ishqanın` atızda bir tegis ha`m qalın` bolıp o`siwin ta`miynlegen waqtımızda, olardın` topıraqtı duzsızlandırıw uqıbı artadı. O`simliktin` bul uqıbı o`zinin` u`shinshi jılı o`mirinin` ishinde maksimumına jetedi.

Ayırım waqıtlarında ekinshi jılı jon`ishqa atızlarında shorlanıw protsessleri orın alg`anlíg`ın ko`remiz. Bul qubılıs tiykarınan o`simliktin` transpiratsiyalıq koeffitsientinin` ko`beyiwinin` sebebinen boladı, o`simlik bul waqıtlarında ko`p ko`k massa toplanıp jaqsı rawajlang`an tamır sistemasına iye boladı. Sonlıqtan da ku`shli rawajlang`an jon`ishqa o`simligi egislikten suwg`arıwğ`a berilgen suw

mug`darına qarag`anda eki ese ko`p mug`darda ıg`allıq sarp etedi, jetispegen mug`darda grunt suwlarının` alıp ekinshi ma`rtebe qayta duzlanıwg`a alıp keledi.

1-keste

Jon`ishqanın` topıraqtag`ı duzdın` mug`darının` azayıwına ta`siri, %

Topıraq qabatı, sm	Bir jıllıq jon`ishqa				Eki jıllıq jon`ishqa		U`sh jıllıq jon`ishqa	
	Ba`ha`rde		Gu`zde		Gu`zde		Gu`zde	
	Qattı qaldıq	CL	Qattı qaldıq	CL	Qattı qaldıq	CL	Qattı qaldıq	CL
0-50	0,635	0,011	0,475	0,010	0,514	0,013	0,301	0,009
0-100	0,759	0,011	0,617	0,011	0,705	0,013	0,541	0,011
100-200	1,210	0,012	1,078	0,018	1,086	0,007	0,039	0,008

O`z waqtında ha`m jetkilikli da`rejede suwg`arılğ`an jon`ishqa o`simligi topıraqtı tegis duzsızlandıradı. Al u`sh jıllıq jon`ishqa bolsa eki metrlik qalın`lıqtag`ı topıraqtı duzsızlandırıp jer astı grunt suwlarının` to`menge tu`siwine alıp keledi, sonlıqtan olar topıraqtın` fizikalıq qa`siyetlerinin` jaqsılanıwın ta`miynleydi. Jon`ishqa eginlerinde ko`p mug`dardag`ı organikalıq zatlardıń toplanıu`ının` sebebinen topıraqtag`ı suw o`tkizgishligi jaqsılanadı ha`m topıraqtın` joqarg`ı qatlamlarındag`ı ko`p mug`dardag`ı duzlardıń juwılıwın ta`miyinleydi.

Jon`ishqa o`simliginen keyin egilgen paxta atızları keyingi 4-5 jıl dawamında zıyanlı duzlardıń ta`sirin ko`rmeydi. Al qayta duzlanıw jon`ishqa egilgennen son`g`ı 6-7 jıldan son` payda bola baslaydı. Bul waqıtları jon`ishqanı qaytadan egedi yamasa topıraqtı shayıp suwg`aradı. Topıraqtın` duzsızlanıwının` tiykarg`ı sebebi topıraq betinin` erteden baslap qalın` o`simlik qabatı menen bastırılıwı ha`m qoyıw ko`len`senin` jer betine twsip turıwınan, alıng`an o`nim

menen toplanğan duzlardın` ko`pshilik mug`darının` alıp shıg`ılıwı, o`simlik tamırı ta`repinen sorıp aling`an suwlardın` sebebinen ıg`allıqtın` joqarıg`a ko`teriliwinin` toqtawı, vegetatsiya da`wirindegi suwg`arılıwlardın` na`tiyjesinde duzlardın` juwılıwınan bolıp esaplanadı.

Jon`ishqa o`simliginin` topıraq sostavındag`ı toplanğan duzlardın` mug`darın azaytıw dinamikası, o`simlikti optimal waqıtlarında ekkende, o`z waqtında suwg`arg`anda, orıp alg`anda ha`m o`simliktin` egisliktegi bir tegis qalın`lıqta bolıwına baylanıslı bolıp keledi.

1.3. Jon`ishqanın` biomorfologiyalıq o`zgeshelikleri

Jon`ishqa-bir neshe ta`kirar orıp alınatug`ın, ko`p jıllıq ot-sho`p o`simligi. Tamır sisteması sterjen ta`rizli bolıp, oraylıq tik tamırın do`gereklep torlap o`sken qalın` shashaq tamırlarına iye. Shashaq tamırlarının` tiykarg`ı massası topıraqtın` joqarg`ı qabatına jaylasqan. Birinshi ha`m ekinshi u`sh top japıraq payda bolg`an gezleri jon`ishqa o`simligi 25-30 sm. teren`likke jetedi. Birinshi u`sh top japıraq shıg`arıw menen hawa quramındag`ı erkin azottı o`zlestirip alıwshı tamır tu`ynekshelei payda boladı, birinshi jılı-onın` tamırı 1,5-2,0 metrge shekem, al 3-4 jıllıq jon`ishqanın` tamırı 5-7 metrge shekem o`sedi.

Bir tu`ptegi paqal sanı-onın` qalın`lıg`ına, orılıwına, jasına, topıraqtın` hasıldarlıg`ına, sortının` biologiyasına ha`m o`sip jetilisiw jag`daylarına qaray o`zgerip turadı. A`dettegishe qalın` etip egilgen jon`ishqanın` bir tu`binde normal rawajlang`an 2 6 paqax payda boladı. Al, ken` qatarlı, shanaqlap egilgen jon`ishqanın` ha`r tu`binen 40-60 qa deyin, siyrek egisliklerinin` ha`r tu`bine derlik 150 ge shekem paqal sanawg`a boladı. Jon`ishqanın` japırag`ı quramalı u`sh top japıraqqa iye, onın` ortan`g`ısı japıraq sabag`ının` ushına bekitilgen bolıp, eki qaptal japırag`ı bir qansha to`menirekte qısqa japıraq sabag`ına ilinip turadı.

Jon`ishqanın` gu`l g`umshası -ko`p danalı gu`lqasına iye, shog`ırlı gu`l buwmasınan turadı. Gu`l shog`ırında (gu`l uyasında) gu`l sanı, a`dette -15 ten 30 g`a jetedi. Miywesi tawlap esilgen spiral formadag`ı 3-5 oramnan turatug`ın lobiya

sıyaqlı qattı tuqımlı bolıp keledi. Sabag`ında ortasha 6-12 tuqımnan boladı, tuqımı mayda, bo`teke, lobiya ta`rizli, tegis emes yamasa do`n`eslew-sopaqsha formada: sarg`ish, jasil sarg`ish yamasa ashıq-qon`ır ren`de bolıp 1000 tuqımın` salmag`ı 1,9 2,3 gr keledi. Tuqımın` jibiwi ha`m ko`gerip shıg`ıwı ushın o`z salmag`ının` 85-90 % mug`darında suw talap etiledi.

Tuqım urıg`ının` o`nıp shıg`ıwı ushın 2-3% S ıssılıq kerek. Biraq na`linin` normal o`siwi ha`m bunnan bılayg`ı rawajlanıwı ushın topıraqtın` temperaturası 15-20⁰S dan kem bolmawı kerek. Jon`ishqa o`simligi ıssılıq bolg`an jag`dayda egilgennen baslap 5 7 ku`nnen keyin na`l beredi. Jon`ishqa na`li salıqlıqqa shıdamlı, ha`tte 2-3<sup>0</sup> lıq o`tkinshi suwıqqada qurg`aqshılıqqada to`zimi bekkem. Jon`ishqanı o`simligi qalın` ko`p japıraqlı bolıp, bir gektar jerdegi japırag`ın jıynap jayıp shıg`ar bolg`anda 40-50 gektar, hatte onnanda ko`p jer maydanın qaplap ketedi. O`simlikte rawajlanıw fazaların` o`tiwi, onın` sortına, biologiyalıq o`zgesheligine, agrotexnikalıq ilajlardı iske asırıw usıllarına baylanıslı 124-142 ku`nge shekem sozıladı. Ekinshi jıl g`ı go`ne tu`bir jon`ishqanın` o`sip shıg`ıwı menen gu`llew aralıg`ı 60-70 ku`n, al tuqımı 125-130 ku`nde pisip jetilisedi. Eger, tuqım ushın keyingi oraqtı qaldırsa onda jon`ishqa tuqımı 80-90 ku`nde pisip jetilisedi.

Jon`ishqanı neda`wir erte mu`ddetlerde orıw, onın` ot-jemlik massasının` ko`p ha`m joqarı azıqlıq sapag`a iye bolıwına paydası ko`p ekenligine qaramastan, ulıwma zu`ra`a`tinin` to`menlewine, o`simliktin` a`zzilep qalıwına, aqır g`ı o`niminin` azayıp ketiwine alıp keledi. Paxallar g`awlap o`sip shıg`ıp, paxal baldag`ı bu`rtiginen shaqalawı az mug`darda boladı. Biraq, qubılıs bul jon`ishqanın` pashalap o`siwin ta`miynleydi, sezilerli da`rejede zu`ra`a`tliligin arttıradı. Jon`ishqa topıraqlı jerlerde jaqsı o`sedı. Sonday-aq ol, kebirten`lew jerlerde de o`sip, topıraqtın` shorlanıwın azaytadı. Jer astı izey suwların` joqarı ko`terilip, egislik maydanların`, kebirlenip ketiwinen saqlaydı. Mexanikalıq quramı awır, jer astı suwı jaqın, batbaqlıq payda etiwge beyim jerler-jon`ishqa o`simliginin` o`sip-rawajlanıwı ushın jaramsız. Jon`ishqa o`simliginin` normal

o'sip rawajlanıwı ushın ıssılıq ha'm ıg'allıq ko'p talap etiledi. Biraq, u'zliksiz bastırıp suwg'arıw, jon'ishqanı o'ltirip qoyıwı mu'mkin. Sebebi, jon'ishqa tamırına turaqlı tu'rde hawa barıp turıwı kerek. Jon'ishqa topıraqtın` tolıq ıg'allıg`ınan sa'l az 65-85 % lik mug`darındag`ı ıg'allıq jag`dayında jaqsı o'sip rawajlanadı. Qolaylı jag`dayda o'simliktin` gu'llew da`wiri 25-40 ku`nge, al bir masaq basınan gu'llewi ortasha 8-10 ku`nge dawam etedi.

Jon'ishqa o'simligi shetten shan`lanıwshı gruppag`a kirip, nasekomalar ha'm samal ta'sirinen aralas yamasa ayqaspalı protsesslerge baylanıslı shan`lanadı.

Onın` gu'li –eki jınıslı bolıp, gu'l kese japırag`ınan, gu'l tajınan, atalıg`ınan ha'm analıg`ınan turadı. Jon'ishqa nasekomalardı o`zine tartatug`ın xosh iyisli ashıq ren`li gu'l tajına (gu'l po`pegine) iye. Ha`zirgi da`wirde Qaraqalpaqstanda jon'ishqanın` «Qaraqalpaq-1» ha'm «Xiywa» jergilikli sortları egilmekte.

«Qaraqalpaq-I» sortı Qaraqalpaqstan ilim-izertlew diyxansılıq institutı ta`repinen ekologiyalıq jol menen aling`an. Bul sort Aziya jon'ishqasının` xiywa tuwıslı tu`ri bolıp esaplanadı.

Paxalı, tik o'siwshi, tu`pleniwi jaqsı, paxalının` bası pashalaydı. Japırag`ı ortasha irilikte, ma`yek formalı az tu`kli, japıraqlawı jaqsı (44-48%).

Gu'l g`umsha toplamı-tsilindr formalı, ortasha tıg`ızlıqta, gu'li ashıq sıya ren`li. Sobıg`ı ortasha 2-3 tawlanıp o'sken spiral ta`rizli. Tuqımı bu`yrek sıyaqlı gu'n`girt qon`ır ren`li. Ma`mleketlik sort sınaw uchastkasının` mag`lıwmatı boyınsha ko`k massa zu`ra`a`ti, gektarına-330 tsentner, al qurg`aq paxalının` zu`ra`a`ti-143,8 tsentnerden tuwra keledi.

O'siw da`wiri –egisten birinshi oraqqa deyin 60-62 ku`n, birinshi oraqtan ekinshi oraq aralıg`ı 25-28 ku`n ha'm ba`hargi ko`gerip shıg`ıwınan tuqımının` pisiwine deyin-paxalı jıg`ılmaıdı, mexanizm menen jıynawg`a qolaylı, qurg`aqshılıqqa, suwıqqa to`zimli, sonday-aq, ha`r qıylı keselliklerden zıyanlanıwg`a ha'm nasekomalardıń zaqım keltiriwlerine shıdamlı.

Ko`k massasında 18,3-21,64 % ke deyin proteyn boladı.

Jergilikli «Xiywa» sortı-xiywa tuwısınan bir tu`rine kirip, Aziya jon`ishqasına jatadı. Paxalı tarqalın`qı yarım jıg`ılgh`ish, paxalınan boyı 37-64 sm, juwan emes, tu`pten ko`p pashalap o`sedı. Japırag`ı ortasha enli-do`n`es elips sıyaqlı yamasa do`geregi ma`yek formasındag`ı shen`berge usag`an, astın`g`ı jag`ı tu`kli. Japıraqlawı 35,8-42,2 %, gu`l g`umsha toplamı-kelte tsilindr formalı. Gu`li gu`n`girt sıya ren`li. Tuqımı mayda, 3-4 tawlanıp esilgen spiral sıyaqlı tıg`ız, gu`n`girt qon`ır ren. Ma`mleketlik sort sınaw uchastkasınan alıng`an mag`lıwmat boyınsha ko`k massa zu`ra`a`ti 745 tsentnerden tuwra keledi.

O`siw da`wiri ko`gerip shıqqannan baslap birinshi oraqqa deyin 72-85 ku`n, al tuqımnan tolıq pisiwi 131 ku`n. Paxalınan o`siwi a`stelik penen o`tedi. Suwg`arılmalı zonada jaz boyı 3-4 oraq beredi. Qısqa shıdamlı. Ko`k massasındag`ı protein mug`darı № 14,4-18,5 %.

1930-1941-jılları Qaraqalpaqstan jon`ishqa egisi boyınsha tiykarg`ı zona bolıp, barlıq jer maydanınan 19,5-25,0% tin iyelegen ha`m ha`r jılı 1,7-2,0 mın` tonnag`a deyin jon`ishqa tuqımın jetistirip kelgen. Qaraqalpaqstannan aldın`g`ı xojalıqları hektarınan 3,5-4,5 tsentnerge deyin jon`ishqa tuqımın jetistiredi. Biraq keyingi jılları g`awashag`a hadden tis a`hmiyet berilip, eginlerdi almaslap egiw derlik toqtatılıp jon`ishqashılıq esaptan shıg`ıp qalg`an edi.

Mal otı ushin da, tuqım ushında egiletug`ın jon`ishqa atızlarında topıraqtı tayarlaw, egis mu`ddeti, azıqlandıruw rejimi jalpı birdey bolg`anı menen, tuqım ushin egilgen jon`ishqa o`simligine ta`rbiya beriw bir qansha o`zgesheliklerge iye boladı. Ma`selen, hektardag`ı o`simlik na`linin` qalın`lıg`ı, egiw usılı, tuqım ushin qaldıruw jası ha`m orag`ı, suwg`aruw rejimi, zıyankesler menen gu`resiw ha`m jıynaw protsessleri tuqımnan sapasın ha`m zu`ra`a`tin ko`teriwde u`lken rol tutadı.

Bizin` jag`dayımızda 1 m² maydanda 75-80 o`simlik qalg`anday etip, jalpılamay sewip yamasa qatarlap egiw usılı tuqımnan joqarı zu`ra`a`t alıwg`a mu`mkinshilik beredi, biraq barlıq agrotexnikalıq ilajlar joqarı sapada o`tkeriliw kerek.

Jon`ishqadan joqarı sapalı tuqım alıw ushın onın` qatar arası adayıda 50 sm den qaldırılıp egilgen jag`dayda gektarına-3,75 ts en` joqarı zu`ra`a`ti alındı. A`dette ekinshi jıldan baslap, ta`rbiyalaw jag`dayına, ıg`allıqqa, topıraqtın` hasıldarlıg`ına baylanıslı jon`ishqanın` gektardag`ı tu`p sanı azaya baslaydı, yag`nıy o`tkerilgen ta`jiriybelerde 3-jılı 50-60% g`ana qalın`lıqta boladı. Bunday jon`ishqanı tu`bi qalın` o`sken birinshi jılında ot jemge paydalanıp; tu`p qalın`lıg`ı azayg`an jılları tuqım ushın paydalanıwg`a boladı.

Ha`r qıylı topıraq-klimat zonalarında o`tkerilgen izertlew jumısları ha`m o`ndiris praktikasında da`lillengenindey jon`ishqadan tuqım alıw ushın 2-3 jılğ`ı o`simlikti paydalanıw na`tiyjeli ekeni belgili boldı. Qaraqalpaqstannın` arqa rayonlarında da en` joqarı tuqım zu`ra`a`ti ekinshi ha`m u`shinshi jılğ`ı egisten aling`an. Usınday mag`lıwmat pu`tkil O`zbekstan zonası boyınshada tarqatılıp atır. O`zbekstan ha`m Qaraqalpaqstan jag`dayında, a`sirese 3-jılğ`ı jon`ishqa o`simliginin` qalın`lıg`ı ko`pshilik atızlarda 1 ga maydanda 50-70 dana paqal tu`binen ibarat. Al, tuqımshılıqta bunday qalın`lıq joqarı zu`ra`a`tli jon`ishqa tuqımın jetistiriwge muwapıq ekeni da`lillenbekte.

Tuqımlıq uchastkalardı gu`zden baslap belgilep, ajratıp qoyıw maqsetke muwapıq keledi ha`m ol atızlarda zıyankeslerge qarsı gu`resiw jumısların (fitonomusqa, jon`ishqa pitesine, gallovoy komarik, semeel) gu`zde yamasa erte ba`ha`rde jon`ishqa o`nip shıqpastan burın o`tkeriliwi tiyis. Eki-u`sh jıllıq go`ne tu`bir jon`ishqa atızları 12% li geksaxloran eritpesi menen superfasfattan tiyisli normasın aralastırıp gektarına 20 kg esabınan da`rilep ha`m azıqlandırıp bolg`annan keyin awır tırma menen kesesine, uzınına tırmalanıwı tiyis. Bunday jag`day jon`ishqanın` jaqsı o`sip rawajlanıwın ta`miynlew menen birge, onın` zıyankeslerinin` de keskin azayıwına paydasın tiygizedi.

Al tuqımlıq jon`ishqa g`umsha baylaw da`wirinde gektarına 500-600 litr 1,5% li GXTsG menen yamasa gektarına 500-600 l. normada 40% li fosfamid eritpesinin` 0,15-0,02% li emultsiyasın bu`rkiw kerek.

Tuqım payda etiw da`wirinde bolsa, gektarına 600-700 l normada 1 % li polixlorkamfen poroshoginin` suyuqlıg`ı eki ret, birinshisi tuqım payda bolıp alıng`an da`wirde, ekinshisi onnan 10 ku`nnen keyin bu`rkeledi.

Tuqımlıq jon`ishqanı azıqlandıruw rejimi tuqım zu`ra`a`tin ko`beytiwde de onın` zıyankeslerin azaytıwda da u`lken a`hmiyetke iye. O`tkerilgen ta`jiriybelerdin` juwmag`ına qarag`anda qaraqalpaqstan jag`dayında fosfor, kaliy to`ginleri menen durıs azıqlandırılğ`an jon`ishqa bedesinin` zu`ra`a`ti 30-40 % ke, tuqım zu`ra`a`ti 9,2 %ke ko`beygen.

A`sirese, tuqımlıq jon`ishqanı suwg`arıwg`a a`hmiyet beriliwi kerek. Eger tuqım jon`ishqag`a normadan artıq suw berilse, qaptal shaqaları g`awlap o`sip, miywe shaqaları menen miywe elementlerinin` rawajlanıwı to`menlep ketedi. Al, kem suwg`arılıp ja`ne azıqlıq zat az bolsa, miywe elementi bar paxalları, sobıg`ı azayıp g`umshalaw, gu`llew ha`m pisiw protsessi qısqa waqıt ishinde o`tiwi na`tiyjesinde gu`li to`gilip, tuqımın` sapası to`men bolıwına alıp keledi.

Sonlıqtan o`simlikti suwg`arıw waqtında topıraq-klimat jag`dayları, ba`hargi jawın-shashın mug`darı, jer astı suwların` jaylasıwı qa`ddi so`zsiz esapqa alınıwı lazım. Eger jer astı suwının` jaylasıw qaddi to`mende bolıp, qıs ha`m ba`ha`r ku`nlerinde jawın-shashın az bolsa, tuqım birinshi oraqtan ha`m ekinshi oraqtan alınama, qatıy na`zer jon`ishqa birinshi oraqtan burın suwg`arılıwı kerek.

Qaraqalpaqstan ilim-izertlew diyxansılıq institutı alımları ta`repinen o`tkerilgen ta`jiriybeler sonı ko`rsetedi, eger jer astı suwının` qaddi teren`de, su`rim qatlamı shegelen` bolıp kelgen atızlardı, o`simliklerdin` o`siw da`wirinde suwg`arıw, jon`ishqa tuqımının` zu`ra`a`tliligin arttıratug`ınlıg`ı anıqlandı. Al, izey suwı teren`de bolg`anı menen atız maydanları awır topıraqlı bolsa, suwg`arıw norması ham sanın azaytıw kerek. Tuqımlıq jon`ishqag`a o`siw da`wirindegi birinshi suw g`umshalaw aldınan, al, en` son`g`ı suwg`arıw g`umshalaw waqtında yamasa gu`llew da`wirinin` baslang`an gezlerinde berilgeni jaqsı.

Eger tuqımg`a ekinshi oraqqa qoyılğ`an atızlar qaldırılatusın bolsa, onda jon`ishqa o`simligi jalpılay gu`llew da`wirinde suwg`arılğ`anı maqul. Tuqımın`

sapası ha'm onın` zu`ra`a`tine vegetativ ma`wsimindegi hawa sharayatların esapqa ala otırıp izertlewshiler tukım ushın birinshi oraqtı yamasa ekinshi oraqtı, qaldırılısada boladı dep usınıs bildiredi.

Qaraqalpaqstan jag`dayında tuqımg`a birinshi oraqtı qaldırıw paydalı boladı. Ig`allı jılları, birinshi oraqtı bede alıw ushın, keyingi oraqtı tuqımg`a qaldırğ`an abzal. Tuqımlıq jon`ıshqa osimliktin` sobıg`ı 70-80 % gu`n`girt tartqanda ha'm tuqımnın` sarg`ayıp, qatayg`an waqtında ha`r atız zu`ra`a`ti o`z aldına bo`leklengen usılda dara-dara jıynap alınsa tuqım zaya bolmaydı, bedesinin` shıg`ımı jaqsı boladı. Orıw da`stelew keshte ha'm erte azanda o`tkerilip: tu`yeklew ku`ndiz o`tkeriliwi lazım. Saqlanatug`ın egislik tuqımnın` ig`allıg`ı 13-14% do`gereginde bolıwı sha`rt.

Eger ig`allıq artıq bolsa, quyashlamada yamasa bastırma astına keptiriw kerek. Ku`nge keptirilse, tuqımnın` pisip jetilisiwi jaqsılanadı.

Saqlang`anda qaltalarg`a salıp, qurg`aq jayda, taqtay sıpá u`stine adam ju`retug`ın 0,5-1 m ashıq aralıq qaldırıp taqlap qoyıw kerek.

Jon`ıshqa tuqımının` zu`ra`a`tin kobeytip ha'm onın` sapasın jaqsılap, kolxozg`a ha'm sovxoz o`ndirisine rayonlastırılğ`an jergilikli ha'm selektsiyalıq taza sortlardı engiziw maqsetinde, joqarı chortlı egislik tuqımlardı ko`plep jetistiriwge erisiwimiz kerek.

Jon`ıshqa tuqımgershiligi to`rt zvenolı sxemadan-sort saqlaw, aldın ala ko`beytiw pitomnikleri ha'mde superelita, elitadan turadı. Ooriginator ilim-izertlew mekemesinin` seleksionerler ta`repinen sort saqlaw pitomniginde egip o`siriw ushın,-super elita ha'm elita kerek dep tabılsa elita tuqımdı saralap alıw jumısları ju`rgizilip, arnawlı tuqımgershilik xojalıqların elita tuqımı menen ta`miynlep otıradı.

Tuqımgershilik xojalıqlarında birinshi ha'm onnan keyingi reproduktsiyalı tuqımlar o`siriledi. Sort saqlaw pitomniginde egip o`siriw ushın super elita ha'm elita eginlerinin` ha`r qıylı jastag`ı tuqımnán u`lgiler alınadı. Bul pitomnikler ken` qatarlı usılda egilip, odan aldın`g`ı tuqımlar aralastırıladı ha'm aldın ala ko`beytiw

pitomniginde egiledi. Onnan superelita tuqıngershiligin` wazıypası sort almasıw ha`m sort jan`alaw sistemasın iske asırıwdan, ma`mleketlik qamsızlandırıw tuqım fondın du`ziw planı tiykarında, joqarı sapalı tuqım menen barlıq tuqıngershilik xojalıqların ta`miynlewden ibarat bolıp tabıladı. Eger sort jalpılamay tan`law jolı menen shıg`arılğ`an bolsa, pitomniklerde de jalpılamay vegetativ tan`law ju`rgiziledi, egislikten praktikalıq sıpatlarg`a iye gu`lla`n nasaz o`simlikler alıp taslanadı, eger, ol sort aralıq shan`landırıw arqalı shıg`arılğ`an bolsa pitomniklerde jalpılamay unamlı (pozitiv) tan`law ju`rgiziledi yag`nıy en` jaqsı praktikalıq sıpatlarg`a iye tu`plerdi jıynap aladı. Sort saqlaw bolsa, sortlar arası ajratıp (izolyatsiyalap) qoyılıwı kerek. Bul pitomniklerge egilgen o`simlikten bir neshe jıl paydalanıwg`a boladı degen so`z. bir atızda o`sirilip, biraq onın` tuqımı bir neshe jıl qatarına egip paydalanılsa da ol bir reproduktsiyalı tuqım bolıp esaplanadı.

Sort penen sort aralıg`ındag`ı qashıqlıq (izolyatsiya) 200 m den kem bolmawı tiyis.

Ha`r jılı tuqımlıq egisliklerde aprobatsiya ju`rgizilip, onda sortlıq ha`m tuqımlıq baqlaw jumısları ju`rgiziledi. Aprobatsiya, tuqıngershilik egisliklerindegi ha`r bir o`simliktin` jalpılamay gu`llew da`wirinde 50 ga jer maydanındag`ı 50 tochkasının` ha`r birinen 200 dana o`simlik na`li (pisik da`nli paxal-bawlıq) alınıp, son` ol analizlenedi, tuqımın` egiske jaramlılıg`ı yamasa jaramsızlıg`ı haqqında akt du`ziledi.

Akt boyınsha tuqımın` sapası 1 ha`m 2 klassqa bo`linedi. 1-klass tuqım kelesi jılı egiw ushın tuqımshılıq xojalıg`ına jiberiledi, al 2 klass tuqım bedede alıw maqsetinde paydalanıw ushın xojalıqlarg`a taratıladı.

2. IZERTLEWLERDI O`TKERIW JAG`DAYLARI, SXEMASI HA`M METODIKASI

2.1. Respublikanın` topıraq klimat jag`dayları


Ha`r bir fermer diyqan xojalıg`ı basshıları ha`m olarda isleytug`ın qanıgeler o`zleri jumıs alıp barıp atırg`an aymaqtın` ıqlım ha`m topıraq sharayatları haqqında jeterli tu`siniklerge iye bolıwları kerek boladı. Qaraqalpaqstan O`zbekstan Respublikasının` arqa-batısında tegislik aymaqta A`miwda`ryanın` to`mengi quyar bo`liminde jaylasqan bolıp, onın` ulıwma jer maydanı 166,6 mın` kvadrat kilometrdi (1.01. 2001-jıl) quraydı. Awıl xojalıg`ı ushın jaramlı bolg`an jer maydanları A`miwda`rya deltasında ornalasqan bolıp, olar ıqlım sharayatı boyınsha sho`listan zonanın` arqa aymaqlarına kiredi. Qaraqalpaqstannın` ıqlımı keskin kontinental ha`m ha`dden tısqarı qurg`aqshılıg`ı menen xarakterlenedi. Jaz ayları og`ada ıssı, qısı suwıq bolıp keledi.

Respublika aymag`ının` ıqlım sharayatları ha`r ta`repleme u`yrenilgen. Professor J. Matmuratov (1963-j., 1987-j.) respublika aymag`ın ıqlım sharayatına qaray to`rt zonag`a bo`ledi: qubla (To`rtku`l, Ellikqala, Beruniy ha`m A`miwda`rya rayonları); oraylıq (Xojeli, Shomanay, kegeyli ha`m No`kis rayonları) ha`m ten`iz jag`alawı (Bozataw ha`m Moynaq rayonları). Bul zonalar hawa rayı, topırag`ının` quramı, jer astı suwlarının` jaylasıw qaddi ha`m ag`ın suw menen ta`miynleniwi boyınsha birdey jag`dayda emes.

Awıl xojalıg`ı daqıllarının` o`sip-rawajlanıwında ıssılıq rejimi sheshiwshi faktorlardan bolıp esaplanadı. Aymaqta toplanatug`ın ıssılıq qorı awıl xojalıg`ı daqıllarının` ko`plegen tu`rleri ha`m olardıń sortları o`nimlerinin` tolıq pisip jetilisiwin ta`miynley aladı. Qubla rayonlarda hawa rayı basqa zonalarg`a qarag`anda jıllıraq bolıp keledi. Mag`lıwmatlarg`a qarag`anda  $+10^0\text{S}$  temperaturadan joqarı bolg`an ortasha jıllıq ıssılıq qorı: qubla zonada -4396^0S ; oraylıq zonada -4064^0S ; arqa zonada -3839^0S boladı. Daqıllardıń o`sip rawajlanıwı da`wirinde alatug`ın na`tiyjeli temperaturanın` summası boyınsha joqarıdag`ı zonalar bir-birinen pariқ qıladı (1-su`wret).

Aймаqta o`sirilip atirg`an miywe, baw-baqsha ha`m palız eginlerinin` tovarlıq o`nimlerinin` ha`m miywelerinin` tolıq pisip jetilisiwi ushın kerekli bolg`an paydalı temperaturanın` summası ortasha 700-2000⁰S a`tirapında boladı.

Qaraqalpaqstannın` ıqlım sharayatının` ja`ne bir o`zgesheligi basqa aymaqlarg`a salıstırğ`anda ba`har mwsimi kesh baslanıp, ol qısqa waqıt ishinde o`tedi. Ba`ha`rdin` da`slepki ayları salqın keledi.



1-su`wret. Daqıllardın` o`sip rawajlanıwı da`wirinde alatug`ın na`tiyjeli temperaturanın` summası

Sonlıqtan ashıq maydanlarda daqıllar ku`n qızg`annan son` aprel ayının` ishinde egile basladı (1-keste). Mısalı: oraylıq zona (No`kis qalası) aymaqlarında mart ayında hawanın` ortasha temperaturası +4,1⁰S boladı, aprelde bolsa ol 13,9⁰S g`a shekem ko`teriledi. Hawanın` ortasha temperaturası jaz ayları 24-28<sup>0</sup>S, al gu`z ma`wsiminin` sentyabr ayında 19,4⁰S ha`m oktyabr ayında 10,7<sup>0</sup>S a`tirapında boladı.

1-keste

**Hawanın` ortasha ko`p jıllıq aylıq temperaturası, °S mag`lıwmat
boyınsha**

Aymaqlar	Aylar											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
U`rgenish	- 3,4	- 1,6	5,6	14,8	21,9	26,9	28,7	25,7	19,4	11,3	4,9	- 0,5
No`kis	- 4,9	- 3,5	4,1	13,9	21,3	26,4	28,7	25,9	19,4	10,7	4,1	- 1,7
Qon`irat	- 5,5	- 4,4	2,7	12,6	20,3	25,2	27,4	24,8	18,4	10,0	3,5	- 2,1
Shımbay	- 5,5	- 4,4	2,9	13,0	20,4	25,3	27,4	24,6	18,2	9,8	3,3	- 2,3
Taxtako`pir	- 4,8	- 3,6	2,9	13,5	20,2	26,5	27,9	25,4	14,4	10,8	2,7	- 2,0
Moynaq	- 5,6	- 5,9	0,6	10,4	18,7	24,4	27,3	25,0	18,8	10,1	3,4	- 2,1

Baw-baqsha ha`m palız o`simlikleri o`zlerinin` o`sip ha`m rawajlanıwı da`wirinin` basqışlarında hawadan ıssılıq mug`darın tu`rlishe aladı. Olardın` ıssılıqqa bolg`an talapshan`lıg`ı ha`m o`siw da`wirinde bolatug`ın pa`s ja`ne de joqarı temperaturalardın` shegaralıq ko`rsetkishi 2-kestede berilgen.

Aymaqtag`ı jıllıq jawın-shashınlardın` mug`darı ortasha 80-110 mm bolıp, onın` tiykarg`ı massası qısqı ha`m ba`ha`rgi ma`wsimde boladı (2-keste).

2-keste.

**Aymaqtag`ı atmosferalıq jawın-shashınnın` ko`p jıllıq mag`lıwmat boyınsha
ortasha aylıq mug`darı, mm.**

Aymaqlar	Aylar											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
U`rgenish	7,9	7,2	17,1	16,3	9,6	3,4	2,0	0,8	1,5	5,6	7,6	12,0
No`kis	10,1	8,7	16,4	19,3	12,2	3,9	3,5	2,1	3,0	8,7	9,4	13,6
Qon`ırat	8,7	8,0	18,8	18,1	13,7	11,0	4,7	2,0	2,1	8,1	11,1	10,5
Shımbay	12,7	10,1	18,9	21,5	13,7	4,2	3,9	2,6	3,2	9,6	10,4	13,3
Taxtako`pir	11,8	8,6	17,9	13,4	20,0	3,9	1,4	2,7	3,6	5,2	15,4	15,8
Moynaq	11,0	7,9	18,1	20,0	7,7	8,0	4,8	4,5	3,9	12,4	18,0	12,2

Diyqansılıqta paydalanılatug`ın suwlar da`ryanın` ag`ın suwı esabınan boladı. Son`g`ı da`wirlerde ayırım jılları da`rya suwının` kemeyiwine baylanıslı aymaqtı suw tam-tarısılıg`ı payda bolmaqta. Qaraqalpaqstan Respublikası aymag`ında ko`pshilik jag`dayda hawa rayı ashıq boladı. Bultlı ku`nlerdin` ko`pshilik mug`darı qıs mawsimine (dekabr-fevral) tuwra keledi. Quıyash radiatsiyasınıń jıl dawamındag`ı mug`darı 168,9 kkal/kv sm (Taxiyatash ). Aymaq reline samal ag`ımı ha`m onın` tezligi aytarlıqtay ta`sirin tiygizedi. Samaldın` tezliginin` ortasha jıllıq ko`rsetkishi 2,5-4,6 m/sek.

Respublikanın` suwg`arılıp egiletugın jerleri tiykarınan otlaqlı, otlaqlı-taqır, otlaqlı-sho`p, otlaqlı-allyuvial topıraqlar tiplerinen turadı. Jer qorı esabındag`ı 500,1mın` gektar maydanlar suwg`arılıatug`ın jerler bolıp, sonın` 419,4 mın` gektarı su`rilip, daqıllar egiletug`ın maydanlardı quraydı. Son`g`ı jılları aymaqtın` ekologiyasında ju`z berip atırgan unamsız jag`daylar ta`sirinde egislik maydanlardın` o`nimdarlıg`ı pa`seyip barmaqta. Ko`plegen egislik maydanlardın` topıraqların` quramında gumustın` mug`darı kem (0,41-0,80%) ko`rsetkishlerde bolıp qalmaqtı. U.E. Ismaylov (2004-j) egislik maydanlardın` topıraqların` o`nimdarlıg`ın arttırıw`a qaratıl`an ilimiy-izertlew jumıslarında ko`pshilik rayonlarda egislik jerlerdin` quramındag`ı shirindi zatının`, ha`reketshen` fosfor

ha`m o`zgermeli kaliydin` mug`darinin` kem-kemnen pa`seyip baratirganlig`in ko`rsetiya menen birge, topiraq o`nimdarlig`in arttiriwda daqillardi almaslap egiw din` a`xmiyeti haqqında bahalı mag`lıwmatlar beredi. Aymaqtin` topiraqları ortasha 41 ball bonitetke ten` bolıp, ol O`zbekstan Respublikası boyınsha ortasha ko`rsetkishten 14 ballg`a kem. Sonday-aq, aymaqtin` ayırım orınlarda daqıllarının` vegetatsiyalıq da`wirinde jer astı suwları qa`ddinin` tiyisli ko`rsetkishten artıq ko`teriliw jag`dayları da ushırasadı. Egislik maydanlardın` meliorativlik awhalının` to`menlewi na`tiyjesinde topiraq quramında zıyanlı duzlardın` mug`darının` artıp baratug`ınılg`ı belgili. Shor baskan maydanlarda daqıllardi egip, olardan o`nim jetistiriw u`lken qıyınshılıqtı payda etpekte. Mag`lıwmatlarg`a qarag`anda (KKGME, 2005-j) suwg`arılıp egiletug`ın jer maydanlarının` (500,1 min` ga) ko`pshilik bo`legin shor basqan. Sonnan:

- shorlanbag`an 103,17 min` ga (21 %)
- kem shorlang`an 169,02 min`. Ga (34%)
- ortasha shorlang`an 171,36 min` ga (34%)
- ku`shli ha`m og`ada ku`shli shorlang`an 56,6 min`. ga (11%)

Aymaqtin` suwg`arılıp egiletug`ın jerleri shorlanıw xarakteri boyınsha xlorid sulfatlı ha`m sulfat-xloridli tipte boladı. (3-keste).

3-keste

Topiraqtin` shorlanıw da`rejesi boyınsha xarakteristikası (B.J. Azimov, X.Ch. Buriev, B.B. Azimov)

Topiraq	Xlorid-sulfat tipinde shorlang`an jerler		Sulfat-xlorid tipinde shorlang`an jerler	
	Qurg`aq qaldıq %	SO <sub>4</sub> %	Qurg`aq qaldıq %	CL, %
Shorlanbag`an	0,3	0,01	0,2	0,01
Kem shorlang`an	0,3-1,0	0,01	0,5	0,05
Ortasha shorlang`an	1,0-2,0	0,1	1,0	0,1
Ku`shli shorlang`an	2,0-3,0	0,1	1,0	0,1
Shorlıq	3,0	0,1	2,0	0,1

Aymaqtin` iqlim ha`m agroekologiyaliq sharayatlarina qaray awil xojalig`i eginlerin jayg`astiriv. Erte da`wirlerde respublika aymag`inda awil xojalig`i daqillarının` ko`plegen tu`rleri, egilip kelinmekte. Son`g`i jillari regionda ta`biyiy ortalıqtin` buzılıwı na`tiyjesinde eginlerdi o`sirip, olardıń o`nimin jetistiririwde tu`rli qıyınshılıqlar payda boldı. Atap aytqanda, Aral ten`izinin` suwının` qurıwı na`tiyjesinde aymaqtin` iqlim sharayatında unamsız o`zgerisler payda boldı. Mag`lıwmatlarg`a qarag`anda Aral ten`izinin` qurg`ap qalg`an ultaninan qum aralas ha`r qıylı duzlar aralasqan shan`lar samal, quynlap esken dawıllar menen atmosferag`a ko`terilip, olar ko`plegen egislik maydanlardı pataslap kelmekte. Bunday dawıllı ku`nler jılına 90 ku`nge shekem boladı. Ulıwma alg`anda aymaqta sho`listanlıqqa aylanıw ha`m jerlerdin` degradatsiyag`a ushırawı protsessinin` jıldan-jılǵa ku`sheyip baratırǵanlıǵı sezilerli da`rejede bolıp qalmaqta. Asirese, jıldan-jılǵa shiyelenisip baratırǵan suw tam-tarısıǵı ja`nede egislik jerlerinin` shorlanıwının` ku`sheyiw keskin to`menlewine alıp keldi. Mısalı, son`g`i jillari paxtanın` zu`ra`tliligi gektarınan 30-34 tsentnerden 14-24 tsentnerge kemeydi («Wzbekistonning ekologik sharhi», 2008 y).

Joqarıda aytilg`anınday son`g`i jillarda aymaqtin` iqlim ha`m agroekologiyaliq sharayatında payda bolg`an unamsız o`zgerislerdi esapqa alg`an halda awil xojalig`i daqılların o`siriw kerek boladı. Sebebi, bul sharayatta ayırım egin tu`rlerin ha`m olardıń sortların o`siriwde u`lken qıyınshılıqlar ushıraspaqta. Sonlıqtan daqıllardı jaylastırıwda usı sharayatqa o`siriw qolaylı bolg`an egin tu`rlerin ha`m olardıń sortlarınan paydalanıw kerek boladı. (4-keste).

**Aymaqtın` ıqlım ha`m agroekologiyalıq sharayatlarına qaray egislikte
paydalanıwg`a bolatug`ın daqıllardın` tu`rleri.**

	Daqıllar	Egislikte paydalanıwg`a bolatug`ın egin tu`rlerine qısqasha sıpatlama
1	Texnikalıq eginler	Topıraqtın` shorlanıwına shıdamlı bolg`an erte ha`m ortapiser g`awasha sortları
	Paxta	
2	G`a`lle eginleri	Suwıqqa ha`m topıraqtın` shorlanıwına shıdamlı bolg`an erte ha`m ortapiser sortları
	1. Gu`zlik daqıllar (biyday, arpa, sulı, qara biyday)	
	2. Jazlıq daqıllar (biyday, arpa, sulı, qara biyday)	Topıraqtın` shorlanıwına ha`m suw tam- tarısıg`ına shıdamlı bolg`an erte ha`m ortapiser sortları
	3. Ma`kke, ju`weri ha`m sobıqlı da`nli eginler	Topıraqtın` shorlanıwına ha`m suw tam- tarısıg`ına shıdamlı bolg`an erte ha`m ortapiser sortları
	4. Salı	erte ha`m ortapiser zu`ra`a`tli sortları
3	Maylı eginler	Topıraqtın` shorlanıwına ha`m suw tam- tarısıg`ına shıdamlı bolg`an erte ha`m ortapiser sortları
	(ayg`abagar, maxsar, gu`nji)	
4	Ot-jem eginleri	Topıraqtın` shorlanıwına shıdamlı bolg`an erte ha`m ortapiser sortları
	(jon`ıshqa, sudan sho`bi, espartset, ot-jem la`blebisi)	
5	Baw-baqsha daqılları	Topıraqtın` shorlanıwına shıdamlı bolg`an geterozisli, gibridli ha`m jergilikli zu`ra`a`tli sortlar
	(kartoshka, kapusta, pomidor, qıyar, piyaz, la`blebi, geshir ha`m tag`ıda basqa)	
6	Palız daqılları	Topıraq shorlanıwına shıdamlı bolg`an geterozisli, gibridli ha`m jergilikli zu`ra`a`tli sortlar
	(qawın, g`arbız ha`m asqabaqlar)	

Respublikada ha`zirgi da`wirde aymaqtın` ıqlım ha`m topıraq sharayatın
ha`mde ag`ın suw menen ta`miynlew jag`dayların esapqa alg`an halda awıl
xojalıg`ı o`ndirisin sho`lkemlestiriwge ha`m egislik maydanlardın` o`nimdarlıg`ın
arttırıwg`a bag`darlang`an agrotexnologiyalıq jumislardı alıp barıwg`a u`lken itibar
qaratılğ`an.

2.2. Ta'jiriybe jumislarının' sxeması ha'm metodikası

Izertlew jumislarında kemshiliklerge jol qoyıw o'z gezeginde alınatug'ın o'zine sonday-aq onın' sapasına ta'sirin tiygizedi. Ta'jiriybe atızının' burınnan paxta egilip kiyatırğ'an ortasha shorlang'an egislik bolıp ta'jiriybe ushın tan'lap alıng'annan son' topıraq betindegi oyılı biyiklik tegislenip shıqqan son' suwg'arıw texnikasın endiriw bir qansha an'satlastı, suwg'arıw o'simlik ushın zıyanlı duzlardı juwıw an'satlastı. Ta'jiriybe atızı gu'z ayına gektarına 3500-4000 m³ mug'darında duzların shayıw ushın suwg'arıldı.

Jon'ishqa o'simligin intensiv o'sip, onnan mol zu'ra'a't alıw ushın topıraq sostavındag'ı o'simlik ushın zıyanlı duzlardı azaytıw kerek ekenligi burın o'tkerilgen klimat izertlewlerden ma'lim boldı. Bul boyınsha Qaraqalpaqstan Respublikasının' awıl xojalıg'ında jon'ishqa o'simliginin' suwg'a bolg'an talabı onın' topıraqtın' meliorativ awhalına ta'sirin keyingi jıllarda dushshı suw qorlarının' kem-kemnen kemeyip barıwı menen bir qatarda Aral ten'izinin' suwının' keskin kemeyiwi sebebinen egislik maydanlarg'a samal menen ten'izdin' qurg'ap qalg'an maydanlarınan ko'terilgen o'simlik ushın zıyanlı duzlardın' kelip egislik maydanlardın' topıraqların shorlandırıp meliorativ awhalın to'menletpekte. Na'tiyjede awıl xojalıq eginlerinen alınatug'ın o'nimlerdin' o'nimi ha'm sapası pa'seyip barmaqta. Sonlıqtan topıraqtın' meliorativ awhalın jaqsılap barıw awıl xojalıg'ında ma'deniy eginlerden alınatug'ın o'nimlerdin' arttırıw suwg'a bolg'an talabın onın' topıraqtın' meliorativ ta'sirin ilimiy tu'rde izertlew ha'zirgi waqıtta tiykarg'ı wazıypa bolıp qalmaqta.

2-jılı jon'ishqa o'simliginin' suwg'a bolg'an talabın yag'nıy topıraq quramındag'ı o'simlikler ushın zıyanlı duzlarg'a, topıraqtın' meliorativ awhalına ta'sirin u'yreniw ushın ilimiy izertlewler 5-kestedegi dala ta'jiriybesi sxeması boyınsha alıp barılğ'an.

Izertlew jumısı sxeması

Variant	Topıraq ıg`allıg`ı %
1	70
2	75
3	80

Dala ta`jiriybesi 3-variant 4-qaytalamadan bolıp ta`jiriybe variantları 1-bag`anada jaylastırıldı. Ilim izertlew alıp barılğ`an jer eskiden egilip kiyatırğ`an 0,5 ga bolıp ulıwma ta`jiriybe barısında esapqa alınatug`ın jer maydan 470 m³ boldı.

Ta`jiriybe ushın egilgen jon`ıshqanın` burınnan xojalıqlarda egilip kiyatırğ`an «Xiva» tolıq egildi. Ta`jiriybe ushın ajratılğ`an jerdin` izey suwdın` qa`ddi jon`ıshqa egilmesten aldın 1,8-21 bolıp jon`ıshqa o`simligi o`sip rawajlanıp na`llerdi tegis saqlap qalıw ushın barlıq agrotexnikalıq jumıslar xojalıqlarda alıp barılıp isler alıp barıldı. Ta`jiriybe atızına mineral to`ginlerden fosfor 200 kg, azot 150kg ha`m kaliy 50 kg berilip birinshi fosfor menen kaliy tolıq mug`darı swrim menen berildi. 2-jılı jon`ıshqa ko`gerip shıg`ıw aldınan gektarına 50 kg azot, 100 kg fosfor shirigen da`ris penen birge aralastırıp berildi ha`m go`ne tu`bir jon`ıshqa variantlardın` barlıg`ıda tırmalanıp shıg`ıldı.

Ta`jiriybe ushın gektarına jon`ıshqadan ortasha 20 kg, arıdan 40 kg egildi. Izertlew barısında talap etilgen suwdı waqtında suwg`arıw ilimiy izertlew metodikasına sa`ykes o`lshep berildi. Dala ta`jiriybesi barısında ilim izertlew, baqlawlar, analizler O`zPIII metodikası boyınsha o`tkerildi, ol boyınsha to`mendegidey baqlawlar ju`rgizildi.

Ta`jiriybe baslamastan aldın ta`jiriybe atızının` topırag`ının` mexanikalıq quramı pipetka menen geksifosfat natriy menen N.A.Kachinskiy klassifikatsiyası ja`rdeminde bahalanadı.

Ta`jiriybe atzının` suw-fizikalıq qa`siyetin jon`ishqa egilmesten aldın ha`m ta`jiriybenin` 2-jıldan son` jon`ishqanın` suwg`arıw rejimnin` ta`siri variantlar boınsha anıqlap barıldı.

Topıraqtın` tolıq suw sıyımlılıg`ı (NV) topıraqtı (2x2) izey suwg`a deyingi, suwg`a toyındırıw jolı menen anıqlandı. Topıraq ıg`allıg`ı ha`r bir 10 sm teren`likte anıqlanıp barıldı.

Topıraq salıstırma salmag`ı vegetatsiya ha`m vegetatsiya aqırında piknometr metodı menen anıqlanadı.

Topıraqtın` ko`lem massası ta`jiriybe atızında qudıq qazıw jolı menen ha`r bir 10 sm izey suwg`a deyin. Jon`ishqanın` vegetatsiya da`wirinin` bası ha`m aqırında anıqlandı.

Ta`jiriybe atızının` duz rejimin anıqlaw ta`jiriybe atızı shayıp suwg`arg`annan keyin variantlar boyınsha 2-4 qaytalamalarda ha`r birinen topıraq u`lgisin alıp suwg`arıw rejimine baylanıslı olardıń topıraqtın` meliorativ awhalına ta`sirin u`yreniw ushın topıraq quramındag`ı HCO_3 , Cl, SO_4 , Ca, Mg, Na duzlarınin` shamaları vegetatsiya da`wirinin` bası ha`m aqırında anıqlandı.

Ta`jiriybe barısında suwg`arıw rejimine usı topıraq quramındag`ı duzg`a baylanıslı jon`ishqa o`simliginin` tu`p sanlarınin` saqlanıwı, o`sip rawajlanıwı, shaqalar sanı, qaptal shaqalar ha`r varianta 5-tochkadan 1 m<sup>2</sup> jerden vegetatsiya da`wirinin` basında ha`m aqırında anıqlandı.

Ta`jiriybe barısında suwg`arıw rejiminin` topıraqtın` meliorativ awhalına ta`siri u`yreniw menen birge jon`ishqa o`simliginin` zu`ra`a`tligine ta`siri anıqlanıp barıldı.

Jon`ishqa ha`m basqada qosıp egilgen ma`deniy eginlerdin` bir tegis ko`gerip ha`m o`sip rawajalanıwı ushın onnan joqarı zu`ra`a`t jetistiriwde tiykarg`ı faktor hawa rayı bolıp esaplanadı.

Ta`jiriybe o`tkerilgen meterologiyalıq jag`daylar boyınsha mag`lıwmatlar alıp turıw ushın bizin` dala ta`jiriybesin alıp barg`an jerge jaqın Respublikanın`

meteorologiya stantsiyasının` mag`lıwmatlarınan paydalanıp ilimiy izertlewler alıp barıldı.

Dala ta`jiriybesin alıp barg`an birinshi jılı hawanın` temperaturası aprel ayında  $+13,4^0\text{S}$  bolıp, jon`ıshqa ha`m og`an qosıp egiletug`ın eginlerdi egiwge qolaylı temperatura bolg`an bolsa, bul ko`rsetkish ko`p jıllıq hawa temperaturasına salıstırg`anda 2011-jılı  $+16^0\text{S}$  joqarı bolg`anlıg`ı, aprel ayı awıl xojalıq daqılların egiwge qansha qolaylı bolg`anlıg`ınan derek beredi. Jon`ıshqanın` vegetatsiyalıq da`wirinde o`sip rawajlanıw ushın hawa temperaturası bir qansha qolaylı boldı. Ulıwma jon`ıshqanın` vegetatsiyalıq da`wirinde ortasha hawa temperaturası aprel-noyabr aylarının` ishinde  $20,8^0\text{S}$  bolg`an bolsa yag`nıy temperaturanın` o`zgeriwi bul aylarda  $13,4-28,7^0\text{S}$  deyin ko`terildi. Bul aylardag`ı hawa temperaturasına ko`p jıllıq hawa temperaturasına salıstırg`anımızda ortasha vegetatsiya da`wirinde $18,9^0\text{S}$ qurag`an bolsa, 2011-jılı  $1,9^0\text{S}$  hawa temperaturası ko`rsetkishi joqarı boladı.

Al jon`ıshqanın` ekinshi jılı ushın 2011-jılı hawa temperaturası aprel ayında jon`ıshqa o`simliginin` o`sip rawajlanıwı ushın qolaylı bolıp ulıwma vegetatsiya da`wirinde aprel-noyabr aylarında hawa temperaturası  $11,8-27,0^0\text{S}$  o`skenligi ma`lim bolıp, bul ortasha vegetatsiya da`wirinde $21,0^0\text{S}$ quradı.

Bul temperatura jon`ıshqa o`simliginin` o`sip rawajlanıwı ushın qolaylı boladı. Hawa temperatura menen bir qatarda jon`ıshqa ha`m basqa qosıp egilgen eginlerdin` jaqsı o`sip rawajlanıwı ushın hawanın` salıstırma ıg`allıg`ı da o`z ta`sirin tiygizedi bul jag`daydı baqlag`anımızda jon`ıshqanın` birinshi 2010-jılı aprel ayında hawanın` salıstırma ıg`allıg`ı ortasha 52% qurag`an bolsa bul ko`rsetkish vegetatsiya da`wirinde 52-66% deyin o`skenligin, ortasha aprel-noyabr ayları ushın hawanın` salıstırma ıg`allıg`ı 57% qurag`anlıg`ı metostantsiya mag`lıwmatlarınan ma`lim boldı. Bunı ko`p jıllıq hawanın` salıstırma ıg`allıg`ına salıstırg`anımızda aprel ayında 7% kem bolg`anlıg`ı, al aprel-noyabr ayları boyınsha 2% hawanın` salıstırma ıg`allıq kem bolg`anlıg`ı ma`lim boldı.

3. IZERTLEW NA'TIYJELERI

3.1. Jon'ishqa tuqimgershiligi tiykarları

Qaraqalpaqstanda jaqıng`a shekem jon`ishqa tuqımın tayarlaw xojalıqlarının jumısı jaqsı jolg`a qoyılğ`an bolıp, qaraqalpaq jon`ishqasının` tuqımı d6nya ju`zinin` ko`plegen ellerinde satılatug`ın edi. Son`g`ı jılları jon`ishqa bedesin ha`m tuxımın jetistiriw jumıları a`dewir pa`sen`lep qaldı.

O`zbekstan ha`m Qaraqalpaqstan Respublikası jon`ishqashılıq xojalıg`ın qayta tiklew boyınsha arnawlı qararlarınan keyin xojalıqlarda bul taraw qaytadan qolg`a alınıp, bir qatar xojalıqlar jaqsı ko`rsetkishlerge eristi. Biraq, awhal ha`mme jerde birdey emes.

Sonlıqtan-da, jon`ishqashılıq xojalıqları egislik sapası jaqsı joqarı sortlı jon`ishqa tuqımların jetistiriw ushın ilimiy mekemeler ta`repinen islenip shıg`ılğ`an sxemada to`mendegi ilajlardı iske asırıwları tiyis.

Birinshi etap - jon`ishqanın` superelita ha`mm elita tuqımın tayarlaw. Topıraq jag`dayı ha`r qıylı bolğ`an joqarı z u`ra`a`tli uchastkalardan zıyanlı ja`nlik ha`m kesellikler menen zıyanlanbag`an, jaqsı rawajlang`an t6plerdi tan`lap, olardan shıqqan tuqımdı aralastırıp, bir uchastkag`a ekkennen keyin aling`an tuqım superelita dep atalıp, al superelitani egiwden aling`an tuqım elita delinedi. Superelita ha`m elita tuqımların tayarlaw ilimiy mekemelerde o`tkeriliwi tiyis bolıp, bul wazıypa Qaraqalpaqstan diyxanshılıq ilim-izertlew institutına j6klengen.

Ekinshi etap - jon`ishqa tuqımının` birinshi reproduktsiyasın tayarlaw. Respublikanın` jon`ishqashılıq xojalıqlarına ilimiy mekemeler ta`repinen tayarlang`an elita tuqımın engiziw jolı menen birinshi reproduktsiya tayarlanıladı.

**U`shinshi etap** - reproduktsiya tuqımshılıq xojalıqları o`ndirgen birinshi reproduktsiyadan ekinshi reproduktsiya tayarlanıp, usı tuqım menen barlıq xojalıqlar ta`miynlengen. Usınday usıl menen tayarlang`an jon`ishqa tuqımı may tuqımg`a qarag`anda ko`p zu`ra`a`t beretug`ın joqarı sapalı egislik a`hmiyetke iye boladı.

Tuqım tayarlaw ushın tiykarınan eki jıllıq yamasa ko`p jıllıq jon`ıshqalardan paydalanıladı.

Ken` qatarlı egiwdin` ziyanı haqqında. Qaraqalpaqstan jag`dayında tuqım æîn`ûøqàdan joqarı zu`ra`a`t alıw ushın bolıwı sha`rt:

1. O`simliktin` kun nurı menen tolıq jaqtılanıwın, jaqsı azıqlanıwın, shan`lawshı nasekomalardın` jon`ıshqa gu`line erkin qona alıwın ta`miyin etiwshi tu`p sanına iye na`ldin` bolıwı.

2. Gu`llew, tuqım payda bolıw da`wirinde jon`ıshqa nın` ko`birek o`sip ketip, jatıp qalıwın boldırmaytug`ın suw rejimi.

3. Jon`ıshqanın` zıyanlı ja`nlikler, kesellikler ha`m merezsho`p penen zıyanlanbawı.

Jon`ıshqa tuqımının` zu`ra`a`ti tu`p sanının` azı-ko`pligine baylanıslı bolıp, a`dettegi usıl menen gektarına 16-18 kg tuqım jumsap, ken` qatarlap ekkende (arası 60-70), az normada gektarına 4-6 kg tuqım jumsap, siyrek na`l alg`andag`ıg`a qarag`anda ekinshi-u`shinshi jılı az o`nim beredi. Bunı UzNIXI dın` oraylıq selektsiya stantsiyasının` to`mendegi mag`lıwmatınan ko`riwge boladı.

6-keste

P.G.Gritsenkonın` mag`lıwmatı boyınsha

Egiw usılları	Sebiw norması, gektarına kg esabın.	Tuxımının` ha`r jılğ`ı o`nimi							
		Birinshi jılı		Ekinshi jılı		U`shinshi jılı		To`rtin-shi jılı	
Qatar arası 12 sm, sınaq ta`jiriybe	14,0	0,81	100	2,87	100	3,53	100	3,17	100
Qatar arası 70 sm	3,5	2,0	246,9	6,91	240,7	4,35	123,2	3,13	98,7

Kestedegi mag`lıwmatlarg`a qarag`anda, ken` qatarlap egilgen jon`ıshqanın` tuxım zu`ra`a`ti birinshi ha`m ekinshi jılı ko`p bolatug`ınlıg`ın ko`rsetse, biraq son`g`ı jılları na`linin` ta`biyg`ıy jag`dayda siyreklewinin` na`tiyjesinde tar

qatarlap egilgen jon`ishqa atızları da zu`ra`a`tligi boyınsha ken` qatarlap egilgen jon`ishqa atızlarınan qalıspaytug`ınlıg`ın ayqın ko`rsetedi.

Sonın` menen ken` qatarlap egilgen jon`ishqa tuxımının` na`sillik belgilerin teksergende, tar qatarlap egilgen jon`ishqa tuxımına qarag`anda kem o`nim beretug`ınlıg`ı Qaraqalpaqstan diyxansılıq ilim-izertlew institutının` jon`ishqa selektsiyası sektori ilimpazlarınan` ta`jiriybelerinen anıqlandı. Bunı to`mendegi kesteden ko`riwge boladı.

7-keste

Ta`jiriybe variantları	Jon`ishqa bedesinin` u`sh jıllıq o`niminin` summası		Jon`ishqa bedesinin` eki jıllıq o`niminin` summası	
	Gektarına ts esabında	Kontrolg`a % esabında	Gektarına ts esabında	Kontrolg`a % esabında
Ken` qatarlı jon`ishqadan aling`an tuxım (sınaq ta`jiriybeler)	r0w,e	q00	i,eq	q00
Tar qatarlı jon`ishqadan aling`an tuxım	rwe,r	q0t,w	i,u	q0r,u

Kestenin` tsifr mag`lıwmatları ken` qatarlap egilgen jon`ishqanın` tuxım zu`ra`a`ti birinshi ha`m ekinshi jılı ko`p bolatug`ınlıg`ın ko`rsetse, biraq son`g`ı jılları na`linin` ta`biyg`ıy jag`dayda siyrekleniwinin` na`tiyjesinde tar qatarlap egilgen jon`ishqa atızları da zu`ra`a`t boyınsha ken` qatarlap egilgen jon`ishqa atızlarınan qalıspaytug`ınlıg`ı ayqın ko`rsetedi.

Sonın` menen qatar ken` qatarlap egilgen jon`ishqa tuxımının` na`sillik belgilerin teksergende tar qatarlap egilgen jon`ishqa tuxımına qarag`anda kem o`nim beretug`ınlıg`ı Qaraqalpaqstan diyxansılıq ilim-izertlew institutının` jon`ishqa selektsiyası sektori ilimpazlarınan` ta`jiriybelerinen anıqlandı.

Kestedegi mag`lıwmatlar a`dettegi ta`rtipte qalın` etip egilgen jon`ishqa ken` qatarlap egilgen jon`ishqag`a salıstırğ`anda anag`urlım ko`p o`nim beretug`ınlıg`ın ko`rsetedi. Sebebi, jon`ishqanı xojalıqlarda o`ndirisinde qabıl etilgen ta`rtip penen

ekkende birinshi jılǵı zu`ra`a`t tek g`ana bede alıw ushın paydalanılıp, kelesi jıldan baslap tuxımǵa qaldırıladı, al suwıqqa, keselliklerge, ta`biyattın` qolaysız sha`rayatlarına shıdamag`an jon`ishqa tu`pleri o`lip ketip, sırtqı jag`daydın` qolaysızlıqlarına biyimlesken en` jaqsı o`simlikler g`ana qaladı. Olar na`sillik qa`siyetleri jaqsı tuxım beredi. Al ken` qatarlap ekkende, arasın islew otaq sho`plerden tazalaw ha`m basqa da arnawlı ta`rbiyanın` kemligi sebepli tag`ıda a`zelgi tu`ptin` o`simlikleri tolıq saqlanadı. Na`tiyjede, na`sillik qa`siyetleri to`men jon`ishqa tu`pleri tuxım baylap, olardan az o`nim beretug`ın o`simlikler kelip shıg`adı.

O`tkerilgen ilimiy ta`jiriybelerdin` na`tiyjesi Qaraqalpaqstan jag`dayında jon`ishqanın` birinshi orag`ın tuxımǵa qaldırıw joqarı zu`ra`a`t alıwda u`lken a`hmiyetke iye ekenligin 1964-jılı o`tkerilgen ilimiy ta`jiriybe ko`rsetti. Buni to`mendegi kestedeki ko`riwge boladı.

8-keste

1 ga jerden aling`an tuxım jon`ishqanın` zu`ra`a`ti, ts/ga esabında		
Birinshi oraq	Ekinshi oraq	U`shinshi oraq
6,2	4,8	1,7

Birinshi oraqtı tuxım ushın qaldırǵanda tuxımın` zu`ra`a`ti ekinshi oraqtag`ıǵa qarag`anda gektarına 1,49 ts, u`shinshi oraqtag`ıǵa qarag`anda 4,5 ts ko`p boladı. Jon`ishqa birinshi oraq da`wirinde fitonomus penen ku`shli tu`rde zıyanlanbasa, jon`ishqanın` birinshi orag`ın tuxımǵa qaldırıw sha`rtli ilajlardan bolıp esaplanıwı kerek. Jon`ishqanın` u`shinshi orag`ın tuxımǵa qaldırǵanda jon`ishqa tamırındag`ı azıqlıq zatlardı alding`ı eki oraq da`wirinde ko`p sarp etiwı, tuxımın` pisip jetilisiwi ushın hawa rayının` qolaysızlıǵı, jon`ishqa gu`lin shan`landırıwshı paydalı nasekomalar sanının` azayıp ketiwine baylanıslı az ha`m sapasız zu`ra`a`t alınadı. Tuxım jon`ishqanı shıyırshıǵın` to`rtten u`sh bo`legi, yag`nıy 75% pisken waqıtta orıw kerek. Tuxım bul waqıtqa shekem sarg`ish ren`ge enip, barmaq penen qısqanda qolg`a qattı tiyedi. Tuxım jon`ishqanı orıp alıw ushın

iykemlestirilgen da`n kombaynları, lobogreykalar, jatkalar ha`m jon`ishqanı kishigirim gu`dilerge jıynaytug`ın platformalar menen u`skenelengen senokosilkalar qollanıladı. Jon`ishqanı qol menen orıwdı u`lken traktor aylana almaytug`ın, ayırım mayda uchastkalarda g`ana qollanıp, u`lken atızlarda qollanılmaydı. Tuxım jon`ishqanı jay tu`rdegi senokosilka menen orıw, onnan keyin grabiller menen jıynaw qattı qadag`an etiliwi tiyis. Sebebi, jıynaw waqtında zu`ra`a`ttin` 50 % ten aslamı zaya boladı. Tu`yeklew jumısında g`a`lle ushın arnalg`an molotilkalardıń barlıq tu`rinen paydalanıwg`a boladı. Jon`ishqanı molotilka barabanınan shıyrshıqtag`ı (sobıqtag`ı) tuxım tolıq alıng`ang`a shekem (2-3 ret) o`tkeriw kerek. Eger xojalıqta klevreterka bar bolsa, molotilkadan shıqqan, tuxım aralas shıyrshıqtı klevreterkadan o`tkeriw kerek, keyin tuxım tazalaytug`ın elewshi qurılmalardan o`tkerip, arnawlı elektromagnitli mashinada (EMS-1) merez sho`p ha`m basqa da jabayı o`simliklerdin` tuxımlarınan, sonday-aq zıyanlı ja`nlikler menen zıyanlang`an o`zinin` push tuxımlarınan da tazartıladı.

Qaraqalpaqstan jon`ishqa egisi boyınsha O`zbekstanda tiykarg`ı zona bolıp, barlıq jer maydanının` 19,5-25,0 % in iyelegen ha`m ha`r jılı 1,7-2,0 mın` tonnag`a shekem jon`ishqa tuxımın jetistirip kelgen. Qaraqalpaqstannın` aldın`g`ı xojalıqları gektarınan 3,5-4,5 tsentnerge shekem jon`ishqa tuxımın jetistirip kelgen. Biraq keyingi jılları g`awashag`a ha`dden tıs a`hmiyet berilip, eginlerdi almaslap egiw derlik toqtatılıp, jon`ishqashılıq esaptan shıg`ıp qalg`an edi.

Ot-sho`p ushın da, tuxım ushın da egiletug`ın jon`ishqa atızlarında topıraqtı tayarlaw, egis mu`ddeti, azıqlandıırıw rejimi jalpı birdey bolg`anı menen, tuxım ushın egilgen jon`ishqa o`simligine ta`rbiya beriw bir qansha o`zgesheliklerge iye boladı. Ma`selen` gektardag`ı o`simlik na`linin` qalın`lıg`ı egiw usılı, tuxım ushın qaldırıw, jası ha`m orag`ı, suwg`arıw rejimi, zıyankesler menen gu`resiw ha`m jıynaw protsessleri tuxımın sapasın ha`m zu`ra`a`tin ko`teriwde u`lken rol tutadı.

Bizin` jag`dayımızda 1m² maydanda 75-80 o`simlik qalg`anday etip, jalpılamay sewip yamasa qatarlap eiw usılı tuxımnan joqarı zu`ra`a`t alıwg`a

mu`mkinshilik beredi. Biraq barlıq agrotexnikalıq ilajlar joqarı sapada o`tkeriliwi kerek.

Jon`ishqadan joqarı sapalı tuxım alıw ushın onın` qatar arası 50 sm den qaldırılıp egilgen jag`dayda gektarına en` joqarı zu`ra`a`ti e,ut ts alındı.

A`dette, ekinshi jıldan baslap, ta`rbiyalaw jag`dayına, ıg`allıqqa, topıraqtın` hasıldarlıg`ına baylanıslı jon`ishqanın` gektardag`ı tu`p sanı azaya baslaydı, yag`nıy o`tkerilgen ta`jiriybede 3-jılı 50-60 % g`ana qalın`lıqta boladı. Bunday jon`ishqanı tu`bi qalın` o`sken birinshi jılında ot-jemge paydalanılıp, tu`p qalın`lıg`ı azayg`an jılları tuxım ushın paydalanıwg`a boladı. Qaraqalpaqstannın` arqa rayonlarında da en` joqarı tuxım zu`ra`a`ti ekinshi ha`m u`shinshi jıl g`ı egisten aling`an. Usınday mag`lıwmatlar pu`tkil O`zbekstan ha`m Qaraqalpaqstan jag`dayında aling`an barlıq ta`jiriybelerde de 3-jıl g`ı jon`ishqa o`simliginin` qalın`lıg`ı ko`pshilik atızlarda 1 ga maydanda 50-70 dana paqal tu`binen ibarat bolg`an. Al tuxımshılıqta bunday qalın`lıq joqarı zu`ra`a`tli jon`ishqa tuxımın jetistiriwge muwapıq ekeni da`liyllenbekte.

İlimiy ta`jiriybelerge qarag`anda, Qaraqalpaqstan jag`dayında tuxımg`a birinshi oraqtı qaldırıw paydalı boladı. Ig`allı jılları birinshi oraqtı bede alıw ushın, keyingi oraqtı tuxımg`a qaldırg`an maqul. Tuxımlıq jon`ishqa o`simliktin` sobıg`ı 70-80% gu`n`girt tartqanda ha`m tuxımın sarg`ayıp, qatayg`an waqtında ha`r atız zu`ra`a`ti o`z aldına bo`leklengen usılda dara-dara jıynap alınsa, tuxım zaya bolmaydı, bedesinin` shıg`ımı jaqsı boladı. Orıw, da`stelew keshte ha`m erte azanda o`tkerilip, tu`yeklew ku`ndiz o`tkeriliwi lazım. Saqlanatug`ın egislik tuxımının` ıg`allıg`ı 13-14% do`gereginde bolıwı sha`rt.

Jon`ishqa tuxımının` zu`ra`a`tin ko`beytip ha`m onın` sapasın jaqsılap, xojalıqlarg`a rayonlastırıl g`an jergilikli ha`m selektsiyalıq taza sortlardı engiziw maqsetinde, joqarı sortlı egislik tuxımlardı ko`plep jetistiriwge erisiwimiz kerek.

Tuxımgershilik xojalıqlarında birinshi ha`m onnan keyingi produktsiyalı tuxımlar o`siriledi. Sort saqlaw pitomniginde egip o`siriw ushın superelita ha`m elita eginlerinin` ha`r qıylı jastag`ı tuxımınan u`lgiler alınadı. Bul pitomnikler ken`

qatarlı usılda egilip, odan aldın`g`ı tuxımlar aralastırıladı ha`m aldın-ala ko`beytiw pitomniginde egiledi. Onnan super elita alınadı. Superelita tuxımgershiliginin` wazıypası sort almasıw ha`m sort jan`alaw sistemasın iske asırıwdan, ma`mleketlik qamsızlandırıw tuxım fondın du`ziw planı tiykarında, joqarı sapalı tuxım menen barlıq tuxımgershilik xojalıqların ta`miyinlewden ibarat bolıp tabıladı.

Tuxımlıq egisliklerde aprobatsiya ju`rgizilip, onda sortlıq ha`m tuxımlıq baqlaw jumısları ju`rgiziledi. Aprobatsiya, tuxımgershilik egisliklerindegi ha`r bir o`simliktin` jalpılamay gu`llew da`wirinde 50 ga jer maydanındag`ı 50 tochkasının` ha`r birinen 200 dana o`simlik na`li (pisik da`nli paqal bawlıq) alınıp, son` ol analizlenedi, tuxımının` egiske jaramlılıg`ı yamasa jaramsızlıg`ı haqqında akt du`ziledi. Akt boyınsha tuxımının` sapası 1- ha`m 2-klassqa bo`linedi. 1-klass tuxım kelesi jılı egiw ushın tuxımshılıq xojalıg`ına jiberiledi, al 2-klass tuxım bede alıw maqsetinde paydalanıw ushın xojalıqlarg`a taratıladı.

3.2. Jon`ishqa agrotexnikası

Jon`ishqa astına qaldırılğ`an uchastkalardı tegislew ha`m su`riw. Jon`ishqa ku`shli shorlanbag`an jerlerdin` barlıg`ında da jaqsı o`sedı. Shordan (kebirden) tolıq ashılmagan ha`m jer astı suwı jaqın bolğ`an uchastkalarda bul o`simlik to`men rawajlanadı. Tu`p sanı kemeyip ketedi.

Jon`ishqa astına bo`lip shıg`arılğ`an uchastkalar egis aldı islewden burın jaqsı tegisleniwi tiyis. Bul ushın atızlardın` oy jerine biyik jer menen skreper, buldozer arqalı topıraq alıp barıp tegislew kerek. Mine, usılay etip ta`rtipli ra`wishte tegislengen atızlardı jaqsılap qandırıp suwg`arıp, onnan tegis na`l alıwg`a boladı. Ilim izertlew mekemelerinin` aldın`g`ı qatardag`ı kolxoz ha`m sovxozlardın` is ta`jiriybeleri jerdi gu`zde yamasa erte ba`harde teren` etip su`rgende jon`ishqa o`niminin` artatug`ının ko`rsetti.

Jerdi gu`zde su`riwdin` na`tiyjesinde topıraqtın` sıpatı anag`urlım jaqsılanadı, shayıp suwg`arıwdın` na`tiyjeli bolıwın ta`miynleydi, bul jabayı sho`plerge ha`m zıyanlı ja`nliklerge qarsı gu`resiwdin` agrotexnikalıq ilajlarının` biri bolıp tabıladı.

Jerdi shu`digarlawdın` mu`ddeti buring`ı egilgen daqıllardan tazalawg`a ha`m su`rmesten aldın islenetug`ın jumıslardın` (jerdi tegislew) tamalanıwına baylanıslı boladı.

Su`rimnin` teren`ligi 28-30 santimetrden kem bolmawı tiyis. Shım ha`m qamıs basqan atızlardı jon`ıshqa astına su`rgende onda su`rimnen keyin uzınına ha`m kesesine chizellew kerek, jabayı sho`plerdin` tamırların terip alıp sırtqa taslaw kerek. a`dette bunday atızlardı mu`mkinshiligi bolg`anınsha teren` su`riw kerek.

*Jerdi shayıp suwg`arıw.* Shorlang`an jerlerdi shayıp suwg`arıw jon`ıshqadan joqarı zu`ra`a`t alıwdın` agrotexnikalıq sharalarınin` biri. Bunın` ushın uchastkalardı joqarıda aytilg`anday etip aldın ala tegislew, suwg`arıw, salmalardı tazalaw yaki bolmasa tazadan shel shabıw, sheldin` kemis jerdi qoldan du`zew jumısların pitkeriw kerek. Uchastkalardı kartalarg`a bo`liw kerek, ol kartalardın` ko`lemi 0,25 ga dan kem bolmawı tiyis.

Shayma suw beriw mug`darı ha`m sanı uchastka topırag`ının` mexanikalıq sostavına jer astı suwının` teren`-sayızlıg`ına, a`sirese topıraqtın` kebirleniw da`rejesine baylanıslı boladı. Sol ushında az shorlangan jerlerge 1-2 ret ortasha, kebirlengen jerge 2-3 ret, al kebiri basım uchastkalarg`a 3-4 ret suw beriya kerek. Suwg`arıw normaları gektarına 1200-1500 kubometrge shekem boladı. Mu`mkinshiligi bolg`ansha shayma suw beriw gu`zde o`tkeriliwi tiyis. Bunday bolg`anda ba`harde shayma suw bermey yamasa az mug`darda g`ana suwg`arıw jon`ıshqa egisi ushın jetkilikli.

Topıraqtı egis aldı islew. Topıraq egis aldı islew topıraqtın` fizikalıq-mexanikalıq jag`dayına, jabayı sho`plerdin` ko`gere baslawını baylanıslı boladı. O`tkerilgen ilimiy ta`jiriybelerdin` juwmag`ı gu`zde shu`digarlanıp suwg`arılğ`an jerlerdi ba`ha`rde qaytadan suwg`arıwdın` zıyanlı ekenin ko`rsetti. Topıraqtın`

uchastka qatlamın awdarıp taslamay onı otvallı plug penen, diskalı yachizel menen islew kerek. Al jenil topıraqlı jerlerde Zig-Zag tırması menen uzınına ha`m kesesine bir yamasa ek ret tırmalawda jetkilikli.

Egis aldı topıraqtı islew egis jerler tapqa kelgennen keyin o`tkeriledi.

Jerdin` suwg`a qang`anının` belgisi onın` kebiri ketip, qızg`ılt, beti qızg`ılt tartıwınan ko`rinedi. Topıraqtı egis aldı islew 15-20 sm, teren`likte su`rip o`tkeriledi. Egerde qandayda bir sebep penen jerdi shu`digarlaw isi ju`rgizilmese, onda ol qandırıp suwg`arılğ`annan keyin plug penen 28-30 sm teren`likte su`rilip, keyin tırma ha`m mala basıp, jon`ıshqa egisin baslay beriwge boladı. Egis aldı islew jumısların ju`rgiziwde jerdin` tuxımının` ko`geriwi ushın normal jag`dayda isley alatug`ın topıraq beriwine erisiw kerek.

Sebebi jer kesekli bolıp islense jon`ıshqa tuxımı alag`at ko`geredi, na`li siyrek boladı. Sol ushın qandırıp suwg`arılğ`an jerler tapqa keliw menen bir qatar «Zig-Zag» salmaw kerek.

**Egis mu`ddetleri.** Jon`ıshqanı o`z ma`ha`linde egiw onnan joqarı zu`ra`a`t alıwdın` ilajlarının` biri. Tiykarınan jon`ıshqa erte ba`ha`rden baslap egiledi. Bul da`wirde ku`n qattı ısıp ketpegen bolıp, topıraқта normal ızg`arlıq saqlanadı. Na`tiyjede tegis na`l ko`gerip shıqqan jas o`simlikti ku`n ıssısı urıp ketiw qa`wpi bolmaydı.

Egerde egis keshiktirilip, ba`ha`rgi ku`nnin` ısıp ketken waqtına tuwrı kelse, onda topıraqtın` u`stin`gi- qatlamınan ızg`arlıq qashıp, topıraққа tu`sken tuqım ko`germey, alag`at na`l alınadı, zu`ra`a`ti kem boladı.

Jon`ıshqanın` egis mu`ddeti Qaraqalpaqstannın` arqa rayonları ushın 25-aprelge, al tu`slik rayonları ushın 15-aprelge, al tu`slik rayonları ushın 15-aprelge deyin o`tkeriliwi tiyis. Bul mu`ddetten keshiktiriw jon`ıshqa o`simliginen kem o`nim alıwg`a alıp keledi. Jon`ıshqa o`simligin egiwdin` ekinshi bir mu`ddeti gu`zgi egis bolıp, ol ba`ha`rgi egiske qarag`anda o`zinin` bir qansha artıqmashlıg`ına iye boladı.

Erte gu`zde egilgen jon`ishqa suwıq baslang`ansha normal rawajlang`an tamırg`a iye boladı, qısqı suwıqqa shıdaytug`ın halda vegetatsiyalıq da`wirin tamamlaydı, ba`ha`rdin` keliwi menen jon`ishqa ko`kley baslap, tez rawajlanadı, na`tiyjede ba`ha`rde egilgen jon`ishqag`a qarag`anda gu`zde egilgen jon`ishqanın` birinshi ha`m son`g`ı oraqları 1-1,5 ese o`nim beredi. Jon`ishqanı gu`zde egiw keshiktirilse o`simlik a`zzi rawajlang`an tamırg`a iye bolıp, eki-u`sh japıraq shıg`arıw da`wirinde qıslaydı. Ondaı jag`dayda denesinde suıayıqtan saqlaytug`ın awqatlıq ha`m fiziologiyalıq organikalıq zatlardın` az bolıwı sebepli qısqı suwıqqa ko`plep o`lip qaladı. Bunday bolmawı ushın jon`ishqanı erte gu`zde egiw kerek.

**Egiw usılları ha`m norması.** Jon`ishqa o`simligin egiw bir qatar usıllarg`a bo`linedi, en` paydalısı arnawlı seyalkalar menen egiw bolıp tabıladı. Tuqımın` sebiw norması mexanikalıq sostavı awır topıraqlarg`a jatıwshı yamasa kebirlengen uchastkalarda gektarına 18 kilogramm tukım egilip, al jen`il topıraqlı uchastkalarda gektarına 16 kilogramm tuqım egiliwine boladı.

Jon`ishqa tukımının` topıraqqa durıs teren`likte jaylasıwı jon`ishqadan bir tegis na`l alıwdın`girowi bolıp tabıladı. Jon`ishqa tukımı topıraqtın` mexanikalıq sostavına ha`m egiw mu`ddetine baylanıslı 1,5-3 sm teren`likke taslanıwı kerek.

Erte ba`harde egilgen tukım sayız jaylasıp, al egis mu`ddeti keshiktirilgende teren`lew etip tuqımdı jaylastırıw kerek. Sonday-aq jen`il topıraqlı uchastkalarda awır topıraqlı uchastkalarg`a qarag`anda teren`lew egiw orınlı.

İlimiy mekemelerdin` ha`m aldın`g`ı kolxozlardın` ha`m sovxozlardın` ta`jiriybeleri jon`ishqa tuqımın nitrogin menen da`rilew jon`ishqanın` zu`ra`a`tinin` artıwına ta`sir tiygizetug`ının ko`rsetti.

Jon`ishqanın` tamırında hawadag`ı erkin azottı o`zlestiriwshi bakteriyalar bolıp, jon`ishqanın` hawadan alg`an azotı menen, al bakteriyalar jon`ishqa tamırındag`ı qant ha`m tag`ı basqa da azıq shireleri menen awqatlandıratug`ın ilimpazlar erterekte-aq anıqlag`an edi. Al tsitrogin preparatı usı azot jıynawshı bakteriyalardan topıraqqa tuqım menen birge tu`sip tez rawajlanadı, ol jon`ishqanın` tamırına o`tip aladı ha`m u`lken payda keltiredi.

Eger nitrogin bolmag`an jag`dayda azot jıynawshı bakteriyalardı ko`beytiw maqsetinde egiske arnalg`an atızlarg`a, go`ne tu`bir jon`ishqadan, sostavında jon`ishqa tamırı bar 5-6 tonna topıraq to`giw kerek. Boyı pa`s vegetatsiyalıq da`wiri uzaq emes daqıllar menen jon`ishqanı qosıp ekkende, onı orıp algannan keyin tek jon`ishqanın` o`zi qalıp, gu`zge shekem bir eki orıp alıwg`a boladı. Bul eginlerdi mal otı maqsetinde jon`ishqanın` birinshi oraqqı keliw da`wirinde birge qosıp orıwg`a da, al ormay da`nin pisirip alıwg`a da boladı. Saya salıwshı eginnin` birinshi jılǵı jon`ishqada ko`p o`nim alıwdag`ı a`hmiyeti menen bir qatarda paydalı agrotexnikalıq ta`repi de bar. Bul eginler jerdin` u`stine saya salıp suwdın` puwg`a aylanıwın kemeytedi, na`tiyjede jer betine duzdın` ko`teriliwine jol qoymaydı.

Jon`ishqanın` ko`p o`nim beriwi topıraqta ko`p mug`darda tamır massasın qaldırıp, jerdin` hasıldarlıǵın arttırıwdı onın` normal qalın`lıqta jaqsı rawajlanıwına baylanıslı. Arpa menen jon`ishqa ba`ha`rde seyalka menen shaxmat usılında egiledi. (jon`ishqa-uzınına, al saya salıwshı egin kesesine), ol gu`zlik biyday menen gu`zde de egiledi. Arpanın` sebiw norması gektarına 40-50 kg bolıp, jon`ishqaniki gektarına 16 kg boladı. Arpa jon`ishqag`a qarag`anda irirek bolıwı sebepli tukımı topıraqqa teren`irek jaylasadı.

Jon`ishqadan joqarı zu`ra`a`t alıw ushın islenetug`ın ilajlardın` ishinde jon`ishqa o`simligin o`siw da`wirinde ta`rbiyalaw ayrıqsha a`hmiyetke iye. Jon`ishqa o`simligin ta`rbiyalaw egilgen jon`ishqadan tegis na`l alıwg`a, sol na`llerdin` jaqsı rawajlanıwına, jabayı sho`pler, zıyanlı ja`nlikler ha`m keselliklerge qarsı gu`res ju`rgiziwge qaratılǵan bolıwı kerek. Sonday-aq go`ne tu`bir jon`ishqalardı sistemalı ra`wishte ha`r jılı erte ba`ha`rde to`gin menen azıqlandıırıw, uzınına kesesine tırmalaw ha`m suwg`arıw ilajların o`tkeriw kerek.

Qatıwash buziw. Jon`ishqanı ekkeninen keyin jawınnın` sebebinen topıraqtın` beti qatıwash bolmawın ta`miynlew kerek. Egerde jawıp, qatıwash bolg`an jag`dayda, ele jon`ishqa jer betine shıqpag`an bolsa rotatsiyalıq motiga, yamasa jen`il tırma menen qatıwashtı buziw kerek. Egerde jon`ishqa jer betine

shıg`a baslag`an da`wirde qatıwash payda bolsa, onda jen`il da`rejede ızg`arlawshı suw beriw kerek. na`tiyjede jon`ishqa tezlik penen o`sip, jer betine ko`k sala baslaydı.

Seplew. Qandayda bir jag`daylardın` sebebinen jon`ishqa atızının` ayırım jerlerinde na`lsiz orınlar ushırassa, onda jon`ishqanın` ekinshi jılınan baslap ol orınlardı seplew kerek.

Seplew-Erte ba`ha`rden birinshi suw aldında alag`at jerge jon`ishqa tuqımın shashıp, onnan son` suwg`arıw kerek. Na`tiyjede jon`ishqa atızları alag`at bolmaydı.

**Suwg`arıw.** Jon`ishqadan joqarı zu`ra`a`t alıw ushın o`simlikti suw menen ta`miynlew bas wazıypa olıp tabıladı. Sebebi ol qurg`aqshılıqqa shıdamlı bolıwına qaramastan qansha tez suwg`arılsa sonsha rawajlanadı. Suwg`arıw mu`ddetleri ha`m normaları jon`ishqa o`simliginin` jasına baylanıslı boladı.

Birinshi jılğ`ı jon`ishqanın` tamır sisteması topıraqtın` joqarı qatlamında jaylasqanı sebepli topıraqtın` u`stin`gi qalamında normal ızg`arlıq saqlaw maqsetinde tez-tez suwg`arılıp turıwı kerek. Son`g`ı jıllarda jon`ishqanın` tamırı teren`ge ketip, jer astı suwınan paydalana baslaydı, sol ushında suw beriwdi siyrekletse boladı.

Jon`ishqanın` suwg`a bolg`an talabı onın` rawajlanıwg`a o`tiwi da`wirinde massasının` azlıg`ı sebepli ba`ha`rde ha`m ha`r oraqtan keyingi waqıtları suwdı az talap etedi. Tu`yneklew da`wiri tamam bolganda, tuqım pise baslag`an waqıtlarında tag`ı da az suw jumsaladı. Sonday-aq jon`ishqanı hawa rayı salqın bolatug`ın ba`ha`rde ha`m gu`zde az, al hawa rayı ıssı bolg`an jazda ko`p suwg`arıw kerek.

Solay etip ulıwma alg`anda ko`p o`nim alıwdı ta`miynlew ushın jon`ishqa o`simliginin` suwg`arıw norması ha`m mu`ddeti hawadan jawg`an ıg`allıqtın` mug`darına hawa rayının` ıssılıg`ı ha`m topıraqtın` mexanikalıq sostavınv, jerdin` ba`lent-pa`sligine, kebirleniwine, jer astı suyayın` teren`ligine, jon`ishqanın`

jasına, rawajlanıw fazasına ha'm qaysı oraqtın` (birinshi yaki ekinshi) tuqımg`a qaldırılıwına baylanıslı boladı.

Jon`ishqanın` suwg`a talabın onın` paqal ha'm japıraqlarının` tu`rinen biliwge boladı: topıraqta ıg`allıq jetkiliksiz bolsa o`siw protsessi toqtaydı, o`simliktin` tu`ri qaraltım ko`k bolıp solın`qırıp turadı, japıraqları biraz qalın`lasadı.

Jas jon`ishqanı aq tamır urg`ansha suwg`armaw kerek. Birinshi suwdı jon`ishqanı ekkennen keyin 35-40 ku`n o`tpay bermew kerek. Tiykarınan birinshi suwdı og`ada ustalıq penen o`tkeriw kerek, kelesi suwdı 2-3 ha`pte o`tkerip beriw maqsetke muwapıq keledi.

Solay etip jon`ishqag`a bir orın algang`a shekem eki ret suw, al son`gı oraqlarının` arasında arasında bir ret suw beriw kerek. Qaraqalpaqstan jag`dayında jon`ishqanın` suwg`arıw normaları gektarına 800-1200 metr kubke shekem boladı, vegetatsiyalıq da`wirde jer sharayatına qarap bedege qaldırılğan jon`ishqalardı 5-6 ret suwg`arıw kerek. jer astı suwı teren` jaylaskan uchastkalarda go`ne tu`bir jon`ishqanı birinshi oraqtan keyin ko`rpe bola baslagan da`wirde bir ret, al butanizatsiya da`wirinde bir ret suwg`arıw kerek.

Jer astı suwı jaqın uchastkalarda ha`r oraq ortasında tek bir ret g`ana suw menen ta`rbiyalaw kerek.

Oraq aldınan jon`ishqanı suwg`arıw org`annan keyingi o`siwine ja`rdem etedi. Sol ushında org`annan keyingi o`siwine ja`rdem etedi. Sol ushında eger oraq aldınan suw beriw planlastırılса, onı 5-6 ku`n burınraq beriw kerek.

Jon`ishqag`a to`gin to`giw. Jon`ishqa o`simliginen joqarı zu`ra`a`t alıwda to`ginnin` a`hmiyeti og`ada ullı. Jon`ishqa atızına to`gin to`giw vegetativlik massa (bede) payda etiw ushın jon`ishqanın` topıraqtan kem mug`darda azıqlıq zat alatug`ını sebepli kelip shıqqan. Sol ushında to`gin topıraqtın` azıqlıq rejimin saqlaydı. Topıraqta jon`ishqag`a azıqlıq retinde kerek elementlerdin` ko`pshiligi bar, biraq azot, fosfor, kaliy ha'm bir qatar mikroelementler jetkiliksiz boladı. Sol ushında bizin` jag`dayımızda jon`ishqa ushın bas to`gin superfosfat ha'm kaliy duzları bolıp esaplanadı. Al azot bolsa jon`ishqa tamırında jaylasqan azot

жынаwшy бактериялар арқалы жерди байытатуғ`ын себебли ко`п жйлар жон`ишқағ`а бул то`гин берилмейди.

Илим изертлеw жумасынын` жуwмағ`ы Қарақалпақстан жағ`dayында гектарына 5-7 тс суперфосфат то`гилсе жон`ишқадан жоқары зу`ра`а`т алыw ушын jetkilikli екенin ко`рsetti.

Суперфосфат жон`ишқағ`а egis алдынa, жерди су`рместен бурын, ал го`не ту`бир жон`ишқағ`а суперфосфат беде берiledi. го`не ту`бир жон`ишқағ`а суперфосфат бергennen кейin тирма диска менен топыраққа араластырылып жiberiledi.

Таза жон`ишқанin` egis астына калий то`гинnin` жыллық дозасы гектарына 1,5-2 тсентнерден берилди, ал го`не ту`бир жон`ишқағ`а гу`зде, yamasa ба`harde тирмалаw алдынa берiledi. Жон`ишқа о`зи азот жынаwшy eгин болғаны себебли тийкарынан азот то`гини берилмейди. Бирақта азот жынаwшy ту`yirshek бактериялары бир тамыр sistemasına iye емес жан`а rawajлана баслаған жаs жон`ишқа о`simligi да`slepki osiw да`wirinde аз mug`darda азот то`гини менен азықландырылады. да`risti суперфосфат penen qosıp togiw paydalı та`sirin тийгizedi, тийкарынан жердин` шорын жуwıw жумасы алдынa то`гip, кейin жон`ишқаны egiw керек.

Жон`ишқа атızын jabayı sho`p basıp ketpesligi ушын то`giletug`ын да`ris sostavында merez sho`p, кара sora, kekire т.б. jabayı sho`plerdin` тiri туқымı ко`п болadı, shirigen да`riste olар kogeriwshilik qa`siyetin joyıtadı.

Илим изертлеw мекемелерinin` son`g`ı waqıtlardag`ı ilimiy та`jiriybelerinin` жуwмағ`ына қарағ`анда жон`ишқа о`simligi mikroelementlerden ibarat то`g`gin менен азықландырылғ`анда onın` беде ha`m туқым зу`ра`а`tinin` ко`beytetug`ынı belgili boldı.

Bunday то`ginlerge мıs, tsink, bor, molibden ha`m тағ`ы басқа elementler ha`m Jer astы qazılma baylıqlарının` shығ`ınları yamasa usы jer astы baylıqlарынан tayarlang`an mikroto`ginler kiredi. Бул то`ginlerди beriw дозасы og`ada аз болıp, бир tonна туқымғ`а 200-500 грамм mikroto`gin араластырылып а`detтеgi жон`ишқа egisi та`rtibinde туқым egiledi.

Go`ne tu`bir jon`ishqanı tırmalaw ha`m diskalaw. Jon`ishqadan joqarı zu`ra`a`t alıw ushın onı ekinshi jılınan baslap gu`zde yamasa ba`ha`rde topırag`ın tırma yamasa diska menen jumsartıp turıw kerek. Tırmalaw na`tiyjesinde ko`gerip shıqqan bir qatar jabayı sho`pler ha`m zıyanlı ja`nlikler o`ledi, jerdin` u`stin`gi qatlamı jumsarıwının` sebebinen jon`ishqa tamırında ha`m topıraқта hawa almasıw jaqsılanadı.

Ig`allıqtın` puwg`a aylanıp la`mnin` qashıwı toqtaydı, al bul na`rse o`znawbetinde jerdin` betine duzdın` ko`teriliwin toqtatadı. Tırmanın` usınday paydalı sebebinen jon`ishqanın` zu`ra`a`ti ko`beyedi, jabayı sho`plerdin` kemeyiwi sebepli bedenin` sıpatı artadı.

Tırmalaw «Zig-Zag» tırması menen uzınına, kesesine bir yamasa eki ret o`tkeriledi. Tırmalawdan basqa go`ne tu`bir jon`ishqanı diskalaw ko`p paydalı bolıp tabıladı.

Diskalaw na`tiyjesinde topıraq teren`irek jumsartıladı, jabayı sho`p tamırları ha`m zıyanlı ja`nlikler ko`birek o`ledi, jon`ishqa tamırının` paqallar payda etetug`ın jerinin` u`stin`gi bo`legi maydalanıp, paqal shıg`arıwshı ko`zleri ko`beyedi. Birinshi jılǵı jon`ishqag`a tırma, diska salıwg`a bolmaydı. Eki jıllıq jon`ishqa tırmalansada, diskalaw ruxsat etilmewi tiyis. Ush jıllıq jon`ishqa bir yamasa eki ta`repleme jen`il diskalanıp (5-6 sm), ko`p jıllıq jon`ishqa eki ta`repleme teren` (6-8 sm), diskalansa boladı. Eskiden paydalanıp kiyatırǵan go`ne tu`bir jon`ishqanı diskalaw ma`jbu`riy agrotexnikalıq usıl bolıp esaplansada, tırmanı bunday jon`ishqag`a qollanbaw kerek. go`ne tu`bir jon`ishqanı diskalaw jon`ishqa elek ko`k salmag`an waqıtta yaki erte ba`ha`rde o`tkeriledi. Ayrım jag`daylarda erte ba`ha`rde diskalanbay qalg`an jon`ishqanı birinshi oraqtan keyinde diskalawg`a boladı, biraq bunın` paydası erte ba`ha`rdegidey bolmaydı.

Jon`ishqanı orıw mu`ddetleri. Keyingi jıllarda shet elde, sonday-aq **Sovetler Soyuzında** ko`plegen belgili ilimpazlar jon`ishqashılıqtan alinatug`ın o`nimnin` sapasın jaqsılaw maqsetinde ilimiy ta`jiriybe jumısların alıp barmaqta.

Qaraqalpaqstan sharayatında erte da`wirde orıw rejimleri ilimiy jumıslardıń na`tiyjesinde jon`ıshqanı erte da`wirde org`anda mallarg`a jug`ımlı belok ha`m vitaminli zatlardıń ko`p bolganın da`lillep ko`rsetti. Biraqta, jon`ıshqanın` tu`p sanının` ha`dden tis kemeyip ketetug`ınlıg`ın ta`jiriybe ko`rsetti. Sol ushında, ha`zirgi waqıtta erte da`wirde orıwg`a shıdamlı joqarı sapalı, belok zatlarına bay jon`ıshqa sortları do`retildi ha`m ilimiy ta`jiriybe jumısları alıp barılmaqta.

Qaraqalpaqstan diyqanshılıq ilim-izertlew institutında jon`ıshqa bedesinin` sapasın jaqsılaw ha`m erte da`wirde orıwg`a shıdamlı joqarı sapalı jug`ımlılıg`ı jag`ınan beloqqa bay sort shıg`arıw u`stinde ilimiy ta`jiriybeler alıp barılmaqta.

Ilimiy ta`jiriybenin` juwmag`ı ko`rsetkenindey-aq, birinshi oraqtı gu`llew da`wirine salıstırganda erte g`umshalaw da`wirinde orıp, keyingi oraqtı gu`llew da`wiri menen almastırganda, bedenin` sapalılıg`ı jag`ınan jem birliği 4,8-8,6 protsent, al mallarg`a jug`ımlılıg`ı jag`ınan protein 12,4-19,0 protsentke artadı.

Bul ko`rsetkishler elede bolsa awılxojalıq sharwalarınin` talabın tolıq qana`a`tlandıra almaydı. Sebebi «Xiywa» sortı ko`p jıllar dawamında bizin` respublikamızda egilip kiyatır. Onı ha`zirgi yaaqıtta ilimpazlarımızdın` tazadan do`retip atırg`an sort gıbridleri menen almastırıw za`ru`r.

Qaraqalpaqstan ilim-izertlew institutının` jon`ıshqa selektsiyası ilimiy xızmetkerleri ta`repinen islenip atırg`an, keleshekte respublikamızg`a rayonlastırıw planlastırılğan sort gıbridler ha`r qıylı rejimde sınaw menen bir qatarda, olardıń erte da`wirde orıwg`a shıdamlıların tan`lap, ta`jiriybe o`tkeriliwde.

Bul sorttın` bedesı jaqsılanıwı menen bir qatarda osimligi jag`ınan «Xiywa» sortına qarag`anda 15-20 protsent artadı.

Jon`ıshqadan joqarı zu`ra`a`t alıw ushın islenetug`ın ilajlardın` ishinde jon`ıshqa o`simligin o`siw da`wirinde ta`rbiyalaw ayırıqsha a`hmiyetke iye.

Ilimpazlardın` o`tkergen ta`jiriybelerinin` juwmag`ı jon`ıshqanın` tiykarınan to`rtten bir bo`legin yaki 10-15 protsent g`umshalaw da`wiri aldınan orıw paydalı ekenin da`lilledi. Sebebi, usı da`wirde jon`ıshqa belok ha`m basqa da mallar ushın azıq zatqa bay boladı, mol zu`ra`a`t beredi. G`umshalaw baslanar aldında org`anda

26,5 protsent azıq birligi, gu`llew da`wiri basında 17,2 protsent, al gu`llew da`wiri bolg`anda org`anda 14,4 protsent azıq birligi boladı.

Jon`ishqa ha`dden tıs erte orılsa, sıpatsız o`nim alıw menen birge, o`simlik o`z tamırına jergilikli azıq zatların jıynay almaydı ha`m qısta suwıqqa shıdamaydı. Al, orıw keshikken sayın japıraq ha`m basqada mal otı ushın paydalı o`simliktin` gu`l-bo`lekleri to`gilip qalıp, zu`ra`a`ti kemeyip paqalları qatayıp, bedenin` sapasız bolıwına jol qoyıladı, onın` u`stine zu`ra`a`t azayadı. Alıp barlıg`an ilimiy ta`jiriybenin` juwmag`ına tiykarlana otırıp, Qaraqalpaqstan jag`dayında mol hasıldarlı, sıpatlı ot-jem ushın jon`ishqa egisligin birinshi jılı gu`llew da`wirinde, al qalg`an jılları 1-4 oraqtı g`umshalaw da`wirinde, keyingi oraqtı gu`llew da`wirinde orıw maqsetke muwapıq keledi.

**Mal otı jon`ishqanı orıp jıynaw.** Jon`ishqanı o`z waqtında orıp jıynap alıw joqarı sapalı bede alıwdın` tiykarı. Bedenin` sapası jon`ishqanın` orıw ma`ha`line qaray o`zgeredi.

Ilimpazlardın` o`tkergen ta`jiriybelerinin` juwmag`ı jon`ishqanı tiykarınan gu`llew da`wiri baslang`an  $\frac{1}{4}$  waqıtta orıw paydalı ekenin da`lilleydi. Sebebi usı da`wirde jon`ishqa belok ha`m basqa da mallar ushın azıqlıq zatqa bay boladı, ko`p zu`ra`a`t beredi. Hslengen ilimiy ta`jiriybenin` juwmag`ı butanizatsiya da`wirinde orılğ`anda protein 22,4 protsent bolsa, al gu`llew da`wirinde 26,3 protsentke jetti.japıraq massalarınin` ko`beyiwi ha`m paqalının` qatayıp ketiwi protein azıq zatının` azayıwına, al kletchatkanın` ko`beyiwine malg`a jug`ımlı azıq zatlardın` kemeyiwine alıp keletug`ınlıg`ın da`lilleydi. Waqtınan erte orıw jon`ishqanın` tu`p sanının` kemeyiwine alıp keledi, sol ushında da`slepki oraqlar butanizatsiya fazasında, al keyingi oraq gu`llew da`wirinde org`an maqsetke muwapıq keledi.

Jon`ishqa ha`dden tıs erte orılsa, sıpatsız o`nim alıw menen birge, o`simlik o`z tamırına jergilikli azıq zatların jıynay almaydı ha`m qısta suwıqqa shıdamaydı. Al, orıw keshikken sayın japıraq ha`m basqada mal otı ushın paydalı o`simliktin` jumsaq ushları japıraq belokları to`gilip qalıp, zu`ra`a`ti kemeyip paqalları qatayıp, bedenin` sapasız bolıwına jol qoyıladı, onın` u`stine zu`ra`a`t azayadı, onın`

ekinshi, u`shinshi orag`ı keshigedi. Kesh org`anda zıyanlı ja`nlikler (fitonomus, jon`ishqa pitesi ha`m tuqım jewshi qurt), jabayı sho`plerdin` ko`beyiwine alıp keledi. Qaraqalpaqstan jag`dayında birinshi jılǵı jon`ishqa tiykarınan u`sh retke shekem, al ekinshi gu`llew da`wirinen baslap to`rt ret orıp alıwg`a boladı. Jon`ishqanı senokosilka menen org`anda, mu`mkinshiligi bolgansha tıqırlap orıw kerek. Solay etkende jon`ishqa to`mendegi tu`pte jaylasqan zıyanlı ja`nliklerden taza boladı, ha`m de kelesi o`sip jetilisiwine qolay boladı, o`ytkeni paqallar jon`ishqanın` paqal shıǵ`arıwshı ko`zinen o`sedi, paqallardın` o`siwi, gu`llewi bir tegis bolıp, jon`ishqa tu`binen shıqqan paqallardın` boyı ten` boladı, na`tiyjede sıpatlı ha`m ko`p bede alınadı.

Egerde jon`ishqa biyikten orılsa pa`s boylı jabayı o`simlikler, merez sho`p, pa`stegi zıyanlı ja`nlikler atızda qalıp o`siwi mu`mkin.

Joqarıdan orılǵan jon`ishqa paydalanıwdan tez qaladı, sebebi tazadan o`setug`ın paqallar jon`ishqanın` tamırındag`ı ko`zlerdin` tek o`zinen g`ana emes, al joqarı orılǵan paqallardan jetiledi, olar tiykarg`ı ko`zlerden o`skenge qarag`anda kem shaqalaydı, tez gu`lleydi, mallarg`a jug`ımlı organikalıq zatları azayadı. Jon`ishqası belinen orılǵan jon`ishqa atızında bir tu`ptin` o`zinde ha`r qıylı gezekte gu`llewshı shaqalardın` bolıwı sonnan. Ulıwma alganda jon`ishqa tamırındag`ı ko`zsheler kemip tamır o`le baslawının` na`tiyjesinde atızdag`ı na`l siyreklenip ketedi, jon`ishqa o`nimsiz bolıp qaladı. Usı jag`daydı boldırmaw ushın jon`ishqanı tu`pten tıqırlap orıw kerek.

**Jon`ishqa bedesin tayarlaw.** Qaraqalpaqstan jag`dayında jon`ishqa mallar ushın belok ha`m vitamin zatlarına bay otlardın` biri bolıp esaplanadı. Sebebi bede sostavında mallardın` organizmi ushın kerekli protein, amino-kislot, kaltsiy ha`m basqada zatlar ko`p. laboratoriyalıq jol menen jon`ishqa bedesinde 20,3 protsent protein 3 protsent may, 26,3 protsent kletchatka, 40,7 protsent azotsız zatlar ha`m 9,7 protsent kaliy, t.b. mineral duzlar bar ekenligi anıqlanadı. Sol ushın sıpatlı keltirilgen bede mallardın` barlıq tu`ri ushın bahalı ot-jem bolıp esaplanadı. Jon`ishqanı jaqsılap keptiriw ha`m saqlaw u`lken a`xmiyetke iye bolıp, bedenin`

sıpatı keptiriw usılına baylanıslı. Jaqsılap keptirilgen bede xosh iyisli, tu`ri ko`k sostavında tek g`ana 20 protsent ıg`allıq boladı. Sonın` menen bir qatarda, japıraq, g`umsha, gu`l tolıq saqlanıp, shan` ha`m shiriy baslagan paqal bolmaydı. Egerde bede sıpatsız keptirilse, la`m saqlansa joqarıda ayılğ`an belgiler bolmaydı, onday bede mallar ushın jug`ımlı ot bolıpta esaplanbaydı. Sol ushında orılğ`an jon`ıshqanı keptiriwde japıraq, gumsha, gu`l ha`m bedenin` ushları tolıq saqlanıwına jetisiw kerek.

Keptiriw dawamında japıraq ha`m o`simliktin` mayda bo`lekleri iri paqallarg`a qarag`anda tez quwraydı. Arnawlı ilajlar na`tiyjesinde keptiriw jumısı ustalıq penen o`tkerilse, jon`ıshqanın` barlıq bo`leklerinin` bir tegis kebiwine erisiw mu`mkin. Jon`ıshqanı keptiriwdin` en` jaqsı usılı-orılğ`annan keyin qısqa mu`ddet ishinde orılğ`an ko`k massanı quyashta soldırıw, keyin u`yinshik yamasa orılğ`an jon`ıshqanı shel formasında iz jaap keptiriw bolıp tabıladı. Ol ushın orılğ`an jon`ıshqa ornında bir neshe saat dawamında qaldırıladı, traktorg`a tirkelgen grabller ja`rdeminde shel formasında uzınına jınaladı. Jon`ıshqa bul halında 2-4 ku`n atızda jatqannan keyin kishi-kishi gu`dsheklerge jıynaladı. Gu`dshekler tolıq kepkennen keyin turaqlı saqlanatuğ`ın orıng`a tasıp alınadı. Egerde bede tolıq keppese, gu`dilengen orında shirip ketedi. Jon`ıshqa gu`dilenetug`ın orın atızdan awlaqlaw, biyik jerden tayarlanıp, abzalında fermanın` qaptalında bolıwı sha`rt. Uyinshiklerdi gu`dige jıynaw, shellengen transportta tasılıp, ha`r ku`ni tan` sa`ha`rden ku`n qızg`ang`a shekem dawam etiwı kerek. Jon`ıshqa bedesi gu`dilew jumısın arnawlı mexanizmler ja`rdeminde o`tkeriw kerek, ol ushın arnawlı gu`dilewshi mashina (stogmetatel) ha`r bir xojalıqta bolıwı sha`rt.

Jon`ıshqa bedesin presslewshi mashina menen tay jamsaw og`ada paydalı. Taylang`an jon`ıshqa bedesi saqlang`anda az orındı aladı ha`m transport penen uzq orınlarg`a jiberiwge de boladı. Orılğ`an jon`ıshqadan atızdı tez tazalaw jon`ıshqanı suwg`arıwdı keshiktirmewge tez oraqqa keltiriwge boladı. Sol ushın orıw, keptiriw, jıynaw ha`m atızdan tasıp alıw jumıları qısqa mu`ddette o`tkeriliwi tiyis.

**Jon`ishqa unı**-jon`ishqa bedesi sıpatlı keptirilgennen keyin onı tezlik penen bede unına aylandırıw onın` ot-jemlik bahasın burıng`ıdan da beter arttıradı. Sonlıqtan bededen arnawlı mashinada vitaminli untayarlaw maqsetke muwapıq keledi.

Jon`ishqa unı mallarg`a jug`ımlılıg`ı jagınan kontsentrat jemlerden qalıspaydı. Malga jug`ımlılıg`ı 1 kg jon`ishqa unında 0,65 azıq birligi bolıp, 26 protsent protein, 200-300 mg kg karotin, provitamin «A» boladı.

Jon`ishqa unın tayarlaw ushın «KHK-1,4» kosilka izmelchitelden paydalang`an durıs. Bir waqıtta orıw menen birlikte pritsepke jon`ishqa maydalanıp salıp jiberiledi. Orıw boyınan tez keptiriletug`ın jerge jetkeriw jon`ishqanın` sostavındag`ı protein karotin zatlarının` sepsimewin saqlaydı.

«AVM 0,4», «SV-1,5», «AKB-Fe» keptiriwshi agregatları orılğ`an jon`ishqanı keptiriwde u`lken a`hmiyetke iye. Ol ushın maydalang`an jon`ishqa 30 mm uzınlıqtan aspawı sha`rt. Sebebi uzın kesilgen ko`k jon`ishqa massası agregat barabanların ku`dirip jiberedi. Tayarlang`an jon`ishqa unın qag`az qaltalarda saqlaw yarım jıl ishinde 50-75 protsent karotin zatın joyıtadı. Sol ushın jon`ishqa unın antioksitek santoxin preparatı menen obrabotka etiw 1,5-2,0 ese karotinnin` kemeyip ketiwinen saqlaydı. Santoxin preparatının` norması 200 gr bir tonna jon`ishqa unına jeterli ekenin ilimpazlar da`lilledi. Santoxin menen 30 kg texnicheskiy (1 sort) maydı aralastırsa, jaqsı na`tiyje beredi.

Senaj tayarlaw-senaj ot-jemnıń tu`ri, ol a`dettegi siloslang`an jemge qarag`anda ashqıltımlıg`ı kemirek ha`m da`mlirek qa`siyetleri jag`ınan taza ko`k massag`a jaqın boladı. Senaj bastırıwda sho`ptin` ıg`allıg`ı 45-55 protsent bolıwı kerek.

Pu`tkil mal sharwashılıq institutının` mag`lıwmatlarına qarag`anda 1 metr kub senajda zatlar ta`biyiy ıg`allıqtag`ı-o`simliklerden tayarlang`an silostı 1,4-1,5 ese ko`p, 1 kg senajdın` jug`ımlılıg`ı 0,35-0,5 jem birligine ten`, al silosta bolsa 0,16-0 jem birligine ten` boladı. Senajdın` 1 kg 50-60 g protein, 30-50 mg artıg`ıraq karotin boladı.

Senajdı tayarlaw ha`m saqlaw waqtında azıqlıq zatlardın` ulıwma jog`alıwı ko`k sho`ptegi azıqlıq zatların` 10-12 protsentine ten` boladı, al bul silosta 15-25 protsentke jetedi.

Senaj tayarlawda atmosferalıq hawa ızg`ardın` kiriwinen onı isenimli tu`rde aman saqlag`anda g`ana sapalı senaj alıwg`a ha`m onı uzaq waqıt saqlawg`a boladı. Bug`an germatikalıq jemxanalardı qollanıw arqalı erisiwge boladı. O`simliklerdi qambag`a salıp bastırıw 3-4 ku`nde isleniwi kerek.

Qaraqalpaqstan jag`dayında senajdı saqlaw ushın ultanınan eni 4 metr, u`stin`gi jag`ının` eni 5-6 metr, biyikligi 2-2,5 metrden, uzınlıg`ı 10-15 metrlik betonlang`an qambalardı qollanıwg`a boladı. Jer u`stine islengen waqıtta jerdin` u`stine diywal salıp, diywaldın` sırtın hawa kirmewi ushın bitum eritpesi menen sıbap (25 protsent bitum BN-III ha`m 75 protsent benzin) ha`m qulamawı ushın sırtı topıraq penen ko`miledi.

Orıw mexanizmleri-senaj tayarlawda jon`ıshqanı orıw ushın barlıq tiptegi kosilkalardı qollanıw mu`mkin. Solardın` ishinde KZN-2,2, KS-2 kosilkaları boladı. Orılg`an sho`ptin` ıg`allıg`ı 55-60 protsent bolg`an waqıtta grabiller GBU-6,0 GVK-6,0 agregatları menen jıynaladı.

Jıynalg`an sho`pti mashina ha`m telejkalarg`a tiyew ushın PU-0,5 ha`m stogmetan agregatları qullanıladı. Egerde 1 hektarda ko`k massanın` zu`ra`a`ti 10 tonnag`a shekem bolsa yamasa zu`ra`a`tliligi onnan da az bolsa bir waqıtta grabillerdi 1 sektsiyada isletiw kerek.

Solıg`an gu`dini gu`dishekten alıw ha`m onı maydalaw bir waqıt ishinde podborshikli eki maydalag`ısh penen ju`rgiziledi. O`ytkeni, olardın` is o`nimi sho`p orıw mashinalarına qarag`anda kemirek. Podborshik usag`an markalardan paydalanıladı. Jon`ıshqanı jıynap alıw ha`m maydalaw ushın kesiw apparatların` ornına podborshik ornatılğ`an silos jıynaw kombaynları KS-2,6; KS-1,8 «Vixr» qullanıladı. Maydalang`an massanı saklanatug`ın orıng`a shashıw bortı biyik samosvaldı traktor telejkaları ha`m ju`kti tu`siriw ushın troster menen u`skenelengen ju`k avtomashinaları qullanıladı. Senaj tayarlaw waqtında qambag`a

toltırıw texnikasının` ot-sho`pti siloslawdan ayırmashılıg`ı joq, biraq tıg`ızlap bastırıw ha`m jemge hawa kirmeytug`ın etip bekitiw protsesslerinin` ha`mmesi anag`urlım ko`birek puxta islenedi. Massanı tıg`ızlaw (T-100 yamasa DT-75, DT-4, T-74) traktorları menen ju`rgiziledi. Sho`p toltırılğ`an qarımlardın` u`stin traktorlar menen bastırıp, tıg`ızlaw isin jumıstı toqtatpastan ha`m tasıw aralıg`ında u`ziliske islemey ju`rgiziw kerek. Massanı tıg`ızlawdın` temperaturası 39 gradustan joqarı koterilse, onda tıg`ızlawdı ku`sheytip, qambanı tez toltırıw ha`m onı hawa kirmeytug`ın etip bastırıw kerek. Qamba to`ppeleme etip toltırıladı. Hawa kirmeytug`ın etip bedenın` u`stin qalın`lıg`ı 80-100 santimetr etip jen`il siloslanatug`ın o`simliklerdin` solımag`an menen maydalang`an ko`k massa menen bastırıp puxta basqılap tıg`ızlaw kerek.

Jaqsı tegislengen ha`m tıg`ızlang`an massanın` u`sti polietilenli yamasa xlorfinilovoy plyonkalar menen jabıladı. Sanaatta pl1nkalardın` eni 1,2 metrden 3 metrge shekem shıg`arıladı. Plyonka qambanın` uzınınan ha`m eninen u`stinen esaplag`anda 2,5-3,0 metr shıg`ıw kerek. Plyonkanın` u`stine 30-50 santimetr qalın`lıqta topıraq salınadı. Bastırması qaqqaq ta`rizli etip ha`r qambanın` do`geregine qarıq yamasa salma qazıladı.

Plyonkalardı bir-biri menen arnawlı kley menen biriktiriwge boladı. Qızdırılğ`an utyug penen gazlı yamasa benzinli gorelka menen kepserlewge boladı.

Plyonkalar kepserlengende shetleri tuwrı biriktirilip, ustine felefon yamasa qagaz qoyılıp qozdırılğ`an utyug penen ju`rgiziledi.

Senaj etip bastırılıp atırgan massanı o`lshew kerek. T-100 traktoru menen tıg`ızlang`an qambdag`ı 1 metr senajdın` salmag`ı 450 kg ten` boladı. Tayar senajdı alg`an waqıtta qambanı tolıq ashıp taslaw usınılmaydı.

Qamba bir shetinen 1-2 metr ko`leminde ashıladı, senaj onın` joqarısınan ultanına shekem arnawlı pıshaqlar menen kesip alınadı ha`m malxanalarg`a traktor telejkaları menen alıp barıladı.

Senajdı mallarg`a beriw ta`rtibi: Qara mallar ushın senaj 1 syırg`a sutkasına 20-30 kg mug`darında beriledi, 2 aydan 6 ayg`a shekemgi jas to`llerge

sutkasına 2-4 kg, 6 aydan bir jasqa shekemgi mallarg`a 6-10 kg jılınan asqannan keyin 10-15 kg ana qoylarg`a 3-4 kg, al qozılarg`a 2 kg beriliw kerek.

3.3. Jon`ishqa tuqımgershiligi

Ilimpazlar aldına Qaraqalpaqstan jag`dayına beyimlesken joqarı da`rejede belok, protein ha`m tag`ı basqa da mol o`nimdarlı jon`ishqa sortın shıg`arıw, respublikanın` xojalıqların elita tuqımı menen ta`miynlewden ibarat. Usı wazıypalardı inabatlı orınlaw ushın ilimpazlar respublikada rayonlastırılğ`an jon`ishqa sortların` o`nimdarlılıg`ın tag`ı da ko`beytiw u`stinde ha`m taza sortlardı tabıw u`stine izertlew jumısın alıp barıwda.

Qollanılatus`ın tiykarg`ı metod jon`ishqanın` sortların shag`ılıstırıw-gibridizatsiya jasaw jolı bolıp esaplanadı. Usı maqset ushın barlıq jon`ishqa egiletug`ın zonalardan sortlar alınadı ha`m sol sortlar ilimge paydalanıladı. Qoldag`ı bar kollektsiya jon`ishqanı gu`zgi ha`m ba`ha`rgi egislerde egiw usılı menen izertlenedi, bulardın` suwıqqa ha`m duzg`a shıdamlı tu`rlerin tan`lap alıw jolı menen selektsiya jumısı isleniwde. Ta`jiriybe alıp barılıp atırğ`an jerdin` mexanikalıq sostavnın` ortashalıg`ı duzlılıg`ı, jer astı suwının` teren`ligi 2-3 metrge jetiw-jetpewi tekserilip ko`riledi. Jerdin` ayırmashılıg`ı mol o`nim jetistiriwge u`lken ta`siri bar jerler edi. Bul jerde az mug`darda duzı bar jerden kebirlesip ketken og`ada duzlı jerge deyin ushırasadı.

Sort aralıq jon`ishqa gibrizatsiyasında atalıq ha`m analıq sortların saylap alıp shag`ılıstırıu`da u`lken a`hmiyetke iye. Sort aralıq jon`ishqa gibrizatsiya metodında analıq etip rayonlastırılğ`an jergilikli kesh piser sortlar, al atalıq etip tez piser ha`m xojalıqqa baxalı sortlar gu`zgi, ba`ha`rgi o`siw morfologiyalıq ha`m biologiyalıq gu`zgi ha`m ba`ha`rgi qa`siyeti menen ayrılatus`ın tu`rin aldıq.

Kollektsiya pitomniginen en` bahalı sortlardı selektsiya pitomnigine alıp sort aralıq shag`ılıstırıw jumıs islenedi.

Barlıq kombinatsiyadag`ı shag`ılistırıw na`tiyjesinde alıngan gıbrıd tuxımlar qısta teplitsada egılıp, al ba`ha`rde birewden qaldırılıp, selektsiya pitomnigine ko`shiriledi. Ol tuxım ushın ekinshi yaki u`shinshi jıl o`siw da`wirinde qaldırıladı. Gıbrıdın birinshi, ekinshi a`wladlarına baha beriw ko`p jıllıq o`simliklerdin` sort sınaw metodına tiykarlanıp alıp barıladı. Jon`ıshqanın` o`nimdarlıg`ına barlıq o`lshenip islengen qıytaqlardan orıp alıng`an bedenın` awırılıg`ı menen anıqlanadı.

Sort aralıq birinshi ha`m ekinshi a`wladlardan alıngan tuxımın` ha`m bedenın` o`nimdarlı ekenin xojalıqlar jaqsı bahaladı. Erkin sort aralıq gıbrıdzatsiya ushın saylanadı ha`r qıylı ellerden alıng`an sortlar metodı jon`ıshqanın` o`nimdarlı tu`rin bay qa`siyetke iye etip taza sort tabıwda paydalı metod bolıp esaplanadı. Izertlewlerde tastıyqlanıyama karag`anda: «Xiywa», «Semirechensk», «Tashkent 721» sortları analıq tu`rinde alınsa jaqsı na`tiyje beredi. Erkin sort aralıq shanlanıw uzaq akklimatizatsiya usılı menen alıng`an sortlar menen bir qatar rayonlık sortlar o`zinin` o`nimdarlıg`ı menen Xiywa jon`ıshqasınan artıq boladı. Erkin sort aralıq shan`lanıw, uzaq akklimitizatsiya, sonın` menen birge gu`zgi, ba`ha`rgi qaytalap egıw usılı menen alıng`an sortlar o`zinin` o`nimdarlıg`ı menen Xiywa sortınan artıq boldı.

Solay etip «Qaraqalpaq-1» ha`m «Qaraqalpaq-15» sortı basqa sortlarg`a qarag`anda xojalıqqa bahalılıg`ı boyınsha barlıq jag`ınan joqarı ekenligin tastıyqladı. Jon`ıshqanın` bul jan`a sortınin` ortasha zu`ra`a`tliligi 140-155 tsentnerden bede ha`m 3-4 tsentnerden tuxım jetistiriw mu`mkinshiligine iye.

«Qaraqalpaq-1» taza sortı basqa sortlarg`a qarag`anda barlıq xojalıq bahaları boyınsha alda turadı. Mısalı: bede o`nimin salıstırğanda «Qaraqalpaq-1» sortı Xiywa sortınan 3,6 protsent, al «Xiywa» «Yubiley», «OSh-37» sortlarına qarag`anda 14,9 protsent mol o`nim bergen. Sonın` menen birge qısqa shıdamlıg`ı 55 protsentke deyin ha`m duzg`a shıdamlıg`ıda artıq bolıp esaplanadı.

Tuqım jon`ıshqa agrotexnikasının` ayırmashılıqları. Ha`zirgi waqıtta jon`ıshqa tuqımın ko`beytiw, onı durıs sho`lkemlestirip, egis ko`lemin ken`eytiw,

onı durıs sho`lkemlestirip, egis ko`lemin ken`eytiw agrotexnikada bas wazıypalardıń biri bolıp esaplanadı.

Respublikamızda jon`ıshqa tuqımın ko`beytiw minnetlemesin orınlawdın` tolıq mu`mkinshilikleri bar, ol ushın selektsiyalıq ha`mde rayonlastırılǵan jon`ıshqa sortların jaqsartıw arqalı sortlı konditsiyalıq tuqımdı ko`beytiw za`ru`r bolıp otır.

Egislik sıpatı jaqsı joqarı sortlıq tuqımlar tayarlaw ilimiy mekemeler ta`repinen islenip shıǵ`ılǵan sxemada o`tkeriliwi tiyis:

Birinshi etap- Jon`ıshqanın` superelita ha`m elita tuqımın tayarlaw.

Bul wazıypa mekemelerde o`tkeriliw tiyis bolıp, avtonomiyalı respublikamızda Qaraqalpaqstan diyxansılıq ilim-izertlew institutına ju`klengen.

Ekinshi etap - jon`ıshqa tuqımının` birinshi reproduktsiyasın tayarlaw. Ilimiy mekeme tayarlag`an elita tuqımın respublikanın` tuqımshılıq kolxoz, sovxozlarında ko`beytiw jolı menen birinshi reproduktsiya tayarlanadı.

**U`shinshi etap** - reproduktsiya tuqımshılıq xojalıqları o`ndirgen birinshi reproduktsiyadan ekinshi reproduktsiya tayarlanıp, usı tuqım menen barlıq xojalıqlar ta`miynlengen. Usınday usıl menen tayarlang`an jon`ıshqa tuqımı jay tuqımg`a qarag`anda ko`p zu`ra`a`t beretug`ın joqarı sapalı egislik a`hmiyetke iye boladı. Tuqım tayarlaw ushın tiykarınan eki jıllıq yamasa ko`p jıllıq jon`ıshqalardan paydalanıladı.

Qaraqalpaq diyqansılıq ilim-izertlew institutı, xojalıqlarının` is ta`jiriybeleri hawa rayı ha`m topıraq jag`dayına baylanıslı Qaraqalpaqstannın` barlıq rayonlarında birinshi oraqtı tuqımg`a qaldırǵanda birden u`shke, al ekinshi oraqtı qaldırǵanda bir-eki ret suwg`arıw jon`ıshqadan joqarı zu`ra`a`t alıwdı ta`miynleytug`ın ko`rsetti. Tuqım jon`ıshqanı jay tu`rdegi senokosilkalar menen orıw, grabiller menen jıynaw qattı qadag`an etiledi, sebebi usı usılda orıw jıynaw jumısın o`tkeriwde zu`ra`a`ttin` 50 protsentten aslamı zaya bolıwı mu`mkin. zu`ra`a`tti sepsitpey jıynap alıw ko`p o`nim alıwdagı baslı wazıypalardıń biri.

Sonlıqtan tuqım jon`ishqanın` ha`dden tıs pisip ketip sobıqlarının` to`gilip qalmawı ushın o`z waqtında orıp alıw kerek.

Tuqım jon`ishqanı shıyrshıg`ının` sorttan u`sh bo`legi yaki 75 protsenti pisken waqıtta orıw kerek. Tuqım bul waqıtta sarg`ish ren`ge enip, barmaq penen qısqanda qolg`a qattı tiyedi.

Tuqım jon`ishqanı orıp alıw ushın iykemlestirilgen kombaynlar, jatkalar ha`m jon`ishqanı kishi kishi gu`dilerge jıynap ketiwshi platformalar menen u`skenelengen senokosilkalar jumsaladı. Ha`r bir xojalıq bul ma`wsimge arnalğan mexanizmlerdi aldın ala remontlap, jumıs waqtında onnan durıs ha`m o`nimli paydalang`an jag`dayda g`ana jon`ishqa tukımının` zaya bolıwına jol qoymaydı, onnan mol zu`ra`a`t jıynap aladı. Pisip jetilgen jon`ishqa tuqımın jıynap alıwdın` birinshi usılı-ayrım jıynap alıw.

Bunda da`slep tuqım jon`ishqa: «KSX-2,1» yamasa «K-2,1» senokosilkasına «PB-2:1» mashinası tirkelgen jag`dayda orıladı. Son` da`steler kepkennen keyin ju`rip tu`yekleytug`ın «SOK-4» «SKP-4» kombaynlarına jon`ishqa tukımının` paqalın jıynaytug`ın PTS mexanizm tirkelip tu`yeklenedi.

Eger «PB-2,1» mashinası bolmagan xojalıqlar «JBN-35» yamasa «JNR-4» mashinalarınan paydalanıwına boladı. Sonday-aq ha`rbir xojalıq o`zinin` qolına bar orıw mashinaların jon`ishqa tukımın jıynap alıw ushın qayta o`zlestirip alıp jumsasada boladı, ol kıyın emes.

Tuqım pisip jetilgennen keyin sobıqları kewip, sa`l na`rse tiygennin` o`zinde-aq da`ni to`giletug`ın jag`dayg`a keledi. Sonlıqtan tuqım jon`ishqalardı azang`ı waqıtları shıq keppesten burın orıp jıynaw kerek.

Ekinshi usıl- birden jıynap alıw bolıp, bul usıl tukımg`a qoyılğ`an jon`ishqa siyrek, jartıwlı da`ste tu`speytug`ın jag`dayda qollanıladı. Bul usıl menen jıynaw ayırım jıynap alıwg`a qarag`anda keyinirek kirissey, yag`nıy jon`ishqa tukımının` sobıqları 80 protsent qarawıtqanda baslasa boladı. Tuqım jon`ishqanı kelte jig`ilmagan ha`m siyrek uchastkalarda «SKA-8», «SKA-4» da`n kombaynları menen orıp tu`yeklewge boladı. Birden jıynap alıwg`a kombaynnın` orıp ha`m

tu'yeklegen is da'wirinde ayırım pispegen tuqımlardıń sonday-aq la'mlikten jumbarshaqlanıp qalğan tuqımlardıń ulıwma zu'ra'a'tin qızdırıp, onıń sapasın buzıp jibermeui ushın bunkerden alıng'an tuqım juqa etip jayılp, kuyashqa keptiriliwi kerek. Bunnan keyin tu'yeklew waqtında ezilmey qalğan sobıq shıyrshıqları ısıw mashinasınan o'tkerilip, basqa shıyrshıqları ısıw mashinasınan o'tkerilip, basqa shıyrshıqlarday etip «OSM-3,4» sortlaw mashinası menen tazalanadı. Merez sho'plerinin` tukımınan tazalap, onı konditsiya da'rejesine jetkeriw ushın en`aldı menen «kuskuta» mashinasında tazalap, keyninen «EMS-1» markalı elektromagnitli mashinadan o'tkeriw kerek. Tuqım jon`ıshqanı orıp jıynawda, tu'yeklewde, tazalawda karantinli jabayı sho'plerdin` tuqımlarınan tazalawda gu'lla'n mashinalardıń sapalı remontlawına ha'm onı sarras isletiwge ayırıqsha a'hmiyet beriliwi tiyis. Eger orıw-jıynaw mashinaları sapasız remontlang'an bolsa, orıp-jıynap atırg'an waqıtta-aq ju'da` qımbat bahalı jon`ıshqa tuqımın zayalaydı. Bul o'nimnin` o'zine tu'ser baxasın qımbatlatadı. Bug'an jol qoymaw kerek.

3.4. Jon`ıshqa zıyankesleri ha'm keselliklerine qarsı gu`res jolları

Joqarıda aytıp o'tilgenindey, jon`ıshqa o'simligi o'zinin` fiziologiyalıq rawajlanıwı, denesindegi bioximiyalıq quramnın` unamlı ta'repleri sharwa mallarına jug`ımlı ot-jem retinde qollanıluwı, topıraqtın` o'nimdarlılıg`ın arttırıw menen birge, qorshag'an ortalıqtın` hawasın tazalawda a'hmiyeti u'lken. Sonın` menen bir qatarda, jon`ıshqa o'simligi o'zine ta'n jag`ımlı iyis taratıwı, ıg'allıqtı ku'tilgen da'rejede saqlawı usag'an qa'siyetlerine iye o'simlik. Sonlıqtan, jon`ıshqa ko'gerip shıg`ıwdan baslap gu'llew da'wirine shekem atızdag`ı mikroklimattın` jaqsı bolıwı sebepli biotsenozda bir qansha mayda ja'nliklerdin` toplanatug`ınlıg`ı, olardıń rawajlanıwının` belgili bir payıtları usı jon`ıshqa biotopında o'tetug`ınlıg`ı, son`ınan o'zleri ushın tiykarg`ı azıq ornı esaplang'an

eginlerge tarqalıp ketiwi, al jon`ishqa eginini tiykarg`ı jasaw ornı bolg`an tu`rlerdin` usı biotopta jasap qalıwı eginge bir qansha zıyan beriwi menen juwmaqlanadı.

Jon`ishqa egininde, tiykarınan, Fitonomus qon`ızı, Tixius, bruxofagus, jon`ishqa pitesi ha`m jon`ishqa shırınjaları rawajlanıp ko`beygen halda, ko`plep zıyanın tiygizedi.

**Fitonomus qon`ızı** (*Phytonomus variabilis* \*rbst), jon`ishqa o`simliginin` japırag`ı menen azıqlanatug`ın, kemiriwshi, qa`wipli zıyankes esaplanadı. Erjetken qon`ızdın` u`lkenligi 4,5-7,0 mm bolıp, ju`da` ha`reketshen`. Ren`i sarg`ish-sur, qattı xitinlang`an qanatlarının` u`stinde uzınına aqshıl ren`li sızıqshaları bar. Awız bo`limi bası menen birge aldığ`a sozılıp jaylasqan, onın` eki ta`repinde iymekshe ta`rizli jeti buwıng`a bo`lingen murtshaları bar. Analıqlarının` denesi erkegine salıstırğ`anda irilew. Ma`yekleri mayda (0,5-0,6 mm), ren`i ashıq sarı. Embrional rawajlanıw tamamlang`annan son` ma`yekten bası qaraltım, denesi siyrek tu`ksheler menen qaplang`an, ulıwma ko`rinisi qon`ır-ku`l ren`li, sarg`ish yamasa ko`kshil qurtları shıg`adı. Fitonomus qon`ızı qurtlarında ayaqları bolmaydı, olar dene buwınların ha`reketke keltiriw arqalı qozg`aladı ha`m jılısadı. Japıraqtag`ı qurtlar jerge tu`sip ketse, qaytıp o`rmeley almaydı. Kurtları tolıq azıqlanıp bolg`annan keyin sol jerdegi japıraq yaki paqalg`a jabısıp, jipekshe ishinde quwırshaqqa aylanadı. Quwırshag`ının` du`zilisi sharsiman, ren`i ashıq ko`kten qaramıl ko`k boladı. Atızlarda g`alaba quwırshaqqa aylanıw ju`z bergende, o`simliktegi aq shilter ta`rizli aqshıl jipeksheler alıstan jiltırap ko`zge tu`sedi.

Zıyankestin` erjetken qon`ızı atız shetlerinde, jap-salma boylarındag`ı o`simlik qaldıqları astında qıslap shıg`adı. Ba`ha`rde hawa temperaturasının` ortasha +12°S qa ko`teriliwi menen fitonomus qon`ızları qıslawdan shıg`ıp, o`sip baslag`an jas jon`ishqa japırag`ı menen qosımsha azıqlanıp shıqqan son` ha`reketlene baslaydı.

Issılıqtın` turaqlı ko`teriliwinin` na`tiyjesinde, yag`nıy aprel aylarının` basında fitonomus qon`ızı analıqlarının` jınısıy jetilisiwi ju`z berip, atalığ`ı menen

juplasadı ha'm jas jon'ishqa paqalların tesip, sonın' ishine 4-8 danadan ma'yeklerin qoyadı. Ortasha hawa temperaturası 20-25°S bolıwı analıq qon'ızlardın' ayırıqsha aktiv ha'reketleniwin ta'miyinleytug'ın birden bir faktor esaplanadı. Usınday qolaylı sharayatta ha'r bir analıq qon'ız 2500 danag'a shekem 50 ku'n dawamında ma'yek qoyadı. Ma'yek qoyılğ'annan son' 8-10 ku'n ishinde ma'yekten qurtları shıg'ıp, da'slep paqaldın' ishinde jasırın tu'rde, al orta jasqa shıg'ıwı menen ashıq tu'rde japıraqlarda azıqlanıwg'a o'tedi. Bul payıtlar may ayının' ishine tuwra keledi. Usı da'wirde zıyankeske qarsı gu'res ilajları o'tkerilmese, 7-10 ku'n ishinde o'simlik japıraqları shilter ta'rizli tu'ske enip sezilerli da'rejede zıyan ko'redi. Zıyanlang'an o'simlik o'siwden toqtap, jer u'sti bo'limi nabit boladı. Azıqlanıp toying'an u'lken jastag'ı qurtları quwırshaqqa aylanadı. Quwırshaqlardıń rawajlanıwı dawam etip, onnan erjetken qon'ızlar shıg'ıp, azıqlanıp baslaydı. Lekin, temperaturanın' ha'dden tıs ko'teriliwi, ıg'allıqtın' to'menlep ketiwi na'tiyjesinde qon'ızlar jazg'ı tınıshlıq halına (diapauza) o'tip aladı.

Fitonomusqa qarsı agrotexnikalıq gu'res ilajları. Jon'ishqa egisi ushın atızlardı tayarlag'anda, buring'ı go'ne tu'bir jon'ishqası bar atızlardan a'dewir qashıqlıqtan tan'law kerek boladı. Sebebi, go'ne tu'bir jon'ishqa atızının' ishinde ha'm a'tirapındag'ı o'simlik qaldıqlarının' astında fitonomus qon'ızı qıslap shıg'ıp, a'taraptag'ı jon'ishqa atızlarına tarqaladı. Sonın' ushın jon'ishqanın' keyingi orag'ı waqtında barınsha to'mennen org'an maqsetke muwapıq boladı.

Erte ba'ha'rde, mart ayının' ekinshi yarımında go'ne tu'bir jon'ishqanı uzınına ha'm kesesine diskalap yamasa tırmalap, kerekli mug'darda to'gin berip, keyin suwg'arılса, zıyankestin' qıslap shıqqan tiykarg'ı bo'legi jon'ishqanın' birinshi orag'ı waqtında rawajlanıp u'lgere almay, zıyanlılıg'ı kemeyedi. Jon'ishqanın' birinshi orag'ı may ayının' ekinshi yarımında tolıq orıp, jıynap bolınıwı kerek.

Jon`ishqada ushırasatug`ın zıyankesler menen keselliklerge qarsı gu`res usılların o`z-ara sa`ykes tu`rde alıp barg`an waqtımızda g`ana olar unamlı na`tiyje berip, o`simlikten joqarı ko`k massa ha`m tuqım o`nimin jetistiriwge boladı. Ot-sho`p o`simlikleri egisliklerinde ekologiyalıq ha`m sanitariyalıq talaplarg`a muwapıq ximiyalıq birikpelerdi qollanıw sheklengenligi sebepli, olardı zıyankes ha`m keselliklerden qorg`aw ilajlarının` ishinde jetekshi orınlardı agrotexnikalıq usıllar iyeleydi.

Zıyankes ha`m keselliklerge qarsı gu`resiwdegi agrotexnikalıq usıllar: almaslap egiw - jon`ishqa egiletug`ın barlıq zonalarda ken`nen qollanıw`a sha`rt bolg`an agrotexnikalıq ha`m xojalıq-sho`lkemlestiriw bag`darlarındag`ı tiykarg`ı ilajlardan bolıp esaplanadı. O`simliklerdi ilimiy ko`rsetpelerge muwapıq, durıs almasırlılıp ekken waqtımızda olardıń o`sip ha`m rawajlanıwları ushın qolaylı, jaqsı bolg`an jag`daylar tuwdırıladı, zıyankeslerdin` sanları azayadı, bularg`a tiykarınan, jon`ishg`a iykemlesken fitonomus, jon`ishqa yaki akatsiya shırınjası, jon`ishqa pitesi h.t.b. usag`an zıyankesler jatadı.

Jon`ishqa o`simligi ushın olardan burın egiletug`ın o`simliklerge - qatar araları islenetug`ın atızlardı jabayı sho`plerden tazalaytug`ın ha`m mineral to`ginler beriletug`ın o`simlikler jatadı.

Ko`pshilik rayonlarda jon`ishqa aldınan tuqımgershilik, dala ha`m ot-sho`plik almaslap egiwindegi o`simlikler egilgeni jaqsı na`tiyje beredi. Sonın` menen bir qatarda, tuqımgershilik egislerinin` basqa sobıqlı o`simlikler egislikleri menen o`z-ara -1-1,5 km bolg`an kerekli qashıqlıqların saqlaw kerek boladı. Bul usıl jon`ishqa egisliklerinde ha`m basqa-da bir ha`m ko`p jıllıq sobıqlı o`simlikler egisliklerinde toplanatug`ın zıyankes ha`m kesellikler tarqalıwın azaytadı.

Egerde xojalıqta jon`ishqa tuxımı ushın ajratılğ`an tuqımgershilik egislikleri bolmasa, ol waqıtlarında, jon`ishqa o`simliginin` jaqsı, qalın` rawajlang`an, zıyankes ha`m kesellikleri joq bolg`an, tegis ha`m bir yamasa eki jıl dawamında

ko`k massa yamasa bedede tayarlaw ushin orıp aling`an atızlardı tuqım tayarlaw ushin qaldırıwǵa boladı.

Jon`ishqa egisliklerinin` paydalanıw waqıtlarının` ko`beyiwi menen olardıń egisliklerindeki toplanatug`ın o`simlikke qa`liplesken zıyankes ha`m keselliklerdin` mug`darı ortasha esap penen 50-70 % ke deyin ko`beyetug`ınılıǵı belgili. Sonlıqtan-da, jon`ishqa atızların jıl dawamında bedede, ko`k massa ha`m tuqım tayarlaw ma`pleri ushin gezeklestirip paydalanıwlarımız kerek.

Topıraqtı islew. Jon`ishqa o`simligi o`zinin` egilgen jılları dawamında jabayı sho`plerge qarsı turıw mu`mkinshiligi to`men bolǵanlıqtan, olardıń egislikleri ushin tiykarg`ı ha`m egis aldı topıraqtı islew jumısların atızlardag`ı jabayı sho`plerge qarsı gu`reske bag`darlaw kerek.

Jon`ishqashılıqqa ajratılǵan atızlarda aldın ala egilgen o`simliklerdi orıp alg`annan son` topıraqtı jetkilikli mug`darda ıǵallıq toplanǵan bolsa, gu`zde topıraqtı lushilnikler menen islew, son`ınan sol zonalar ushin anıqlanǵan teren`liklerde jerlerdi shu`digarlaw kerek. Topıraqtı teren` su`rgen waqtımızda topıraq quramındag`ı toplanǵan ko`pshilik zıyankesler topıraq betine shıǵıp qaladı ha`m usı jerlerde olar quslar ta`repinen joq etiledi. Qalg`an zıyankeslerdin` ma`yekleri ha`m qurtları menen o`simlik qaldıqları topıraqtın` teren` qatlamlarının` astına tu`sip, nabıt boladı.

Topıraqtın` suw-hawa jag`dayların jaqsılaw ushin ha`mde ondag`ı zıyankeslerdin` mug`darın to`menletiw ushin, kesellikler toplanǵan jerlerdi qurtıw ha`m jabayı sho`plerge qarsı gu`resiw retinde gu`zgi shu`digarlang`an jerlerdi erte ba`ha`rde kultivatorlar menen islew kerek. Suwg`arıp egiletug`ın zonalarda tiykarınan, erte ba`ha`rdegi ıǵallıqtı saqlap qalıw ushin o`tkerilgen tırmalawdan son` atızlardı shayıp suwg`arıw kerek ha`m son`ınan egis aldı kultivatsiyasın tırmalaw menen birge o`tkeriw kerek boladı.

Jon`ishqadan aldın egilgen ha`m ko`k massag`a yamasa bedede tayarlaw ushin orıp aling`an o`simliklerdin` astına gektarına 20-30 kg mug`darında organikalıq

to`ginler beriliwi kerek. Jon`ishqanı egiw aldınan birinshi jılı gektarına 30-35 kg mug`darında fosfor elementi beriliwi kerek ha`m usı mug`darda kaliy elementi beriledi, egerde ekinshi jılı jon`ishqashılıqtı tuqım ushın qaldırğ`an jag`dayda gektarına 30-40 kg mug`darında fosfor ha`m kaliy elementlerin qosımsha azıqlandıırıw retinde bergen maqul boladı.

Ayırım waqıtları jon`ishqa tuqımların jazg`ı waqıtları, olardıń ko`geriwine ha`m o`sip-rawajlanıwları ushın qolaylı jag`daylar bolg`anda egedi, bul waqıtları jon`ishqa egilgen atızlarda tolısıp o`semen degenge shekem zıyankes ha`m keselliklerdin` ta`sirleri to`menleydi.

Jon`ishqanın` taza egislikleri 3-4 ma`rtebege ko`p mug`darda zıyankes ha`m kesellikler menen zıyanlanadı, sonlıqtan, olardıń masaqlı o`simlikler menen birge egilgeni maqul, bul ushın bizin` jag`dayımızda arpa yamasa biyday o`simliklerin qollanıwg`a boladı.

Jon`ishqanı tegis ekken waqıtlarında gektarına 8-10 kg mug`darında tuqım egiletug`ın bolsa, al ken` qatarlı ekken waqıtlarımızda egiw norması – 6-7 kg dı quraydı. O`simliktin` zıyankesler menen keselliklerge qarsı turıw mu`mkinshiligin joqarılıtıw ushın suwg`arıw normaların optimal jag`dayda beriw, egislikti siyreklew qa`liplestiriw yamasa ken` qatarlı etip egiw kerek boladı. Jon`ishqanı bir tegis atızlarg`a egiw ha`m son`ınan katok basıw jaqsı na`tiyje beredi.

Jon`ishqa o`simliginin` tuqımın ekken waqıtları aldın ala arpa yamasa biyday tuqımların egip bolg`annan son` jon`ishqa tuqımın olardıń egiw bag`darlarına keselep egiw kerek. Tuqımınin` egiw teren`ligi 3-4 sm etip egisten burın, ha`m ekkennen keyin katoklap, topıraqtı tıg`ızlaw kerek ekenligi o`ndiris praktikası arqalı da`liyllengen.

Jon`ishqanı orıp alıw olrdın` usı zonalarg`a sa`ykes bolg`an ilimiy ta`repten anıqlang`an waqıtlarında iske asırılıwı kerek. O`simlikti erte orıp alıw tek g`ana olarda zıyankesler menen keselliklerdin` mug`darı belgilengen normadan asıp ketken waqıtlarında yamasa egisliklerde sarı sho`pler ko`beyip ketken waqıtlarda

g`ana ruxsat etiledi. Jon`ishqanı orıp alıw mug`darı yamasa sanı olardıń agrotexnikasının` sapasına, suwg`arıw sapalarına, sortlarına, jon`ishqanın` jasına ha`m sol zonadag`ı qa`liplesken hawa-rayı jag`daylarına baylanıslı boladı.

Jon`ishqanı o`z waqtında ha`m tez waqıt ishinde orıp alıw olardag`ı zıyankeslerdin` mug`darın azaytadı, olardıń bir bo`legi mexanikalıq ta`sirlerden o`ledi, ku`n nurının` tuwrı tu`siwlerinin` ta`sirinen ha`m orıp alg`annan son`g`ı suwg`arıwlardın` ta`sirinen joq boladı. Zıyankes qurtları ha`m quwırshaqları orıl`an jon`ishqa massasının` kebiw da`wirinde nabıt boladı. Orıp-jıynawdın` keshigiwlerinin` sebebinen o`simliktin` o`nimdarlıg`ı to`menlep qoymastan, olardıń sapasının` to`menlep ketiwine alıp keledi, ja`nede, zıyankeslerdin` rawajlanıwları ushın qolaylı jag`daylardın` uzaqlıg`ın arttıradı, keselliklerdin` tarqalıwına qolaylı jag`daylardı payda etedi ha`m o`simlikte zamarrıqlı awırıwlardı ko`beytedi. Jon`ishqa egisliklerindeki ushırasatug`ın zıyankeslerdin` o`zlerinin` biologiyalıq ayırmashılıqlarına baylanıslı, o`simlikti birinshi orıp jıynap bolg`annan son` jılına bir ret a`wlad beretug`ın fitonomus ha`m tixiuslar menen ko`p zıyanlanadı, al ekinshi orıp alıw da`wirinde jılına bir neshe a`wladlar beretug`ın piteler, tuqım jewshi juwan-ayaqlılar ha`m gu`l shıbınları menen ko`p zıyanlanadı.

Jon`ishqa o`simligi zıyankesler, kesellikler menen zıyanlang`an ha`m egislikte sarı sho`pler ko`beyip ketken waqıtlarında o`simliktin` gu`llew da`wirinde jer betinen 5-6 sm biyiklikten to`men orıw usılında jıynap alınıwı kerek. Orıl`an sho`plerdi atızlardan tez arada jıynap alıw kerek, sebebi bul jumıslar keshikken waqıtlarında zıyankesler menen keselliklerdin` orayları atızlarda qalıp qoyıwları mu`mkin, olardı atızdan sho`p penen birge tez alıp shıg`ıw mu`mkinshiligi tuwadı.

Solay etip, eki ha`m onnan da ko`p jıllıq joqıshqa atızları zıyankesler menen keselliklerdin` infektsiyaların tarqatatug`ın tiykarg`ı orınlardan bolıp esaplanadı, bul infektsiyalar tiykarları topıraq quramında, jer betindeki o`simliklerdin` qaldıqlarında, jabayı sho`plerdin` paqallarında kesellikler menen zıyankesler qıslap

shıg`adı, sonlıqtan-da, bul egisliklerdi shu`digarlaw kerek ha`m erte ba`ha`rde yamasa sol jılı gu`zde tırmalaw jumısların o`tkeriw maqsetke muwapıq boladı. Go`ne tu`bir jon`ishqalar ko`gerip shıg`aman degenshe, qalg`an jon`ishqa tu`birlerin orıw agregatların to`mengi biyikliklerinde orıp alıw yamasa aldın ala tırmalardı awdarıp, atızlar boyınsha keselep, 1-2 retten ju`rgizip, son`ınan sol tırmalar menen jerge tu`sken qaldıqlar menen zıyankes ha`m basqa da qaldıqlardı jıynap alıp, atız shetlerine shıg`arıp taslap, olardı tolıg`ı menen jag`ıp jiberiw kerek.

**Ximiyalıq qarsı gu`res usılları.** Egisten burın tuqımlardı da`rilew. Jon`ishqa o`simliginin` ko`gislerinin` shirip ketiwinin` aldın alıw ushın olardıń tuqımların egisten burın bayleton yamasa folikur preparatları menen da`rilewimiz kerek. Bul jumıslardı PU-3 yamasa PZ-10 markalı mashinalar menen olardı egisten 2-3 ay burın yamasa egisten 2-3 ku`n burın iske asırıw kerek.

Jon`ishqa tuqımların olardıń egisinen burın nitragin preparatı menen islegen o`simliktin` o`sip ha`m rawajlanıwların tezletiwde ko`p paydası tiyedi. Bul waqıtlarında tuqımlardı nitraginlewde egisten 30 ku`n burın da`rilew jumısların tamamlaw kerek boladı.

JUWMAQLAW

1. Topûraq mexanikalûq quramûn ha`r qûylû bolûp ko`pshilik bo`legin awûr sugilenikten qurag`an topûraqtûn` 0-70 sm qabatûnda tiykarg`û topûraq fraksiyalarûnûn` mikroagregatlûq bo`lekshelerin 0,25-0,05 mm al to`mengi teren` qabatlarûnda mikroagregatlûq 0,05-0,001 mm bo`leksheler qurag`an.

2. Jon`ûshqa o`simliginen tolûq na`l alûw onnan jeterli o`nim alûw vegetatsiya da`wirinde normal da`rejede o`sip rawajlanûw ushûn topûraqtûn` 0-100 sm qabatûnda xlor mug`darûn 0,020% ke keltiriw ushûn gu`z ayûnda jon`ûshqa ekpesten aldûn gektarûna 3500-3650m<sup>3</sup> suw berip topûraq quramûndag`û o`simlik ushûn zûyanlû duzlardû juwûw ha`m drenaj arqalû sûrtqa ag`ûp ketiwin ta`miynlew kerek.

3. Ot-jemlik jon`ûshqa 1-jûlû orta shorlang`an topûraq jag`dayûnda joqarû jon`ûshqa bedesin jetistiriw ushûn onûn` optimal suwg`arûw rejimin topûraq ûg`allûg`ûn birinshi oraqqa deyin 80% shamasûnda uslap 2-ma`rtebe suwg`arûp gektarûna ortasha 550-650 m³ suw berip kerek.

4. Keyingi oraqlarda topûraq ûg`allûg`ûn 75% shamasûnda uslap 1,5 ese qosûmsha suw berip vegetatsiya da`wirinde gektarûna 5350 m<sup>2</sup> suwdû 2-2-1 sxemasûnda suwg`arûp barûw kerek.

5. Topûraq ûg`allûg`ûn 70; 75; 80% shamalarûnda uslap suwg`arûp 1,5 ese qosûmsha suwg`arg`anda tup sanlarû o`sip rawajlanûwû jaqsû boladû.

6. Jon`ûshqanûn` ekinshi jûlû joqarû zu`ra`a`t alûw ushûn topûraq ûg`allûg`ûn 75% shamasûnda uslap vegetatsiya da`wirinde gektarûna ortasha 6789 m³ suw berip 0-2-2-1-1 sxemasûnda suwg`arg`anda jon`ûshqadan gektarûna 165,3ts jon`ûshqa

bedesin alıp bunı topıraq ıg`allıg`ın 70% shamasında uslap suwg`arıp 0-2-1-1-0 sxemasında gektarına 3727 m<sup>3</sup> suw bergen jag`dayda salıstırg`anda qosımsha 45,5 ts o`nim alındı.

7. Topıraq quramında duz mug`darı 0-100 topıraq qabatında vegetatsiya da`wirinin` basında duzlar mug`darı 0,500% qurg`aq qaldıq 0,024% qurag`an bolsa ol 2-jıl vegetatsiya aqırına kelip bul ko`rsetkish to`menlegenligi ulıwma duzlar shaması 0,356% ke al qurg`aq qaldıq 0,018% kemeydi.

Paydalınlıg`an a`debiyatlar

1. Karimov I.A. Qishloq xwjalik taraqqiyoti farovon va
twkin xayot garovi. -Toshkent, 2000
2. Dospexov B.A. Metodika polevogo opita.- M.: «Kolos», 1979
3. Jarinov V.I., Klyuy V.S. Semenovodstvo lyutserni na
promishlennoy osnove.- Kiev, «Urojay», 1988
4. Ismaylov U.E. Nauchnie osnovi povisheniya plodorodiya
pochvi. –Nukus. «Bilim», 2004.
5. Mambetnazarov B.S., Xojasov A.S. Rejim orosheniya
semennoy lyutserni v usloviyax severnoy zoni
xlopkoseyaniya Respubliki Karakalpakstan
//Sb.nauch.trudov UXNIIXI. Nukus, 1992
6. Massino I.V. Intensifikatsiya oroshaemogo
kormoproizvodstvo. Tashkent «Fan», 1984
7. Medvedev G.A. Vozdelivanie lyutserni na semena pri
oroshenii.M., «Rosselxozizdat», 1987
8. Romanov X.A. Vozdelivanie kormovix kultur na
oroshaemix zemlyax. Tashkent: «Mexnat», 1986
9. Xojasov A.S. Rejim orosheniya i produktivnost furajnoy
lyutserni/ «Selskoe xozyaystvo Uzbekstana»,1999
10. Yuldashev X. Lyutserna.Tashkent: «Mexnat», 1990
11. Yuldashev X. Lyutsernovodstvo.Tashkent: «Mexnat», 1992