

**O`ZBEKSTAN RESPUBLIKASI AWIL HA`M SUW XOJALIG`I
MINISTRLOGI**

**TASHKENT MA`MLEKETLIK AGRAR UNIVERSITETI NO`KIS
FILIALI**

AGRONOMIYA FAKULTETI

«O`SIMLIKSHILIK HA`M TOG`AYSHILIQ» kafedrası

**BAKALAVRIAT «5410900 – JIPEKSHILIK» ta`lim bag`dari
4 kurs studenti**

SEYTJANOVA ARZAYIMNIN`

Atamasi: **«PILLE TUQIMLARIN TAYARLAW TEXNOLOGIYASIN
U`YRENIW»** atamasindag`i

PITKERIW QA`NIGELIK JUMISI

Basshi: b.i.k.dotsent: _____ Matchanova X.

«Jumis ko`rip shig`ildi ha`m qorg`awg`a qoyildi»

“O`simlikshilik ha`m tog`ayshilik» Agronomiya fakulteti dekani,
kafedrası baslig`i, dots A. Xojasov _____
a.x.i.k., dotsent _____ D. Madreymova
«_____» 2016 jil 2016 jil «_____» _____.

NO`KIS - 2016 jil

KIRISIW.....	3-5
1 A`debiyatlarg`a sholiw.....	6-16
2 Tuqimshiliq ka`rxanalarinin` waziypalari	17-22
3 Na`silshilik ka`rxanalarinin` waziypalari.....	18-33
4 Tut jipek qurti tuqiminin` xarakteristikasi	34-37
5 Jipek qurtinin` partenogenezi ha`m androgenezi.....	38-40
6 Biologiyaliq usilda jipek qurti tuqimin tayarlaw.....	41-43
7 Tsellyulyar usilda jipek qurti tuqimin tayarlaw.....	44-47
8 Urg`ashi gu`beleklerdi keselliklerge qarsi mikroskopta tekseriw	48-55
9 Ta`kirariy qurt bag`iw ushin tuqim tayarlaw texnologiyasi.....	56-57
10 Tut jipek qurti porodaları ha`m gibridlerin ma`mleketlik sinawdan o`tkiziw.....	58-60
Insan qa`wipsizligi hizmeti.....	61-62
Juwmaqlar ha`m usinislari.....	63-64
Paydalang`an a`debiyatlar.....	65-67

KIRISIW

Ekonomikaliq rawajlanıwdın' du'niya ta'jiriybesi soni ko'rsetti, agrar tarawınin' o'siwi, awıl xojalıg'ınin' rawajlanıwınin' tiykarg'i faktorlarınan biri bolıp hizmet qiladi. Sonin' ushin jaqın keleshekte ma'mleketimiz ekonomikasınin' u'zliksiz rawajlantiriw ushin makroekonomikaliq ko'rsetkishler ten'salmaqlıqta awıl xojalıg'ınin' bo'lek itibar qaratılmaqta.

O'zbekstan Respublikasi Prezidentinın' "Awıl xojalıg'ınin' reformalarınin' teren'lestiriwınin' en' a'hmiyetli bag'dari tuwrısında" g'i pa'rmanı ma'mleketimiz agrar tarawınin' ekonomikaliq rawajlandiriwdın' jan'a basqışın baslap berdi. Pa'rman ha'm onin' tiykarında qabil qiling'an normativ hu'jjetlerdin' orınlanıwi menen tarawdag'i bar mashqalalar o'z sheshmin tappakta, sonnan; fermer xojalıqlari ekonomikaliq g'a'ressizliginın' tiykarı jaratıldı. Jerden paydalaniwg'a ijara mu'na'sibetleri formalandı, fermer xojalıqlari ushin jan'a tamajillar qilindi, sha'rtnama ma'jbu'riyatlarında tamanlar ten'ligi ta'miynlendi, hizmet ko'rsetiwshiler juwapkershiligi asırıldı, o'nim islep shig'ariwshilar ma'npa'a'tler u'stinligine erisildi.

Respublikamız pille, jipek shiyki zatı ha'm jipekli gezlemeler islep shig'ariw ushin jeterli ta'biyi ha'm texnikaliq sharayatlarg'a iye, ha'mde miynet menen menen toliq ta'miym lengen. Tarmaqti ja'nede rawajlandiriw tek g'ana pillekeshler da'ramadin asirip g'ana qalmay, ba'lki ma'mleketimizge valyuta tu'simin asiratug'in o'nimler aliw imkanında beredi.

Sonin' ushin Respublikamızda jipekshilikti ja'nede rawajlandiriwg'a u'lken itibar berilmekte.

O'zbekstan Respublikasi Prezidentinın' 1998 jil 30 martta ha'm 2003 jil 22 dekabrdegi pa'rmanlari ha'mde O'zbekstan Respublikasi Wazirler Mekemesinın' 1998 jil 3 aprelda shig'arg'an «Respublika pilleshilik tarawınin' basqariwdi ja'nede jaqsilaw is-ila'jlari tuwrısında», 2000 jil 15 marttag'i «Pilleshiliktin' aziqliq bazasını bekkemlew ha'm jipekshilik o'nimlerin jetistiriw ko'lemlerin ko'beyittiriw is-ila'jlari» 2006 jil 15-noyabrdegi PQ-512-sanli "Respublika pilleshilik tarawın ja'nede rawajlandiriw is-ila'jlari tuwrısında" qararlari shig'arildi. Bul pa'rman ha'm qararlarda Respublikada pilleshilikti ja'nede rawajlantiriw jumislari aniq ko'rsetilgen bolıp, tarawdin' rawajlanıwına u'lken imkaniyatlar jaratildi.

Bul qararda arnawli ajratilg'an maydanlarda jan'a tutzarlar jaratiw, jipek qurti tuqimin tayarlaw tapsirmalarinin' orinlaniwi, ha'mde fermer xojaliqlaridan qabil qilib aling'an tiri pilleler ushin o'z waqtinda juwmaqlawshi esap-kitap qiliw, sonday-aq jetistirilip atirg'an pillenin' sipatina qatan' itibar beriw ko'rsetip o'tilgen.

Usi jilda respublikada pille jetistiriw 30,0 min' tonna boliwi rejelestirilgen. Ha'r qutidan alinip atirg'an ortasa o'nim 48-50 kg g'a ten' bolip, tayarlanip atirg'an sortli ha'm sortsiz pillenin' mug'dari 60-70% dan artig'iraq bolip, qurg'aq pilleden jipek shig'iw mug'dari 32-33% ha'm shubatilg'an jipektin' uzunlig'i 800-850 metrni quramaqta. A'lbette bunday ko'rsetkishler ishki ha'm sirtqi bazardi qaniqtirmaydi.

O'zbekistan ma'mleketinin' jipekshilikni ja'nede rawajlandiriw ha'qqida qatar qararlardi qabil qiliniwina tiykarg'i sebep, du'niya bazarida bizin' qurg'aq pillenin' bahasi 2,0-2,5 ese to'men ha'm shiyki jipektin' bahasi 18-20 Amerika dollarina ten' bolip, bul pilleshilik penen shug'illanip atirg'an Qitay, Yaponiya, Braziliya ha'm Tailand ma'mleketlerinde jetistirilip atirg'an pille ha'm shiyki jipekten eki ese arzan.

Bunnan tisqari du'niyada jipek o'nimlerine rawajlang'an ma'mleketlerde (Amerika, Evropa, Yaponiya ha'm basqalar) talap pa'seyip ketkenligi mu'nasiybeti menen bizin' shiyki-zattin' bahasi tu'sip ketiwinen tisqari, olardin' satiliwida ju'da' pa'seyip ketdi, bul bolsa o'z na'wbetinde pilleni qayta isleytug'in ka'rxanalar o'nimdi kasod boliwi ha'm islep shig'ariw quwatlaridan 40-70% paydalaniw esabina, ha'mde olardi toliq isletiw ushin qarajetler jetpesligi ka'rxanalardin' finans awhalinin' nashar halg'a tu'sip qaliwina alip keldi.

Bug'an sebep bizde tayarlanip atirg'an pillenin' sipati ha'm o'nimdarlig'i, onnan alinip atirg'an shiyki jipektin' texnologiyaliq ko'rsetkishleri to'menlegenidir. Buni to'mendegi sanlardanda bilip alsaq boladi.

	O'zbekstanda	Xitoy, Yaponiyada
Tayarlang'an pillenin' sortli bo'limi, %	80-82	97-98
Sonnan birinshi sortlarg'a, %	40-45	95
Jipek shig'iw mug'dari, %	32-33	42-44
Jipektin' u'zliksiz shubaliw uzunlig'i, m	350-500	1300-1400
Pille qabig'inin' shubaliw mug'dari, %	70-75	80-85

Tayarlaniy atirg'an pille, islep shig'arilip atirg'an shiyki jipek ha'm gezlemelerdin konkurent sipatina iye boliwi, jipek qurtinin' o'nimdar porodalarina, olardi bag'iw agrotexnikasina ha'm pilleni tayarlaw ha'mde olarg'a birinshi islew beriw texnologiyasina tig'iz baylanisli. Sipatli pilleden alinatug'in jipektin' sipatida joqari bolip, sipatli jipekten bolsa sipatli gezlemeler islep shig'arip, ishki ha'm sirtqi bazarlarda biyma'lel ba'sekilesiw mu'mkin.

O'zbekstanda jipekshilikdin' tiykarg'i waziypalarinan biri pille iyiriy sanaatinin' talaplarina juwap beretug'in, jipek mug'dari joqari bolga'n, qurg'aq pilleden ko'p jipek shig'atug'in ha'm jaqsi iyiriletug'in, metrik nomeri (teksti) bolsa 3500 den ha'm jipek talasinin' toqtawsiz iyiriliw uzinlig'i 1000 nan kem bolmag'an jan'a poroda ha'm gibriderdi jaratiw, ha'mde islep shig'ariwg'a usiniwdan ibarat. Bunday joqari qa'siyetlerge iye boliw, ko'binese pille oraw sharayatlarinin' ha'm olarg'a da'slepki islew beriwgede tig'iz baylanisli boladi. Sonin' ushinda pille orawdi ha'm pillelerge da'slepki islew beriwdi sho'lkemlestirip, O'zbekstanda jetistirilip atirg'an tiri pilleden en' ko'p jipek o'nimin aliw maqsetke muwapiq.

Bag'iw ushin import qilinip atirg'an tut jipek qurti tuqimlari tiykarinan gibrider porodalarina ta'n bolip, bul bolsa tut jipek qurtlarinin' import qiliwdi ha'r jili a'melge asiriw lazimlig'in ko'rsetedi. Bul orinda shetten taza jipek qurti porodalarin alip kelip respublikamizda tut jipek qurti tuqimin tayarlaw ma'selesin sheshiwdi talap qiladi. Sol sebepli, usi ilimiy izertlew jumisinin' waziypasi sirt elden joqari sipatli o'nimdarli tut jipek qurti porodalarini tuqimlarinin' baslang'ich material sipatida alip kelip, oni respublikamiz iqlim sharayatina ha'm aziqliq bazasinda tekserip, olardin' o'nimdarlig'in aniqlaw ha'm aling'an mag'liwmatlar tiykarinda usi tut jipek qurti porodalarinin' na'tiyjelegin u'yreniwden ibarat.

Bunday waziypalardi na'tiyjeli orinlawda tuqimshiliq tarawindag'i jumislardi tuwri jolg'a qoyiw, jipek qurti tuqimin tayarlawshi ka'rxanalarda sanaatliq tuqimlarin tayarlaw texnologiyasin tuwri jolg'a qoyip, jipek qurti tuqiminin' mug'darin ha'm sipatin asirip, ha'r qanday keselliklerden saqlap joqari ko'rsetkishke iye bolga'n jipek qurti tuqimlarin tayarlaw talap etiledi.

Sonin' ushin biz pitiriy qanigelik jumisin tayarlawda "Pille tuqimlarin tayarlaw texnologiyasin u'yreniw" temasın tan'lap oni u'yreniwdi maqset qilip aldiq.

1. A`DEBIYATLARG'A SHOLIW

U'yrenilgen a'depiyatlardi sholiwdan aldin tiri org'anizmler o'miri protsessleri aziqliq ha'm aziqlandiriw menen tig'iz baylanisli ekenin ayriqsha aytip o'tiw kerek. Aziqliq ha'm onin' toyimlilik'in awil xojaliq haywanlari o'nimdarliq ha'm ko'ppishlik da'rejesin belgilewshi tiykarg'i faktor (U.N. Nosirov, 1967; M.Nortojiev, 1969; A.K.Ag'anesin, 1971; I.Xidirov, R.Bulishev, 1980; A.Djuxish, 1990; U.N.Nosirov, I.Xidirov, T.A.Reshetova, 1990).

Avtorlar atalanbag'an urg'ashi gu'belek tuqimlarin ovarioollardan ajratip alip turaqli temperatura ta'sir ettiriw tuqim kletkalarin aldin bo'linip, son' qayta qosiliw aqibetinde tek urg'ashi jinisli a'wlad aliw texnologiyasin jaratti. L.V.Strunnikova (1979), L.V.Strunnikova, E.V.Dem'yanov (1980) lar $-2...-11^{\circ}\text{S}$ ha'm atalanbag'an tuqimlardi urg'ashi gu'belek denesinde rawajlaniwdi partenogenetik jolina o'tkiziw mu'mkin ekenin da'liyllegen.

Tut jipek qurti jinsin jasalma ra'wishte basqariw ushin erkek ha'm urg'ashi jinsiy kletkalarinin' rawajlaniwin o'zgertiwinin' bir neshe usllarin jaratiwda V.A.Strunnikov (1975), E.R.Terskaya, V.A.Strunnikov (1975) ken' ko'lemde izertlewlerdi a'melge asirg'anlar. Bul izertlewler partenogenetik ha'm androgenetik a'wlad aliw ma'selelerine bag'ishlag'anlar. Androgenetik yaki tek erkek jinisli a'wlad aliw ushin tuqim kletkalarindag'i yadroni jansizlantiriw yaki rawajlaniwdan toqtatiw son' spermatozoidlardi jup-jup bolip, bir-biri menen qosiliwg'a ma'jbu'r etiw lazim boladi. Tuqim kletkalarindag'i yadroni rawajlaniwdan toqtatiw ushin aldinlari g'amma nurlarin qollanilar edi. V.A.Strunnikov bul protsessti nolden to'men bolg'an temperatura ja'rdeminde a'melge asiriw ha'm spermatozoidlardi qosiliwidan androgenetik tuqimlar aliw usilin jaratti. Tuqim kletka yadrosin rawajlandiriwdan toqtatiw ha'm tek erkek jinisli a'wlad aliwda en' qolayli temperatura – $5...-17^{\circ}\text{S}$ ekeni aniqlandi.

I.M.Gumbatov (1964, 1968) o'tkizgen qiziqli ta'jiriybelerde pillelerden gu'beleklerdin' shig'iwi ha'm pille oraw da'wirinde temperaturanin' ko'teriliwi gu'belektin' pilleden shig'iwin jen'illestiretug'in suyuqliq mug'darinin' 10% ke kemeyiwine alip keliniwin ko'rsetti. Pille oraw da'wirinde temperatura ha'm hawanin' salistirma na'mligi da'rejesin o'zgerip turiwi gu'belekler qoyg'an tuqim sani ha'm sipatina ta'sir etiwini aniqlang'an.

M.A.Bessonova (1971), A.K.Maksimova qatnasinda o'tkizgen ta'jriybeleri juwmag'ina tayanip, bir quti qurt ushin japirag sarpin optimal da'rejesin 900 kilogramm qilip belgilew ta'repdari ekenin bildirgen. Normani 900 kilogrammnan kem boliwi jipek qurti poroda ha'm gibridlerdin' na'silinde bar bolg'an potentsial o'nimdarliqtin' ju'zege shiqpay qaliwina alip keliwi mu'mkin.

Izertlewlerler sonnan derek beredi, aziqtin' jetispesligi ha'm qurtardin' ash qaliw hallari olardin' tek jasawshan'lig'i ha'm o'nimdarlig'ina ta'sir etip qalmay, fiziologiyaliq qa'siyetleri ha'm ha'tte irsiy potentsialinin' toliq jaqsi bolmaslig'ina sebep boliwi mu'mkin eken.

Ha'r quti qurtqa sarp bolatug'in japirag normasi u'stinde A.G.Kafian ha'm S.S.Zinkinalar (1954) turaqli jumislardi a'melge asirg'anlar. Uzaq mu'ddetli ha'm ken' ko'lemdegi ta'jriybeler, sinawlar tiykarinda bir quti (19gramm) qurt esabina japirag normasi tabilg'an. S.S.Zinkina, A.K.Maksimova(1986) tu'rli poroda ha'm gibridlerdi o'tkizgen qiziqli sinawlarda qurtlardin' o'mirshen'ligi ha'm o'nimdarliq belgilerinin' aziqliq normasina baylanisli ekenin aniq ko'rsetip bergen. 60- shi jillarda ken' tarqalg'an SANiSh 3-1 x SANiSh 32 gibrid qurtlarina 1-quti esabina 1500 kilogramm japirag berilgende qurtlardin' o'mirshen'ligi 89,5%, 1000 kilogramm bolg'anda 84,3 %, 750 kilogrammg'a kemeytirilgende 71 % ha'm en' aqirinda 600 kilogramm bolg'aninda 73,1 % tin qurag'an. Japirag beriw normasinin' o'zgeriwi menen pille salmag'ida sol halatta o'zgeriwi gu'zetilgen.

K.Madaminov (1973) bir quti qurtqa ha'mmesi bolip, 600 kilogramm japirag sarplap ta'jriybeler o'tkizgen. Aziz jetispesligi qurttin' qan quraminada ta'sir etkenin, atap aytqanda gemotsitler ha'm makronuk-leotsitler mug'darinin' keskin asip ketiwine alip kelgenligi gu'zetilgen.

Tiri ja'nlikler aziz, temperatura, na'mlik ha'm jaqtiliqtan basqa kislorodqada mu'taj. Arnawli binolarda bag'ilatug'in haywan ha'm ja'nlik tu'rlerinin' muttasil taza hawa (kislorod) menen ta'miymnlep turiw za'ru'riyati bar.

B.Kenjaev, U.N.Nasirillaev (1977) lar tut jipek qurti genotiplerdi sirtqi ortaliz penen o'z-ara baylanisililig'in ayta otirip, aziqliqtin' jetispesligi yaki qurtlardi japirag penen toliq ta'miyn etilmesligi tek olardin' o'nimdarliq belgilerin (o'mirshen'ligi, pille ha'm jipek qabig'inin' salmag'i) kemeytirip qalmay, irsiylaniw ha'm korellyatsiya koeffitsientlarinede ta'sir etiwini gu'zetkenler.

Qurtlardi kislorod penen turaqli ra'wishte ta'miynlaw olardi issig'a shidamliliq qa'siyetinib' asiwina alip keliwi mu'mkin.

B.A.Parpiev (1970) ta'jiriybelerde alg'an mag'liwmatlar soni ko'rsetti, qurtlardi sirtqi ortalıqtin' qolaysiz sharayatlari, sonnan joqari temperaturag'a shidamlilig'i kislorod penen ta'miynlew da'rejesine baylanisli. Tap sonday ta'jiriybeler T.R.Azizov (1972) tamaninan o'tkizilip, g'az almasiniw da'rejesine qarap, jastan jasqa o'tip atirg'an qurtlardin'joqari temperaturag'a qarsi tura aliwin aniqlaw mu'mkin degen pikirge kelgen.

Qurtlar bag'ilip atirg'an binalardag'i hawani almastiriw za'ru'riyati tek olarda karbonad angidrid g'azin basqag'a shig'arip jiberiw menen da'liyllenbeydi. Ba'ha'rgi qurt bag'iw waqtında bolatug'in jawingershilikler, qurt denesi ha'm tut japiraqlarınan parlanatug'in suw esabına qurtxanalar hawasinin' salistirma na'mligi ko'beyiwi mu'mkin. Ba'ha'rdegi salqin hawa, salistirma na'mliktin'artiwina sebep boladi.

Qurtlardin'pille oraw da'wirinde ha'm pille orawinin' baslaniwi aldınan qurtlar denesinen ajralg'an suw shig'indilar salistirma na'mliktin' ko'beyiwine sebepchi boladi. Eger qurtxanalardan ig'alli hawani shig'arip jiberilmese qurtlar keselliklerge shaliniwi, olardin' sani kemeyiwi mu'mkin (R.T.Safarov, R.Asraev, 1993). Biraq inkubatoriya ha'm kurtxanalardag'i karbonad angidrid g'azin shig'arip jiberiw ha'm kislorodqa bay taza hawani kiritiw maqsetinde a'melge asirilatug'in samallatiw hawa temperaturasi ha'm salistirma na'mligin kemeytirip, jibermesligi sha'rt.

Sirtqi ortalıq faktorlari haywan ha'm o'simliklerdin' irsiy kodlang'an biologiyaliq ha'm o'nimdarlıq qa'siyetleri ha'm belgilerinin' boliwin ta'miynleydi. Sirtqi ortalıqtin' optimal sharayatında bag'ilip atirg'an awıl xojaliq haywanlari a'dette joqari o'nimdarlıqqa iye boladi. Sharayat jamanlasqan waqıtta o'nimdarlıq ko'rsetkishleri keskin pa'seyedi.

Demek, sirtqi ortalıq faktorlari bolg'an aziqliq, hawa temperaturasi, salistirma na'mligi, taza hawani turaqli da'rejede o'zgertiw joli menen awıl xojaliq haywanlari, sonnan, jipek qurtinin' o'siw, rawajlaniw protsessi ha'm o'nimdarlıq da'rejesin basqariw mu'mkin.

T.G'oipov (1976) tin' ko'p ma'rte ta'kirarlang'an ta'jiriybelerinde qurtlardin' ekinshi uyqidan keyingi da'wirde 25-26⁰S ha'm 65-75 % na'mlik sharayatında polietilen plyonkasi qaplamasi astında bag'iw menen lichinkalardi statistik tamannan isenerli da'rejede boliwina erisiw mu'mkinligi da'liyllengen.

Tut jipek qurtinin' lichinka basqishinda o'siwi ha'm rawajlaniwi turaqli sharayatlardi ju'zege keltiriw talap etiledi. Sonida aytiw kerek, jipek qurti lichinkalari hawa temperaturasi ha'm salistirma na'mlikti seziwshen' boladi. Temperatura qurtin' jaslarina qarap biraz o'zgerip turiwida mu'mkin (N.G.Bog'autdinov, N.V.Polyanskaya, 1977; M.Numanov, Sh.Abduqodirov, 1987).

Sh.A.Karimova (1968) qurtlar o'mirshen'ligi olarg'a jaratilg'an temperaturag'a baylanisli dep esaplaydi. 18-20⁰ ha'mde 25-26⁰ C da qurtlardin' o'mirshen'ligi to'mendegishe bolg'an. SANIISH 3-1 75.5%-83,5% SANIISH E-76,3%-92-0%, SANIISH 8 83,4%- 83,0%, SANIISH 9 80,7%-89,0%

Joqaridag'i sanlar turaqli temperatura sharayatin jaratiw joli menen qurtlar jasawshan'lig'in basqariw mu'mkinligin ko'rsetedi. To'men temperaturada pille orawg'a shekem jetip barg'an qurtlar sani sezilerli da'rejede kemeygen.

Bizge ma'lim, qurtxanada temperaturanin' ko'teriliwi menen qurtlardin' rawajlaniwi tezlesedi, aqibetinde qurt bag'iw da'wiri qisqaradi. (N.G.Bog'autdinov,1966). Biraq bunday qurt bag'iw rejiminin' juwmag'i daim ha'm unamli bola bermeydi.

Qurtxana hawasinin' salistirma na'mligi ham qurt bag'iw na'tiyjelerine turaqli ta'sir o'tkiziwi joqarida aytilg'an edi. Usi bag'darda ta'jriybeler alip barg'an T.G'oipov (1971, 1978) I-III jastag'i qurtlar bag'ilip atirg'an xanalarda hawanin' salistirma na'mligi 90% boliwi unamli na'tiyjeler bergenin aytadi.

L.F.Rajdestvenskaya (1966) o'zinin' tut jipek qurti fiziologiyasina bag'ishlang'an ko'p jilliq ta'jriybeleri tiykarinda jipek qurti evolyutsion rawajlaniw da'wirinde hesh waqit sutka dawaminda bir qiyli hawa temperaturani ha'm salistirma na'mligi sharayatinda bolmaydi. Tap sol biologiyaliq qa'siyetke tiykarlang'an halda avtor o'zgeriwshen' temperaturada qurt bag'iw usilin usinis etedi, pille hosildorlig'i ha'm na'slli pillelardin' ko'beyiwine alip keledi.

Sanoatbop pillelerdi jetistiriw ushin bag'ilatug'in qurtlar qanday temperatura ha'm salistirma na'mlik rejiminde bag'iliwi u'lken a'meliy a'hmiyetke molik ma'sele. Bonnan 30 jil burin 1980 jil mart ayinda O'zbekstan awil xojaliq Wazirligi maqullag'an hu'jjette to'mendegi rejim ko'rsetilgen:

a) I-II ha'm III jastag'i qurtlardi ta'rbiyalawda temperatura 26-27 ⁰S, hawanin' salistirma na'mligi 65-75 % boliwi;

b) IV-jastag'i qurtlar ushin hawa temperaturasi 25°S , V-jastag'i qurtlar ushin $23-24^{\circ}\text{S}$, salistirma na'mligi 60-70 % boliwi za'ru'r (M.Numanov, Sh.Abduqodirov, 1987).

Pille shiyki-zati dunyanin' tu'rli jerinde ha'm ma'mleketlerinde jetistiriledi. Hawa temperaturasi joqari bolg'an Hindistanda qurt bag'iwdin' optimal rejimleri menen tanisiw ju'da' qiziq. Sol sebepli S.R.Ullal, M.N.Nazasimhanne lar Hindistan pilleshiliginde ken' ko'lemde qollanilatug'in temperatura ha'm salistirma na'mlik qurtlardin' birinchi jasinda $26-28^{\circ}\text{S}$, 85%; qurtlardin' ekinshi jasinda $26-28^{\circ}\text{S}$, 85%; qurtlardin' u'shinshi jasinda $24-26^{\circ}\text{S}$, 80%; qurtlardin' to'rtinshi jasinda $24-25^{\circ}\text{S}$, 80%; qurtlardin' beshinchi jasinda bolsa temperatura $23-24^{\circ}\text{S}$ hawanin' salistirma na'mligi bolsa 70% bolg'an.

Qurt bag'iwda qollanilatug'in usi temperatura ha'm na'mlik rejimi bul ma'mlekette anag'urlim joqari pille hasildorlig'ini ta'miynleydi dep xabar beredi avtorlar.

Endi pilleshiligi dim rawaj tapqan Yaponiya ma'mleketinin' qurt bag'iw sharayati menen tanisamiz. U.N.Nasirillaev, R.I.Muha'mmedjonov (1977) Yaponiyag'a qilg'an ilimiy-a'meliy sapari na'tiyjeleri bayan etilgen esabatta kishi jaslardag'i qurtlar ushin temperatura biraz joqari $27-28^{\circ}\text{S}$, u'lken jastag'i qurtlar ushin $25-26^{\circ}\text{S}$, qurt bag'iwdin' ha'mme da'wirlerinde hawanin' salistirma na'mligi 80-90% boliwin jazadilar .

Qurtlardi bag'iw da'wirinde temperatura ha'm salistirma na'mlik rejiminin' ja'nede na'tiyjeli variantlarin jaratiw u'stinde ma'mleketimiz ha'm sirt ellerde turaqli izleniwler alip barilg'an.

M.Numanov, Sh.A.Abduqodirov, I.P.Miloxova (1987) arnawli ta'jriybeler tiykarinda sanoatbop qurtlardin' bag'iwda to'mendegi temperatura ha'm salistirma na'mli unamli na'tiyje beriwin aytadilar;

-inkubatsiyanin' I-VIII ku'nleri temperatura 24°S , hawanin' salistirma na'mligi 75 % ha'm sutkasina 18 saat dawaminda jaqtiliq penen ta'miynlew;

- inkubatsiyanin' IX-ku'ninen temperatura 25°S g'a ha'm hawa salistirma na'mligi 80% ke ko'teriw, sutka dawaminda inkubatoriyada qaran'g'iliqti ta'miynlew;

- qurtlardin' I-II jaslarinda temperatura $27-29^{\circ}\text{S}$, hawanin' salistirma na'mligi 55-65% shegerasinda uslap turiw, avtorlardin' jaziwinsha bayan etilgen temperatura ha'm hawa salistirma na'mlik rejimi unamli na'tiyjeler beredi.

Salistiriw ushin Bolg'ariya alimlari usinis etken ha'm a'meliyatta qollanilg'an qurt bag'iw rejimin keltiriw maqsetke muwapiq.

M.Petkov, I.Penkov, P.Petkov (1975) kishi jastag'i qurtlardi bag'iwdi bo'lek a'hmiyetke iye ekenin esapqa alip, I-III jastag'i qurtlar bag'ilip atirg'an qurtxanada xana temperaturasi 26-28⁰S salistirma na'mligi 90 % boliwi jaqsi na'tiyjeler beriwin ha'm Bolg'ariya ta'biy-iqlim sharayatinda jipek qurti porodaları o'nimdarlig'in toliq aytqan.

N.I.Petkov, A.I.Petrov ha'm A.A.Yankov (1979) lardin' jazg'an kitabinda qurtlardin'jaslari boyinsha temperatura ha'm salistirma na'mlik shegeralari ko'rsetilgen.

İlimiy jurnal ha'm toplamlarda temperatura salistirma na'mlik jipek qurtinin' biologiyaliq belgilerine ta'sir etip qalmay, pillelardin' texnologiyaliq ko'rsetkishlerin ham o'zgeriwine sebep boliwi mu'mkin. Usi bag'darda S.ToshpwlatoV (1969) tin' ta'jiriybeleri harakterlidir.

Avtor ta'jiriybelerinde pille oraw da'wirinde temperatura 21⁰S qa shekem pa'seytiriw jipek qabig'inin' seretsin zatinin' (3,65%) kemeyiwi ha'm onin' eriwshen'ligi bolsa 15% ke pa'seywi sebep bolg'an. Pille oraw protsessi 29⁰S ta a'melge asirilg'anda seretsin mug'dari 4,1 % ti qurag'an ha'm pilleden shiyki-jipek shig'iwı 43,1% ten 45,4% ke, pillelardin' shuvatiliwi 78,4% ten 85,1 % ke ko'beygen. Demek, pille oraw da'wirinde temperaturani o'zgertiW joli menen pille texnologiyaliq qa'siyetlerin basqariW mu'mkin eken.

Tut jipek qurti agrotexnikasi ma'seleleri menen uzaq jillar shug`ullang'an N.G.Bog'autdinov (1965) pille oraw da'wirinde sirtqi ortalıq faktorlarinin' ta'siri ja'nede ku'shlirek boladi, a'sirese, temperatura optimal da'rejede boliwi dim za'ru'r dep esaplaydi. N.G.Bog'autdinov pille oraw 23-27⁰S ta o'tiwin qolaylı esaplap, temperatura 29⁰S g'a jetip, onnan assa, texnologiyaliq ko'rsetkishler, aldin pillenin' shubatiliwi 2-3% ke kemeyiwin aytadi.

I.Xolmatov (1962) jaziwinsha qurtlardin' jipek talasi jipek qabig'inin' jaylaw tezligi qurtxanadag'i temperaturag'a baylanisli. Joqari temperaturada pille oraw protsessi tezlesip, tala jin'shkelesedi.

A.B.Yoqubov (1997) ta'jiriybelerinde gigrotermik rejimdegı o'zgerisler aqibetinde pilleden gu'beleklerdin' shig'iwı, U.N.Nasirillaev, B.Kenjaev (1974) ta'jiriybelerinde qurtlar o'mirshen'liginin' pa'seywi, Z.İkramov (1974) baqlawlarında lichinkalik da'wirinin' uzayiwi ma'lim bolg'an.

E.N.Mixaylov (1984) guwaqliq beriwinshe joqari temperatura jipek-qurtinin' ken' tarqalg'an sari poliedroz keselligi viruslarına qarsi gu'resiwde jaqsi na'tiyjeler bergen.

Qurtlarga joqari temperatura ta'sir ettirilganda tsitoplazmatik ha'm yadro poliedrozi kemeygen.

Soni da aytiv kerek temperatura ha'mme waqitta na'tiyjeli na'tiyje bere bermeydi. G.A.Azimova (1971) izertlewlerleri soni ko'rsetti, jipek qurtinin' o'siwi ha'm rawajlanivi ushin optimal esaplang'an 25-28⁰S ta muskardina sporolari ko'beyivi ushin dim qolay. Muskardinanin' ziyani hawanin' salistirma na'mligi normadan ziyat bolg'an taqdirde ko'birek ekeni gu'zetilgen.

Ukraina jipekshilik ilimiy izertlewler instituti ha'm Xar'kov Ma'mleket universitetinde alip barilg'an izleniwler temperaturanin' sezilerli da'rejede o'zgertiwi usili menen jipek qurti o'mirshen'ligi ha'm ko'ppushlig'in asiriwg'a bag'ishlang'an (V.G.Shaxbazov, O.A.Shalamova, S.V.Suxanov, M.Yu.Braslavskiy, N.V.Merishkova, G.S.Panamarenko, 1966; S.V.Suxanov, O.A.Shalamova, 1996).

A.D.Mamedova (1973) o'z ta'jiriybelerin Ozarbayjon sharayatinda o'tkizgen bolip, qurtlardan' IV-V jaslarinda temperatura normadagi 23-24⁰S ornina 27-28⁰S g'a jetse, birinshiden biologiyaliq ko'rsetkishler pa'seyedi, ekinshiden oling'an pillelerde texnologiyaliq jaqtan nuqsanlar payda boladi dep esaplaydi.

B.Yu.Sadikov (1975) qurt bag'iw rejimi buzilg'an hallarda gibrid quwati geterozis to'men da'rejede boliwin xabar qiladi. Gigrotermik rejimdegisi o'zgerisler jipek qurti selektsiyasi ha'm na'silshiliginde qollanilatug'in usillar na'tiyjesinin' pa'seywine alip keledi. Misali, M.G.Silan'teva (1962, 1975) issig'a shidamli jipek qurti porodalarinin' selektsiyasi protsessinde kishi jastagi qurtlardan' joqari temperatura (27-29⁰S) da bag'iw selektsion oilalarinin' o'mirshen'ligi boyinsha tabaqalanishiga alip kelgenin jazadi.

Sirtqi ortalik faktorlaridan paydalanip jipek qurti keselliklerine qarsi gu'resiwi mu'mkin. Bul barada E.F.Poyarkovtin' (1945-1959) jumislari diqqatqa sazawar. Issi temperaturanin' quwirshaqlarg'a ha'm tuqimlarga ta'sir ettiriwi tiykarinda pillelilikke en' qa'wipli ha'm en' ko'p ziyani keltiriwshi pebrina (*Nozema bombyx*) sporalarinin' ziyansizlantiriwi usili usinis etilgen. Pillelilik pa'nine «Biologiyaliq usil» ati menen kirgen usi bag'dardin' maqseti jipek qurti urg'ashi quwirshaqlarinin' denesinde bar bolg'an pebrina sporolari joqari temperatura ta'sirinde jipek qurti organizminde bar bolg'an ishki ta'biyi qorg'aw ku'shleri ha'm immunalogiyaliq qa'siyetlerdi aktivlestiriwi arqali sporalarinin' nabit boliwin ta'miynlewden ibarat. Usi usil ko'p jillar dawaminda Andijon ha'm Osh jipek qurti tuqimshilig'i zavodlarinda qollanilip kelingan.

Temperatura faktoridan paydalanib H.Sato (1931), B.L.Astaurov (1969, 1977) tut jipek qurtida, T.R. Malin (1971) jer bawirlawshilarda, E.Suomalainen (1986), L.H.Oliver (1978) u'y haywanlarida jinslar nisbatin o'zgertiwi barasinda ilimiy jumislar basilip shig'ilg'an.

Joqarida keltirilgen izertlewlerden parqi B.L.Astaurov, E.I.Baburashvilli, T.A. Bednyakova, N.V.Vereyskaya, V.P.Lobjanidze, T.T.Ovanesyan (1969) lar jipek qurti gu'belekleri endi g'ana qoyg'an tuqimlarina temperaturani ta'sir ettiriwi esabina pebrina keselliginin' sporalarin jansizlantiriwi ha'm bir jola tuqimdag'i o'mirlik protsesslerdi aktivlestiriwi, embrional diapauzag'a barham bergenler.

Temperatura tut jipek qurtinin' jinsiy kletkalar ha'm embrionlar rawajlanishida o'z ta'sirin o'tkiziwi mu'mkin. (E.Kawaduchi, 1934; B.A.Astaurov, 1969; Y.Tasime, 1964;).

Joqarida bayan etilgennen ko'rinip turipti, temperatura sirtqi ortaliqtin' en' ta'sirshen' faktorlaridan biri bolip, oni o'zgertiwi arqali tut jipek qurti embriologiyaliq rawajlanish, qurt bag'iw protsessleri o'nimdarliq belgilerinin' payda bolishni basqariwi imkoniyatlari bar, buning' ushin sirtqi ortaliq faktorlarinin' tut jipek qurtinin' tuqimlari, lichinkalari, quwirshaq ha'm gu'beleklerine ta'sirin kompleks u'yrenish za'ru'r boladi.

L.F.Rojdestvenskaya (1966) o'zinin' tut jipek qurti fiziologiyasiga bag'ishlang'an ko'p jilliq ta'jiriybeleri tiykarida jipek qurti evolyutsion salistirma na'mligi sharayatida bolmaydi. Tap sol biologiyaliq qa'siyetke tiykarlang'an halda avtor o'zgerishen' temperaturada qurt bag'iw ushul usulni etadi, ol pille o'nimdarlig'i ha'm naslli pillelardin' u'lesinin' ko'beyishni alish keledi.

Bizga ma'lim, qurtxana temperaturasining' ko'terilishi menen qurtlarning' rawajlanishi tezlesadi, aqibetida qurt bag'iw da'wiri qisqaradi (N.G.Bog'autdinov, 1966). Biraq bunday qurt bag'iw rejimining' juwmag'i ha'r dayimda unamli bola bermeydi.

Qurtxana hawasining' salistirma na'mligi ham qurt bag'iw na'tijelerine turaqli ta'sir o'tkiziwi joqarida aytib keltirilgen edi. Ushu bag'darda ta'jiriybeler alish barg'an T.G'oyibov (1971,1978) I-III jastag'i qurtlar bag'ilish atirg'an xanalarda hawanin' salistirma na'mligi 90% bolishi unamli na'tijeler bergening' aytadi.

Sanoatbop pilleler yetishtirish ushin bag'ilatug'in qurtlar qanday temperatura ha'm salistirma na'mlik rejimida bag'ilishi u'lken a'hmiyetke iye ma'sele. Buning' 20 yil burin 1980 yil mart oyida O'zbekiston avil xojaligi vazirligi maqullag'an hu'jjet

to'mendegi rejim ko'rsetilgen: a) I, II ha'm III jastag'i qurtlardan' ta'rbialawda temperatura 26-27⁰S, hawanin' salistirma na'mligi 65-75% boliwi; b) IV jastag'i qurtlar ushin hawa temperaturasi 25⁰ S, U jastag'i qurtlar ushin 23-24⁰S, salistirma na'mligi 60-70% boliw za'ru'r (M.Nurmonov, Sh.Abduqodirov, 1987).

Qurtlardi bag'iw da'wirinde temperatura ha'm salistirma na'mlik rejiminin' ja'nede na'tiyjeli variantlarin jaratiw u'stinde ma'mleketimiz ha'm sirt ellerde turaqli izleniwler alip barilg'an.

M.Nu'monov, Sh.A.Abduqodirov, I.P.Miloxova (1987) arnawli ta'jriybeler tiykarinda sanoatbap qurtlardi bag'iwda to'mendegi temperatura ha'm salistirma na'mlik unamli na'tiyje beriwini aytadilar;

- Inkubatsiyanin' I-VIII ku'nleri temperaturanin' 24⁰ S g'a.. Hawanin' salistirma na'mligi 75% ha'm sutkasina 18 saat dawaminda jaqtiliq penen ta'miynlew;

- Inkubatsiyanin' 9-shi ku'nnen temperaturani 25⁰S qa ha'm hawanin' salistirma na'mligin 80% qa ko'teriw, sutka dawaminda inkubatoriyada qaran'g'iliqti ta'miynlew;

- Qurtlardan' I-II jaslarinda temperaturani 27⁰ - 29⁰ S, hawanin' salistirma na'mligin 55-65% shegerasinda uslap turiw, avtorlardan' jaziwinsha bayan etilgen temperatura ha'm hawanin' salistirma na'mlik rejimi unamli na'tiyjeler beredi.

Salistiriw ushin Bolgariya alimlari usinis etken ha'm a'meliyatta qollanilg'an qurt bag'iw rejimin keltiriw maqsetke muwapiq.

M.Petkov, I.Penkov, P.Petkov (1975) kishi jastag'i qurtlardi bag'iwda bo'lek a'hmiyetke iye ekenin esapqa alip, I-III jastag'i qurtlar bag'ilip atirg'an qurtxanada hawanin' temperaturasi 26-28⁰S salistirma na'mligi 90% boliwi jaqsi na'tiyjeler beriwini ha'm Bolg'ariya ta'biyi-iqlim sharayatinda jipek qurti porodalarinin' o'nimdarlig'in toliqraq ko'rsetip o'tkenin aytip o'tken.

Ilimiy jurnal ha'm toplamlarda temperatura ha'm salistirma na'mlik jipek qurtin' biologiyaliq belgilerine ta'sir etip qalmay, pillelerdin' texnologiyaliq ko'rsetkishlerinde o'zgeriwine sebep boliwi mu'mkin. Usi bag'darda S.Toshpwlato'v (1969) tin' ta'jriybeleri xarakterge shekem pa'seytiriw jipek qabig'inin' seritsin zatinin' (3,65%) kemeyiwi ha'm onin' eriwshen'ligin bolsa 15% g'a pa'seywine sebep bolg'an. Pille oraw protsessi 29 da'rejede a'melge asirilg'anda seretsin mug'dari 4,1% ti qurag'an ha'm pilleden shiyki jipek shig'iw 43,1 payizdan 45,4 payizg'a, pillelerdin' shubatiliwi 78,4

payizdan 85,1 payizg'a ko'beygen. Demek, pille oraw da'wirinde temperaturani o'zgartiw joli menen pille texnologik qa'siyetlerin basqariw mu'mkin eken.

Tut jipek qurti agrotexnikasi ma'seleleri menen uzaq jillar shug'ullang'an N.G.Bogautdinov (1965) pille oraw da'wirinde sirtqi ortalik faktorlarinin' ta'siri ja'nede ku'shlirek boladi, a'sirese, temperaturani 29⁰S etip, onnan assa, texnologiyaliq ko'rsetkishler, aldin pillenin' shubatiliwi 2-3 payizg'a pa'seywin aytadi.

A.D.Mamedova (1973) o'z ta'jiriybelerini Ozarbayjon sharayatinda o'tkizgen bolip, qurtlardan' IV ha'm V jaslarinda temperatura normadag'i 23-24 da'reje ornina 27-28⁰S qa jetse, birinshiden biologiyaliq ko'rsetkishler pa'seyedi, ekinshiden aling'an pillelerde texnologiyaliq jaqтан nuqsanlar payda boladi dep esaplaydi.

T.Kavaguchi (1988) din' "Yaponiya jipekshiligi" jurnalidan awdarma qilinip, "Jipek" (№2, 1989) jurnalinda basalg'an maqalasinda qurtxanada hawanin' salistirma na'mligi normadan ko'teriliwi pillelerdin' shubatiliwina keru ta'sir ko'rsetiwini xabar qiladi ha'm ko'p mug'dardag'i qurtlar ajratqan na'mli ekskrementlerden ajralg'an ha'm qurtlardan' dem aliwinan toplang'an na'm hawanin' qurtxanada waqti-waqti menen shig'arip jiberiw kerakligin aytadi.

Qurtxanalardag'i gigrotermik rejim, a'sirese temperaturaning' o'zgerip turiwi jipek qurtinin' basqa belgi ha'm qa'siyetlerinde biraz o'zgeriwine alip keliwi mu'mkin.

A.B.Yoqubov (1997) ta'jiriybelerinde gigrotermik rejimdeg'i o'zgerisler aqibetinde pilleden gu'beleklerdin' shig'iwini, U.N.Nasirillaev, B.Kenjaev (1974) ta'jiriybelerinde qurtlardan' o'mirshen'liginin' pa'seywin, Z.Ikramov (1974) baqlawlarinda lichinkaliq da'wirinin' uzaywi ma'lim bolg'an.

B.Yu.Sadikov (1975) qurt bag'iw rejimi buzilg'an hallarda gibrid quwati-geterozis to'men da'rejede boliwini xabar qiladi. Gigrotermik rejimdeg'i o'zgerisler jipek qurti selektsiyasi ha'm na'silshiliginde qollanilatug'in usillar na'tiyjesinin' pa'seywine alip keledi. Misali, M.G.Silant`eva (1962, 1975) issig'a shidamli jipek qurti porodalarinin' selektsiyasi protsessinde kishi jastag'i qurtlardan' muttasil joqari temperatura (27-29⁰S) da bag'iw selektsion oilalarinin' o'mirshen'ligi boyinsha tabaqalanishiga alip kelgenin jazadi.

Ukraina jipekshilik ilimiy izertlewler instituti ha'm Xar`kov ma'mleket universitetinde alip barilg'an izleniwler temperaturaning' sezilerli da'rejede o'zgartiw usili menen jipek qurtinin' o'mirshen'ligi ha'm serpushtligin asiriwg'a bag'ishlang'an


(V.G.Shaxbazov, O.A.Shalamova, S.V.Suxanov, M.Yu.Braslavskiy, N.V.Merejkova, G.S.Ponamarenko, 1966; S.V.Suxanov, O.A.Shalamova, 1996).

Sunday qilib, joqarida sholiw keltirilgen ilimiy jumislar aldın jipek qurti tuqimlarini inkubatsiya qiliw, bag'iw, pille oraw protsesslerinde sirtqi ortalıq faktorların o'zgertiw tiykarında fiziologiyalıq, o'nimdarlıq ha'm texnologiyalıq belgilerin o'zgertiw ha'm en' aqirında basqariw mu'mkinliginen derek beredi.

2. TUQIMSHILIQ KA'RXANALARININ' WAZIYPALARI.

Ha'zirgi waqitta jipek qurtinin' tuqimina bolg'an talap ku'nnen-ku'n asip barmaqta bul bolsa tuqimshiliq ka'rxanalarina ja'nede u'lken juwappershilikti ju'kleydi. Sonin' ushin Respublikamizdag'i tuqimshiliq ka'rxanalari sanaat tuqimlarin tayarlaw protsessinde ol o'zinin' sipatlilig'i, janlaniw payizinin' joqarilig'i, bag'iw da'wirinde o'mirshen'ligi, pillesinin' sipati, sortililig'i ha'm jipekshen'ligi joqari bolg'an gibridd tuqimlardi tayarlamag'i lazim boladi.

Tuqimshiliq ka'rxanalarinin' uliwma jumis protsessi sanaatta bag'iw ushin tuqim tayarlawdan, respublikamizdag'i ma'mleket ha'm fermer xojaliqlarinin' qurt tuqimi menen ta'miynlewden ibarat.



Bul uliwma jumislardi orinlaw ushin tuqimshiliq ka'rxanalari birinshiden tek rayonlastirilg'an poroda ha'm gibriddlerdin' tuqimin tayarlawı, olarda joqari biologiyaliq, texnologiyaliq qa'siyetleri ha'm belgilerin saqlap qaliwlari kerek. Sonday-aq na'silli qurtlardi bag'iwdi o'tkiziw menen (qurt tuqimin janlantiriwdan baslap) pille partiyalarin tan'law, bo'lek pille, gu'belek ha'm tuqim toplamlarin ha'mde tuqim partiyasin tan'law; tuqim tayarlawdin' ha'r bir basqishında en' qolay ekologiyaliq sharayatti jaratiwdan ibarat.

Ekinshiden – joqarida aytilg'an jumislardin' ha'mme basqishinda ka'rxanada en' aldi menen jipek qurtinin' en' qa'wipli keselligi – pebrinag'a qarsi turaqli gu'resiwden, quwirshaq yaki gu'beleginde pebrina keselligi bolg'an, nuqsanli ha'm kesel gu'beleklerdin' tuqim toplamin jaramsizg'a shig'ariw, binalardi, paydalanilg'an a'spab – u'skenelerdi dezinfektsiya qiliw ha'mde basqa aldin aliw ila'jlarin orinlawdan ibarat.

Ha'zirgi waqitta na'silshilik rayoni sonday baza esaplanadi ha'm og'an na'silli qurtlardi bag'iwshi bir qatar shirket ha'm ma'mleket xojaliqlari kiredi.

Tuqimshiliq ka'rxanalari tuqimdi tek na'silshilik rayoninda jetistirilgen pilleden tayarlaydi. Biraq na'silli qurtlardi bag'iw bunday na'silshilik rayonlarinda xojaliq jumiss hilarinin' u'ylerinde o'tkizilmekte. Demek, ha'r bir sonday rayonda 1,5 min'g'a shekem na'silli qurt bag'iwshi bar, bul bolsa qurt bag'iwdi basqariw jumislarin biraz qiyinlastiradi.

Na'silshilik rayoninda ekologiyaliq sharayattin' ha'r qiyli boliwi pillelerdin' sirtqi du'zilisi ha'm fiziologiyaliq xarakteristikasi tu'rlishe bolg'an, sonday-aq, qurt bag'iw da'wirinde onin' keselleniwi tuwirisinda kerekli aniq mag'liwmatdin' bolmaslig'i na'silshilik rayoninan ko'p mug'darda kishi pille toparlarin aliwg'a tuwri keledi.

Sol menen birge qurt bag'iw da'ramad keltiriwin ta'miynlew za'ru'rliqi jan'a poroda ha'm gibriderdi islep shig'ariwg'a usinis qiliwdi toqtatip qoymaqa, olar ayrim waqitta o'zinin' genetik tabiati (jaratiliwi) boyinsha joqari pille hasilin bermeydi, bul bolsa na'silshilik rayoninda bunday pille materialinin' ko'beyiwin ha'm pille jetistiriwshilerdin' manfaatdarlig'in kemeytiredi. Bular tuqimshiliq ka'rxanalarinin' na'silshilik bazasin qayta sho'lkemlestiriw za'ru'rligigin alip keledi, partiya ha'm hu'kimet qararlarinda tuqimshiliq ka'rxanalarinan qaytadan na'silshilik – jipekshilik xojaliqlarina (plemshelkxojaliq) aylantiriw ko'zde tutiladi. Bunday xojaliqlar tiykarinan tut na'lin ko'beyittiriw (tut tuqimi, na'lshe, tut na'li), na'silli pillelerdi jetistiriw ha'm olardan sanaat ushin tuqim tayarlaw menen shug'illanadi. Bunday na'silshilik – jipekshilik xojaliqlarin sho'lkemlestiriwde qurt bag'iw waqtinda qolayli ekologiyaliq sharayatti saqlap turatug'in iri qurtxanalar quriw ha'm olarda kem miynet sarplap u'lkenligi bir qiyli bolg'an na'silli pillelerden joqari hasil aliw mo'ls herlengen. Na'silshilik bazalarin qayta sho'lkemlestiriw baslap jiberiledi, qatar na'silshilik – jipekshilik xojaliqlari sho'lkemlestirildi ha'm bul jaqin jillarda, aziqabop tutzarlardi

paydalaniwg'a kiritiw, sol xojaliqlarda qurtxanalar quriliwi, onda qurt bag'ip jetistirilgen na'silli pillelerden tuqim tayarlaw imkaniyatın beredi.

Ekinshi qurami bo'limi tuqimshiliq ka'rxanasinin' o'zi (na'silshilik – jipekshilik xojaliqlarında - tuqimshiliq tsexi). Ol jerde gu'belekler menen islew, mikroskopta tekseriw, tuqimlarg'a islew beriw ha'm qis da'wirinde saqlaw jumislari o'tkiziledi.

Tuqimshiliq ka'rxanalarında tuqim tayarlawdin' sharayatlarına ha'm pebrına keselligine qarsi gu'resiw usilina, tayarlanatug'in tuqim porodasinin' quramina ha'mde sol tuqimnan paydalaniwg'a qarap ha'r qiyli texnologiyaliq usil qollaniladi.

En' aldi menen tuqim porodasinin' quramiy bo'limine qarap biraz texnologiyaliq parqi aniqlanadi. Egerde sap porodanın' tuqimi tayarlanatug'in bolsa, tayarlaw protsessi qisqaradi, egerde gibrıd tuqim tayarlansa (a'piyawı ha'm quramalı gibrıdler) onda texnologiyaliq protsessler quramalasadi. Ekinshi aniqlawshi da'wir tuqimdi pebrına keselliginen hali qiliwdi tanlang'an usili esaplanadi.

Tuqimshiliq ka'rxanalari sanaat ushin tuqimdi tek na'silshilik rayonlarında jetistirilgen na'silli pillelerden tayarlawi kerek.

Ha'r bir tuqimshiliq ka'rxanasinin' na'silshilik rayoni na'silshilik xojaliqlarınan sho'lkemlestiriw tapqan.

Jan'a na'silshilik xojaliqlari keminde eki jil sinap ko'riledi, olardin' jumisi aling'an pillelerdin' hasili ha'm sipatlari tuwrisidag'i mag'liwmatlar, sonday-aq pebrına ha'm basqa kesellikler menen keselleniwi tiykarında baha beriledi. Qurt bag'iw da'wirinde ha'r bir xanadag'i qurtlardan' keselleniwin aniqlaw maqsetinde arqada qalg'an qurtlar tekseriledi, sonday-aq sol uchastkada qabil qilinip atirg'an ha'r bir pille partiyasınan 100 dana pille u'lgisi alinadi ha'm onin' ishindegı ha'r bir quwirshaq bo'lek mikroskopta tekseriledi. Egerde pebrına menen keselleniw eki jil dawamında bir qiyli da'rejede ha'm eski uchastka boyınsha ortasa keselleniw da'rejesinen joqari bolsa, bunday uchastkalardi na'silli rayon quramina kiritiwge ruxsat etilmeydi.

Na'silli qurt bag'ilatug'in uchastkalar sanaat ushin qurt bag'ilatug'in zonalardan ajralg'an boliwi kerek. Sog'an ha'reket qiliw kerek, na'silshilik rayoninin' quramında ha'r qiyli iqlim sharayatında jaylasqan uchastkalar bolsin. Tuqimshiliq ka'rxanalarınan na'silshilik uchastkalarinin' uzaqlig'i 40 km den artiq bolmaslig'i kerek. Bunday belgilep qoyilg'an halatta o'zgertiw ushin tiyisli sho'lkemlerden ruxsat alinadi.

Tuqimshiliq ka'rxanasinin' bir agrotexnigi na'silshilik uchastkasinda bag'ilip atirg'an 30 qutidan artiq bolmag'an qurtlarg'a hizmet qiliwi kerek.

Ha'r bir tuqimshiliq ka'rxanasi ushin tuqimlardi tarqatiw, pillelerdi tayarlaw ha'm porodalar qurami boyinsha tayarlanatug'in tuqimnin' rejesi tiyisli joqari sho'lkemler tamaninan tastiyqlang'an.

Qurtlardin' tarqatiw rejesi ayrim na'silshilik xojaliqlarinda tut tereginin' mug'darina qarap 10% artiqcha aziq esabinda belgileniwi kerek.

2016 jildin' hasılı ushın Qaraqa`lpaqstan Respublikası ushın sırttan alıp kelinetug`ın tuqımlar haqqında mag`lıwmat (1-keste).

Qaraqalpaqstan Respublikası rayonlarında 2015 jılda sanaat0 ha`m tuqımshılıq ushın ta`rbiyalang`an poroda ha`m gıbrıdler boyınsha pille tayarlaw tuwrısında

M A G` L I W M A T

(1-keste)

Rayonlar atı	Poroda ha`m gıbrıdler atı	Janlandırıw g`a qoyılğ`an tuqım, quti	Tarkatılğ`an qurt, quti	Bag`ılğ`a n qurt quti	Pille tayarlaw, tn			Ortasha hasıl. kg		Tuqım zavodı atı
					reje	Haqıqatt a	%	ochiril-ganga nisbatan	boqılğanga nisbatan	
To`rtku`l	Xorijiy	1300	1300	1300	74,2	74,9	100,9	57,6	57,6	Cilver-Silk
	T-3	1718	1718	1718	98,0	98,5	100,5	57,3	57,3	Kattakurgor
	T-3	255	255	255	14,6	13,9	95,2	54,5	54,5	Navoiy
Jami:		3273	3273	3273	186,8	187,3	100,3	57,2	57,2	-
Beruniy	Xorijiy	1350	1350	1350	77,6	78,6	101,3	58,2	58,2	Cilver-Silk
	T-3	1261	1261	1261	72,5	72,8	100,4	57,7	57,7	Kattakurgor
	T-3	255	255	255	14,7	13,9	94,6	54,5	54,5	Navoiy
Jami:		2866	2866	2866	164,8	165,3	100,3	57,7	57,7	-
Ellikqal`a	Xorijiy	1350	1350	1350	77,5	78,7	101,5	58,3	58,3	Cilver-Silk
	Tetro-3	1408	1408	1408	80,7	80,9	100,2	57,5	57,5	Kattakurgor
	Tetro-3	255	255	255	14,6	13,9	95,2	54,5	54,5	Navoiy
Jami:		3013	3013	3013	172,8	173,5	100,4	57,6	57,6	-
A`miwda`rya	Tetro-3	1462	1462	1462	83	83,1	100,1	56,8	56,8	Kattakurgor
	İp-1, İp-2	1400	1400	1400	79,5	79,5	100,0	56,8	56,8	Rostgren
	İp-2, İp-1	1600	1600	1600	90,8	91,3	100,6	57,1	57,1	Rostgren
Jami:		4462	4462	4462	253,3	253,9	100,2	56,9	56,9	
Xojeli	Tetro-3	151	151	151	8,5	8,6	101,2	57,0	57,0	Kattakurgor
	İp-1, İp-2	300	300	300	16,8	16,6	98,8	55,3	55,3	Rostgren
	İp-2, İp-1	302	302	302	16,9	17	100,6	56,3	56,3	Rostgren
Jami:		753	753	753	42,2	42,2	100,0	56,0	56,0	
Shumanay	İp-2	44	44	44	2,6	2,6	100,0	59,1	59,1	Rostgren
Qanlıko`l	İp-2	27	27	27	1,6	1,6	100,0	59,3	59,3	Rostgren
No`kis	İp-2	27	27	27	1,6	1,6	100,0	59,3	59,3	Rostgren
Kegeyli	Tetro-3	129	129	129	6,2	5,4	87,1	41,9	41,9	Navoiy

	İp-1, İp-2	100	100	100	4,8	5,2	108,3	52,0	52,0	Rostgren
	İp-2, İp-1	100	100	100	4,8	5,3	110,4	53,0	53,0	Rostgren
Jami:		329	329	329	15,8	15,9	100,6	48,3	48,3	
Shimbay	Tetro-3	106	106	106	4,4	3,9	88,6	36,8	36,8	Navoiy
	İp-1, İp-2	52	52	52	2,1	2,3	109,5	44,2	44,2	Rostgren
	İp-2, İp-1	48	48	48	2	2,4	120,0	50,0	50,0	Rostgren
Jami:		206	206	206	8,5	8,6	101,2	41,7	41,7	
Ja'mi:	<i>Xorijiy</i>	4000	4000	4000	229,3	232,2	101,3	58,1	58,1	Cilver-Silk
	<i>Tetro-3</i>	6000	6000	6000	342,7	343,9	100,4	57,3	57,3	Kattakurgon
	<i>Tetro-3</i>	1000	1000	1000	54,5	51	93,6	51,0	51,0	Navoiy
	<i>İp-1, İp-2</i>	1852	1852	1852	103,2	103,6	100,4	55,9	55,9	Rostgren
	<i>İp-2, İp-1</i>	2148	2148	2148	120,3	121,8	101,2	56,7	56,7	Rostgren
Respublika boyinsha ja'mi:		15000	15000	15000	850,0	852,5	100,3	56,8	56,8	-

3. NA'SILSHILIK KA'RXANALARININ' WAZIYPALARI

Tut jipek qurtinin` na'silshilik jumisi – jan'a jaratilg'an gibridlerdi qurawshi komponentlerdi baslang'ish tuqim qoymalarinan elita tuqimlarin tayarlaw protsessi tu'siniledi.

Bul jumista ilimiy-izertlew instituti, porodalarđ sinaw tarmag'ı, na'silshilik ha'm tuqimshılıq qatnasadı ha'm olardin` orınlaytug'ın jumis sxeması to'mendegishe:

Na'silshilik jumislarının` tiykarg'ı waziypaları

- Jipek qurti porodalarının` jasawshan'lıg'ın asırıw;
- Jipek o'nimdarlıg'ın asırıw;
- Shiyki jipek shıg'ımın asırıw;
- Porodalar populyatsiyasinin` tu'rli nuqsanlardan ha'm pillenin qolaysız tawlanıwshan'lıq (ottenochnost`) qa'siyetlerinen tazalaw.

Porodalar menen nasilshilik jumislari nasilshilik stantsiyalarında alıp barıladı ha'm olardin` aqırg'ı o'nimi elita tuqimlari esaplanadı. Elita tuqimlarin sanaatbap gibrid

Protsesste qatnasıwshılar	Uaziypaları	Orınlawshılar
Seleksiya jumislari	Porodalarđ jaratıw	İlimiy-izertlew institutlari ha'm stantsiyalar
Porodalarđ sinaw dizimi	Sinawdan o'tkiziw ha'm rayonlastırıw	Awıl xojalıq eginlerin sinaw ma'mleketlik komissiyasi
Na'silshilik jumisi	Porodalarđ ko'beytiriw	Na'silshilik ka'rxanalari
Sanaat urig'ın tayarlawshılar	Sanaatbap tuqimlardı tayarlaw	Tuqimshılıq ka'rxanalari

tuqimlar tayarlaytug'ın ka'rxanalarg'a tapsırıladı. Tuqimshılıq ka'rxanalarında tuqimlar tayarlanadı.

O'zbekistan Respublikasindag'i na'silshilik ha'm tuqimshılıq ka'rxanalari

I. Na'silshilik ka'rxanalari

1. Samarqand na'silli pille tuqimshılıq stantsiyasi.
2. "Mastura-Nur" MChJ (nasilshilik ka'rxanasi).
3. Farg'ona pille nasilshilik MChJ (nasilshilik ka'rxanasi)
4. Andijon na'silli jipekshilik stantsiyasi.

II. Sanaatbap gibril jetistiriwshi ka'rxanalar

Samarqand waliyatinda - 2 ta, Navoiy waliyatinda – 1 ta, Qashqadaryo waliyatinda – 1 ta, Xorazm waliyatinda – 1 ta, Namangan waliyatinda – 2 ta, Farg`ona waliyatinda – 4 ta, Andijon waliyatinda – 3 ta, Toshkent waliyatinda – 2 ta.

Nasilshilik ka'rxanalarida to'mendegi tuqimlar tayarlanadi

1. Oilalar pitomnigi ushin seleksion tuqimlar.
2. Da'slepki ko'beytiriw tuqimlari.
3. Superelita tuqimlari.
4. Elita tuqimlari.

Nasilshilik ka'rxanasinda bar tsexlar

1. Oilalar pitomnigi.
2. Da'slepki ko'beytiriw tsexi.
3. Superelita tsexi.
4. Elita tsexi.
5. Mikroskopik tekseriw tsexi.
6. Texnologiyaliq ko'rsetkishlerin aniqlaw laboratoriyasi.

Oilalar pitomniginde a'melge asirilatug'in jumislar

– Jan'a porodanin' baslang'ish oilalarini originatordan qabil qilib aladi (100-200 ta oila);

– Oilalar inkubatsiya qilinip en' joqari janlaniw potentsialina iye 150 ta oila qurt bag'iwg'a alinadi;

– Oilalar bo'lek bir qiyli gigrotermik ha'm aziqlaniw sharayatlarinda bag'ilip, rawajlaniwda arqada qalg'an oilalar brakovka qilib bariladi. Pille oraw ushin 100 ta en' jaqsi oyla qaldiriladi;

– Birinchi sutkada qoyilg'an tuqimlar alinadi, en' joqari ko'rsetkishlerge iye oilalar aniqlanip oilalararo papil'onaj qilinadi;

– Ha'r bir oiladan 25 ten pille u'lgileri alinip, texnologik ko'rsetkishler aniqlanadi;

– Da'slepki ko'beytiriw basqishi ushin jasawshan'lig'i 90% ten kem bolmag'an oilalar qaldiriladi;

– Oilalar pitomniginde keyingi jilda bag'iw ushin en' jaqsi oilalardan 10 ta ♀ ha'm 10 ♂ jinisli pilleler alip bo'lek papil'onaj qilinadi.

Ha'r bir nasilshilik ka'rxanasindag'i oilalar pitomnigi oilalardin' 3/2 bo'legi sol ka'rxananiki ha'm 3/1 bo'legi basqa stantsiyalardan aliniwi lazim.

Da'slepki ko'beytiriw tsexindagi a'melge asirilatug'in jumislar

- Oilalar pitomniginde tayarlangan bir-birine jaqin oilalardan aling'an tuqimlar partiyalarg'a birlestiriledi;
- Partiyalardagi na'silli qurtlar bo'lek bag'ilip, ha'r bir partiya ushin pille o'nimdarliq ko'rsetkishleri aniqlanadi;
- Na'sil ushin 40% intensivlikte pilleler tanlanadi ha'm en' o'mirshen' ha'm o'nimdar partiyalar o'z-ara shatistirip superelita tuqimlari tayarlanadi;


Superelita tuqimlarin tayarlaw

- Superelita tuqimlarin tayarlawda tan'law jedelligi 40-50% ten aspaslig'i lazim;
- Ha'r bir partiyadan mayda danadar pilleler, tawlaniwlardan ha'm tu'rli nuqsonlardan (o'tkir qutbli, buyrakta'rizli, sharta'rizli, assimetrik, atlaslik, dag'liq) ele pilleler na'sil ushin tanlanadi;
- Kesellik payizi 5% ten joqari partiyalar na'sil ushin alinbaydi;

Elita tuqimlarin tayarlaw

- Ha'r bir poroda boyinsha tuqimlardan shiqqan qurtlar qatnasinda elita qurtlari bag'iladi. Superelita tuqimlarinin' janlaniwi 92% ten kem bolmaslig'i talap etiledi;
- Superelita basqishinda inkubatsiyaga tuqimlar 25% rezerv penen qoyiladi;
- Tuqimlar janlaniwi boyinsha 10%, qurtlar rawajlaniwi ha'm mikroskopik tekseriw na'tijesine ko're 15% qurtlardi brakovka qiliniwi mu'mkin;
- Qurt bag'iwshilarg'a da'slepki 2 ku'n ishinde shiqqan qurtlar tarqatiliwi sha'rt;
- Ha'r jasta 1 quti qurt esabinan 30-40 danadan qurtlar alinip, mikroskopik tekseriw alip bariladi;
- Eger pebrina ha'm yadro poliedrozi kesellikleri aniqlansa karantinge qoyilip, pilleleri pillexanag'a tapsiriladi;
- Bir xojaliqta eki ha'm onnan artiq porodalar bag'iliwg'a jol qoyilmaydi;
- Na'silli pilleler nasilshilik stantsiyasina keltirilgende ha'r bir partiya ushin 200 danadan pille u'lgisi alinadi ha'm laboratoriya analizi o'tkiziledi;

– Na’silli pilleler OPK apparatlarida jinislarg’a ajratiladi, bunda ♀ jinisi 30%, ♂ jinisi 30% ha’m aniq emes topar 40% tin qurawi mu’mkın (1-su’wret). Aniq emes topar pilleleri bo’lek papil`onajga qoyilip, azan’g’i na’wbetshilik etiledi.





1-su’wret. Pillelardin’ jinisın anıqlaytug’in OPK apparatı


NA’SILSHILIK JUMISLARININ’ ORINLANIWI

Jan’a porodalardi ko’beyittiriw menen bir waqıtta jeke ha’m jalpi usılda elita materialın tan’lap alıw ha’m sap poroda yaki gıbrıd na’silli tuqımlardi tayarlaw. Bul basqıshti orınlaw ushin qabil qiling’an jumıs sxemasın qollaw usılına qarap eki yaki u’sh jıl talap etiledi.


Sanaatta bag’ıw uchin gıbrıd tuqımların tayarlaw. Sonday qurt bag’ıwdan aling’an pilleler pille yırıw fabrikalarına jiberiledi ha’m olardan jipek shıyki zati islep shig’arıladi.



Tut jipek qurtinin' na'silshilik jumislari sxemasi (na'silshilik stantsiyasinda eki jilliq jumis benen) ha'm sanaat pillelerin jetistiriw.



Na'silshilik stantsiyalarida jipek qurti na'silshilik jumislarinin' u'sh jilliq sxemasi.



Tuqim qoymalarin da'slepki saralaw ha'm mikroskopik tekseriw

– Gu'belekler tuqim qoyg'annan son' 30-40 ku'n o'tkennen son' da'slepki saralaw o'tkiziledi;

– Brakka to'mendegi tuqim qoymalari shig'ariladi: janlang'an qurtlar bar tuqim qoymalar, keptirilgen tuqimlar 10% ten ko'p tuqimlar, atalanbag'an tuqimlar 5% ten ko'p tuqimlar, tuqimlari normadan sezilerli kem tuqimlar ha'm gu'belekleri shirip, idirap ketken tuqim qoymalari.

– Jalpilamay mikroanaliz o'tkizilip pebrinanin' sporasi ha'm yadro poliedrozi keselliklerin qozg'atiwshilari bolg'an tuqimlar jag'ip jiberiledi ha'm dezinfektsiya o'tkiziledi.

Sanaatbap gibrid tuqimlar tayarlaw

Sanaatbap gibridler tuqimlarin tayarlawdin' tiykarg'i basqishlari.

1. Joqari sipatli pilleler aliw maqsetinde na'silli qurtlardi bag'iw.
2. Pillelerdi ha'm gu'beleklerdi tan'law, son'ra olardan tuqim aliw.
3. Mikroskopik tekseriw o'tkizip saw tuqimlarni aliw.
4. Tuqimdi jelpiw, juwiw, saralaw ha'm tuwri saqlaw.

Na'silli qurtlardi ta'rbiyalawdin' tiykarg'i qag'iydalari

– Ha'r bir na'silli qurtlar bag'ilatug'in xojaliqlarda 1 quti qurtqa 1200 kg nan tut japiraqlari 10% rezervi menen ta'miynleniwi sha'rt.

– Qurt bag'ilatug'in xanalardi tan'lawda 5-jastagi 1 quti qurtqa 70 m² maydannan kem bolmag'an sharayatlar jaratiw za'ru'r.

– Na'silli qurtlardi ta'rbiyalawda optimal gigrotermik rejim ha'm aziqlantiriw normalarina qatan' boysiniw lazim.

– 5-jasinda qurtlardi jeterlishe aziq japiraqlari menen ta'miynlenbesligi aqibetinde pille qabig'i salmag'i ha'm tuqim mug'darinin' kemeywi baqlanadi.

– Pille oraw da'wirinde hawa temperaturasi 24-25°S boliwin ta'miynlew lazim, eger temperatura pa'seyse, qurtti quwirshaqqa aylaniwina ha'm keyinshelli gu'belekler shig'iw payizina keru ta'sir ko'rsetedi.

– Tayar pilleler terip aling'annan 2 ku'n ishinde tapsiriliwi sha'rt.

Papil`onaj

Gibrid tayarlaw ushin jetistirilgen na'silli pillelerdi tuqim zavodina tapsiriwda pilleler arnawli yashiklerde (80x48x45 sm) ha'r birine 12 kg nan ko'p bolmag'an halda tapsiriladi. Eger pillelerdin' jiynaliwi ju'da' qalin jaylansa, pilleler eziliwi, qizip qaliwi ha'm usi qizip qaliw quwirshaqlarg'a keri ta'sir ko'rsetiwi mu'mkin. Aqibette gu'belek shig'iw kemeywi baqlanadi.

Na'silli pillelerdi bahalaw

1. Na'silli pilleler. 2. Sortlar aralaspasi. 3. Brak, qarapashaq pilleler.

Pille qabil qiliwshi pillekerden agropasportti alip tekseredi, eger pille partiyasinda qandaydir kesellik ha'm basqa halatlar bolg'an bolsa ha'm karantinga o'tkizilgen bolsa bunday pilleler qabil qilinbaydi.

Na'silli pillelerdi morfologiyaliq analizi

Na'silli pilleler to'mendegi morfologiyaliq belgiler boyinsha tekseriledi: pille formasi (porodanin' formasina tuwri keliwi sha'rt), pillelerdin' bir tegisligi, pillelerdegi tu'rli tawlaniwshan'liq (ottenochnost'), danadarlig'i, pillenin' tig'izlig'i yaki tig'iz oralg'anlig'i, pillenin' yisi.

Pille partiyalarinin' keyingi ko'rsetkishi 1 quti qurtan aling'an pille o'nimi esaplanadi. O'nim ko'p bolsa, sol partiyadag'i qurtlar **jasawshan'lig'i ha'm den sawlig'i** talap da'rejesinde ekenin bildiredi. Papil`onajga 1 q. dan 55,0 kg o'nim bergen partiyalar qoyiladi.

Sortlar aralaspasindag'i pillelerden ha'r jerinen 1 kg u'lgi alinip, tekseriledi. Sol 1 kg lik u'lginin' 40 payizi na'silli pillelerge tuwri kelse, sol partiya qabil qiliniwi mu'mkin. **Qarapashaq** pilleler sol partiyanin' 1% den ko'biregin qurawi ham sortlar aralaspasi na'silli dep qabil qilinbaydi.

Pebrina keselliginin' bar yaki joqlig'in tekseriw ushin pillelerden ja'ne u'lgi alinadi ha'm laboratoriyada tekseriw o'tkiziledi. Sol menen birge u'lgidegi pillelerdin' quwirshaqlarinin' tiri yaki o'lgeni de tekseriledi. Eger u'lgide o'lgen quwirshaqlar 3% ten ko'p bolsa, bunday pilleler de na'silli dep qabil qilinbaydi.

Na'silli pillelerdi saralaw

Tuqimshilik zavodina keltirilgen sortlar aralaspasindag'i 40% na'silli pillelerdi tan'lap aliw ushin zavodta pilleler saralanadi. Bunin' ushin arnawli bunker tayarlanip saralawshi pillelerdi **na'silli, sanaat ha'm geren' pilleler toparlarina vizual ajratadi**. Saralang'an pillelerden qayta u'lgi alinip ja'ne tekseriledi, eger na'silli dep saralang'an pilleler ishinen 4% na'silli emes pilleler aniqlansa, bunday pilleler qayta saralawg'a jiberiledi.

Gu'belekler menen islew

Gu'beleklerdi saqlaw, shatistiriw, tuqim qoyiw protsessleri ushin en' maqul sharayat – bu **22-26°S temperatura ha'm 60-75% hawa na'mligi** ekeni alimlar tamaninan da'liyllengen.

Ta'biyi jaqtılıq sharayatında gu'belekler ertelep saat 5-9 larda shig'adi. Gu'belek pilleden shig'iwı ushin awız boslıg'ınan silti ortalıqqa iye suyuqlıq shig'arip (seritsinaza fermenti, 0,2 sm³), pilleni seritsinini eritedi ha'm fibroinni tumshug'i menen eki tamang'a su'rip tesik o'nim qiladi, ana sol tesikten gu'belek shig'adi.

Gu'belek shig'iwı 6-7 ku'n dawam etedi ha'm en' maksimumı 3-4 ku'nlerge tuwri keledi ha'm a'ste kemeyedi.


Keselliktin' na'silli tuqimg'a o'tip ketpesligi maqsetinde ekinshi ma'rte gu'beleklerden u'lgi alinip, mikroskopik tekseriw o'tkiziledi. Eger kesellik aniqlansa sol partiya gu'belekleri taslap jiberiledi.

Gu'beleklerni shatistiriw

Gu'belekler juplasiwi 12-14 saatqa shekem dawam etiwı mu'mkin, biraq gu'belekler normal atalaniwi ushin **30 min (24°S)** jeterli dep da'liyllengen. Ko'pshilik tuqimshilik ka'rxanalarida **1 saat juplanadi** (2-su'wret).



2-su'wret. Gu'beleklerdin' juplasiwi



3- su'wret. Atalang'an urg'ashi gu'belekti pergament qaltasag'a saliw

XXR ha'm Yaponiya tuqimshiliqda gu'belekler 4-6 saat juplanadi. Bunday shatistiriwdan maqset, 24 saatliq tuqim aliwni ko'beytiriw esaplanadi. Gu'belekler chatishib bwlqach, olar bir-biridan ajratilib, urg'ashi gu'belekler izolyatsiya qilinadi (3-su'wret), erkek gu'belekler takroriy shatistiriw ushin saqlab qalinadi. Ta'krariy shatistiriw ushin erkek gu'beleklerge 3-4 saat dem beriw lazim.

Gu'belek ajratilgandan son' olar 10 min dawaminda izolyatsiya qiliniwi lazim bolmasa olar tuqim qoyiwdi baslap jiberedi (4-su'wret).



4-su'wret. Tuqim qoyiw waqti



4-su'wret. Gu'belektin' tuqim qoyup b
waqti

Tuqimdi mikroskopik tekseriwi

Gu'belekler o'lip, 20 ku'n o'tkennen son' mikroskopik tekseriwdi o'tkiziw mu'mkin. Ha'r bir tuqimshilik zavodinin' tayarlang'an tuqimlari nozematoz ha'm yadro poliedrozi keselliklarine tekseriliwi sha'rt. Pebrinanin' sporolari ha'm sariq keselligini poliedrlari aniqlang'an tuqim qoymalari jag'ip taslanadi. Mikroskoptin' 600 ma'rte u'lkenlestiriw ob`ektivida sporalar jaqsi ko'rinedi.


4. TUT JIPEK QURTI TUQIMININ' XARAKTERISTIKASI

Tut jipek qurtinin' gu'belegi qoyg'an tuqim uriq dep ataladi. Jipek qurtinin' Urig'i a'piyawu tuqim formasinda bolip, qaptallari qisilg'an, ortasi batin'qi, oval ta'rizli ko'rinske iye (5-su'wret).




5-su'wret. Uriqtin' ko'rinishi ha'm du'zilisi

Jan'a qoyilg'an tuqimnin' ren'i ashiq sari bolip, 2-3 keshe ku'ndiz dawaminda ashiq ren'nen fiolet ren'ge, son' qizg'ish-qon'ir ren'ge ha'm aqirinda, bo'z ku'l ren'li tu'ske kiredi (6-su'wret).



6-su'wret. Birinshi ku'ni qoyilg'an tuqimlar



6-su'wret. Tuqimnin' qabil qilg'an en' keyingi ren'i

Qislawshi uriqtin' haqiqiy ren'i bo'z ku'l ren'li boladi. Bivoltin porodasinin' o'z-o'zinen janlanatug'in uriqlarinin' ren'i uliwma inkubatsiya da'wirinde de ashiq sarilig'insha qala beredi.

Ha'r qanday poroda tuqimlanbag'an tuqimlarinin' ren'i ha'mme waqit sari boladi. Tuqim qoyilg'annan bir neshe ku'n o'tkennen son' ol jalpayin'qirap, gu'lshe formasina kiredi. Tuqimlang'an, biraq tuqim qoyilg'annan keyin da'slepki u'sh ku'n dawaminda

nabit bolg'an uriqlar kewip qaladi ha'm jalpaqlaw plastinkalar formasina kiredi, biraq olar fiolet, toq sari, qon'ir ren'lide boladi.

Uriqlardin' u'lken-kishi boliwi tut jipek qurtinin' porodasina, vol'tinligine ha'm onin' qurtlik da'wirinde bag'iw sharayati – agrotexnikasina baylanisli.

Misali, iri pilleli monovol'tin poroda jipek qurtinin' tuqimlari polivol'tin porodalarinikine qaraganda anag'urlim u'lken boladi. Jipek qurtlari jaqsi bag'ilmasa, tuqimlardin' salmag'i anag'urlim kemeyip ketedi. Agrotexnika qag'iydalarina su'yenip bag'ilg'an jipek qurti uriqlarinin' boyi 1,4 - 1,5 mm, eni 1,1 - 1,2 mm, massasi bolsa 0,525 – 0,650 mg g'a jaqin boladi.

Endi g'ana qoyilg'an tuqimlardin' massasi biraz awir boladi. Saqlanip turg'an sayin tuqimlardin' salmag'i kemeye beredi. Ba'ha'rgi uriq asiriw da'wirinde tuqimlardin' salmag'i, a'sirise kemeyip ketedi, sebebi bul waqitta embrion tez rawajlanadi. Inkubatsiya davrinin' aqirina kelip, tuqimlardin' massasi orta esapta 16 – 18% ke kemeyedi.

Tuqim qabig'inin' qalin'-juqalig'ida jipek qurtinin' porodasina baylanisli: iri pilleli monovol'tin poroda jipek qurti tuqiminin' qabig'i bivoltin ha'm polivol'tin porodalarinikinen 2,5 – 3 ma'rte qalin' boladi. Jaqsi rawajlang'an jipek qurti tuqiminin' qabig'i orta esapta 4 - 5 mikrong'a ten'. Tuqim qabig'inin' sirtinda aqshil jollar menen ajralg'an bo'lek u'shmu'yesh ko'rinishidagi siziqshalar bar, sonin' ushinda qurt urig'i lupa arqali qaralg'anda qali barday ko'rinedi.

Tuqimnin' ushinan biraz qaptal tamanraqta ko'zge ko'rinbeytug'in kishi (mikropiyar) tesikshe bar. Bul tesikshe arqali tuqim ishine spermatozoidlar kirip, onin' uriqlantiradi. Mikropilyar tesikshenin' awzi guldin' tadjapiraqlarina uqsas su'wretler menen oralg'an. Tuqim qabig'inin' ha'mme jerinde hawa kiretug'in jin'ishke nayshalar bar, a'ne sol nayshalar arqali uriq dem aladi.

1 g qurttan alinatug'in pille hasili keminde 3 kg, bir pillenin' ortasa awirlig'i ha'r bir poroda yaki gibridd ushin belgilengen normadan kem bolmag'an, qara pashaq 1% ten aspag'an, qurti ha'm quwirshag'i o'lgan pille formasi ko'bi menen 3-5% o'zgergen, tekserilgen u'lgilerde kesellik bolmag'an pilleler uriq tayarlaw ushin qabil qilinadi.

Qabil qiling'an pilleler tazalaw mashinasi ja'rdeminde lostan tozalanadi ha'm sortlari ajratiladi.

Sanaatbap pille aliw ushin jipek qurtinin' birinshi bwuin gibridleri bag'iladi. Ha'r qiyli porodalar'ga ta'n pilleler, gu'belekler ha'm uriq topari aralasip ketpesligi ushin porodanin' erkek ha'm urg'ashi pillelerge ajratilip bo'lek xana yaki bo'lek joylarda joylastiriw kerek.

TUQIM TAYARLAW METODLARI

1. Industrial metod. Bul usildin' maqseti sonda, na'silli pilleler keltirilgennen son' vizual saralanip, pille partiyasidan 50-100 dana u'lg'i alinadi ha'm olardi 30°S da'reje issi ha'm 70% hawa na'mlik sharayatida tezkor gu'belekler shig'ariladi. Shiqqan gu'belekler tezkor mikroskopik tekseriwden o'tkizilip, eger pebrina keselligi 3% dan mikroskopik tekserilmeydi. Usi usildin' abzallig'i – onin' anag'urlim arzan ha'm kem isshi ku'shi sarip boliwinda. Kemshiligi bolsa keselliktin' o'tip ketiw qa'wpi saqlanip qaliwinda.

2. Tsellyulyar metod. Usildin' ati latincha cellula – ketekshe yaki xaltacha ma'nisin an'latadi. Yag'niy urg'ashi gu'belekler arnawli xaltachalarg'a izolyatsiya qilinip, keyin mikroskopik tekseriledi ha'm kesellik aniqlangan tuqimlar taslap jiberiledi. Usi usildin' tiykarshisi L.Paster bolip, kesellengen gu'belekler tuqimlarin almaslig'in usinis etken.

3. Biologiyaliq metod. Bul usildin' tiykarshisi E.F.Poyarkov esaplanadi. Onin' usinisi boyinsha jan'a keltirilgen pillelerge 33,8°S issiliq, 55-65% hawa na'mlik 16 saat dawaminda ta'sir ettiriledi. Bunin' na'tiyjesinde quwirshaq denesindegi fagotsitlerdin' aktivligi asip pebrina qozg'atiwshilarin fagotsitoz joli menen nabit qiladi. Tuqimda bolsa olar lizin zati ta'sirinde eritip jiberiledi. Pebrinag'a chidamli porodalarda bunday ta'sir sporalar sanin 0 ge shekem tu'siredi, keselge beriliwshen' porodalarda bolsa 0,1-2% ke shekem kemeytiredi. Bul usildin' kemshilikleri: gu'beleklerdin' shig'iw 8-10% ke kemeyedi, gu'belekler shag'ilisiwi jamanlasadi, sutka dawaminda gu'belekler shig'a beredi, nuqsanli gu'belekler ko'beyedi ha'm ta'biyiki, atalanbag'an tuqimlar sani da ko'p boladi.

4. 50-100 den gu'beleklerdi izolyatsiya qiliw metodi. Bul usildi V.A.Strunnikov usinis etken bolip, bir neshe jillar dawaminda pebrina gu'zetilmegen yaki tek g'ana 0,05% kesellik bolg'an ka'rxanalarda qollaniwi mu'mkin. Mikroanaliz (uplotnenniy),

yag'niy tig'izlang'an analiz o'tkiziledi. Bunda issi ku'shi sarpi 30 ma'rtege shekem ekonom qilinadi.

5. 5-10 nan izolyatsiya qiliw metodi. Bul usildi S.A.Minasyants usinis etken. Eger ka'rxanada pebrina menen keselleniw 0,05% ten joqari bolg'an ha'm basqa usil qollaw imkani bolmag'anda qollaniladi. Bul usilda 15x12 ko'lemli qag'az xaltachalardan paydalaniladi.

5. JIPEK QURTININ' PARTENOGENEZI HA'M ANDROGENEZI.

1. Haywan tu'rlerinin' ko'pshiliginde jinslardin' salistirmasi bir-birine jaqin (1:1) boladi, yag'niy, yarimi urg'ashi ha'm yarimi erkek boladi.

Tut jipek qurtinin' erkeklari urg'ashilarina qaraganda anag'urlim jipekshen' ha'm o'mirshen' boladi. Atalanbag'an tuqimlardin' bunday rawajlaniwi sap, yag'niy **partenogenetik rawajlaniw** dep ataladi. XIX a'sir aqirlarinda tut jipek qurtlarinda da ta'biyi partenogenez ha'diysesi barlig'i aniqlang'an.

Atalanbag'an tuqimlardi rawajlaniwg'a qozg'awshi sebeplerin u'yrenip, alimlar atalanbag'an tuqimlarga qaynag'an suw menen ta'sir etiw, olardi shetka menen isqalaw, ha'r qiyli kislotalar menen islew ha'm basqa jollar menen tut jipek qurtlarinda da jasalma partenogenez payda qilg'anlar. **Partenogenetik** rawajlaniw joli menen aling'an qurtlardin' ha'mmesi urg'ashi qurtlar bolg'an.

Tixomirov jaratqaninan 50 jil o'tkennen keyin Yaponiya alimi X.Sato tut jipek qurtinin' gu'beleklik stadiyasina shekem normal rawajlang'an ha'm ha'mmesi erkek jinsinan bolg'an atalanbag'an tuqimlardi jasalma jol menen aktivlestiriw arqasinda partenogenetik rawajlaniwshi qurtlar alg'anlig'in ayitqan. Sato partenogenetik na'sil aliw usilin (retseptini) ko'rsetpegen.

Ko'p jillar alip barilg'an izertlewler na'tiyjesinde partenogenetik qurtlar payda qiliw usili islep shig'ilg'an. Bul usil to'mendegilerden ibarat: atalanbag'an urg'ashi qurtlardin' qarni jariladi ha'm ishi tuqimlar menen liq toli ovariollar shig'arip alinadi. Tuqimlardi tuqim nayshalarinan – ovariollardan shig'arip aliw ushin olar marlidan qiling'an elekten ezip o'tkiziledi. A'ne sonday jol menen aling'an atalanbag'an tuqimlar 18 minut dawaminda 46⁰S temperaturali issi suwg'a salip qoyiladi, sonnan keyin xana temperaturasindag'i suw menen tez juwladi. Sol jol menen aktivlentirilgen tuqimlardan 85% ge shekem partenogenetik qurt shig'adi, bul qurtlardin' ha'mmesi urg'ashi bolip, olar o'z anasinin' genlik ta'biyatin aniq ta'kirarlaydi.

Jasalma partenogenez joli menen tek urg'ashi na'sil jetistiriw usili u'lken teoriyalik a'hmiyetke iye, sebebi bul usil tuqimlaniw protsesssin aydinlastirip beredi. Sol menen birge, partenogenez ja'rdeminde tut jipek qurtlari genlik belgilerinin' na'silden-na'silge o'tiwi u'yreniw mu'mkin. Gu'belek qarninan tuqimlardi sig'ip shig'arip, 46⁰S li issi suwda 18 minut dawaminda islew lazim. Bunda atalanbag'an tuqimlar rawajlana baslaydi. Eger tuqimlar aktivlentirilgennen keyin 36-48 saat o'tkennen son', diapauzadan

azat qiliw ushin NSI menen islense, 10 ku'nnen keyin olardan partenogenetik qurtlar – urg'ashi qurtlar shig'adi. Eger qurt bag'iw da'wri tamam bolg'annan keyin bul urg'ashi qurtlardan' ha'mmesi ushi jin'ishke pille orasa, bul belgi genlik belgi boladi (3).

Biraq jasalma partenogenezdin sanaatta paydalanip bolmadi, sebebi na'silli erkeklerge qara'ganda kem jipek beredi (4).

2. Tek erkek na'sil jetistiriw ushin B.A.Astaurov, keyinrek V.A.Strunnikovlar tamaninan **androgenetik** na'sil aliw usili islep shig'ildi ha'm engizildi.

Androenez dep rawajlaniwidin' sonday jolina aytiladi, bunda atalang'an tuqim o'zinin' ovoplazmasi qatnasinda ha'm eki spermatozoid yadrosinin' qosliwi na'tiyjesinde rawajlanadi. Tuqim yadrosi tuqimlaniw protsessinde qatnaspaydi.

Androgenetik erkek na'sil aliw usili tuqimg'a eki tamanlama ta'sir ko'rsetiwden ibarat.

Birinchi ta'sir urg'ashi na'sil yadrosin rawajlaniwidan toqtatip turiwg'a qaratilg'an bolip, buning' ushin yadro zatining' reduktsiya protsessi waqtinsha toqtatip qoyiladi. Bunday ta'sir urg'ashi gu'belek denesindegi tuqimlardi ma'lim ku'shke iye bolg'an x-nurlar menen nurlaw ha'm sonnan keyin gu'belekler qoyip bolg'an atalang'an tuqimlardi hawa temperaturasi 40⁰S bolg'an jayda 60 minut dawaminda termoaktivlewden ibarat. Termoaktivlew jumisinin' baslanivi atalang'an tuqimlardin' issig'a en' sezgir bolg'an da'wrine ju'da' ham tuwri keliwi kerek. Bul da'wir tuqim qoyilip bolg'andan keyin 23⁰S temperaturada rawajlaniw waqtinda 100 minuttan son' baslanadi. Tuqimlar rawajlanip atirg'an waqitta temperatura 1⁰S asirilsa yaki kemeytirilse, tuqimlardan' sezgirlik da'wri, sog'an nuwapiq ra'wishte, 10 minut aldin yaki keyin baslanadi.

Ekinchi ta'sir eki spermatozoid basshalarinin' qosiliwi ushin qozg'atip qoyiwidan ibarat. Ekinshi ta'sir de issilik ta'siri bolip, bul birinchi ta'sirden keyinaq, hawa temperaturasi 36⁰S bolg'an jayda 145 minut dawaminda a'melge asiriladi. Ekinchi issiliq ta'siri da'wri normal rawajlanip atirg'an tuqimlardan' kariogamiy da'wri menen bir waqitta tuwri keliwi kerek.

Eger x-nurlar menen nurlang'an birar porodaning' urg'ashi gu'belekleri aojika porodasidan bolg'an erkek gu'belekler menen uriqlantirilsa da joqarida ko'rsetilgen usil menen termoaktivlense, tuqimnan (qara ornina) tek sari qurtlar shig'adi ha'm olardin' ha'mmesi erkek boladi.

Sari ren'li ha'm tek erkek qurtlardan' payda boliwi tuqimlar yadrosi aojika porodasına kiriwshi erkek qurtdin' eki spermatozoidinin' qosliwi joli menen payda bolg'anlig'in ko'rsetedi, sebebi normal tuqimlaniwda ren'i qara ha'm ha'r eki jinisqa kiriwshi qurtlar payda boliwi kerek edi.

1957 jili Astaurov ha'm Ostryakova-Varshaverlar jabaywi jipek qurti *Bombyx mandarina* menen *Bombyx mori* porodaların shatistirip birinshi ma'rte toliq androgenez poroda alg'anlar.

Jipekshilikte ken' paydalaniw ushin erkek na'sil jetistiriw ma'selesini ha'zirgi waqitta basqasha jol menen, yag'niy tut jipek qurtlarinin' tuqimliq ha'm qurtliq stadiyalarında jinisina qarap belgilep (nishonlab) qoyilg'an porodaların shig'ariw joli menen hal qiling'an.

Tuqimlardi ionlawshi nurlar menen nurlaw ja'rdeminde yarimi aq ren'li, qalg'an yarimi bolsa a'dettegishe, bo'z-ku'l ren' tuqimlar aling'an. Bul tuqimnan shig'arilg'an qurtlardi ayriqsha-ayriqsha bag'iw na'tiyjesinde aq ren'li tuqimnan shiqqan qurtlardan' ha'mmesi erkek, ku'l ren' tuqimnan shiqqan qurtlar bolsa urg'ashi ekenligi aniqlang'an.

Jinisi boyinsha belgilep qoyilg'an tuqimlardi tuqim zavodlarda qista-aq ele qurt bag'iw da'wri baslanbastan aldin, erkek ha'm urg'ashilarg'a ajratsa boladi. Bul protsessti mexanizatsiyalastiriw da mu'mkin. Sonday-aq, qurtliq stadiyasinda jinisi boyinsha belgilep qoyilg'an porodalar da jetistirilgen, bul porodalar urg'ashi qurtlarinin' ren'i a'dettegisheligi (yag'niy ren'i maskali aq ha'm yarim ayta'rizli daqlig'i), erkekleri bolsa maskasiz oq ha'm yarim ayta'rizli daqsizlig'i menen pariqladi.

Qurtliq stadiyasinda jinisi boyinsha belgilep qoyilg'an porodalardin' naqolaylig'i sonda, bul qurtlardi u'shinshi jastan aldin, yag'niy qurtlar pigmentatsiyasi ko'rinetug'in bolg'annan aldin jinislariqa qarap ajratip bolmaydi.

6. BIOLOGIYALIQ USILDA JİPEK QURTİ TUQIMIN TAYARLAW

Gu'belekler ajratilg'annan son' tezde tuqimlay baslaydi, sonin' ushin olar ajratilg'anna son', ko'bi menen 10 minuttan keyin tuqimlatiw ushin arnawli jayg'a qoyiladi. Ayni waqitta aldi menen bilinbay qalg'an nuqsanli pilleler brak qilinadi. Gu'belekler ka'rxanada qabil qiling'an tuqim tayarlaw usilig'a muwapiq jaylastiriladi. Ha'zirde respublikamizda qurt tuqimin tayarlawda tsellyulyar usil, biologiyaliq usil – pillelerge joqari temperatura menen ta'sir qiliw usili, 25 – 100, sonday-aq 5 den gu'belekti toparlarg'a ajratip izolyatsiyalaw usili ha'mde tig'izlastirip mikroskopta tekseriw usili qollaniladi.

Qurt tuqimin tayarlawdin' bul usillari islep shig'ariw imkaniyatlarina, pebrina keselliginin' tarqaliwina, na'silshilik xojalig'inin' halatina ha'm basqa jergilikli sharayatlarg'a qarap qollaniladi. Na'silli qurt tuqimlari tek tsellyulyar usil menen tayarlanawi kerek.

Ha'r bir usildin' tiykarg'i qa'siyetleri to'mendegilerden ibarat.

A) Gu'beleklerdi qag'az qaltasalg'a 1 – 2 den yaki qag'az qutilarg'a 25 – 50 – 100 den qilip jaylastiriw;

B) Gu'beleklerdin' kesellengenligin aniqlaw ushin olardi mikroskopta tekseriw.

Professor E.F.Poyarkov 1945 jilda pebrinag'a qarsi gu'resiwdin' biologiyaliq usilin usinis qiladi, bunda gu'beleklerdi jaylastiriw ham, olardi mikroskopta tekseriwde talap qilinbaydi. Jetiliw da'wirinde bolg'an pilleler 33,5 – 34,3⁰ temperaturada qizdiriladi. Na'tiyjede UzNİSh biologlari gruppasi (O.G.Saprikina, V.V.Zvorikina, A.İ.Xaxanov, L.F.Rojdestvenskaya) biologiyaliq usildin' to'mendegi variantlardin' usinis etti.

A) 55 – 65 % na'mlikte 40⁰ temperatura menen 24 saat dawaminda toqtawsiz ta'sir etiw;

B) 40⁰ temperatura menen 16 saat dawaminda toqtawsiz ta'sir etiw;

V) 40⁰ temperatura menen sutkasina 12 saattan 2 ku'n dawaminda ta'sir etiw. Basqa waqitlarda temperatura 25 – 26⁰ boladi.

Normal sharayatda oralg'an ha'm jalpi pille oraw baslang'aninan 8 – 9 shi ku'nleri terip oling'an pillelerge joqari temperatura menen ta'sir etiledi.

1960 jilda ha'mme variantlar sinap ko'rilgende temperaturaning' asiwi ha'r qiyli porodalg'a tu'rlishe ta'sir etiw ma'lim boldi. Joqari temperatura menen ta'sir etkende quwirshaq ovariollarindag'i tuqim qabig'inin' payda boliwi tezlesedi, bul bolsa

pebrinanin' tuqim ishine kiriwge jol qoymaydi, sonday-aq quwirshaq denesindegi fagatsitlerdin' protsessin asiradi. Bulardin' ha'mmesi tuqimnin' pebrina menen keselleniw anag'urlim kemeytiredi, lekin keselliktin' bir bo'legi qaladi. Buni keselleniw din' qaldig'i delinedi.

Joqarida jazilg'an tekseriwlerdi o'tkiziw den aldın qurtlar 5 – jasinin' baslarında pebrina menen jasalma kesellentirilgen. Bul pilleler qizdirilg'annan keyin keselleniw qaldig'i 0,5 – 26,5 %, baqlawda bolsa keselleniw qaldig'i 4 – 46 % ti qurag'an. Gruziya jipekshilik institutinin' tekseriwin she, quwirshaqlar o'te qizdirilg'anda kelesi a'wlad tuqiminan qurtlar 5 – 7 % ge shekem kem ashıp shig'adi, biraq qurtlar din' bag'ilip atirg'an da'wirindegi halatina ta'sir etheydi.

Tuqim zavodlarinin' aniqlawina ko're biologiyaliq usilda islengen pillelerden gu'belekler kesh shig'adi, olar jaman shatisadi, tuqim kem shig'adi. A'sirese 40⁰ temperaturada bir sutka dawamında ta'sir etilgende tuqim ju'da' kem shig'adi. Fergana tuqim zavodinin' baqlawinsha 40⁰ temperatura menen 16 saat ta'sir etilgende jaqsi na'tiyjeler aling'an.

Pillelerdi tuqim zavodqa mu'ddetinen 1 – 2 ku'n keyin alıp keliw hallari tez – tez bolıp turadi. O'zi ITI biologlari gruppasinin' pikirine ko're, pillelerdi tapsiriw keshiktirilgende gu'belekler din' pilleden shig'awi kemeyip ketip, tuqimlanbag'an tuqimlar sani asadi.

Biologiyaliq usil menen tuqim aliwda su'rilerge jazilg'an emul'siya shimdirilgen qag'azdin' ha'r 1 m² qa 800 dana esabınan urg'ashi gu'belek qoyiladi. Gu'belekler sol jayda tuqimlaydi, aradan 2 sutka o'tkennen son', gu'belekler terip alinip joq etiledi. Sonnan keyin tuqim qoyilg'an qag'azlar a'stelik penen alinip, bosiraq qilip oraladi ha'm tuqim partiyasi menen qirip aling'an sha tuqim saqlaw xanalarında bo'lek – bo'lek turadi. Eger tuqim shashilatug'in bolsa, qag'az qutishalarg'a salinadi.

V.A.Strunnikov gu'beleklerdi tig'izlap mikroskopta tekseriw ha'm gruppalap izolyatsiya qiliw usilin usinis qildi (1954 jil). Bul usil bir neshe jil dawamında pebrina keselligi bolmag'an yaki ol 0,05 % ten aspag'an jaylardag'i tuqim zavodlarında g'ana qollaniladi. Pebrina menen keselleniw 0,001 % ten aspag'anda gu'belekler 100 den keselleniw 0,001 % - 0,05 % bolg'anında 50 den, keselleniw 0,05 % ten asip ketgende 25 ten izolyatsiya qilinadi. 100 gu'belekli qutishalar 40 x 30 x 8 – 9 sm, 50 gu'belekli

qutichalar 30 x 20 x 7 – 8 sm u'lkenlikte boladi. 100 gu'belekli qutichalar karton qag'az benen 4 kletkag'a bo'linip, olardin' ha'r birine 25 ten gu'belek jaylastiriladi.

Ajralip bolg'an gu'belekler ishki betine emul'siya su'rkelgen qutichalarg'a salinadi. Ha'r bir qutichada 50 – 100 den gu'belek boladi. Gu'belekler qutichag'a salmag'ina qarap salinadi. Bul bolsa jumisti tezlestiriledi. Qutichanin' qapqag'i jabiladi, og'an partiyanin' nomeri, gibridtin' ati ha'mde gu'belek izolyatsiya qiling'an ku'n jazip qoyiladi. Qutichalar yashiklarga jaylastiriladi. Yashikler su'rilerge qoyiladi.

7. TSELLYULYAR USILDA JİPEK QURTI TUQIMIN TAYARLAW

XIX asrdin' ortalarina shekem qurt tuqimin pille jetistiriwshilerdin' o'zleri (kelesi jili o'zi bag'iwı ushin o'zlerine kerekli mug'darda) ya bolmasa kishi ka'rxana iyeleri kelesi jili ba'ha'rde jergilikli bazarda satiw ushin tayarlardı. Eki haldada tuqim tayarlaw ushin ajratip aling'an pilleler tegis ju'zege jayip qoyiladi (stol u'stine, su'rilerge, qavatlarg'a), olardan shiqqan gu'belekler bolsa juplasg'aninan son' ajratilip qag'az betine yaki siylege uqsas materiyalg'ag'a qoyiladi, ol jerde gu'belekler tuqim qaldiradi. Onin' toplan yaki ko'shirip alip suwda juwip keptirer ha'm ba'ha'rge shekem saqlap son' satardi.

Ha'r bir gu'belekti bo'lek ajratpastan qaltasalarg'a ha'm basqalarg'a bunday saliw tuqim tayarlawdin' sanaatlasqan dep atalg'an a'piyawı usili ayrim waqıtta ha'm ha'zipde na'silli pilleleri pebrına menen keselleniwi derli ushiramaytug'in tuqimshiliq ka'rxanalarında qollaniladi. Biraq ta'jiriybe soni ko'rsetedi, bunday usildi bir neshe jil qollaw ha'm a'sirese, tuqim tayarlawda pebrınag'a qarsi tekseriwdi bosastiriw (pebrınag'a qarsi qurt bag'iw, pillelerdi qabil qiliw waqtında aling'an u'lgidegi quwirshaq, gu'belek ha'mde tayarlang'an tuqimnan aling'an u'lgiler boyınsha tekseriledi) qurt bag'iwda bul kesellikti birden ha'wij aliwg'a sebep boladi, sebebi na'silshilik uchatkalarinan keletug'in na'silli pillelerden ka'rxana o'zi ushin tuqim tayarlaydi. Na'tiyjede tuqimdi ma'mleket baqlawınan o'tkizilgende, onin' pebrına menen ku'shli kesellengenligi aniqlanadi ha'm bunday kesellengen ha'mme tuqimlar joq etiledi. Sonin' ushında pille jetistiriwshi respublikalardalarda tuqim tayarlawdin' bunday usilin qollaw qadag'an etilgen.

L.Paster tamaninan usinis qiling'an kesellikten xali bolg'an tuqim tayarlawdin' ekinshisi – tsellyulyar usili esaplanadi (7-su'wret).

XIX asrdin' ortalarında aldin Evropa jipekshiligi, keyin Aziya ma'mleketlerinin' jipekshiliginde qurtin' en' qa'wipli keselligi bolg'an pebrına ken' tarqaldi (ma'lim, bul kesellikti qozg'atiwshilar a'wladtan – a'wladqa tuqim arqali o'tedi).



Ургочи капалак




0,5% K_2CO_3 да эзиш



Эзилган моддани
филтрдан ўтказиш



Микроскопда тайёрланган
препаратни 600 катталиқда кўриш



Микроскопда кўриш учун
препарат тайёрлаш



2.600 тезликда 3 мин. центрифугадан ўтказиш

7-su'wret. Tselyulyar usilda tuqim tayarlaw texnologiyasi

Ta'biyi jipekti islep shig'ariw keskin kemeydi. Bul kesellikke qarsi gu'resiw usilin tabiw za'ru'r bolip qaldi. Ataqli frantsuz alimi, ha'zirgi zaman mikrobiologiya pa'ninin' tiykarshisi Lui Paster tamaninan usinis qiling'an ila'jlardan biri tuqim tayarlawdin' tsellyulyar usili esaplanadi.

Tsellyulyar usili – sonnan ibarat, ha'r bir urg'ashi gu'belekti erkek gu'belekten ajratilg'annan keyin qandaydir bo'lek izolyatorg'a: qag'az yaki material qaltasag'a, qag'az yaki metall stakanlarg'a ha'm basqalarg'a jaylastiriladi. Onda urg'ashi gu'belek tuqim (tuqim) qaldiradi. Keyin ha'r bir gu'belek mikroskopta tekseriledi ha'm egerde olarda pebrina keselliginin' qozg'atiwshi spora tabilsa, onda gu'belek tamaninan qaldirilg'an tuqimlar pu'tinley joq etiledi. Bul usildin' bir neshe tu'ri bar bolip, olar gu'beleklerdi izolyatsiya qiliw usili menen izolyatsiyanin' tig'izlig'i ha'm mikroskopta tekseriw texnikasi menen bir – birinen pariqli qiladi. Biraq bul usildin' tiykarshi maqseti gu'beleklerdi mikroskopta tekseriw ha'm kesellengen tuqimlardi jog'altiw ha'mme waqit saqlanip qaladi. Bul usildin' ha'r qiyiligi tuwirisinda sabaqliqti tiyisli bo'limlerinde aniq bayan qiling'an. Mikroskopta tekseriwdin' za'ru'rliqi sol kibi za'ru'r a'spab – u'skeneler menen u'skenelengen iri tuqimshiliqlik ka'rxanalarinin' sho'lkemlestiridi sha'rt qilib qoydi. Sonday qilib L.Pasterdin' usinisi, tuqimshiliqlik ka'rxanalarinin' jaratiliwi ha'm rawajlanishi ushin tiykar bolip ol tek pebrinag'a qarsi tabisli gu'resiwden basqa o'zi menen birge na'silli material aliwdin' sho'lkemlestiriw formalari ha'm texnologiyasin qayta islew ha'mde fiziologiyaliqlik halatin jaqsilaw, jipek qurtinin' ha'mme rawajlanish da'wirlerinde ekologiyaliqlik normalardi a'melge asiriw ha'm ornatiw joli menen porodalar quramin jaqsilawdan ibarat.

Sonday qilib tuqimni tayarlaw texnologiyasi en' aldi menen pebrinag'a qarsi gu'resiw usilina baylanisli. Keyin onnan qanday sap poroda yaki gibrid tuqim tayarlanishiga baylanisli. Egerde birinchisinde, bir porodanin' gu'belegin juplastirish za'ru'r bolsa, ekinchisinde bolsa egerde gibridni birinchi a'wladi tayarlanip atirg'an bolsa juplastirilatu'g'in urg'ashi ha'm erkek gu'belekler ha'r qiyili porodalardan bolishi kerek.

Egerde uchgibrid (trigibrid) yaki quramali gibridtin' (tetragibrid) tuqimi tayarlanatu'g'in bolsa, urg'ashi ha'm erkek gu'belekler ha'r qiyili porodalardan yaki gibridlerden bolishi lazim.

Tuqim tayarlawdin' qatar texnologiyaliqlik qa'siyetleri onin' tayarlaw na'wsimine ha'm onin' paydalaniw da'wirine baylanisli. Egerde sol jili ta'krariy qurt bag'iw ushin

tuqim tayarlanatug'in bolsa, tuqimlar qisqartirilg'an qislawg'a qoyiladi ha'm olar jasalma janlantiriladi; ba'ha'rgi pillelerden tayarlang'an tuqimlardi kelesi jili ta'krariy qurt bag'iwda paydalanilsa, olardi uzaytirilg'an qislawg'a qoyiwdi talap qiladi.

8. URG'ASHI GU'BELEKLERDI KESELLIKLERGE QARSI MIKROSKOPTA TEKSERIW.

Tekseriletug'in tiri janzatlardin' keselliklerine qarsi gu'resiw usillaridan biri, aniq bir keselligik qozg'atiwshini mikroskop arqali tekserip, oni aniqlaw esaplanadi. Jipekshilikte en' qa'wipli bolg'an pebrina keselligine qarsi gu'resiw, jipek qurtin mikroskopta tekseriw usillarina tiykarlang'an. Olar sonnan ibarat, gu'belekler tuqim (tuqim) qaldirip bolg'annan son', mikroskopta tekserip ko'riledi. Egerde gu'belek pebrina sporasinin' barlig'i aniqlansa, onda sol gu'belek tamanidan qaldirilg'an ha'mme tuqim joq etiliwi sha'rt, sebebi ol sol kesel menen toliq yaki bir bo'limi ziyanlang'an boladi. Jipek qurtinda ol yaki bul keselligikti qozg'atiwshi spora barlig'in aniqlaw ushin ha'mme da'wirlerde yag'niy tuqim, qurt, quwirshaq ha'm gu'belek da'wirlerinde tekseriledi (8-su'wret).

Baqlanip atirg'an ol yaki bul keselligik qozg'atiwshinin' barlig'ina qarap mikroskopta tekseriw din' ha'r qiyli usillari, tu'rli mikroskoplar (ha'tte elektron mikroskoptada), ha'r qiyli u'lkenlestirgishler ha'm preparat tayarlawdi tu'rli jollari qollaniladi.

Jipekshilikte qurt, quwirshaq, tiri gu'belek ha'm a'sirese, keptirilgen gu'beleklerdi jalpi mikroskopta tekseriw ken' qollaniladi. Tuqimshiliq ka'rxanalari biologiyaliq tekseriwge arnalg'an bolip, olar 600 ma'rte u'lkenlestiriletug'in mikroskoplar menen u'skenelengen. Bul bolsa pebrina sporasin yaki sari keselligin qozg'atiwshi poliedrozlardi, tas keselliginin' sporalarin ha'm qatar basqa keselliklerdin' qozg'atiwshilarin aniqlawg'a imkan beredi.

Preparat tayarlaw. Qandaydir qurg'aq yaki yarim qurg'aq na'rseni mikroskopta ko'riw ushin onnan preparat tayarlaw kerek. Preparat tayarlaw ushin a'dette onin' suw yaki basqa suyuqliq penen havonshada eziledi, son' onnan ayna u'stine tamshi alinadi. Suyiq tekseriletug'in na'rse (misali, qan suyuqlig'i) tamshi ko'rinishinde aynashasinda alinadi. Egerde preparat nativ formasinda, yag'niy suyiq halinda tekserilse, onda eki ayna: qalin' buyim ha'm juqa qaplag'ish aynasi qollaniladi. Buyim aynalari shama menen eni 20 – 30 ha'm boyi 70 – 100 mm u'lkenlikte bolip, qalin'lig'i 1 den 6mm di quraydi. Qaplag'ish aynalar ju'da' juqa tayarlanadi, onin' qalin'lig'i 0,2 mm bolip kvadrat formada, tamanlarinin' u'lkenligi bolsa 15 – 20 mm. Sonday aynalar «asilip


turiwshi» ha'm «ezilgen» preparatlardi tayarlaw usillarınan paydalang'anda da qollaniladi.

1. «Asilip turiwshi» tamshi usilinda tayarlang'an preparatlar. Bunday preparatlardi tayarlaw ushin ortasi teren' bolg'an qalin' buyim aynalari ha'm kvadrat formadag'i qaplag'ish ayna qollaniladi, bunda kvadrat tamanlari shuqirdin' diametrine qarag'anda 3 – 5 mm u'lken boliwi kerek. Tamshi qaplag'ish aynasına alinip keyin aylantirip onin' teren'lestirilgen jerine sonday qoyiliw kerek, na'tiyjede tamshi shuqirshanin' betine hech jerine tiymesten tamshi sonday halatta mikroskop astında tekseriledi.

2. «Ezilgen tamshi» usilinda preparat tayarlang'anda a'piyawı buyim aynasına tekseriletug'in suyıqlıqtan tamshi alinip, onin' u'stin'gi tamanınan a'piyawı qaplag'ish ayna menen qaplanadi.

Tap birinchi preparatqa uqsas tekseriletug'in suyıqlıq ob`ektiv linzanin' sizig'inan ajratilg'an ha'm qaplag'ish ayna menen biraz hawa qavatına iye.

3. Mikrobiologiyalıq halattag'i ha'm boyalg'an preparatlar ken' qollaniladi. Olar to'mendegi ta'rıtpe tayarlanadi: buyim aynachasinin' bir tamanin ortasına tekseriletug'in suyıqlıqtan tayaqsha ja'rdeminde tamshi alinadi; tayaqsha yaki basqa buyim menen aling'an tamshi qaplag'ish ayna menen buyim aynasinin' u'stin'gi tamanınan su'rtiledi keyin keptiriledi ha'm boyaladi. Bunday halattag'i preparatlardi keptiriw ha'm boyawdin' ko'p usillari bar. Tayarlang'an preparat mikroskop astında qaplag'ish aynani qollamastan ko'riledi.



8-su'wret. Mikroskopik usilda tuqim tayarlaw

4. A'melde jipekshilikte pebrinani ko'riw ushin qara tush penen ortalıqtı boyaw usili qollaniladi. Bunin' ushin buyim aynasi ortasinin' on' tamanına shiyshe tayaqsha menen tekseriletug'in suyıqlıqta tamshi alinadi ha'm qaptalina sol tayaqsha ja'rdeminde

tamshi qara tush tamizilip aralastiriladi. Keyin tamshinin' shetine buyim aynasinin' tegis qirin yaki qaplag'ich aynanin' sheti tiygiziledi, na'tiyjede tamshi og'an qoyilg'an aynag'a tiyip tez buyim aynasinin' ortasi boylap chep tamang'a turg'an jerinen su'riledi. Ken' qara tush penen boyalg'an preparat payda boladi ha'm sol waqitta mikroskopta gu'zetiledi. Qara tushtin' ren'ine pebrinanin' aq sporalari (olar ren'in qabil qilmaydi) jaqsi ko'rinedi. Egerde preparat ko'p ma'rte u'lkenlestirip ko'riletug'in bolsa, onin' xana temperaturasinda keptiriw za'ru'r, bunin' ushin keminde 30 minut waqit talap qiladi.

Qurg'aq gu'beleklerdi mikroskopta tekseriw.

Ha'zirgi waqitda mikroskopta tekseriw din' ha'r qiyli usillari (texnologiyaliq sxemalari) qollanbaqta, sol sebepli biz mikroskopta tekseriw din' ha'mmege ma'lim sxemasin bayan etip ha'm a'melde ha'zir bul sxemag'a qanday o'zgertiwler kiritip qollanip atirg'anin esletip o'temiz.

Tuqimshiliq ka'rxanalarinda ha'r bir gu'belek mikroskopta eki ma'rte, aldin qarın bo'limi keyin qalg'an bas ko'kirek bo'limi (kontrol) tekseriledi. Tuqimshiliq ka'rxanalari sharayatında qurg'aq gu'beleklerdi mikroskopta tekseriw gu'belekler tuqim qaldirg'annan keyin shama menen 15 ku'n keyin baslanip 10 oktyabrden keshke qalmay juwmaqlaniwi kerek.

Gu'beleklerdin' kebiwi sonin' ushin za'ru'r, onda bolg'an pebrina keselliginin' qozg'atiwshisi rawajalaniw da'wirinen spora da'wirine o'tiwi kerek, na'tiyjede onin' mikroskoptin' 600 ma'rte u'lkenlestiriletug'in halatında arnawli usillari menen (boyamay) formasin an'sat ko'riw mu'mkin.

Ha'mme jaramsiz tuqim toplamlari, sonday-aq saralaw waqtında to'gilgen tuqimlar ha'r ku'ni joq etiledi. Saralawdan son' normal tuqim toplamlari karavotlarda, su'rilerde yaki arnawli yashiklerde saqlanadi. Normal hawa almasiniwi ushin qaltasalar tuqim toplami menen karavotlarg'a, yashiklerge ha'm basqalarg'a sonday jaylastiriliwi kerek, olardi qatar arasinda biraz bosliqlar bolsin. Saralab qoyilg'an tuqim toplamlari mikroskopta ko'riw ha'm kontrol tekseriwde eki ku'nnen aspaslig'i kerek.

Mikroskopta tekseriw jumislari eki basqishta a'melge asiriladi:

1. Mikroskopta islewshiler tamaninan orinlanatug'in jalpi mikroskopta tekseriw.
2. Kontrolyorlar tamaninan orinlanatug'in jalpi kontrol tekseriw.

Mikroskopta tekseriw aldinan ha'r bir gu'belek izolyatsion qaltasadan alinip eki bo'lekke - qarin ha'm bas ko'kirek bo'limine ajratiladi. Qarin bo'limi eziw ushin xovonchag'a salinadi, bas ko'kirek bo'limi bolsa keyin kontrol tekseriw o'tkiziw ushin qayta qaltasag'a salinadi. Egerde bir qaltasada u'sh gu'belek bolsa, olardin' ha'mmesi bir xovonchada salinadi. Sol qarinlarg'a biraz mug'darda suw ($1...3\text{sm}^3$), qosip, qol yaki mashina menen eziledi.

Mikroskopta tekseriwshi to'mendegi ta'rtipte isleydi. Gu'belektin' denesi salip ezilgen xovonchani ha'm olardan sol gu'belekler aling'an qaltasalar menen birge mikroskopta tekseriwshige uzatqanda, ol idistan chep qoli menen aynasin aladi ha'm aylanatug'in stulda aldi tamani menen xovonchag'a burilip, olardi ondag'i en' shetki u'shewinen da'ste (miss yaki shiyshe tayaqsha) menen birden tamshi alip, olar buyim aynasina ma'lim ta'rtipte tamiziladi (paydalanilg'an tayaqsha bos idisqa salinadi).

Bul preparatti mikroskopta ko'rgende pebrina sporasi aniqlanbas, mikroskopta tekseriwshi predmet aynasin su'redi ha'mde ekinshi preparatti gu'zetedi. Egerde sol preparatta pebrina sporasi barlig'i aniqlandi dep xulasa qilinsa, onda mikroskopta tekseriwshi usi waqittin' o'zinde tiyisli xovonchani astinda tuqimi menen qaltasani aladi ha'm stol qapqag'inan tesikshe arqali onin' astinda jaylasg'an – kesellengen qaltasalar ushin arnalg'an idisqa taslaydi, keyin sol kesel xovonchalar turatug'in jayg'a qoyiladi, son' u'shinshi preparatti tekseriwge kirisedi.

Egerde pebrina ko'rinbese, onda buyim aynasin juwiw ushin tarelkag'a salinadi.

Buyim aynasindag'i ha'mme u'sh preparatti tekserip bolg'annan son', kesellik uchrag'an buyim aynasi bo'lek kesel aynalar ushin qoyilg'an tarelkag'a salinadi. Buyim ha'm qaplag'ish aynalar bo'lek juwiladi ha'mde dezinfektsiya qilinadi.


Ko'binese mikroskoptin' tekseriw maydoninda ha'r qiyli basqa mikroorg'anizmlerdi ko'riwi mu'mkin, olardin' sporasi pebrina sporasinan u'lkenligi, formasi, sonday-aq tas keselligi (zamarriqlardin' mitselliylari) ha'm sari keselliginin' ko'p qirralarinan pariqladi. Ha'mme sonday preparatlar gu'man taypasina kiritiladi ha'm gu'belekler tamaninan qaldirilg'an tuqimnin' ha'mmesi jaramsizg'a shig'arilip tarqatiwg'a ruxsat etilmeydi. Bunday tuqimlar tap pebrina menen kesellengen tuqimlar siyaqli joq etiledi, biraq olar bo'lek esapqa aliniwi kerek ha'm bunday tuqimlar qaltasalari menen bo'lek yashikke jaylastiriladi. Soni aytiw kerek, pebrina sporasinin' formasi o'zgergenleri sonnan eki ma'rte irileri ju'da' kem uchraydi, sebebi kesellikti

qozg'atiwshi million jil jasamaqta ha'm sol da'wirde ol genetik tamaninan sonday bekkmlenedi, onin' a'piyawı formada pariqlıw itimallıg'ı ju'da' kem.

Mikroskopta islewshi saw tuqimli qaltasalardı stulinin' chep tamanındag'ı arnawlı stulla qoyılğ'an yashikke jaylastıradi. Jaylastırıw normal boliwi kerek, sebebi qaltasalardag'ı tuqımlar hawa menen jeterli ta'minlesin.

Ha'r bir mikroskopta tekseriwshi ushin bir qiyli qalın'lıktag'ı buyım aynalari tan'lap aliniwi kerek. Bul mikroskoptı fokusqa tuwrılardı jen'illestiredi, sebebi buyım aynalari bir qiyli qalın'lıqta bolsa, mikroskoptın' makrovintini isletiwge za'ru'riyat qalmaydı.

Soni este saqlaw kerek, pebrina sporaları suwg'a qarag'anda bir neshe ma'rte awır ha'm a'dette tayarlang'an preparatta buyım ha'mde qaplag'ish aynanin' arasındag'ı suyıqlıqtı to'mengi tamanına jaylasadı (9-su'wret).



9-su'wret. Pebrinanin' sporası

Buyım aynalari gu'zetilgen preparatlari menen biraz suw qoyılğ'an teren' tarelkag'a jaylastıriladi. Gu'belek ku'shli kesellengen bolsa, birinchi ko'riwden-aq tekseriw maydanında pebrina sporaları ko'rinedi ha'm onda basqa jayların tekseriwdin' za'ru'riyatı joq. Egerde birinchi ha'm basqa tekseriw maydonında pebrina sporası ko'rinbese, on jerinen teksergennen son' gu'belek saw esaplanadı.

Buyım ha'm qaplag'ish aynalardı juwiw arnawlı jumisshilar tamaninan xanani ortasına olar ushin wrnatılğ'an, aldına suw kranıgı bar, rakovınası bolğ'an bo'lek stolda orınlanadı.

Mikroskopta tekseriwshi tamaninan ko'rilgen xovonchani da'stesi, miss yaki shiyshe tayaqsha salıng'an idis ku'shli suw ag'imında juwiladi. Pebrina menen kesellengen gu'belekler ezilgen xovonchalar bo'lek stolg'a jiynastıriladi ha'm bo'lek rakovınada issi suw yaki soda eritpesi menen (kal'tsiylestirilgen sodanın' 20%, kaustik sodanın' 2%) juwiladi.

Xovonchalar (kesel ha'm sonday-aq saw gu'belekler ezilgenleride) juwilğ'annan son' a'llette awdarıp qoyiliwi kerek.

Preparat tayarlawdag'ı barlıq jumislardı bir mikroskopta tekseriwshige hizmet qiliwshi kishi topardag'ı hizmetkerler orınlaydı. Jumisshılardan biri qaltasani aship onin'

ishindegi gu'belekti aladi. Son' ha'r birin eki bo'limge ajratadi ha'm qornin xovonchag'a, bas – ko'kiregin bolsa qayta qaltasag'a salip berkitedi. Bir yaki bir neshe bo'limi saling'an sol qaltasani xovoncha da'stesinin' ostina qoyadi. Xovoncha basqa jumisshig'a eziw ushin beriledi. Qarin bo'liminen suyiq massa tayarlang'an ha'm og'an taza suw (ha'r bir gu'belekke $1...2\text{sm}^3$ suw) qosiladi. Jumisshi xovonchani mikroskopta tekseriwshige uzatadi. Bunda ja'ne qaltasalar xovoncha da'stesinin' astina, onin' ishindegi suyiq massag'a tiymeytug'in qilip qoyiladi. Mikroskopta tekseriwshi sonday xovonchalardan tamshi alip preparat tayarlawda miss yaki shiyshe tayaqshalardan, ayrim waqitda sol maqsette xovoncha da'stesinende paydalaniladi. Tekseriwshi preparatti mikroskopta teksergennen keyin pebrina keselligi joq xovonchalardi juwiwshi – jumisshi jiynastirip aladi ha'm olardi mikroskopta tekseriwshi stoli jaqinina jaylasg'an suw idisinda juwadi, sonin' ushinda mikroskopta tekseriw zalinin' proektin siziw ha'm quriwda juwiw jaylarin mikroskopta tekseriwshi stolinin' jaqinina ornatiw na'zerde tutiladi – a'dette bul derezeler arasindag'i diyalg'a tesip ornatiladi.

Gu'beleklerdi kontrol tekseriw

Mikroskopta tekserilgennen son' saw dep esaplang'an qaltasalar kontrol tekseriw ushin ha'mme texnologiyaliq protsessler a'melge asirilatug'in – gu'beleklerdi eziw, mikroskopta tekseriw, xovoncha, da'ste, buyim ha'm qaplag'ish aynalardi juwatug'in bo'lek xanag'a o'tkiziledi.

Kontrol tekseriwdi arnawli tekseriwshi orinlaydi; bul jumisqa ta'jiriybeli, ta'rtpili, iqtiyatli ha'm intizamli hizmetkerler tayinlanadi. Barlig'in mikroskopta tekseriwden parqi bir xovonchadan 3 dep artiq bolmag'an bir qaltasada jaylasg'an gu'belek (qarin) ezilse, kontrol tekseriwde bas – ko'kirek bo'limin bir neshe qaltasadan aliw mu'mkin, biraq bir xovonchada olardi uliwma mug'dari 1- den aspaslig'i kerek. Demek gu'beleklerdi qaltasalarg'a ekewden saling'anda kontrol tekseriwde bir xovonchag'a bes qaltasadag'i gu'belektin' bas – ko'kiregin jaylastiriw mu'mkin.

Eger mikroskopta tekseriw waqtinda partiyadag'i tuqim toplamlarinin' ko'pshiligi pebrina menen kesellengeni aniqlansa, saw tuqimlardi shig'indig'a shig'iwin kemeyittiriw maqsetinde bir xovonchadag'i gu'belektin' bas – ko'kirek mug'dari 4 – 6 g'a kemeyttiriledi. Misali, bir xovonchada 10 day bas ko'kirek ha'm olardan birisi kesellengen bolsa, bunda ha'mme 5 qaltasadag'i tuqimlardi jog'altiwg'a tuwri keledi,

yag'niy bir gu'belektin' tuqimi dep, 9 sawida joq etiledi. Bul nabitgershiliktin' aldin aliw is ju'ritiwdi bilmeslikke shek qoyiwi kerek.

Jumis to'mendegi ta'rptte orinlanadi: bir neshe qaltasalar tigilgen jibi boyinsha ashilip alyumin idisshag'a salinadi, onnan bas, ko'kiregin ha'm qanatinin' qaldiqlari bo'lek ajratip alinadi; bas – ko'kirek u'lken (kontrol) xovonchag'a jaylastiriladi, olar onda jaqsilap qol menen ezip maydalanadi, kontrol tekseriwshige alyumin idistag'i to'gilgen tuqimi, izolyatsiya qaltasalarinin' qag'azina jabiwdan tuqim toplamlari menen birge uzatiladi. Ko'pshilik ka'rxanalarda ha'r birinde ekewden uyachasi bolg'an arnawli taglik qollaniladi – birine xovoncha qoyiladi, basqasina bolsa idis tuqimi menen kontrol tekseriwshige uzatiladi.

Hovonchada ezilgen massadan bir jola eki preparat tayarlanadi, birisi mikroskopta gu'zetiledi, ekinshisi bolsa kontrol tekseriwshige beriledi. Kompleks quramina hawani tartatug'in u'skene, gu'beleklerdi qaltasadan alinatug'in ha'm olardi xovonchag'a salinatug'in bo'lek xana (qanatlariin jog'altiw menen) ezetug'in ha'm juwatug'in mashinalar ha'mde mikroskopta tekseriwshiler bo'limi kiredi. Bul kompleksti da'slepki sinaw jaqsi na'tiyjelerdi berdi.

Gu'beleklerdi tig'izlastirilg'an usilda mikroskopta tekseriw:

Gu'beleklerdi bunday 25, 50 ha'm 100 den tig'izlastirip qutishalarg'a izolyatsiya qiling'anda mikroskopta tekseriwdin' to'mendegi usili qollaniladi: qutishadan aling'an ha'r bir gu'belek 3 bo'lekke – bas- ko'kirek, qarin ha'm aqirg'i bo'limge ajratiladi. Ha'r bir sonday bo'lim bo'lek ha'ripler menen belgilengen qaltasalarg'a salinadi. G ha'ripi jazilg'ang'a bas ko'kirek, B ha'ripbine qarin ha'm K ha'ribine bolsa aqirg'i bo'limi salinadi. Bunnan basqa sol ha'r bir u'sh qaltasag'a qa'lem menen partiya nomeri jaziladi. Tig'izlastiriw da'rejesine qarap qaltasalarg'a gu'beleklerdin' 25, 50 ha'm 100 bo'lekleri salinadi. K ha'ribi jazilg'an xalta jumis ku'ninin' aqirinda jandiriladi. B ha'ribi jazilg'an qaltasa mikroskopta tekseriwge beriledi, G ha'ribi bolsa kontrolg'a jiberiledi. Mikroskopta tekseriwde B ha'ribi menen belgilengen qaltasalardan qarin bo'limi alinip, olar u'lken metall xovonchanin' ha'r birine 25, 50 yaki 100 den maydalanadi. Xovonchadag'i gu'belektin' qarin bo'limine 50sm^3 mug'darda suw qosip jaqsilap maydalanadi (qarinlardin' mug'daridan qat'i nazar). Keyin xovonchanin' ishindeg

maydalang'an massa xo'llengen siyle arqali fil'trlenedi ha'm fil'trden o'tken suyuqliq voronka ja'rdeminde tindiriw ushin stakanag'a quyiladi.

Biraq mikroskopta tekseriwidin' bul usilin a'melde qollaw jumis waqtinda itibarsizliq na'tiyjesinde kesellengen materialdi o'tkizip jiberiw mu'mkinligini ko'rsetedi (misali, jumis waqtinda gu'belektin' denesin 3 bo'lekke boliwde onin' jog'altiw), a'sirese bunday boliwig'a sebep, bul jumislardi ma'wsimli jumisshilar orinlaydi. Ha'zirgi waqitta respublikamizdag'i tuqimshiliq ka'rxanalarinda gu'beleklerdi izolyatsiya qiliw ha'm mikroskopta tekseriwidin' biraz basqacha texnologiyaliq sxemasi qollanilmaqta.

U'lkenligi 18x12 sm bolg'an ha'r bir izolyatsiya qaltasasina 5 den gu'belek salinadi. Mikroskopta tekseriw ushin qaltasalardan gu'belekler alinadi ha'm pu'tinliginshe xovonchada maydalanadi (gu'belekti xovonchag'a saliw alidan qanati sindiriladi ha'm joq etiledi).

Xovonchag'a 3 – 5sm³ suw qosiladi ha'm bir qiyli u'lkenlikte suyiq massa payda bolg'ang'a shekem qol menen maydalanadi. Mikroskopta tekseriwshi buyim aynasina u'sh xovonchadag'i sol suyiq massadan u'sh tamshi aladi. Ha'r bir tamshi itibar berip qaplag'ish ayna menen berkitiledi, bunda bir qaplag'ish ayna astindag'i suyuqliq ekinshi qaplag'ish ayna astina tu'spesligi kerek ha'm keyin ha'r bir preparat gu'zetiledi. Egerde pebrina barlig'i aniqlansa, onda tiyisli xovoncha xaltasi menen (ishinde tuqimi bar) alip qoyiladi. Xovoncha usi waqittin' o'zinde dezinfektsiya qilinadi, kesellengen tuqimdi bolsa usi waqittin' o'zinde qaltasasi menen ku'ydiriliwi lazim.

Egerde mikroskopta tekseriwshi pebrina sporaini ko'rinbese, onda usi waqittin' o'zinde xovoncha qaltasalari menen kontrol tekseriwshige uzatiladi. Kontrol tekseriwshi xovonchadag'i suyiq massadan u'sh preparat tayarlaydi ha'm olardi gu'zetedi. Egerde pebrina keselligi aniqlansa, tap mikroskopta tekseriwshi kibi is tutadi.

Egerde kontrol tekseriwshi preparatta sari keselliginn yaki basqa nama'lim mikroorganizmlerdin' sporasin ko'rse, tiyisli xovoncha ha'm qaltasa ajratip alinadi, qaltasalar tuqimi menen joq etiledi, xovoncha bolsa dezinfektsiya qilinadi.

9. TA'KIRARIY QURT BAG'IW USHIN TUQIM TAYARLAW TEXNOLOGIYASI.

Ha'zirgi waqitqa shekem jipekshilik tarawinda alimlar jipek qurti gu'belegi u'stinde jazg'i-gu'zgi islewde optimal ha'm jol qoyilatug'in ko'rsetkishlerdi islep shig'ariwg'a kem itibar beredi.

Jazg'i qurt bag'iw ma'wsiminde jipek qurti tuqimin jetistiriw za'ru'riyati pilleshilikti intensivlestiriw ha'm oni sanaat tiykarinda o'tkiziw waziypasi barlig'i sebepli ju'zegea keledi. Keyingi da'wirde porodali ha'm sanaatbap jipek qurti tuqimin jetistiriwdi ko'beyittiriw ushin gu'belek u'stinde jazg'i-gu'zgi islew a'hmiyetli a'meliy a'hmiyetke iye.

Jipekshilik tarawinda rawaj tapqan Yaponiya, Qitay, Xindiston kibi sirt el ma'mleketler a'meliyatta sanaatbap ha'm porodali jipek qurti tuqimi tek ba'ha'rde bag'ilg'an qurtlar pillesinen emes, ba'lki jazg'i-gu'zgi yaki gu'zgi bag'iwdan da tayarlanadi.

1966 jilda XXR da bolg'an O'zbekstan wakilleri (Banokin M.B., Parpiev B.A., Usmonov K) tin' mag'liwmatlarina ko're, elita tuqiminin' 75 payizi ba'ha'rgi ha'm 25 payizi gu'zgi qurt bag'iw pillesinen tayarlanadi (1).

R.A.Guseynov ha'm M.I.Nu'monovlar basshilig'inda Yaponiyada bolg'an (1965) delegetsiya o'z esabatinda jipek qurti tuqimi ba'ha'r ha'm jazda 60-40 payizdan tayarlaniniwin ayitqan.

SANIIShtin' na'silshilik laboratoriyasinda A.M.Safonova basshilig'inda porodali jipek qurti tuqimin jaz ha'm jaz-gu'zgi da'wirde tayarlaw ma'selesi boyinsha arnawli ta'jriybeler alip barildi (2).

Eksperimental jumis 1980-1983 jillar dawaminda na'silshilik laboratoriyasinda SANIISh-8, SANIISh-9 Oq pilla 1, Oq pilla 2 porodalarda o'tkizildi. Jazg'i ma'wsimde ha'r bir porodadan 2000 den qurt bag'ildi. Aling'an normal pilleler jinislarg'a ajratilg'annan keyin jekkelep analiz qilinip, ha'r bir jinis boyinsha salmag'i ha'm jipekshen'ligi boyinsha variatsiya aniqlandi. Urg'ashi ha'm erkek pilleler salmag'i boyinsha 4 variantqa (1-4) ha'm jipekshen'ligi boyinsha ja'ne 4 variantqa (5-8) bo'lindi. Faridler bir variant ishinde shatistirildi.

Aling'an mag'liwmatlar tiykarinda birinchi ret jazda bag'ilg'an to'rt rayonlastirilg'an porodali pilleler salmag'i ha'm jipekshen'liginin' optimal ko'rsetkishleri

ha'mde jol qoyilatug'in parametrlar islep shig'ildi, bul jumis joqari sipatli superelita ha'm elita jipek qurti tuqimin tayarlaw maqsetinde alip barildi (3).

Aling'an mag'liwmatlardan sol aniqlandi, superelita jipek qurti tuqimin tayarlaw ushin tek optimal parametrlardan, elita tuqim tayarlaw ushin jol qoyilatug'in ko'rsetkishlerden de paydalaniw mu'mkin. Sonday-aq, superelita ha'm elita pillelerdin' optimal ko'rsetkishlerin inabatqa alg'anda jipek qurti joqari reproduktiv na'sil beriw qa'siyetlerine erisiledi, keyingi a'wladtan joqari hasil aliw imkanin beredi ha'm jipekshen'ligi joqari boliwin ta'miynleydi.

10. TUT JİPEK QURTİ PORODA HA'M GİBRİDLERİN MA'MLEKET SINAWINAN O'TKIZIW.

Pebrina keselligine qarsi gu'resiwdin' en' a'hmiyetli ila'jlarinan biri ma'mleketimiz aymag'ında (yag'niy tuqimshiliq ka'rxanalari, na'silshilik stantsiyalari, jipekshilik ilimiy tekseriw mekemeleri tamaninan) tayarlang'an tuqimlardi ma'mleket kontrolinan o'tkiziw ta'rtipi awil xojaliq wazirliginin' pilleshilikti rawajlandiriw basqarmasi tamaninan shiqqan tiyisli buyriq ha'm qollanba tiykarında tayinlanadi. Ha'zipgi waqıtta pebrinag'a qarsi ma'mleket kontralin o'tkiziw ushin ha'r bir respublikada tuqimlardi kontrol tekseretug'in ma'mleket baqlawi du'ziledi. Bul baqlawshilar u'lgi aliw, tasiw, saqlaw ha'm tuqim u'lgilerin shifrlaw, janlantiriwdi o'tkiziw ha'mde olardi mikroskopta tekseriw ha'm kesellengen tuqimlardi jog'altiw jumislarina basshiliq qiladi.

Ha'r bir tuqimshiliq ka'rxanasinan u'lgi aliw ushin ag'zalar du'zilip, ma'mleket kontrol tekseriwinin' quramina waliyat jipekshilik islep shig'ariw birlespesi ha'm basqa tuqimshiliq ka'rxanalarinin' wakilleri kiredi.

Tekseriw tuqim saqlaw xanasındag'i tuqimlardin' mug'darin tekseredi, onin' awirlig'i ka'rxana yaki mekemenin' esabat hu'jjetlerine tuwri keliwi salistirip ko'riledi ha'm keyin ha'r bir tuqim partiyasınan 0,2g nan u'lgi alinadi, u'lginin' sani tuqim partiyasinin' u'lkenligine ha'm kategoriyasına baylanisli.

Aling'an u'lgiler tuqimdi tekseriw ma'mleket tekseriw ag'zalari tamaninan ayrim tuqimshiliq ka'rxanalarında sho'lkemkestirilgen tuqim saqlaw xanalarina jiberiledi. Tekseriw punktine kelgan u'lgiler basqarma tekseriw wakili tamaninan shifrlanada ha'm janlantiriw baslang'a qadar temperaturasi $+2 \dots +4^{\circ} \text{S}$ muzlatkishta saqlanadi.

U'lgiler 90 ku'n dawamında qiling'annan son' olar a'piyawi inkubatoriya sharayatında janlantiriladi ha'm paketsheden u'lgi tuqimnan shiqqan qurtlar kepkennen son', olardi mikroskopta tekseriwge kirisiledi.

Preparatlardi tayarlaw ha'm mikroskopta tekseriw jumislari ju'da' puxta orinlanadi, bunda pebrinag'a qarsi ma'mleket kontroli o'tkiziw qollanbasi ha'mme talablarina boysiniwi kerek. Soni ayriqsha aytıp o'tiw kerek, qurtlardi ha'm janlanba'gan tuqimlardi eziwde ha'r bir xovonchag'a 2sm^3 distillengen suwda eritilgen 2% li natriy yaki kaliy siltisinin' eritpesinen qosiladi. Ma'mleket kontrolında a'piyawi mikroskopta tekseriwden parqi bir buyim aynasına bir xovonchadan tek g'ana bir tamshi alinadi. Bunda buyim aynasına tayarlang'an bir preparat keminde 600 ma'rte u'lkenlikte 50 jerinen gu'zetiledi.

Preparat kesellengenligi sezilse, onin' keselleniw intensivligi aniqlanip mikroanaliz vedomostina tiyisli jaziw jaziladi. Kesel preparat kontrol tekseriwshi yaki tuqim tekseriw baslig'i tamaninan ko'riliwi kerek. Mikroskopta tekseriw na'tiyjeleri respublikalarda komissiyasi tamaninan shifrlang'an u'lgilerdi tekseriw vedomosti formasinda ma'lim qilinadi. Sol shifr boyinsha komissiya qaysi ka'rxananin' tuqim u'lgisi tekserilgenin jazip otiradi. Egerde keselleniw to'men da'rejede bolsa, bunday partiyalar jipekshilik bas basqarmasinin' rezervinen qaldiriliwi mu'mkin.

Ku'shli kesellengen partiyalar jipekshilik bas basqarmasi tamaninan tayinlang'an komissiya qatnasinda joq etiliwi kerek.

Tuqimshiliq ka'rxanalari ha'm tuqim bergen basqa mekemeler mikroskopta tekseriw ma'mleket kontroli na'tiyjelerine narazi boliwi mu'mkin ha'm bunday waqitta ka'rxananin' tuqim saqlaw xanasinda pechatlang'an halda saqlanip atirg'an rezerv u'lgileri mikroskopta tekseriledi. Bunday qayta mikroskopta tekseriledi. Bunday qayta mikroskopta tekseriw na'tiyjesi qatan' esaplanadi.

U'lgilerdi aliw, olardi saqlaw, shifrlaw ha'm qayta shifrlaw, mikroskopta tekseriw, saw tuqimlardi jiberiwge tayarlaw ha'mde kesellerin jog'altiw basqarma tamaninan tayarlang'an qollanbada aniq bayan etilgen. Pebrinag'a qarsi ma'mleket kontroli ushin u'lgali aliw menen bir qatarda tuqimlardi janlaniw payizi ushinda u'lgali alinadi. Bunday tekseriw tu'ri tek g'ana sanaat ushin qurt baqilatug'in fermer ha'm ma'mleket xojaliqlarina beriletug'in tuqimlarda orinlanadi.

Tuqimlardi juwiw ha'm keptiriw tamamlang'annan keyin ha'r bir partiyadan ma'mleket komissiyasi (pebrinag'a qarsi tekseretug'in komissiyannin' o'zi) 0,2g awirliqta 2 den u'lgali aladi (a'dette bunday u'lgali aliwda kishi kalibrli miltiq gil'zasinan paydalaniladi). Aling'an u'lgiler, sonday-aq, arnawli tayarlang'an qag'az paketchelerge jaylastirilip, u'stine a'piyawli qara qa'lem menen partiya nomeri jaziladi. U'lgilerdi saqlaw ha'm jiberiw tap pebrinag'a qarsi ma'mleket kontrolina aling'an u'lgilerge uqsas alip barip beriw 10 noyabrge shekem juwmaqlaniwi sha'rt.

Jumistag'i keskinlikti kemeyittiriw maqsetinde tuqimlardin' bir bo'limin janlantiriwg'a 3...5 ku'nnen son' qojiladi ha'm bul protsess bo'lek xanada o'tkiziliwi kerek. Ol jerdede joqari ko'rsetilgen hawanin' temperaturasi ha'm salistirma na'mligi saqlanadi, janlantiriw da'wirinde ha'r bir u'lgidegi tuqimlar sanab shig'iladi ha'm atalanbag'an, keptirilgen ha'mde basqa nuqsanlilari jaramsizg'a shig'ariladi.

Sanaw ha'm saralaw na'tiyjeleri arawli inkubatsiya vedomostina jaziladi. Tuqimlardin' janlaniwini' to'rtinshi ku'ni ha'r bir u'lgidegi janlanbay qalg'an tuqimlar sanaladi. Sanaw bir ku'nde orinlanadi, na'tiyjeleri paketshelelge ha'm joqarida jazilg'an formasi qollanbada berilgen vedomostqa jaziladi.

Xojaliq sol 6,68 quti tuqim ushin pul to'leydi, sebebi esapta bul qosimsha haq bo'lek qatarda, tap tuqimshiliq ka'rxanasina joqari janlaniw payizina eriskeni ushin berilgen xoshamet tariqasida o'tedi, xojaliqqa berilgen tuqim ba'ribir 100 quti esaplanadi, a'melde xojaliq 106,67 quti tuqim alg'an. Basqa xojaliq tap sonday 100 quti tuqim alip, janlaniwi 90% bolg'ani ushin hesh qanday qosimsha haq to'lemeydi, biraq alding'i xojaliqqa uqsap 100 quti tuqim aling'an esaplanadi. Birinchi halda tuqim berilgen fakturag'a 100 quti yaki 2900 gramm tuqim berildi dep jazip qoiyiladi, yag'niy birinshi halda bir quti 31,5grammg'a, ekinshi halda bolsa bir quti 29 grammg'a ten'.

Janlaniw da'rejesine ko'p faktorlar ta'sir qiladi, biraq ha'mme texnologik protsessler da'wirindegi ekologik sharayat tiykarg'i esaplanadi. Sonday-aq, janlaniw da'rejesi tuqimshiliq ka'rxanalarinin', hizmetshileri tamaninan belgilengen hawa temperaturasi ha'm na'mligin saqlawg'a, tuqimlardi qag'az ha'm marli qaltasalarda saqlawda olardi jeterli samallatiwg'a, tuqimlardi juwiw ha'mde keptiriwdegi temperatura rejimine ha'm ekologik faktorlarga baylanisli. Juwiw aldinan ha'm juwg'annan son' (ba'ha'rde) tuqimlardi jaqsilap saralaw u'lken a'hmiyetke iye.

Tuqimshiliq ka'rxanalarinda tuqim tayarlaw texnologiyasin biraz jen'illestiriw maqsetinde Taskent tuqimshiliq ka'rxanasinda na'silli pillelerdi jaylastirilatu'g'in ha'm olardan shiqqan gu'beleklerdi terip alip, jumisshinin' aldina keltiretu'g'in arawli mashinani ta'jiriybe nusxasi ornatilip, ol islep shig'ariw sharayatinda sinap ko'rilmekte.

Gu'beleklerdi mikroskopta tekseriwdi arawli mexanizatsiyalaw liniyasi ornatilip ol bir neshe jildan beri muwapiqli islep turipti. Tuqimlardi gu'z pasilinda juwiw mashinalari ja'rdeminde a'melge asirilmoqta. Sonday-aq 1987 jildan baslap tuqimshiliq ka'rxanalari qurt tuqimlarin paydalaniwshilarg'a arawli karton qag'azdan tayarlang'an chemodanlarda jo'netilmeqte.

Bul a'melge asirilg'an jumislar tuqim sipatin biraz jaqsilaydi, qol miynetin keskin kemeytiredi ha'mde o'nim bahasin arzanlastiradi.

INSAN QA`WIPSIZLIGI HIZMETI

Atmosfera ortalig'inin' pataslaniwinin' insanlardin' xojaliq jumislari sebepli ju'zege kelgen ha'r qiyli ximiyaliq zatlardin' roli u'lken.

Ha'zirde sanaat ka'rxanalari ha'm hizmet ko'rsetiw kombinatorlarinin' a'ne sonday shig'indilardin' mug'dari ju'da' ko'p. A'tirap ortaligti pataslantiriwshi tiykarg'i dereklerden biri za'ha'rli ximikatlar. Za'ha'rli ximiyaliq preparatlar uliwma halda pestidsidler dep ju'ritiledi. Pestidsidler sawlaiqti saqlawda ha'm a'sirise awil xojalig'inda ko'plep isletilmekte.

Za'ha'rli ximikatlar bir neshe, tu'rge bo'linedi: Sebebi, o'simliklerdin' o'siwi ha'm rawajlaniwina ta'siri ximiyaliq zatlar – regulyatorlarda, japirag'in to'giwshi preparatlar defoliyantlar: sonday-aq nasekolar ha'm kemiriwshilerdi qiriwshi preparatlar olardi o'zine shaqiriwshi nasekolardi ha'm basqalardi sterelizatsiyalaytug'in preparatlar ha'm basqalar.

O'simliklerdin' o'siwin ta'rtipke saliwshi pestidsidlerden na'tiyjeli ha'm ilimiy tiykarda paydalanilsa, hasildarlaiq 10 % ten -80 % ke shekem asadi. A'sirise, olar da'nli ha'm ayrim paliz, ha'mde niyweli eginleri ushin ju'da' u'lken payda beredi.

Pestidsidlerdin' islete beriliwi aqibetinde za'ha'rge shidamli ziyankesler ko'beyip, olardin' ta'biy kushandalari ha'm nasekolari bolsa qirilip ketpekte. Ha'zirgi waqitta 150 kg /ga jaqin nasekoma tu'rleri za'ha'rli ximikatlarg'a maslasip alg'an. Olardin' yarimi awil xojalig'i ziyankesleri, qalg'anlari bolsa kesellik tarqatiwshilar.

Awil xojalig'inda ha'm a'sirise xaliq xojalig'inda ziyankeslerge qarsi gu'resiwde za'ha'rli ximikatlardi qollaw metodinan waz keship bolmaydi. Sebebi, bul metod arkali ko'p g'ana qosimsha o'nimler alinip atirg'anlig'i ma'lim. Biraq za'ha'rli ximikatlar payda keltiriw menen birge u'lken ziyanda keltiredi.

Bnday pereparatlardin' qa'siyetleri, onin' toksinlik da'rejesinin' parshalaniw mu'ddetin tuwri biliw kerek.

A'tirap-ortaligti pataslaniwina alip kelmeytug'in, kishi organizmine qa'wipli bolg'an fosfirli organikaliq pestidsidler (fosfororganik); korbofos, rogermetofos ha'm basqalar awil xojalig'inda qollanilip kelinbekte.

Paydali haywanlar ha'm o'simlik organizimlerge ziyani jetkizbeslik, ha'mde o'simliklerdin' hasildarlig'in asiriw geografiyalig ortalig'i pataslantirmasliq ushin ziyankeslerge qarsi gu'resiw ila'jlarinan biri o'simlik uriqlarin egiwden aldini pestidsidler

menen qayta islew. Bunnan basqa ziyankes organizimlardin' erkeklerin nur ta'sirinde sterilizatsiyalang'an arqali olardin' ko'beyiwne shek qoyilmaqta. Teoriyalıq esaplawlarg'a ko're, bul usil na'tiyjesinde to'rtinshi a'wladtan keyin nasekoma populyatsiyasi jog'aliwi mu'mkin.

JUWMAQ HA'M USINISLAR

Usi tema boyinsha toplag'an mag'liwmatlarim, qaniygelik pa'nlerdi oqip u'yrenip alg'an bilimlerim ha'mde alip barilg'an tekseriwler ha'm islep shig'ariwda ko'rgenlerim tiykarinda usi tema boyinsha to'mendegi juwmaqqa keldim.

1. Sanaat tuqimlarin tayarlaw protsessi ju'da' ham juwapkerli ha'm quramali protsess esaplanip, bul tarawda islep atirg'an ha'r bir qaniyge o'z tarawini teren' biliwi lazim.

2. Jipek qurti porodalarinin` jasawshan`lig`in asırıw, jipek o`nimdarlıg`in asırıw, shiyki jipek shıg`ımın asırıw, porodalar populyatsiyasinin` tu`rli nuqsanlardan ha`m pillenin qolaysız tawlanıwshan`lıq (ottenochnost`) qa`siyetlerinen tazalaw.

3. Sanaatbap gibridler tuqimlarin tayarlawda: joqari sipatli pilleler aliw maqsetinde na'silli qurtlardı bag'iw, pillelerdi ha'm gu'beleklerdi tan'law, son'ra olardan tuqim aliw. Mikroskopik tekseriw o'tkizip saw tuqimlarnı aliw ha'm tuqimdi jelpiw, juwiw, saralaw ha'm tuwri saqlaw.

4. Jipek qurti tuqimin tayarlawdin' tsellyulyar usil, biologiyaliq usili, pillelerge joqari temperatura menen ta'sir qiliw usili, 25 – 100, sonday-aq 5 den gu'belekti toparlarga ajratip izolyatsiyalaw usili ha'mde tig'izlastirip mikroskopta tekseriw usillari bar.

5. Biologiyaliq usil menen tuqim aliwda su'rilerge jazilg'an emul'siya shimdirilgen qag'azdin' ha'r 1 m² ga 800 dana esabınan urg'ashi gu'belek qoiyiladi. Gu'belekler sol jerde tuqimlaydi, aradan 2 sutka o'tkennen son', gu'belekler terip alinip joq etiledi. Sonnan keyin tuqim qoyilg'an qag'azlar abaylap alinip, bosiraq qilip oraladi ha'm tuqim partiyasi menen qirip aling'an sha tuqim saqlanadi – sonnan ibarat, ha'r bir urg'ashi gu'belekti erkek gu'belekten ajratilg'annan keyin qandaydir bo'lek izolyatorg'a: qag'az yaki marli qaltachag'a, qag'az yaki metall stkanshalarg'a jaylastiriladi. Onda urg'ashi gu'belek tuqim (tuqim) qaldiradi. Keyin ha'r bir gu'belek mikroskopta tekseriledi ha'm egerde olarda pebrina keselliginin' qozg'atiwshi spora tabilsa, onda gu'belek tamaninan qaldirilg'an tuqimlar pu'tinley joq etiledi.

6. Ha'r bir na'silli qurtlar bag'ilatug'in xojaliqlarda 1 quti qurtqa 1200 kg nan tut japiraqlari 10% rezervi menen ta'miynleniwi sha'rt. Qurt bag'ilatug'in xanalardi tan'lawda 5-jastagi 1 quti qurtqa 70 m² maydannan kem bolmag'an sharayatlar jaratiw

za'ru'r. Na'silli qurtlardi ta'rbiyalawda optimal gigrotermik rejim ha'm aziqlantiriw normalarina qatan' boysiniw lazim.

7. Pille oraw da'wirinde hawa temperaturasi 24-25°S boliwin ta'miynlew lazim, eger temperatura pa'seyse, qurtti quwirshaqqa aylaniwina ha'm keyinshelli gu'belekler shig'iw payizina keru ta'sir ko'rsetedi. Tayar pilleler terip aling'annan 2 ku'n ishinde tapsiriliwi sha'rt.

8. Pebrina keselliginin' bar yaki joqlig'in tekseriw ushin pillelerden ja'ne u'lgilini alinadi ha'm laboratoriyada tekseriw o'tkiziledi. Sol menen birge u'lgidegi pillelerdin' quwirshaqlarinin' tiri yaki o'lgeni de tekseriledi. Eger u'lgide o'lgen quwirshaqlar 3% ten ko'p bolsa, bunday pilleler de na'silli dep qabil qilinbaydi.

PAYDALANILG`AN A`DEBIYATLAR.

1. İ.A.Karimov “Mamlakatimizda demokratik islohatlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish kontsepsiyasi” Toshkent-“Wzbekiston”-2010 y. 12 noyabr`.
2. İ.A.Karimov “Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi Wzbekiston sharoitida uni bartaraf etishning ywllari va choralari” Toshkent-“Wzbekiston”-2009 yil.
3. İ.A.Karimov “Wzbekistonda iqtisodiy islohatlarni chuqurlashtirish ywllida” Toshkent “Wzbekiston”-1995 yil.
4. İ.A.Karimov “Qishloq xwjaligi taraqqiyoti-twkin hayot manbaiy” Toshkent “ma`naviyat”-1998 yil.
5. Abbosov B.G, Bekirov A.G, Alekperova Ya.A, Raxmonova G.N.- Noviy sposob prigotovleniya i xraneniya grenı dlya mnogokratnix vıkormok tutovogo shelkopryada. J. «Shelk», 1984, № 3, s.10-12.
6. Abdukadirov Sh. - Prognozirovanie geterozisa u tutovogo shelkopryada po ojivleniyu obraztsov grenı. J.»Shelk», 1970, № 2, s. 24-25.
7. Abduraxmanov A.A, Zaxidov N.A, Pariev B.A, Xafizova T. - İzuchenie vesennego razvitiya zarodısha v grene. J.»Shelk», № 5, s. 12- 13.
8. Axmedov N.A, - İpak qurti: harorat va havo. «Ekologicheskiy vestnik», Tashkent 1999, №1
9. Axmedov N.A,- Tut ipak qurtining oziqlanish muddati. «İpak» ilmiy-texnik jurnali, Toshkent 1999, №1
10. Axmedov N.A, - İpak qurti tanasida tut bargining xazm bwlish muddati. «İpak» ilmiy-texnik jurnali, Toshkent 1999, №2
11. Axmedov N.A, - İnkubatoriya uchun toza havo. Ekologik xabarnoma, Toshkent 1999, №3
12. Axmedov N.A, - İnkubatoriyada havo almashinish jarayoni. «O`zbekiston qishloq xwjaligi», Toshkent 1999, №4
13. Axmedov N.A, - Qurtlarni navdor tut bargi bilan oziqlantirish mahsuldorlikni oshirishning samarali usuli. «İpak» ilmiy-texnik jurnali. Toshkent 1999, №4
14. Axmedov N.A, - Kontrast xarorat va namlikni ipak qurtining biologik kwrsatkichlariga ta`siri bwyicha tavsiyalar. «Zangiota» tipografiyasi, Toshkent 1999.

15. Axmedov N.A. - Keskin farq qiluvchi harorat va havoning nisbiy namligini ipak qurtining yashovchanligiga ta'siri. «Ipak» ilmiy-texnik jurnali, Toshkent 2000, №2.
16. Axmedov N.A, - Tuxumdan chiqqan qurtlarni turli muddatlarda past xaroratda saqlashni qurtlar yashovchanligiga ta'siri. «Ipak» ilmiy-texnik jurnali, Toshkent 2001, №1.
17. Axmedov N.A, - Ipak qurti urug'ini jonlantirish. Tipografiya ToshDAU, Toshkent 2000.
18. Axmedov N.A, - Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi. Tipografiya ToshDAU, Toshkent 2000.
19. Axmedov.N.A, Murodov.S, - Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi. «Wqituvchi» nashriyoti ToshDAU nashr taxririylati bwlimi. Toshkent 2004.
20. Axmedov.N.A, Qurbonov.T, Qanotov.A, - Tirik pillalarni pillaxonaga kelish muddatini rejalashtirish. Magistratura talabalari, aspirantlarning qishloq xwjaligi ywnalishidagi ilmiy twplam. Toshkent 2004.
21. Axmedov N, Qaxxorov N, - Plenka ostida qurt boqish. Magistratura talabalari, aspirantlarning qishloq xwjaligi ywnalishidagi ilmiy twplam. Toshkent 2004.
22. Axmedov N, Mirqosimov M, Bekkamov Ch, - Wzgaruvchan xarorat va namlikni ipak qurtining tana kwrsatkichlariga ta'siri. Magistratura talabalari, aspirantlarning qishloq xwjaligi ywnalishidagi ilmiy twplam. Toshkent 2004.
23. Bessonova M.A. - Razvitie texnologii grenajnego proizvodstva v Uzbekistane. Trudi SANİİSh. İzd-vo «Fan», Tashkent,1971, s. 81-88.
24. Bessonova M.A. - Metod tormojeniya embriona v inkubiruemoy promıshlennosti plemennoy grene tutovogo shelkopryada. Nauchnie osnovı razvitiya shelkovodstva. Vip. 16, Tashkent, 1982, s 30-47.
25. Gumbatov İ.M, Billallı D.A. - O vliyanii prodoljitel`nosti estivatsii na kachestvo grenı razlichnix porod tutovogo shelkopryada. Trudi Azerbaydjanskogo Nİİ shelkovodstva, Baku, 1973, tom USh, s. 85 - 87.
26. Guseynov R.A, Eminbeyli S.N. - Podbor novıx jaroustoychivıx liniy tutovogo shelkopryada. Trudi Azerbaydjanskogo Nİİ shelkovodstva, Baku, 1973, tom USh, s. 59 - 62.

27. Zlotin A.Z., Kirichenko V.N., Juravel` O.M., Roxmolya M.V. - Grena vesennego prigotovleniya dlya letnix vikormok sleduyushego goda, J. «Shelk», 1988, № 5, s. 12 - 13.
28. Karpova A.E. - Vliyanie usloviy inkubatsii grenı na proyavlenie latentnogo vursa jeltuxi u tutovogo shelkopryada. J. «Shelk», 1973, № 2,
29. Malov S.S, Butlitskaya S.D. Boltaboev D.B. - Osnovnie parametri mikroklimata vnutri pomesheniy dlya vikormki tutovogo shelkopryada. J. «Shelk» , 1974, №2, s.10 - 11.
30. Mametkuliev B. - Otbor jiznesposobnix semey tutovogo shelkopryada na stadii yaytsa. J. «Shelk». 1960, №2, s. 20 -23.
31. Parpiev B.A. Rojdestvenskiy K.M, Lejenko O.B. - Inkubatsiya grenı tutovogo shelkopryada. İzdanie UzNIİNTİ, Tashkent, 1980, s. 2-10.
32. Poyarkov E.F. - O sushestvovanii u tutovogo shelkopryada sezonnix faz. Sb, «Novoe v biologii shelkopryadov», Moskva, 1959, s. 54 - 63.
33. Romenko T.M. - Potreblenie i utilizatsiya pishi gusenitsami kitayskogo dubovogo shelkopryada pri raznix temperaturax. №Jurnal obshey biologii», 1988, tom X1X, № 4, s. 563 - 568 .
34. Umarov Sh.R. - Tut vegetatsiyasining yoz-kuz davrida pilla olish uchun yaroqli zotlarini tanlash. Toshkent, 1996, 1-2 b.

İnternet ma`lumotlari

35. WWW. Fermer ru.
36. Shelkopryadu ru. 2009.
37. Sel`skoe xozyaystvo/ Tkan.
38. www.mavicanet.com/
39. www.slovar.info/word/
40. www.nuron.uz/
41. [www.sk.kg/ zakon.tj/index.cgi](http://www.sk.kg/zakon.tj/index.cgi)
42. www.ab.az/ru
43. www.sheki-ipek.com.az
44. ww.edu.diplomax.ru/
45. www.red-rose.ru/