

**O`ZBEKSTAN RESPUBLIKASI XALIQ BILIMLENDIRIW
MINISTRLOGI**

**A`JINIYAZ ATINDAG`I NO`KIS MA`MLEKETLIK PEDAGOGIKALIQ
INSTITUTI**

Ta`biyiy pa`nler fakulteti «Geografiya oqitw metodikasi» kafedrası

«Geografiya oqitw metodikasi » bakalavr ta`lim bag`darinin`

4 a – kurs talabasi

Алиев Рахат Кеунимжаевичтин

**« Арал экологиялық дағдарысының қарақалпақстан
республикасы қоршаған орталығы тәбийй шараятларының
өзгериўине тәсири » TEMASINDAG`I BAKALAVRLIQ**

PITKERIW QA`NIGELIK JUMISI

Ilimiy basshi:

u`lken oqitwshi Nurlanov A.S

Kafedra baslig`i:

п.и.к. Р.Гайпова

No`kis 2017 jil

МАЗМУНЫ:

Кирисиў.....	3
I-БАП. Тәбият хәм жәмийет арасындағы байланыслардың кескинлесиўи нәтийжесинде Арал теңизи регионында экологиялық машқалалардың жүзеге келиўи.	
1.1. Тәбият хәм жәмийет арасындығы қатнасықлардың қошаған орталықтың тәбийий компонентлериниң өзгериўине тәсири.....	13
1.2. Арал теңизи бассейниниң қурғаў себеплери хәм оның тәбийий ландшафтларының өзгериўине тәсири.....	27
1.3. Арал бойы тәбийий экологиялық жағдайларын турақластырыў бойынша итималлы илажлар.....	13
II-БАП. Арал бойы тәбийий экологиялық жағдайлардың кескинлесиўи Қарақалпақстан Республикасы қоршаған орталығы тәбийий шараятларының өзгериўине тәсири.	
2.1. Арал бойы регионы қоршаған орталығы тәбийий шараятының өзгериўи.....	40
2.2. Арал экологиялық жағдайларының Қарақалпақстанның өсимлик хәм хайуанат дуньясына тәсири.....	46
2.3. Арал экологиялық жағдайларының Қарақалпақстанның Арқа районларының тәбийий ландшафтларының өзгериўине тәсири....	
2.4 Арал экологиялық дағдарысының Қарақалпақстанның социаллық экономикалық шараятларына тәсири.....	
Жуўмаклаў.....	52
Пайдаланылған әдебиятлар.....	57

КИРИСИЎ

Изертлеу темасының актуаллыгы. Арал теңизи этирапында пайда болған экологиялық машқалалар региондағы барлық тәбийғый компонентлердің кескин өзгериске ушырауына кери тәсирин тийгизип бармақта. Соның ишинде тәбийй ландшафтлардағы өзгерислер ақыбетинен өсимлик хәм хайуанат дүньясының жоқ болып кетиуи қәуипи бар екенлиги кимди болсада тәшүишке салады.

Өзбекистан Республикасы биринши Президенти И.А.Каримов 1995 жыл 25 октябрде БМШ бас ассамблеяның мәжлисиндеги сөзинде «Арал теңизиниң курып кетиуине байланыслы болған экологиялық апатшылық ҳаққында, улыўма планетар көлеминде тарқалып баратырған, биосфераға, он миллионлаған халықтың турмыс шараятларына, саламатлығына хәм нәсиллерине бузғыншылық тәсир ететуғын машқалалар ҳаққында усы минберден айтпай тура алмайман»¹ деген еди.

Орайлық Азиядағы ең ири көллердің бири болған Арал теңизиниң набыт болыуы оның суўдан босаған майданларында кең көлемдеги шорлақлар хәм еспе қумлардың пайда болыуы тарийхта болмаған кубылыс. Соңғы 40 жыл ишинде теңиз суўы 96 % ке қысқарып теңиздің Үстүрт жағалары батыс бөлиминде аз ғана дузлы суўлары сақланып қалған.

1960-жылы теңиз суўы тереңлиги 53 метрди кураған болса, 2013-жылға келип 3-5 метрди курады. Суў бетиниң көлеми 1062км^3 дан 23км^3 қа қысқарып, суўының дузлылығы литрине 11 грамнан 122 граммға шекемге көбейген. Солай етип мениң питкерий қәнигелик жумысымда Арал теңизи экологиялық дағдарысының Қарақалпақстанның қоршаған орталығы тәбийй шараятларына тәсирин табийй географиялық сыпатлау болып есапланады.

Изертлеу жумысымның махсет хәм ўазыйпалары. Арал теңизи экологиялық дағдарысының келип шығыу себеплери хәм оның бүгинги күнде

1.Өзбекистан Республикасы биринши Президенти И.А.Каримовтың 1995 жыл 25 октябрде БМШ бас ассамблеяның мәжлисиндеги сөзи.

Қарақалпақстан Республикасы қоршаған орталығы тәбiiйii шараятларына тәсирин айтып өтип пайда болған экологиялық машқалаларды турақластырыўдың итималлы жолларын излеп бул арқалы регионның тәбiiйгii ландшафтларын турақлы раўажландырыў қусаған мәселелер мениң питкерийў жумысымның бас мақсети етип қойылған.

Питкерийў қәнигелик жумысымның иззертлеў объекти хәм предмети Қарақалпақстан Республикасы территориясының 43⁰ арқа кеңликлеринен баслап Арал теңизи жағаларына шекемги Устирт тәбiiйii районның Арқа Устирт бөлими, төменги Амударьяның Арқа хәм Арқа шығыс бөлими менен Қызылқум шөлиниң Қарақалпақстан бөлими территориялары киреди. Бул районлардың тәбiiйгii ландшафтларына салыстырмалы баха берип экологиялық машқалалардың тәбiiйгii компонентлердиң өзгериўине тәсирин усы қәнигелик жумысында атап өтпекшимен.

Питкерийў қәнигелик жумысының жаңалықлары үлкемиздиң тәбiiйii ландшафтларының раўажланыўына экологиялық жағдайлардың тәсирин Қарақалпақстанның қоршаған орталығы тәбiiйii шараятларына тәсири мысалында баҳалай билиўи есапланады. Арал теңизи суўының курғаўы нәтийжесинде теңиздиң курғаған ултаны 44 мың км² ден асып оның орнында кумлы, дузлы шөлистанлықлар пайда болмақта нәтийжеде район климатының курғақласыўына тәсир жасаса, екиншиден теңиз ултанынан хәр жылы 100-150 млн тонна дузлы, шаңлы тозанлардың көтерилиўи халық хожалығына жарамлы жерлердиң дузланыўы менен өнимдарлығының пәсейиўине себепши болмақта. Самал менен көтерилген шаң-тозанлардың узынлығы 200 км ден 400 км аралықта, ени 30-40 км ге шекем созылады хәм олар жылына 6-9 мәрте қайталанады. Үлкемиздеги экологиялық жағдайлардың кескинлесиўи хәм оның ақыбетлерин жасларға тусиндириў арқалы оларда тәбиятқа туўры қатнас жасаўды, тәбият байлықларынан ақылға муўапық пайдаланыў көнликпелерин пайда етиў арқалы тәлим тәрбиялық әмелий жақтан әҳимийети күшли.

Қәнийгелик питкеріу жұмысының методологиялық тийкарлары,
методлары хәм оның нәтийжелериниң әмелиятта тутқан орны
Қарақалпақстанның қоршаған орталығы тәбийй шараятларына тәсири
мысалында үлкемиздиң тәбийй ландшафтларының раўажланыўына
экологиялық жағдайлардың тәсирин оқыў әдебиятларынан пайдаланып
салыстырмалы, статистикалық, картографиялық методлардан пайдаланып
анализ бериўге еристим.

Бүгинги күнге келип Арал теңизи суў бети көлеминиң 96% ке
қысқарыўы нәтийжесинде теңиз этирапындағы жерлерден 800 мың гектарға
шамалас қамыслар қуўрап қалды, 1,3 млн га тоғайлықлар ығаллықтың
жетиспеўи нәтийжесинде жоқ болыў алдында тур. Тәбийғый жайлаўлардың
зүрәәтлилиги 5 млн от жем бирлигине төменлеп кетти, 100 ге жақын ири хәм
майда көллер қуўрап олардың орнында шорлақлар пайда болды.

Региондағы ығаллықтың кемейиўи менен тәбийғый ландшафтлардағы
өсимлик хәм ҳайўанат дүньясы кемейип айтарлықтай өзгериске ушырады.
Олардың көпшилигиниң (генафонды) нәсили бузылып айрымлары жоқ
болыў алдында тур. Бул жерде жасаўшы ҳайўанлардың 32 түри Өзбекистан
Республикасының Қызыл китабына киргизилди. Бурынғы орталықта жасап
тиришилик еткен 178 ҳайўанатлар түринен тек 38 түри санланып қалған.
Суўда жасайтуғын ҳайўанлардың бас саны кемейип баратыр, мысалы 1960
жыллары Арал жағасындағы көллерден 1 млн ға шамалас ондатра терилери
таярланған болса, ҳәзирге келип 1000 данаға жетпейди.

Бундай мағлуматларды Өзбекистанның хәм Қарақалпақыстанның
экономикалық-социаллық географиясы курсларын оқытыўда тек илимий
теориялық акспектте билим берип қоймастан оның мазмунында әмелий
көлликпелерди пайда етиўинде әҳмийети кушли. Усы мақсетте
мениң қәнийгелик питкеріу жұмысымда тәбийй ландшафтлардың
өзгерислери бойынша топланған мағлуматлар Өзбекистан хәм
Қарақалпақстан географиясы курсларының әмелий сабақларында
пайдаланыўға хәм географиялық жаңа мағлуматлар таярлаўда, сондай ақ

мектеплерде география дөгереклерин шөлкемлестириўде хәм үлке таныў музейлеринде экспонатларын кеңнен пайдаланыў мүмкин .

I БАП. Тәбият хәм жәмийет арасындағы байланыслардың кескинлесиўи нәтийжесинде Арал теңизи регионьнда экологиялық машқалалардың жүзеге келиўи.

1.1. Тәбият хәм жәмийет арасындағы қатнасықлардың қошаған орталық тәбийий компонентлериниң өзгериўине тәсири

Тәбият пенен жәмийеттиң өз-ара қатнасықлары курамалы процесс болып ол тез өзгермели хәрекетке ийе. Инсаният тәбияттан хәм байлықларынан қанша көп пайдаланса тәбият хәм оған сонша тәшиўиш келтиреди. Тәбият байлықларынан зәрүрликке қарап пайдаланса олардың орнын бәрқулла толықтырып, тәбиятты байытып барыў тийкарғы фактор болыўына сүйениўимиз керек. Сол ўақытлары тәбият хәм жәмийет арасындағы өз-ара байланыслар бизлер күткен унамлы нәтийжелерди береди. Тәбият инсанлардан өз меҳири сақыйлығын аямайды. Инсанлардың тәсиринен усы ўақытқа шекем тәбиятқа болған тәсири әсте-ақырын асып барған. Буннан 300-400 мың жыллар бурын әийемги адамлар оттан пайдаланатуғын болды. От адамлардың аўқат түрлерин көбейтип ғана қоймай оны таярлаўға мүмкиншилик берди. Бул ўақытлары тәбият пенен болған адамлардың байланысында зыянлы ақыбетлер болмаған.

Буннан 12-15 мың жыл бурын Өзбекстан территориясында (мезолит дәўиринде) жаңа дүзим пайда болды. Мийнет қуралларының курамаласыўында жаңа көплеген табыслар жүз берди, найзаларды узаққа атыўшы қураллар жасалды. Бул инсаният тарийхында үлкен жеңис деп тән алынды. Аў қуралларының курамаласқан түрлериниң пайда болыўы менен тез жүгиретуғын хәм тез ушатуғын қусларды аўлаўға мүмкиншилик жаратты. Неолит дәўиринен баслап әпиўайы дийханшылық хәм шарўашылық пенен шуғылланыў басланды.

Эрамыздан бурынғы III-мыңыншы жылларда рудадан мыс еритип алынып, олардан түрли мийнет қураллары еритиў басланды. Қубла Арал

теңиз бойы аймақларында үй хайуанларды бағыу хәм көбейтиўлер менен шуғылланды.

Эрамыздан алдыңғы II-мыңыншы жылларда Әмиўдәрья, Сырдәрья, Зарафшан, Қашқадәрья етеклеринде суўғармалы дийханшылық пайда болды.

Мезолит, неолит, бронза хәм эрамыздан алдыңғы II-I мыңыншы жыллықларда Өзбекстан аймағында тәбият пенен жәмийет арасындағы байланыслар күшсиз болған хәм орташа өзгерислерге себеп болған. Бундай аз муғдардағы өзгермелер қайта тиклене алыўға мүмкиншилиги бар еди.

Өзгерислер тийкарынан көбирек өсимлик хәм хайуанат дүньясына базы жерлерде топырақ өзгермелери қайта тикленип турған. Бул ўақытлары тәбият пенен жәмийет ортасында кескин байланыслар жүз бермеген. Айырым аймақларда хайуанат дүньясының майданы кемейиўи менен шекленгени менен бирде-бир хайуан яки өсимлик түрлериниң жоқ болып кетиў ўақыялары күзетилмеген. Эрамыздан алдыңғы VI-IV әсирлерде Төменги Әмиўдәрья хәм Төменги Сырдәрья етеклеринде кең майданларда суўғармалы дийханшылық пенен шуғылланған. Әмиўдәрья хәм Сырдәрьяның төменги ағымларында барлығы болып 3,5-3,8 млн га жерлер суўғарылған. Бирақ жерлерден пайдаланыў коэффициенти жылына 10-15 % тен аспаған. Себеби усы уақытлары адамлар еле жердиң шорланыўы, қум басыўы, батпақланыўы усаған ҳәдийселер менен гүресе алмаған. Жерлер шорлана баслағаннан кейин оны таслап жаңа жерге көшип кете берген.

Суўғармалы дийханшылықтың тез пәт пенен раўажланыўы IX-XIII әсирлерде, әсиресе Сырдәрья хәм Әмиўдәрьяның төменги ағымында 1,4 млн га жерди ийеледи. 1914-жылға келип барлық пайдаланыўда болған суўғарылатуғын жер майданы Өзбекстан майданының 1817,5 мың га ны курады. Дийхан хәм мураплар тақырлы жерлердиң өзине тән өзгешелигин есапқа алмай суўғара бериўи нәтийжесинде жерлер шорланып, батпақланып олар партаў хәм тасланды жер сыпатында пайдаланыўдан шығып қалды.

Хәзирги Әмиүдәрәя дельтасының жайлау хәм партау жерлериндеги шорлы тақыр жерлер, кумлар усы хәдийселердин гууасы деп есаплауға болады.

Ақчадәрәя дельтасының кубла бөлиминде хәм Қызылқум менен өз-ара тутасқан жеринде Аязкала, Қырққыз, Оқакул араларындағы бир неше онлап топырақ қалалар бир-биринен көшпели кумлар аркалы ажыралып турады. Адамлар бул жерлерди өзлестириу дәуиринде кумлықлар көшпели кумлар болмаған. Олардың пайда болуы жерлерди сууғарыуда эрозияға бериушеңлигин есапка алмау, жайлаулардан надурис пайдаланыу х.т.б.

Тау жанбауырлар етектери бәрқулла азық-ауқат, от-жем жыйнау, қурылыс материаллары ушын ағаш, жанылғы ушын отын, металл өндириу ушын «писта көмир» таярлау, аңшылық ушын мөкән болып хызмет еткен.

Бул уақытлары жайлаулардың төменги бөлимлеринде яғный тоғайзарлықлар адамлар тәрөпинен қурылыс материаллары ретинде пайдаланылған. Түркстан аймағында VII-әсирден баслап феодал дүзимниң күшейиуи, IX-әсирден баслап күшли мәмлекетлердин пайда болуы (Сомонийлер IX-X әсирлер, Қараханийлер XI-XII әсирлер, Хорезмшахлар XII-XIII әсилер, Темурийлар х.т.б.). Жаңа қалалардың сарайлардың қурылыуына байланыслы көплеген қурал-әсбаплар ислеп шығарыуға, мийнет қуралларын таярлауға, өнерментшиликти рауажландырыуға байланыслы тәбиятқа болған байланыслардың тәсириниң өзгериуине себепши болды.

Усы уақытлары көплеген тараулардың тийқарғы шийки зат ретинде ағашлардан пайдаланған. Ол жанылғы қурылыс өнерментшилик өнимлерин таярлауда тоғайлардағы ағашлардан кең пайдаланған. Соның ушын Батыс Тянь-Шан тау дизбеклеринде Зарафшан, Нурата, Түркстан, Хисар, Алай х.т.б. таулардың жан бауырларындағы тоғайлар көплек кесилген. Арша тереклер көбирек өнерментшилик хәм қурылыс материалы ретинде көбирек ислетилген. Себеби оған ислеу бериу аңсат, тез ширимейди, бойы 10-12 м ден артық келеди.

Самарқанд, Шахрисабз, Бухара, Ташкент, Уртатепа, Хужанд, Қаршы, Фарғона, Төменгі Әмиўдәрйя қалаларындағы қурылыс материаллары тоғай өсимликлери есабынан қурылған. Илимпазлардың айтыўына қарағанда ХІХ-әсирдің ақырларында Зарафшан дәрйясында хәр жылы Түркстан хәм Зарафшан таўлы етеклериндегі тоғайзарлықлардан Самарқандқа Төменгі Әмиўдәрйя қалалары ушын 120 дай сал ағызылған. Хәр бир салда 220 дай арша ағашы болған. Пәнжикенттен Самарқандтағы қурылыслар ушын хәр жылы 30 мың арша қадалары жиберилип турылған.

Егер тек ғана Зарафшан дәрйясы арқалы ХІІІ-ХІХ әсирлер даўамында орташа 20-30 мың тереклер жиберилген болса, қаншадан-қанша тоғайлықлардың аяўсыз қырқылғанлығы әсиресе тоғайзарлықлардың сийреклесип баратырғанлығының гуўасы боламыз. Тоғайлықлардың көпшилигі әсиресе Төменгі Әмиўдәрйя дельтасында тораңғыллықлар, жыңғылзарлы, шеңгелзарлы тәбийй ландшафтлар суўғармалы жерлерди ашыў мақсетинде көплек кесилип хәм сүрилип кеткен. Қарақалпақстан Республикасы территориясында Әмиўдәрйя дельтасының суўғармалы каналларының (Қызкеткен, Қуўанышжарма, Суўенли, Қоңырат) иске түсиўи менен тоғайзарлықлар тәбийй отлақлы жерлер дийханшылық мақсетинде қайта өзлестирилип жиберилди.

Республикамызда жаңа районлардың дүзилиўи менен Қараөзек, Тахтакөпир, Бозатаў, Қанлыкөл, Шоманай районлары территорияларында жаңа партаў жерлер ашылып тоғайзарлықлар тегисленип тың жерлер ашылды. Нәтийжеде аўыл-хожалығында үй жайлар қурыўда, қурал-әсбаплар ислеўде, өнерментшилик өнимлерин ислеўде, әсиресе шарўа халқын қара үйлер менен тәмийнлеўде қара тал, баялыш, сексеўил, тораңғыл, жийде, ерик ағашлары кеңнен пайдаланылды.

Усы жағдайларға байланысly Төменгі Әмиўдәрйя дельтасы тегислик территориялардың қамысзарлықлары мал шарўашылығы ушын пайдаланылды, аўыл-хожалық районлардың ашылыўы менен Арал теңизине шекемги территорияларға таралыўы бул аймақта жасайтуғын жыртқыш

мәлим пышық, қасқыр, жолбарыс, қарақулақ усаған хайуанлар арқада Үстирт кеңислиги менен қызылқум дала шөллерине қоныс өзгертиуіне себепли болды.

Солай етип, әсирлер дауамында үлкемиздің өсимлик хәм хайуанат дүньясының адамлар тәрәпинен аяўсыз жоқ қылыныуы қандай ақыбетлерге алып келеди.

Бириншиден, Туран ойпатлығының тегислиги соның ишинде Әмиўдәрәя алабындағы әсирлер бойы пайда болған өсимлик хәм хайуанат дүньясы кемейип, дәрәя суўының көппеп аўыл-хожалығын пайдаланылыуына байланыслы дәрәя суўы менен тоғайлардың тәмийнлениуи төмен жағдайда болғанлығына байланыслы курғақшылық күшейип шөлге шыдамлы өсимликлер ғана сақланып келинген.

Тоғайлықлардың терекзарлықлардың мақсетсиз жоқ қылынуы нәтийжесинде ҳаўаның кескин курғақ болып, путалы, ярымпуталы хәм отлақ жерлердің өсимлик дүньясының кемейиуіне алып келди. Топырақ эрозиясының тийкарғы қалқаны өсимликлердің сийреклесиуи нәтийжесинде Қарақалпақстан Республикасы территорияның арқа батыс территорияларында шөлистанлықлардың өнимдарлы жерлерди басып алыулары ушыраспақта.

Арал апатшылығына байланыслы ҳәзирги уақытта кубла Аралда пайда болған экологиялық жағдай туўралы өкиниш пенен былай деп көрсетиуге болады; Әмиўдәрәяны жуўенлеу онша қыйын болмады, бирақ буннан келип шыққан ақыбетлер әжайып тәбийий комплекслердің әсиресе тоғай экосистемаларының бузылыуына хәм жоқ болыуына алып келди. Атап айтқанда, Әмиўдәрәяның төменги бөлегиндеги тоғайлардан есапланған Бадайтоғай, Назархан, Бекбайтоғай, Нурымтубектоғай, Шаббазтоғай хәм Саманбай тоғайлардың майданы қысқарды. Соңғы 30 жыл ишинде өсимлик бирлеспелери хәм ҳәр жылы суўға бастырыу жолы менен өсип туратуғын өсимликлер майданы 38 % тен 8 % ке шекем, ал уақты-уақты суўландырып туратуғын қуслардың жасау орынларының майданы 40 % тен 12 % ке азайды.

Ал суўалмалы дельтаның шорланған, сахраға айланған майданларына бейимлескен асосациялардың саны 25 % тен 70 % ке шекем өсти. Әмиўдәрья дельтасының 600 мың гадан аслам майданында оғада бәлент қамыслықлар бар еди. Олар 80-жыллардың ортасына келип 6-есеге қысқарды. 1960-жыллары гектарына 300-400 центнер қамыстың көк массасы өндирилген болса, ҳазир бул көрсеткиш 40-120 қурайды. Бул дәўирлерде баяғы бирлеспелердиң майданы 12 мың гадан 1,5 мың га ға шекем кемейип кетти. Пишенликлер менен жайлаўлардың майданы қысқарып олардың зүрәәтлилиги пәсейди. Мәселен 1960-жылы 420 мың га пишензарлықтан 1980-жыллықтың ақырында 70-75 мың гектары ғана қалды.

Системалы суўғарылатуғын майданлардың қурғақ массасы гектарына 15-40 центнерден 3-6 центнерге кемейди. Сахраға айланып атырған аймақларда ҳәр бир гектарынан жетистирилетуғын өним 0,7-0,8 центнерге яғный 22 есеге қысқарды. Суўалма ҳәм делдытадағы жайлаў майданлары 348 мың га дан 125 мың га ға азайды. Олардың өнимдарлығы гектарына еки есеге 1-14 центнерден 0,5-5 есеге пәсейди.

Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик тоғай қоры 1995 жылдың 1 январынан алынған мағлыўматқа қарағанда 4 млн 437 мың гектар майданды қурайды. Соның 650 гектар майданы тоғайлар сексеўил, баялыш, қоянсүйек, жүзгин усаған ағаш, ярым пута, пута өсимликлери менен қапланған тоғайлықлардан ибарат. Ал 6 мың гектар жерде көллер менен сайлар бойларын қаплаған боян ҳәм пишенликлерден ибарат болған тәбийий жайлаўларға ийе. (Аметов 1995).

Дәрья бойындағы тораңғыллы тоғайзарларымыздың 1 га майданында шаңлардың жутылыўы жаз айларында 50-60 кг шаңды ҳәм 45 кг углекислий газды жутыў қәсийетине ийе екен. Соған қарамастан тоғайлы жерлерди шаўып алыў, өзлестириў, өртеў усаған әдетлер 1970-жыллардан баслап дәстүрге айланған болса, ҳазирги күнде тек қурылыс материллары ушын пайдаланылмақта. Егер 1978 жылы тоғайзарлықлардың майданы 79 мың га болса, ол ҳазирге келип 30 мың га аслам тоғайлар сақланып қалған.

Республика аймағында Арал теңизинің 1960-жыллардан бастап қурып барыуы бул жерде жасаушы өсімлик хәм хайуанат дүньясында экологиялық тең салмақтылықтың бузылыуында көриуимизге болады. Өсімлик хәм хайуанат дүньясының тарқалыу географиясы әдетте усы жерде жайласқан топырақ ресурстарының қурамы өнімдарлығына байланысly рауажланады.

XX-әсирдің 60-жылларынан бастап илим техника рауажланыуының жеделлесиуі нәтийжесинде өндирис күшлеринің рауажланыуы күшейип, санаат-ауыл хожалығы өндириси, транспорт қурылыс тез пәт пенен рауажланды. Соның нәтийжесинде жаңа жерлерди өзлестириу, дәр्या сууларын суғарыу ушын пайдаланыуы нәтийжесинде теңизге қуятуғын суу муғдары кескин кемейип, XXI әсирде пүткил дүньяны кәуәтерге келтиретуғын Арал теңизи сууының қурыуы нәтийжесинде экологиялық апатшылық зонасының пайда болыуына алып келди.

Нәтийжеде тәбият пенен жәмийет арасындағы байланыслар өзгерип, инсанлардың тәбийий байлықларды ақылға мууапық регионаллы пайдаланыу хәм оны тиклеп бериу уазыйпаларын еледе болса толық қолға алмай атыр. Арал теңизи суу бассейнинің қурыуы менен республикамыздың климатына, ауыл-хожалық егинлеринің вегетациялық дәуирине, топырақтың қунарлылығына, өсімликлердің хәм хайуанатлардың тарқалыу географиясына сезилерли дәрежеде кери тәсирин тийгизип атыр.

Солай етип инсан тәбиятты мың жыллар дауамында дерлик өзгерте алмаған болсада бизиң регионымызда кейинги 40-жылда буған еристи. Тәбият пенен инсан арасындағы байланыслар кескинлесип бармақта. Буның айқын мысалы ретинде жоқарыда айтып өткенимиздей Арал теңизи сууының қурыуы менен Арал бойындағы экологиялық жағдайлардың кескинлесиуі ақыбетинде тәбийий компонентлердің жоқ болып барыуы оның кери тәсирлеринің социал-экономикалық ақыбетлеринен көриуимиз мүмкин.

Арал теңизинде экологиялық тең салмақтың бузылыуы топырақлардың мелиоративлик жағдайына, рагионда жасаушы хайуанат дүньясының генофондының бузылыуына, өсімликлердің түрлеринің кескин кемейип ,

дузға шыдамлы өсимликлердің қалғанлығы, аўыл-хожалығында зүрәттиликтің төменлеўине, жергиликли халықтың ден-саўлығының кери тәсиринде хәм тағы басқада экологиялық проблемалардың пайда болыўында көриўге болады.

Жуўмақлап айтқанда республикамызда кейинги ўақытлары тәбият пенен жәмийет арасындағы өз-ара тәсирлердің кескинлесип барыўын ўақтыншалы әпиўайы ўақыя деп қараўға болмайды. Себеби тәбият байлықларынан оның шегараланған, мөлшерленген муғдарынан есапсыз пайдаланыўға болмайтуғынлығын адамларға түсиндириўимиз керек. Дүньяда барлық материаллық байлықлар өлшемли болғанындай жер байлықлары да анық өлшемли. Соның ушын оннан ақылға муўапық үнемли пайдалансақ келешек әўладларымыздың бизлерден бахытлырақ жасаўына мүмкиншилик жаратқан боламыз.

1.2. Арал теңизи бассейниниң қурғаў себеpleri хәм оның тәбийий ландшафтларының өзгериўине тәсири.

XX-әсирдиң 60-жылларынан баслап илим техника раўажланыўының жеделлесиўи нәтийжесинде өндиpис күшлериниң раўажланыўы күшейип, санаат-аўыл хожалығы өндириси, транспорт қурылыс тез пәт пенен раўажланды. Соның нәтийжесинде жаңа жерлерди өзлестириў, дәрья суўларын суғарыў ушын пайдаланыўи нәтийжесинде теңизге қуятуғын суў муғдары кескин кемейип, XXI әсирде пүткил дүньяны кәўетерге келтиретуғын Арал теңизи суўының қурыўи нәтийжесинде экологиялық апатшылық зонасының пайда болыўына алып келди

Түркстан үлкесиниң үлкен суў бассейни Арал теңизине Әмиўдәрья хәм Сырдәрья келтирип турған суў сыйымы 1961 жылдан баслап кемейип кете баслады.



Буған себеп Арал теңизи бассейнинде жаңа суўғарылатуғын жерлерди өзлестириў, сыйымлылығы үлкен болған суў сақлағышларының, сер тармак суўғармалы системаларының иске түсирилиўи сыяклы көп жылларға

мөлшерленген үлкен ирригациялық хәм мелиорация дәстүриниң әмелге асырылыўы себеп болды.

Таблица №1

Арал теңизине Әмиўдәрья хәм Сырдәрья аркалы қуйылатуғын суў муғдарының 1926-2006 жыллар даўамында өзгерип барыўы

Көрсеткишлер	Жыллар						
	1926-1940	1941-1950	1951-1960	1961-1970	1971-1985	1986-1996	1997-2006
Суў байлықлары	103,7	113,8	119,9	116,2	109,6	98,6	72,4
Суў ағымы, сарпланыўы	43,8	50,5	56,9	70,8	92,2	-	-
Дарья делталарына жетип келген суў муғдары	59,9	63,2	63,0	45,4	17,4	14,6	12,3
Дарья делталарында сарпланған суў	6,1	8,0	7,8	3,9	2,4	2,0	1,8
Теңизге қуйылған суў	53,8	55,2	55,2	41,5	15,0	12,6	-

1911-1960 жыллар даўамында Аралға алымлардың мағлыўматына гөре хәр жылы орташа 52 км^3 суў қуйылып келген хәм оның бийиклиги турақлы рәўиште 53 м абсолют бийикликте болған, теңиз майданы 66 мың км^2 , суў сыйымы 1061 км^3 ге тең еди, суўдың орташа дузланыў дәрежеси хәр литр суўда 9,5-10 г әтирапында болған, теңиздиң орташа тереңлиги 16 м болған.




Арал қаддиниң 1961 жылдан баслап пәсейиўи түрли жылларда түрлише болды. 1961-1970 жыллар даўамында пәсейиў орташа 21 см, 1971-1980 жылларда орташа 58 см, 1981-1985 жылларда 80 см, 1986-1995 жылларда 46 см ди қурайды. Айырым жылларда суў қаддиниң пәсейиўи ҳәтте 1 метрденде көп болған. 1960-2006 жылларда теңиз суў режиминиң өзгериўи төмендегише болған.

Таблица №3

Арал теңизи суў режиминиң өзгериўи

Көрсеткишлер	Жыллар бойынша тийисли мағлыўматлар									
	1960	1965	1970	1975	1980	1985	1989	1996	2006	2013
Қәдди, абсолют бәлентлик, м есабында	53,3	52,5	51,5	49,4	46,3	42,2	38,6	36,0	22	5
Көлеми, км ³	1090	1040	975	845	675	470	329	266	154	21,8
Майданы, мың км ²	67,6	64,4	61,2	57,4	52,1	45,0	36,5	30,3	17,1	1,3

Аралдың суў муғдары 1911-1960 жыллары жыллар даўамында тийкарынан бир қыйлы болған, теңизге келген суў менен оның суў сарпланыўы дерлик тең болған. 1961-жылдан баслап теңизге қуйылып атырған суў кемейип барған. Бул жағдай Арал бассейнинде суў кем болған 70-жыллардың орталарында (1972 ҳәм 1974 жыллар), сондай-ақ 1977, 1981, 1982, 1983, 1986 ҳәм 1989 жылларда күшейди.



1984 ж

2012 ж

Сол дәуірлерде суўғарылатуғын жерлердиң майданы Өзбекстан Республикасы бойынша жылына 100 мың га ға кеңейип барған.

Динамика орошаемых земель Узбекистана (в тыс. га)



Теңиз суўының шорланыў дәрежеси артып бармақта, Теңиз суўының шорланыўы 2010 жылға 1 литр суўдағы дуз муғдары 87 г дан артады.


Аралдың қурғаған бөлиминиң (майданы 4,4 млн. га дан артық) тәбийий жағдайы өзине тән, ески жағадан ишкери тәрәпке қарай 100-120 км аралықта суўы тартылған. Бул жерлер тийкарынан дөң бархан қумлары менен бәнт. Марзалы қумлар пайда болмақта. Қумларда сийрек черкез, қара сексеўил, жузгин, бир жыллық соралар ҳәм басқа өсимликлер ушырасады. Бул регионнан соң тақыр тәризли шорлақлар үлкен майданларды ийелеген, гейде қум үйиндилери ушырайды. Грунт суўлары қәддиниң 5-7 м төменге түсиўи арқалы әўелги қатқалақ ҳәм порсылдақ шорлақлар ендиликте қалың шорлақларға айланған. Бул регионның майданы теңизге қарай жыл сайын кеңеймекте, грунт суўлары қәдди де Арал шегинген сайын пәсейип барады.

Суўдан жақында қурғаған бөлеги пәс тегисликлерден ибарат болғанлығы себепли грунт суўларының ағымы ҳәм жүдә пәсте, гей жерлерде әмелде жоқ дәрежеде. Грунт суўы тийкаргы бөлиминиң пуўланыўға сарп болыўы нәтийжесинде топырақта үлкен муғдарда дуз жыйналып бармақта. Грунт суўлары қәддиниң жер бетине жақынлығы (1-3 м) ҳәм дузлылығы (хәр литр суўда 20-50 г, хәтте одан да көп) себепли бир жыллық (қара ҳәм қызыл) соралар кең тарқалған, бирақ өсимликлердиң тығызлығы кем, алдынлары (1977-1978 жыллары) 1 км² майданға олардың муғдары 900-1000 туп ҳәм одан көп еди. Хәзирде ол 100 туп әтирапында болып үлкен майданларда

ашық шорлақлар аппақ яки күлрең түсте куяш нурынан жылтырайды. Теңіз бойына 200-500 м қалған жерлерде (маршлы шорлақ) грунт суылары тереңдигі 0-0,5м. Бул жерлерде теңіз жақтан бағдарланған жер асты суылары менен құрғақтықтан қиятырған грунт суылары өз-ара ушырасады, соның ушын хәм олардың минералласыу дәрежеси онша үлкен емес хәм теңіз суы дузлылығы дәрежесинен бираз жоқары (40-50 г). Өсимлик дүньясы дерлик жок, хәр жер-хәр жерде пәс бойлы кара сора ушырасады.

Теңиздің құрғаған бөлиминде дуз топланыуы жедел болмақта. Қазақстан гидрометеорология илимий-изертлеу институтының (1990 ж) мағлыұматы бойынша 1961-1970 жылларда егер де қурып қалған майдан 6,9 мың км² құраған болса, орташа жыллық дуз топланыуы 4,85 млн. тонна, 1971-1980 жылларда қурып қалған бөлим 9,6 мың га болса, жылына 2,95 млн. т, 1981-1985 жылларда болса дуз хәр жылы орташа 4,82 млн. т қурайды. Оның қурып қалған бөлеги үлкен дуз дерегине айланып бармақта. Бул процесс орталыққа кери тәсир көрсетеди.

Хәзирги Аралдың қурып қалған бөлиминен қум, шаң хәм дуз бөлекшелери самал тәсиринде түрли тәреплерге тарқалмақта. Киши теңиздеги Сарышығанақ қолтығында (хәзир қурыған) хәм пүткил шығыс бөлиминде жылына орташа 7,3 млн. т қум, соннан 50-70 мың т. дуз ҳауаға көтерилип, көбирек кубла батыс, батыс, арқа-шығысқа қарай тарқалмақта. Ғауаға көтерилген барлық қум хәм шаң-тозаңлардың көпшилик бөлими, теңиздің өзине түсиуи анықланған. Булардан басқа және көпшилик есап-китаплар бар, олардың көпшилиги бир-бирлерине тууры келмейди. Бул тарауда жеке изертлеу усылы хәм дәстүри тийкарында илимий тексеріулердің әмелге асырылыуы зәрүр болмақта.



Қубла Арал бойында теңиздің қурғаған бөлегинен көтерілген дуз хәм шор шанлардың түсиуі САНИИРИ мағлыұматына қарағанда 10 мың км² майданда жылына 90-100 мың тоннаны қурайды, яғный хәр га майданға 90-100 кг дан туұра келеди. Бирақ теңиздің ески жаға бойларынан қублаға қарай бул муғдар кемейип барады. Мәселен, Мойнақ этирапында хәр га майданға 1242 кг ден дуз жаўылса, Нөкис этирапында 100-150 кг хәм одан кемиректи қурайды. Бирақ бул дузлардың хәммеси Аралдың қурып қалған бөлиминен келмей, бир бөлеги этираптағы шорлақлардан хәм ушып келиуі мүмкин. Соның ушын бул туұрасында анық бақлаў жумысларын алып барыў, қай жерден қанша дуз қиятырғанлығын анықлаў жүдә үлкен әхмийетке ийе.

Арал теңизи қәддинің пәсейип барыуы, Әмиўдәрья хәм Сырдәрья дельталарына суўдың бәрқулла келмей қойғанлығынан, ең қорқынышлысы суў дузлылығының бәрқулла артып барыуы хәм түрли зәхәрли шығындылар менен патасланыуы Арал бойы аймақларында 60-жыллардың басларынан қурғақласыў процесси бақлана баслады. Нәтийжеде өткен 50-жыл даўамында дельталардағы алдыңғы гидроморф жағдайда әсирлер даўамында пайда болып келген көл-батпақ хәм отлақ тәбийий комплекслердің көпшилик бөлеги қурыды хәм типик шорлақ ландшафтларға айланды. Шорлақлар 2-3 метрге кеңейди, қайырдағы аллювиал отлақ, отлақ-батпақлы топырақлардың майданы қысқарып, олар отлақ хәм типик шорлақлар менен алмасынады

Дәрья дельталарының тийкарғы өсимлик түрлери тоғайлар, топырақ хәм суў муғдарының кескин өзгериуі нәтийжесинде үлкен майданлар да қурып баслады. Қурып қалған көл хәм батпақлы орынларда соралы юлғунзарлықлар, сәл бәлент тегисликлерде түрли отлы, соралы

юлғунзарлықлар, жүдә күшли шорланған орынларда соралы қарабарақзарлар пайда болған, дәрья тармақларының еки жағасын ийелеген терекли тоғайлар (тораңғыл, жийде, тал) суўдың жоқлығы грунт суўларының муғдары түсип кетгенлигиниң артып барыўы нәтийжесинде пүткиллей қурыды хәм олардың орнына юлғунзарлықлар ийеледи.

Бурын өнимдар жайлаў хәм пишензарлықлардың өнимдарлықлары 10-50 ц ден 0,3-0,5 ц ге шекем азайды. Өсимликлер тығызлығының азайып барыўы хәм терек, пута хәм шала пута өсимлик қапламының сийрек галофитлер менен алмасыўы ақыбетинде самал эрозиясы күшеймекте, нәтийжеде тегислик ойлы-терең жерлерге айланбақта, қум рельефи формалары қәлиплеспекте.

Тәбийий орталықтың, атап айтқанда дәрьялар суўының патасланыўы хәм жетиспеўшилиги, климатлық өзгешеликлер (хаўа абсолют ығаллығының пәсейиўи, самаллар, шаң, тозаң х.т.б.) халықтың жасаў жағдайын қыйынластырмақта. Уллы илимпаз Абу Бакр Розийдин «Тәбияттың беқиеслигин тән алмақ керек. Адамның қаншелли саў болыўы хаўа, климат хәм жасаў тәризине байланыслы болады». дегенлери бул үлкеде өз көринисин тапқан. Арал бойы регионьнда тәбийий, экологиялық кескинлесиў жағдайларын турақластырыў бойынша әмелге асырылып атырған илажлар қысқа дәўирде унамлы нәтийжелерин көп миллионлы мийнеткеш халық күтпекте.

1.3. Арал бойы тәбийий экологиялық жағдайларын турақластырыў бойынша итималлы иләжлар

Арал машқаласы қурамалы машқала, ол айрықша аймақ болғанлығы себепли оның шешими Әмиўдәрья хәм Сырдәрья бассейнери аймағындағы жер-суў мәселелерин толығынша туўра жол менен шешиў керек. Арал машқаласының тәбийий, экологиялық хәм социал-экономикалық ақыбетлери үлкен, алдыңғы қолай жағдайларды қайта тиклеў қыйын мәселе. Усы

машқала жүдә қыйын хәм апатшылыққа алып келетуғынлығын итибарға алып, оны тезирек туўра шешиўди көзлеген ҳалда түрли қалаларда (Москва, Тошкент, Алматы, Нөкис, Аральск, Вашингтон, Бразилия, Лагос) илимий кеңес, конференция хәм экспертлер жыйнағы болып өтти хәм тийисли қарарлар қабыл етилди.



БМТ-ның ЮНЕП шөлкеми бир неше мәмлекетлердиң қәнийгелери хәм фирма ўәкиллери қатнасыўында Арал машқаласы бойынша бир қатар кеңеслер өткерди. Машқаланы шешиўдиң түрли вариантлары ҳаққында бир неше лекциялар тыңланды.

1993 жыл 26 мартта Қызыл-Орда қаласында Россия хәм Орайлық Азия Республика президентлери қатнасында Арал хәм Аралбойы машқаласына арналған конференцияда бул машқалаларды шешиўдиң улыўма бағдарлары ислеп шығылды.

Арал бассейни машқалалары бойынша мәмлекетлер аралық кеңес хәм Аралды сақлап қалыў Халықаралық жамғармасы дүзилди. 1994-жылы 14-январда Нөкисте Россия хәм Орайлық Азия республикалары басшылары қатнасыўында усы машқалаға бағышланған кеңес болды. Онда жақын жыллар ишинде усы экологиялық аўхалды жақсылаў ҳаққында анық илажлар хәмде Арал машқаласының программасы тастыйықланды.

1995-жылы 20-сентябрьде және Нөкисте Орайлық Азия мамлекетлери басшыларының ушырасыуы өткерилди. Ушырасыудың ең үлкен жеңиси Орта Азия мамлекетлери басшылары хәм халық аралық шөлкемлердин Арал бассейнинде тураклы раўажландыруў машқалаларын шешиў бойынша Нөкис баянатының қабыл етилиўи болды. Жәхән банки Арал бассейнинде пайда болған экологиялық кризистен тезирек қутылыў мақсетинде финанслық жәрдем бериўди дағазалады.

1997-жылы 28-февралда Алматыда Орайлық Азия мамлекетлери басшыларының Арал теңизи бассейниндеги машқалаларға бағышланған жоқары дәрежедеги нәўбеттеги ушырасыуда «Алматы баянаты» тастыйықланды. Баянатта сондай- делинген. «БМШ хәм оның қәнийгелескен агентликлери Арал теңизи бассейнинде пайда болған қәўипли аўхалға бәрқулла итибар бериў хәмде усы территорияда этирапты қорғаў ҳаққында шаралар көриўге, Арал бойындағы аўыр ахўалға түсип қалған халыққа жәрдем көрсетиў бойынша шараларды әмелге асырыўға айрықша итибар бериўге шақырылсын. Халықаралық шөлкемлер менен бирликте Арал теңизи бассейнин тураклы раўажландыруўға тийисли конвенция программасын ислеп шығарыў ақырына жеткизилсин».

Алматыдағы жыйналыста жәхән банкинің вице-президенти Йоханс Линин Арал машқаласы бойынша ислеп шығылған 2000-жылға мөлшерленген жоқары бағдарлар ҳаққында сөйледи. Ол үш бағдарда тәжирийбели жумыс алып барыў зәрүрлигин айтып

1. Суў сақлағышлар хәм бассейнлерден пайдаланыў, оларға техник хызмет көрсетиў хәмде қәўипсизлигин тәмийнлеўде территориядағы мамлекетлердин өз-ара келисип ис тутыуы 2. Суўдан нәтийжели пайдаланыў 3. Суўдың шорланыўына қарсы гүресиў.

Өзбекстан Республикасы биринши президенти И.А.Каримов төртинши жоқары бағдар сыпатында социал бағдарды белгилеў ҳаққындағы усынысын киргизди. Усы бағдарларды әмелге асырыў ушын Жәхән банки келеси бес жыл даўамындағы бул ҳаққындағы программаларға 380 млн. АҚШ доллары

муғдарындағы дәрамат сарплауын ұсыныс етті. Бизіңше ұсы программаларды әмелге асырыу үшін рауажланған мәмлекетлер белгили муғдарда дәраматлар ажыратыуы мүмкин. Орайлық Азия мәмлекетлери тәрeпинен Арал фондына төленетуғын ярым жыллық салықлар ҳәр бир мәмлекет бюджетиниң 0,3% муғдарында белгиленеди.

Кейинги ўақытлары Арал машқаласы ҳаққында гәп кеткенде теңиз суў қәддин абсолют бәлентликте сақлап қалыу.

Тийкарғы дыққат итибар Арал бойының экологиялық кризистен қутқарыуға қаратылмақта, себеби ең әўеле ҳалықтың саўлығы үлкен әхмийетке ийе, аймақты турақлы рауажландырыуға ерисиу әхмийетли мәселелерден есапланады. Аралды қутқарыу мәселесин ҳәм өз орнында тезирек шешиу керек, «Арал дәрди-дүнья дәрдидур».

1995 жылдан Арал бассейнинде суў жетиспеушилиги басланды, бул дәўир қәнийгелердиң пикирине 2000 жылға шекем даўам етиуи гүзетилген. Аралға Әмиўдәрья ҳәм Сырдәрья арқалы суўдың жетип барыуы бул дәўирде жүдә аз болыуы турған гәп. 1995-жылда Әмиўдәрья арқалы үлкен теңизге жәми болып 5,1 км³, 1996 жылда ҳәм шамалауымызша сонша муғдарда суў түскен. Бул муғдар теңиз қәддинен болып атырған пуўланыудың 1/4 ин қурайды.

Орайлық Азиядағы ең ири көллердиң бири болған Арал теңизиниң набыт болыуы оның суўдан босаған майданларында кең көлемдеги шорлақлар ҳәм еспе қумлардың пайда болыуы тарийхта болмаған қубылыс. Соңғы 40 жыл ишинде теңиз суўы 96 % ке қысқарып теңиздиң Үстүрт жағалары батыс бөлиминде аз ғана дузлы суўлары сақланып қалған.

2013-жылға келип 23 км³ қа қысқарып, суўының дузлылығы литрине 11 грамнан 122 граммға шекемге көбейген. Теңиз акваториясының майданы 66 мың² тан 1,3 мың км² қа кемейди. Нәтийжеде Арал суўының қурғаған ултанында 44 мың км² майданда қумлы дузлы шөлистанлықлар пайда болды. Бул майданлардан жылына 100-150 млн тонна дузлы шаң көтериледи. Арал апатшылығына ең тийкарғы ақыбетлери бул жерлердиң глобал масштабда

шорланыуы, тәбийй орталықтың патасланыуы, топырақ, суў, ҳаўа, өсимлик хәм хайўанатлардың тарқалыуы географиясына кери тәсирин тийгизип атыр. Арал теңизиниң гидрофизикалық режиминиң өзгериўлери тәбийй орталықтың бузылыуына хәм бул жерде жайласқан өсимлик хәм хайўанат түрлериниң жоқ болып кетиўине себепши болмақта. Суўланыўдың кескин кемейип кетиўин дельталарда қурғақшылықтың күшейиўине, дельталық көллердиң көпшилигин кеўип қалыуына жер асты суўларының қаддиниң төменлеп кетиўине хәм олардың минералдласыуына алып келди. Бирақ булардың барлығы микроклиматтың өзгериўине, температураның көтерилюїне хәм ҳаўа ығаллығының төменлеўине, өсимлик дүньясының кемейиўине, батпақ хәм отлақлы топырақлардың қурғап кетиўине топырақ қатламларының шорланыуына, оның қунарлылығының төменлеўине хәм бул орталықта жасаўшы хайўанат дүньясының генофондына жоқ болыуына өз тәсирин тийгизип атыр.

1987 жылдан баслап Сырдарья өз суўын тек киши теңизге қуйып келмекте, оның абсолют бийиклиги 40 м ден жоқары. Оның үлкен теңизден бөлекленген ҳалда сол турысында сақлап қалса, үлкеде әмелге асырылатуғын ең үлкен хәм жуўапкерли экологиялық жұмыс болған еди. Бул менен Аралбойы хәм оның этирапындағы аймақларды келешекте жүз бериўи мүмкин болған ең күтилмеген жағдай хәм процесслердиң тәсиринен сақлап қалған болар еди.

Дурыс, суў да зәрүр, халық күнделикли көбейип баратырған бир ўақытта жаңа жерлерди өзлестириў хәм суўғарылатуғын жерлердиң суў менен тәмийнлениўин жәнede жақсылаў проблемалы мәселе. Бирақ суўдың көпшилигин суўғарыў усылларының бейимлестириў жоллары менен жеңиў мүмкин. Бул жағдай ирригация әмелиятында толық тастыйықланған, оларды әмелде қоллаў керек.

Жәми суў бассейнлерине жылына кеминде 18 км³ суў зәрүр болады, егер сонша көлемдеги суўды толтырыўдың илажы болмаған уақытта киши теңиз орнына Сарышығанақ қолтығын суў менен тәмийнлеўге ерисиў мақсетке

муўапық, оған жылына 1,2 км³ суў зэрүр болады, кублада тек Мойнақ суў бассейнин тәмийнлеў зэрүр болады, оған 0,5 км³ суў зэрүр болады. Есап-китапларға қарағанда, Әмиўдәрья хәм Сырдәрья бассейнлеринде жылына суў муғдары 12-12,5 км³ суў болып табылады. Сонда Батыс Арал, Сарышығанақ, Мойнақ, Балықшы хәм Жылтырбас суў бассейнлери қайта қәлиплеседи.

Аралдың қурыған бөлеги кум, шор, хәм кумлақ топырақларда келешекте карасексеўил (жайларда аксексеўил, черкез, кандим), қалдық шорлақларда жузгин, қарабарақ хәм қара сексеўилден ибарат тоғайзарлықларды пайда қылыў тәбиятты қорғаў мақсетинде қәлиплесетуғын экологиялық регионлардың әхмийети үлкен болады. Сондай-ақ өнимдар тәбийий жайлаўлар пайда болады. Бул ислерди әмелге асырыў ушын илимий хәм өндирис дәстүри таярланып, қәнийгелер катнасында көзден өткерий мақсетке муўапық болады.

Хәзирги уақытта Арал бойы аймағының экологиялық жағдайын жақсылаў бойынша белгиленген ең әхмийетли шара хәм тадбирлер үлкен әхмийетке ийе болып әмелге асырылмақта. Қарақалпақстандағы (Нөкистин арқа бөлиминдеги) хәм Хорезм областындағы барлық халық жасайтуғын пунктлерди таза ишимлик суўы менен тәмийнлеў әмелге асырылмақта.

Түйемойын суў сақлағышы комплексине кириўши Капарас суў қурылмасынан басланатуғын күшли суў кубырлы насослар жәрдемінде халықты суў менен тәмийнлеўге хызмет қылып атыр. Сондай-ақ көпшилик аўыл хәм район орайлары шет мәмлекетлерден келтирилген шор суўды душшыландырыўшы қурылмалар менени тәмийнленген. Тахтакөпирде суўды тазалаўшы айрықша қурылма иске түсирилген. Халыққа медициналық хызмет көрсетиў хәм дәри-дармақ жеткизип бериў жақсы жолға қойылмақта. Бунда Өзбекстан республикасының «Экосан» шөлкеми актив жәрдем көрсетип келмекте. Және сондай қайырлы ислер Қызыл-Орда областының теңизге тутас аймақларында хәм әмелге асырылмақта.

Әмиўдәрья дельтасында көпшилик тийкарғы батпақлықларға хәр жылы белгили бир көлемде (шама менен 1-1,5 км³, суў мол болған жерлерде одан

хәм көп) суў жиберип қолдан жасалған көлшиклер пайда болмақта. Бул илажлар жаз дәўиринде суў бассейнеринде, ең алды менен балықшылықты раўажландырыўға, сондай-ақ жайлаў хәм пишензарлықларға суў жиберийге имкан береді, соның менен бирге шарўашылық ушын от-жем базасын жаратыўға жәрдем берилмекте. Судочье көли хәм оның арқа бөлиминдеги жайлаўлар хәм пишензарлықлар, Ақдәрья хәм Қыпшақдәрья аралығындағы Шеге қамыслығы, Ақдәрья менен Гөнедәрья аралығындағы Майпост ойпатлығы, Ақдәрья менен Еркіндәрья аралығындағы бир неше көллер хәм көлшеклер барлық ўақытта суў менен тәмийнленип атырғанлығы курғакласыў процесслери раўажланып баратырған бир ўақытта оларға қарсы гүресте жақсы тосық болып атыр. Бул хәрекетлер нәтийжесинде Әмиўдәрья етегинде дәрья өзеклериниң хәм шетиндеги тоғайларды белгили бир жағдайда сақлап қалыўына имкан жаратады. Жылтырбас, Балықшы, Мойнак қолтықларында қурылған суў бассейнериниң хәр жылы суў менен тәмийн етилгенлиги сол аймақларда хәм олардың этирапларында экологиялық жағдайдың бир қанша жақсыланыўына туўры тәсирин көрсетеди.

Бул киши бассейнлер балықшылықты раўажландырыўға хызмет қылыў менен бирге суўда жүзиўши қуслардың өмир мәканына айланған. Абсолют ығаллықтың бираз болсада көбейгенлиги тереклер хәм отлардың тығыз өсиўине қолайлы жағдай жаратпақта. Бирақ бул жыйынлар жергиликли халықтың ҳеш қандай инженерликсиз, проектсиз әмелге асырып атырған илажлары, пүткил Аралбойы бас инженерлик проекти тийкарында гидротехник имаратлар қурылып иске түсирилсе хәм барлық жерлерге жетерли көлемде суў шығарылса, үлкениң экологиялық жағдайы жақсыланыўында, оның ақыбетинде социал-экономикалық жағдайдың дүзилиўинде хәм жетискенликлерге ерисилген болар еди.

Аралдың қурып қалған бөлегинде самал тәсиринде пайда болған хәрекеттеги күм жыйындыларының Әмиўдәрья дельтасы тәрәпке хәрекетин тосыў, шорлақлардан көтерилип атырған дузларды этирапқа жайылыўын кемейтириў мақсетинде оның түбинде тоғайзарлықлар пайда қылыў

барысында мәлім іс-шаралар әмелде қолданылып атыр. Бул тарауда Қарақалпақстанның тоғай хожалығы хызметкерлериниң хызметлери дыққатқа ылайық. Бурынғы теңиз түбинде Шымбай, Қазақдәрья, Тахта-көпир, Қараөзек хәм Мойнақ тоғай хожалықларының хәр бирине 25 мың га дан жер ажыратып берилген. Бул майданларда қарасексеўил егий көзде тутылған.

II-БАП. Арал бойы тәбiiйii экологиялық жағдайлардың кескинлесиуi
Қарақалпақстан Республикасы қоршаған орталығы тәбiiйii
шараятларының өзгериуiне тәсири

2.1. Арал бойы регионы қоршаған орталығы тәбiiйii шараятының
өзгериуi

Арал экологиялық апатшылығы бул барлық Орайлық Азия мемлекетлериниң тууры хәм жанапай тәсир ететуғын қәуетерли социал-экономикалық ақыбетлерге алып келетуғын экологиялық машқалалардың жарқын дәлили есапланады. Кризис жағдайлары Арал теңизи сууының қурыуы менен байланысly болып регионда надурьс экономикалық сиясаттың жүргизилиуi тийкарында егислик жерлерди раўажландырыўға байланысly тәбiiйii ресурслардан ақылға муўапықсыз пайдаланыў нәтийжесинде жүзеге келген.

Арал теңизи бассейни Қазақстанның Кызыл Орда областының кубла тәреплерин, пүткил Қарақалпақстанды Әмиўдәрья хәм Сырдәрьяның орта ағымы территориялары, Қарақум каналы жағалық территорияларын өз ишине алады. Экологиялық апатшылық зонасы деп Арал теңизи түби сууы хәм теңиз акватроиясының қурыуы, Әмиўдәрья Сырдәрья дельтасының интенсив суўғарылыуы нәтийжесинде дәрья суўларының шексиз сарыпланыуы ақыбетинде қурып қалыуы нәтийжесинде бул территорияларда тәбiiйii орталықтың көринбеген дәрежеде сапалық муғдарының өзгериуiне айтылады.

Бул жағдайлардың тастыйықлаушы Аралды қутқарыўдың Халық-аралық фонды сайтларында хәм Лестер Браун пикиринше Арал кризиси – барлық Орайлық Азия еллерине байланысly тәсир ететуғын қәуетерли социал-экономикалық ақыбетлерди жүзеге келтиретуғын экологиялық машқалалардың жарқын мысалы есапланады.

Кризис жағдайлары Арал теңизиниң қурыуы менен байланысly регионда экономиканың аграр бағдарламасының тәсиринде егислик

суўғармалы жерлерди раўажландырыў хәм оларды суўғарыўдың көлеминиң артыўын хәдден тысқары көбейтиў тийкарында келип шыққан қурмаласқан экологиялық дағдарыс нәтийжеси болып табылады.



Экологиялық машқалалар булар экономикалық хәм сиясий машқалаларға байланысly келип шығады. Арал бойы регионында жер хәм суў ресурсларының сапасы төменлеп экосистеманың турақлылығы хәм дүзилиси бузылып қоршаған орталықтың зәхәрлениўи артып бармақта. Жыл даўамында 300 күнге шекем қумлы, дузлы шаңлы дүбилейлер хәрекет етип қурғаған теңиз суў астынан атмосфараға жылына 75 млн тонна қум хәм шаңлар тарқалмақта. Барлық қурғаған теңиз суў астының хәр жылы 39 млн тонна дузлар тарқалмақта. Теңиз ултаны астында Арал қум шөли 2 млн ға шамалас сүримли жерлер хәм отлақлы жерлер, тоғайларды басып кетти. Космослық сүүретлерге қарағанда Арал теңизи территориясы шаң хәм дузлар менен қапланған. Оның радиуси 800-1000 км халық жасайтуғын территорияларға тарқалған.

Арал бойы регионының климатының характерли өзгешелиги оның кескин континенталлығы менен хәм қурғақлығы менен ажыралып турады. Кейинги 35-40 жыллар ишинде Арал теңизи қурғаўы нәтийжесинде Арал бойында климатлық шәраятлардың белгили дәрежеде өзгерислери сезилмекте. Бурын Арал теңизи гүз хәм қыс айларында Сибирден келетуғын суўық аязлы самалларды жумсартыўға, жаз айларында күнниң ыссы нурларын пәситетуғын кондиционер ролин атқаратуғын еди. Теңиз қурғаўы


менен климат шәраятларының қаттыласуы менен жаз айлары қурғақ хәм қысқа, қыс айлары ұзақ хәм суықтығы менен өзгешеленеди.

Регионда вегетациялық күнлердің саны 170 күнге қысқарды. Отлақты жерлердің өнімдарлығы тең жартыға қысқарды, ал, дәрәя алаптарының өсімлик қатламларының өнімдарлығы 10 мәртеге кемейди. Арал теңизинің жағалық территорияларында атмосфера жауын-шашынлары бир неше мәрте қысқарды. Жауын-шашынлардың орташа мұғдары мәусимлер бойынша өзгерип 150-200 мм ден төмен бақланады. Теңиз суының қайтыуы менен қурғақ территориялардың майданы көбейип суудың парланыуы жылына 1700 мм ге жетти, ал, хауаның ығаллығы 10 % ке кемейди. Хауаның темепературасы қыста төменлеп жазда 2-3 градусқа көтерілди. Жаз мәусимінде хауа райының температурасы +49 градус целсияға шекем жетти. Арал бойы климатының характерли белгилеринің бири шаңлы дүбилейли күнлердің санының артыуы хәм жыл дауамында көп қайталаныуы есапланады. Арал теңизи районында күшли самаллар хәр уақыт гүзетилип батыс теңиз жағалық районларында оның ұзақтығы 50 суткадан асып кетеди. Самалдың максимал тезлиги 20-25 м/сек ға жетеди.

Арал бойы территорияларының көпшилик бөлими қумлы хәм механикалық дүзилиси жағынан жеңил топырақлардан ибарат болып самаллар нәтийжесинде атмосфераға тез көтеріледи. Арал теңизинің қурғауы регионда Қызылқум хәм Қарақум шөллеринің ортасында Арал қум шөлиниң пайда болыуына алып келди. Арал қум шөлиниң қәуәтерли жери ол тийкарынан минерал жатқызықтарының қалдықлары хәм теңиз жатқызықтарының киши дифференциаланған солончакларынан ибарат.



Арал теңизинің қурып барыуына байланысly пайда болған унамсыз ақыбетлерди үш топарға бөлий мүмкин. Бириншиси тиккелей теңизде болып атырған өзгерислер. Буған теңиздің геофизикалық, гидрохимиялық хәм гидробиологиялық режимлеринің бузылыу жағдайлары киреди. Себеби тиршилик етиу оралығы параметрлеринің кескин өзгериуи теңиздің экосистемасында изине қайтпайтуғын өзгерислерди пайда етти. Нәтийжеде теңиз балықшылық хәм транспортлық әхмийетинен айрылды. Бурынлары кәрханаларды хәм турак жайларды жылтыу ушын көмирди темир жол арқалы Арал теңизи станциясына шекем, соңынан баржылар жәрдемінде жағалықтағы поселкаларға шекем жеткеретуғын еди. Енди теңиз 100-150 шақырым узақлыққа қашықлап кетти, темир жол болса, сахрада қалып қойды. Солай етип көмир қум арқалы трактор тележкалары менен тасылатуғын болды.



Екинши топарға теңиз сууының қурғап кетиуине байланысly Арал бойы тәбийий орталығының өзгериулері киреди. Климаттың хәм

микроклиматтың сахраласыуы (аридизация), жер асты суулары кәддинің төменлеп кетиуі хәм олардың минералласыу дәрежесинің көтерілиуі, топырақтың үстінги қатламының жағдайының төменлеуі, теңиздің құрғаған ултанынан дузлардың самал менен көтерілиу процессинің күшейиуі, дельталардың хәм жақын жайласқан аймақтардың тәбийий комплекслеринің бузылыуы хәм басқалар. Бул жағдай хәзирги уақытта оғада үлкен Арал бойлары аймағында антропогенли сахраға айланыу процесслеринің пәти күшейип атырғанлығын айқын көрсетеди. Пайда болған жағдайларға байланыслы сахра жайлауларының өнімдарлығы азаяды, мал шаруашылығын рауажландыру бойынша оғада ауыр жағдай жүзеге келип атыр. Ишимлик суудың сапасы төменлеп кетти. Кемериушилердің хәм зыянлы шыбын-ширкейлердің көбейип кетиуі бунысыз да ауыр эпидемиологиялық жағдайды жүдә кәуипли етип атыр. Дәрья суулары ағысының тоқтауы нәтийжесинде дельта тегисликлеріндеги кең көлемли пишенликлер қуурап қалды, ондатра аулау кескин кемейди.

Әмиудәрья дельтасының гидрологиялық режими кескин өзгереді. Хәзир 1961-жылға шекем хәрекет еткен тәбийий тармақтар кеуип қалды, тек Раушан хәм Қазақдәрья тармақтары бар, ал буларда ағысты ретлестиретуғын жасалма каналларға айланып кетти. Солай етип, Әмиудәрья дельтасының гидрографиялық тармағы Арал теңизинің шәртли тәбийий режими уақытынан берли әдеуір өзгерди: егер бурынлары көп санлы салалар хәм тармақтар болса, хәзир ағыс тек бир бас аңғарға топланды. Ол Әмиудәрья дельтасының арқа бөлегіндеги пүткил аймақ ушын транзитке айланды.

Әмиудәрьяның хәзирги заман дельтасының гидрографиясы бул дәрьяның өзинің, каналлардың, коллекторлардың ишки дельталық ирригациялық көлдердің, қолтықтардың хәм уақытша сууға бастырылған зоналардың мұдамы өзгерип туратуғын өз-ара байланыслы системасы, Әмиудәрья дельтасының пүткил гидрографиялық тарауы каналлар арқалы сууландырылады. Олардың ең үлкенлери Сууенли, Қызкеткен,

Қуәанышжарма, Бағяб. Әмирабад каналлары. Ал киши каналлардың бир бөлегин насос станциялары суўландырады. Суўғарыў ушын пайдаланылған суўлар коллектор-дренаж тармағы арқалы суўғарыў системаларының ағызып жиберген суўлары менен бирге Әмиўдәрья дельтасына жетеди. Үлкен теңиздиң кеўип атырған ултанында суўдың қәдди төменлеген сайын дәрьяның жана аңғары пайда болып, коллекторлар реконструкцияланып атыр.

Әмиўдәрья дельтасының гидрографиялық тармағы болған междуреченск ойпатлығы әдеўир дәрежеде өзгерди. Бул аймақта төрт қашы системасы жәрдемінде суў сақлағыш пайда болды, оның қурамына Шеге көли де киреди. Бул жерден суў Мойнақ қаласына барып жетеди. Мойнақ көли хәм Рыбачье көли де оның қурамына киреди.

Ағыстың аяқ бети Междуреченск системасы бойынша қайта бөлистириледи. Бирақ суў тасыў пайытларында дәрья суўы қашы менен байлаған Әмиўдәрья аңғарына дельталық көллер системасы арқалы Арал теңизине қарай жығып кетиўи мүмкин. Усыған байлданыслы коллектор-дренаж хәм ағызып жиберилген суўлар жоқарыда атлары көрсетилген көллерди суўландырыўдың тийкарғы дерегине айланды. Сондай-ақ теңиздиң бурынғы ултанында, яғный қубла Арал бойларында көллер системалары пайда болды. Олар ККС, КС-1, КС-2, Кс-3 хәм КС-4 магистрал коллекторлары болып есапланады хәм коллектор-дренаж суў ағысын топлайды. Бирақ Әмиўдәрья авандельтасының кең көллер массиви (майданы) хәзирги уақытта дәрья хәм коллектор-дренаж суўларының тиккелей Аралға түсиўин қыйынластырмақта.

Арал теңизиниң гидрофизикалық режимлериниң өзгериўи тәбийий орталықтың шынтлап бузылыўын хәм оның дөгерегинде саҳраласыў процесслерин күшейтип биокomпонентлердин географиялық тарқалыў ареалларын қысқартып жиберди.

Суўланыўдың кескин кемейип кетиўи дельталарда суў басыў режиминиң тоқтаўына, дельталық көллердиң көпшилигиниң барлық

колтықлардың кеуіп қалыуына, жер асты сууларының қаддиниң төменлеп кетиуіне, олардың минералласуының көтеріліп кетиуіне алып келді.

Бирақ булардың барлығы микроклиматтың өзгериуіне, температураның көтеріліуіне хәм хауа ығалылығының төменлеуіне, аридли литогенездің қәлиплесиуіне, дефляцияның рауажланыуына, хемогенли шөгіндилердің топланыуына х.т.б. байланыслы болады. Арал бойларының дәрьялар дельталарының сахраға айланыуына тийкарынан тәбийий процесслер себеп болса да, олар антропоген факторлардан пайда болғанлықтан күшейіп атырған сахраласыуды антропогенли деп тийкарлауға мүмкиншилик береді.


Жер асты сууларының күшли минералласып атырғанлығына да дыққат аудару керек. Мысалы;Әмиўдәрья дельтасында бурынлары хәлсиз хәм орташа минералласқан жер асты суулары басым келетуғын еди. Хәзир болса, күшли минералласқан хәм дузлы суўлар көбейіп кетти, олар тийкарынан жер асты сууларының пуўларына жумсалыуына байланыслы болды. Өйткени жер асты сууларының дәрежеси 7-8 м төменлеп кетиуі менен суў пуўларының азайып барыуы итимал. Себеби олар өсимликлердің тамырды азықландыру қатламында конденсацияланады хәм олардың суў менен тәмийнлеуін жақсылайды. Бул жағдай жазғы дәуирде сахрадағы вегетацияланатуғын дерлик барлық өсимликлердің суў режимине тәсир етеді.

Арал бойларында сууды көбирек пайдаланыу дәуириниң 1974-1977 жыллардағы қурғақшылық хәм дәрьяларда суудың аз болған дәуири менен алмасыуға антропогенли сахраласыу процессниң апатшылыққа қарай рауажланыуына түртки болды. Тәбийий процесслердің рауажланыуының қолайсыз тереңлене түсетуғын унамсыз антропогенли басымының энергиялық нәтийжеси Чардара (Сырдәрьяда) хәм Тақыятас (Әмиўдәрьяда) суў сақлағышларының түменги тәреплеринде айқын көринеди. Өйткени бул аймақта дәрья сууларының ағысы кескин қысқарып, суўалмаларда хәм дельталардағы көллердің салалары кеуіп қалып, оларда 2,4 млн. га майдан сахраға айланып, суў тасыу режимі пүткиллей тоқтап қалды. 1980-жылдың

ақырына келип, Әмиўдәрәя дельтасында кеўип қалған суў сақлдағышлардың улыўма майданы 310 км² ға жетти. Оларда гидроморфлы, батпақлы хәм қамыслы жерлер кебир, автоморфлы, тақыр тәризли жерлерге айланды.

Бул өсимлик қатламының сукцессияларына хәм фитоөнимлердің саны менен сапасының жоқ болыўына алып келди. Себеби, Сырдәрәя хәм Әмиўдәрәя суўларында хәм дельталарында фитомассаның улыўма төменлеўи 1970-жыллары 192 мың (хаўа-қурғақ масса) тоннаны қурады. Әжайып ботаникалық комплекстеги пишенли шерикликлер хәм тоғай тереклери тез бузылып кетти. Өсимликлердің, хайўанлардың бақалы хәм сийрек ушрасатуғын популяциялары кәўип астына түсип қалды.

Дельталардың дәрәя суўларының сақраласыўы хәм зоокомплекслер қурамындағы түрлердің қайта топарласыўында көллер кеўип сақраға айланып атырған дельталар суўда жүзиўши хәм суў-батпақ қусларының жаңа районларға көшип қоныўына алып келди. Арал регионының дельта тегисликлериндеги көллердің майданы 1960-жылы 400 мың гаға шамалас, соның ишинде Сырдәрәя дельтасында 100 мың га ға хәм Әмиўдәрәя дельтасында 300 мың га болған болса, 1970-жылға келип олардың улыўма майданы 120 мың га ға қысқарды. Әмиўдәрәя дельтасында 1962-жылдан 1988-жылға шекем суў-батпақ комплекси ушын тиршилиқ етиў орны болған қамыслықтың улыўма майданы 3 есеге кемейди. Жасаў орынларының сапасы да өзгерди. Қамыслықлар кескин бузылып кетти. Көплеген орынларда олардың бәлентлиги бурынлары 4-5 м ге жеткен болса, енди тек 1,5-3 м болып қалды. Қамыс өсимликлериниң өнимдарлығы орташа 37 есе, айырым, орынларда жүзлеген есе кемейип кетти.



Қуслар хәм сүт емизйўшилер ушын олардың тиришилик имканиятының жоқ болыўы жасаў орынлары сапасының өзгериўине алып келди. Аралдың тарийхый қәлиплескен балықларының набыт болыўы, дельта суў сақлағышларында от-шөптің азайып кетиўи хәм суў-батпақ комплексіндеги зәхәрли шыбын-ширкей түрлериниң көбейўи суў сақлағышларда хәм олардың жағаларында тиришилик етиўи ушын балықлар менен қусларға хәр қыйлы қыйыншылықлар туўдырды. Бул суўда жүзиўши хәм суў-батпақ қусларының ири топарларының Арал регионы шеклерин таслап кетиўге хәм оның шегараларының тысқарысына көшиўге алып келди. 1978-жылға келип, сахраға айланып атырған Сырдәрья дельтасынан тоғай көллерине қуслар комплекси (арқа тәрепке қарай 350-400 шақырым қашықлыққа) көшип кетти. Олардың арасында қуслардың көплеген түрлери бар. Әсиресе қызыл түстеги бирқазанлар өз уяларын арқа шегараға шығарыўға мәжбүр болды. Көшип кеткен қуслардың улыўма саны бирнеше жүз мыңға жетти.

Үрпек баслы хәм қызыл түсли бирқазанлардың хәм үлкен қарабайлардың ири топарлары Әмиўдәрьяның кубла жағалығынан хәм Әмиўдәрья дельтасынан Сарыкамыс көлине көшип барды. Солай етип, бул көлде усы қуслардың уялы колониялары пайда болды. Усыған байланыслы дельта тегисликлеринде биотобының өзгериўин хәм оның тийкарғы өзгешеликлерин анализлеп шығыў керек.

2.2. Арал экологиялық жағдайларының Қарақалпақстанның өсимлик хәм ҳайуанат дуньясына тәсири

Әмиўдәрья дельтасында дәрья ағысының қысқарыўы суў тасыў режиминиң тоқтаўына, тиршилик орталықлары сыпатында дельтаның хәм суўалманың тәбийий жайлаўларының айтарлықтай өзгериўлерине алып келди. Өсимлик шерикликлериниң тутып турған майданы 36 % тен 8 % ке, ал ўақты-ўақты суўланып туратуғын майдан 40 % тен 20 % ке дейин қысқарды.

Усының менен бирге суўалмалардың хәм дельталардың шорланған хәм Сахраға айланған майданлары 25 % тен 75 % ке шекем өсип кетти. Қалың қамыс өсимликлери Әмиўдәрья дельтасында 300 мың га дан аслам майданды ийелейтуғын еди. Олар суўда жүзиўши қуслардың 21 түрин, соның ишинде уя салатуғын 11 түрин, Хиўа қырғаўылын, узын аяқлылардың 9 түрин, жыртқыш қуслардың 1 түрин хәм шымшықлардың оннан аслам түрин өз ишине алатуғын жасайтуғын орны болды.

Бул қамыслықта қабанның популяциясы жоқарғы көрсеткишлерге жетти, қамыс пышығы хәм 1950-жылларға келип, қамыс өсимликлериниң майданы шама менен бес есе қысқарды. 1960-жыллары қамыстың жасыл массасының зүрәттилиги га басына 300-400 центнер болған болса, олар 1980-жылларға келип га ға 40-120 центнерге шекем азайып кетти. Қамыслықта жасаўшы хайўанлардың популяциясы да әдеўир азайды. 1980-жыллары қабанлардың саны дерлик алты есеге азайып кетти.

1970-жылларға шекем дельтаның теңиз бойы бөлегинде Шегекөл, Машанкөл, Қаракөл, Сапакөл көллеринде ондатраның үлкен популяциясы жасады. 1970-жылларда бул аймақта хәр жылы 50 мыңға шекем аң аўланған болса, 1980-жыллар басына келип ол көллердиң пүткил системасы кеўип қалды, аң аўлаў хәм өндирис тоқтады. Тек 9-түри хәм Судочье көллеринде саннатлық әхмийетке ийе емес муғдардағы ондатра 1990-жылларға шекем аўланып келди.

Әмиўдәрья дельтасының аридлесиў хәм сахраласыў процессинде пишенликлердиң хәм жайлаўлардың майданы әдеўир қысқарды, олардың зүрәттилиги төменлеп кетти. Мысалы: 1960-жылы 420 мың га пишенликтен 1980-жылдың ақырына тек 70-75 мың га сақланды. Майданының усындай алты есе қысқарыўына байланысly ўақты-ўақты суўландырып туратуғын участуаларда пишенликтиң зүрәттилиги 15-40 ц/га дан (қурғақ өсимлик массасы) 3-16 ц/га ға шекем, ал суўландырылмайтуғын сахраға айланып атырған аймақларда 17-22 есе, ямаса 0,7-0,8 ц/га ға дейин кемейип кетти.

Әмиўдәрьяның суўалмасында хәм дельтасында жайлаў майданы 348 мың га дан 125 мың га ға дейин, яғный 3 есе қысқарды. Бул аймақта жайлаў шерикликлериниң өнимдарлығы еки есе яғный 1-4 ц\га 0,5-5 ц\га шекем төменледи. Әмиўдәрья дельтасында жер бети экосистемаларының суў менен тәмийнлениўниң Л.Г.Раменский шкаласы бойынша 3-4 басқыш төменлеўи ығаллы орталдыктан курғақ дала хәм саҳралыққа шекем төменлеўге Әмиўдәрьяның дельтасындағы биологиялық өнимдарлықтың кескин азайып кетиўине себепши болды.

Әмиўдәрьяның дельта тегислигиниң аридлесиўиниң хәм саҳраласыўының сақланып турған, хәттеки күшейип атырған процесслерине байланыслы пишенликлердиң, жайлаў шерикликлериниң өнимдарлығының төменлеп кетиўи, Арал регионының тәбийий орталығының хәзирги раўажланыў жағдайларына тән турақлы тенденция деп мойынлаў керек.

Қарақалпақстан Республикасының мәмлекетлик тоғай қоры 4 млн. 437 мың га майданды курайды. Соның 650 мың га гектары тоғайлар, сексеўил, баялыш, қоянсүйек, жүзгин усаған ағаш, пута хәм ярым пута өсимликлери менен қапланған тоғайлықдардан ибарат, ал 6 мың га жерде көллер менен сайлар бойларын қаплаған боян хәм пишенликлерден ибарат болған тәбийий жайлаўларға ийе.

Мине усылардың барлығы республиканың 16,5 млн га жер майданының жәми 23,3 % ин курайды. Егер Қарақалпақстанның 13,67 млн га жерин шөлистанлықлар қаплаған десек, бул тоғайлықлар тандыр ишиндеги питпеген шала менен тең деўге болады. Себеби, сондай үлкен саҳраға белгили дәрежеде микроклимат таратып турған Арал теңизинде 3,8 млн га жери суўдан курып ысылдаған қумлы шөлистанға айланбақта. Бул қумлар өз гезегинде самалдың тәсиринде жылына 1,0 м жылжып, қала берсе теңиз астынан көтерилген дузлы шаң тозаң егислик жерлеримизди истен шығарып атырғанлығы өз алдына бир баслы машқала.

Илимпазлардың дәлиллеўлери бойынша бир га қумлы жерге егилген сексеўил өсимлиги жылда тамыр жайыўы арқалы сол жердиң 60-70 %

майданының қумын иркіп тұрыуы менен бирге 158 кг углекислотаны жутып есесине жылына 135 кг кислород бөліп шығарады екен. Ал дәр्या бойындағы тораңғыллы тоғайларымыздың 1 га майданында шаңлардың жутылуы жаз айларында 50-60 кг шаңды хәм 45 кг углекислотаны жуту қабилетине ийе екен.

Соған қарамастан тоғайлы жерлерди өзлестиру, шауып алу хәм өртеу 1970-жыллардан баслап, дәстүрге айланған болса, хәзирги күнде тек қурылыс материаллары үшін шауып алушылық хәуиж алмақта. Егер 1978-жылы тоғайзарлықлардың майданы 79 мың га болған болса, ол 1986-жылға келип жәми 33 мың га тоғай қалған еди. Солай етип хәр жылдың ишиндеги дельтадағы тоғайлар ени еки есе қысқарды, нәтийжеде бул кубылыс жылына 5778 гектарға жетти.

Азияның тоғай экосистемалары арасында флора қурамы бойынша Әмиўдәрйяның тоғайлы тереклери анағурлым бай. Себеби олардың арасында жоқары өсимликлердин 576 түри бар, соның ишинде Орта. Азияның эндемик түри табылады хәм 3-дәуирдин репликт өсимликлери де көплек ушрасады.

Хәзирга ўақытта тиришилик етиў орталығының күшли өзгериске ушырауына байланысly Әмиўдәрйя дельтасындағы тоғай өсимликлеринин 54 түри жоқ болып кетиў алдында тур. Олар 26 тухымластың 46 туўысына киреди. 1980-жыллардың ақырына келип, Әмиўдәрйя дельтасында сары кувышка, ақ кувышка, альдровинда өрмелеуши пырей хәм попоротниклер ушраспайтуғын болды.

Хайуанат дүньясынын аўхалы ашынарлы дәрежеде. Әмиўдәрйяның суўының Түйемойын плотинасынан арқайын төмен қарай түспеўинин ақыбетинде, бекире, суўен, қаязбалық, қылышбалық хәм сумырайдың еки түри дәрйямызда ушраспайтуғын болып қалды. Ал Аралдың суўының дузлылығы 52-60 мг/л көтерилюине байланысly теңиз маржанлары болып аталған тоқы балық, торта. көкжан (көк мойын торты), шамай (жумыр балық), ала буға, ерш, шорш (ийт балық) х.т.б. пүткиллей жоқ болып кетти. Жер баўырлаушылардан сарыуўек жылан жоқ болып кеткен болса, Хентаў,

жумалақбас, кесиртке Султан Уәйис тауының Хожакөл этираптары менен Бельтауда аздап ушрасады. Сүт емизюшилерден жарқанаттың бир түри, Гиптнер тышқаны, сасық гүзен, палхор порсық, қарақулақ, мәлим пышық, барыс, қарақуйрық кийик, Үстирт хәм Қызылқум архарлары, Бухара сууыны хангул аймағымызда жабайы халында ушраспайды десекте болады. Бухара сууынының Бадай тоғай қорықханасында жүзден аслам басы бар деген есаптары бүгинги күнде хеш бир нырққа сыймайды. Оларды тез күнде есаплауларды талап етеди. Себеби, бул қорықхананың қорасындағы қамақта турған 10 лаған бастан артық сууынды жайғастырғандай қорықхананың мүмкиншилиги жоқтың қасында.

Қарақалпақстан орнитофаунасы жәми 307 түр кустан ибарат болып соның 179 түри шымшық тәризлилер емес, ал 128 түри шымшық тәризлилер топарына киреди. Бул Орта Азияда ең бай регионаллық фаунаны курайды. Деген менен соңғы жыллардағы Әмиу сууының тартылыуы менен Аралдың курып кетиуи бул куслардың Қарақалпақстан аймағында 30,3 % ке шамасының аз ушрасатуғын тайпаны курайды. Соның ишинде 6,2 % ти, жүдә кем ушрасатуғын түрлери болып табылады.

Қарақалпақстанда экологиялық дағдарыстың күшли рауажланыуының ақыбетин хәм бағытын есапқа алған халда регионда өсимлик хәм хайуанат дүньясының көп түрлилигин сақлап қалыу, олардың айырым түрлериниң жоқ болып кетиуиниң алдын алыу мақсетинде хәзирги күнде сақлап қалыуға мүмкин болған илажларды көриу зәрүр болады. Буның ушын арнаулы мәмлекетлик қарарлары тийкарында қорықханалар (заповедник хәм заказниклер) шөлкемлестириу керек. Булар биринши гезекте мыналардан ибарат: Әмиүдәрьяның куяр аяғындағы Бердеке, Таллық, Ордабай, Инженерөзек хәм Ахантайдағы тәбийий тоғайларды қоса есаплағанда кубласы Мақпалкөл менен Шуаққа шекем, шығысы Домалақ көл менен Майлы өзек, Аққалаға шекемги аралықтағы 1,5-2,0 млн га дағы созылып атырған тораңғыллы-жийдели, жыңғылы менен шеңгели аралас қалың соралы қамыслықларды нәзерде тутамыз.

Хайуанат дүньясында бир әжайып жаратылыс болғанындай олар мудары тоғайда, көлде хәм ашық далаңлықларда жасай бермейди. Олардың айырымлары тек ғана таў қырларында, тик жарлықларды жасағанды мақул көретуғынлары да аз емес. Олар таў текелери архарлар, жарғанатлар, жыртқыш қулар-бүркітлер, тазқаралар, қумайлар, мыйқылар. хәттеки кептерлер, көкғарғалар, кекликлер хәм шымшықлар. Бундай таўлы жыралы комплекстиң хайуанат дүньясын сақлап қалыў оларды қорғаў мақсетинде Султан Уәйис таўынан, Үстиртиң Хасарма. Ақтумсық хәм Жийдели булак деген жерлерин де қорықханаға айландырған жөн болар еди.

Шығыс Арал теңизи ултанының қурғаған полосасында өсимликлердің 147 түри ушрасады. Соның ишинде олардың 12 түри (4,2%) теңиз жағасында жоқ. Бул теңиз ултанындағы өсимликлердің жағалыққа таралған түрлери есабынан пайда болып атырғанлығын көрсетеди. Олардың арасында анағұрым кең тарқалғанлары: жүзгинлер 15 түр, сведлер-13, лебедлер-12, гребеншиклер-9, астрогаллар-9, жуўсанлар-8, солянкалар-6, климакоптерлер-6. Өсимликлердің бул түрлериниң үлкен бөлегин галоксерофитлер хәм галомезофитлер қурайды.

Сонлықтан Аралдың қурғаған ултанындағы өсимлик шерикликлери сингенездің процесслер туўралы арнаўлы илимий мийнетлер жазылған. Бирақ дельтаның теңиз бөлеклери кеўип баратырған теңиз ултаны менен байланысыўшы бөлеклери шорлы-сахра бослығын дүзиў бағдарына эволюциялық тарады, ол шаңлы-дузлы дүбелейлер орайына айланбақта. Арал теңизиниң поставкаль қурғақлығын шорландырыў процессине сүт емизиўишилердің 25 түри, қулардың-15 түри, өсимликлердің-10 түрге жақыны омыртқасызлардың азғана муғдары қатнасады.

2.3. Арал экологиялық жағдайларының Қарақалпақстанның Арқа районларының тәбiiйii ландшафтларының өзгерiуiне тәсiri.

Арал экологиялық дағдарысына байланысты соның менен бирге оған тийiп турған Үстiрт районының ландшафт қурамында айтарлықтай өзгерiслер жүз бермекте.

Район территориясындағы тәбiiйгii географиялық таксономикалық бирлик бойынша Қарақалпақстан Республикасы территориясының арқа территориясын ийелеп жатырған Үстiрт платосы Қызылқум тәбiiйгii үлкесине салыстырғанда бәлентлиги жағынан бiiйик хәм оның ландшафтларының өзгешелигине қарап өзине тән қәсiiетлерге ийе. Үстiрт тәбiiйгii үлкесин екиге яғный Арқа Үстiрт хәм Кубла Үстiрт тәбiiйгii географиялық үлкеси деп үйренсек мақсетке муўапық келеди. Бул бир пүтин Үстiрт тәбiiйгii географиялық үлкени бәлиўмиздиң анализлеўмиздиң себеби, Арал экосистемасының тәсиринде Арқа Үстiрт теңизге шегаралас болғанлықтан оның ландшафтларының күшли өзгерiуiне себепши болған.



1. Арқа Үстiрт-бул территория теңиздин батыс жағалаўының шегарасын кублаға қарай төменги Әмиўдәрья делтасы арқалы өтип, Барсакелмес шорын өз ишине алып, Батысқа қарай Қарабаўыр қырының арқаға қарап Қарақалпакия оннан кейин арқа шығысқа шегара бойлап, Арал теңизинин

бурынғы жағасы менен тийискен жерде ушласады. Арқа Үстирт территориясы ландшафтының басқа кубла Үстирт хәм төменги Әмиўдәрәя ландшафтларына салыстырғанда аўыл хожалығына жарамсыз болғанлықтан тәбийғый ландшафт түрлери сақланып қалған бирден бир территория есапланады.

Арқа Үстирт жерлериниң бүгинги күнге келип 68% орташа өзгерген 21% пүтин өзгерген 11% жерлери тәбийғый дерлик өзгермеген. Арқа Үстирттиң арқа хәм арқа батыс территорияларының аз өзгерген кең пайтахт жерлеринде пәс бәлент қыялы толқын тәризли самал эрозиясына ушыраған жерлерде сур қоңыр топырақларда биюргин, қара сексеўиллер алмаслап ушырасады.



Қыялы орташа дәрежеде эрозияға ушыраған боз қоңыр топырақларында биюргинзарлар кейреўикзарлар менен дөңли қумлы шор топырақларында албаслы-терескензарлар ушырасады.

Дөңли пәс қыялы тегислерде хәм эрозияға ушыраған жанбаўырлардың боз қоңыр топырақларында биюргин, тақыр хәм путалы өсимликлерден (жузгун-қара сексеўил) тарқалған.

Карстлы, карстлы эрозиялы ойпатлықлар шөгиў процесси нәтийжесинде пайда болады. Бул жерлерде биюргинзарлы тақырлар хәм путалы өсимликлер алмасланып келеди.

Арқа Үстирттиң күшли өзгерген Арал теңизи жағалары теңиз жағасы менен меридианал бағдарды созылып жатыр, бул участкаларда жайласқан топырақ қатламларының күшли эрозия процесси нәтийжесинде өнимдарлы

катламы өзгериپ өсимлик қатламының күшли деградацияланыўы болып табылады. Бул учаскада топырақлардың дефляцияға берилюў жағдайы орташа болып өсимлик қатламлары күшли деградацияға ушыраған бул жерде бурын жасаў орталығы болған Каспий арты Гепарды Өзбекистан Республикасы Қызыл китабына киргизилген.

Арқа Үстирт орташа өзгерген кең пайтахт тегисликлеринде өсимлик қапталлары орташа деградацияға ушыраған, әсиресе теңиз акваториясына жақынласқан сайын топырақтың минерализация дәрежеси көбейип өсимликлер қапламының сийреклесип баратырғанын айтып өтиўмиз орынлы. Бул участкаларды бурын жасаў орталығы болған Жейран, Алакозен, Куршанапак, қуслардан тухта тувалак, бургит х.т.б. Өзбекистан Қызыл китабына киргизилип жоқ болып кетиў қәўипи бар өсимлик хәм хайўанлар есапланды.

Арқа Үстирт терртиориясында тәбийғый онша өзгермеген ландшафтлы территорияларда бар оларға Барса келмес шорының арқа шегарасынан Ақ ийин батпақлы шорларға киреди. Бул жерде ойпатлық хәм пәс жағалаўлы ландшафтларда ири дөңли шорлақ хәм шорлақлар жағалары сарысазан, қара сексеўил, жүзигин өсимликлери өседи.

Ойпатлықлардың пәс толқынлы ямаса зәңги сыяқлы шетки дөңликлерде голофит түрине киретуғын өсимликлер хәм қара сексеўиллер шор боз қоңыр топырақларда биюргинзарлар алмасып өседи.

Пәс бойлы хәм қыялы майда дөңли ойпатлықларда голодитлер топарлары сай өсимликлер хәм шорлақлы жерлерде өсимликлер сийрек ушырасады. Дөңли қумларда жүзигин топарына киретуғын өсимликлер, тақыр хәм шор басқан топырақларда шорға шыдамлы тәбийғый комплекслер жүзеге келген. Бул территорияларда топырақлар орташа дефляцияға ушырағанлығы себепли, өсимлик қатламлары бираз өзгериске ушыраған. Кубла Үстирттиң Қарабаўыр қырларында Қызыл китапқа түскен жайран, Каспий арты Гепардын айтыўмызға болады.

Әмиўдәрәя дельтасы менен шегаралас территорияларда Үстирт қойлары жоқ болып кеткен . Қуслардан тоқтатувалок қусы, Үстирт бүркітлери дерлик жоқ болып Өзбекистан Республикасы Қызыл кітабына түскен.

3. Қоңырат районы төменгі Әмиўдәрәя дельталық бөлімі. Бул жерде районның барлық халқы жасайды. Қоңырат районының 7,9 млн га жерден төменгі Әмиўдәрәя дельтасында 38 млн га жерлер аўыл хожалығына пайдаланылып дерлик тәбійғый ландшафтлары инсан факторларына байланысly қайта өзгертілген мәдениі ландшафтларға кіреді.

Районның төменгі Әмиўдәрәя бөліміне Қоңырат районы орайы хәм оған кіретуғын хожалықлардың жерлери кіреді. Арқа тәрәпі Әмиўдәрәя дәрәясынан баслап районның шегарасы арқалы батысқа қарай Машанкөл теңізінің арқа тәрәпі менен Шоманай районның шегараларына келип оннан шығысқа Әмиўдәрәя дәрәясының шеп тәрәпіндегі Қоңырат хәм Қанлыкөл шегарасының тийіскен жеріне келип ушласады. Суўғармалы дийханшылық ушын пайдаланып киятырған топырақлар орташа айрып жерлери күшли шорланған.

Тәбійғый ландшафтлары дерлик қайта өзгерілген топырақлардың дефляцияға ушыраўы орташа арқаға барған сайын күшейіп барады.


Пәс дельталы тегіслик территориялар болып эрозияға ушыраған егіслик емес жерлерде сур қоңыр топырақларда дузға шыдамлы қарабарак жыңғыл х.т.б. өсимликлер ушырасады.

Егіслик жерлердің батыс территорияларында қыя тегісликлерде эрозияға ушыраған Үстирт жанбаўырларында боз қоңыр топырақларда боялыш жүзигін путалы өсимликлерден қара сексеўіл қарабарак өсимликлери ушырасады.

Арал тенізі суўының қайтыўына байланысly бурын теңіз суўы басып жатырған 100 км артық арқаға қарап Теңіз жағалаў район территориялары созылды. Бул районның кубла тәрәпі Белтаў районы менен шегараласса, арқа шегарасы хәзіргі теніз суўлары жағаларына шекем созылып жатады. Теніз жағалаўы районы оғада көп санлы дөңлі, хәр қыйлы бийікликтегі дизбеклі

қумлардан турады. Бул районның тийкарғы жер бетинің дузилиси белгиси, ески дәр्या оның тармақларындағы көллердің излери болып, тоғайлы өсимликлер бирлеспелер қалдықлары ушырасады. Теңиз жағасына жақын территорияларда тийкарынан шорлы топырақлар ушырасады. Ол жерлерде тийкарынан қарабарак, жыңғыл, кара сексеуил, поташник хәм соралардың турлери өседі. Төбекшили дөңли қумлардың, етеклерінде, тегислик қумлы жерлерде жуўсан өсимлик бирлеспелери ушырасады. Қурып қалған дәр्याлардың куяр жерлерінде де шөллистанның суўлы территорияларында тоғай қалдығы, пута хәм ярым пута, сондай-ақ көп жыллық өсимликлердің бирлеспелери өседі. Ең тийкарғы өсимликлер бирилеспелеринің турлери путалар: сексеуил, жузгинлер, қоянсуйеклер, черкез, боялыш, ал тегислик территорияларда көп жыллық хәм бир жыллық өсимликлер бирлеспелери көбирек тарқалған. Бирақ көплеген майда көлемли ойпатлық жерлерде бийдайық, селеу қумпәшеги хәм басқада өсимликлер өседі.

Теңиз жағалау районы басқа территориялардан ықлымының салқынлығы, ығаллықтың, көбирек болыуына байланысly бул аймақта гүздің ақырына шекем өсимликлер бирлеспелеринің, нормал өсип раўажланыуы ушын қолайлы жағдай болып саналады.



Қарабайлы атаулары районының көпшилик бөлими төбешикли дизбекли қумлардан ямаса айырым ири атаулардан, 20 метрге шекем бийикликке

ийе төбешикли дизбекли кумлардан ибарат. Гейпара атаўлардың жағалары жыңғыл ассоциацияларынан турады.

Бул жайлаў районы тийкарғы өсимликлер бирлеспеси пута хәм ярым пута сондай-ақ көп жыллық өсимликлерден турады. Ал өсимликлер түрлеринен алды менен пута өсимликлери көзге түсип, ақшыл-көк дөнип турады. Бул жерде сийрек өсиўши пута өсимликлерин ағаш деп атаўға болады, себеби олардың бийиклиги 6 м ге шекем жетеди. Атаўларда өсиуши өсимликлер ушын экологиялык шараятлар колайсыз келеди. Барлық атаўларда жүзгин, сексеўил, коянсүйек, серкез, боялыш, жыңғыл өсимликлериниң ассоциациялары ушырап хәм усы өсимликлер үстемлик етеди.

Қарабайлы атаўларында пута өсимликлериниң ағаш тәризлилери тез-тез ушырасып турады. Арал теңизиниң Арқа бөлиминде жайласқан атаўларда сексеўилли, жузгинли, хәм коянсүйекли „тоғайлар" көплеп ушырайды. Ал бирақ атаўлардың жағаларында галофитли өсимликлер топары комплексли хәм өсимликлериниң раўажланыўы менен басқа районлардан айырылып турады. Атаўларда көбинесе ақ сексеўил, жүзгин, жыңғыллар өсип, олардың бири менен екиншисиниң аралығы 5-10 м болып, бийиклиги 3-6 м ге шекем жетип, гейбир жерлерде тутасып тоғайлык болып турады. Сондай-ак. айырым тығызланған тусерлик хәм тегис кумлы жерлерин ярым пута өсимликлер әсиресе жуўсан, кейреўик ушырасып, жүзгин хәм ақ сексеўил араласып жайлаўларды курайды. Булардан басқа кейреўик, селеў, кум пәшеги, эфемер хәм эфемероид өсимликлери ушырасады (Советкина, 1938, Гранитов, 1965, Нечаева, 1976, Мухамедов, 1979, Туремуратов, 1978).

Белтаў бәлентлиги районы арқа-батыс Кызылқумның кубласында жайласып, жер бети кубладан арқаға карай созылып, арасында тегислик жерлери, шоқалақ кумлары болып белгили майданды ийелейди. Белтаў теңиз бетинен 80-143 м бәлентликте болып, оның арқа хәм шығыс түсерликлери жатық жайпаўыт хәм қыя болып, кум үйиндиклериниң

төбешикли кумларының бийиклиги 30 м, олардан арқаға қарап Арал теңизине дейін созылған болып айырым жерлерінде майда дизбекли кумлар хәм ири көшпели төбешикли кумларды ушыратамыз. Булардан басқа Белтаў бәлентлиги үстінде тақырлықлар ушырасады. Белтаў бәлентлиги топырақларының басым көпшилиги аз шириндили, қоңыр-сур, шөлистанның кумлы топырақларынан турады. Бул район топырақларының қоңыр-сур, шөлистанның кумлы топырақлы жерлерінде гипсофил пута, ярым пута, көп жыллық шөптер өседі. Олардан сингрен, жуўсан, кейреўик, бюргун, эфемер хәм эфемероидлар ушырасады. Ал төбешикли дизбекли кумларда жүзгин, черкез, боялыш, қоянсүйек, ақ сексеўил, көп жыллық хәм бир жыллық өсімликтер өседі. Пута хәм ярым пута өсімликтері арасында сасық геўрек өсімлиги бәхәр хәм жаз айларында ушырасады.

Жаңадәрәя районы арқа беги ески теңиз жағалық, ал батысы Белтаў жайлаў районы менен шегераланған, Жаңадәрәя районы аймағы ески дәрәя тармақлары, арна хәм хәр қыйлы сайлардың аңғарлары, суўғарылып егилиўге болатуғын үлкен көлемдеги тегислик жерлерден ибарат. Бул жайлаў районының территориясының Белтаўға жақын бөлиминде үлкен көлемдеги тақырлар арасында кум дизбектері ушырасады. Соның менен бир қатарда бул районының территориясының айырым жерлерінде ойпатлық жерлер ушырасып бул ески көлдердің ултаны болып саналады. Жаңадәрәя районының арқа бети бөлими аймағында да тақырлар болып киши майданлы, ал орта бөлиминде төбешикли кум дизбектері жайласқан болады. Белтаў бәлентлигинің шегарасы бөлиминде пәлле тәризли қатты қабықлы гипс ямаса оның үсти майда таслар менен қапаланған.

Жаңадәрәя аймағында майда төбешикли көшпели кумлар алабы хәм шөлистанның кумлы хәм шеге топырақлы жерлері, жер асты суўларының тереңде жайласуына қарамастан өсімликтер дүньясы жақсы беккемленген болады. Бул районның арқа батыс бөлиминде толқын тәризли хәм дөң төбешикли кумларда тийкарынан ақ сексеўилли, қара сексеўилли, жүзгинли, кейреўикли, хәм көп жыллық өсімликтер

бирлеспелерин курайды. Көпшилик тегислик жерлерде қара сексеуіл менен бирге кейреуик хәм биюргун қосылып жайлау бирлеспелерин дүзеди.

Арал теңизиниң қурып қалған ултанының геосистемаларының қәлиплесиуи 1960-жыллардың басына тийисли. хәзирги уақытта олар Арал депрессиясының шығысында ени бирнеше онлаған шақырымлық жолак түринде табылып атыр. Теңиздиң қурғаған ултанының оғада үлкен хәзирги жийегиниң аралығында созылып атыр. Суў астынан уақтынша ямаса биротала шығып қалған қурғақлық тиршиликтиң өз алдына бир тарауы болып табылады. Онда тығыз топырақ қатламы жоқ. Бирақ оларды хәзир қысқа мүддетли шерикликлер хәм жер бетинде пайда болып атырған экосистемалардың комплекси сыпатында қәлиплесип атырған өсимликлер хәм ҳайуанлар өзлестирип атыр.

Қарақалпақстанда экологиялық дағдарыстың күшли раўажланыуының ақыбетин хәм бағытын есапқа алған ҳалда регионда өсимлик хәм ҳайуанат дүньясының көп түрлилигин сақлап қалыу, олардың айырым түрлериниң жоқ болып кетиуиниң алдын алыу мақсетинде хәзирги күнде сақлап қалыуға мүмкин болған илажларды көриу зәрүр болады.

2.4. Арал экологиялық дағдарысының Қарақалпақстанның социаллық экономикалық шараятларына тәсири

Арал апатшылығы бул барлық Орайлық Азия мәмлекетлериниң туўры хәм жанапай тәсир ететуғын қәўетерли социал-экономикалық ақыбетлерге алып келетуғын экологиялық машқалалардың жарқын дәлили есапланады. Кризис жағдайлары Арал теңизи суўының қурыўы менен байланыслы болып регионда надурис экономикалық сиясаттың жүргизилиўи тийкарында егислик жерлерди раўажландырыўға байланыслы тәбийий ресурслардан ақылға муўапықсыз пайдаланыў нәтийжесинде жүзеге келген.



Арал теңизи бассейни Қазақстанның Кызыл Орда областының кубла тәреплерин, пүткил Қарақалпақстанды Әмиўдәрья хәм Сырдәрьяның орта ағымы территориялары, Қарақум каналы жағалық территорияларын өз ишине алады. Экологиялық апатшылық зонасы деп Арал теңизи түби суўы хәм теңиз акватроиясының қурыўы, Әмиўдәрья Сырдәрья дельтасының интенсив суўғарылыўы нәтийжесинде дәрья суўларының шексиз сарыпланыўы ақыбетинде қурып қалыўы нәтийжесинде бул территорияларда тәбийий орталықтың көринбеген дәрежеде сапалық муғдарының өзгериўине айтылады.

Бул жағдайлардың тастыйықлаўшы Аралды қутқарыўдың Халық-аралық фонды сайтларында хәм Лестер Браун пикиринше Арал кризиси – барлық

Орайлық Азия елдерине байланысly тәсир ететуғын қәуәтерли социал-экономикалық ақыбетлерди жүзеге келтиретуғын экологиялық машқалалардың жарқын мысалы есапланады.

Кризис жағдайлары Арал теңизиниң қурыуы менен байланысly регионда экономиканың аграр бағдарламасының тәсиринде егислик суўғармалы жерлерди раўажландырыў хәм оларды суўғарыўдың көлеминиң артыуын хәдден тысқары көбейтиў тийкарында келип шыққан қурмаласқан экологиялық дағдарыс нәтийжеси болып табылады.

Экологиялық машқалалар булар экономикалық хәм сийасий машқалаларға байланысly келип шығады. Арал бойы регионында жер хәм суў ресурсларының сапасы төменлеп эко-системаның турақлылығы хәм дүзилиси бузылып қоршаған орталықтың зәхәрлениўи артып бармақта. Жыл даўамында 300 күнге шекем қумлы, дузлы шаңлы дүбилейлер хәрәкет етип қурғаған теңиз суў астынан атмосфараға жылына 75 млн тонна қум хәм шаңлар тарқалмақта. Барлық қурғаған теңиз суў астының хәр жылы 39 млн тонна дузлар тарқалмақта. Теңиз ултаны астында Арал қум шөли 2 млн ға шамалас сүримли жерлер хәм отлақлы жерлер, тоғайларды басып кетти. Космослық сүўретлерге қарағанда Арал теңизи территориясы шаң хәм дузлар менен қапланған. Оның радиуси 800-1000 км халық жасайтуғын территорияларға тарқалған.

Арал бойы регионының климатының характерли өзгешелиги оның кескин континенталлығы менен хәм қурғақлығы менен ажыралып турады. Кейинги 35-40 жыллар ишинде Арал теңизи қурғауы нәтийжесинде Арал бойында климатлық шәраятлардың белгили дәрежеде өзгерислери сезилмекте. Бурын Арал теңизи гүз хәм қыс айларында Сибирден келетуғын суўық аязлы самалларды жумсартыўға, жаз айларында күнниң ыссы нурларын пәситетуғын кондиционер ролин атқаратуғын еди. Теңиз қурғауы менен климат шәраятларының қаттыласыуы менен жаз айлары қурғақ хәм қысқа, қыс айлары узақ хәм суўықлығы менен өзгешеленеди.

Регионда вегетациялық күнлердің саны 170 күнге қысқарды. Отлақлы жерлердің өнімдарлығы тең жартыға қысқарды, ал, дәрәя алапларының өсимлик қатламларының өнімдарлығы 10 мәртеге кемейди. Арал теңизинің жағалық территорияларында атмосфера жауын-шашынлары бир неше мәрте қысқарды. Жауын-шашынлардың орташа муғдары мәўсимлер бойынша өзгерип 150-200 мм ден төмен бақланады. Теңиз суўының қайтыўы менен курғақ территориялардың майданы көбейип суўдың парланыўы жылына 1700 мм ге жетти, ал, хаўаңың ығаллығы 10 % ке кемейди. Хаўаның темепературасы қыста төменлеп жазда 2-3 градусқа көтерилди. Жаз мәўсиминде хаўа райының температурасы +49 градус целсияға шекем жетти. Арал бойы климатының характерли белгилериниң бири шаңлы дүбилейли күнлердің санының артыўы хәм жыл даўамында көп қайталаныўы есапланады. Арал теңизи районында күшли самаллар хәр ўақыт гүзетилип батыс теңиз жағалық районларында оның узақлығы 50 суткадан асып кетеди. Самалдың максимал тезлиги 20-25 м/сек ға жетеди.

Арал бойы территорияларының көпшилик бөлими қумлы хәм механикалық дүзилиси жағынан жеңил топырақлардан ибарат болып самаллар нәтийжесинде атмосфераға тез көтериледи. Арал теңизиниң курғаўы регионда Қызылқум хәм Қарақум шөллериниң ортасында Арал қум шөлиниң пайда болыўына алып келди. Арал қум шөлиниң қәўетерли жери ол тийкарынан минерал жатқызықларының қалдықлары хәм теңиз жатқызықларының киши дифференциаланған солончакларынан ибарат.

Арал регионында тәбияттың дигредацияға ушыраў процесслери усы регионның социаллық-экономикалық тараўларында кризислерди қурамаластырыўға себепши болмақта.

Ekanomikaliq mashqalalarga tutasip asirese densawliqti saqlaw ham sotsiyalliq tarawlarga kushli tasir etpekte. Respublikadagi awir ekanomikaliq jagdaylar xojaliq duzilisindegi karxanalardin jabiliwina, qalaliq byudjettin jetispewshiligine ham jergilikli xaliqtin ozleri jumsagan elektr energiyalarina tolem tolewi uziliske tuspekte. Natiyjede xaliqti tok penen tamiynlew turaqli bolmay kop

jagdaylarda toktin oshiwı guzetiledi. Bunday waqitlari turaq jay administrativlik ham ondiris binalari tok penen tamiynleniwı uziliske tusip hatte mektep ham bolnitsalarda tok oshiwı guzetiledi.

Бул кризистен ең биринши жәбир көрип атырған жергиликли халықлар, балалар, хаяллар, кем тәмийинленген аўыл хәм қала халықлары. Бул регионда бурынғы аўқам ўақтында жас балалардың өлими бойынша (хәр 1000 туўылған баладан 75 бала), аналардың өлими бойынша (хәр 10000 туўыўға 120 бала) жоқары көрсеткишлерге ийе еди. Регионда камбағалшылықтың жолдаслары болған аўырыў түрлери - туберкулёз, инфекциялық хәм паразитлык кеселликлерден – паратиф, тиф, гепатит кеселликлери тарқалған.

Бундай кеселликлер әсиресе Қарақалпақстанның аўыл хәм қалаларында анық байқалады. Регионда аўырыўлардың көбейўи қәўетерли тенденцияларға ийе. Экологиялық апатшылық эпицентринде анемия, бөтеке, баўыр кеселликлери көбеймекте. Әсиресе қан кеселликлери рак, астма хәм жүрек қан тамыры кеселликлер түрлери кең тарқалмақта. Медициналық изертлеўлердың жуўмағына қарағанда бул аўырыўлардың түрлери хәм көбейип барыўы экологиялық апатшылыққа байланыслы екенлигин тастыйықлайды.

Регионда ҳаўа температурасының курғақлығы менен жаз айларында курғақшылықтан Қарақалпақстан территориялары жәбир көреди. Ўзбекстан 32 млн халқы менен тәбияттың бундай қыйыншылықларына төзем бермекте. Бирақ, тәбият қоршаған орталық хәм тәбийий ресурслардың арасында тең салмақлылық бузылып бармақта. Жергиликли ҳүкимет басшылары Халық-аралық шөлкемлерге региондағы кем тәмийинленген семьяларға гуманитарлық хәм медициналық жәрдем бериўге шақырды.

Ozbekistan Orayliq Aziya elleri ishinde xalqinin sani boyinsha 1 orinda iyelep ozinin rawajlamgan ekanomikasi ham kop sandagi kushli armiyasi menen regiyondagi mashqalalardi sheshiwge toliq mumkinshiligi bar ekenligi aniqlangan.

Дурысында да Өзбестандағы тәбийй ресурслардың тәбийй газ, нефт, алтын, пахта өнимлериниң жетерли дәрежеде болыуы келешекте өзиниң жағдайларын жақсылаўға мүмкиншиликлер бар екенлигин көрсетеди.

Aral basseyin teretoriyasinda awil xojaligi eginlerinen bolgan baqshilik ham ovosh paliz onimlerinin zuratligi tomenlemekte. Usinin aqibetinde awilliq jerlerde jumissizliq ham sotsiyalliq mashqalalardin quramalasiwi juz bermekte.

Suw resurslarinin kop sarplaniwi topiraqlardin shorlaniwina ham topiraqtin tez-tezden duzinin juwiliwi onin duzilisinde aziqliqlardin kemeyip keiwine sebepshi bolmaqta Ozbekistan boyinsha har bir gektar jerge ortasha jer juzi kolemine qaraganda ximiyaliq toginlerdi qollaniw 7 martege kop ekenligi aniqlandi. Pataslangan suw qatlami puwlanip jer betin aq duzli kebirlikler qaplagan.

Aral tenizi suwinin qurgagan ultaninda tap usinday aq kebirlikler qaplap jatadi ham kushli samallar natiyjesunde uwli shan tozanlar 1000 km araliqlarga tarqalmaqta. Hazirgi waqitta Aral regiyoninda adamlardin jasaw uzaqligi keskin tusip ayirim rayonlar xalqinin massaliq migratsiyalaniwina alip kelmekte.

Aral problemi – regiyonda bir million жети жүз мың халқи жасайтугин Qaraqalpagistannin tiykargi problemi bolip esaplanadi. Respublikanin 200 minnan aslam xalqi tez jardem mutajligine iye. Ondiris tarawlarinda ham awil xojaliginda adamlardin kundelikli turmisinda 60 minnan aslam ximiyaliq zatlar paydalaniladi. Bugar pistitsitler dari-darmaqlar aziq awqat qosimtalari, boyawlar ,antikisliteller ham sintetik materyallardi tayarlaw ushin qollanilatugin materyallar kiredi. Jer juzinin barliq rawajlangan ellerinde jurek qan tamiri kesellikleri, mayip balalardin tuwilinin kobeyiwi, turaqli dawam etetugin awiriwlar sani kobeymekte. Bunday mashqalalar Aral boyi ham ogan jaqin jaylasqan rayonlarda ekalogiyaliq jagdaylardin quramali turleri saqlanbaqta. Hawanin pataslaniwi, topiraqtin shorlaniwi ham ishimlik suwlardin jaramsizligi adamlardin den sawligina keri tasirin korsetedi. Regiyondagi suw qorlarinin ximiyaliq quraminin buziliwi tek gana xaliqtin sanitariyaliq jasaw jagdaylarina gana emes al tikkeley adamlardin den sawligina tasiri kushli. Suwdin kushli mineralizatsiyalaniwi bolajaq analardin

jinisina ham juklilik dawirinde unamsiz tasiri menen ham har qanday ginekologiyaliq awiriwlardin kobeyiwine alip keledi.

ЖУЎМАҚЛАЎ

Түркстан үлкесиниң үлкен суў бассейнериниң бири болған Арал теңизине Әмиўдәрья хәм Сырдәрьядан келип турған суў муғдары 1961 жылдан баслап кемейип барған. Буған тийкарғы себеп Арал теңизи бассейниндеги суўғармалы жерлердиң хәдден тыс көп өзлестирилиўи көлеми үлкен суў сақлағышлардың қурылыўы, көп тармақлы ири суўғарыў каналларының иске түсиўи хәм көп жылларға мөлшерленген ирригациялық хәм мелиорациялық дәстүрлериниң әмелге асырылыўы болып табылады.

1960-жылға шекем Арал теңизине ҳәр жылы 52 км^3 суў келип қуятуғын болған. Оның бәлентлиги 53 м ди қурап теңиз майданы 66 мың км^2 ты , суўының көлеми 1061 км^3 қа тең еди. Соңғы жыллар ишинде теңиз суўының 98 % ти қурғап, теңиздиң батыс бөлимінде $21,8 \text{ км}^3$ суў сақланып қалған. Суў бетиниң көлеми 1960 жылы 1061 км^3 ты қураған болса, 2013-жылға келип 23 км^3 қа қысқарып, суўының дузлылығы литрине 11 грамнан 122 граммға шекемге көбейген.

Теңиз акваториясының майданы 66 мың² тан 1,3 мың км^2 қа кемейди. Нәтийжеде Арал суўының қурғаған ултанында 44 мың км^2 майданда қумлы дузлы шөлистанлықлар пайда болды. Бул майданлардан жылына 100-150 млн тонна дузлы шаң көтериледи. Арал апатшылығына ең тийкарғы ақыбетлери бул жерлердиң глобал масштабда шорланыўы, тәбийий орталықтың патасланыўы, топырақ, суў, ҳаўа, өсимлик хәм ҳайўанатлардың тарқалыўы географиясына кери тәсирин тийгизип атыр. Арал теңизиниң гидрофизикалық режиминиң өзгериўлери тәбийий орталықтың бузылыўына хәм бул жерде жайласқан өсимлик хәм ҳайўанат түрлериниң жоқ болып кетиўине себепши болмақта.

Суўланыўдың кескин кемейип кетиўин дельталарда қурғақшылықтың күшейиўине, дельталық көллердиң көпшилигин кеўип қалыўына жер асты суўларының қәддиниң төменлеп кетиўине хәм олардың минералдласыўына алып келди. Бирақ булардың барлығы микроклиматтың өзгериўине, температураның көтери́лиўине хәм ҳаўа ығаллығының төменлеўине, өсимлик

дүньясының кемейиўине, батпақ хәм отлақлы топырақлардың қурғап кетиўине топырақ қатламларының шорланыўына, оның қунарлылығының төменлеўине хәм бул орталықта жасаўшы хайўанат дүньясының генофондына жоқ болыўына өз тәсири тийгизип атыр.

1980-жылларға келип Әмиўдәрья дельтасында кеўип қалған суў сақлағышлардың майданын 310 мың км² қа жетти. Оларда гидроморфлы, батпақлы хәм қамыслы жерлер кебир автоморфлы, тақыр тәризли жерлерге айналды. Бундай жағдайлар өсимлик қатламларының фито өнимлериниң саны хәм сапасының жоқ болыўына алып келди. Өсимликлердиң хәм хайўанлардың баҳалы хәм сийрек ушырасатуғын популяциялары кәўип асытына түсип қалды. Көллердиң кеўип қалыўы, суўда жүзиўши хәм суў батпақ қусларының жаңа районларға көшип қонысланыўына себепши болды.

1960-жыллары Әмиўдәрья дельтасында көллердиң майданы 300 мың га болса 1970 жылларға келип олардың майданы 120 мың га ға қысқарды. Қамысзарлықлардың майданы 3 есеге қысқарды хәм олардың өнимдарлығы 37 есеге кемейип кетти. Қуслар хәм сүт емизиўшилердиң жасаў имканиятларының жоқ болыўы жасаў орталықларының сапасының өзгериўине алып келди. Дельта суў сақлағышларында от-шөплик өсимлик қатламларының азайып кетиўи суўлы батпақлы комплекслердеги зәхәрли шыбын ширкейлердиң көбейиўи суў сақлағышларда тиришилик етиўши балық хәм қусларға хәр қыйлы қыйыншылықлар туўылды. Бул суўда жүзиўши хәм суў батпақ қусларын ири топарларының Арал регионы шеклерин таслап көшип кетиўге мәжбүр етпекте. Әсиресе қызыл түстеги бирқазанлар өз уяларын арқа шегараларға шығарыўға мәжбүрлемекте.

Үрпек баслы хәм қызыл түсли бирқазанлардың хәм үлкен Қарабайлардың ири топарлары Әмиўдәрьяның кубла жағаларынан Сарықамыс көлине көшип барды. Дәрья ағысларының қысқарыўы тәбийий жайлаўлардың айтарлықтай өзгериўине алып келди. Өсимлик шерикликлериниң тутып турған майданы 36 % тен, 8 % ке , суўланып туратуғын майданлар 40 % тен 20 % ке қысқарды. Қалың қамыс өсимликлери

Әмиўдәрья дельтасында 300 мың га ийелейтуғын еди. Олар суўда жүзиўши куслардың 21 түрин, уя салатуғын 11 түрин, Хйуа қырғаўылының 8 түрин, узынаяқлылардың 9 түрин өз ишине алдатуғын жасаў орталығы болған еди. Бул қамыслықларда қамыс пышығы хәм Туран жолбарысы 1950-жылларға шекем жасап келди. 1980-жыллардың ақырына келип қамыс өсимликлериниң майданы 7 есеге қысқарды. 1970-жылларға шекем дельтаның теңиз бойы бөлегинде Шегекөл, Машанкөл, Қаракөл, Сапакөл көллеринде ондатралардың үлкен популяциясы жасаған болса, хәзирге келип бул көллердиң көп көл системасы кеўип қалды, аң аўлаў хәм өндирис тоқтады. Әмиўдәрьяның суўалмалы хәм дельтасында жайлаўлардың майданын 348 мың га дан 125 мың га ға дейин 3 есеге қысқарды.

Қарақалпақстан республикасының мәмлекетлик тоғай қоры 1995 жылғы мағлыўмат бойынша 4437 мың га майданды ийелейди. Соның 650 мың га сы тоғайлықлар сексеўил, боялыш, қоянсүйек, жүзгин усаған ағаш, пута хәм ярым пута өсимликлери менен қапланған тоғайлардан ибарат. Бул майданлардың 6 мың га жерлеринде боян пишенликлерден ибарат болған тәбийий жайлаўларға ийе. Хәзирги уақытта тиршилик етиў орталығының күшли өзгериске ушыраўына байланыслы Әмиўдәрья дельтасында тоғай өсимликлериниң 54 түри жоқ болып кетиў алдында тур. Өзбекстан республикасының «Қызыл ктитабы» на 17 түрдеги хайўанлар өсимликлердиң 21 киритилген.

1980-жыллардың ақырына келип Әмиўдәрья дельтасында сары кувышка, ақ кувышка, альдрованда, өрмелеўши пирей хәм попоротниклер ушыраспайтуғын болды. (Өтенов, Сагитов 1990ж). Республикмыздың территорияларында хайўанат дүньясының тарқалыў географиясы ашынарлы дәрежеде болып қалмақта. Әмиўдәрья суўының Түйемойын плотинасына төмен түспеўи нәтийжесинде бекире, суўен, қаязбалық, қылышбалық, хәм сумырайдың еки түри дәрьямызда ушыраспайды. Арал суўы дузлылығының 96 мг/л көтерилиўине байланыслы теңиз маржанлары болған тоқыбалық,торта, көкжан, шамай (жумыр балық). Алабуға, ерщ, шорщ

(ийтбалық) пүткиллей жоқ болып кетти. Жер бауырлаушылардан сарыуёк жылан жоқ болып кеткен болса, Хентау жумалақбас кесиртке, Султан-Уәйис тауының Хожакөл этираплары менен Бельтауда азлап ушырасады. Сүт емизюшылерден жарқанаттың бир түри, Гиптнер тышқаны, сасық гүзен, палхор порсық, қарақулақ, мәлим пышық, барыс, қарақуйрық кийик, Үстирт хәм Қызылқум архарлары, Бухара сууыны х.т.б айтсақ болады.

Демек, Қарақалпақстанда экологиялық дағдарыстың күшли рауажланыуының ақыбетин есапқа алған ҳалда регионда өсимлик хәм хайуанат дүньясының көп түрлилигин сақлап қалыу, олардың айырым жоқ болып баратырған түрлериниң жасау орталықларын қорықлау усаған илажларды көриу зәрүр болады. Буның ушын арнаулы мәмлекетлик қарарлар тийкарында жаңадан қорықханалар шөлкемлестириу зәрүр. Әмиудәрьяның куяр аяғындағы Бердеке, Таллық, Ордабай, Инженер өзек хәм Ахантайдағы тәбийий тоғайларды есапқа алып қубласы Мақпалкөл менен Шууаққа шекем 1,5-2 млн га созылып атырған тораңғылла жийдели қалың соралы қамыслықларды нәзерде тутамыз.

-үлкен сарышығанақ қолтығындағы көлеми 10-12 км² ретлестирилетуғын режимдеги суу сақлағышты қайта тиклеу арқалы балық хожалығын рауажландыруға хәм рекрационлық әхмийетке ийе.

-арал теңизиниң қубласында бөлинип қалған Әжибай қолтығындағы суу сақлағышты қайта тиклеу арқалы тәбийий орталықтың өсимликлер хәм хайуанатлары ушын зхәрүр болған ығаллылық балансын услап турыуға жәрдем береди.

Региондағы барлық сууғарыу системаларын қайта реконструкциялау арқалы теңиз бойы көллерине системалы сууланыуын сақлайды.

-Ауыл-хожалығында сууды аз талап ететуғын жоқары зүрәәтли жаңа сортларын ислепп шығыу

-Ауыл-хожалығында сууды үнемлеуши алдыңғы технологияларды енгизиу

-Региондағы душшы жер асты сууларынан нәтийжесли пайдаланыу

Бул илажларды мақсетке муўапық әмелге асырсақ экологиялық жағдайлардың турақластырыў менен тәбийий компонентлердиң соның ишинде өсимлик хәм хайўанат дүньясының турақлы өсип раўажланыўын тәмийнлеп тәбийий орталықтың тең салмақлығын сақлаўға кең мүмкиншилик жаратқан боламыз.

ӘДБИЯТЛАР

1. Каримов И. А. Биздан озод ва обод ватан колсин. Ташкент. 1996.
2. Каримов И. А. Узбекистон буюк келажак сари. Ташкент. 1998.
3. Каримов И. А. Узбекистон XX – асрга интиломда. Т. ҒУзбекистонҒ. 1999 й.,
4. Каримов И.А. «Узбекистон иқтисодий ислохатларини гуҳурлаштириш йўлида». Тошкент, 1995.
5. Бабушкин Л.А. «Особенности климаты низовев Амударьи материлы СОПС». АН Руз, Тошкент, 1959.
6. Рафиков А.А. Водные ресурсы проблемы Арала и окружающая среда.
7. Рафиков А.А., Акрамов З.М. Прошое, настоящая и будущее Аралского моря.
8. А.А.Рафиков. Снижение уровня Аральского моря и изменение природных условий низовьев Амударьи. Ташкент, 1981.
9. Рафиков А.А., Эргашев Ш.Э, Хайдаров Э. «Процессы опустынивания южного приаралья», Ташкент, 1997.
10. Баратов Г. «Узбекистон табиий географияси», Тошкент, 1996.
11. Бахиев Э.С., Ещанов Г., «Дәўиримиздиң экологиялық машқалалары», Нөкис-Билим, 2001.
12. Бахиев Э., Хожаниязов С., Абитов К «Тәбиятты қорғаў» Нөкис-Билим, 1996.
13. Б.Жоллыбеков. Изменение почвенного покрова приморской дельты Амударьи при аридизации. Нукус, 1991.
14. Отенов Т., Сагитов Б.Н. «Редкие и исчезающие растения Каракалпаксий», Нукус, 1990.
15. Н.Ф.Глазовский. Аральский кризис причины возникновения и пути выхода. М, 1990.
16. Ж.Жалгасбаев. Растительности Южного ПриАралья и ее изменения. Нукус. 1995.
17. «Биологические ресурсы приаралья» Тошкент, «Фан» 1986.

18. Аметов М.Б. «Экология птиц и мелькопитающих долины Амударии, Устюрта и Кызылкумов», Нукус, 1993.
19. Даўлетова К., Умаров Е.К. «Қарақалпақстан Республикасының табиаты хэм хожалығы», Нөкис, 1989.
20. Матмуратов Ж. Қарақалпақстанның табиий шараяты хэм табиий ресурслары. -Нөкис, 1988.
21. Матмуратов Ж. Агроклиматические условия северо-западного Узбекистана. -Нукус, 1989.
22. Умаров Е.К. Қарақалпақстанның экономикалық хэм социаллық географиясы. -Нөкис, 1998.
23. Растительный и животный мир Каракалпакии. Нукус, «Каракалпақстан» 1970.
24. Флора и растительной Север Западного Устюрта и пути улучшения пастбищ. Тошкент, «Фан», 1985.
25. Экология и охрана редких и исчезающих позвоночных Узбекистана. -Т., «ФАН»

Elektron resurslar

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat Hokimiyati portali: www.gov.uz
2. Axborot - kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug'ati, 2004, UNDPDI: Programme www.lugat.uz, www.glossaiy.uz
3. O'zbek internet resurslarining katalogi: www.uz
4. Axborot resurs markazi <http://www.assc.uz/>
5. www.ziyonet.uz
6. www.edu.uz
7. www.tdpu.uz