

**O`ZBEKISTAN RESPUBLIKASI XALIQ BILIMLENDIRIW
MINISTRILIGI**

**A`JINIYAZ ATINDAG`I NO`KIS MA`MLEKETLIK
PEDAGOGIKALIQ INSTITUTI**

**Ta`biyy pa'nler fakul`teti
«Geografiya oqitiw metodikasi» kafedrası**

**5110500 - Geografiya oqitiw metodikasi bakalavr ta`lim bag`darinin`
4 a – kurs talabasi**

Sabiev Amanjol Qaybraxman ulinin`

**«ARAL TEN`IZININ` GIDROGEOLOGIYALIQ HA`M
GEOGRAFIYALIQ U`YRENILIWIN ORTA AZIYA
TA`BIYY GEOGRAFIYASINDA OQITIW USILLARI»
TEMASINDAG`I BAKALAVRLIQ
PITKERIW QA`NIGELIK JUMISI**

Ilimiy basshi:

g-m.i.k. Jaqsimuratov K.

Kafedra baslig`i :

p.i.k., dots. Gaipova R.

No`kis 2017 jil

MAZMUNI

	Kirisiw.....
I-BAP.	ARAL TEN`IZINE ULIWMA TA`BIYIY- GEOGRAFIYALIQ SIPATLAMA.....
I.1.	Geografiyalıq jaylasqan ornı ha`m geologiyalıq rawajlanıwı..
I.2.	Ten`izdin` izertleniw tariyxı.....
I.3.	Ten`izdin` qurıp barıwı ha`m bunın` na`tiyjesinde qurg`aqlıqqa aylang`an bo`liminde ju`z bergen protsessler....
III-BAP	ARAL TEN`IZININ` HA`ZIRGI WAQITTAG`I JAG`DAYI HA`M ONIN` GIDROLOGIYALIQ- GIDROXIMIYALIQ REJIMININ` OZGERIW TENDENTSIYALARI.....
II.1.	Aral ten`izinin` morfologiyalıq ozgerisine sipatlama.....
II.2.	Aral ten`izinin` duzlılıg`ı ha`m suw balansının` o`zgeriwi ..
II.3.	Aral ten`izinin` gidrogeologiyalıq ha`m geografiyalıq u`yreniliwin Oрта Aziya ta`biyiy geografiyasında oqitiw usillari
	Juwmaqlaw.....
	Paydalanılğ`an a`debiyatlar.....

KIRISIW

Temanin` aktualig`i: Ha`zirgi Aral boyi regioninda ekologiyaliq qiyin jag`dayg`a ken` a`hmiyet berilip atir. Aral ten`izin u`yreniw, og`an geografiyalıq sipatlama beriw temanin` xa`m onnan paydalaniw u`lkemizdegı sheshiwi kerek bolg`an aktual` ma`selelerdin` biri bolip tabiladi. Aral ten`izine uliwma ta`biyiy-geografiyalıq sipatlama berip onin` u`yreniliw tariyxına ilimiy ko`z-qarastan u`yreniw kerek ma`selesi jumistin` region ushin a`hmiyetin ko`rsetedi. Bunda regionnin` geologiyası, geomorfologiyası, gidrogeologiyası, gidrologiyası, klimati ha`m rel`efin u`yreniw ushin jan`a a`debiyatlar, ekspeditsiya, internet materiallarinan ken` paydalaniw kerekligi ilimiy izertlew jumisinin` ja`nede aktualig`in ko`rsetedi.

Aral ha`m Aral boyin u`yrenge alimlardan Abdunabiev A.G. (1971), Akramov A.A. (1989), Akramov Z., Rafikov A. (1986), Bekbulatov A. (1977), Gulyamov P.N. (1985), Kenesarin N., Sultanxojaev A.(1983), Ma`tmuratov J., Yuldashev J. (1985), Medetullaev J. (1976), Kurbanbaev E. (1999, 2007) ilimiy jaqtan izertlegen.

Izertlew jumisinin` ob`ekti: Aral ten`izi aymag`i.

**Jumistin` maqseti.** Jumistin` tiykarg`i maqseti ilim-izertlew da`wirinde Aral ten`izine geografiyalıq sipatlama beriw ha`m olardin` jaylasıw jag`dayin u`yreniıw bolip, u`lkedegi ta`biyiy resurslarinan aqilg`a muwapiq paydalaniwdan ibarat.

Pitkeiw qa`niygelik jumisında ko`p jilliq toplan`an mag`liwmatlar analiz etildi olardan Aral boyi gidrogeologiya, gidrogeologiya-meliorativ ha`m Ustyurt geofizika ekspeditsiya materiallari, ja`nede Qaraqalpaqstan Respublikası ta`biyatti qorg`aw komiteti, Qaraqalpaqstan Respublikası awıl ha`m suw xojalig`i ministrliğı, O`zbekstan ha`m Rossiya ilimpazlarinin` «Aral – 2009» haliq aralıq ekspeditsiya materiallari, internet mag`liwmatlarinan paydalanildi.

XX-XXI a'sirdin` O'rta Aziya regioninin` en` global mashqalalarinin` biri bolg`an Aral ten`izi qa`ddinin` tez pa`t penen to`men tu`siwi ha`m onin` qorshag`an ortaliqqa ta`siri.

Aral ten`izi mashqalasi boyinsha ko`plegen halıqaralıq ushırasıwlar ha`m halıq aralıq konferentsiyalar boldı. Bul boyinsha ko`plegen ilimiy-izertlew jumısları islenbekte.

Tek ta`biyatqa qana emes sonın` menen birge usı regionnıń ekonomikalıq-sotsiallıq jag`dayına da o`zinin` ekologiyalıq ta`sirin tiygizbekte. Ten`iz tu`binen ushıp shıqqan duzlar egislik maydanlardı, topırag`ının` degradatsıyalanıwı ha`m usılardıń ta`sirinde usı regionda jasap atırğ`an adamlardıń den-sawlıg`ına kerı ta`sir etpekte.

A`miwda`r`ya ha`m Sırda`r`ya basseynlerinde awıl-xojalıg`ı egislik maydanlarının` ken`eyip, suw resurslarınan ha`dden tıs paydalanıw ta`sirinde Aral ten`izine kelip tu`setug`ın kelip ta`biyiy suw balansı buzıldı. Bul bolsa ten`iz qa`ddinin` tez to`menlep ketiwine alıp keldi.

Jumistin` metodi ha`m metodologiyasi: Jumistin` tiykarg`ı metodlari bolg`an dala marshrutli-ekspeditsiyalıq, jer astı suwların jasalma dushshilandiriw ha`m salıstiriw metodlarınan ken`nen paydalaniladi. Bunnan basqa qa`niygelik jumista Internet materiallarınan, Aral boyı gidrogeologiyalıq, gidrogeolgiyalıq-meliorativ ha`m U`stirt geofizika ekspeditsiyasınin`, xabar-resurs orayinin` jıllıq esabatlarınan paydalanildi.

I-BAP. ARAL TEN'IZINE ULIWMA TA'BIYIY-GEOGRAFIYALIQ SIPATLAMA

I.1. Geografiyalıq jaylasqan ornı ha'm geologiyalıq rawajlanıwı

Bu`gingi ku`nde bir payıtları o`zinin` ko`lemi jag`ıman du`nyada to`rtinshi orında turatug`ın Aral ten`izi qurıp barmaqta, onın` ornında bolsa u`lken Aralqum sho`li qa`liplesti. Bul protsesste bolsa, Qaraqum, Qızılqum ha'm U`stirt sho`lleri o`zara birlespekte.

Aral ten`izinin` buring`ı jag`a boyı sızıqları (shegaraları) ha`zir 100-200 km ishkerige qaray kirip ketti. Buring`ı waqıtları onın` jag`a boyı sızıg`ı batısta U`stirt chinkinen, shıg`ısta Qızılqum sho`linin` arqa batısı, qublada A`miwda`rya deltası ha'm arqada Aral boyı qumlı sho`llerine jetetug`ın edi. Ten`izdin` ko`p jılıq ko`lemi Baltik ten`izi betinen 53 m joqarı bolıp turg`an, onın` akvatoriya maydanı 66458 km² bolg`an territoriyada suw bolg`an, al atawlardın` maydanı 2345 km<sup>2</sup> qurag`an. Onın` ortasha teren`ligi 16 m bolsa, en` teren` jeri 69 m, bolg`an. Ten`izdin` uzınlıg`ı 428 km, al eni bolsa 292 km di qurag`an.

Relifi tiykarınan tenizdin` a`yyemgi ha'm jan`a transgressiyaları da`wirinde qa`liplesken a`yyemgi transgressiya da`wirindegi relef bunnan 3000 jıl burın ju`z bergen. Bul transgressiya jolbarıs quyırqlı yarım atawında releftin` birinshi forması qa`liplese baslag`an.

Aral ten`izi jag`aları relifi ultanı jan`a transgressiya da`wirinde qa`liplese basladı. Son`g`ı on jılıqlarda ten`izdin` qayıwı na`tiyjesinde Araldın` qurg`ag`an ultanında ekzogen protsessler tiykarınan 2 genetik kategoriya: akkumlyativ ha'm deflyatsiyalıq-akkumlyativlik (eollı) ko`rinsinde ju`z berdi. 2000-jıldın` aqırına kele Araldın` qa`ddi 32,0 m ge tu`sti. Ten`izdin` qurg`ag`an bo`liminin` maksimal uzınlıg`ı 80 km ge, al qiyalıg`ı 0,0002 a`tirapında. Bug`an Ajibay qoltıg`ının`

batisinan Jıltırbasqa shekemgi qurg`ag`an ultanları kiredi. Al minimal uzınlıg`ı bolsa 30 km, qiyalıg`ı 0,0005 bolıp qurg`ag`an ultannın` Moynaq-Uzınqayır bo`limleri kiredi. Bul jerde A`miwda`rya deltasında da`rya tiykarınan Ordabay, Aqqay ha`m İnjenero`zek h.t.b. bo`limlerge bo`linip ketedi. Bular 80-jıllarg`a kele qurg`ap onın` qurg`ag`an ultanında qumlar, allevritli jatqızıqlar menen qaplandı. Bulardın` qalın`lıg`ı 5-7 m bolıp tabıladı.

Rayonda ta`biyiy territoriyalıq komplekstin` (TTK) qa`liplesiwinde gidrologiyanın` ha`m gidrogelogiyalıq faktorlardın` roli u`lken. Bunın` na`tiyjesinde Qazaqda`rya, Qon`ırat-Moynaq sistemalı kanalı plitalanıp bunnan ag`ıp kelgen suwlar arqalı ten`izdin` qurg`ag`an bo`liminde ko`lli-batpaqlı Jıltırbas, Balıqshı, Moynaq TTK ları payda boldı. Moynaq ha`m Balıqshı TTK larına K.M.Atanazarovtın` (1998) gidroximiyalıq sıpatlamasın atap o`tsek boladı. Bul izertlew jumısının` mag`lıwmatlarına qarag`anda suwının` minerallıq da`rejesi 1,2-3,6 g/ l ha`m 2,1-2,3 g/l di quraydı. Suwının` duzlılıq da`rejesi qıs-gu`z aylarında maksimal jag`dayda boladı. Bul gezde minerallıq da`rejesi 1572 mg/l (1,5 g/l den artıq) ge shekem boladı. Al suwdın` quramındag`ı sulfatlar ha`m xloridler 1326 mg/l ge shekem jetedi. Bunda jıl dawamında kaltsiy mug`darı Sa 74 mg/l den 410 mg/l ge shekem, magniylar 30 mg/l den 210 mg/l ge shekem o`zgerip otıradı. O. A. Alekinanın` klassifikatsiyalawına qarag`anda bul suwlar xloridli-sulfatlı tiplerge jatadı.

Rayonda grunt suwları ha`m landshaftlardın` qa`liplesiwini ha`m rawajlanıwında a`hmiyetli rol oynaydı. V. N. Sokolovtın` (Pinxasov h.t.b.) mag`lıwmatlarında (1999) tenizdin` qurg`ag`an ultanındag`ı to`rtlemshi jatqızıqlarındag`ı grunt suwları duzlang`an (10-50 g/l) ha`m ku`shli da`rejede duzlang`an (50-150 g/l). ten`izdin` qurg`ag`an ultannın` grunt suwlarının` ximiyalıq quramı tek g`ana ten`izge emes, al ultannın` reline ha`m litologiyalıq jınıslarg`a ko`p jag`daylarda o`z ta`sirin tiygizedi.

Geologiyalıq rawajlanıwı. Bunnan 25-30 million jıl aldın Orta Aziyanın` batis bo`liminde u`lken paleogeografik o`zgerisler ju`z bergen. Qurg`aqlıqtın` a`ste-aqırın ko`teriliwi na`tiyjesinde payda bolg`an suw basseyini batisqa – Kaspiy ten`izi ta`repke

sheginedi. Bunun` na`tiyjesinde ha`zirgi Qızılqum ha`m Aralboyı ornında qurg`aqlıq payda boladı. Alımlardıń pikirinshe, Aral boyında ha`zirgi Aral, Sarıqamıs ha`m Xorezm oypatlıqları bunnan 13-14 million jıl aldın payda bola baslag`an.

Aral ten`izi oypatlıg`ının` payda bolıw sebepleri haqqında ha`zirge deyin ha`r tu`rli pikirler bar. L.S.Berg, B.M. Georgievskiy, A.D. Arxangelskiylerin` da`liyllerine qarag`anda bul oypatlıq jer qabıg`ının` tektonikalıq ha`reketler na`tiyjesinde payda bolg`an. A.S.Kes, B.A.Feodorovichtin` mag`lıwmatlarına qarag`anda tektonik ha`reketler menen birge samaldın` oyıw ku`shi de belgili bir da`rejede rol oynaydı. İ.G. Veynbergs bul pikirge qosımsha ta`rizde suffoziya ha`m karst protseslerinde qosqan. O.M.Borisov Aral ten`izinin` ornın u`lken krater sıpatında qaraydı. Onın` pikirinshe, oypatlıq bunnan 40 million jıl aldın kosmostan tu`sken bir neshe ju`z mın` tonna awırılıqtag`ı meteorit yaki asteroidtin` qattı urılıwı na`tiyjesinde payda bolg`an.

İ.V. Rubanov basshılıg`ındag`ı bir gruppa geologların` pikirinshe, Aralboyında ten`iz batıs ta`repke shedingennen son`, bunnan aldın toplang`an ten`iz jatqızıqları eroziya ta`sirinde oyıla baslag`an. Moynaq yarım atawı-Vozrojdenie-Barsakelmes atawları bag`ıtında U`stirt platosının` chink sızıg`ı payda bolg`an. Bul jerde ten`izdin` sarmat allyuvial` jatqızıqları pu`tkilley juwılıp ketken. Toqtawsız dawam etken eroziya protsessinde Aralsk qalasınan Sarıqamıs oypatlıg`ına deyin u`lken aymaqta sho`kpe payda bolg`an. U`stirt platosının` shıg`ıs chink bo`limi juwılıw ha`m basqa protsesler na`tiyjesinde oyılıp ha`zirgi ko`rinisine jaqınlasqan.

Neogen da`wirinin` joqarı pliotsen da`wirinde Kaspiy ten`izinin` transressiyası ju`z beredi, bul protsess ko`bineze Akchagıl transgressiyası deb ju`ritiledi. Suw Sarıqamıs ha`m Aral batıqların bir qansha waqıtqa shekem iyelep jatqan. Akchagıl suw basıw protsessi na`tiyjesinde payda bolg`an ha`r qıylı ten`iz jatqızıqların ko`riw mu`mkin. Olarda jatqızıqlar mergel, gil, qum, alevrolit ha`m qumtaslardan quralg`an.

Ten`iz suwı aldın`g`ı jag`dayına qaytqannan son` ja`ne bir ma`rte u`lken suw tasıw ju`z bergen. Bul tasıwdı geologiya tariyxında Apsheron suw basıwı dep ataladı.

Sarıqamis-Aral oypatlıg`ın suw bir qansha waqıt basıp turg`an. Bul waqıtta sho`kpelerde qumtas-gil ha`m qum jatqızıqları payda bolg`an. Alımlardıń da`liyllewlerine qarag`anda, suw basseyini Aral oypatlıg`ında 54-62 m, Sarıqamis oypatlıg`ında bolsa 80 m ba`lentlikke shekem bolg`an maydandı iyelegen.

To`rtlemshi da`wirdin` orta bo`liminin` son`ında A`miwda`rya Qaraqum sho`linin` pa`s jerlerin jatqızıqlar menen tolturg`an. Son` arqa-shıg`ısqa qaray burılıp Zarafshan da`r`yasına, al Gozarda`r`ya o`z suwın A`miwda`ryag`a quyg`an. A`miwda`rya Aral ten`izine ag`ıp, Xorezm oypatlıg`ına quylg`an ha`m keyinshelik bolsa ha`zirgi Aqshada`rya deltasın payda etken. B.V. Andrianov, M.A. İtina ha`m A.S. Kes sıyaqlı alımlardıń pikirinshe, Aqshada`rya deltasının` payda bolıwı joqarı to`rtlemshi da`wirde ha`m galotsen (son`g`ı 10 mın` jıl) de dawam etip, ha`zirgi tariyxıy jıllarda toqtag`an. Galotsennin` to`mengi ha`m orta bo`limlerinde A`miwda`rya Sarıqamis oypatlıg`ın o`z ılayı menen tolturg`an ha`m Uzboy arqalı Kaspiy ten`izine ag`a baslag`an. Da`ryanın` bunday ag`ıwı eramızdan aldın`g`ı ekinshi a`sirdin` baslarına deyin dawam etken. Bul arada Sarıqamis oypatlıg`ı da`rya jatqızıqları menen toltırılğ`an ha`m Sarıqamis aldı deltası payda bolg`an. Bul protses Sarıqamis ko`li ha`m Uzboy da`ryası jag`alarında neolit da`wiri awshıları menen balıqshılarının` ko`plegen jasag`an orınların arxeologlar ta`repinen anıqlanıwı menen da`liyllengen.

Bul da`wirde Aral oypatlıg`ına tek g`ana Sırda`rya quyılıp qalmastan, al Chu da`yası da jetip barg`an bolıwı mu`mkin. Aral oypatlıg`ında A.S. Kes pikirinshe eki ko`l bar bolıp, olardıń suwı ju`da` shorlıg`ı menen ajıralıp turg`an.

Eramızdan aldın`g`ı 2000 jıldın` son`ında ha`m 1000 jıldın` baslarında Sarıqamis aldı deltasının` payda bolıwı menen A`miwda`rya qaytaldan Aqshada`rya deltasına burılıp, Aral ta`repke ag`a baslag`an. Eramızdan aldın`g`ı 2000 jıldın` ekinshi yarımınan baslap A.S. Kes pikirinshe A`miwda`rya Aral sho`kpesine qubladan quyıla baslag`an. Usı da`wirden baslap ha`zirgi A`miwda`ryanın` Aral aldı (A`miwda`rya) deltası payda bola baslag`an. Eramızdan aldın`g`ı 1000 jıldın` birinshi

yarımında A`miwda`rya deltası tolıq payda bolg`an. G.V. Lopatin alıp barg`an esaplawlarg`a qarag`anda, Xorezm-Sarıqamıs deltasındag`ı allyuvial jatqızıqlardıń payda bolıwı ushın shama menen 10 mın`, A`miwda`rya deltası ushın bolsa 7,5 mın`, A`miwda`rya deltaların` payda bolıwı ushın ulıwma 18 mın` jıl za`ru`r bolg`an.

Sırda`rya Aral ten`izine tu`skenge shekem Qızılorda pastegisligindegi ko`llerge quyılıp turg`an. Biraq bunnan 2,5 jıl aldın Sırda`rya pa`stgisligi arqalı bul jerdegi ta`biyiy tosıqlardı juwıp, o`z bag`darın Aral ten`izine buradı. Ten`izge ol Jan`ada`rya, Inkarda`rya ha`m keyinshelik Quwanda`rya o`zenleri arqalı quyıladı. Eramızdan aldın`g`ı 1000 jıldın` ortalarında ha`zirgi Quwanda`rya deltası ju`zege kelgen. Demek, Aral ten`izi A`miwda`rya ha`m Sırda`rya suwları esabınan birinshi ma`rte bunnan 2500 jıl aldın tolg`an, Aral oypatlıg`ı neogen da`wirinin` ortalarında payda bolg`an.

Aral ten`izi tariyxında onın` qa`ddi ha`r qıylı sebeplerge qaray birneshe ma`rte o`zgerip turg`an. Eramızdan aldın`g`ı 1000 jıldın` ortalarında ten`izdin` birinshi transgressiyası ju`zberedi. Bul transgressiya waqtında ten`izi qa`ddi 58-59 m ba`lentlikke shekem ko`terilgen. Bul jag`day usı ba`lentliktegi maydanlarda ha`r tu`rli shıg`anaqlardıń tabılıwı menen da`liyllenedi. A`yyemgi Aral transgressiyasının` payda bolıwı ko`binese onın` basseynindegi muzlardın` eriwi menen tu`sindiriledi.

A`yyemgi Aral transgressiyasının` tamamlanıwı muzlıq da`wirinen keyingi waqıtqa tuwra keledi. Bul da`wirde ten`iz qa`ddi ju`da` pa`ske (16 m abs ba`lentlik) tu`sip ketken. Bunın` aqıbetinde ten`iz suwı minerallasıwı ku`sheyip, ten`iz astında gips ha`m basqa tuzlar payda boldı.

Eramızdan aldın`g`ı V11-1V a`sirlerde jan`a Aral transgressiyası bolıp o`tti. Bul suw tasqınıda ten`iz qa`ddi 54,5 m abs ba`lentlikke deyin, yag`nıy XX a`sir 60-jılları basındag`ı(53m abs) betinen 1,5 m ba`lendirekke ko`terildi.

Aral qa`ddinin` keyingi 200 jıldan ko`birek tariyxın u`yreniwde L.S. Berg ha`m V.P. Lvov toplag`an materiallar u`lken ilimiy a`hmiyetke iye. L.S. Berg ko`plegen tariyxıy derekler tiykarında Araldın` 1780 jıldan baslap XX a`sir baslarına shekem

bolg`an ten`iz qa`ddi terbeliwin u`yrenip shıg`ıp, to`mendegi na`tiyjege kelgen. Bul waqıt dawamında ten`iz qa`ddinin` terbeliwi u`sh ma`rte ba`lent ha`m eki ma`rte pa`s fazada ju`z bergen. 1910 jıldan baslap 1961 jılǵa shekem ten`iz qa`ddi tiykarınan 53 m abs ba`lentlikte terbelip turg`an, biraq keyingi jıllarda (1961) onın` qa`ddi 53,4 m ge jetken.

Eger 1960 jıllarg`a shekem Aral ten`izine ortasha ha`r jılı 52 km kub suw tu`sken bolsa, al 2000 jılǵa kelip, Aral ten`izine 1 km kub suw tu`spedi. Sonlıqtanda Aral ten`izinin` qa`ddi 60 jılları 53 m abs ba`lentlikte bolg`an bolsa, al ha`zirgi waqıtta Aral ten`izi suwının` qa`ddi ortasha 30-33 m abs ba`lentlikti iyeleydi. Araldın` qurg`ag`an ultanı landshaftların izertlewde tiykarınan aerokosmikalıq shifrovkalaw, ha`r tu`rli jıllardag`ı topokartalardı salıstırıw, dala ha`m laborotoriyalıq usıllardan paydalanıladı.

Aero-kosmikalıq su`wretlewde (1995 jıldan keyin) Moynaq, Balıqshı ha`wizleri olardıń sheklengen dambaları ha`m Jıltırbas ko`li ha`zirgi konturı kartag`a tu`sirildi. Bul obiektler son`g`ı ma`rte 1986 jılı su`wretke tu`sirilgen bolıp 1:200000 masshtablı edi.

Topokartalıq salıstırıw usılında ta`biyiy ortalıqtın` xarakterin belgiledi, a`sirese onın` ten`izdin` keyin qayıwın jag`a sızıǵın, qurg`ag`an ultandag`ı eollı protsesslerdin` bag`darı ha`m tezligi h.b., topografiyalıq su`wretlewde eollı qumlıqlar ha`m olardıń formaları, releftin` birden-bir tiykarg`ı komponentleri bolıp tabıladı. Topokartalarldı analizlewde Aral qa`ddi 1960 jılı 53,0 m bolg`an. Keyin 1979 jılı -47 m, 1986-jılı 41 m di ko`rsetken. Jag`anın` sızıǵı 1990 jılǵı kosmosu`wretlewge tu`sirgende 38,2 m boldı. Al 2000 jıldın` oktyabrindegi mag`lıwmatlarg`a qarag`anda Araldın` qa`ddi 32,58 m di ko`rsetken.

Qurg`ag`an ultannın` landshaftların izertlewde maydanlı semkalaw metodın o`tkergende ha`m meridianallı ha`m ken`lik boyınsha 1:100000 ha`m 1:200000 masshtabda profillendi. Bunda 22 meridianlıq ha`m keliq boyınsha profiller boldı, bul jumıslar tiykarınan nivelirlew aralı iske asırıldı. Izertlegende baslı dıqqat

landshaftlardin` quramlıq nomerine qataratılğ`an geologiyalıq qurılısı, topıraqtın`-grunttın` quramı ha`m shorlıg`ı, relefi, relief payda etiwshi protsessler, o`simlikler birliklerine sıpatlama, don` jatqızıqlarının` quramı u`yreniledi.

Bul izertlew din` juwmaqlarında geomorfologiyalıq karta quraladı. Aldın`g`ı relief genezisin anıqlawda tiykarg`ı dıqqat baslı ha`m ekinshi da`rejeli relief payda etiwshi protsesslerdi qaraydı. Baslı protsesste ha`zirgi forması, ekinshi da`rejeli protsesste qıyınlaw qurılısı su`wretlenedi.

I.2. Ten`izdin` izertleniw tariyxı

A`yemgi zamanlarda Aral ten`izi ko`plegen ellerge ma`lim bolğ`an. A`yemgi grekler menen rimlikler Aral ten`izi haqqında bilgen ha`m onı Kaspiy din` «Skifli qoltug`ı» dep atag`an. S.P. Tolstov «Kaspiy ten`izinin` skifli qoltug`ı antik avtorlardın` pikirinshe, ha`zirgi Aral ten`izi jaylasqan territoriyanı o`z ishine alıp, shıg`ısqa qaray sozılıp jatadı. Antik da`wirdegi a`debiyatlarda «Oks ko`li», «Oks batpaqlıg`ı» degen tu`sinikler ushırasadı. Bularda Aral ten`izi bolıwı mu`mkin», - degen pikir aytadı.

Al Pliniy: «Oks ha`m Yaksart Sog`di jerinen Skif sho`li arqalı ag`ıp o`tip, skif qoltug`ına quyadı», - dep jazg`an.

Erte da`wirdegi u`lken ilimpaz Klavdiy Ptolomey de Aral ten`izi haqqında derekler qaldırg`an. Ol Sagdi tawlarınan ag`ıp o`tip Kaspiy ten`izine quyatug`ın (Ptolomey din` tu`sinigi boyınsha) Oks ha`m Yaksart da`r`yaların` aralıg`ında jaylasqan Oksian ko`lin ataydı. Ko`l onın` kartasında da ko`rsetilgen. Vizantiya elshisi Zemarx Kiliskiy Tu`rk xanlıg`ına barg`an saparında «Ko`ldin` qumlı jag`alawları menen on eki kun dawamında ju`rip o`tkenligin» jazadı. Akademik V. Bartold bul ko`l Aral ten`izi bolıwı mu`mkin dep shamalaydı.

En` birinshi ret ten`izdi «Aral» dep arab jazıwshısı İbn-Rustad 920-jılı o`zinin` miynetlerinde jazıp qaldırg`an. İbn- Rustadnıń A`miwda`rya ha`m Aral ten`izi

haqqında jazg`an miynetleri birqansha anıq bolıp, onın` mag`lıwmatları boyınsha Aral ten`izinin` ko`lemi 80 farsax (1farsax–u`km (480km)), ten`izdin` batis jag`alawındag`ı dizbekler Siyakux (Qara tawlar) dep ataladı. On` ta`repinin` jag`alawı batpaqlı, ol jerde qalın` tog`ay bolg`an.

Bul aytılp atırg`an Siyakux dizbegi-U`stirttin` bir bo`limleri bolıwıda mu`mkin. Sebebi onın` batis jag`alawı biyik keledi, ayırım noqatlarının` biyikligi – 190 metrge jetedi.

İbn – Xaukldin` Jankent qalası Xorezm ko`line quyatug`ın da`ryadan bir farsaxtay (6km) aralıqta jaylasqan degen deregi ju`da` a`hmiyetli. Usıdan L.S. Berg to`mendegidey na`tiyje shıg`ardı: «Bul mag`lıwmatlar X a`sirde Aral ten`izinin` ko`lemi ha`m jag`alarınin` forması ha`zirgidey bolg`anlıg`ın da`liylleydi, sebebi Jankent qalasının` qaldıqları ha`zirgi waqıtta ten`iz jag`asınan eliw shaqırımday aralıqta jatır».

L.S. Bergtin` aytıwınsha, XIII a`sirde jasag`an arab ilimpazı Bekran X- XII a`sirlerde Sırda`rya menen A`miwda`ryanın` sag`aları ha`zirgige uqsas bolg`anlıg`ın, al ten`iz jag`alarınin` formaları ha`zirgi ko`rinisi menen tuwra keletug`ınlıg`ın jazg`an.

İbn-Rustannın` zamanlası al-Masudi Aral ten`izinin` atawların keltirmesten, Balxa yamasa Jayxun da`ryası Termiz qasınan o`tip, Xorezmge jetkende tarmaqlanıp barıp, ko`lge quyatug`ınlıg`ın aytıp o`tedi. Ko`l sol jerde jalg`ız bolg`an... Biraq Masudi bul ko`l (Aral ten`izi) u`lken salalar arqalı Kaspiy ten`izi menen baylanısqan degen qa`te pikirdi aytadı. Arab geografi İstaxri (961) Aral ten`izin «Xorezm ko`li» dep atag`an ha`m Sırda`rya boyınsha ko`plegen mag`lıwmatlar jazıp qaldırg`an. Sırda`rya haqqında tuwrı ha`m ken` tu`rde jazıp, İstaxri: «Bul ko`ldin` aynalası 100 farsax (600km). Suwı duzlı, Jayxun, İlash (Sırda`rya) ha`m basqa da`ryalar quyadı», - deydi.

İstaxridin` «Klimat kitabında» X a`sirdin` a`landkartası berilgen. Onın` 18-19 kartalarında Aral ha`m og`an quyatug`ın da`ryalar ko`rsetilgen. Bul kartalar bul u`lkenin` bay toponimiyasın ko`rsetip g`ana qoymastan, bul jerde X a`sirde A`miwda`ryanın` tek bir arnası bolıp, onın` Aral ten`izine quyatug`ınlıg`ın da`lilleydi.

Tariyxıy dereklerge su`yengen halda, Aral ten`izinin` qa`ddi o`tken mın` jıllıqta birqansha joqarı bolg`anlıg`ın ko`riwimizge boladı. Bul haqqında mag`lıwmatlar V.V.Bartold ha`m L.S.Bergtin` miynetlerinde ko`plep keltirilgen. Olarda joqarıdag`ı avtorlardın` Araldı iri suw aymag`ı sıpatında atap o`tkenligi ayıladı. X a`sirde o`mir su`rgen belgisiz avtordın` parsı tilinde jazg`an «Xudud al Alam» («Shıg`ıstan batısqa deyingi a`lem oblastları») atamasındag`ı qol jazbasında da Aral ten`izinin` sıpatlaması berilgen. Bul jerde ten`izdin` ko`lemi 300 farsaxqa (1800km) ten` keletug`ın ha`m jag`lawlarının` qumlı ekenligi jazılğ`an.

Araldın` jan`a transgressiyası XVII a`sirdin` ekinshi yarımında o`tti. A`miwda`rya o`z bag`ıtın Aral ten`izine o`zgerkennin son` ten`iz qa`ddi ko`terildi. Transgressiya waqtında Aral ten`izinin` akvatoriyası ha`zirgisinen birqansha u`lken bolg`an ha`m jag`a sızıqları ju`da` ku`shli tilkimlengen. A.V. Shnitnikov XIV- XV a`sirlerde Aral qa`ddinin` joqarı bolg`anlıg`ın anıq mag`lıwmatlar menen jazıp qaldıradı. Bul waqıtta avtor Og`uzlar ma`mleketinin` paytaxtı Jankent penen Quwanda`rya boyındag`ı birneshe qalalardın` tariyxına baylanışlı mag`lıwmatlardı alg`an. Tariyxıy-arxeologiyalıq izertlewlerge qarag`anda (Levshin 1832, Tolstov 1947, 1948), Jankent XIX a`sirdin` aqırlarına shekem g`ana o`mir su`rgen. Son` bul jerde jasawshı adamlar basqa jaqqa qonıs awdarıp, Qala buzılmag`an halında bosap qalg`an. Shnitnikovtın` boljawlarına qarag`anda, Janakent ha`m tag`ı basqa qalalardan (Quyıqqala, Kesken Quyıqqala) xalıqtın` ko`ship ketiwine ten`iz qa`ddinin` ko`terilip, apatshılıq alıp keliwshi suw tasqınlardın` bolıwı sebepshi bolg`an.

İzertleniw waqtında Aral ten`izi haqqındag`ı da`slepki mag`lıwmatlardın` jıynalıwı, onın` a`piwayı tu`rde sıpatlanıwı ta`n. Yag`nıy bul mag`lıwmat

qaldırıwshılar ten`izdi arnawlı ra`wishte izertlegen adamlar ushın derek sıpatında jıynag`an sholıwshılar. Sonlıqtanda bul waqıtları Aral ten`izi haqqındag`ı anıq ilimiy izertlewler bolg`an joq dep aytıwg`a boladı. Degen menen, bul waqıttag`ı ta`biyat jag`daylarının` ayırım o`zgesheliklerinin` ko`rsetiliwi ha`zirgi ilimge usı u`lkenin` ta`biyatının` o`zgeriw sıpatlamasın anıqlawda ju`da` u`lken a`hmiyetke iye boları so`zsiz.

I.1. Ten`izdin` qurıp bariwı ha`m bunun` na`tiyjesinde qurg`aqlıqqa aylang`an bo`liminde ju`z bergen protsessler

Aral tenizinin` qurg`ag`an ultanı-bul jan`a kontinentallıq kurg`aqlıq xam birinshi da`rejeli aridlik tipke kiriwshi ta`biyiy kompleks bolıp tabıladı.

Bul rayon shegaraları arqada Aral tenizi jag`aları, shıg`ıs xam qublada A`miwda`rya ha`m Sırda`ryanın` allyuviallı-deltalı tegislikleri ha`m batısta bolsa u`stirt platosı bolıp esaplanadı. Bul jerdin` ulıwma maydanı joqarıda keltirip o`tkenimizdey 18 mın` km³ bolıp esaplanadı.

Reliefi tiykarınan tenizdin` a`yyemgi ha`m jan`a transgressiyaları da`wirinde ka`liplesken a`yyemgi transgressiya da`wirindegi relief bunnan 3000 jıl burın ju`z bergen. Bul transgressiya jolbarıs quyırqlı yarım atawında releftin` birinshi forması ka`liplese baslag`an.

Rayonda grunt suwları ha`m landshaftlardın` ka`liplesiwi ha`m rawajlanıwında a`hmiyetli rol oynaydı. V. N. Sokolovtın` (Pinxasov h.t.b.) mag`lıwmatlarında (1999) tenizdin` qurg`ag`an ultanındag`ı to`rtlemshi jatqızıqlarındag`ı grunt suwları duzlang`an (10-50 g/l) ha`m ku`shli da`rejede duzlang`an (50-150 g/l). ten`izdin` qurg`ag`an ultanının` grunt suwlarının` ximiyalıq quramı tek g`ana ten`izge emes, al ultannın` reliefine ha`m litologiyalıq jınıslarg`a ko`p jag`daylarda o`z ta`sirin tiygizedi.

Klimat bul ta'biyiy geografiyalıq sharayatta a'hmiyetli faktorlardın` biri bolıp esaplanadı. Klimatlıq sharayatlar ta'biyiy protsesslerdin` rawajlanıwın belgileydi, landshaftlardın` qa'liplesiwine bag`dar ko`rsetedi.

Aral ten'izi rayonın klimatlıq ta'riyplegende, onın` jaylasqan ornının` ta'biyiy rejimi ha'm ten'izdin` qaytıwı intensiv rawajlang`ang`a shekem (1960) onın` qa'ddinin` 53m bolıwı, O.M.Jitomir mag`lıwmatlarında (1964) keltirilgen. Onın` belgilewinshe Aral ten'izi ha'm og'an tutas territoriyalardın` arqa bo`liminde qurg`aqshılıq poyasları jaylasqan.

№1-SUWRET. ARAL TEN'IZININ` QURG`AG`AN ULTANI



Ten'iz boyı jag`aları tegisliginde bul jerge arqadan hawa massaları suwıq qıs ha'm jıllı ha'm qurg`aq jazdı payda etedi. Klimattın` tiykarg`ı ta'sir etiw zonası ten'izdin` orap alg`an birqatar klimatlıq elementler (temperatura, hawa ıg`allıg`ı) tek

ensiz jag`aboyı maydanlarda ten`izge jumsaq ta`sirin tiygizedi.

T.İ.Molosnov h.t.b. (1987) Araldın` klimatlıq sharayatların analizlegen mag`lıwmatlarında 1950-1960 jıllarda ha`m son`g`ı eki on jıllıqta 1960-69, 1970-79 jıllarda ten`iz qa`ddinin` intensiv ha`rekette ekenligin ko`rsetedi.

Meteorologik sıpatlama ha`r tu`rli waqıtta toplanıp o`zgeriske iye boladı. ten`iz jag`alırandag`ı stantsiyalarda 1981-1990 jıllarda teperaturanın` jıllıq ag`ımı (sonın` ishinde gu`zde) ortasha yanvarda 19 S, iyulda 3,4 S tı ko`rsetedi. Gu`z bul jerde qattı suwıq keledi. Qıs (dekabrden martın` oralarına shekem) ortasha suwıq azı-kem qarlı, ko`binese bulı hawa rayı gu`zetiledi. Turaqlı samallar dekabrın` ekinshi yarımınan bslanadı. en` suwıq ay bul yanvar` bolıp keledi. Ku`ndiz temperatura 0-5 S, al tu`nde bolsa -10 S tan -15 S qa shekem, minimal -34 S qa shekem baradı, son`g`ı jılları ortasha aylıq temperatura -2,4 S tan -10,1 S qa shekem baradı.

№2-SUWRET. ARALDAG`I KEMELER



Aral ten`izi ha`m aralqum sho`linin` son`g`ı 9 jıllıqta meteorologiyalıq

sharayatların tek g`ana Moynaq meteostantsiyasınan ko`riwge boladı. (keste 1).

Keste №1

Moynaq stantsiyasında hawanın` ortasha aylıq temperaturası °S esabında

Jıl lar	Aylar												ort. jıl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1990	-5,6	-3,7	6,4	13,3	20,0	27,4	27,6	25,7	21,1	10,6	4,6	-4,6	14,2
1991	-4,9	-5,6	0,3	14,1	19,3	26,3	28,1	24,6	19,3	13,4	4,3	-2,8	13,5
1992	-2,9	-2,1	-0,8	10,9	17,9	24,1	27,1	23,2	18,1	9,1	4,4	-1,3	11,8
1993	-4,8	-4,1	1,0	11,2	17,9	25,7	27,4	25,3	17,0	9,1	-4,8	-7,2	12,9
1994	-8,9	-9,9	-0,5	10,5	20,0	25,0	26,1	26,6	18,8	9,0	-0,4	-3,7	12,7
1995	-2,4	-0,3	3,1	17,5	20,4	26,6	28,7	26,4	18,6	10,4	7,3	-4,1	12,8
1996	-10,	-6,8	-1,9	9,6	20,8	26,6	28,2	24,1	19,2	10,5	1,3	-1,1	10,3
1997	-3,2	-2,3	6,3	16,3	21,2	27,7	28,5	26,6	19,2	15,8	-0,1	-4,8	12,6
1998	-9,8	-5,5	-0,5	13,0	19,7	28,6	30,0	26,0	19,7	10,7	2,5	-2,4	10,5
1999	-3,5	-1,9	1,8	13,2	19,0	25,1	27,6	28,8	19,0	19,7	1,0	-0,5	11,6
2000	-4,3	-0,4	5,2	18,9	19,5	25,7	28,4	28,6	19,3	7,3	1,0	-1,1	12,1

Aral tenizinin qurg'ag'an ultanının topıraqları o'zinin payda bolıwı jag'ınan ele jas bolıp esaplanadı. Bul jerdegi topıraqlardı payda etiwshi faktorlar olardıń rawajı xaqında A.A.Rafikov (1982), S.Kabulov (1990), B. Jolıbekov (1995) h.t.b. alımlardıń miynetlerinde orın alg'an.

Bul jerdegi izertlew jumıslarının na'tiyjesine ko're, bul topıraqlar son'gı on jıllıqta o'zinin baslang'ısh formasın endi qalıplestirgen bolıp esaplanadı. Qurg'ag'an ultandag'ı topıraklardı V.G.Popov ha'm V.E.Sektemenko to'mendegi tu'rlerge bo'ledi: avtomorflı shorlaqlı ha'm yarım avtomorflı, gidromorflı shorlaqlı ha'm yarım gidromorflı, qumlu topıraqlar.

Avtomorflı shorlaqlı topıraqlar Ajibay koltıg'ında payda bolıp ha'm en jayıp arqada kurg'ag'an akvatoriyada chink jag'alarınan akbulaq dar'yalıg'ına shekemgi ken'likte jaylaskan. Rayonda grunt suwlarının qa'ddi 0,5-3 m arqada jer betine jaqın jaylaskan, bul gidromorflı ha'm yarım gidromorflı shorlaqlardıń rawajlanıwında u'lken orın tutadı. Bul topıraqlardıń duzlılıq da'rejesin izertlegen V.E.Sektemenko xam T.M.Tayrovlar mag'lıwmatlarına qarag'anda ku'shli da'rejede duzlang'an. Duzlılıqtın darejesi 1-5 % ten 16-27 % aralıg'ında to'mengi gorizontlarda tez-tez belgilep teksergende 1-3 % ti quradı. Bular ha'zirgi ku'shli minerallasqan grunt suwlarının ta'sirinde qalıplesken. Bul duzlı topıraqlarda ha'r tu'rli duzlardıń tipi sul'fat-xlorid, natriy, kaltsiy ha'm magniy-natriyli bolıp tabıladı.

Gidromorflı ha'm yarım gidromorflı topıraqlarda grunt suwlarının qa'ddi jer betine 2-3 m jaqın jaylasqan. Bul jerlerde yarım gidromorflı al, jer betine 0-2 m jaqın jerlerde gidromorflı topıraqlar bar. Batısta u'stirt chinkinen ha'm Arxangelsk qalqanının, Ajibay koltıg'ı jag'alarınan arqada 50-60 km jerde gidromorflı ha'm yarım gidromorflı shorlaqlı topıraqlar tarqalg'an.

Batısında gidromorflı teniz boyı shorlaları Aqbulaq xam u'lkentumsıq mu'yisinen baslanadı. Bul jerde olar 6-8 km kenlikte tarkalgan. Bul jerdegi grunt suuları jer betinen 2-3 m teren'likte jaylasqan, minerallıq da'rejesi 35-56 g/l minerallıq tipi negizinen xloridli ha'm sulfat-xloridli bolıp esaplanadı.



Qumli topiraqlar jag`a boyında meridional bag`darda 50 km uzunlıqta tarkalg`an. Bul topiraqlardın` uzaq shıg`ısında ha`mme jerdi yarım avtomorflı topiraqlar iyelese, Arxangelsk qalqanı ha`m Erjan jerinde bo`linip qalg`an Jiltırbas ko`li a`tirapında gidromorflı topiraqlar tarqalg`an. Topiraqtın` joqarı gorizontında duzlılıq da`rejesi 0,2-0,4%, al absolyut ko`rsetkishi 1% ten aslamıraq. Bul jokarı gorizonttag`ı topiraqlardag`ı duzlar tipi anionlar: xloridli

sulfatli ha'm sulfatli bolip keledi.

O'simlikler landshafttag'i biotanın rawajlanıwında quramlıq bo'limi bolip esaplanadı ha'm onın atkaratug'ın funktsiyasında a'hmiyetli rol iyeleydi. Bul ko'z-qarastan alg'anda Aral ten'izinin kurg'ag'an bo'liminin ultanı ta'biyat laborotoriyasın elesletedi.

Juwmaqlap aytqanda, Aral tenizinin qa'ddinin ha'rekette bolıwı aridlik-zonallıqtın, gidromorflı ha'm avtomorflı topıraqlardıń tarqalıwında jer astı grunt suwları tiykarg'ı orın iyeleytug'ınlıg'ın bildik. Bul o'z gezeginde rayonda grunt suwlarının tarqalıwının topıraq qatlamının buzılıwı ha'm samal eroziyasına alıp keledi.

Araldın qurg'ag'an ultanında ta'biyiy ortalıqtın rawajlanıwında nızamlılıq ha'm aqırg'ı natiyjede topıraq ha'm o'simliktin zonallıq tipinin qa'liplesiwi haqqında A.Baxiev (1979), İ.P.Gerasimov (1983) ha'm S.Kabulov (1999) o'z jumıslarında jazg'an. Usıların ishinde İ.P.Gerasimov h.t.b. ilimpazlar izertlep, bunın rawajlanıwın etaplarg'a bo'lgan. Bular 6 etaptan ibarat: a'welgi eki etabında marshlıq ha'm ten'iz jag'alawı shorlaqlarının formalarının qa'liplesiwi bir jıllıq galofitli landshaftlardın rawajlanıwı u'ken rol oynaydı. Kelesi etapqa ten'izdin qurg'ag'anına 3-4 jıl bolg'an ha'm na'tiyjede qurg'ag'an joqarı qatlamda bir jıllıq galofitler ha'm ten'iz boyı shorlaqları bir qatar sho'lli kserofitlerde galofitli sistemanın ele qa'liplespegen tu'rleri kirgiziledi. To'rtinshi etapqa baslang'anına 4-5 jıl bolg'an juqa don jatqızıqları ha'm 5-7 jıl bolg'an, qıyın baslang'an sho'lli biokompleksler kiredi. Juqa don jatqızıqlarının mexanikalıq quramı kelip shıg'ıwı sho'lli kserofitler bolg'an ko'p jıllıq o'simlikler-tamariks, sarsazan ha'm psammofitler jatadı. Ilaylı-topıraqlı, ılaylı-qumlı jatqızıqlarda payda bolg'an shorlaqlar qatlamında sarsazanlar menen baylanıslı.

10-11 jıldan son 5 etap baslanadı. Bunda sho'l landshaftlarının ju'zege keliwi baslanadı. Ele donlı jatqızıqlı qumlar ha'm gruntlı topıraqlarda jaylaw-tog'ay fitotsenozlı elementleri menen ko'p jıllıq psammofil o'simlikleri rawajlanadı.

Ha'zirgi waqitta I.P.Gerasimovtın' bul boljawları tuwra keledi. Sebebi ten'izdin' qurg'awı 1980 jılları baslang'an ha'm 1980-90 jılları dawam etken, al 2000-jıllarg'a kelip qumlı-shorlaqlı maydanlardın' rawajlanıw protsesi bolıp o'tken ha'm qurg'ag'an bo'limnin' 50-80 % maydanında ha'zirgi waqitta ku'shli qurg'aqshılıq dawam etip atır. Bul qurg'ag'an maydanda 1990-2000 jılları ku'shli shorlanıw protsesi bolg'an ha'm tiykarınan bul jerde ten'iz boyı shorlaqlı forması qa'liplesken. Bul boljaw bolsa tolıg'ı menen o'zin-o'zi aqladı.

Ten'izdin' qurg'ag'an bo'liminde o'simlik du'n'yasının' qa'liplesiwı bul tiykarınan o'simliklerdin' qublada arqag'a qaray ha'reketi menen baylanıslı. U'stirt chinkleri jag'alarında qumlı plyajlarda aq seksewil tu'rleri o'sedi. Ko'plegen seksewil tu'rleri tarqalg'an. Ajibay qoltıg'ının' qublasında seksewiller 30 % ti quraydı. Bul jerde seksewıldin' tamariks, silen h.t.b. tu'rleri ushrasadı. Bular ishinde tamariks seksewilinin' uzınlıg'ı 1,5 m ge shekem jetedi. Bunnan basqa toran'g'ıl o'simlikler-qandım, aq seksewil h.t.b. lar jolbarıs quyrıg'ı yarım atawı ha'm Moynaq jag'alarında 5-6 km ken'lik boylap tarqalg'an.

Aral ten'izinin' qurg'ag'an ultanının' qurg'ag'an qubla bo'liminde aridlik sho'lleniw ayırıqsha ko'zge taslanadı. S.Kabulov h.t.b. lardın' (1999) mag'lıwmatlarına qarag'anda sho'lli o'simliklerdin' 59,6 % ti, toran'g'ıllıqlardın' 26,8 % ti, yarım-toran'g'ıllıqlardın' 12 % ti usı qurg'ag'an bo'limde tarqalg'an.

Birinshi anıq mag'lıwmatlarg'a tiykarlanıp jan'a tipli landshaftlardag'ı su't emiziwshilerdin' tarqalıwı haqqında E.V.Vostokov (1969), R.Reymov, S.K.Seytnazarovtın' (1995) h.t.b. ko'plegen alımlar jumıslarında gu'zetilgen. ubirden o'zgermeydi, yag'nıy sho'lli qumlar birden baslanbaydı.

Erjan ataw uchastkası buring'ı Jıltırbas qoltıg'ının' shıg'ıs bo'liminde jaylasqan. bul uchastka o'zinin' qumlı-shorlaqlı, qurg'aq ha'r tu'rli toran'g'ıllıqlar-tamariks, qarabaraq, ju'zgin, bayalısh seksewil menen belgili. Bul uchastka deltanın' oraylıq bo'liminde jaylasqan, bunda tiykarg'ı haywanat du'n'yası To'mengi A'miwda'ryanın' ten'iz boyı haywanat du'nyası ko'beygen.

Ajibay uchastkası deltanın` batus bo`liminde jaylasqan. Bul uchastkanın` qurg`ag`an ultanı-bul qumlu shorlaqlar tarqalg`an, qurg`aq toran`g`ıllıqlar ha`m sho`pler o`setug`ın rayon. Bul jerge kollektorlar arqalı Sudochenin` suwları ag`ıp keledi ha`m bunın` aqıbetinde su`t emiziwshilerdin` bir qatar tu`rlerinin` tarqalıwında qolaylı sharayatlardı tuwdıradı.

Regiondı topıraq-litologiyalıq ha`m fitotsenozlıq analizlewde tiykarınan 4 biotopqa bo`ledi (Reymov, Kenjebaev):

- 1) su`t emiziwshilerdin` 21 tu`ri bar, sonın` ishinde 8 kemiriwshi,
- 2) qumlıqlar, dyunalardag`ı tamariksler, ju`zgin h.b. ko`p jıllıq o`simlikler, bunda su`t emiziwshilerdin` 20 tu`ri, sonın` ishinde 9 kemiriwshi,
- 3) shorlaqlı tegislikler bunda kserofitli ha`m galofitli o`simlikler o`sedı. Bunda su`t emiziwshilerdin` 21 tu`ri, sonın` ishinde 10 kemiriwshi jatadı.
- 4) Magistral kollektorlarda, ıg`al jerlerdegi gidrofitli o`simlikler o`sedı. Bul jerde tiykarınan-ondatra, go`rtıshqanlar h.t.b. lar tarqalg`an.

Araldın` qurg`ag`an ultanındag`ı izertlenip aturg`an territoriylarda 25 tu`rden ko`p su`t emiziwshiler tarqalg`an. Bul jerdegi dizimge alıng`an 27 tu`ri, 5 otryad ha`m 11 semeystvog`a kiredi.

Tiykarg`ı ta`biyy faktorlardı kompleks analizlewdin` juwmag`ında, Aral ten`izinin` qubla bo`limindegi qurg`ag`an ultanının` landshaft genezisin belgilew, onın` landshaftın` qa`liplesiwinde ha`m rawajlanıwında baslı faktor bolıp esaplanadı. Bular klimatlıq (quyash radiatsiyası, samal ku`shi, atmosferalıq jawın-shashın), releflik, geologiyalıq-gidrologiyalıq ha`m o`simlik faktorları bolıp tabıladı.