

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ HÁM ORTA ARNAWLÍ
BILIMLENDIRIW MINISTRILIGI**

**ÁJINIYAZ ATINDAĞI NÓKIS MÁMLEKETLIK PEDAGOGIKALIQ
INSTITUTI**



Ximiya-biologiya fakulteti

Botanika, Ekologiya hám onı oqıtıw metodikası kafedrası
Zoologiya, adam morfofiziologiyası h'ám onı oqıtıw metodikası kafedrası

**5110400-biologiya oqıtıw metodikası tálim baǵdarı
4-kurs talabası Orınbaeva Tumaris Farxadovnanın**

PITKERIW QA'NIGELIK JUMISI

**TEMA: «HÁZIRGI EKOLOGIYALÍQ JAǵDAYLARDA DAWÍTKÓL AQ
AMUR BALÍǴÍ PARAZITLERI HÁM KESELLIKLERI»**

İlimiy basshısı prof.:

B. Allamuratov

Kafedra baslıǵı b.i.k., dots.:

F.Otenova

Kafedra baslıǵı b.i.k., dots.:

Sh.Allamuratov

Pitkeriw qánigelik jumisi Botanika, ekologiya hám onı oqıtıw metodikası kafedrası,
Zoologiya, adam morfofiziologiyası h'ám onı oqıtıw metodikası kafedralarınıń
2018jil _____ qospa májlisinde qaralip, №___ protokol menen qorǵawǵa ruxsat berildi.

Nókis-2018

M A Z M U N I

KIRISIW.....	3
I. TÚSLIK ARAL JAĞALAWINDAĞI DAWITKÓL SUW SAQLAĞISHINIŇ QISQASHA FIZIKALIQ HÁM GEOGRAFIYALIQ SIPATLAMASI.....	10
1.1. Ámiwdárya bassyini balıqların parazitologiyalıq izertlew tariyxı.....	20
II. IZERTLEW MATERIALI HÁM METODIKASI.....	24
III. AQ AMUR BALIĞINIŇ PARAZITLERINE SISTEMALIQ SHOLIW.....	28
3.1. Ápiwayılar (Protozoa) kishi dúnyası.....	30
3.2. Kóp kletkalılar (Metazoa) kishi dúnyası.....	34
3.3. Aq amur balığı parazitlerine akklimatizaciyanıń tásiiri.....	57
IV. AQ AMURDIŇ TIYKARĞI KESEL TUWDIRIWSHI PARAZITLERI ÓZGESHELIKLERI.....	59
JUWMAQLAW.....	70
ÓMIR QAWIPSIZLIGI.....	72
ÁDEBIYATLAR DIZIMI.....	79

KIRISIW

Ózbekstan Respublikasınıń birinshi Prezidenti, enciklopedist alım akademik I.A. Karimovtıń «XXI ásir bosaqasında qáwipsizlikke abay etiwler, progress shártleri hám kepillikleri» atlı kitabınıń 6-babında, ekologiya máselelerine ayrıqsha kewil awdarǵan. Bul kitapta jaslardı ekologiyalıq tárbiyaǵa shaqırıw basil orında turıptı. Sonıń ushın da, bizdi qorshap turǵan tábiyatqa ádeplilik penen, aqıl-parasatlılıq penen qatnas jasaw adamzattıń tiykarǵı pazıyleti bolıp, biz tábiyattan reyimlilik kútip otırmaymız, onnan qalay bolsa da alıw, biziń wazıypamız dep umtılw, jerde tirishiliktiń joyılıwına alıp keliw qáwipin tuwdıradı. Bizde dáryalar menen kóllerge tek izeykesh suwların aǵızıp ǵana qoymastan oǵan xlor, organikalıq zatlardı, pesticidlerdi, kanalizaciya suwların taslap qoydı. Bul ushın hesh kimniń hújdanı qıynalmadı.

Respublikamız Prezidenti SH. Mirziyoev óziniń sóylegen sózlerinde Aral boyı regionınıń rawajlanıwında Aral teńizi qurıwı aqıbetinde duzlanıw hám jerlerdiń degradaciyasına qarsı gúres, qorshaǵan ortalıqtı salamatlastırıw, regionda ekologiya hám klimat ózgerisiniń qolaysız tásin kemeyitiriw hám ekologiyalıq jaǵdaydı jaqsılaw boyınsha kóp wazıypalardı alǵa qoymaqta.

Sunday-aq, xalıqshıl prezidentimiz SH. Mirziyoev 2017-jıl 1-mayda «Balıqshılıq tarmaǵın basqarıw sistemasın jetilistiriw ilajları haqqında» ǵı qararında balıqshılıq tarmaǵın basqarıw sistemasın jetilistiriw, balıqshılıq hám balıq awlaw shólkemleriniń jumıs nátiyjeliligin arttırıw, onıń ónimlerin qayta islew boyınsha óndiris quralların keńeytiw, tábiyiy hám jasalma suw saqlaǵıshlarınan aqılǵa muwapıq paydalanıw, sunday-aq balıq jetistiriwdiń ilimiy tiykarlangan usılların hám intensiv texnologiyalardı engiziw máselelerin alǵa qoydı.

Adamlardı haqıyqiy ekolog yaǵnıy átiraptıń, suwdıń, hawanıń tazalıǵın saqlawǵa úyretiwimiz kerek. Ekologiyalıq tárbiya, bilim beriw Aral boyı xalıqlarınıń tirishilik etiwi hám ekologiyalıq apatshılıqtan qutılıwı ushın úlken

praktikalıq áhmiyeti bar. Sebebi, bul mäseleniń tórkini hám tiykarǵı principi, baǵdarları, bizdi qorshaǵan ortalıqtı pataslawdı hám buzıwdı boldırmaw, adamnıń barlıq iskerliklerin, ásirese qorshaǵan ortalıqqa tásir etiwdi aldın ala oylap kóriwdi talap etedi. Sonıń nátiyjesinde ekologiyalıq eski kóz qaraslardı jańartıwǵa tuwra keledi.

Adam óziniń tábiyat penen bir pútin ekenligin túsiniwi kerek. Adamnıń ómirindegi eń joqarı bahalıǵı tábiyatqa qatnası, joqarı sanalıqtı iyelewı bolıp esaplanadı. Al adamnıń tábiyattan bóliniwshiligi onıń morallıq krizisiniń gúwası bolıp, onıń tábiyatqa miyrimsiz qatnası jámiyetke de ótip, adamlardıń olardıń ózgeriwine, jalataylıq illetlerine alıp keledi.

Aral mashqalasınıń payda bolıwı hám unamsız kórinisler kesapatınan kelip shıǵıw sebepleri tiykarınan alıp qaraǵanda adamlardıń ózlerine de baylanıslı. Olar tábiyatqa itibarsızlıq penen qarap oǵan turpayı tásir ete otırıp, tábiyiy tirishilik ortalıǵınıń ózgeriwine alıp keldi. Dáriyalardıń suw aydınlarınıń gidro rejimlerin ózgertiw arqalı jer betinde kól, teńiz dógereklerinde duzlardıń kóbeyiwlerine, suwlardıń duzlanıwlarına, jańa sahralardıń payda bolıwına, duzlı-shańǵıtlı dawıllardıń kelip shıǵıwına, al óz gezeginde suw hám jerdiń ekosistemasınıń biologiyalıq ónimdarlıǵınıń buzılıwına alıp keldi. Bul adamǵa óziniń jasawı ushın zárúrli bolǵan dushshı suw, taza hawa, taza awqat derekleriniń buzılıwına, solay etip, adamnıń ómiriniń zıyanlanıwına tiykar saladı.

Demek, ekologiya hám etikanıń óz ara baylanısın dáliyllew ádep-ikramlı sananı ekologiya menen biriktiriw hám ekologiyalıq tárbiya, bilim beriw Aral boyı xalıqlarınıń sanasına engiziw, ómirinde jasawı hám ekologiyalıq apatshılıqtan qutılıwı ushın da úlken praktikalıq áhmiyeti bar.

Eń baslısı adam óziniń tábiyat penen bir pútin ekenligin túsiniwi kerek. Adam tirishiligindegi eń joqarı bahalıǵı onıń tábiyatqa jaqsı qatnasta bolıwı, joqarı sanalıqtı iyelewı bolıp esaplanadı.

Bul baǵdarda Ózbekstan Respublikası Ilimler Akademiyasınıń Qaraqalpaqstan bólimi ádewir jumıs isledi. Máselen, 1989-1990-jıllarda ilimpazlar YUNEP tiń tapsırması boyınsha «Aral apatshılıǵı boyınsha diagnostikalıq hújjet» islep shıqtı, bul 1994-jılǵa deyin jer júzlik banktiń Aral mashqalasın sheshiwge finans qarjıların ajratıw ushın tiykar boldı. Qaraqalpaq ilimpazları islep shıqqan kóp muǵdardaǵı usınısları «Aral teńizi basseyininde ekologiyalıq jaǵdaydı jaqsılaw boyınsha ayqın háreketlerdiń programmasına» (1994) kirdi. Bul hújjetke Ámiwdáryanıń ayaq betindegi jaylasqan Qaraqalpaqstan ushın programma – 3 turmıslıq áhmiyetke iye boldı, ol kóp minerallasqan hám pataslangan – kollektor-drenaj suwların hám úy-xojalıǵı suwlarınıń turmıs qaldıqlarınıń dáryaǵa aǵızlawǵa qaratıldı.

Tilekke qarsı bul programma áste aqırınlıq penen orınlanbaqta. Elimizdi taza awız suw menen támiyinlew mashqalası, bul genofondtı saqlaw mashqalası hám Aral boylarında dagdarıslı jaǵdaylarda jasap atırǵan adamlar kelesi áwladlardıń keleshegi degen edi.

Házirgi waqıtta tábiyiy deltanıń (úshmúyeshliktiń) ornına bizler jasalma túrde dúzilgen deltaǵa iyemiz, onı suw menen támiyinlew Qızketken, Súwenli hám risoviy kanallarınıń úsh tiykarǵı iri sisteması boyınsha ámelge asırılıp atır. Usı kanallardıń rejimin retlestire otırıp, Ámiwdárya deltasındaǵı ıǵallıqtıń hár qıylı zonalarınıń dúziliwine erisiw múmkin. Al, endi qollanılatuǵın programmanıń birinshi fazasında Ámiwdáryanıń aǵısın Taxiýatash plotinasınan da basqarıw múmkinshiligi haqqında ayqın hesh nárese ayılmaǵan. Sonlıqtan da bizler Túyemoyın hám Taxiýatash platinasınan suw qorların nátiyjeli basqarıwǵa alternativa joq, dep esaplaymız. Bul usınıs jer júzlik bank islep shıqqan programma menen islenip otır. Bank 2000 jılǵa deyin, háreket etiw programmasın islep shıqqan. Ol tómendegi úsh baǵdardı óz ishine aladı, birinshisi – plotinalar hám suw saqlaǵıshlar mámleketler aralıq kelisimler tiykarında paydalanıwı tiyis,

ekinshi – suw qorlarınan aqılǵa muwapıq hám únemlep paydalanıw, úshinshisi – suwdıń dúzlanıwına qarsı gúresiń. Usı shártler orınlangan jaǵdayda donor mámleketler investiciyaların kóbeytiwi múmkin. Bunda Jer Júzlik bank jaqın bes jılda usı programmanı orınlawǵa 380 million dollar investiciya beriwge kelisip otır. Mine bulardan basqa da biziń regionımızda yaǵniy Ámiwdáryanıń quyar jerindegi kóp ǵana kól, zalivlerdi suwlandırıw hám balıqtı qoldan ósiretuǵın balıq hawız xojalıǵın shólkemlestiriw kózde tutılıp otır. Aral teńizine qolda bar Ámiwdárya suwın jibere bergen menen onı toltırıw múmkin emes. Sol sebepten Porlıtawdan Ámiwdıń ayaǵı Damba menen baylangan. Qolda bar múmkinshilikti suwlardı sol jerge jaqın kóllerge: shege, kóksuw, maqpal kóllerine jiberip, olardı toltırıw kózde tutılǵan. Aral teńiziniń Zalivleri Moynaq, Sarbaslardı suwlandırıw kózde tutılmaqta. Lenin kanalı arqalı Sudoche kóllerin suwlandırıw kózde tutılmaqta. Qıpshaqdárya hám Ámiwdárya arqalı Domalaq kóllerin suwlandırıw, Qazaqdárya kanalı arqalı Jaltırbas zalivlerin hám solarga jaqın kóllerdi suwlandırıw kózde tutılmaqta. Dawıtkól suw saqlaǵışın suwlandırıw shıǵıs Qarateren kóllerin suwlandırıw Qojakól-Qaradjar kól sistemaların suwlandırıw kerek. Sonda ǵana malǵa ot-shóp mol kógeredi. Ásirese, balıqshılıqtı bunnan bılay da rawajlandırıwǵa úlken múmkinshilikler ashıladı. Joqarıdaǵı atı atalǵan kóllerde, kanallarda, izeykeshlerde taǵı basqa suw jaylımlarında júdá tıǵız hám biyik bolıp qamıs, jeken, qalıń bolıp shalan ósedı. Bunday shópler tıǵız bolǵanlıqtan suwdaǵı erigen kislorodlardı azaytadı, ondaǵı suw haywanlarınń ósip, kóbeyip rawajlanıwına kerı tásirin tiygizedi. Sol sebepli bunday qamıslardı shabıw kerek, kanallardı tazalaw kerek, sonda suwdıń aǵıwı jaqsılanadı. Bunday qıyın jumıstı islew ushın bir qansha mexanizm hám kóp ǵárezet kerek boladı. Sol sebepli usı pitkeriw qanıygelik jumısında, usınday kanallardı (vodoemlardı) tazalaw ushın bul vodoemlardı suwlandırıwdı hám bularǵa Aq amur balıǵın jiberiwdi usınaman. Aq amur balıǵı iri ot-shóplerdi jep meliorator xızmetin atqaradı. Men ózimniń

pitkeriw qániygelik jumısında usı Aq amurdıń búgingi ekologiyalıq jaǵdayda parazitofawnasın tekseriwdi ózimniń aldına maqset etip qoydım.

Aral mashqalası biziń planetamızdaǵı jigirmalanshı ásirdegi eń úlken ekologiyalıq apatshılıqtıń biri. Teńiz qáddiniń 16 metrden artıq tómencelewı hám onıń suwınıń duzlılıǵı bir litrge 44 gramm dárejesine jetiwi, teńiz ultanınan 3.4 million gektar jer suwdan ashılıp, kebirlikke, duz aralas Aralqum shólistanlıǵına aynalıwı biziń tábiyiy ortalıǵımızǵa, ekonomikamızǵa, sociallıq turmısımızǵa zıyanın tiygizbekte. Usı teńizden bosaǵan keń kólemdegi duzlıqlardan samal dúbeleydiń kúshi menen duzlı shańǵıtlar kóterilip egislik maydanlarǵa, otaqlı jerlerge taralmaqta. Ol tozańlar hár jılı Qaraqalpaqstan aymaǵına 44 million tonna duzlı shańǵıttı, yaǵnıy ortasha 1 ge jerge 1 tonnadan 3 tonnaǵa deyin duzdı shashadı. Sonıń menen bir qatarda jerdi duzlı suw menen suwǵarıwdıń saldarınan úlkemizdegi egislik jerler duz benen toyingan. Nátiyjede, jerimizdiń 80 procenti kúshli kebir ashqan. Bul qubılıslardıń barlıǵı Qaraqalpaqstan genefondına jaǵımsız tásir etip, florası menen faunasınıń hálsirep, azayıwına alıp keldi.

Usı joqarıda ekologiyalıq ózgerislerge baylanıslı Ózbekstan hám Qaraqalpaqstanda tez pát penen hawız xojalıǵın rawajlandırıp, balıqlardı qoldan ósiriwge úlken kewil bólinbekte. Usıǵan baylanıslı Ámiwdáryanıń bir qansha jerinen Nurek, Túyemoyın suw saqlaǵıshları, Taxiýatash gidrouzli, Qaraqum, Ámiw-buxar hám basqa da kanallar tartılıp, egislik jerlerdiń kólemi keńeyip, Ámiwdáryanıń deltasına suwdıń kelip túsiwi kemeydi, bul balıqshılıqtı rawajlandırıwǵa kerı tásirin tiygizbekte. Bir qansha túrli balıqlar joq bolıp ketti, bir qanshasınıń sanı azaydı. Balıqlardıń uwıldırıq shashatuǵın orınları (suw jayılmaları) kewip ketiwine baylanıslı olardıń zapası azaymaqta. Kollektor, kanallardıń suwlarınıń duzlılıǵı kóterilip ketiwine baylanıslı, balıqlardıń uwıldırıǵı shashqan menen rawajlanbaydı.

Awıl xojalıǵın bunnan bılayda rawajlandırıwda húkimetimiz xalıq aldına úlken wazıypa etip qoymaqta. Awıl xojalıǵın rawajlandırıwdıń bir tarawı sharwashılıq bolıp, al sharwashılıqtıń bir bólimi balıqshılıq bolıp esaplanadı. Xalqımız ushın balıqshılıqtıń áhmiyeti oǵada ullı. Balıqtıń góshinen adamǵa kerekli azıq-awqattan bir neshe túrleri alınadı. Sonıń menen birge balıqtıń góshinde adamnıń den sawlıǵı ushın zárúr bolǵan vitaminlerdiń kóp ekenligin bizler bilemiz. Ásirese, balıqtıń mayı medicinada keńnen qollanılıp, kesel adamlarǵa ishkiziledi. Qansha ekologiyalıq qıyın jaǵday bolıwına qaramastan balıqshılıqtı rawajlandırıw ushın Qaraqalpaqstannıń vodoyomları kóp, kól, dárya, kollektor, háwiz xojalıǵın shólkemlestiriw hám onıń tábiyatı, klimat jaǵdayları basqa respublikalarǵa qaraǵanda júdáqolaylı bolıp esaplanadı. Sonlıqtan da, Respublikamızda balıqtı órshitiw isine keying jılları úlken áhmiyet bermekte. Házirgi waqıtta solardıń ishinen Dawıtkól suw saqlaǵıshı úlken áhmiyetke iye.

Moynaq rayonınan burınǵı teńizdiń qoltıqları bolǵan Sarbas, Moynaq hám Sudochelerden, ulıwma kólemi 54 mıńǵa, balıqtı ósiretuǵın háwiziniń maydanı 800ge bolatuǵın balıq xojalıǵın shólkemlestiriw kózde tutılmaqta. Balıqtıń zapasın arttırwda awlanatuǵın balıqlardıń ónimdarlıǵı parazitleri hám keselliklerin saplastırıwǵa baylanıslı.

Keying jılları ilimpazlardıń izertlegen suwlarındaǵı balıqlardıń hár túrli sistematikalıq toparlarǵa kiretuǵın 300 ge shamalas parazittiń túrleri tabıldı. Olardıń balıqlarda ushırasıw jiyililigi ziyan keltiriw dárejesi, ekologiyalıq hám antropogenlik faktorlardıń tásirinde parazitler faunasınıń ózgeriw xarakterin úyrendi. Ilimpazlar usı maǵlıwmatlardıń tiykarında zıyanlı hám kóp taralǵan parazitlerdiń sanın sheklew, qáwipli kesellikler menen gúresiw jolların islep shıqpaqta. Bul ilajlardı ámelde qollanıw arqalı unamlı nátiyjeler alındı. Solay etip ózleriniń dóretken ilimiy miynetleri menen Qaraqalpaqstan iliminiń rawajlanıwına belgili úlesin qosıp kelmekte. Ol parazitler hár jılı balıqlardıń shabaǵın, júdá kóp

muǵdarda qırıp jiberedi. Sol sebepli men ózimniń pitkeriw qániygelik jumısında usı parazitlik jol menen tirishilik etetuǵın parazitlerdi tereńirek úyreniwdi maqset etip qoydım.

Dawıtkól suw saqlaǵışında aq amurdıń parazitleri, burınları izertlenilmegen, sol sebepli, házirgi ekologiyalıq ózgerislerdi esapqa ala otırıp, men usı temanı pitkeriw qánigelik jumısım ushın alıp otırman.

Meniń qániygelik pitkeriw jumısımniń wazıypası tómendegilerden ibarat:

1. Dawıtkól suw saqlaǵışındaǵı aq amurdıń parazitlik jol menen tirishilik etetuǵın parazitleriniń túrin anıqlaw.
2. Aq amurdıń parazitleriniń házirgi jaǵdayda ekologiyalıq ózgerislerin dáliyillew haqqında.
3. Aq amurdıń tiykargı kesellikleri, olardı shaqırıwshı parazitler hám olar menen qarsı gúres jolları.

Qısqasha juwmaqlaw hám t.b.

I-bap. Túslik Aral jaǵalawındaǵı Dawatkól suw saqlaǵıshınıń qısqasha fizikalıq hám geografiyalıq sıpatlaması.

Pitkeriw qániygelik jumıstıń bul bóliminde Túslik Aralǵa hám sonıń ishinde Dawatkól suw saqlaǵıshına, qısqasha fizika hám geografiyalıq sıpatlama berilgen.

Keyingi (1995-2017-jj.) Qaraqalpaqstannıń klimatınıń bir qansha ózgergenligi hámmege belgili. Qıs aylarında hawa rayı ózgerip tómelenip ketti (25-30 gradus C), jaz aylarında hawa qurǵaq, hawanıń temperaturası joqarı (40-43 gradus C). hawanıń ıǵallıǵı ortasha 20-30%, ayırım kúnleri 8-12% ke shekem boladı.

Túslik Aral boyı ushın tegislik relefi xarakterli bolıp, tolıǵı menen shól zonasında jaylasqan. Territoriyanıń tegisli qaldıq tóbeshikler menen buzıladı (Qızıljar, Qusqanataw, Porlıtaw). Olardıń biyikligi 123 metrden aspaydı. Aral krizisi teńizge Ámiwdárya hám Sırdáryanıń kelip quymawı nátiyjesinde keskinlesip ketti. Aral teńizi ólmekte. Onın quwarıp qalǵan túbinen úzliksiz úlken massadaǵı (mln. tonna) duzlı shańlar kóterilmekte. Bul shańlar topıraqtı shorlandırmaqtı, birinshi gezekte Aral aldı jer massivleri shorlaanbaqtı. Klimat ózgerdi. Ol burınǵıdan da keskinlesti, yaǵnıy, qısı jáne de suwıq, jazı qattı ıssı boldı. Araldıń ixtiofanası joq bolıw aldında tur.

Aral krizisi – bul tek teńizdiń óliwiniń juwmaǵı emes. Bul Ámiwdáriya hám Sırdárya dáryalarınıń ańǵarına kollektor-drenaj suwlarınıń suwǵarıwǵa quyılıwınan da bolıp otır. Sebebi, pataslanǵan suw tuwrıdan-tuwrı Aral teńizine quymay, deltadaǵı jerlerdi suwǵarıwǵa jumsaladı hámde barlıq duz, pesticide, gerbicide atız hám kóllerde jıynaladı. Topıraqtıń shorlanıwı nátiyjesinde awıl xojalıǵınıń ónimdarlılıǵı páseyedi. Ximikatlar menen záhárlengen dárya suwı adamlar, flora hám faunanı záhárlmekte. Bulardıń barlıǵı tómengi Ámiwdárya hám Sırdáryanıń xalqınıń jasawjaǵdayınıń tómeleniwine alıp keldi.

Aral krizisiniń aqıbetin jeńilletiw ushın birinshiden teńiz qáddin 37-38 metr tereńligin saqlap turıwı kerek. Bunıń ushın ortesha jılına 25-30 metr suwdı Oraylıq Aziya respublikalarınıń ishki resurslarınıń esabınan berip turıw kerek. Ekinshiden kollektor drenaj suwların Ámiwdárya hám Sırdárya ańǵarları arqalı aǵızıw. Biraqta Aral mashqalasın sheshiw ushın bul usınılǵan sharalardı orınlawǵa kop waqıt talap etiledi. Bizler Ámiwdárya hám Sırdárya dáryalarınıń aǵısların antropogenlik qısqartıw nátiyjesinde Araldıń katastrofalıq qurıwına alıp kelgenliginiń gúwasımız. Tariyxta birinshi mártebe bir áwladtıń kóz aldında tolıq teńiz joq bolmaqta.

Aral teńiziniń ekologiyalıq katastrofası regiondaǵı jasaw sapasına jaman tásir kórsetpekte, biraq bul regionnıń bala hám analarına jaman tásir etiwshi birden-bir faktor emes. Sonday-aq, finans hám sociallıq jáne de ekonomikalıq qıyınshılıqlardıń bolıwı ekologiyalıq faktorlar menen birge usı gruppadaǵı jasawı hám den sawlıǵına aytarlıqtay qáwip tuwdırmaqta. Házirgi waqıtta finans materiallıq zatlardıń jetispewi ulıwma den sawlıqtıń bilimlendiriwdiń suw menen támiyinlewdiń sanitariyanıń páseńlep ketiwine alıp keldi.

Aral teńiziniń azıqlanıwı Ámiwdárya hám Sırdárya esabınan 60-jıllardıń basınan baslap olardıń suwları ózlestirilgen jer massivlerin suwǵarıw ushın kennen paydalanıldı. Aqıbetinde 1960-jıllardan baslap Aralǵa quyılatuǵın suw muǵdarı keskin qısqardı. 1973-jıldan soń Sırdáryanıń suwı tenizge túsiwin toqtattı, al Ámiwdárya aǵısınıń kólemi 75% ke qısqardı. 80-jıllardıń basına kelip Aral teńiziniń maydanı 15.4 mın. kv. km ge qısqardı, al suwdıń kólemi 486 km³ qısqarıp suwdıń sostavındaǵı duz 19-20% qurap, jaǵalawı 10-60 km sheginip ketti. 80-jıllardaǵı Araldı qutqarıw ushın kórilgen sharalar aytarlıqtay dárejedegi juwmaqlardı bermedi. Pataslanǵan drenaj suwların dáryaǵa aǵızıwǵa baylanıslı Sırdáryanıń ańǵarı kómilip qaldı. Tazalawshı qurılımlardıń, olardıń qurılısı ushın aqshanıń bolmawı dárya suwınıń sapasınıń jaqsılanbaytuǵınlıǵınanderek beredi. Dáryanıń kómilip qalıwı nátiyjesinde suwdıń teńizge qaray aǵıw mumkinshiligi

páseyip báhárde dáyanıń dógeregindegi xalıqqa hám kóllerge suw tasıwınıń nátiyjesinde úlken zıyan keltiredi. Aral teńiziniń túbiniń ashılıp qalıwı, kóplegen maydanlarınıń topıraǵınıń shorlanıwına duzlar kóterilmekte. Hátteki, mallardı suwǵarıw ushın paydalanılatuǵın artizan skvajına suwları da duzlı bolıp shıqpaqta. Bul, álbette, qoylardıń, mallardıń ónimdarlıǵınıń páseyiwine hám awıllarınıń kóbeyiwine alıp keledi.

Aral katastrofası jergilikli xalıqtıń tradiciyalı iskerligindegi yaǵnıy balıq awlaw, balıqtı qayta islew sıyaqlı tarawınıń keskin qısqarıwına alıp keldi. 1936-1966-jıllar aralıǵında Aral teńizi basseyini dárya deltasın hám deltadaǵı kóllerdi qosqanda Burınǵı Awqamdaǵı awlanatuǵın bahalı balıq túrleriniń 11-13% berip turdı. 1960-jılı jılına 45 mın tonnanı quradı. 1972-jılı bul kórsetkish 17 mın tonnaǵa, al 1990-jılı nolge teń boldı. Túslik Aral miynetkeshleri Nókiste 1995-jılı bolıp ótken B.M.SH. nıń xalıq aralıq konferenciyasınıń hám Oraylıq Aziya mámleketleriniń Nókis deklaraciyasınıń, sonday-aq, Aral teńizi basseyini turaqlı rawajlandırıw probleması menen shuǵıllanıwshı xalıq aralıq, shólkemlerdin ekologiyalıq deklaraciyanı jaqsılaw sheshimlerinden úlken úmit kútpekte. Álbette, bul úmitler órinlanıwı kerek. Aral ekologiyalıq katastrofası regionnıń organikalıq hám bioorganikalıq dúnyasında globalıq ózgerislerdi keltirip shıǵardı. Ámiwdárya hám Sırdárya iri texnikalıq qurılmalar qurıldı. 80-jıllardan baslap Aral teńizine dárya suwın quyıwdı toqtattı, sonıń aqıbetinde teńiz ekvatoriyası 60% ke qısqardı, ol eki bólimge bólini, 5 million hektor teńiz ultanı qurǵap ketti. Qurǵaǵan ultanda 10 million tonna duz jıynalǵan, teńiz suwınıń mineralizaciyası 40% ke jetti. Teńizde tek-aborigen balıqlardıń azǵanası qalǵan. Duzlı shańlar atmosferaǵa jılına 10-12 ret kóterilip samal menen Aral boyı regionına kelip túspekte. Nátiyjesinde 0,5 million hektardan aslam jaylaw xat otaqlar degradaciyalandı, bul jaylawlar mal sharwashılıǵında arzan tábiyiy ot-jem deregi bolıp esaplanadı. Suwǵarılatuǵın jerler suwǵarıw nátiyjesinde ekinshi márte duzlanıwdı basınan ótkermekte.

Bunıń aqıbetinde Qaraqalpaqstan Respublikasınıń 3/1 paxtashılıq jeriniń maydanına teń bolǵan 70 mıń gektar suwǵarılıp egiletuǵın jer awıl xojalıǵınan shıǵıp qaldı. Ekologiyalıq apatshılıq mal sharwashılıǵınıń rawajlanıwına da keri tásirin kórsetti. Ósimlik qatlamı degradaciya hám destrukciyaǵa ushıradı. Ot-jem derekleri keskin qısqardı. Haywanlardıń ónimdarlıǵı tómenledi, mallardıń bas sanı qısqardı. Ekologiyalıq katastrofa balıqlardıń hám awıl xojalıq haywanlarınıń awırıwın, ásirese, gelmintoz awırıwın keskinlestirdi. Biogelmindlerdiń kóbeyiwi ushın biotikalıq hám abiotikalıq qolaylı shárayatlar dúzildi. Túyemoyın awıl xojalıǵınan hám kommunalıq paydalanıwdaǵı suw kólge, jaylawlarǵa hám otlaqlarǵa aǵızıldı. Bunnan basqa jer astı hám salı atızlarınan shıqqan magistrallıq kollektorlar arqalı sol tárepke qaray baǵdarlangan.

1991-1994-jıllarda Ámiwdárya aǵısı Taxiataş gidrouzelinen ortasha jılına 20-28 km³ suw aǵıp ótedi, biraq bul suw Aral teńizine shekem jetip barmaydı. Kóldiń hám mayda suw saqlanatuǵın orınlardıń toltırılıwı otlaq hám jaylawlardıń ızǵarlanıwı jerdiń batpaqqa aylanıwı keń kólemdegi salı maydanlardıń keńeytiriliwi kóp sandaǵı malyuskalardıń biotoplarınıń payda bolıwına alıp keldi.

Ámiwdárya deltasınıń eń kóp taralǵan ósimliklerdiń tábiyiy tiplerine suwlı, batpaqlı togay hám golafid jatadı. Tómengi Ámiwdáryanıń batpaqlıq ósimlikleri 3 ekologiyalıq gruppaları menen kórsetilgen. Birinshi gruppanı – suw ústi makrofidleri qurap, solardıń ishinde áhmiyetlileri ápiwayı qamıs (*phragmites communis*). Ekinshi gruppa – júzip júriwshi ósimliklerden quralıp, tiykarınan suw salvini – paprotniginen (*Salvinia natans*), aq quvshin (*Nymphaea candidapresi*) hám jer suw greshkası kiredi (*Polygonum amphiliuml*), úшінshi gruppaǵa – suwdıń túbine shógetuǵın ósimlikler yaǵnıy jergilikli til menen shalan dep atalıwshı ósimlikler kiredi. Tómengi Ámiwdáryanıń haywanat dúnyası hár qıylı bay, kaban, túlki, porsıq, shaǵal hám taǵı basqalar, kemiriwshilerden úy tıshqanı hám křisa, al mamıq júnli haywanlardan andatra hám nutriya jaqsı

aklimatizatsiyalangan edi. Ayırım xojalıqlarda kletkalarda saqlanıp Amerika norkası kóbeyttilirgen edi. A.M. Mambet Jumaevtıń (1995) maǵlıwmatı boyınsha Túslik Aral boyında quslardıń 346 túri hám kishi túri anıqlangan, bular 19 otrıad, 18 semeystvoǵa jatadı. 5 otr-tın wákilinen, sonıń 30 ı balıq jewshi quslarǵa jatadı. Kólde ósiwshi nart qamıslardıń arasınan, aq qutan, bir qazanlar hám t.b. uylar salıp atır. Jer bawırlawshılardıń bir (túri) wákili jer suw haywanlardan eki túri jasıl jaba hám kól baqası.


Túslik Aral boyı hawızlerinde sol waqıtlarda 40 nan aslam balıq túri bolǵan. (Berg 1949, Shaposhnikov 1950, Tlewov 1984) olar 8-semeystvoǵa jatadı. Solardıń óndiriletuǵınları: sazan, jerek, sudak, som, lesh, krsnoperka hám taǵı da basqalar. Akklimatizatsiyalangan balıqlardan bul jerde aq amur hám hár qıylı tostolobik, jılan bas hám t.b. balıqlar gezlesedi.

Tiykarınan bizlerdıń stacionar ornımız Dawıtkól suw saqlaǵıshı boldı. Dawıtkól suw saqlaǵısh (1,2-sxema), Dawıtkól sistemasındaǵı kól ekige: úlken hám kishkene (házirgi suw saqlaǵıshı) bolıp bólinedi. Ol Ámiwdáryanıń tómengi deltasınıń qubla oń tárepinde jaylasqan. Dawıtkól suw saqlaǵıshı Qaraqalpaqstannıń Bozataw territoriyasında Nókistiń arqa-batısında 40 km den aslamıraq aralıqta jaylasqan. Ádebiyatlardaǵı maǵlıwmatlardı salıstıra otırıp onı Ámiwdáryanıń úzilip qalıw nátiyjesinde payda bolǵan dep esaplawǵa boladı. Kóldiń azıqlanıwı Shortanbay, Tólegen jap, Katira tarmaqlarınan suw alıw arqalı ámelge asıp otırdı. Bul kanallar Dawıtkól sisteması arqalı ótip, kóldi suw menen támiyinleydi. Dawıtkól sistemasına 20 dan aslam kóller kirip, olardan irilerinen Andrey kól, Aqbashlı kól, Biyday kól, Birqazan kól, Allanazar kól, Saloy kól, Dawıt kól, Bashirshiyor kól, Qaraaydın kól, Xoja kól hám Kók suw. Dawıt kól ssisteması 1969-jılı suw saqlaǵıshqa aylandırıldı. Suw saqlaǵıshtıń arqa-batıs jaǵalawı ózi menen birge Erkindáryanıń qurǵaq ańǵarın súwretleydi. Qalǵan jaǵalawları 3.5 metr bálentlikke, 4 metr keńlikke iye tóbeshiklerden ibarat edi.


Suw saqlaǵıstıń jaǵalawlarınıń uzınlıǵı 64 km, relefi burınǵısınsha 20 laǵan kóldiń jatqızıqları menen shuqırılıqlarınan ibarat bolǵan edi. Plaslar bir-biri menen qalay baylanısıp turǵan bolsa solayınsha baylanısqan.

Suw saqlaǵıstıń kóller suw sistemasınan ózgesheligi suwdıń kólemi hám aǵıwı kóbeyttiliwinde. Maksimal toltırılǵanında Dawıtkól suw saqlaǵışınıń maydanı 2000 km di quraydı (Embergenov, 1970-jıl). Suw saqlaǵıstıń qáddi Ámiwdáryanıń suw toplaw rejiminen ǵárezli bolıp turaqlı emes. Házirgi waqıtta Dawıtkól suw saqlaǵışı I-II Qarabek-yarımsh kanalı arqalı túskendey boladı. Suw saqlaǵıstıń suwları arqa-batis shetinde Erkindárya kanalları arqalı jerlerdi suwǵarıwǵa alınǵan. Suw saqlaǵıstıń bálentligin 1. 5-4 metrge shekem bolǵan qamıs hám trosnikler iyelep jatır edi. Jazǵı dáwirlerde háwizlerde suwda ósetuǵın ósimlik túrleri intensive rawajlanǵan edi. Suw saqlaǵıstıń eń tereń jeri suw toıl bolǵan jaǵdayda 8 metrge shekem jetedi. Dawıtkól sistemasınıń suwınıń tınıqlıǵı 3-4 metrge shekem jetken edi. D.Eshimbaevtıń (1987) Dawıtkól suw saqlaǵışınıń gidroximiyalıq jaǵdayı 1964-jıldan baslap izertlenip kiyatır. Jıldan-jılǵa bul suw saqlaǵıstıń suwınıń duzlılıǵı kóterilip kiyatırǵanlıǵı málim. Dawıtkól suw saqlaǵışınıń Kóksuw aydınındaǵı suwınıń duzlılıǵı 1965-jılı 0.8 g/l bolǵan bolsa, al 1979-jılı 1.4 g/l, 1984-jılı 2.0 g/l ósip jetti.

ÁMIWDÁRYA DELTASÍNÍN SXEMATIKALÍQ KARTASÍ



DAWÍTKÓL SUW SAQLAĞÍSHÍNÍN SXEMALÍQ ULÍWMA KÓRINISI



Al, 1998-jılǵı menıń pitkeriw qánigelik jumısım ushın Dawıtkól suw saqlaǵıshınan alıp izertlengen suwdıń duzlılıǵı 2.5-3 g/l boldı. Kóllerdiń ústin muz qaplaǵan waqıtlarda muzdıń astındaǵı suwdıń kislorod muǵdarı azayadı. Jaz hám gúzgi waqıtlarda fotosintez arqalı kislorodtıń muǵdarın asıradı (120-125%). Gúzde suwdıń saqlanıwı menen temperaturanıń teńlesiwi menen barlıq tereńlikte kislorodtıń quramı kóteriledi hám bir qalıpte turadı. Kóldiń ultanı ventos organizmlerdi jaqsı rawajlangan qalınlıǵına qaray qatlamı menen qaplangan. S. Embergenovtıń, H.Z. Kusaynovanıń 1971-jılǵı maǵlıwmatları boyınsha kók suwda 7 tipke jatıwshı 59 semeystvanıń 192 túrdegi hám formadaǵı omırtqasızlardıń bar ekenligi atap ayılǵan.

Dawıtkóli planktonında 20 semeystvanıń omırtqasızlardıń 85 túri hám forması belgili. Solardan 22 kók suwǵa tán. G.K. Shaposhnikova 1950-jılı Dawıtkól kólindegi 20 balıq túrin kórsetedi. Házirgi waqıtta bul suw saqlaǵıshta 20 dan aslam balıq túri jasaydı (Tlewov, 1981). Suw saqlaǵıshtan Shuka flotova Yaz Krasno ferka, Karas, sazan, lesh, som t.b. balıqlar awlanadı. Sonday-aq, balıq awlaw waqtında Amur, tolstolobik, jılanbas hám t.b. gezlesedi. Dawıtkól suw saqlaǵıshı úlkenbalıq xojalıǵın áhmiyetine iye. On birinshi besinshi jıllarda suw qanaatlandırarlıq bolmaǵan jaǵdayda 5-0.2 cent balıq awlandı. Parazitologiyalıq izertlew ushın material Krasnoferka birneshe háwizlerden tabıldı. Solardıń ishinde aytarlıqtay orındı kóksuw iyeleydi. Bul háwizge qısqasha xarakteristika jazǵanımızda ózimizden tısqarı S. Embergenov, N.Z. Kusaynova 1971, Tlewov 1980, E. Astanovanıń h.t.b. maǵlıwmatlarınan paydalandıq. Kók suwdıń maydanı 11 mıń. kub. Bolıp, eń tereń jeri 4 metr, ol suw saqlaǵıshtıń eń arqasında jaylasqan bolıp, óziniń sezilerli dárejedegi shegarasına iye. Arqa hám Arqa shıǵıs jaǵalawları dandıǵa shekem barıp tur. Eń batıs shetinen okeden ózegi ótedi, qublasında qara aydın menen shegaralasadı. Suw ósimliklerinen trosnik, pogilesnik, jıltırawıq rdest h.t.b. gezlesedi.

Dawıtkól suw saqlaǵısh plangtonında hár qıylı izertlewler nátiyjesinde 20 semestvaniń 85 túrindegi omırtqasızları tabıldı, sonnan 22 kók suw ushın belgili. Sonı da atap ótiw kerek, onıń biomassasınıń 87% tómén rashkiler qurap balıqlar ushın, joqarı koloriyalı jem rolin atqaradı. S. Embergenov, N. Kusayonovaniń (1971) maǵlıwmatları boyınsha makrozoventosında 7-tipke jatiwshı 59 semeystvoniń 192 túri hám formasındaǵı omırtqasızlar bar ekenligi kórsetilgen. Sonnan 184 túri kók suw ushın xarakterli hám 121 turi tómengi Ámiwdárya deltası ushın xarakterli.s. Aynazarovtıń (1972) Dawıtkól suw saqlaǵıshında (kók suw) zooplankton tiykarınan kolovretok wákilinen turadı. Shaka murtlı hám eskek ayaqlı shayanlar may ayında (73 mın ekz/m^3), iyun ayında ($103.3 \text{ mın ekz/m}^3$), al avgust ayında (99.7 mın ekz/m^3), biomassası 3-2, 4-3.3 g/m^3 quraydı. Eń keń tarqalǵan malyuska túrine (ushkovıy prudovik), (okaymlennaya katushka), tissizler (Arıstanov, Yusupov 1978). Japtıń jaǵalarında molyuskalar tıǵız ornalasıp alǵan (30-72 ekz.kv.m. de). Bul suw saqlaǵıshtıń bolimin hár qıylı quslar iyeleydi (shaǵala, aqqutan, úyrekler h.t.b.). Kóksuw suw saqlaǵıshında balıqlardıń turi 10 nan aslam. Bul suwda amfibiyalarda ushırasadı. Kóksuw suw saqlaǵısh jaǵalawlarında bólimlerinde iri mallardıń awqatlanıwına múmkinshilikleri bar. Kóksuwdıń shıq bólimlerinde, tissizler júziwshi ósimliklerdiń ústinde prudovikler menen katushkalar ushırasıp turadı. Tiykarǵı massası molyuskalar (70-75%). Zoobentoslardıń bir qansha bóleklerindeki nasekomalardıń ushıp ketpegenligi sebepli, olardıń massası gúzde, báhárde jaqsı boladı. Jazda bolsa, nasekomalardıń ushıp ketiwine baylanıslı zoobentostıń massası kemeyip qaladı. Bul kerisinshe boladı eken (Aynazarov 1972).

Dawıtkól kóli suw saqlaǵıshı – Ámiwdárya deltasındaǵı perspektivalı dushshı suwı balıq awlaw hawızı bolıp tabıladı. Bul hawızde hár jıl sayın awlanıwı kerek bolǵan balıq muǵdarı awlanadı. Suw saqlaǵısh ixtionofaunanıń túrlerine bay. Bizler tárepinen awlanıwǵa bolatuǵın 16 túri registraciyalandı. Tiykarǵı túrлерinen aq shabaq, sazan, ılaqa, okun, shortan, qızılqanat h.t.b. esaplanadı. Sońǵı

jillarda suw saqlagışı rayonlarda kompleksli parazitologiyalıq izertlewler ótkerildi. Suw omırtqasızları (molyuska), suwda júziwshi (chayka, úyrek, baklam) quslardıń ayırım túrleriniń gelmintofaunası, balıqlardıń parazitofaunası izertlendi.

1.1. Ámiwdárya bassyini balıqların parazitologiyalıq izertlew tariyxı.

Bul bólimde pitkeriw qánigelik jumısınıń birinshi ret Aral teńizinde balıqlardı óz aldına izertlemesten burın suw jániwarları menen qosımsha parazitologiyalıq jaqtan jumıs júrgizgen A.P. Fedchenko (1874) birinshi ret Chexon balıgınıń terisinen *Piscicola* sp. *Ercasilus* sp. Degen sırtqı parazitlerdi Aral teńiziniń Sarışığınaq degen jayılımnın kórsetedi. L.S. Berg (1908) óziniń monografiyalıq jumısında Aral teńizinen tabılğan haywanatlarınıń diziminiń ishinde *Azydia Incil* degen parazitti qosımsha túrde kórsetedi. Sol jerde aqshabaq balıgınan *Ziqula* sp. – tide kórsetedi.

Birinshi ret Aral teńizine balıqlardıń parazitlerin óz aldına izertlew maqsetinde T.A. Krepkogorskoy (1927) dıń arnawlı dala saparın shólkemlestiredi. Bul ekspediciyanıń juwmağında shortan balıgınan *R. acus* (dóngelek qurt), shemayadan *Coetracaecum* sp., aq shabaqtan *Cucullfnellus* sp. degen gelmintlerdi tawğanı bizge belgili.

Ámiwdárya basseyninen eń birinshi ret balıqlardağı kesellik taratıwshı, ápiwayı parazitlik jol menen jasawshı jánlıklardi, ásirese, ilaqanıń qanındağı *Crypobia ninae* degendi tapqan V.L. Akimov (1923) degen ilimpaz bolğan. Onnan keyin Leningradlı ilimpazlar V. Dogel hám B. Bıxovskiy ózleriniń «Parazitofauna Aralskogo morya» (1934) degen monografiyalıq miynetinde Ámiwdáryanıń quyar jerinde *Ostroluchka* degen balıqtıń 8 túrli parazit tapqanlıgın kórsetedi. G.V. Nikolskiy (1940) Ámiwdáryanıń quyar jerindegi jasawshı torta (plotva) balıgınıń ishki boslıgınan (polost tela) *Zioula intestinalis* – ti kórsetken bolsa, K.I. Skryabin (1946) balıqlardağı (usach hám lopatonos) parazitlik jol menen

turushilik etetuđın dóngelek (nematode) qurtlardın wákili Rhabdochona onedini – di kórsetedi. Ilimpaz V.T. Ostroumov (1949) bolsa Vaxshten Lopatonostın qaninan Cryptobiapseudoscaphirin dusi degen qan parazitini kórsetedi. B.N. Kazancev (1949) Vaxshtan balıqlardağı parazitlik jol menen tirishilik keshiretuđın Zernaea cyprinacea –nı tapqanlıđı tuwralı xabarlađan. C.A. Rostovshikov (1952) Varzob, pyuchob, Kafirnigan hám Vaxshtın qasındağı kóllerden 17 túr, hámmesi bolıp (429 dana) balıq teksergen. Usı balıqlardağı ápiwayılardıń (prosteyshie) 15 túr silekeyli sporoviklerdi tapqan. S.S. Shulman (1966) usı materiallardan ápiwayı bir kletkalı parazitlerdiń (mikroskoporidiya) kóplegen taza túrlerin jazıp shıqqan.

Ámiwdárya basseynindegi balıqlardan jıynalđan parazitologiyalıq materiallardağı monogeneyalardan B.E. Bıxovskiy (1957) kóp ǵana ilimge taza terlerdi ashqan.

S.O. Osmanov (1960, 1965, 1966, 1971 hám tađı basqa) miynetlerinde Ámiwdárya basseynindegi balıqlardağı parazitlik jol menen jasaytuđın hám balıqlarǵa júdá kóp zıyan keltiretuđın jánlıklardiń kóp túrlerin tapqan hám olardıń sistemasın, ekologiyasın, taralıwın óziniń «Paraziti rıb Úzbekistana» (1971) degen monografiyasında sáwlelendirgen. Túyemoyın suw saqlađışındağı balıqlardıń parazitleri tuwralı Osmanov, Aristanov, Urazbaev, Yusupovlardıń (1974) ilimiy statyasın kórsetiwge boladı.

Ámiwdáryanıń basseyni tuwralı, olardıń balıqlardı ilimiy parazitologiyalıq jaqlarınan, balıqlarǵa kesellik taratıwshı parazitler tuwralı kóp ǵana ilimpazlardıń miynetlerin atamay ketiwge bolmaydı. Olardan: Ámiwdáryanıń pritoklarınan (Vaxsh, Kafirnigan, Surxandárya, Qashqadárya, Zarafshan) S.O. Osmanovtı, B. Allamuratovtı, G. Shmelovtı (1962), S.O. Osmanovtı (1966), U. Djalilovtı (1966), Ashurovanı (1973), M. Daniyarovtı (1975), R. Karaevtı (1975) tilge alamız.

Surxandáyanıń basseyinen júdá kóp ǵana balıq parazitlerin hám olardıń keselliklerin teksergen B. Allamuratov (1966, 1974) kóp ǵana balıqtaǵı ápiwayı parazitiniń túrlerin ilimge jańalıq retinde jazıp shıqqan. 2 rod (tuwıstı) tazadan ashqan. Sonıń menen birge shıǵıs Surxan suw saqlaǵıshlarındaǵı balıqlardıń parazitlrin jazǵan. 16 túr balıqlardan hámmesi 268 dana bolıp, olardan 60 qa jaqın parazitlerdiń túrin tapqanlıǵı tuwralı xabarlaǵan. Olardıń ishinen *eurodactylus cobionum* Ámiwdárya basseynine birinshi ret kórsetolgen. M. Butabaeva hám B. Allamuratov (1966) Degrez suw saqlaǵıshlardaǵı balıqlardıń ápiwayı parazitlerin, al B. Allamuratov hám V.P. Koval (1966) lar monogeneelerdiń tazatuwısın (rod) ilimge birinshi ret kórsetedi. Ol tuwıstıń atı *Markewitschiana* dep, túri menen qosa aytqanda *M. cruciber* dep ataladı. G. Suxenko hám B. Allamuratov (1966) *Samproolena markewitschi* degen taza túrdi jazıp shıqqan. B. Allamuratov (1966) Surxandáyanıń basseyinen 24 túr balıq hámmesi bolıp 1806 dana balıqtı tekseredi hám olardan 161 túr parazit tabadı, al 13 túr parazit Orta Aziyanıń kól-dáryalarına birinshi ret kórsetilgenligi tuwralı sóz etiledi.

Aral teńiziniń balıqlarınıń parazitlerin tekseriw 1930-jılı V.A. Dogel hám B.E. Bıxovskiylar tárepinen júrgiziledi. Ol ilimpazlar 1934-jılı «Fauna parazitov pıb Aralskogo morya» - dep ataladı. Bul miynet júdá bahalı miynet bolıp, elege deyin óziniń qunın joyıtpaǵan hám parazitologlardıń úlken jol kórsetkishi bolıp esaplanadı. Bul miynette 13 túr ápiwayı parazitler, 19 túr monogenen, 9 túr cestoda, 12 túr trematode, 10 túr nematode, 2 túr piyavka, 2túr molyuska, 2 túr grib hám 5 túr rakoobraznıylar kórsetilgen. Nátiyjede usı joqarıdaǵı (Dogel, Bıxovskiy 1934) miynetinde 77 túr parazit kórsetilip, olardıń kóbisi ilimge birinshi ret kórsetilgen.

Túslik Aral teńiziniń balıqların tekseriw bir qansha úzilislerden keyin 1952-jıllardan baslap Ózbekstan Ilimler Akademiyasına qarashlı Qaraqalpaq bóliminiń bioekologiya laboratoriyasınıń parazitologiya laboratoriyasınıń ilimpazları tárepinen iske asırıladı. Usı kóp jıllıq jumıslardıń, parazitologiyalıq tekseriwlerdiń nátiyjesi – bir qansha monografiyalar, sbornikler, broshyuralar hám

kóplegen ilimiy maqalalar jazılmaqta. Olardan S.O. Osmanovtın «Paraziti i bolezni prudovıx rıb Uzbekistana i merı borı s nim» (1965), «Paraziti rıb Uzbekistana» (1971), S.O. Osmanov, E. Aristanov, K. Ubaydullaev, Yusupov, A. Turemuratov «Voprosı parazitologii Aralskogo morya» (1976), C.O. Osmanov, A. Urazbaev, E. Aristanov, O. Yusupov, T. Allaniyazova «Paraziti rıb I vodnıx bezpozvononochnıx nizovev Amudari» (1980), S.O. Osmanov, O. Yusupov «Vliyanie osoloneniya Aralskogo moray na parazitofaunu rıb» (1986). Bul miynetlerde balıqlardağı barlıq parazitlerdın gruppalarına hár tárepleme analizler berilgen.

Dawıtkól suw saqlağıshındağı balıqlardıń parazitologiyalıq jaqtan tekseriwge baylanıslı bir qansha ilimiy maqalalar járiyalanğan. Olardan: B. Allamuratovtın (1971, 1997), S.O. Osmanov hám O. Yusupovlardın (1977), O. Yusupovtın (1980-1, 1980-2) miynetlerin atap kórsetpey ketiwge bolmaydı. Ásirese, O. Yusupovtın (1988) «Paraziticheskie prosteyshie rıb ozero vodoxranilisha Dawıtkól v delte Amudari», O. Yusupov, A. Karataevlardın (1986) «Paraziticheskiye prosteyshie rıb sistemı oezr I kollektorov v delte Amudari», A. Qurbanova, B. Allamuratov, O. Yusupov (1995) «Vliyanie aklimatizicii na parazitofaunu belogo amura v Nijnem Priarale» degen miynetlerin kórsetse boladı.

Endi aq amur balıǵı Dawıtkól suw saqlağıshında usı pitkeriw qánigelik jumısına deyin kem izertlengen. Sol sebepli aq amurda parazitlik jol menen tirishilik etetuǵın parazitlerdi izertlew, bul parazitologiyalıq túsinikti keńeytedi hám jıynalğan parazitologiyalıq materiallar ilimge jańalıq bolıp esaplanadı.

II-bap. Izertlew materialı hám metodikası

Bulpitkeriw qánigelik jumıstı jazıw ushın tiykarǵı parazitologiyalıq materiallar Dawtkól suw saqlaǵışındaǵı iri shop jewshi aq amur balıǵınıń parazitlerin izertlewdiń nátiyjesinen ibarat.

Dawtkól suw saqlaǵışına parazitologiyalıq material jıynaw ushın A. Urazbaev hám prof. B. Allamuratov penen 10 marttan 25 mart 2017-jıl aralıǵında ilimiy sapar ótkerildi. Bul ekspediciyǵa Bioekologiya institutınıń parazitologiya laboratoriyasınıń aǵa ilimiy xızmetkeri, biologiya iliminiń kandidatu basshılıq etti. Usı ilimiy saparǵa pitkeriw qániygelik jumıs ushın material jıynawǵa mende qatnastım (avtor). Izertlew metodikasın hám tekseriw ornın (Dawtkól suw saqlaǵışı) tańlaǵan sebebimiz, bul jerdegi aq amurdıń búgingi ekologiyalıq ózgerisler jaǵdayındaǵı parazitologiyasın anıqlawdan ibarat boldı.

Dala saparınıń dawamında (10-25-mart 2017-jıl) ulıwma metodikaǵa súyengen halda tolıq parazitologiyalıq izertlew boyınsha Dawtkól suw saqlaǵışınan 25 dana aq amur balıǵın izertledim.

Izertlew ushın materialdı (balıq) kóldegi balıqshılardıń awınan, mayda shabaqlar ushın da «volokushi» den paydalandıq. Bul pitkeriw qánigelik jumıstıń izertlew tiykarın V.A. Dogel (1933) tárepinen jazılǵan ekologiyalıq parazitologiyalıq principlerinen paydalandıq. Keyinirek ol principle Dogeldiń shákirtleri tárepinen tolıqtırılıp barılǵan.

Parazitologiyalıq jol menen balıqlardı jarıw, fiksaciyalaw, olardı islew (obrobotka), ilimge belgili ulıwma metodikaǵa súyenip alıp barıldı. Bul metodikanı (balıqtı izertlew) birinshi ret jazıp shıǵıp usınǵan chlen. korr. AN SSSR V.A. Dogel (1933) bolǵan. Onnan keyin V.A. Dogel hám B.E. Bıxovskiı (1934), A.P. Markevich (1951), I.E. Bıxovskaya-Pavlovskaya (1985) hám S.S. Shulman (1966) hám basqalardıń ilimiy miynetinde tolıqtırılıp barıldı.

Tolıq parazitologiyalıq izertlew ushın bizler tiri aq amurdı yamasa jaqında ólgen (taza), sırtları ele kewip ketpegen balıqtı aldıq. Balıqshı uslap, awdan alıwdan, túrleri boyınsha bólgende aq amurdı bólek ıdısqa qoydıq. Sebebi, basqa túrdegi balıqlardıń sırtqı parazitleri juǵıwı múmkin. Uslangan aq amurdıń sırtqı parazitleri tusip ketpewi ushın, dárhal sırtın qarap shıqtıq.

Onnan keyin metodikadaǵı kórsetilgenindey balıqtıń sırtınan mazok alıp, ápiwayı parazitlerge qaradıq. Sol ektoparazitlerdi jıynap (lupanıń járdeminde) bolǵannan keyin, mikroskoptıń járdeminde parazitlerdiń túrin anıqladıq (opredeliteldegi 1984-1987 gg). Parazitlerdiń súwretin salıstırıp kórdik, onnan keyin izertlenetuǵın balıqtıń uzınlıǵın hám salmaǵın ólshep kúndelikke (dnevnik) jazıp bardıq. Balıqtıń eki ólshemi boladı eken: birinshisi awız quwıslıǵınan (tumsıǵı) baslap, quyırq qalashınıń baslangan jerine shekem, ekinshisi, awzınan baslap quyırq qalashtıń aqırına shekem 2 ólshenedi. Buǵan balıqtıń uzınlıǵı dep ataladı. Al, salmaǵı táreziniń járdeminde ólshenedi.

Bul jumıslardıń barlıǵı júdá tez shaqqanlıq penen islep alınıwı kerek, sebebi uslanıp alıp kelingен balıqtıń sırtı kewip ketpewi kerek. Izertlenetuǵın balıqtıń uzınlıǵı shtangencirkul, lineyka, ruletkalardıń járdeminde ólshenedi. Bul jumıslardan keyin balıqtıń jasın anıqlaw ushın, onıń sırtınan qabırshaǵı alınıp, keptirip saqlap qouıladı. Balıqtıń qanınan mazok alıp, qan parazitleri izertlenedi.

Balıqtıń sırtındaǵı ektoparazitlerdi (teri, saǵaq, murın hám awız quwıslıǵı) jıynap bolǵannan keyin, ishki múshelerine ótıledi. Bunda metodikaǵa súylene otırıp, tómendegi náwbet boyınsha qaraladı: júregi, quwıǵı (mochevoy puzır), óti, bawırı, talaǵı (jirovaya tkan), ishegi, jınıs organları, torsıldaǵı, bótekesi, kózi, bas miyi, góshi hám skeleti hám t.b.

Balıqtıń hár bir organı óz aldına bólek ıdısqa salınıp, eń áweli sırtı qaralıp shıǵıladı. Bul ishki organlardan jıynalǵan iri gelmentlerdi taza suwǵa chashki Petride uslap turıwı kerek. Mayda kózge kórinbeytuǵın parazitlerdi jıynaw ushın

hárbir organ óz aldına kompressornıy metod boyınsha binokulyarnıy lupa (MBS-1) járdeminde obektiv 2 hám okulyar 8-x qarap shıqtıq, mazoklardı alıp onı mikroskop (MRB-3) járdeminde izertlep shıqtıq.

Alınğan parazitlerdi fiksaciyaǵa shekem jaqsılap taza suw menen juwıp kórdik, sebebi parazitlerdiń sırtına jabısqan ayırım silikey hám tkanlardıń qaldıǵınan tazalaw ushın. Alınğan gelmintlerdi taza suwda uslaw kerek, sebebi suwda parazit óziniń denesin bosatıp, uzınına sozılıp jatadı. Bul olardıń túrin anıqlawǵa jaqsı boladı, ishki xıytlı músheleri jaqsı kórinedi. Barlıq alınğan parazitlerdi fiksirovat etiw kerek, tiri halında ótkiziledi.

Fiksaciya tási, alınğan parazitlerdiń jaǵdayına, úlken-kishiligine, olardıń morfologiyalıq jaǵdayına hám tekseriw shártlerine baylanıslı boladı. Sol sebepli fiksaciya parazittiń sistemalıq jaǵdayına qarap is alıp baradı.

Fiksaciya hám parazitleri keying izertlewge qaldırıw ushın kóp kletkalı gelmintlerdi 70 gradus etilovıy spirtke salıp saqlanadı. Nematodlardı fiksaciyalaw hám keying izertlewlerge qaldırıw ushın jidkosti Borbogallo (3№ formalin, as duzınıń fiziologiyalıq eritpesi) paydalanıladı.

Monogeneylardi tazalap suwda juwıp bolıp, glicerin-jelatinde preparatları islenedi. Bul preparatlar turaqlı saqlanadı, trematodlardı fiksaciya jasaǵan waqıtlarda, olardı eki predmetniy steklonıń arasına qoyıp, qısıp shetinen (arasına) 70 gradus ıssı spirt jiberiledi. Eger gelmint iri bolǵan jaǵdayda shiysheniń ústine júk qoyıladı.

Metacerkarin trematodlardı (Diplostomum) tuwrısına jatatuǵın, gelmintlerdi bulardı preparat islew ushın uksusnokisliý járdeminde uslap, olardı diffekrenciyalaw ushın 1% solyanokisliý spirt paydalanıladı. Onnan keyin parazittiń denesindegi suwdı qaldırmaıw hám parazittiń ishki múshelerin anıq kóriniwi ushın dimetiltalattı paydalanıp, eń keying balzamda turaqlı preparat islenedi. Bul joqarıdaǵı Diplostomum-dı fiksirovat etiw ushın V.E. Sudarikov hám A.A. Shiginniń (1965) jılǵı metodikasın basshılıqqa aldıq.

Dónúgelek qurtlardı fiksirovat etiw ushın Barbagallo suyıqlıǵı paydalanıladı, olardıń denesiniń jaqsı kóriniwi ushın molochnıy kislota paydalanıladı.

Parazitlik jol menen tirishilik etetuǵın shayan tárizlilerdi fiksirovat etiwushın 70 gradus spirt paydalanıladı.

Kameralnıy obrabotka hám parazitlerdi (tabılǵan) anıqlaw Ózbekstan Ilimler Akademiyasınıń Qaraqalpaqstan bóliminiń Bioekologiya institutınıń laboratoriyasında alıp barıldı. Usı laboratoriyada diplom jumısım ushın jıynalǵan parazitlerdiń hár bir gruppası menen pitkeriw qánigelik jumısımınıń ilimiy basshım biologiya ilimleriniń doktorı B. Allamuratov tárepinen tastıyqlanıp barıldı. Parazitlerdi anıqlawda boyalǵan hán boyalmaǵan preparatlardan basqa da olardıń súwreti salındı yamasa mikrofotografiya islendi, parazitlerdiń ayırım sistemalıq xarakterge iye bolǵan músheleri (organları) ólshendi. Olardı orınlaw ushın risovalnıy apparat RA-4, mikrofotonasadka MFA-3 hám okulyar mikrometr qollanıladı. Barlıq jıynalǵan parazitologiyalıq materiallardı pitkeriw qániygelik jumısımınıń ilimiy basshısı professor B. Allamuratov kórip shıqtı hám pitkeriw qániygelik jumısımdı jazıwǵa járdem berdi.

III-bap. Aq amur balıǵınıń parazitlerine sistemalıq sholıw.

Bul bólimde pitkeriw qániygelik jumısı ushın Dawıtkól suw saqlaǵışınan izertlengen aq amur balıǵındaǵı parazitlik jol menen tirishilik etetuǵın jániwarlardı belgili bir sistematikaǵa salıp úyreniliw kózde tutılǵan.

Bunda iri shop jewshi aq amur balıǵınan izertlewler nátiyjesinde tabılǵan hár bir parazitke óz aldına toqtap óttim. Olardıń balıqtıń qaysı organınan tabılǵanlıǵı, parazittiń iyesi, ushırasqan jayı, xozyayinniń uslangan háwizi, parazittiń júgiw procenti, zálelleniwi hám olardıń sanı (intensivnost) anıqlap bardım. Burın aq amurden tabılǵan ba, tabılsa qashan tabılǵan hám taǵı basqa parazitologiyalıq materiallardı pitkeriw qániygelik jumısı ushın ekspediciya dawamında jıynaǵan maǵlıwmatlarımnan paydalandım. Ádebiyatlardan salıstırmalı túrde qollanıw ushın aq amurdın basqa da avtorlar tárepinen izertlewler nátiyjesinde tabılǵan parazitologiyalıq materiallarınan paydalandım. Bulardıń ishinen biologiya ilimleriniń kandidatı marqum O. Yusupovtıń (1980) Dawıtkól suw saqlaǵışındaǵı aq amurdı izertlegen jumısı kóp járdem berdi.

Dawıtkól suw saqlaǵışınan izertlegen aq amur balıǵınan 7 túr parazit tabıldı. Olar 3 tipke: 5 klassqa, 5 otryadqa, 3 kishi otryadqa, 5 tuwısqqa, 5 áwladqa hám 5 túrge bólinedi.

Joqarıdaǵı Dawıtkól suw saqlaǵışınan diplom jumıs jıynalǵan aq amurdıń parazitlerin belgili bir sistematikaǵa salıp jazıw ushın 3 tomalıq «Opredelitel parazitov presnovodnix ryb» anıqlaǵısthan paydalandım. Olardıń I-tomı (1984), II-tomı (1985), III-tomı (1987) jılları jarıq kórgen.

Ápiwayı jániwarlar tuwralı ulıwma túsiniw.

Omırtqasızlar zoologiyasına kiretuǵın barlıq tipler ekige bólinedi. 1) bir kletkalı. 2) kóp kletkalı. Bir kletkalılardı tek ápiwayı jániwar tipleri kiredi. Qalǵan tipler kóp kletkalardı kiredi. Ápiwayılılar taypasına kiretuǵın jániwarlardıń

hámmesiniń denesi bir kletkadan turadı. Bul kletka morfologiyalıq jaqtan bir kletkaǵa tuwra keledi. Fiziologiyalıq jaqtan hár qaysı organı óz alına boladı. Hár qıylı funkciyanı atqaradı. Olardıń denesi júdá mayda bolıp, tek mikroskop arqalı kórinedi. Bul topaǵa (tip) 25 mın túr kiredi. Basqa tiplerge salıstırǵanda júdá kesh ashılǵan, sebebi bul tip mikroskop payda bolǵannan keyin tabıla baslaǵan. Birinshi ápiwayı jániwarlar XVII ásirdiń ekinshi yarımnan keyin belgili bolǵan. Birinshi ret ápiwayılardıń denesi bir kletkadan turatuǵınlıǵın XIX ásirdiń ortalarında Kellikler hám Zibold degen ilimpazlar tárepinen tabıldı.

Ápiwayılardıń deneleri hár qıylı, biraq barlıq organları bir kletkaǵa ornalasqan. Ápiwayılardıń denesi eki kompetenten turadı: birinshisi – citoplazma, ekinshisi – yadro. Qısqaırwshı hám awqat pisiriwshı vakuolları boladı, yadrolar bir yamasa bir neshe boladı.

Ápiwayı jániwarlardıń kletkalarınıń tirishilik cikli, kóp kletkalı jániwarlardıń barlıq kletkaları, tek jınıs kletkalarınan basqası tirishilik ciklına iye emes.

Al ápiwayılılardıń kletkası tirishilik ciklına iye. Mine usınıń menen kóp kletkalılardıń parıq etedi. Cikl aldı menen zigota dáwirinen baslanadı. Zigota bir yamasa bir neshe bóliniw dáwirin ótkeredi. Ápiwayılardıń taǵı bir ózgesheligi dúnya júzinde kóp taralǵan. Kópshiligi dushshı hám teńiz suwında bentosta planktoda jasaydı. Ayırım túrleri topıraқта jasaydı, shegede tirishilik etedi. 3.5 mınnan salami úy haywanlarında, adamlarda tirishilik etedi.

Suwda jasaytuǵın ápiwayılar, bakteriyalardı hám basqa da mikroorganizmlerdi jeydi, al ózide suwda jasaytuǵın balıqlardıń lichinkaları jer sharınıń tropikalıq zonalarında awır bezgek keselliklerin adamlarda taratadı. Jıl sayın Indiyada hám basqa da Aziyanıń, Afrikanıń tropikalıq bólimlerinde onlaǵan million adam usı kesel menen awıradı. Bul keseldi payda etetuǵın bir kletkalı parazit sporovikler tipine kiredi. Sarkomastigoforalar tipine kiretuǵın parazit Oraylıq Aziyada uyqı keselligin payda etedi. Kokcidllar, triponosomalar balıqlardı hám úy haywanlarında túrli keselliklerdi payda etip, balıqlarda, mallard, mal

sharwashılıǵına úlken zıyan keltiredi. Solay etip, medicina, veterinariya hám awıl xojalıǵında paydası hám zıyanı da bar.

3.1. Ápiwayılar (Protozoa) kishi dúnyası.

Tip Knidosporidin – Cnidosporidia Doflein. 1901 emend. Schulman et Podlipaen 1980

Klass silekeyli sporovikler yamasa Miksporidiya – Mexosporidia Biitschli 1881

Otryad Bipolaria Jripathi 1949

Sem. Muxidiidae Jhelohan 1892

Rod Zschokkella Auerbach 1910

Zschokkella striata Schukman 1962

Iyesi (xozyayn): aq amur

Ushırasqan múshesi (lokalizaciya): ót qaltashası

Tabılǵan jeri: Dawıtkól suw saqlaǵışı

Túrdiń sıpatlaması (avtorlıq materialları). Sporası máyek tárizli sopaq. Sporasınıń uzınlıǵı 13-15, eni 6.5-7, qalınlıǵı, juwanlıǵı (tolshına) 15.3-19.5, polyarlıq kapsulasınıń diametric 3.3. - 4.1 MKM dı quraydı.

Procent hám intensivnosti. Dawıtkól suw saqlaǵışındaǵı aq amur balıǵınıń ápiwayı parazit penen záhárleniwi 24%, intensivnosti ortasha 1-2 plazmodiyanı quraydı.

Zschokkella striata Dawıtkól suw saqlaǵışı ushın aq amurdan birinshi ret avtor tárepinen kórsetilgen.

Kishi otryad Eurysporea Kudo 1919

Tuwıs. Shaerosporidae Dabis 1917

Áwlad. Chloromyxum Mundazzini 1890

Chloromyxum cyprinid Fnjita 1927

Iyesi (xozyan): aq amur

Ushırasqan múshesi (lokalizaciya): ót qaltası

Tabılǵan jeri: Dawıtkól suw saqlaǵıshı.

Túrdiń sıpatlaması Opisanie vida (avtordıń materialları). Sporasınıń diametric 10-14. Polyarlı kapsulası hár qıylı boladı, olardıń úlkeni 2.7-4.5, kishkentayı 2-3.4 atılıwshı sabaqshasınıń uzınlıǵı 49-55 mkm. ǵa teń. Procent hámintensivnost. Dawıtkól suw saqlaǵıshındaǵı aq amur balıǵınıń bul ápiwayı menen záhárleńiwiniń muǵdarı 16.0%, intensivnost 2-4 dananı quraydı. Ch cyprinid – Dawıtkól suw saqlaǵıshı ushın avtor tárepinen birinshi ret kórsetilip otır.

Tip Kirpikliler (Resnichie) – Ciliophora doflein. 1901

Bul tipke kiretuǵın ápiwayı jániwarlardıń dene qurılısı, ótkendegi tiplerden góre quramalıraq bolıp keledi. Qozǵalıw quralı denesindegi kóp sandaǵı kirpikshe (resnichki) ler bolıp sanaladı. Sol sebepten bularda kirpiksheli ápiwayılar dep ataladı. Denesiniń sırtqı pellikula menen qalıń bolıp jabılǵan boladı. Bunday denesiniń sırtındaǵı qalıń qabatlı pellikulalar deneni belgili formada uslap turıwda úlken áhmiyetke iye boladı. Kirpiksheler belgili qatarlar menen jaylasqan – kineta dep ataladı. Kirpikshelerdiń túbi kinetosomalarǵa jabısaadı. Kirpiksheler qatarlasıp jayǵasıp, kirpikshe apparatın quraydı, buǵan kinetoma yamasa ciliaturu deydi.

Infuzoriyalardıń awız quwıslıǵı bar. Buǵan citostom dep ataladı. Denesiniń bir oyıq jerine jaylasadı. Dawıs arqalı awqatlıq zat jutqınshaqqa barıp jetedi. Jutqınshaǵı tayaqsha apparatları menen támiyinlengen.

KLASS DÓNGELEK KIRPIKLILER (KRUGORESNIHNIE) – PERITRICHIA STEIN. 1859.

OTRYAD PERITRICHIDA F. STEIN. 1859.

KISHI OTRYAD MOBILINA KAHL. 1933.

TUWÍS (SEMEYSTVO) TRICHODINIDAE CLAUS. 1874.

Bul infuzoriyalardan denesi dóńgelek bolıp keledi. Tisleri bolıp, olar venchikke jabısıp turadı. Tisleri ishki tisler hám sırtqı tisler dep ataladı. Tislerdiń

arasında shısh sıyaqlı kirpiksheleri jaylasadı. Denesiniń sırtqı ushın kirpiksheler menen qaplangan. Qozǵalganda denesi taqıya sıyaqlı boladı. Usı kirpikshelerdiń járdeminde háreketke keledi. Yadrosı, makronukleus, onıń janında mikronukleusleri jaylasadı. Bulardıń barlıq wákilleri balıqlardı parazitlik jol menen tirishilik etedi.

ÁWLAD (ROD) TRICHODIN SRAMEK – HUSEK 1953

Trichodiekka epizootica (Raabe 1950). (1-súwret).

Iyesi (xozyayn): aq amur.

Ushırasqan múshesi (lokalizaciya): saǵaq japıraqshaları.


Tabılǵan jeri (mesto naxojdeniya): Dawıtkól suw saqlaǵıshı.

Túrdiń sıpatlaması – opisanie vida (avtorıń materialları): denesiniń diametric 28-43.4 mkm., jabısıwshı diskasınıń diametric 15.0-32.5 mkm., sırtqı venchiktiń diametric 10.4 – 22.2 mkm., ishki venchiktiń diametric 6.3 – 24 mkm., sırtqı ósimsheniń uzınlıǵı 2.4 -6.6 mkm., venchikte 18-30 dana tisler jaylasqan. Bir tis penen ekinshi tistiń arasına venchikke jabısıp ósken shashlardıń sanı 4-6 dananı quraydı. Shetki membrananiń eki 1.4 – 3.3 mkm. Di quraydı

Procent hám intensivnost. Dawıtkól suw saqlaǵıshındaǵı aq amurdiń záhárleniwi 32,9%, intensivnost ortasha 0.8 dananı quraydı.

T. epizootica Dawıtkól suw saqlaǵıshı ushın aq amur balıǵınan birinshi ret kórsetilip otr.

1 - SÚWRET. TRICHODINELLA EPIZOOTICA (ORIGINAL)



3.2. Kóp kletkalılar (metazoa) kishi dúnyası.

Tip jalpaq qurtlar PLATHELMINTES.

Jalpaq qurtlardıń sırtqı kórinisi saqıyna (taspa) tárizli hám jalpaq uzın bolǵanlıqtan saqıynalı qurtlar dep te ataladı. Jalpaq qurtlardıń basım kópshiligi parazit qurtlar bolıp, olar adamlardıń, haywanlardıń hám ósimliklerdiń denesine jaylasadı ham solardıń esabınan awqatlanadı. Biraq bazı bir qurtlar haywanlar denesinde óse alatugınlıǵı sıyaqlı, olar adamlar denesinde de óse aladı.

Jalpaq qurtlar-haywanatlar menen adamnıń isheginde, geyde basqa múshelerinde tek parazitlik tirishilik etetuǵın júdá qáwipli jánlıklar. Bulardıń sırtqı kórinisi saqıyna (taspa) tárizli hám jalpaq hám uzın bolǵanlıqtan saqıynalı qurtlar, taspa qurtlar dep ataladı. Saqıynalı qurtlardıń dene kórinisi millimetrge jeter jetpes, ayırımları 30 metrge deyin jetedi. Házir saqıynalı qurtlardıń 3000nan aslam túri belgili.

Parazitlik jol menen tirishilikke biyimlesken qurtlardıń bir uakili sıyr taspa qurtınıń mısallınan anıq kórinedi. Eresek taspa qurtı adam isheginde jasaydı, demasileri iri shaqlı qara mallardıń, sıyırlardıń denesinde rawajlanadı, sonlıqtan sıyr cepeni dep ataydı.

Sıyr cepeni, iyesiniń denesindegi qannan awqatlanadı. Bul cepenniń denesiniń barlıq jerleri arqalı sorıp awqatlanadı, sol sebepli ol qurtlardıń ózleriniń as siniriw músheleri joq bolıp ketken. Ol naǵız parazit bolǵanlıqtan erekshe qurılısta bolıp keledi. Sıyr cepeniniń dene turqı 10 metrge deyin jetedi. Onıń saqıyna tárizli uzın denesi 1000 nan aslam buwıntıqlardan quraladı. Buwıntıqlar qurttıń denesiniń moyın jaǵınan baslap, quyırǵına qaray qartayıp baradı.

Sıyr cepeniniń uzın denesiniń aldınǵı jaǵında kishkene bası hám qısqa moyın boladı. Bunıń basqa saqıynalı qurtlardan bir ayırmashılıǵı – basında iyesiniń ishine bekinetuǵın bulshıq etli tórt dóńgelek sorıǵışları bar. Saqıynalı qurtlardıń bas bóliminiń qurılısı hártúrli bolıp keledi. Sıyr cepeniniń buwılarınıń úlkenligi deneniń hámme jerinde birdey bolmaydı. Mısalı.: moyındaǵı buwıntıqlar-

qısqa, deneniń orangı bóleginde-sharshı, al deneniń sońǵı bólegine qaray buwıntıqlar uzarıp, eni tarıla túsedi. Buwıntıqlardıń forması barlıq saqıynalı qurtlarda birrdey emes, misalı jalpaq saqıynalı qurttıń sońǵı buwınlarınıń eni uzınlıǵınan enlirek boladı.

Saqıynalı qurtlarda da jalpaq qurtlar sıyaqlı xan aynalıw hám dem alıw júyeleri bolmaydı. Sonday-aq, denede tirishilik etetuǵınlıqtan saqıynalı qurtlarda kóz rawajlanbaǵan. Saqıynalı qurtlardıń hámmesi de germaroditler, yaǵnıy qos jinisli jánlıkler. Sıyrı cepenide qos jinisli jánlık bolıp tabıladı. Jinis buwınlıqları (saqıynaları) moyın buwınlıqlarınan keyingi 200 buwınlıqtan baslap rawajlanadı. Bul qurttıń bir saqıynasında (buwınında) atalıq, analıq jinis buwınlıǵı payda boladı. Analıq bezdegi atalıq bez benen shaǵılısqan máyekler sıyrı cepenin sońǵı buwınında tolıq pisip jetilip, qurt denesinen úziledi de, tezек penen birge sırtqa shıǵarıladı.

Sıyrı cepeniniń tirishilik aynalıwı quramalı bolıp, kópshiligi bir neshe iyelerdi almasırw arqalı ótedi. Negizgi iyesi adamnan jerge túsken qurttıń máyekleri shópke jabısıp, onı jegen sıyrıdıń qarına túsedi de júdá usaq nasillerge aynaladı. Sıyrı – sıyrı cepeniniń aralıq iyesi. Dernásillerdiń ótkir altı qarmaqshısı boladı, sol qarmaqshanıń járdemi menen qarınıń qabırǵasın tesip, qanǵa ótedi de, sıyrıdın barlıq denesine taraladı. Bulshıq etlerge orıalasqan dernásiller mólsheri kishirek finkaǵa aynaladı. Finka – sıyrı cepeniniń ekinshi dernásili. Sıyrıdın bulshıq etlerine orıalasqan finkalar aralıq iyesi menen óle-ólgenshe birge tirishilik etedi.

Tazalıq saqlamaytuǵın, salaq adamlar qolaysız jaǵdaylarǵa ózlerine sıyrı cepeniniń máyegin juqtırıp, onıń rawajlanıwına jaǵday tuwǵızadı. Bul adam ushın júdá qáwipli, eger máyek qan arqalı kózge deyin jetip, onnan finka rawajlansa, adam soqır bolıp qaladı. Máyektiń mıyda rawajlanıwı múmkin, sondayda rawajlangan finkanıń tásirinen adam óledi. Bunday jaǵday, kóbinese, shala pisirilgen shoshqa góshinen jiyi juǵadı, onnan adam shoshqa cepeniniń háreketine

tap boladı. Payda bolğan awırıw cisticerkoz yamasa fikoz dep ataladı. Denesinde finkası bar sıyr góshin shala pisirip jegende qarınğa túsken máyekten finkanıń rawajlanatuǵın joqarıda aytıp óttik.

Óttiń tásirinen finkanıń bası awdarılıp, sırtqa sozıladı da, moyın bóleginen birimlep jańa buwınlar payda boladı. Jańa buwıntıqlar payda bolğan sayın finkanıń kópirshigi joyılıp, 3-4 ayda qurttıń uzunlıǵı 2-3 metrge jetedi. Ishekтеgi sıyr cepeni denesinen uwlı zat bóledi, adam oǵan shıday almaydı, ishi buzılıp qanı azayadı, sóytip kesellikke jolıǵadı. Shala pisirilgen hám shala quwırılğan finkası bar sıyr góshi –finnoz awırıwının deregi. Sonlıqtan sıyr góshin xolodilnikte 21 kúndey saqlasa, sonday-aq tolıq pisirip, tamaqqa paydalansa, awırıw taralmaydı. Bunday keselliktiń aldın alıw júdá jaqsı nátiyjeler beredi. Sonday-aq, sıyrǵa saqıynalı qurttı juqtırmawǵa háreket etiw kerek. Saqıynalı qurtlar adam menen haywanatlardıń ishki aǵzalarına tirishilik etetuǵın parazit jánlıklar. Sırtqı forması jalpaq qurtlardıń belgisine say keledi, denesi uzın jalpaq bolıp pitken.

Parazitlik tirishilikke baylanıslı saqıynalı as sińiriw organı joq. Sonlıqtan iyesi paydalanatuǵın sińimli zattı denesiniń barlıq jerleri menen sorap alıp sińiredi. Parazitlik tirishilikke negizgibeyimleskenligi: denesin qorǵanış qabıqsha qaplaydı, iyesiniń denesine bekinetuǵın arawlı múshesi – sorıǵıshı hám qarmaqshaları bar. Nerv sisteması júdá ápiwayı, sezim músheleri bolmaydı.

Saqıynalı (taspa) qurtlardıń tirishiligi aynalmalı hám júdá quramalı: negizgi hám aralıq iyesiniń denesinde rawajlanadı. Bular – germafroditler yaǵnıy qosjınıslı jánlık. Saqıynalı qurtlardıń kóbeyiwi aynalmalı: máyek, qarmaqshalı dernasil – finka (ekinshi dernasil), eresek saqıynalı qurt. Finka negizgi iyesinde rawajlanadı, onıń qarmaqshalı hám sorǵıshlı bası, qısqa moynı, kóbik tárizli denesi boladı. Finkanın moynınan buwındıqlar payda bolıp, olardıń sanı 1000 ǵa jetedi. Saqıynalı qurtlar júdá kóp máyek saladı.

Sorıǵısh qurtlar – bular balıqlardı qos mekendi, qos hám sút emiziwshilerdiń ishki múshelerinde parazitlik jolı menen tirishilik etetuǵın jalpaq qurtlar klassına kiredi. Bul klassqa jatatuǵın jáńlikler geyde trematodlar dep te ataladı.

Trematoda grekshe «ataw», onıń qaraqalpaqsha atı «sorıǵıshı bar» - degendi bildiredi. Sorıǵısh qurtlardıń dene qurılısı bir neshe millimetrden 5 santimetrge shekem jetedi. 5000 nan aslam túri bar dep esaplanadı.

Eger biz balıqlardıń kózinde parazitlik jolı menen tirishilik etetuǵın Diplostomum degen tuwısına toqtap, usı klassqa xarakteristika retinde usı wákiline toqtaymız. Bular balıqlardıń kóziniń qarashıǵında tirishilik etedi. Aldıńǵı sorıǵıstıń ortasında awzı boladı. Awız jutqınshaqqa jalǵasadı da, onnan arman ishek tarmaqlarına aynaladı. Bular balıqtıń esabınan onıń qanıń sorıp tirishilik etedi. Diplostomumlar germafrodit, yaǵnıy bir aǵzada atalıqta, analıqta jınısı boladı. Uriqlanǵan máyek qustıń isheginde qan tamırları arqalı ishekten shıǵıp, onnan quslardıń tezegi arqalı suwǵa túsedi.

Trematodlardıń ayırım wákılleriniń máyekleri suwǵa túspewi de múmkin. Suwǵa túspegen máyekler onnan arman rawajlanbay qaladı da suwǵa túsken máyeklerden mayda sırtı kirpikler qaplanǵan lichinkalar shıǵadı. Bular júdá kóp sanda bolıp, kirpiksheleriniń járdeminde suwda júzip júredi hám óziniń birinshi aralıq iyesi bolǵan molyuskalardıń awız quwıslıǵına kiredi, stadiyasına miracidi dep ataladı.

KLASS MONOGENEIYALAR – Monogenoidia (Van beneden 1858)
(Bychowsky 1937)

KISHI KLASS – Polyonchoinea Bychowsky 1937

OTRYAD – Dactylogyridea Bychowsky 1937

SEMEYSTVO – Dactylogyridea Bychowsky 1933

ROD – Dactylogyrus Diesing 1850

Dactylogyrus Lamellatus Achmerow 1952

Iyesi (xozyayn): aq amur.

Ushırasatuǵın múshesi (lokalizaciya): saǵaq japıraqshası.

Tabılǵan jeri (mesto naxojdeniya): Dawıtkól suw saqlaǵıshı.

Túrđın opisaniyesi (avtorđın materialınan). Parazit mayda, uzınlıǵı 0.53 mm., eni 0.13 mm. ge shekem jetedi. Jaǵa qarmaqshalarınan uzınlıǵı 0.019-0.035 mm. ortańǵı qarmaǵınıń (kryuchki) ulıwma uzınlıǵı 0.030-0.042 mm/ onıń tiykarǵı bóliminiń uzınlıǵı 0.26-0.030 mm. ishki ósimshesi 0.011-0.015 mm. sırtqı ósimshesi 0.003-0.005 mm. ortańǵı qarmaqshanıń ushınıń uzınlıǵı 0.014-0.018 mm.

Eki ortańǵı kryuchkolardı biriktirip turatuǵın biriktiriwshi plastinka 2 dana boladı, onıń tiykarǵısınıń ólshemi 0.002-0.005 mm. x 0.027-0.036 mm. qosımshasınıń ólshemi 0.001-0.002 mm. 0.019-0.025 mm.

Kóbeytiw apparatınıń uzınlıǵı (kopulyativnogo apparata) 0.020-0.028 mm.

D. Lamellatus – ebrigalinnaya hám evritermnayaformaǵa jatadı. Suwdaǵı erigen kislorodtıń azayıwın júdá tez sezedi, sonıń menen suwdıń temperaturasınıń ózgeriwinde sezedi. Bul parazit aq amur balıǵınıń barlıq jastaǵı gruppalarında parazitlik etip tirishilik etedi. D. Lamellatus aq amurdan basqa balıqlarda parazitlik etpeydi.

Zárerleniwdiń procenti hám sanı (procent I intensivnost invazii). Dawıtkól suw saqlaǵıshındaǵı aq amur balıǵınıń zárerleniwi (zarajenie) 80.0%, olardıń sanınıń muǵdarı 4-160 dana, ortashası 35 danadan tuwra keldi (indeks obiliya).

KLASS LENTA TÁRIZLI QURTLAR – Cestoidia Rud 1808

KISHI KLASS – Cestoda

OTRYAD – Pseudophyllidea Carus 1863

TUWÍS – Bothriocephalidae Blanchard 1849

ÁWLAD – Bothriocephalus Rud 1808

Bothriocephalus opsariichthydis Yamaquti 1934 (2-súwret)

Sin. B. qowhonoensis Yeh 1855

Iyesi (xozyayn): aq amur, ushırasqan múshesi (lokalizaciya): ishek tabılǵan jayı (mesto naxojdeniya): Dawıtkól suw saqlaǵıshı Ádebiyattan qarasañ. R.R. Amiwdárya, Sırdárya, Aral teńizi, Orta Aziyadaǵı barlıq háwiz xojalıqları, Qazaqstan, Ukraina, Moskovskiy oblast, R. Amur, KNR hám t.b. jaylar.

Túrdiń sıpatlaması (avtordıń materiallarınan). Eresek qurttıń uzınlıǵı 145-171 mm, onıń eni 3 mm. ge jetedi. Jutqanshaǵı ortasha, denesiniń basqa bóliminen ayrıqsha bolıp turadı, ayırım waqıtları onıń eni 1.5 mm ge jetedi. Basında 2 boriyası bar, olar máyek tárizli bolıp keledi. Strobilaları dene quwıslıǵına shaqalanıp ketken. Saqıynalarınıń (chlenik) eni, uzınınan uzınlaw boladı. Hár bir saqıynada 45-85 semennikler jaylasqan. Cirrustıń sumkaları almurt tárizli bolıp keledi. 0.11-0.14 x 0.06-0.09 mm máyekleri ekilopostnıy. Máyekleriniń qabırǵaları (diywalları) juqa 0.053-0.054 x 0.033-0.038 mm. máyekleri jatırınan shıqqannan lichinka shıǵarıwǵa tayar boladı.

Procent hám intensivnost. Aq amur balıǵı Dawıtkól suw saqlaǵıshında 15.38% ke zárerlengen (zarajeniya), olardıń intensivnost 2-5 ekz. Indeks obiliyası 0.92 dananı quraydı.

B. orsoriichthydis ishki parazit bolıp esaplanadı. Birinshi ret Yaponiyalı ilimpaz tárepinen (Yamaquti 1934) tabılǵan.

Bul gelmint Ukrainada birinshi ret M.A. Maliveckskaya (1958) tárepinen karı, aq amur balıqlarınan, háwiz xojalıǵınan tabılǵan. Onnan keyin Moskva oblastınan háwiz xojalıǵınan B.A. Musselius tárepinen aq amur balıǵınan kórsetilgen. Bul joqarıdaǵı avtorlardıń pikirinshe botriocefalyus iri shop jewshi balıqlar (belıy amur) menen Qıtaydan keltirilgen hám házirgi waqıtlarda biziń kól dáryalarımızǵa keńnen taralǵan.

Amiwdáryanıń tómengi aǵısında botriocefalyustı birinshi ret súwennen S.O. Osmanov (1963) tapqan, al aq amurden, toltolobiklerden Osmanov, Urazbaev, Yusupov (1966) lar tapqan. Túslik Surxan suw saqlaǵıshınan 9 tur

balıqtan (Allamuratov 1965), Aral tenizinen 16 túr balıqtan (Osmanov, Aristanov, Ubaydullaev 1976) kórsetken.

Botriocefalyus, kóbinese, ishekten aldınǵı jaǵındaǵı diywallarına óziniń kúshli botriolları menen jabısadı hám usı jabısqa jeri jara boladı. Onnan keyin sol jeri isinedi, balıqtan kóp qandı sorıp aq amurdı elemiya (qansızlanıwı) keselligine shalınadı. Sonday-aq, bul parazit hádden tıs kóbeyip ketse, aq amurdıń ishegin piteydi (zakuporka). Sol sebepten botriocefalyus kóp sanda kóbeyse hawız xojalıǵında hám tábiyyı kól, kollektor hám t.b. suwlarındaǵı balıqlar qırılıp qaladı. Kesellik kóbinese balıqtıń lichinkalarında kóborek ushırasadı., usı maydaları kóp sanda qırıladı da úlken jastaǵıları usı kesellik shaqırıwshı botriosefalyustı ózinde saqlap maydalarǵa juqtıradı (Yusupov 1980).

S.O. Osmanovtıń (1965) kórsetiwi bo kórsetiwi boyınsha Qalǵan-Chirchiqtaǵı prudxozda aq amurdıń bir jılǵa deyingi (segoletka) maydalarınıń botriocefalez keselliginen qalǵanlıǵı (massovie gibeli), tovardı balıqlarında karpte (50.0% intensivnost 27 dana) bolǵanlıǵı, usı maqalasında kórsetedi. 1966-jıldıń gúzinde Qaraqalpaqstannıń hawız xojalıqlarında A. Urazbaevtıń tekseriwi natiyjesinde, aq amur balıǵı botriocefalyus penen 84.3% kesellengen hám olardıń sanı 224 danaǵa deyin bir balıqta ushırasqa. Al karpte 92.6% ke deyin kesellikti shaqırıwshı usı gelmint ushırasqa. Karptıń kóp sanda qırılǵanlıǵı kórsetiledi. Parazittiń sanı bir balıqta 127 danaǵa deyin jetken. Botriocefalyus penen kesellengen balıqlar Túyemoyın suw saqlaǵıshında da ushırasqa hám balıqlardıń óliwshiligi kórsetilgen (Osmanov, Urazbaev, Yusupov 1974).

Mine usı joqarıdaǵı botriocefalyustın júdákeń taralǵanlıǵın, barlıq Ózbekstannıń vodoemlarında ushırasatuǵınlıǵın esapqa ala otırıp hám balıqtıń awlanıw zapasına kóp sanda zıyanın tiygizetuǵınlıǵına kewil bóle otırıp, Qaraqalpaqstan parazitologleri Amiwdáryanıń tómengi jaǵında botriosefalyustıń biologiyasın islep shıqtı.


Nátiyjede Amiwdáryanıń tómengi aǵısındaǵı vodoemlarda botriocefalyustıń birinshi iyesi (xozyayn) ciklop hám diaptomus ekenligin anıqlap berdi. Olardan 12 túr ciklop hám 1 tur diaptomustı atap kórsetti. Solardıń ishinde 3 túr ciklop birinshi ret kórsetilgen (aralıq xozyayinge). (Urazbaev, 1970, 1973, Allaniyazova 1975).

Dawıtkól suw saqlaǵışınan T. Allaniyazova (1975) tárepinen 50000 dana ciklop tekserilip, 986 danası yaǵnıy (1.9%) botriocefalyustıń lichinkası menen zárerlengen. Olardıń intensivnost 1-2 dananı quraǵan. Cikloplardıń zárerleniwi avgust ayında bolǵan (2.9%). Suwdıń ortasha temperaturası 26.3 gradus bolǵan.

Joqarıdaǵı keltirilgen faktlerden tómendegishe juwmaq shıǵarıwǵa boladı. Qaraqalpaqstannıń vodoemları botriocefalyustıń kóbeyiwine hám rawajlanıwına júdá qolaylı bolıp keledi. Sonıń ushın bulardıń aldın alıw jolların izlestiriw kerek. Hawızlerdi dizenfekciya islew kerek. Botriocefalyuslerge qarsı gúresiw ushın antigelmentik retinde, medikamentiklerden kamalanı, fenasaldı, fenatizindi, devermin hám taǵı basqalardı instrukciyaǵa muwapıq qollanıwǵa boladı (Musselius, 1960, 1973, Sherban, 1965, Muzıkovskiy, 1968, 1969, Brichuk 1972).

Biziń suwlarımızǵa botriocefalyus aq amur balıǵı menen birge kelgen. Burın aq amurdı alıp kelgenge deyin bolmaǵan. Bizge aq amur kelip jetkennen keyin kóp uzamay bul gelmint biziń jergilikli balıqlardıń kóplegen túrine juqtı. Házirgi waqıtta júdá kóp túrli balıqlarda, sonın ishinde Dawıtkól suw saqlaǵışında da kóp túrli balıqlarda tabılǵan (Yusupov 1980).

2-SÚWRET. *Bothriocephalus opsariichthydis* – rawajlanıw cikli.



Pispegen máyek birinshi kún. 2. Pispegen máyek 2-3 kúnlik. 3. Piske máyek 3-5 kún. 4. Koracidiya shıqqan máyek 5-8-kúnlik. 5. Máyekten koracidiyanıń shıǵıwı 5-8-kún. 6-7-koracidiya máyekten shıqqan soń 2-3-kúnlik. 8. Procerkoid cikloptıń denesinde 1-2-kúnlik. 9. Procerkoid cikloptıń denesinde 2-3-kúnnen keyin. 10. Procerkoid cikloptıń denesinde 6-8-kúnlik. 11. Sazan gelminttiń aqırǵı xojaynı. 12. Sazannıń ishegindegi pleorocerkoid 4-6-kúnnen keyin. 13. Sazannıń ishegindegi plerocerkoid 5-8-kúnnen keyin. 14. Sazan ishegindegi gelmint skoleksi 20-25 kúnnen keyin. 15. Pisip jetiliske gelmint 20-25-kúnnen keyin (B. Allamuratovtan, 1969, 1974).

KLASS TREMATÍDLAR – trematode Rudolphi 1808

KISHI KLASS – Prosostomata Odhner 1905

OTRYAD – Strigeidida (La Rue 1926)

TREMATOD LICHINKALAR (metacerkariya) balıqlarda parazitlik etedi.

TUWÍS – DIPLOSTOMATIDAE POIRIER 1886

ÁWLAD – Diplostomum Brandes 1892.

TÚR – Diplostomum spathaceum (Rudolphi 1819). (**3-súwret**).

Iyesi (xozyayn): aq amur, Dawıtkól suw saqlaǵışınan bul parazittiń metacerkariyası 14 túr balıqtan tabılǵan (Yusupov 1980-2).

Jaylasqan múshesi (lokalizaciya): kózdiń qarashıǵı (xrustalik glaz). Tabılǵan jayı: Dawıtkól suw saqlaǵış ıresek forması balıq jewshi quslardıń, solardıń ishinde kóbirek shaǵalalardıń isheginde parazitlik jol menen tirishilik etedi.

D. Spathaceum – aralıq iyelerdiń járdeminde kóbeyedi, birinshi aralıq iyesi (xozyayn) mollyuska – ushkovie prudoviki (Aristanov, Yusupov 1978 g). Eresek (polovozrelyy) forması D. Spathaceumniń Aral teńizinde gúmis tárizli shaǵalalardıń, Qarabas xoxotunniń, qádimgi shaǵalanıń, qara, dárya krachkasınıń hám chegravanıń isheklerinde ushırasadı (Turemuratov 1962, 1976).

Túrdiń opisaniesi (avtorıń materiallarına). Metacerkariydiń forması uzınshaqlaw máyek tarizli (ovalnyy), uzınlıǵı 0.432 mm hám eniniń en enli jeri 0.233 mm. awız prisoskasınıń forması dóńgelek (0.075 mm), onıń tesigi cubterminalnoe. Uzınsha sharshardıń ólshemi 0.034 x 0.019 mm. qarın prisoskası (sorıǵış) denesiniń eki yarımınan Brandestiń janına jaylasqan. Ol kese kóldeneń tárepke qaray burılǵan hám onıń ólshemi 0.042 x 0.046 mm. Brandes uzınshaq, onıń ólshemi 0.084 x 0.071 mm.

Procent hám intensivnost. Bul metacerkariya Dawıtkól suw saqlaǵışındaǵı aq amur balıǵınan tabılǵan D. Spathaceum (63.38% intensivnost 1-28 dana).

Áwlad: Posthodiplostomum dubois 1936

Túr: Posthodiplostomum cuticolf (Nordmann 1832)

Iyesi (xozyayn): aq amur

Ushirasqan múshesi (likalizaciya): saǵaq japıraqshası, qalashları góshi.


Ushirasqan jayı (mesto naxojdeniya): Dawıtkól suw saqlaǵışı.

R. cuticoka balıqta tek metacerkariy stadiyasında parazitlik qıladı.

Bulardıń birinshi aralıq iyesi – Planorbis planorhis (Vladimirov 1960). Bul parazittiń er jetken dáwiri quslardıń isheginde ótedi. Sol jerde máyek qoyıp kóbeyedi – bul tiykargı iyesi dep ataladı, bular: qutanlar hám kvakva.

Procent hám intensivnost. Aq amur balıǵı Dawıtkól suw saqlagışında 12.0% ke zárerlengen (zarajeniya), olardıń intensivnost 5-7 ekz.

**3-SÚWRET. TIP NEMATGELMINTLER (Dóńgelek qurtlar) –
Nemathelminthes.**



Bul tipke kiretuǵın jániwarlardıń birinshi dene quwıslıǵı boladı, bul quwıslıqqa ishki organları jaylasadı. Dene quwıslıǵınıń sırtı teri yamasa teri muskullarınan ibarat bolǵan qalta menen oralǵan boladı. Háreketti sirtın qaplaǵan kirpikshelerdiń yamasa muskullardıń járdeminde boladı. Deneler kóbinese uzınshaq dóngelek bolıp keledi. Bulardıń ayırım wákılleri erkin halda jasaydı, ayırım túrleri omırtqalı haywanlarda parazitlik jol menen tirishilik etedi. Balıqlarda parazitlik jol menen jasap, olardıń shabaqlarına kóp ziyan keltiredi. Erkin hareket etiwshi wákılleri tenız suwlarında, dushshı suwlarda tirishilik etedi. Parazitlik halda jasaytuǵınları suwda hám qurǵaqta jasaytuǵın haywanatlarda, ósimliklerdiń denesinde tirishilik etedi. Bul tipke 6 klass kiredi. Solardıń ishinen nematod klası toligi menen parazitlik jol menen tirishilik etedi. Olar suw hám qurǵaqtaǵı haywanatlar ham ósimliklerde parazitlik jol menen tirishilik etedi.

Dóngelek qurtlar – denesi sozılınqı, buwinlarǵa bólinbegen celendr yamasa urshıq tárizli kóldeneń kesindisi dóngelek, tenizlerde, dushshı suwlarda, topıraqta, geybir túrleri adamda, haywanatlarda, ósimliklerde parazitlik jol menen tirishilik etetuǵın jánlıklar boladı. Bulardıń denesinde buwıltıǵı bolmaǵanlıqtan, jumır (dóngelek) qurtlar dep ataladı. Jer júzinde dóngelek qurtlardıń 20000 ga jaqın túrleri tirishilik etedi.

Dóngelek qurtlardın kópshiligi parazitlik jol menen tirishilik etedi, solardıń biri adam isheksorgıshı hám qurtın mısasında úyrenemiz. Úlken adamlardan góre, jas óspirimlerdiń isheginde parazitlik jol menen tirishilik etedi, eki ushı da súyirlenip kelgen, denesiniń forması hám uzınlıǵı 20 sm. Ge jetetuǵın aqshıl yamasa sargısh túsli dongelek qurt ishek sorgıshı dep ataladı. Isheksorgıshı eki ushın qadap, ishekte tirishilik etedi.

Ishek sorgıshınıń aldińǵı ushında awzı, sońǵı boleginde anal tesigi (artqa shıǵarıw tesigi) boladı. Artqa shıǵarıw tesiginen keying dene bólimi quyırıq dep ataladı. Ishek sorgıshınıń awzında úsh erin bar. Qurt sol erinler arqalı ishektiń diywalına qadalıp, qan sorıydı. Olardıń denesi tigız qabıqsha menen kutikula

menen qaplangan, kutikulanın astında uzun salalı bulshıq etleri boladı. Kóldeneń salalı bulshıq etleri bomaǵanlıqtan, isheksorgıshı denesin jıyıra, qısqarta almaydı, onın denesi sozılmaydı da, sonlıqtan formasın ózgerter, ján-jagına iyiledi.

Ishek sorgıshının denesin qaplagan tıǵız qabıqsha teri – bulshıq et qapshıǵı dep ataladı. As pisiriw hám basqa músheleri teri bulshıq etiniń astındaǵı suıqlıqqa tolı quwıslılar depte ataydı.

Isheksorgıshının awqatı awzınan tútik tárizli ishekke ótedi. Ishegi úsh bólekten quraladı: aldınǵı, ortanǵı hám sońǵı. Pisirilgen (qorılǵan) awqatı ishektiń diywalları sorıp, dene quwısın toltırıp turgan suıqlıqqa jetkiziledi, onı denenin jasawshıları sindiredi. Sinbey qalğan awqat qaldıǵı deneniń sońǵı bólegindegi anal tesigi arqalı sırtqa shıǵaradı.

Ishek sorgıshında qan aynalıw hám dem alıw musheleri bolmaydı, ol dóngelek qurtlar sıyaqlı dem aladı. Nerv sisteması jalpaq qurtlarǵa uqsas. Seziw organları júdá tómén rawajlangan, deneniń aldınǵı jagında teridegi oyıqta ximiyalıq sezim múshesi boladı.

Isheksorgıshlar – bólek jınıslı jánlıklar. Analıǵınan atalıǵı qısqa boladı hám atalıǵının quyırq bolegi ishke qaray iymeklenip turadı. Isheksorgıshınıń analıǵında eki máyek bezi, al atalıǵında bir atalıq bez ornasqan. Shaǵılısqan mayekler ishekke bólinip shıǵıp, sinbey qalǵan awqat qaldıǵı menen birge sırtqa shıǵarılıp taslanadı. Ondaı ortaǵa túsken mayekler (olardıń sanı 200000 ǵa deyin jetedi) birneshe kúnnen soń lichinkalarǵa (dernásillerge) aynaladı. Usınday rawajlangan máyekler kóldiń kiri hám juwılmaǵan miywelerdi jarıp, násiller (lichinka) ishek diywallarına jabısa, sóytip bosir (askarido) keselligin payda etip, isheksorgıshı (askarida) bólgen ullı zatlardan ishektiń xızmeti buzıladı.

Lichinkalardıń qan menen birge ókpege barıwı múmkin, ondayda qırıq bólinip, adam jóteledi. Qaqırıq penen birge isheksorgıshınıń lichinkası awızǵa

adam jutinganda qaytadan ishekke tusedi. Endi ol tayar azıq penen awqatlanıp, jetiledi de úsh aydan soń eresek ishek sorgıshına máyekleydi.

Ushqırqurtlar adamnıń, ásirese, jas balanıń tik (tuwrı) isheginde tirishilik etetuǵın dóńgelek qurttıń biri – ushqırqurt. Onıń denesiniń forması isheksorgıshına uqsas, atalıǵı analıǵınan eki ese qısqa boladı. Ushqırqurttıń denesiniń uzınlıǵı 10 millimetrge deyin jetedi hám sırtqa atalıǵı ǵana tiriley shıǵadı. Qurttıń quyrıq bólegi júdá jıńishkerip pitedi, sonlıqtan qurt ushqırqurt dep ataladı. Onıń analıǵı máyegin analıq tesiginiń shıǵa berisine saladı da, deneni qıshıtadı. Onı qasıǵanda turnaq astına jabısıp, qaytadan awızǵa tusedi. Ol ash ishekke, búyrekke hám soqır ishekke ótip, olardı qabındırıw arqalı soqır ishek keselligine shalındıradı.

Askarida hám ostricadan saqlanıw ushın – tazalıqtı saqlaw: tamaqlanıw aldında miynetli túrde qol juwıw, miywelerdi tek juwǵan halında jew, suwdı qaynatıp ishiw kerek.

Dóńgelek qurtlar – erkin qozǵalatuǵın denesi buwınlarǵa bólinbegen, sozılınqı, kóplegen túrleri ósimlikler menen haywanatlarǵa parazitlik jol menen tirishilik etetuǵın cilindr tárizli jánlikler bolıp tabıladı. Bulardıń denesiniń uzınlıǵı 1 millimetrden 8 metrge deyin jetedi.

Isheksorgısh hám ushqır qurtlar adamǵa parazitlik etetuǵın qurtlar bolıp tabıladı. Dóńgelek qurtlardıń denesi kutikula menen qaplangan, denesinde quwısı boladı, awız quwısı - denesiniń aldınǵı jaǵında, al anal tesigi - artqı jaǵında orınasadı. Kóplegen dóńgelek qurtlarda teri bulshıq et qapshıǵı boladı. Kóldeneń jolaqtı bulshıq etleri bomaǵanlıqtan, dóńgelek qurtlar denesin qısqartsa da, soza almaydı, tek ján-jaǵına iyiledi. Dóńgelek qurtlarda dem alıw hám qan aynalıw sisteması bolmaydı. Bular dara jınıslı jánlikler. Dóńgelek qurtlardıń atalıǵınan analıǵı uzın. máyek arqalı kóbeyedi, lichinka menen kóbeyetuǵın túrleri bar.

Zoologiya iliminiń parazit qurtlardı izertleytuǵın salası – gelmintologiya dep ataladı. Indoparazitler (ishkiqurtlar) adam hám haywanatlardıń, ósimliklerdiń aǵzalarında parazitlik jol menen tirishilik etedi, olar arqalı payda bolatuǵın awırıwlar ishqurt awırıwlar yamasa gelmintoz dep ataladı. Ishqurtlardın sebebinen balıqlar, kurslar iri shaqlı hám mayda shaqlı mallar awırıwları múmkin. Ishqurtlar adamlar ushın da qáwipli. Sonlıqtan elimizde ishqurtlarga qarsı gúres júrgiziw ushın sharalar qolǵa alındı. Bul salada akademik K.I. Skryabin hám onın shákirtleri ilimde hám is júzinde paydalanılatuǵın júda áhmiyetli nátiyjelerge iye boldı. Ishqurtlarǵa qarsı gúres júrgiziwdin kóplegen sharaların usınıp, ishqurt awırıwınıń aldın alıw ilajların belgilep berdi. K.I. Skryabinniń baslawı menen den sawlıqtı jaqsartatuǵın josparlı sharalar jolǵa qoyıldı.

Adam menen awıl xojalıq malların gelmintlerden qutqarıwdıń tómendegidey jolları belgilendi: 1. Gelmint taratıwshılardı parazitlerden qutqarıw, yaǵnıy gelmintti joyıw. 2. Sırtqı ortalıqtaǵı gelmintlerdi joq etiw, ol mınalardı óz ishine qamtıydı: a) terilerdi yamasa ólgen mallardı biotermiyalıq jol menen zıyan keltirmeytuǵınday etiw, bundayda ólimtik durıs tógilse, bakteriyalardıń tirishilik háreketinen temperature +50 grad. C danda kóp, +70 grad.C ǵa deyin kóterilip, gelmintlerdiń máyegi menen lichinkaları nabıt boladı. b) mal jaylawın almasıw, sonda gelmintlerdiń násilleri aralıq iyesi bomaǵanlıqtan óledi. v) soylǵan maldın et ónimlerin mal dárigerdiń tekseriwinen ótkeriw, tazalıǵın anıqlaw.

KLASS NOMATADÍ yamasa dóńgelek qurtlar – Nematoda Rudolohi (1808)

OTRYAD – Ascaridida skrjabin et Schuls 1940

KISHI OTRYAD – Ascaridata Skrjabin 1915

TUWÍS – Anisakidae Skrjabin et Karpkhin 1945

ÁWLAD – Contracaecum Railliet et Henri 1945

LICHINKA – III stadiya áwlad contracaecum

Contracaecum microcephalum Rud 1809

Sin. Contracaecum squalii (Tinstow 1907)

Iyesi (xozyayn): aq amur ushırasqan múshesi (lokalizaciya) ishki dene quwıslıǵı (v polosti tela).

Tabılǵan jayı (mesto naxojdeniya): Dawıtkól suw saqlaǵışı.

Túrdiń opisaniesi (avtordıń materiallarınan). Ulıwma alǵanda bul *C. microcephalum* balıqtın ishki dene boslıǵında isheklerdiń sırtqı diywallarında chistada boladı. aq amurde tek lichinka halatında gezlesedi. Cistadan shıǵarıp ólshegenimizde lichinkanıń uzınlıǵı 3.6-7.3 mm, eni 0.16-0.25 mm, bas jaǵı domalaq, 3 rudimentarnıy erni bas bólimine jaylasqan, jutqınshaq ósimshesi, jutqınshaqtın ózinen uzınraq, onıń uzınlıǵı 0.43-0.54 mm ge jetedi. Ishek ósimshesi kishilew boladı, onıń uzınlıǵı 0.28-0.46 mm. quyırǵı súyir, onıń uzınlıǵı 0.09-0.17 mm.

Procent hám intensivnost. Bul parazit Dawıtkól suw saqlaǵışınan aq amur balıǵınan, onıń *C. microcephalum* menen zárerleniwi 30.76% ti quraydı. Intensivnost 1-5 dana parazitke teń boladı. Ortasha sanı 3 danaǵa ten keledi.

*C. microcephalum*niń lichinkaları balıqlardı parazitlik etip jasadı. Bular balıqtıń ishki dene quwıslıǵında boladı. Úlken forması (er jetken) balıq jewshi quslardıń isheginde jasadı, máyek qoyıp kóbeyedi. Aralıq iyesi arqalı kóbeyedi.

TIP BUWÍN AYAQLÍLAR – Arthropoda

PODTIP JABRODÍSHAYUSHIE – Branchiata

KLASS SHAYAN TÁRIZLILER – crustacean Zamarck 1801

KISHI KLASS ESKEK AYAQLÍ SHAYAN TÁRIZLILER – Copepoda Edulards 1840

KISHI OTRYAD – Cyclopoida Sars 1886

TUWÍS – Zernaeidae Cobbold 1879

ÁWLAD – Zernaea Zinnaeus 1758

TÚR – ternaea elegans Zeiqh – Sharpe 1925

Iyesi (xozyayn): aq amur

Ushırasqan múshesi (lokalizaciya): terisi, saǵaǵı, qalashları.

Tabılǵan jayı (mesto naxojdeniya): Dawıtkól suw saqlaǵışı.

Túrđıń sıpatlaması (avtordin materiallarınan). Denesiniń uzınlıǵı 6.4-10.7 mm. arqa oyılmasınıń uzınlıǵı 1.5-3 mm, búyirniki 0.5-1.2 mm.

Procent hám intensivnost. Bul shayan tarizliler Dawıtkól suw saqlaǵışınan aq amur balıǵınan tabıldı. Onıń zárerleniwi 16.0%, intensivnost 1-3 danaǵa tuwra keldi.

Bul parazit aq amurden birinshi ret avtor tarepinen kórsetilip otır. SNG ge jaǵdayında, arqa rayonlardan basqa barlıq jerlerge kórsetilgen. Z.eledans, á sirese, hawız xojalıǵındaǵı karp, sazan baliqlarına óte kóp zıyanın tiygizedi, kóbinese túslik rayonlarda.

Pitkeriw qánigelik jumıstın ekinshi bóliminde dala saparında aq amur balıǵınan jıynalǵan, parazitologiyalıq materiallar belgili bir tablicaǵa jámlengen.al tekstte bolsa tek ǵana usı házirgi Dawıtkól suw saqlaǵışındaǵı aq amur balıǵındaǵı parazitlerdiń ekologiyalıq ózgerisleri sóz etiledi.

Aq amur – *Otenophorynqodon ideila* (Valenciennes) Ózbekstanǵa keńnen taralǵan bolıp, kóbinese qoldan hawız xojalıǵında ósiriledi. Sebebi, sazanǵa salıstırǵanda júdá tez ósedı, góshi mazalı, eki jıllıǵının salmaǵı 800-1.5 kg. ǵa deyin ósedı. Prudxozlarda qoldan awqatlandırıladı. Ózbekstanda 1961-jılı karptı ósiretuǵın bir ǵana prudxoz domashi bolǵan bolsa, keyin Kalǵanchirchiq prudxozi qurıldı. Onnan keyin Samarqandta, Buxarada, Ferganada, Andijanda, Xorezmde qurıldı. Qaraqalpaqstan Respublikasında házirgi waqıtları Moynaq prudxozi, Nókis balıq xojalıǵı islep turıptı. Bularda karp balıǵı qoldan órshitedi. Nókis balıq zavodınıń ózinde karptı ósirip Dawıtkól suw saqlaǵışına hár jılı kóp sanda jiberip turıptı. Karpler úshke bólinedi (Zerkalnyy, Cheshuychatiy hám goliy).

Karp balıǵınıń parazitini Ózbekstanda birinshi ret S.O. Osmanov (1964, 1965, 1966) Tashkent oblastlarındaqı rıbxozlardan 1347 danasın, Kattaqorǵan suw saqlaǵışınan (39) danasın hám Qaraqalpaqstandaǵı burınǵı XXII partsezd sovxozınan (14) danasın teksergen.

Aq amur – *Ctenopgarypqodon ideila* (Valenciennes). Bul balıqtıń tábiyiy taralǵan jayı Qıtaydaǵı amur dáryasınıń ortanǵı hám tómengi aǵısı bolıp: Sungar, Ussiri hám óz. Xanka tap túslik Qıtaydaǵı Kaptonaǵa deyin taralǵan (Berg.1949).

Ózbekstanğa Qıtaydan akklimarizaciyanı 1961-63-jılları aq amurdıń bir jastaǵıların Kalganchirchiq balıq hawız xojalıǵına alıp kelingен. Al, Qaraqalpaqstanğa 1964-jılı sol waqıtlardaǵı XXII partcezd sovxozına aq amurdıń bir jıllıq hám proizvoditeli alıp kelingен. Sonnan keyin Amiwdárya arqalı Aral teńizine hám basqa da suw saqlaǵıshlarǵa, kóllerge, izeykeshlerge tarap ketken.

Men pitkeriw qániygelik jumısım ushın Dawıtkól suw saqlaǵıshınan 25 dana aq amur balıǵın izertledim. Dawıtkól suw saqlaǵıshındaǵı aq amur balıǵının ulıwma parazit penen zararleniwi (zarajennost) 100% boldı. Solardin ishinen aq amur balıǵı monogenen menen júdá joqarı dárejede zárerlengen yagnıy 80.0%, trematod penen 72.0%, cestod penen 44.0%, nematod penen 20.0%. al ápiwayılar menen 28.0-32.0%, al rakoobraznı menen tómén dárejede qabillanǵan bolıp, tek ǵana 16.0% ti, nematodlar menen 20.0% ti quraydı (keste 1). Barlıǵı bolıp aq amur balıǵınan 9 túr parazit tabıldı (keste 2). Bulardan ápiwayılar úsh túr, monogenne 1 túr, cestol 1 túr, trematode 2 túr, nematode 1 túr, rakoobraznıy 1 túr. Buringı aq amur balıǵın teksergen ilimpazlardıń parazitologiyalıq materiallarına salıstırǵanda bizde turdıń sanı bir qansha az boldı. Bunıń sebebi, ekologiyalıq jaǵdaylarǵa, suwdıń duzlıǵınıń kóbeyip ketiwine baylanısli dep bilemiz. Aq amur balıǵınan tabılǵan Dacty – logyrus Lamtllatus hám Bothriocephalus opsariichthydis bul balıq ushın specifichniy túrge jatadı, al Zschokkella striata hám Ch cypini aq amur balıǵı menen birge izge keltirilgen.

**Dawitkól suw saqlaǵışındaǵı aq amur balıǵınan tabılǵan
parazitlerdiń gruppalarınıń zárerleniw
maǵlıwmatları tuwralı.**

Kn	Parazitlerdiń gruppaları	Zárerleniw procenti
1.	Tip Knidosporidin	
2.	Klass Miksopsporidin	28.0
3.	Tip resnichnie	
4.	Klass krugloresnichnie (dóńgelek kirpikliler)	32.0
5.	Tip ploskie chervil (jalpaq qurtlar)	
6.	Klass monogenei	80.0
7.	Klass cestodlar	44.0
8.	Klass Trematodlar	72.0
9.	Tip nematgelmintler	
10.	Klass dóńgelek qurtlar	20.0
11.	Tip buwın ayaqlılar	
12.	Klass rakoobraznie (shayan tárizliler)	16.0

Aq amur balığında Dawıtkól suw saqlağıshınan tabılğan (2-keste) túrdıń eki túri aq amurğa specifichnıy turler, qalğanları basqa balıqlarğa kennen taralgan. Bunıń sebebi, aq amur bul túrlerdi usı kól-dáryalardağı burınnan jasap kiyatırğan balıqlardan juqtırğan parazitlerdiń turi bolıp sanaladı. Avtor tárepinen kórsetilgen aq amurdegi usı 9 túr parazittiń ishinen jiyi ushırasıp turatuǵınlarınan dactylogus lamellatus (80%), Diplostomum spathaceum (64%), B. Opsariichthydis (44%), Tripartiella epizootica (32.0%). Patogennıy parazitke B. opsariichthydis, D. spathaceum – bul túrler Dawıtkól suw saqlağıshında aq amur, sazan, yaz, qızıl qanat, aq shabaq hám basqalarda jiyi-jiyi ushırasıp turadı (Yusupov, 1980).

Dawıtkól suw saqlağıshındaǵı aq amurden tabılğan 9 túr parazitinen 3 túri (2-keste) aralıq xozyaynnıń járdeminde kóbeyedi, qalğan eki túri aralıq xozyaynnıń járdemisiz kóbeyedi. Bul úsh túr + benen belgilengen.

**Dawitkól suw saqlagışındağı aq amurdiń
parazitofaunası tuwralı**

№	Parazitlerdiń túrleri	Dawitkól suw saqlagışı		
		Zárerleniw procenti	Intensivnost dana	Indeks liya/ ortasha
1.	Zschokkella striata	24.0	1-2 plazmodin	
2.	Chlozomyxum cyprini	16.0	2-4	
3.	Trichodinella epizootica	32.0	-	0.8
4.	Dactylogyrus Lamellatus	80.0	1-247	9.5
5.	Bothriocephalus opsariichthydis +	44.0	4-160	35
6.	Diplostomum spathaceum +	64.0	3-112	31.5
7.	Postodiplostomum cuticola +	12.0	5-7	-
8.	Contracaecum microcephalum	20.0	1-5	-
9.	Lernata elegans	16.0	1-3	-

Aq amurden Dawıtkól suw saqlaǵışındaǵı usı qanıgelik jumıs ushın jıynalǵan parazitologiyalıq materiallardıń ishinen 2 tur burın (T. epizootica hám S. microcephalum) aq amur dep tabılmaǵan. Sol sebepten avtor tárepinen birinshi ret kórsetilip otır.

Aq amurdiń mayda lichinkaları suwdaǵı mayda cikloplardı jep awqatlanadı. Úlken jastaǵıları iri ot-shópler (qamıs, jeken, shalan) menen awqatlanadı. Sol sebepli Dawıtkól suw saqlaǵışındaǵı aq amurdiń awqatlıq zatları arqalı parazitlerdiń aralıq iyeleri (xozyayn) ne ótip ketip aq amurǵa parazitler juǵadı. Ayırım rak tárizlilerdiń (ciklop) hám bentoslar arqalı ótip otıradı. Balıqlardıń awqatlıq zatlarınıń túrleri hám olardıń muǵdarı Dawıtkól suw saqlaǵışında S. Embergenov hám N.Z. Husaynova (1971), R.T. Tlewov (1981) tiń jumıslarında kórsetilgen.

Ámiwdáryanın deltasında aq amurdiń parazitlerin birinshi ret Osmanov, Urazbaev, yusupov (1966), al Túslik Aral teńizinde Osmanov, Yusupov (1967) ler izertlegen.

Bul avtorlar aq amurden 14 tur parazit tapqan. 1967-1971-jılları Túslik Aral tenizinen (Abbas, Sarbas, Djıltırbas zalivlerinen) S.O. Osmanov, E.Aristanov, K.Ubaydullaev. O.Yusupov (1976) izertlewleri nátiyjesinde aq amurden 30 túr parazit kórsetken.

1972-1973-jılları O.Yusupov (1980) Dawıtkól suw saqlaǵışınan aq amurden 19 túr parazit tapqan.

Hazirgi jaǵdayda ekologiyalıq ózgerislerdiń nátiyjesinde Dawıtkól suw saqlaǵışınıń jaǵdayı putkilley ózgerdi, suwdıń duzlılıǵı artıp ketti, suwı pataslandı. Sol sebepli usı pitkeriw qanıygelik jumıs ushın izertlengen aq amurden tek ǵana 9 túr parazit shıqtı. Joqarıdaǵı avtorlardıń parazitologiyalıq materiallarına salıstırǵanda aq amurdiń paraziti Dawıtkól suw saqlaǵışınıń jaǵdayında 3.8 esege kemeyip ketkenligi málim boldı.

Aq amur iri shóplerdi jep (qamis, suw otları, shalanlar) kanallardı, jap salmalardı tazalaydı. Sol sebepli biologiyalıq meliorator xızmetinde atqaradı.

3.3. Aq amur balığı parazitlerine akklimatizaciyanıń tásiiri.

Aq amur parazitleriniń ózgeriwine akklimatizaciyanıń tásiiri haqqında túsinik.

V.A. Dogel (1938-1939) akklimatizaciya bolǵan jániwarlardıń parazitofaunasınıń ózgeriske ushıraytuǵınlıǵınıń ulıwma nızamlılıqların islep shıqtı. Bul miynetinde, eger de bir jániwar bir orınnan basqa bir uzaq jaqlarǵa aparılıp taslansa, ol aparılǵan jerde kóshirilgen jániwardıń jaqın tuwısı bolmasa, onda ol kóshirilgen jániwardıń parazitofaunasınıń kemeyetuǵınlıǵın yamasa parazitofaunasınıń pútkilley joq bolıp ketetuǵınlıǵı ashıp dáliyillep kórsetken.

Birinshi ret akklimatizaciyanı balıqlardıń parazitiniń ózgeriwine tasirin Aral teńizi jaǵdayında V.A. Dogel hám A.S. Lutta (1937) kórsetti. Iri ot-shóp jewshi balıqlardıń (aq amur, aq tolstolobik, pestrıy tolstolobik, qara amur h.t.b.) akklimatizaciyalangan, keying Ózbekstangá birinshi ret izertlep, onıa shıp kórsetken S.O. Osmanov (1971), B.A. Allamuratov (1974) boldı.

Aq amurdıń watanı Qıtay bolıp esaplanadı. Bul balıq Amur, Sungari, Ussuri dáryalarında, Xanka kolinde tirishilik etedi. Bul aq amurdıń tez ósetuǵınlıǵı, góshiniń mazalılıǵın, hawız xojalıǵında karp balığı menen qosıp ósirgende iri qamis, shalan usaǵan shóplerdiń kóp ekenligin esapqa alıp 1961 hám 1963-jılları Ózbekstanga akklimatizaciya etip ákelindi. Birinshi ret «Kalgan-Chirchiq» háwız xojalıǵında karantinnen ótti.

Qaraqalpaqstanda aq amur 1964-jılı XXII partsezd sovxozına alıp kelindi. Al Ámiwdáryaǵa hám Aral teńizine aq amur «Qarametniyaz» - Qaraqum kanalı arqalı túsken bolıwı kerek. Hazzirgi waqıtları barlıq kóllerde, suw saqlagışlarda, kollektorlarda júda kóp sanda ushırasadı ham tez taralıp ketti. Aq amurdıń

watanında (Qıtayda) 33 túr parazit bolǵan. Biziń vodoemimizǵa aq amur arqalı onıń specifichnıy parazitini alıp kelindi. *Balentidium ctenopoarinqodonis*, *Dactyloqyrus Lamellatus*, *D. ctenopharinqodonis*, *Diplozoon bychowski* – alıp kelindi. Basqa parazitleri óziniń watanı Qıtay vodoemlerinde qalǵan. Bunnan aq amurdiń parazitofaunasınıń akklimatizaciyanıń tásirinen 8.3 esege kemeygenin kóremiz. Bulardan basqa *B. qowkongensis* - te Qıtaydan alıp kelingende dep esaplanadı.

Bul joqarıdaǵı parazitlerdiń ishinen 1túr parazit (*Balentidium ctenopoarinqodonis*) aq amurdiń jegen qamıs, shalan usaǵan iri awqatların maydalap awqatlanıp, aq amurdiń iri awqattı maydalap tez sińiriwge óziniń járdemin tiygizedi.

Egerde balıqtı úlken jasında akklimatizaciya islense, alıp kelinse, onda ol sol balıq arqalı kóplegen túr specifichnıy parazitini ózi menen alıp keledi. Sonıń ushın lichinichnıy stadiyasında alıp kelinse, parazitini ózi menen birge alıpkeliw mǘmkinshiligine iye bolmaydı.

Parazitler aralıq iye menen kóbeyetuǵın túrleri akklimitizaciyalanǵan balıq penen alıp kelingeni menen kelgen vodoemlerde, olardıń birinshi, ekinshi hám ayırımlarında úshinshi aralıq xozyayini (iyesi) bolmasa, olap ólip ketedi. Sonıń ushı ózleriniń kóbeyiw ciklında aralıq iye talap etpeytuǵın tek tuwrıdan-tuwrı kóbeyetuǵın túrleri ákelingen balıqlar menen keledi.

Solay etip, biziń pitkeriw qanıygelik jumısı ushın jıynalǵan materialımızda ekologiyalıq ózgerisler anıq kórinip tur. Bul meniń ilimge qosqan jańalıǵım bolıp tabıladı.

Aq amurdiń awqatlıq zatları menen de kóplegen parazitler ótedi. Aq amurdiń kishkentay shabaqları cikloplar menen awqatlandı. Sol sebepten olarda cestodlar kóbirek ushırasadı. Cestodlardıń birinshi aralıq iyesi cikloplar boladı. al úlken amurlarda, kóbinese, trimatodlar kóbirek jerlesedi. Onıń sebebi trimatodlardıń birinshi aralıq mollyuskalar boladı.

IV-bap. Aq amurdiń tiykargı kesel tuwdırıwshı parazitleri ózgeshelikleri

Pitkeriw qaniygelik jumıstıń bul tarawında Dawtkól suw saqlaǵışındaǵı gezlesetuǵın aq amur balıǵınan izertlew nátiyjesinde tabılǵan parazitlik jol menen tirishilik etetuǵın parazitlerdiń ayırım balıqqa kóbirek zıyan keltiretuǵın túrlerine toqtaymız. Bul parazitler Dawtkól suw saqlaǵışında ózleriniń rawajlanıwına qolaylı jaǵday tuwılsa, á sirese, aq amurdiń mayda jas shabaqlarına (molod) kóbirek zıyan tiygizedi hám kóp sanda qırılıp jiberedi. Sol sebepli balıqtıń zapasına parazitler úlken zıyan tiygizedi. Olardan:

TRIXODINOZ. Bul keseldiń awırıw shaqırıwshı paraziti *Vrceolariidae* semeystvosına kiretuǵın kirpikli infuzoryalar bolıp tabıladı. Burınları bulardı trixodinalar dep ataǵan. Bul kirpikli infuzoriyalar (ápiwayı) aq amurdiń terisinde hám sagaq japıraqsalarında bolıp kóp sanda ushırasadı. Aq amurdiń lichinkaları júdá erte waqtınan-aq trixodanalar menen kesellenedi.

Dawtkól suw saqlaǵışında aq amurdiń *Trichodinella epizootica* menen 32.0%, ortasha intensivnost 0.9 danadan tuwra keledi. 1960-jılı Tashkent ribpitomniginde S.O. Osmanov (1965) karptıń 10 kúnlık lichinkası – 20.6%, bir aylıǵı – 42.0%, úsh aylıǵı – 93.3% ke deyin usı *T. epizootica* menen zıyanlanganıń kórsetedi.

Bul parazit kóbinese arıq balıqlarda júdá kóp muǵdarda rawajlanadı (Bauer 1959), sonday-aq, suwdiń temperaturası joqarı bolǵanda, kóbirek rawajlanadı (Allamuratov 1986).

1971-1973-jılları Dawtkól suw saqlaǵışınan O.Yusupov (1980) 6 túr balıqtan *Urceolariidae* semeystvosına kiretuǵın kirpikli infuzoriyanıń wákillerin tapqan: *Trichodina meridionalis* tortanın (molod) maydasında – 82%, *T. Luciopercae* soglada – 1 balıqtan, aq amurda – 20% *Trichodinella epizootica* aral súweninde – 1 balıqtan, sazanda – b46.6% *T. subtilis* shortanda 7.7% bolǵan. Bul

degen, Dawıtkól suw saqlaǵışında rawajlanıwı ushın barlıq jaǵdaylar bar degen sóz. Dawıtkól suw saqlaǵışında báhárde, jazda hám gúz aylarınıń basında trixodinalardıń kóbeyiwine, ósiwine júdá qolaylı jaǵday tuwıladı. Sonlıqtanda, ásirese, trixodinnoz keselligi Dawıtkól suw saqlaǵışında aq amurdıń mayda shabaqlarına júdá qáwipli kesellik bolıp tabıladı.

Emlew jollarıtrixodinoz keselligine qarsı antiparazitarnıe yagnıy as duzı bannası (5%), waqıtı 5 minut (Sherbina 1931) bolıp esaplanadı.

DAKTILOGIROZ. Bul kesellikti aq amurdıń saǵaǵında ektoparazitlik jol menen tirishilik etetuǵın qáwipli monogeney *Dactylogerus Lamellatus* shaqıradı. Bul kesel taratıwshı gelmint júdá specifichnıy bolıp, *Dactylogyrus Lamellatus* tek aq amurdıń sagaq japıraqsalarında ektoparazitlik jol menen tirishilik etedi. Parazittiń uzınlıǵı 0.50-0.53 mm boladı. Denesiniń keyingi jaǵında kushli eki ortanǵı, 16 qaptal qarmaqsaları boladı. rawajlanıwı tuwrı, aralıq iyenıń qatnasısız ótedi. Eresek qurt máyek qoyadı, máyegi júdá kóp sanda boladı. máyek aq amurdıń saǵaǵına qoyıladı, olar suw arqalı kóldegi suwǵa túsedi. Suwda rawajlanıp qaytıp basqa saw aq amurdıń hár qıylı jastaǵılarınıń saǵaǵına otıradı.

Dawıtkol suw saqlaǵışınan biziń izertlewimiz nátiyjesinde aq amurdıń 80.0% ti kesellengenligi anıqlandı. Olardıń sanı 1-247 danaǵa shekem, ortasha hár balıqqa 95 danadan tuwra keledi.

Dawıtkól suw saqlaǵışındaǵı pitkeriw qániygelik jumıs ushın izertlenip tabılǵan daktilogiroz, ásirese, balıqtıń mayda shabaqlarına júdá úlken epitootiyalıq xarakterge iye bolıp, aq amurde daktilogirez keselligin taratadı.

Olarǵa qarsı gúres, keselliktiń aldın alıw ushın usı parazit penen kesellengen aq amurdı, ammiachnıy vannadan ótkeriw usınıladı. Ol vanna 1 ml. 25% li amiyaktıń eritpesi 1 litr suwǵa qosıladı. Usı eritpede 0.5 minut aq amurderdi uslaǵanda aq amurdıń saǵaǵındaǵı gelmint suwǵa tógilip qırıladı (Bauer I dr. 1981).

BOTRIOCEFALEZ. Bul kesellikti *Bothriocephalus opsariichthydis* – degen saqıynalı gelmint shaqıradı. Bul qurt biziń vodoemımızǵa iri shop jewshi balıqlar menen 1961-jılları Qıtaydan kelip jetken. Qıtayda usı gelmintten aq amurdiń mayda shabaqları kóp sanda qırılǵan. Bizde bolsa karptiń hám basqa da balıqlardıń mayda shabaqları qırılǵan (Osmanov 1971).

Botriocefalez keselligi Ukrainaǵa (Malevickaya 1958), Moskva oblastına (Musselius 1962), Túrkmenshanǵa (Babaev I Sherbakova, 1963), Ózbekstanǵa (Osmanov 1963, Osmanov, Urazbaev, Yusupov 1966, Allamuratov 1966) kenneń tarǵan kesellik bolıp esaplanadı. Ózbekstanda birinshi ret V. Shzıfkshshsrnvgı tiń biologiyasın islep shıqqan (Allamuratov 1966). Bul keselliktiń awırıw shaqırıwshı gelminti *B. opsariichthydis* balıqlardıń isheginde parazitlik jol menen tirishilik etedi. Parazittiń aldınǵı jaǵında eki sorıwshı oyıǵı (skolesti) boladı da, usınıń járdeminde balıqtıń isheginin diywalına jabısađı. Jabısqan ornında jara payda boladı. Solay etip, balıqta «anemiya» qansızlanıw keselligine ushıratadı. Egerde ishekte botriocefalus kóbeyip ketse, ishekti bógeydi, sóytip awqat ótpey qaladı. Aq amurdiń (lichinkası) mayda shabaǵı 2-3 háptelik dáwirinde 80-100 parazit bir shabaqqa jabısqanda óledi. O. Yusupovtıń (1980) kórsetiwi boyınsha Dawıtkól suw saqlaǵışında kóp sanda usı gelminttiń saldarınan aq amurdiń qırılıp ketkenligin kórsetedi (O. Yusupov 1980). Krasnoperkanıń ishegin 5 eresek qurttıń orap taslap «Zakuporka» tamaqtıń ótpey qalǵanıń anıqlaǵan. Bul ishektiń aldınǵı jaǵında bolǵan, sol sebepten krasnoperka ash bolǵan hám botricefalyus ózinen uwlı zat bólip shıǵaradı (intoksikaciya) usılardıń saldarınan qırılǵan (Yusupov 1980).

Botriocefalyustiń máyekten shıqqannan baslap, kóbeyiw dárejesine deyin 28-30 sutka kerek boladı. Onda suwdıń temperaturası 16-19 gradus bolǵanda. Botriocefalyus tek vodoemda belgili dárejede aralıq iyesi (xozyayn) jetkilikli bolǵanda ǵana kóp sanda rawailanıwı múmkin. Botriocefalyus tek aralıq xozyaynnıń járdeminde kóbeyiw qásiyetine iye.

Bizni pitkeriw qaniygelik jumisqa izertlegen parazitologiyalıq maǵlıwmatımızda Dawıtkól suw saqlaǵışında aq amur balığı 44.0% zárerlengen bolıp shıqtı, bundaǵı gelminttiń sanı 4-160 dana boldı. Ádebiyattaǵı O. Yusupovtıń 1972-1973-jıllardaǵı maǵlıwmatına qaraǵanda (O.Yusupov 1980) Dawıtkól suw saqlaǵışında 10 túr balıqtan B. opsariichthydis tabılǵan, olar mınalar: aral aq shabaǵı – 90.0%, intensivnost 27-708, ortasha hár bir balıqqa 350 danadan, qızılqanat 31.5%, intensivnost 1-5 dana, aq amur 40.0%, intensivnost 4-650 dana, ortasha hár bir balıqqa 275.7 dana, ılaqa 90.0% intensivnost 1-685 ortashası 125 dana hám taǵı basqa balıqlar.

Bul gelmint penen kóbinese balıqtıń mayda shabaqları qırıladı. Sebebi olardıń denesi ele qatpaǵan hám parazitke qarsı immunitet joq. Sonıń menen birge mayda shabaqlar tek cikloplar menen awqatlanadı. Olar bul gelminttiń birinshi aralıq iyesi. Ózbekstanda botriocefalez benen 30 túr balıq kesellengen (Osmanov 1971, Allamuratov 1974).

Dawıtkól suw saqlaǵışında B. opsariichthydis-tiń biologiyasın islegen (Urazbaev, Allaniyazova 1977). Bulardıń aralıq birinshi iyesine 15 túr eskekayaq shayantárizlilerdiń (ciklop) wákillerin dizimge alıp kórsetken. Belgili ádebiyattaǵı maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda Dawıtkól suw saqlaǵışındaǵı aq amur balıǵında hám basqa da balıqlarda parazitlik jol menen bul gelmint (qıs aylarınan bóten) jıldıń barlıq máwsiminde rawajlana beretuǵınlıǵın, suwdıń temperaturası 27-28 gradus bolǵanda rawajlanıwdıń háwij alatuǵınlıǵın anıqlanǵan. Botriocefalyus júdá qattı pát penen rawajlanǵanda aq amurdıń ishki múshelerinde «nekroz» degen kesellikti shaqıradı. Sonıń nátiyjesinde, Dawıtkól suw saqlaǵışındaǵı jasawshı balıqlarda, ásirese, balıqtıń shabaqlarınıń kóp sanda qırılǵanlıǵı kórsetilgen (Yusupov 1980).

Ásirese, bul kesellik (botriocefalez) balıqlardıń mayda shabaqlarında kóbirek ushırasadı hám olarǵa kóp zıyanın tiygizedi. Shabaqlarǵa eresek balıqlardan juǵadı. Balıqlardıń bul botriocefalezden qırılıw dáwiri, birinshiden, vodoemda

balıqtıń awqatlıq zatınıń kem bolǵanlıǵınan, ekinshiden, balıqlardıń sanı júdá vodoemda kóp bolǵanlıqtan (plotnost posadki), úshinshiden, hár qıylı túrdegi balıqlar bir shuqırǵa jıynalıp qalǵanlıǵınan boladı. qarsı gúresiw ushın degelmintizaciya islenedi.

DIPLOSTOMOZ (4-súwret). Bul kesellikti Diplostomum spathaceum degen metacerkariy shaqıradı. Bul gelmint Ózbekstanǵa kenne taralǵan, barlıq suw xojalıqlarındaǵı (kól, dárya, kollektor h.t.b.) balıqlarda gezlesedi. D.spathaceum balıqtıń tek kózinde metacerkariy dáwirinde gezlesedi. Bul trematode balıqtıń kóziniń qarashıǵında boladı, kóp sanda jıynalsa «katarakt» (6-súwret) degen kesellikti shaqıradı júdá kóbeyip kózge juqqan bolsa, onda aq amurdiń kózinde «bilmo» degen keselliktiń formasına aynalıp, balıqtıń kózi soqır boladı (Musselius 1957). Bunnan (diplostemoz) balıq xojalıǵına keltiretuǵın zıyanı júdá kóp boladı. Diplostemoz benen awırǵan balıqlardıń salmaǵı kemeyedi, balıq azadı, sol sebepten balıq soqır bolǵanlıqtan, balıqlar dushpanlarınan qashıp qutıla almaydı, jaǵadaǵı balıq jewshi quslar qálegeninshe jey beredi. Diplostamoz keselligi menen kóbinese balıqtıń mayda shabaqları kesellenip, kóp sanda qırılıp ketedi. Sol balıqlardı soqır balıqlardı uslap jep, kóp zıyanın tiygizedi. Metacerkariydiń dáwiri máyek tárizli, ashıq aqshıl boladı, olardıń awız hám qarın sorıǵışları bar.

Jasaw cikli (jiznenniy cikl) Diplostomum tuwısında júdá quramalı bolıp keledi. Maritaları balıq jewshi quslardıń isheklerinde jasadı. Marita dep ererek formasına ayıladı. Kesel (soqır) aq amurdiń uslap jegen balıq jewshi quslar D. spathaceumniń metacerkariy dáwiri menen kesellenedi. Quslardın ishekligine jegen balıǵı menen túsken metacerkariy 4-5 kúnnen keyin ererek (polovozreliy) formasına (marita) aynaladı hám máyek qoya baslaydı. Bir ererek gelmint (marita) bir sutkada bir neshe júzlegen máyek qoyadı. Bulardıń embrionlıq dáwiri máyek ishinde 10-15 kúndi yaǵnıy suwdiń temperaturasına baylanisli boladı. quslardıń ónbey qalǵan awqatlıq zatları, dárisi menen birge diplostomumniń máyekleri

vodoemğa suwğa kóp sanda túsedı. Suwğa túskennen keyin máyekten lichinkalar (miracidin) shıǵıp, sırtı kirpiksheler menen qaplanıp suwda júzip bir neshe saat júredi. Suwdaǵı (vodoem) jasap atırǵan mollyuskalar awqatlıq zat retinde bul júzip júrgen miracidiyalardı uslap jeydi. Bul birinshi aralıq iyesi boladı. mollyuskalardıń ishki dene quwıslıǵında bul lichinkalar cercariyge aynaladı. Belgili waqıtlardan keyin cercariyler mollyuskalardı taslap suwğa shıǵadı. 1 sutkada bir mollyuska onlaǵan mın cercariylardı suwğa bólip shıǵaradı. Suwdaǵı cercariylerdiń ómiri bir sutkaǵa deyin ǵana sozıladı. Sol qısqa waqıttıń ishinde ekinshi iyesin balıqtı (aq amur) tawıp alıp, denesine, onnan qan arqalı júrip migraci (kózine ótiwi) kerek. Balıqtıń kózinde ol lichinkalar ekinshi dáwirine, yaǵnıy, metacercariy dáwirine ótedi, bul dáwir aq amur ushın júdá qáwipli. Balıqtıń kózinde, ulıwma bul metacercariydiń eresek qurtqa – maritaǵa deyingi dáwiri 1-2 ayǵa sozıladı. Onıń tezleniwi suwdıń temperaturasına baylanıslı. Ayırım jaǵdaylarda metacercariyler balıqtıń kózinde bir neshe jılǵa deyin jasawı múmkin (Shigin 1957). Bunnan keyin awırıw balıqtı balıq jewshi quslar jeydi, tiykarǵı iyesi (okonchatelnıy xozyayn).

D. spathaceum-niń tiykarǵı iyesi balıq jewshi quslar boladı. Bulardıń isheginde Maritaǵa aynaladı. Sonnan keyin diplostomumniń tazadan jasaw cikli qayta baslanıp kete beredi. Jasaw cikliniń tezleniwi, tek suwdıń temperaturasına baylanıslı boladı. Suwdıń temperaturası joqarılasa parazittiń jasaw cikli tezlesedi, suwdıń temperaturası tómense, gelminttiń rawajlanıwı da páseyedi. Dawıtkól suw saqlaǵıshında diplostomos keselliginiń aq amurǵa taratıwshı birinshi aralıq iyesi mollyuska, ekinshi aralıq iyesi aq amur, úshinshi tiykarǵı iyesi balıq jewshi quslar boladı. rawajlanıwı suwdıń temperaturasına baylanıslı, ómirlik cikli máyek, birinshi lichinkası miracidiy – suwda, ekinshi dáwiri cercariy – mollyuskada, úshinshi dáwiri metacercariy – balıqta (aq amur), tórtinshi dáwiri Marita – balıq jewshi qusta (isheginde) bul dáwiri eresek gelmint kóbeyiwge tayar eń aqırǵısı boladı.

Diplostomozdın kóbeyiw dáwiri, ásirese, jaz aylarına tuwra keledi. Sebebi, suwdın temperaturası ol aylarda joqarı boladı.

Dawtkól suw saqlaǵışında bizler aq amur balıǵınan pitkeriw qániygelik jumıs ushın kúnniń jıllı kúnlerinde parazitologiyalıq material jıynadıq, aq amur balıǵınan *Diplostomum spathaceum* (64%), intensivnost 3-112 danaǵa tuwra keledi, ortasha hár bir balıqqa 31.5 danadan.

Balıqtın jasınıń úlkenligine qarap *D.spathceum* menen keselleniwi kemeyedi (Shigin 1975). Vodoemda parazittiń aq amurge juǵınıwınıń tiykarı balıq jewshi quslar hám bryuxonogie mollyuskalar bolıp tabıladı, bulardıń ekewide Dawtkól suw saqlaǵışında bar. Aq amurdıń 10 kúnlik lichinkası 1 diplostomumnan, 1 aylıq lichinkası 1-2 metacerkariyden, lichinkanıń 1 aydan joqarısı 3-5 metacerkariyden óledi. A.A. Shiginniń (1975) eksperiment arqalı sheshken materialında úlken ererek aq amurdıń kózine 30 dana jabısqanda ólgenligin kórsetedi.

S.O. Osmanovtıń (1971) kórsetiwinshe Ámiwdáryanıń quyar jerindegi vodoemlarda 16 túr balıqtan *D. spathaceum* tabılǵanlıǵı belgili.


O. Yusupovtıń (1980) 1972-1973-jıllarda Dawtkól suw saqlaǵışınan 14 túr balıqtan tapqanlıǵı ádebiyattan belgili. Solardıń ishinen karp – 50.0%, ılaqa – 90.0%, aq amur – 70.0%, aq tolstolobik – 80,0%. Olardıń sanları eń kóbi bir balıqqa 130 danaǵa deyin jetken.

Dawtkól suw saqlaǵışında diplostomoz benen kesellengen balıqlardı emlew ushın, birinshi aralıq iyesi – Bryuxonogi mollyuskalardı joq qılıw hám aqırǵı iyesi balıq jewshi quslardı úrkitiw, olardıń uyaların buzıw yamasa atıwdı usınamız. Suw saqlaǵışqa taza dárya suwın beriwde, jaqsı nátiyje beredi.

Posthodiplostomum cuticola – bul gelmint biziń jagdayımızda júdáqáwipli parazit bolıp, balıqshılıqtı rawajlandırıwı óziniń keri tásirin tiygizedi. *P.cuticola* óziniń rawajlanıwınıń metacerkariy dáwirlerinde balıqtın sırtqi terisinde, qalashlarında parazitlik jol menen tirishilik etedi. *P.cuticola* balıqlardıń mayda shabaqlarına júdáqáwipli bolǵan *Postodiplostomoz* keselligin payda etedi. Bul

kesellik balıqlardıń ósiwine kesent beredi, ayırım jaǵdaylarda kóplep qırılıp ketiwine alıp keledi, á sirese, mayda shabaqlarına kóbirek keri tá sirin tiygizedi. Á miwdáryanıń quyar jerinde balıqtıń maydasında birinshi ret kórsetken K. Ubaydullaev (1959).

4 – SÚWRET. Diplostomoz parazitlik kóz katarakt keselligi.



Pitkeriw qániygelik jumıs ushın Dawıtkól suw saqlaǵışınan izertlegen aq amur balıǵınıń 12.0% ti usı *P.cuticola* menen kesellengen, onıń intensivnost 5-7 dana boldı. Aq amurdıń denesinde bul parazittiń metacerkariy cista payda etip teriniń astında jatadı. Óziniń aynalasına qara suyıqlıq bólip shıǵaradı. Balıqtıń sırtında qap-qara bolıp turadı. Sol qaranı alıp jarıp qarasań ishinen gelminttiń metacerkariy tabıladı, sonın ushın da bunı «qara siya keselligi» dep ataladı. Balıqtıń sırtında kóp sanda bolsa, balıqtıń shırayın buzadı, satıwǵa bolmaydı, bahasın kemeytedi. Qarsı gúresiw jolları *D. spathaceum* siyaqlı boladı.

Contracaecum microcephalum tárepinen shaqırılǵan aq amurdıń keselligi. Bul nematode aq amurda tek lichinka dáwirinde parazitlik jol menen ómir súredi. Lichinkanıń uzınlıǵı 35-40 mm, eni 1.5-2 mm. ge jetedi. Bul balıqtıń ishki dene quwıslıǵına cista payda etip jaylasadı. Eresek forması balıq jewshi quslardıń ishekliginde parazitlik jol menen jasadı. Aq amurden basqa da kóplegen túrli balıqlarda gezlesedi. Dawıtkól suw saqlaǵışına keńnen taralǵan dóńgelek qurt bolıp esaplanadı. Kontrasaesim balıqtıń esabınan tirishilik etip, aq amurge júdá kóp zıyanın tiygizedi. Ayırım waqıtlarda aq amurdıń dene quwıslıǵında kóp sanda bir neshe júzlegen tabılǵan. Bul nematode ishki organdı tolıq toltırıp barlıq organlarǵa, bawırǵa jabıladı. Onnan basqa da góshke, júrek góshlerine de jabıladı. Zıyanlangan aq amurdıń góshi (muskulaturası) deformiruyutsya, balıq hásizlenedi hám balıq jewshi quslarǵa júdá tez uslanadı. S.O. Osmanovtıń kórsetiwi boyınsha Aqpitkey Arxipelaǵınan Aral tenizindegi 1955-jılı somnıń mayda (jas) shabaǵınan júdá kóp sanda kesellengenligi atap kórsetedi. Sonday-aq, Jamansay kólinen 1952-1953-jılları osmnıń maydalarınıń qırılıp qalǵanlıǵın kórsetedi. O. Yusupov (1980) Sarbas zalivinen okunniń *C.microctphalum* menen 80% niń, onıń intensivnosti hár balıqqa 132 danadan tuwra kelgen.

Dawıtkól suw saqlaǵışında usı pitkeriw qániygelik jumıs ushın izertlengen aq amurden *C. microcephalum* 30.76% kesellengen, intensivnost 1-5 danaǵa jetti.

Dawıtkól suw saqlaǵıshında 11 túr balıqtan tabılǵan, olardıń ishinen júdá kóbirek zárezlengenı: sazan 80.0%, qızılqanat 50.0%, aq shabaq 46.6%, aq tolstolobik hám ılaqa hár qaysısı 40% ke tuwra keledi. Intensivnost eń kóp bolǵanları 2-31 danaǵa tuwra kelgen (Yusupov 1980).

Lernaea elegans. Bul shayan tárizli parazit aq amurdıń terisinde, saǵaq japıraqshalarında parazitlik jol menen jasaydı. Eger de bul shayan tárizli balıqqa kóp sanda tabıssa, onda júdá kóp zıyanın tiygizedi. Bul tárizli balıqqa kóp sanda tabıssa, onda juda kóp zıyanın tiygizedi. Bul keselge – lerneoz dep ataladı. Bul keselliktiń *Z. elegans* shaqıradı. Bul parazittiń aldınǵı jaǵında kúshli rawajlanǵan shaq sıyaqlı shanalanǵan qarmaqshalar bolıp, balıqtı jaqsılap uslap turadı. Bir orınnan ekinshi orınǵa awmasqanda úlken jara payda etedi. Sol jerge gripler ornalasıp, infekciya payda etedi, teriniń funkciyasın buzadı.

Pitkeriw qániygelik jumıs ushın Dawıtkól suw saqlaǵıshınan izertlengen aq amurden 16.0% *Z. udupftı* tabıldı, onın intensivnost 1 den 3 dana boldı.

Bul parazitke qarsı ilajlar ilimpazlar tarepinen ele islenbegen. G.E. Suxenko (1964) kórsetiwi boyınsha bul parazittiń kopepoditleri (licninkası) xlorofogtıń 100 mg/l suyuqlıǵında bos kesel balıqtı shomıldırǵanda bir saattan keyin qırılıp ketkenin kórsetedi. Biz usınıs etemiz, eger de kóp balıq usı parazit penen kesellense, onda kesel balıqtı tez awlap alıw kerek, solay etip, olardı unga aylandırıp, mallarǵa jemge beriwge boladı.

JUWMAQLAW

1. Ilimiy sapar dawamında Dawıtkól suw saqlaǵışındaǵı ushırasatuǵın balıqlardıń ishinen pitkeriw qániygelik jumısıımız ushın 25 dana aq amur balıǵın, ixtioparazitologiyalıq metodikaǵa (Dogel 1933, Bıxovskaya-Pavlovskaya 1987) súylene otırıp, tolıq parazitologiyalıq usılda izertlep shıqtım.

2. Pitkeriw qániygelik jumısıında Dawıtkól suw saqlaǵışındaǵı aq amur balıǵınan izertlew nátiyjesinde tabılǵan, parazitlerdiń túrleri (vidovoy sostav) berildi. Aq amur balıǵınan 9 túr parazit tabıldı. Aq amur balıǵınan tabılǵan 9 túr parazit, belgili bir sistemaǵa salıp úyreniwde tek ózimniń jıynaǵan maǵlıwmatlarım tiykarında jazıldı. Ádebiyattaǵı parazitologiyalıq materiallardan salıstırıw ushın paydalandım. Aq amur balıǵınıń óziniń biologiyası, házirgi ekologiyalıq ózgerislerdi esapqa alǵan halda salıstırıp, taza materiallar tiykarında jazdım.

3. Dawıtkól suw saqlaǵışındaǵı aq amur balıǵınıń ulıwma parazitler menen zárerleniwi (zarajenie) 100.0% boldı. Solardıń ishinen joqarı dárejede zárerlengen monogeney klassı menen (80%), trematode (72.0%), cestod penen (44.0%), nematode (20.0%). Tómen dárejede (rakoobraznyy) shayan tárizliler menen 16.0% ke tuwra keledi.

4. Aq amur balıǵınan Dawıtkól suw saqlaǵışınan pitkeriw qániygelik jumısıımız ushın izertlew natıyjesinde jıynaǵan 9 túr parazittiń: ápiwayılılarǵa (3 túr), monogeneyǵa (1 túr), cestodqa (1 túr), trematodqa (2 túr) hám nematodqa (1 túr), shayan tárizlilerge (1 túr) kiredi. Solardıń ishinen 2 (Tripartiellaepizootica hám Contracaecum microcephalum) túri aq amur balıǵına birinshi ret kórsetildi. Bul menen aq amur balıǵınıń paraziti sanı taǵı eki túrge kóbeydi, bul meniń ilimge qosqan jańalıǵım boladı.

5. Dawıtkól suw saqlaǵışındaǵı aq amur balıǵınan tabılǵan parazitiniń ishinde kóbirek qáwipli túrlerine pitkeriw qániygelik jumısıımızda toqtap, olardıń

kesellik shaqırıwshı parazitleri tiykarında aq amur balıǵınıń keselliklerin (trixodinoz, daktilagiroz, botriocefalez, diplostomoz, postodiplozarmoz, nematodoz hám shayan tárizliler) anıqladım hám olardıń aldın alıw jolın usındım.

6. Ekspediciya dawamında Dawıtkól suw saqlaǵışındaǵı aq amur balıǵın pitkeriw qániygelik jumısıımız ushın izertlep qaraǵanıımızda hám burınǵı ilimpazlardıń kórsetken ádebiyatlarındaǵı maǵlıwmatlarǵa salıstırıp qaraǵanda, házirgi waqıtları aq amur balıǵınıń prazitleriniń túrleri 6 esege kemeyip ketkenligin kórsettim. Bunıń sebebi keying jılları ekologıyanın ózgerip ketkenliginen (hawızdın gidrologiyalıq rejimleriniń ózgeriwinen, duzlılıǵının kóbeygenliliginen hám t.b) derek beredi.

7. Dawıtkól suw saqlaǵışındaǵı balıqlardıń, quslardın, balıqlardıń awqatlıq zatı bolǵan suwdaǵı mayda jánlıklardi kóbeytiw ushın, suwdın quramın jaqsılaw ushın hár jılı jeterli muǵdarda taza Ámiwdárya suwı menen suw saqlaǵıştı toltırıp turıw kerek boladı.

ÓMIR QÁWIPSIZLIGI

O`zbekstan Respublikasi Ministrler Ken`esiniń 19.07.2011 j. №208 sanli «Xaliqti jer silkiniwler aqibetinde payda bolatuǵın ayırıqsha jaǵdaylarda (tábiiy hám texnogen túrdegi) háreket etiwge tayarlaw kompleks dástúrin tástıqlaw hakkında»ǵı qarari, Joqari hám orta arnawli bilimlendiriw ministrliginiń 22.07.2011 j. №310 sanli buyrıǵın basshiliqqa alinip hám orinlaw maqsteinde A`jiniyaz atındaǵı Nókis Mámleketlik pedagogika instituti rektorati buyrıǵı (25.12.2012 j. №601 D/1) tiykarında «O`mir qáwipsizligi» páni barlıq tálim baǵdarlari boyınsha talabalarǵa oqıw protsessinde úyretiw ushin, magistrlik dissertatsiya jumisi hám bakalavr qánigelik pitkeriw jumislarin orinlawda pánniń huqıqiy tiykarlari kirgizildi.

“Jámiyette puxaralardıń huqıqlari hám erkinliklerin qorǵaw támiyinlengende ol haqıqiy, huqıqiy puxaralıq jámiyet boladi. Hár bir adam óz huqıqlarin aniq biliwi olardan paydalana aliwi, óz huqıqi hám erkinliklerin qorǵay aliwi lazim. Buniń ushin dáslep mámleketimiz xalqınıń huqıqiy mádeniyatin asiriw zárúr” (I. Karimov. O`zbekstan XXI ásirge umtilmaqta, 31 – bet).

XX ásirde 60 – jıllarınan baslap is júrgizip kelgen puxaralıq qorǵanıw sistemasiniń tiykarǵı waziypasi tinishliq dáwirinde hám uris jaǵdayında mámleket xalqın jalpi qırǵın qurallari hám basqa xújim qurallarınan qorǵaw, uris jaǵdayında xalıq xojalıǵı obektleriniń turaqlı islewin támiyinlew hámde apatshiliq oshaqlarında qutqariw hám tiklew jumislarin óz waqtında nátiyjeli ámelge asiriwdan ibarat edi.

Biraq xalıq ómirine tek jalpi qırǵın qurallari emes, bálkim basqa qáwip – qáterlerde qáwip salmaqta, olardı názerden shette qaldiriw hasla múmkin emes. Bular tábiyiy, texnogen hám ekologiyalıq qásiyetli ayırıqsha jaǵdaylar bolip tabiladi.

1990–jıllarǵa kelip yadro urisi qáwipi kemeyip, biologiyalıq qurallardan paydalaniw sheklep qoyildi, jan`a – zamanagóy qural túrleri oylap tabildi, olar

adamlar ushin qáwipli bolmay, bálki ekonomikalıq obektlerdi isten shıǵarıwǵa qaratılǵan edi. Bulardıńbarlıǵı puqaralıq qorǵanıw sisteması ornında jan`a bir sistema dúziliw kerekligin dálillep berdi.

Puqaralıq qorǵanıw ornın iyelewi múmkin bolǵan iri kólemdegi ayırıqsha jaǵdaylarǵa áwelden tayarlıqtı támiyinlewshi jan`a arnawlı mámleket sisteması iyelewi, ol tinishliq hámde uris dáwirinde xalıqtı hám aymaqlardı ayırıqsha jaǵdaylardan qorǵawı lazım edi. Bul sistema xalıqtı ayırıqsha jaǵdaylardan qorǵaw hám qutqarıw jumislarin ótkerip qoymay, basqa áhmiyetli ilajlardı: tábiyiy apatlardan qáwipli aymaqlar kartaların dúziw, seysmikalıq bekkem bina hám imaratlardı quriw, qisqa, orta hám uzaq múddetli boljaw jumislarin shólkemlestiriwi hám xalıq tayarlıǵın ámelge asiriwi lazım edi.

Usı orında jáne bir máseleni aydinlastirip aliwǵa tuwra keledi. Ayırıqsha jaǵday degen ne, onnan xalıqtı hám aymaqlardı qorǵaw degende neni názerde tutiwimiz kerek?

Ayırıqsha jaǵday – adamlar qurban boliwi, olardıńden sawlıǵı yaqı qorshaǵan ortalıqqa ziyan tiyiwi, materiallıq shıǵınlar keltirip shıǵiliwi hámde adamlardıńturmis sharayatınıńızden shıǵıwına alıp keliwi múmkin bolǵan yaqı alıp kelgen avariya, apatshiliq, qáwipli tábiyǵiy hádiyse yaqı basqa tábiyiy apatshiliq nátiyjesinde belgili bir aymaqta júzege kelgen jaǵday.

Xalıqtı hám aymaqlardı ayırıqsha jaǵdaylardan qorǵaw – ayırıqsha jaǵdaylardıńaldin aliw hám olardı saplastiriw ilajları, usılları, qurallar sisteması, háreketler birlesigi.

Ayırıqsha jaǵdaylardıńaldin aliw – aldın ala ótkerilip, ayırıqsha jaǵdaylar júz beriwi qáwipin múmkinshiligi bolǵansha kemeytiwge, bunday jaǵdaylar júz bergen táǵdirde bolsa adamlar den sawlıǵın saqlaw, qorshaǵan tábiyiy ortalıqqa tiyetuǵın ziyan hám materiallıq shıǵınlar muǵdarın kemeytiwge qaratılǵan ilajlar kompleksi.

Ayriqsha jaǵdaylardi saplastiriw – ayriqsha jaǵdaylar júz bergende ótkerilip, adamlar ómiri hám den sawlıǵın saqlaw, qorshaǵan tábiyiy ortalıqqa tiyetuǵın ziyan hám materiallıq shıǵınlar muǵdarın kemeytiwge, sonday – aq ayriqsha jaǵdaylar júz bergen zonalardi shen`berge alıp, qáwipli faktorlar tásirín toqtatiwǵa qaratılǵan avariya – qutqariw jumislari hám basqa keshiktirip bolmaytuǵın basqa jumislar kompleksi.

Xalıqtı hám aymaqlardi ayriqsha jaǵdaylardan qorǵaw tarawında qoyılǵan eńtiykarǵı jumislardıńbiri–dáslep Qorǵaniw ministrligi qasında puqaralıq qorǵaniw hám ayriqsha jaǵdaylar basqarmasınin`, sońusi basqarma tiykarında O`zbekstan Respublikasi Prezidentiniń1996 jıl 4 marttaǵı PF–1378 Buyrıǵı menen Ayriqsha jaǵdaylar ministrliginińdúziliwi boldı.

Ministrlik is júrgize baslaǵannan sońxalıqtı hám aymaqlardi ayriqsha jaǵdaylardan qorǵaw tarawınıńhuqıy tiykarin dúziwshi bir qatar nizam hám qararlar qabil etildi.

O`zbekstan Respublikasi nizamlari:

Xalıqtı hám aymaqlardi tábiyiy hám texnogen qásiyetli ayriqsha jaǵdaylardan qorǵaw haqqında (1999 jıl 20 avgust) – 5 bólim hám 27 stat`yadan ibarat. Nizam xalıqtı hám aymaqlardi tábiyiy hám texnogen qásiyetli ayriqsha jaǵdaylardan qorǵaw tarawındaǵı sotsial múnásibetlerdi tártipke saladı hám ayriqsha jaǵdaylar júz beriwı hám rawajlanıwınıńaldin aliw, ayriqsha jaǵdaylar keltiretuǵın shıǵınlardi azaytiw hám ayriqsha jaǵdaylardi saplastiriwdi maqset etip qoyadı.

Puxaralıq qorǵaniw haqqında (2000 jıl 26 may) – 4 bólim hám 23 stat`yadan ibarat. Usı nizam puxaralıq qorǵaniw tarawındaǵı tiykarǵı waziypalardi, olardi ámelge asiriwdıńhuqıy tiykarların, mámleket organlarinın`, birlespe hám shólkemlerdińwákilliklerin, O`zbekstan Respublikasi puxaralarinińhuqıqlari hám

májbúriyatlarin, sonday – aq puxaraliq qorganiw kúshleri hám quralların belgileydi.

Adamnıńimmunitet jetispewshiligi virusi menen keselleniwinińaldin aliw haqqında (1999 jıl 19 avgust) – 13 stat`ya. Nizamda AIJS keselliginińaldin aliw tarawındaǵı mámleketlik támiyinlew, keselliktińaldin aliw boyınsha jumislardi qarji menen támiyinlew, puxaralardıńhám májbúriyatlarına tiyisli máseleler kórsetilgen.

Gidrotexnika inshaatlarinińqáwipsizligi haqqında (1999 jıl 20 avgust) – 15 stat`ya. Usi nazimnińmaqseti gidrotexnika inshaatların joybarlastiriw, quriw, paydalaniwǵa tapsiriw, olardan paydalaniw, olardi rekonstruksiya qiliw, tiklew, konservatsiyalaw hám tamamlawda qáwipsizlikti támiyinlew boyınsha iskerligin ámelge asiriwda júzege keletuǵın minásibetlerdi tártipke saliw bolip tabiladi.

Awıl xojalıq ósimliklerin ziyankesler, kesellikler hám jabayi ot - shóplerden qorgaw haqqında (2000 jıl 31 avgust) – 28 stat`ya. Usi nazimnińmaqseti awıl xojalıq ósimliklerin ziyankesler, kesellikler hám jabayi ot - shóplerden qorgawdi támiyinlew, ósimliklerdi qorgaw qurallarinińadam den sawlıǵına, qorshaǵan tábiyiy ortalıqqa zıyanlı tásirinińaldin aliw menen baylanisli qatnaslardi tártipke saliwdan ibarat.

Radiatsiyalıq qáwipsizlik haqqında (2000 jıl 31 avgust) – 5 bólim hám 28 stat`yadan ibarat. Nizamnińmaqseti radiatsiyalıq qáwipsizlikti, puxaralar ómiri, den sawlıǵı hám mal – múlki, sonday – aq, qorshaǵan ortalıqtı ionlastiriwshi nurlaniwdińziyanlı tásirinen qorgawdi támiyinlew menen baylanisli qatnaslardi tártipke saliwdan ibarat.

Terrorizmge qarsi gúres haqqında (2000 jıl 15 dekabr) – 6 bólim hám 31 statyadan ibarat. Usi nizamnińmaqseti terrorizmge qarsi gúres tarawındaǵı qatnaslardi tártipke saliwdan ibarat. Nizamnińtiykarǵı waziypalari shaxs, jámiyet hám mámlekettińsuverenitetin hám aymaqlıq pútinligin qorgaw puxaralar tinishlıǵı hám milliy tatiwliqtı saqlawdan ibarat.

Qáwipli islep shigariw obektleriniń sanaat qáwipsizligi haqqında (2006 jil 28 sentyabr`) – 23 stat`ya. Nizamnińmaqseti qáwipli islep shigariw obektlerinińsanaat qáwipsizligi tarawındaǵı qátnaslardı tártipke saliwdan ibarat.

O`zbekstan Respublikasi MK (1997 jil 27 dekabr`) №558-sanli qarari «O`zbekstan Respublikasında ayırıqsha jaǵdaylardıńaldin aliw hám olarda háreket etiwde mámleketlik dizimi haqqında»ǵı qarari menen biykar etilip bul qarar qaytadan 2011 jil 24 avgustta O`zbekstan Respublikasi MK №242-sanli «O`zbekstan Respublikasında ayırıqsha jaǵdaylardıńaldin aliw hám olarda háreket etiwdińmámleketlik dizimi jumislarin bunnan bilay jetilistiriw» haqqında qarari menen toliqtirilip qayta shiqti.

O`zbekstan Respublikasi (2011 jil 19 iyul`) №208-sanli qarari «Xaliqti jer silkiniwler nátiyjesinde payda bolıw múmkin bolǵan ayırıqsha jaǵdaylarda (tábiiy hám texnogen) háreket etiwge úyretiwdińkompleks dástúrin tastiyoqlaw» haqqında qarari tiykarında barlıq orinlarda ayırıqsha jaǵdaylarda háreket etiyadińkompleks dásturleri islenip shigilip, oqiw mashqulatlari alip barılmaqta.

O`zbekstan Respublikasi Prezidentinińqarari:

Tasqinlar, sel aǵımlari, qar kóshiw hám jer kóshkisi hádiyseleri menen baylanisli ayırıqsha jaǵdaylardıńaldin aliw hám olardıńaqibetlerin toqtatiw barisındaǵı – ilajlar haqqında (2007 jil 19 fevral, PQ – 585 – sanli). Tasqinlar, sel aǵımlari, qar kóshiw hám jer kóshki hádiyseleri menen baylanisli jumislardi óz waqtında hám nátiyjeli shólkemlestiriw, sonday – aq olardıńaqibetlerin tezlik penen toqtatiw maqsetinde qabil etilgen.

O`zbekstan Respublikasi Ministrler Kabinetinińqararlari:

O`zbekstan Respublikasi Ayırıqsha jaǵdaylar ministrliginińjumisin shólkemlestiriw máseleleri haqqında (1996 jil 11 aprel, 143 – sanli). Qararǵa «O`zbekstan Respublikasi Ayırıqsha jaǵdaylar haqqında»ǵı Nizam qosimsha

etilgen. Ayriqsha jaǵdaylar ministrliginińtiykargı waziypalari, huqıqlari keltirilgen.

O`zbekstan Respublikasi Ayriqsha jaǵdaylarda olardıńaldin aliw hám hárezket etiw mámleketlik sistemasi haqqında (1997 jil 23 dekabr, 558 - sanli). Qarar menen O`zbekstan Respublikasi Ayriqsha jaǵdaylarda olardıńaldin aliw hám hárezket etiw mámleketlik sistemasi (AJMS) haqqındaǵı Nizam hám onińdúzilisi tastiyıqlanǵan, ministrlik hám idaralardıńxalıq hám aymaqlardi ayriqsha jaǵdaylardan qorǵaw boyınsha funktsiyalari keltirilgen.

O`zbekstan Respublikasi xalqın ayriqsha jaǵdaylardan qorǵawǵa tayarlaw tártibi haqqında (1998 jil 7 oktyabr 427 – sanli). Qarar mámleket xalqın hám aymaqlarin tábiyiy hám texnogen qásiyetli ayriqsha jaǵdaylardan qorǵaw sistemasin rawajlandiriw maqsetinde qabil etilgen. Qararǵa qosımsha keltirilgen «Xalıqtı ayriqsha jaǵdaylardan qorǵaw tarawında tayarlaw tártibi haqqında»ǵı Nizam O`zbekstan Respublikasi xalqın ayriqsha jaǵdaylardan qorǵaw tarawında, sonday – aq ayriqsha jaǵdaylarda hárezket etiwge tayarlıqtan ótip atırǵan xalıq toparlarin tayarlawdıńtiykargı waziypalarin, túrleri hám usıllarin belgileydi.

Tábiyiy, texnogen hám ekologiyalıq qásiyetli ayriqsha jaǵdaylardıńsıpatlamasi haqqında (1998 jil 27 oktyabr, 455 – sanli). Qarar menen tastiyıqlanǵan sıpatlamaǵa muwapiq ayriqsha jaǵdaylar júzege keliw sebeplerine kóre texnogen, tábiyiy hám ekologiyalıq qásiyetli, usı jaǵdaylarda ziyan kergen adamlar sanına, materiallıq ziyanlar muǵdarına hám kólemlerine qarap lokal, jergilikli, respublika hám transsšhegarali túrlerge bólinedi.

O`zbekstan Respublikasında adamlar hám haywanlardıńqutiriw keselligine qarsi gúresti kúsheytiw ilajlari haqqında (1996 jil 18 yanvar, 32 – sanli). Adamlar hám haywanlardıńqutiriw keselligine qarsi gúres ilajlarinińnátıyjeligin asiriw, sonday – aq xalıq jasaw orınlarında iyt, pishiq hám basqa úy haywanlarin tártipke saliw maqsetinde qabil etilgen.

G`alaba xaliqliq ilajlardi ótkeriw qagíydalarin tastiylaw haqqinda (2003 jil 13 yanvar, 15 – sanli). O`zbekstan Respublikasi aymagında galaba xaliqliq ilajlar ótkeriliwi waqtinda jamáát qawipsizligin támiyinlew hám tártibin qorgaw maqsetinde qabil etilgen.

Ayriqsha jagdaylardi boljaw hám aldin aliw Mámleket dástúrin tastiylaw haqqinda (2007 jil 3 aprel, 71 – sanli). Ayriqsha jagdaylardinaldin aliw hám aqibetlerin saplastiriw tarawinda alip barilip atirgan jumislar onimliligin asiriw maqsetinde qabil etilgen.

Joqarida kórsetilgen huqiqiy hújjetler tiykarinda oqiw protsessinde talabalarğa “O`mir qawipsizligi” páninińbarliq bagdarlari boyinsha keńmániste túsinikler berildi.

PAYDALANĖAN ÁDEBIYATLAR:

1. Karimov I.A. “Jahon moliyaviy inqirozi Ózbekiston sharoitida uni bartomon echishning yullari va choralari”. Toshkent «Ózbekiston», 2009
2. Karimov I.A. 2010-jilda elimizdi socialliq-ekonomikalıq rawajlandırıwdıń juwmaqları hám 2011-jilda ekonomikalıq reformalardı tereńlestiriwdıń eń áhmiyetli baĖdarları, Ministrler kabinetinde 2011-jıl 21-fevralda jasaĖan bayanatı.
3. Mirziyoev SH.M. “Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz” Toshkent, «Ózbekiston», 2017 y.
4. Агапова А.И. 1 “Паразиты рыб водоемов Казакстана. Алма-Ата” изд-во «Наука» 1966
5. Айназаров С. “К изучению зоопланктона озер низовев Амударии” (по материалам оз. Дауткул). Тез. Докл. Конф. «Биол. Основы рыбн. Хоз-ва Республики Ср. Азии Ы Казакстана». Ташкент-Фергана. 1972
6. Алламуратов Б. “Паразиты и болезни рыб бассейна реки Сурхандари”, Ташкент изд-во «Фан» 1974
7. Mavlyanov.O, Xurramov.Sh., Eshova.X., “Umurtqasizlar zoologiyasi”. Toshkent.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” 2006 y.
8. Быховская-Павловская Ы.Е. “Паразиты рыб руководство по изучению изд-во” «Наука» Л. 1985
9. Бабаев Б. Шербакова А.Ы. “Ыз опыта борьбы с ботриосалезом белого амуре” 1963
10. Mavlyanov.O., Xurramov.Sh., Norboev.Z., “Umurtqasizlar zoologiyasi”. Т. “O‘zbekiston” 2002 y
- 11.Догел В.А “Проблем исследования паразитофауны рыб”. Ленинград. 1963
12. Догел В. А. “Влияние акклиматизации рыб на распространение рыбных эпизоотий” 1939
13. Догел В.А., Быховский Б.Е. “Фауна паразитов рыб Аралского морай” 1934

14. Ембергенов С., Хусайнова Х. З. “Макрозообентос плеса Коксу Даўыткулского водохранилища” 1971
15. Ешимбаев Д. “Гидрохимическое состояние водоемов Каракалпакии в условиях водохозяйственных мероприятий в бассейне Амударии”. Ташкент. 1975
16. Маркевич А.П. “Паразитофауна пресноводных рыб Украинской ССР 1951
17. Мусселиус Б.А. “Паразиты и болезни растительноядных рыб и меры борьбы с ними” 1967
18. Османов С.О. “Паразиты рыб Ўзбекистана”. Ташкент 1971
19. Османов С.О., Уразбаев А. Н., Юсупов О. “Паразитарное состояние карпа и растительноядных рыб в прудах рисоводческих хозяйств Каракалпакии”. 1966
20. Османов С. О., Юсупов О. Паразитарное состояние белого амура у толстолобиков в низовьях Амударии. В сб. «Биол. Основы рыбн. Хоз-ва республик Средней Азии Ы Казакстана». 1967
21. Османов С.О., Арыстанов Е., Убайдуллаев К., Юсупов О. “Вопросы паразитологии Аралского моря” Ташкент 1976
22. Османов С.О, Юсупов О. “Влияние осоломения Аралского моря на паразитофауну рыб. Паразитологический сборник том 33. «Наука» Л. 1985
23. Определитель паразитов пресноводных рыб., Ызд-во «Наука» Л., 1984, 1985, 1987, Том 1-3.
24. Скрыбин К.Ы. “Две нематоды подотряда паразитирующие у рыб” 1946
25. Судариков В.Е., Шигин А.А., “К методике работы с метасеркариями трематоды отряда Стриоеидида” 1963
26. Ростовшиков С.А. “О фауне слизистых споровиков рыб в дельте Амударии” 1952

27. Тлеёв Р.Т., Тлеёбергенов Ш.Т., 1974, Рыбы Каракалпакии, Нукус
Тлеёв Р.Т., “Новый режим Арала и его влияние на ихтиофауну” Ташкент,
1982
28. Туремуратов А. “Кпознанию гелминтофауны сапел и чаек делты
Амударии” 1962
29. Уразбаев А. “Паразиты рыб в прудах Каракалпакии”. Автореф.
Канд. Дисс. Ташкент. 1970
30. Шапошников Г.Х. “Рыбы Амударии” 1950
31. Шигин А.А. “Морфология, биология Ы таксомания трематодe рода
от чайковых птис-сестоды и трематодe” 1975
32. Юсупов О. Паразиты рыб озера-водохранилища Даўыткол. В сб.
Паразиты рыб и водных беспозвоночных низовев амударии. Ташкент. 1980
33. Юсупов О. паразиты рыб промысловых водоемов Каракалпакии.
Автореф. Канд. Дисс. Ташкент. 1995
34. Юсупов О. “Ызученийе влияния изменения гидрорежима на
состояние у паразитов промысловых рыб Ходжакулско-Караджарской
системы озер” 1966.
35. Юсупов О., Уразбаев А., “Паразитические инфузории (Перитича
Урсеоларииде) рыб Аралского моря” Паразитология XIX, Ленинград. 1980.
36. Юсупов О., Уразбаев., Курбанова А., Паразитарное состояние рыб
озерной системы Тогызторе и коллекторной сети №3. 1995.
37. Dadaev S.,Saparov Q. “Zoologiya”. T.:“Cho‘lpon nashriyoti”. 2011 y.
38. Dadayev S., Mavlonov O. “Zoologiya”. T.:“IQTISOD-MOLIYA”
2008 y.
39. Laxanov J.L. “Umurtqalilar zoologiyasi”. T.: «O’AJBNT» markaziy
2005y.
40. Dadaev S., To‘ychiev S., Haydarova P. “Umurtqalilar zoologiyasidan
laboratoriya mashg‘ulotlari”. O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti
2006 y.

41. Digital Zoology version 1.0 CD-ROM and Student workbook Jon Housemen

42. S. Helfman, B. Collette, E. Facey, W. Bowen. – The Diversity of Fishes. Hong Kong Printed in Malaysia, 2009y.

INTERNET SAYTLARI

1. <http://www.amurrivermap.ru>
2. <http://www.hipermir.ru>
3. <http://www.dreamfisher.ru>
4. <http://www.fishstocking.ru>
5. <http://www.aralseapictures.uz>
6. <http://www.encyclopedia.uz>