

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI
SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI**

TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI

FARMAKOGNOZIYA KAFEDRASI

**“BOTANIKA” FANIDAN O‘QUV-USLUBIY
MAJMUA**

Toshkent -2016

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI
SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI**

TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI

FARMAKOGNOZIYA KAFEDRASI

**“BOTANIKA” FANIDAN O‘QUV-USLUBIY
MAJMUA**

Toshkent -2016

Mazkur o‘quv – uslubiy majmua Oliy va O‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2016 yil 6 apreldagi 137 – sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan o‘quv reja va dastur asosida tayyorlandi

Tuzuvchilar:

Yulchieva M.T. – Farmakognoziya kafedrasida dotsenti, b.f.n.

Atamuratova N.T – Farmakognoziya kafedrasida assistenti

Taqrizchilar:

Raximova T.T. - O‘z.RFA O‘simlik va hayvonot olami genofondi instituti,

geobotanika va o‘simliklar ekologiyasi laboratoriyasining etakchi ilmiy
hodimi professor, b.f.d.

Abzalov A.A.– ToshFarmi Ekologiya va mikrobiologiya kafedrasida dotsenti, b.f.n.

O‘quv uslubiy majmua Toshkent farmasevtika institutining soha uslubiy kengashining 2016 yil 15 iyundagi 15 – sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilingan.

Soha uslubiy kengash raisi: _____Tojiev M.A.

O‘quv uslubiy majmua MUK da ko‘rib chiqildi va tasdiqlandi. “28” iyun. 2016 yil

11 - sonli bayonnomasi

Kelishildi: Markaziy uslubiy kengash raisi: _____ S.U.Aliev

MUNDARIJA

I.	Ishchi dasturlar.....	5
II.	Botanika fanining sillabusi.....	34
III.	Modulni o‘qitishda foydalaniladigan interfaol ta’lim metodlari.....	39
IV.	Nazariy materiallar.....	44
V.	Laboratoriya mashg‘uloti materiallari	213
VI.	Keyslar banki.....	309
VII.	Mustaqil ta’lim mavzulari.....	311
VIII.	Glossariy.....	313
IX.	Adabiyotlar ro‘yxati.....	327

Farmatsiya va kasb ta'limi yo'nalishlari uchun

Kirish

Mamlakatimizda ta'lim tizimiga e'tiborning tobora yuqoriligi sababli, o'quv darsliklarni yangilash va xorijiy o'quv adabiyotlaridan yanada ko'prok foydalanishni taqozo etmoqda. Mazkur ishchi dasturni tuzishda xorijiy adabiyot ma'lumotlari ham kiritildi. Bu talabalarning botanika fani bo'yicha olgan bilimlarni yanada mustaxkamlaydi.

Farmatsevtika institutida botanika fanini o'qitilishining asosiy maqsadi malakali mutaxassislar tayyorlash, tabiatga, o'simliklar dunyosiga, ayniqsa dorivor o'simliklarga nisbatan mehr - muhabbat uyg'otish, tabiiy boyligimizdan to'g'ri va oqilona foydalanish yo'llarini o'rgatadi. Maqsadga erishish uchun botanika fanidan mashg'ulotlar o'ziga xos uslub bilan o'tkaziladi. Chunki farmatsevtlar, dorivor moddalarning ko'pchiligi o'simliklar maxsuli ekanligini hisobga olib, ularni makro va mikroskopik tuzilishini tekshirib aniqlaydi. Natijada anatomiya, morfologiya, sistematikadan bilimga ega bo'lib qolmay, amalda ish bajara olishi zarur. Bu amaliy tajriba turli o'simliklarni qismlari to'g'risida aniq tasavvur hosil qilishga, makroskopik va mikroskopik tomondan aniqlashda farmakognoziya faniga asos bo'ladi. Laboratoriya mashg'ulotining «Anatomiya» bo'limida tayyor kesiklardan foydalanish bilan birga, vaqtincha kesiklar tayyorlash ko'zda tutilgan.

Malakali mutaxassis bo'lish uchun talabalar o'simliklar morfologiyasini, anatomiyasini yaxshi o'zlashtirishi lozim. Sistematikani o'rganilayotganda har bir talaba gerbariy bilan ta'minlandi.

Botanika fanini o'qitishda Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. va V. Ch. Evans Pharmacognosy adabiyotlaridan foydalanib, yangi ma'lumotlar bilan boyitildi.

Fanning maqsad va vazifalari

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2015 yil 19 yanvar yig'lishining "O'rmon xo'jaliklarini rivojlantirish dorivor va oziq-ovqat o'simliklarini etishtirish va qayta ishlashni yanada ko'paytirish to'g'risida" gi 5-sonli bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2015 yil 20 apreldagi yig'ilishining "Maxalliy korxonalarda dorivor o'simliklarni va ular asosida biologik faol qo'shimchalar ishlab chiqishni rivojlantirish to'g'risida"gi 32 - sonli bayonnomasida belgilangan vazifalarni ijrosini ta'minlash borasida Respublikamizda tabiiy sharoitda o'sadigan o'simlik turlari, o'rganish, o'simlik areallarini saqlab qolish, zahirasini boyitish kabi vazifalar tushuntirilib boriladi.

Botanika fani farmatsevtika institutida umumiy teoretik kurs bo'lib, talabalarni ixtisos bo'yicha farmakognoziya, o'simlik fiziologiyasi, bioximiyasi, mikrobiologiyasi, dorivor o'simliklarni o'stirish biologiyasi kabi kurslarni o'tishga tayyorlaydi. Shu bilan birga talabalar botanikaning muhim bo'limlari bilan tanishib, bir vaqtning o'zida o'simliklar dunyosining hayot faoliyatini o'rganadilar, bu esa farmatsevtlar uchun o'ta muhim bo'lgan dorivor o'simliklar va o'simlik homashyolari bilan ishlashga yordam beradi.

Dorivor o'simliklar florasidan foydalanish, tabiatini va o'simliklar dunyosining resurslarini himoya qilgan va uni tushungan holda olib borilishi kerak.

Fanni o'rganishning vazifalari.

Botanika fanini o'qish natijasida talaba quyidagilarni bilishi shart:

- o'simliklar dunyosining biologik qonuniyatlarini;
- o'simlik organlarining morfologik va anatomik strukturalarining xilma-xilligini;
- yuqorida ko'rsatilgan kurslarda o'rganiladigan dori turlarini o'z ichiga olgan o'simlik guruhlarini;
- homashyoni aniqlashdagi o'simliklarni diagnostik ko'rsatkichlarini bilishdan iborat.

Fan bo'yicha talabning malakasiga qo'yiladigan talablar

“Botanika” o'quv fanini o'zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida talaba:

- o'simlik hujayralari;
- o'simlik to'qimalari va qismlari;
- o'simliklarning sistemaeikasi *haqida tasavvurga ega bo'lish*.
- tashqi morfologik xususiyatlari bo'yicha gerbariy na'munalari asosida o'simliklarni aniqlash;
- o'simliklarni oilasi bo'yicha ajrata bilish;
- o'simliklarni morfologik tuzilishi bo'yicha ajrata bilish;
- o'simlik organlarining mikrostrukturalari va ularning xilma-xil ko'rinishlarini ajratish;
- tuban va yuqori tipdagi o'simliklarning tashqi morfologik tuzilishini tasniflab berish;
- o'simlik to'qima va hujayralarining elementar tuzilishini bilish va mustaqil ravishda hujayra qobig'i, sitoplazma, yadro, vakuola (hujayra shirasi), hujayra xosilasi bo'lgan kraxmal, yog', oqsilga mikroreaksiyalar olib borish, o'simlik xom-ashyosini diagnostik ko'rsatkichlari bo'lgan kristallarning bor yo'qligini aniqlash;
- o'simlik to'qimalarida reaktivlar yordamida tirik va o'lik hujayra elementlarini, hujayraning yog'ochlangan va sellulyozali qobig'ini, probkalanishini, qoplovchi to'qimalarning kutinlashganini, tukchalarning har-xil turlarini va ular tuzilishini xilma-xilligini aniqlashni bilish;
- efir moyi, smola bo'shliqlarning bor yo'qligini va ularning tuzilishini aniqlash;
- hosil qiluvchi, qoplovchi, mexanik, o'tkazuvchi, asosiy va ajratuvchi to'qimalarning tuzilishini bilish;
- talaba o'qish davomida o'simlikni tasniflashi va ularni bir-biridan ajrata bilishi;
- o'simlikning morfologiyasini *bilishi va ulardan foydalana olishi* kerak;
- Talabanning *ko'nikmasiga qo'yiladigan talablar*:
- amaliy mashg'ulotlarda mikropreparatlarni tayyorlash texnikasini o'rganish;
- o'simlik organlarida; ildiz, poya, bargning tuzilishini anatomik ko'rsatkichlaridan foydalangan holda aniqlash;
- o'simliklar dunyosining tasnifi va ularning tipi, sinfi, oilasi, turini bilish;
- o'simliklardan *gerbariy tayyorlash*;
- kattalashtirib ko'rsatadigan asboblardan foydalanish;
- doimiy va vaqtincha kesiklar tayyorlash va ularni bo'yash;
- hujayradagi moddalarni aniqlashdagi kimyoviy reaksiyalarni bajara olish *ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak*;

O'quv rejadagi boshqa fanlar bilan bog'liqligi

Botanika fani 3-4 semestrlarda o'qitiladi. Dasturni amalga oshirish o'quv rejasida rejalashtirilgan anorganik kimyo, fizika, lotin tili fanlaridan yetarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlik talab etiladi, chunki bu fanlarning ayrim bo'limlaridan olingan bilimlar talabani botanika fanini o'zlashtirish vaqtida kerak bo'ladi.

Fanni o'qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar

Botanika fanidan o'quv jarayoni (ma'ruzalar va laboratoriya mashg'ulotlari)da zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalar keng qo'llanishi ko'zda tutilgan. Jumladan, barcha ma'ruzalarda “Blits-so'rov”, munozara, dialog, laboratoriya mashg'ulotlarida esa “Bumerang”, “Vertushka”, “Klaster”, test, “FSMU”, “Keys”- stadi, “VVV” kabi pedagogik texnologiyalar qo'llaniladi.

“Botanika” fanini loyihalashtirishda quydagi asosiy konseptual yondashuvlardan foydalaniladi:

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim. Bu ta'lim o'z mohiyatiga ko'ra ta'lim jarayoning barcha ishtirokchilarini to'laqonli rivojlantirishni ko'zda tutadi. Bu esa ta'limni loyihalashtirilayotganda, albatta ma'lum bir ta'lim oluvchining shaxsini emas, avvalo, kelgusidagi mutahassislik faoliyati bilan bog'liq o'qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondoshilishni nazarda tutadi.

Tizimli yondashuv . ta`lim texnologiyasi tizimning barcha belgilarini o`zida mujassam etmog`I lozim: jarayonning mantiqiyilgini, uning barcha bo`g`inlarini uzaro bog`langanligi yahlitligi.

Faoliyatga yunaltirilgan yondashuv. Shaxsning jarayonli sifatlarini shakllantirishga ta`lim oluvchning faoliyatini aktivlashtirish va intinsevashtirish, o`quv jarayonida uning barcha qobiliyatlari va imkoniyatlari, tashabbuskorligini ochishga yunaltirilgan ta`limni ifodalaydi.

Dialogik yondashuv . Bu yondashuv o`quv munosabatlarini yaratish zaruriyatini bildiradi. Uning natijasida shaxsning o`z – o`zini faollashtirishi va o`z- o`zini ko`rsata olish kabi ijodiy faoliyati kuchayadi.

Hamkorlikdagi ta`limni tashkil etish. Demokratik tenglik, ta`lim beruvchi va ta`lim oluvchi faoliyat mazmunini shakllantirishda va erishilgan natijalarni baholashda birgalikda ishlashni joriy etishga e`tiborni qaratish zarurligini bildiradi.

Muammoli ta`lim. Ta`lim mazmunini muammoli tarzda taqdim qilish orqali ta`lim oluvchi faoliyatini aktivlashtirish usullaridan biri. Bunda ilmiy bilimni obektiv qarama – qarshiligi va uni hal etish usullarini , dialiktik mushohadani shakllantirish va rivojlantirishni, amaliy faoliyatga ularni ijodiy tarzda qo`llashni mustaqil ijodiy faoliyati ta`minlanadi.

Axborotni taqdim qilishni zamonaviy vositalari va usullarini qo`llash- yangi kompyuter va ahborot texnologiyalarni o`quv jarayoniga qo`llash.

O`qitishning usullari va texnikasi . Ma`ruza (kirish,mavzuga oid,vizuallash), muammoli ta`lim, keys-stadi, pinbort, paradoks va loyihalash usullari , amaliy ishlar.

O`qitishni tashkil etish shakllari: Diologik, polilok, muloqot hamkorlik va o`zaro hamkorlikka asoslangan frontal, kollektiv va guruh.

O`qitish vositalari: O`qitishning ananaviy shakllari (darslik, ma`ruza mantni) bilan bir qatorda- kompyuter va ahborot texnologiyalari.

Kommunikatsiya usullari: tinglovchilar bilan operativ teskari aloqaga asoslangan bevosita o`zaro munosabatlar.

Teskari aloqa usullari va vositalari: kuzatish, blist-surov, oraliq va joriy va yakunlovchi nazorat natijalarini tahlili asosida o`qitish diagnostikasi.

Boshqarish usullari va vositalari: o`quv mashg`uloti bosqichlarini belgilab beruvchi texnologik karta kurinishidagi o`quv mashg`ulotlarini rejalashtirish, quyilgan maqsadga erishishda o`qituvchi va tenglovchining birgalikdagi harakati, nafaqat auditoriya mashg`ulotlari- balki auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarning nazoratlari.

Monitoring va baholash: o`quv mashg`ulotida ham butun kurs davomida xam o`qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib boorish. Kurs oxirida test topshiriqlari yoki yozma ish variantlari yordamida tinglovchilarning bilimlari baholanadi .

“Botanika” fanini o`qitish jarayonida kompyuter texnologiyasidan, “Stat” statistic dasturlar foydalaniladi. Ayrim mavzular bo`yicha talabalar bilimni baholash test asosida va kompyuter yordamida bajariladi. “Internet” tarmog`idagi ma`lumotlardan foydalaniladi, tarqatma materiallar tayyorlanadi, test tizimi hamda tayanch so`z va iboralar asosida oraliq va yakuniy nazoratlar o`tkaziladi

Botanika fanidan mashg`ulotlarning mavzular va soatlar bo`yicha taqsimlanishi

t/r	Mavzular nomi	Jami soat		Ma`ruza		Laboratoriya mashg`u-lotlari		Mustaqil ta`lim	
		F, k/t		F, k/t		F, k/t		F, k/t	
1	Botanika fani bo`limlari va uni farmatsiyadagi ahamiyati. Hujayra. O`simlik hujayrasi. Osmotik bosim. Sitoplazma.	10	10	2	2	3	3	5	5

	Plastidlar.								
2	Hujayradagi oziqli moddalar, kristallar. O'simlik to'qimalari. Hosil qiluvchi va qoplovchi to'qimalar.	10	10	2	2	3	3	5	5
3	Mexanik, o'tkazuvchi, ajratuvchi va asosiy to'qimalar.	10	10	2	2	3	3	5	5
4	Ildiz morfologiyasi va anatomik tuzilishi.	10	10	2	2	3	3	5	5
5	Poya morfologiyasi. Kurtak tuzilishi. O't o'simliklar poyasining anatomik tuzilishi. Daraxtsimon o'simliklar poyasining anatomik tuzilishi.	10	9	2	2	3	3	5	4
6	Barg morfologiyasi. Bargning anatomik tuzilishi.	10	9	2	2	3	3	5	4
7	Bargdagi fiziologik protsesslar. O'simliklarning ko'payishi, o'sishi va rivojlanishi.	10	9	2	2	3	3	5	4
8	O'simliklar sistematikasi. Tuban o'simliklarga xarakteristika. Bakteriyalarning tuzilishi va ko'payishi.	12	9	2	2	3	3	7	4
9	Suv o'tlari, zamburug'lar va lishayniklar.	12	9	2	2	3	3	7	4
10	Yuksak sporal o'simliklarga tasnif. Moxsimonlar. Qirqquloqsimonlilar.	10	10	2	2	3	3	5	5
11	Qirqquloqsimonlilar. Yuksak o'simliklar evolyutsiyasi. Ochiq urug'lilar.	10	10	2	2	3	3	5	5
12	Yopiq urug'lilar o'simliklar evolyutsiyasida eng yuksak taraqqiy etganidir. Reprodukativ organlarning paydo bo'lishi. Gul va to'pgullar.	10	10	2	2	3	3	5	5
13	Changlanish va otalanish. Meva, to'pmeva va urug' tuzilishi.	10	10	2	2	3	3	5	5
14	Yopiq urug'li o'simliklar tasnifi. Bir va ikki pallali o'simliklar. Magnoliyadoshlar, ayiqtovondoshlar, zirkdoshlar, ko'knordoshlar.	10	10	2	2	3	3	5	5
15	Grechixadoshlar, choydoshlar, dalachoydoshlar, qovoqdoshlar, karamdoshlar, gulhayridoshlar oilalari.	10	9	2	2	3	3	5	4
16	Atirguldoshlar, selderguldoshlar, dukkakdoshlar, ituzumdoshlar, yasnotkaguldoshlar va astraguldoshlar oilalari.	10	9	2	2	3	3	5	4

17	Mirtadoshlar, jo'kadoshlar oilalari. Bir pallalilar sinfi. Liliyagullilar va qo'ng'irboshlilar tartibi.	12	9	2	2	3	3	7	4
18	Ekologiya, fitotsenologiya va o'simliklar geografiyasi.	12	9	2	2	3	3	7	4
	jami	188		36	36	54	54	98	81

Asosiy qism: Fanning uslubiy jihatidan uzviy ketma- ketligi

Asosiy qismda fanni mavzulari mantiqiy ketma-ketlikda keltirilgan. Har bir mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va tazislar orqali ochib beriladi/ talabalar botanika fanini o'zlashtirishlari uchun o'qitishning ilg'or va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi information pedagogic texnologiyalarni tadbiq qilish muhim ahamiyatga egadir. Fanni o'zlashtirishda darslik, o'quv va uslubiy qo'llanmalar, ma'ruza matnlari, tarqatma materiallardan foydalaniladi.

Ma'ruza mashg'ulotlari

Botanika fani bo'limlari va uni farmatsiyadagi ahamiyati. Hujayra. O'simlik hujayrasi. Osmotik bosim. Sitoplazma. Plastidlar. Botanika fani va uni vazifalari. Botanika fanining bo'limlari. Hujayra tuzilishi, o'simlik hujayralarining hayvon hujayralaridan farqi. Plastidlar. Botanika fanining farmatsiyadagi ahamiyati haqida tushuncha beriladi

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; Q2; Q6

Hujayradagi oziqli moddalar, kristallar. O'simlik to'qimalari. Hosil qiluvchi va qoplovchi to'qimalar. Hujayradagi oziqli moddalar. Ularning aniqlash reaksiyalari. Kristallar va ularning ahamiyati. Hujayra qobig'i haqida tushuncha beriladi. O'simlik to'qimalari, ularning klassifikatsiyasi. Hosil qiluvchi va qoplovchi to'qimalar, hamda ularning vazifalari haqida tushuncha berish

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q4

Mexanik, o'tkazuvchi, ajratuvchi va asosiy to'qimalar. Mexanik to'qimalarga tasnif, ularning xillari, vazifasi. O'tkazuvchi to'qimalarga tasnif, ularning vazifalari. O'tkazuvchi to'qimalarning elementlari, ularning bajaradigan ishlari. O'tkazuvchi to'qimalarning poyada joylashishi, bog'lamlari, xillari. Ajratuvchi to'qima xillari, ularning tuzilishi va vazifalari. Asosiy to'qimalar, xillari va vazifalari haqida tushuncha beriladi.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q4;

Ildiz morfologiyasi va anatomik tuzilishi. O'simlik ildizining vazifasi, ularning mexanik va fiziologik xususiyatlari. Ildizlarning kelib chiqishiga ko'ra bo'linishi. Ildiz klassifikatsiyasi. Sochma va o'q ildizlar. Ildiz metamorfasi. Tuganak bakteriyalar. Mikoriza haqida tushuncha berish. Ildiz anatomiyasi – birlamchi va ikkilamchi ildiz tuzilishi haqida ma'lumot

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4;

Poya morfologiyasi. O't o'simliklar poyasining anatomik tuzilishi. Daraxtsimon o'simliklar poyasining anatomik tuzilishi. Poya haqida tushuncha. Poyalarning shakli, yo'nalishi, shoxlanishi, yer ostki va yer ustki turini o'zgartirgan poyalar. Kurtak tuzilishi. Vegetativ va generativ kurtaklar. Tinim davridagi kurtaklar. Poyalarning ichki tuzilishi – o'tli o'simliklar va daraxt o'simliklar poyasining ichki tuzilishiga tasnif va ularning farqlari haqida tushuncha beriladi

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2;A3; A4; Q1; Q2; Q4;

Barg morfologiyasi. Bargning anatomik tuzilishi. Barg vazifasi. Uning qismlari. Bargning poyada joylashishi. Oddiy va murakkab barglar. Qiyofasini o'zgartirgan barglar. Hashorotxo'r o'simliklar. Barglarning ichki tuzilishi (dorzoventral, izolateral va radial barglar) haqida tushuncha beriladi.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2;A3; A4; Q1; Q2; Q4;

Bargdagi fiziologik protsesslar. O'simliklarning ko'payishi, o'sishi va rivojlanishi. Bargdagi assimilyatsiya protsessi, uning ahamiyati. Dissimilyatsiya protsessi, uning ahamiyati. Assimilyatsiya va dissimilyatsiya protsesslarining qarama – qarshiligi va birligi haqida tushuncha berish. Transpiratsiya protsessi ahamiyati. O'simliklarning ko'payishi. Jinssiz ko'payish. Jinli yo'l bilan ko'payish. O'simliklarning rivojlanishi haqida tushuncha.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2;A3; A4; Q1; Q2; Q4;

O'simliklar sistematikasi. Tuban o'simliklarga xarakteristika. Bakteriyalar tuzilishi va ko'payishi. O'simliklar sistematikasi tarixi. K.Linney sistemasi. Ch.Darvin ta'limoti. Engler sistemasi. Tuban o'simliklarga tasnif. Tuban o'simliklar klassifikatsiyasi haqida tushuncha. Bakteriyalarning tuzilishi va ko'payishi haqida ma'lumot beriladi.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7.

Suv o'tlari, zamburug'lar va lishayniklar. Suv o'tlarining tuzilishi, klassifikatsiyasi, ahamiyati. Zamburug'larning tuzilishi, oziqlanishi, klassifikatsiyasi, ko'payishi, zarari va ahamiyati. Lishayniklarning tuzilishi, xillari, ko'payishi haqida tushuncha.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7.

Yuksak sporali o'simliklarga tasnif. Moxsimonlar. Qirqquloqsimonlilar. Yuksak sporali o'simliklarga tasnif, ularning tuban sporali o'simliklardan farqi. Yuksak sporali o'simliklar klassifikatsiyasi. Moxsimonlarga tasnif, klassifikatsiyasi. Jigarsimon, poya va bargli moxlarning tuzilishi, ko'payishi haqida tushuncha. Qirqquloqsimonlarga tasnif, klassifikatsiyasi. Qirqbo'g'implilar. Plaunlarning tuzilishi, ko'payishi, ahamiyati.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7.

Qirqquloqsimonlilar. Yuksak o'simliklar evolyutsiyasi. Ochiq urug'lilar. Qirqquloqlar va suv qirqquloqlari haqida tushuncha. Ochiq urug'lilarga tasnif, klassifikatsiyasi, tuzilishi, ko'payishi haqida tushuncha.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q8.

Yopiq urug'lilar o'simliklar evolyutsiyasida eng yuksak taraqqiy etganidir. Reproaktiv organlarning paydo bo'lishi. Gul va to'pgullar. Yopiq urug'lilar, o'simliklarning kelib chiqishi, xarakterli belgilari. Yopiq urug'lilarni ochiq urug'lilardan farqi. Yopiq urug'lilarni klassifikatsiyasi. Gul tuzilishi. Gulning formulasi va diagrammasi. To'pgullar tuzilishi haqida tushuncha.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q8.

Changlanish va otalanish. Meva, to'pmeva va urug' tuzilishi. Changlanish va otalanish haqida tushuncha. O'z – o'zidan va chetdan changlanish. Otalik changining taraqqiy etishi va rivojlanishi. Onalik embrion xaltachasining rivojlanishi va tuzilishi. Yopiq urug'li o'simliklar urug' kurtagini tuzilishi. Yopiq urug'li o'simliklarning qo'shaloq otalanishi. Mevalar. Pishganda ochilmaydigan quruq mevalar va pishganda ochiladigan quruq mevalar. Ho'l mevalar. Urug' tuzilishi. Urug'ning unib chiqishi va tuzilishi.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q8.

Yopiq urug'li o'simliklar tasnifi. Bir va ikki pallali o'simliklar. Magnoliyadoshlar, ayiqtovondoshlar, zirkdoshlar, ko'knordoshlar. Yopiq urug'lilar – hozir yer yuzidagi barcha o'simliklar orasida ustunlik qilayotgan eng katta bo'limdir. Ular bir qancha aniq belgilari bilan o'simliklar olamining boshqa vakillaridan keskin farq qiladi. Bir va ikki pallali o'simliklarga tasnif va ularning farqlari. Magnoliyadoshlar, ayiqtovonlar, zirkdoshlar, ko'knoriguldoshlar oilalariga tasnif va ularning asosiy vakillari.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q8

Grechixadoshlar, choydoshlar, dalachoydoshlar, qovoqdoshlar, karamdoshlar, gulhayridoshlar oilalari. Grechixadoshlar oilasi tasnifi. Asosiy vakillari, ahamiyati. Choydoshlar oilasiga tasnif. Asosiy vakillari, ahamiyati. Dalachoydoshlar oilasiga tasnif. Dalachoy vakillari, ahamiyati. Qovoqdoshlar oilasi. Qovoq, qovun, bodring, tarvuz avlodlari vakillari. Karamguldoshlar oilasiga tasnif. Ularning xalq ho'jaligidagi va tibbiyotdagi ahamiyati. Gulhayridoshlar oilasi vakillarining sanoatdagi va tibbiyotdagi ahamiyati.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q8

Atirguldoshlar, selderguldoshlar, dukkadoshlar, ituzumdoshlar, yasnotkaguldoshlar va astraguldoshlar oilalari. Atirguldoshlar oilasiga tasnif, klassifikatsiyasi, asosiy vakillari. Selderguldoshlar oilasi, asosiy vakillari, ahamiyati. Dukkadoshlar oilasi klassifikatsiyasi. Asosiy vakillari, ularning ho'jalikdagi va tibbiyotdagi ahamiyati. Ituzumdoshlar, yasnotkaguldoshlar va astraguldoshlar oilalariga tasnif, asosiy vakillari.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

Mirtadoshlar va jo'kadoshlar oilalari. Bir pallalilar sinfi. Liliyagullilar va qo'ng'irboshlilar tartibi. Mirtadoshlar va jo'kadoshlar oilalarining umumiy xarakterli belgilari, o'simliklarning xayotiy shakllari, tarqalishi, vakillari. Tibbiyotda va xo'jalikdagi ahamiyati. Bir pallalilar oilasiga tasnif, klassifikatsiyasi. Liliyaguldoshlar tartibi, oilalari. Loladoshlar oilasi, piyozdoshlar oilasi, vakillari. Qo'ng'irboshlilar tartibi, oilalari. Boshqadoshlar vakillari. Tariqsimonlilar, qo'ng'irboshlilarga tasnif, vakillari.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3; Q5; Q6; Q7; Q8.

Ekologiya, fitotsenologiya va o'simliklar geografiyasi. O'simliklar ekologiyasi. Ekologiya fani, vazifalari, tarixi. O'zbekistonda ekologiya fanining rivojlanishi. Ekologik omillar. O'simliklar olamini muhofaza qilish. O'zbekiston Qizil kitobi. Fitotsenologiya. O'simliklar geografiyasi.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3; Q5; Q6; Q7; Q8.

Botanika fani bo'yicha ma'ruza mashg'otlarning kalendar tematik rejasi

№	Ma'ruza mavzulari (barcha)	Soat
III - semestr		
1.	Kirish. Botanika fani, uning bo'limlari va uni farmatsiyadagi ahamiyati. Hujayra. O'simlik hujayrasi. Osmotik bosim. Sitoplazma. Plastidlar.	2
2.	Hujayradagi oziqli moddalar, kristallar. O'simlik to'qimalari. Hosil qiluvchi va qoplovchi to'qimalar.	2
3.	Mexanik, o'tkazuvchi, ajratuvchi va asosiy to'qimalar.	2
4.	Ildiz morfologiyasi va anatomik tuzilishi.	2
5.	Poya morfologiyasi. Kurtak tuzilishi. O't o'simliklar poyasining anatomik tuzilishi. Daraxtsimon o'simliklar poyasining anatomik tuzilishi.	2
6.	Barg morfologiyasi. Bargning anatomik tuzilishi.	2
7.	Bargdagi fiziologik jarayonlar. O'simliklarning ko'payishi, o'sishi va rivojlanishi.	2
8.	O'simliklar sistematikasi. Tuban o'simliklarga tasnif. Bakteriyalar tuzilishi va ko'payishi.	2
9.	Suv o'tlari, zamburug'lar va lishayniklar.	2
IV - semestr		
1	Yuksak sporal o'simliklarning tasnifi. Moxsimonlar. Plaunlar. qirqbug'imlilar.	2
2	Qirqquloqsimonlar. Yuksak o'simliklar evolyutsiyasi. Ochiq urug'lilar.	2
3	Yopiq urug'lilar o'simliklar evolyutsiyasida eng yuksak taraqqiy etgan. Reproktiv organlarning paydo bo'lishi. Gul va to'pgullar.	2
4	Changlanish, otalanish. Meva, to'pmeva va urug' tuzilishi.	2
5	Yopiq urug'li o'simliklar tasnifi. Bir va ikki pallali o'simliklar. Magnoliyadoshlar, ayiqtovondoshlar, zirkdoshlar, ko'knorguldoshlar oilalari.	2
6	Grechixadoshlar, choydoshlar, dalachoydoshlar, qovoqdoshlar, karamguldoshlar, gulxayridoshlar oilalari.	2

7	Atirguldoshlar, selderguldoshlar, dukkakedoshlar, ituzumdoshlar, yasnotkaguldoshlar va astraguldoshlar oilalari.	2
8	Mirtadoshlar, jo'kadoshlar oilalari. Bir pallalilar sinfi: liliyagullilar va qo'ng'irboshlilar tartibi.	2
9	Ekologiya, fitotsenologiya va o'simliklar geografiyasi.	2
jami		36

Laboratoriya mashg'ulotlarining tavsiya etadigan mavzulari

Mikroskopning tuzilishi. Hujayra tuzilishi. Mikroskopning tuzilishi, undan foydalanish qoidalari, doimiy va vaqtinchalik kesiklar tayyorlash, ularni bo'yash usullari bilan tanishtirish. O'simlik hujayrasining tuzilishi ularning shakli va tirik qismlari, organoidlarning vazifasini o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, blits o'yin, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4.

Osmotik bosim. Plastidlar. Xujayraning turgor, plazmoliz va deplazmoliz holatini kuzatish. Plastidlarni aniqlash, o'simlikni qaysi organlarida uchraydi, vazifasi bilan tanishish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, blits o'yin, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4.

Hujayradagi zahira oziq moddalar. hujayradagi zahira oziqli moddalar va ularni aniqlash reaksiyalarni o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, blits o'yin, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4.

Kristallar va ularning tuzilishi. Vakuola, hujayra po'sti va ularni aniqlash reaksiyalari. Kristallarning tuzilishini o'rganadilar, o'simliklarda qaysi krisstal turlari uchrashini aniqlaydilar. naqa hujayra shirasi tarkibiga kiruvchi moddalar va ularni aniqlash reaksiyalar bilan tanishadilar.

hujayra po'sti kimyoviy tarkibi va ularni aniqlash reaksiyalari bilan tanishadilar.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, blits o'yin, vertushka usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4.

Hosil qiluvchi to'qimalar, xillari va joylanishi. Birlamchi va ikkilamchi hosil qiluvchi to'qimalar. O'simlik to'qimalari, ularning turlari, hosil qiluvchi to'qima hamda ularning vazifalari haqida tushuncha berish. Birlamchi va ikkilamchi hosil qiluvchi to'qimalarning tuzilish, vazifasi haqida ma'lumotga ega bo'ladilar.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, blits o'yin, vertushka usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4.

Qoplovchi va mexanik to'qima. Qoplovchi to'qimaning tuzilishi va kelib chiqishiga ko'ra turlari. Birlamchi va ikkilamchi qoplovchi to'qimalar, ularning bajaradigan vazifalari, mexanik to'qima xillari, ularning vazifalari, uchraydigan joylari va ahamiyatini o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, blits o'yin, vertushka usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4.

O'tkazuvchi to'qimalar. O'tkazuvchi to'qima elementlari va bog'lamlari. O'tkazuvchi to'qima- ksilema to'qimasi (elementlari) tarkibiga kiradigan traxeya, traxeid, ksilema tolasi, lebriform, ksilema parenxemasi va floema to'qimasi tarkibiga kiruvchi elaksimon naylar, yo'ldosh hujayralar, floema tolasi – stereid, floema parenxemasidan tashkil topganligi haqida ma'lumotga ega bo'ladilar. O'tkazuvchi bog'lamlari tuzilishi, ularning xillari, vazifasi va uchraydigan joylari.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora,blits o'yin, vertushka usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4.

Asosiy va ajratuvchi to'qimalar, bezlar va ularning xillari. Smola yo'llari. Asosiy va ajratuvchi to'qimalarning tuzilishi, organlarda joylashuvi, ayrim o'simliklarda o'ziga xos bezlar uchrashi va ularda to'planadigan moddalar haqida tushuncha berish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora,blits o'yin, vertushka usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4.

Birlamchi va ikkilamchi ildizning ichki tuzilishi. Kambiyning hosil bo'lishi. Ildizning birlamchi tuzilishi, ildiz zonalari, ikkilamchi ildizning tuzilishi. kambiyning hosil bo'lishi, ildizmevalarning ichki tuzilishini o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora,blits o'yin, vertushka usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4.

Bargning anatomik tuzilishi. Bargning ichki tuzilishidagi to'qimalar, ularning vazifasi, assimilyatsion to'qimalarning joylanishiga qarab barg guruhlariga bo'linishini o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora,bumerang usuli, vertushka usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4.

Bir va ikki pallali o'tli o'simlik poyasining anatomik tuzilishi. O'tli o'simliklar poyasidagi to'qimalarning joylanishi, ularning vazifasi, bir va ikki pallali o'simlik poyalarning ichki tuzilishidagi farqlarni o'rganish

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, bumerang usuli, vertushka usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4.

Yog'ochli o'simlik poyasining anatomik tuzilishi. Oraliq nazorat. : Daraxtli o'simliklar poyasidagi to'qimalarning joylanishini, vazifalarini, poyalarning eniga yo'g'onlashuvi, kambiy faoliyatini o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, blits-o'yin, vertushka usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4.

Fiksirlangan material asosida yuksak o'simliklarning anatomik tuzilishini aniqlash. Talabalar laboratoriya mashg'ulotlari davomida olgan bilimlarini yanada mustahkamlash maqsadida ushbu mashg'ulotni o'tkazadilar. O'simlikning ildiz, poya va barglarning ichki tuzilishini aniqlaydilar.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, blits-o'yin,, vertushka usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4.

Vegetativ organlar morfologiyasi. Ildiz morfologiyasi. O'simlikning vegetativ organi- ildiz tuzilishi, xilma-xilligi, vazifalari, shakl o'zgarishini o'rganish. Ildizning biologik va xo'jalikdagi ahamiyatini o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, vertushka usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4;Q6.

Poya morfologiyasi. O'simlikning vegetativ organi- poya tuzilishi, xilma-xilligi, vazifalari, shakl o'zgarishini o'rganish. Poyaning biologik va xo'jalikdagi ahamiyatini o'rganish. Kurtak tuzilishi. Vegetativ va generativ kurtaklar. Tinim davridagi kurtaklar.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora,, vertushka usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4;Q6.

Barg morfologiyasi. : Oddiy va murakkab barglarning tashqi tuzilishi, arrasimon, tishsimon barg qirralari, yoysimon, to'rsimon, panjasimon tomirlanishi, bo'lakli, kesikli qirqilgan barglari, bargning poyada joylanishini o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, vertushka usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4;Q6.

O'simliklar morfologiyasidan mustaqil ish. Dars jarayonida talabalar amaliy mashg'ulotdan olgan bilimlarni yanada mustahkamlash uchun ildiz,poya, barg gerbariyga qarab analiz qilib o'rganadilar.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, vertushka usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4;Q6.

Tube sporali o'simliklar. Suv o'tlari. Tube sporali o'simliklarning o'ziga xos xarakterli belgilari, tarqalishi. Suv o'tlarning tuzilishi, klassifikatsiyasi, yashash sharoiti, ko'payishi, rivojlanishi va ahamiyati.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, vertushka usuli, bliits-o'yin, klaster, r guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

Zamburug'lar va lishayniklar. Zamburug va lishayniklarning tuzilishi, xilma-xilligi, oziqlanishilinishi, klassifikatsiyasi va ahamiyatini o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, vertushka usuli, bliits-o'yin, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

Yuqori sporali o'simliklar, moxsimonlar, plaunlar, qirqquloqsimonlilar qirqbo'g'inlilar. Yuqori sporali o'simliklar xilma-xilligi, yashash sharoiti, ularning ko'payishidagi nasl gallasini va biologik xususiyatlarini o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, vertushka usuli, bliits-o'yin, klaster, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

Urug'li o'simliklar. Ochiq urug'lilar. : Ochiq urug'li o'simliklarning o'ziga hos o'ziga xos xarakterli belgilari, klassifikatsiyasi, tarqalishi. Ninabarglilarning tuzilishi, yashash sharoiti, ko'payishi va rivojlanishi, ahamiyati va xilma-xilligi.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, vertushka usuli, bliits-o'yin, klaster, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

Yopiq urug'lilar. Gul tuzilishi. Gul formulasi va diagrammasi. Evolyutsion taraqqiyot davrida gulning hosil bo'lishi, gulning tuzilishi, formulasi, diagrammasi, gul qismlarining gul o'rniga joylanish xillari, changchi urug'chining tuzilishi, changlanish xillari va urug'lanish jarayonlari haqida ma'lumot oladilar.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, vertushka usuli, blits-o'yin, klaster, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3; Q5; Q6; Q7; Q8.

To'pgullar va ularning xillari. To'pgul va ularning xillari. Oddiy to'pgullar, murakkab to'pgullar, shoxlanishiga qarab, monopodial va simpodial to'pgullar, tabiatda uchrashi, biologik va tibbiyotdagi ahamiyatini o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, blits-o'yin, klaster, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3; Q5; Q6; Q7; Q8.

Meva xillari va urug' tuzilishi. Meva, uning tuzilishi, mevaning paydo bo'lishiga qarab turlarga quruq va ho'l mevalarga bo'linishi, urug'ning tuzilishi, paydo bo'lishi, urug' qismlari, oziqlanishili moddalarni to'planishiga qarab nomlanishi, unib chiqishi uchun kerak bo'ladigan sharoitlarni o'rganish. Meva, urug'larni tabiatda tarqalishi uchun bo'lgan moslamalarni o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, blits-o'yin, klaster, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3; Q5; Q6; Q7; Q8.

Magnoliyadoshlar ayiqtovondoshlar va zirkdoshlar oilasi. : Magnoliyadoshlar, ayiqtovondoshlar va zirkdoshlar oilalarining umumiy xarakterli belgilari, o'simliklarning hayotiy formalari, tarqalish areali, oila vakillari, organlarining tuzilishi, tibbiyotda va ho'jalikdagi ahamiyatini o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, vertushka usuli, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3; Q5; Q6; Q7; Q8.

Ko'knorguldoshlar, karamdoshlar va gulhayridoshlar oilasi. Ko'knorguldoshlar, karamguldoshlar va gulxayridoshlar oilalarining umumiy xarakterli belgilari, o'simliklarning hayotiy formalari, tarqalishi, vakillari, tibbiyotdagi va xo'jalikdagi ahamiyati.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3; Q5; Q6; Q7; Q8.

Atirguldoshlar va dukkaddoshlar oilasi. Atirguldoshlar va dukkaddoshlar oilasining umumiy xarakterli belgilari, o'simliklarning hayotiy formalari, tarqalishi, vakillari, tibbiyotdagi va xo'jalikdagi ahamiyati.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, vertushka usuli, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3; Q5; Q6; Q7; Q8.

Mirtadoshlar va jo'kadoshlar oilasi. Mirtadoshlar va jo'kadoshlar oilasining umumiy xarakterli belgilari, o'simliklarning hayotiy formalari, tarqalishi, vakillari, tibbiyotdagi va xo'jalikdagi ahamiyati.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3; Q5; Q6; Q7; Q8.

Selderguldoshlar, yasnotkaguldoshlar, ituzumdoshlar oilasi. Selderguldoshlar, ituzumdoshlar va yasnotkaguldoshlar oilasining umumiy xarakterli belgilari, o'simliklarning hayotiy formalari, tarqalishi, vakillari, tibbiyotdagi va xo'jalikdagi ahamiyati.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3; Q5; Q6; Q7; Q8.

Astraguldoshlar oilasi. Oraliq nazorat. Astraguldoshlar oilasining umumiy xarakterli belgilari, o'simliklarning hayotiy formalari, tarqalishi, vakillari, tibbiyotdagi va xo'jalikdagi ahamiyati.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

Bir pallalilar sinfi: Liliyagullilar tartibi (piyozlar, lolalar, shirachlar, marvaridgullilar avlodlari). Liliyaguldoshlar oilasining umumiy xarakterli belgilari, o'simliklarning hayotiy formalari, tarqalishi, vakillari, tibbiyotdagi va xo'jalikdagi ahamiyati.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

Bir pallalilar sinfi; qo'ng'irboshlilar tartibi (g'alladoshlar oilasi: makkajo'gori,sholi, bug'doy avlodlari). G'alladoshlar oilasining umumiy xarakterli belgilari, o'simliklarning hayotiy formalari, tarqalishi, vakillari, tibbiyotdagi va xo'jalikdagi ahamiyati.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

Gerbariydan foydalangan holda o'simliklar oilalarini aniqlash. Ma'ruza va amaliy mashg'ulot darslarida olgan bilimlarini mustaxkamlash maqsadida o'simliklar morfologiyasini, anatomiyasini va sistematika fanini bir-biriga bog'liqligi bilan tanishish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

O'simliklar ekologiyasi, geobotanikasi va geografiyasi. O'simliklar ekologiyasi, ekologik faktorlar, o'simliklarning xayotiy formalari, o'simliklar qoplami va ularning xilma-xilligi, flora, o'simliklar areali, o'simlik qoplaminin xillarini o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

№	Laboratoriya mashg'ulotlar mavzulari	Dars soat
1.	Mikroskopning tuzilishi. Hujayra tuzilishi.	3
2.	Osmotik bosim. Plastidlar.	3
3.	Hujayradagi zahira oziq moddalar.	3
4.	Kristallar va ularning tuzilishi. Vakuola, hujayra po'sti va ularni aniqlash reaksiyalari.	3
5.	Hosil qiluvchi to'qimalar, xillari va joylanishi. Birlamchi va ikkilamchi hosil qiluvchi to'qimalar.	3
6.	Qoplovchi va mexanik to'qimalar.	3
7.	O'tkazuvchi to'qimalar. O'tkazuvchi to'qima elementlari va bog'lamlari.	3
8.	Asosiy va ajratuvchi to'qimalar, bezlar va ularning xillari. Smola yo'llari.	3
9.	Birlamchi va ikkilamchi ildizning ichki tuzilishi. Kambiyning hosil bo'lishi.	3
10.	Bargning anatomik tuzilishi.	3
11.	Bir va ikki pallali o'tli o'simlik poyasining anatomik tuzilishi.	3
12.	Yog'ochli o'simlik poyasining anatomik tuzilishi. Oraliq nazorat.	3
13.	Fiksirlangan material asosida yuksak o'simliklarning anatomik tuzilishini aniqlash.	3
14.	Fiksirlangan material asosida yuksak o'simliklarning anatomik tuzilishini aniqlash.	3
15.	Vegetativ organlar morfologiyasi. Ildiz morfologiyasi.	3
16.	Poya morfologiyasi.	3

17.	Barg morfologiyasi.	3
18.	Gerbariy namunalari asosida o'simliklarning morfologik belgilarini (ildiz, poya va barglarni) aniqlash.	3
19	Tuban sporali o'simliklar, suv o'tlari.	3
20	Zamburug'lar va lishayniklar.	3
21	Yuqori sporali o'simliklar, moxsimonlar, plaunlar., qirqbo'g'implilar, qirqquloqsimonlilar.	3
22	Urug'li o'simliklar. Ochiq urug'lilar.	3
23	Yopiq urug'lilar. Gul tuzilishi. Gul formulasi va diagrammasi	3
24	To'pgullar va ularning xillari.	3
25	Meva xillari va urug' tuzilishi.	3
26	Magnoliyaguldoshlar, ayiqtovondoshlar va zirkdoshlar oilalari	3
27	Ko'knorguldoshlar, karamguldoshlar va gulxayridoshlar oilalari.	3
28	Atirguldoshlar ,dukkakdoshlar oilasi .	3
29	Mirtadoshlar ,jo'kadoshlar oilalari.	3
30	Selderguldoshlar, yasnotkaguldoshlar, ituzumdoshlar oilalari.	3
31	Astraguldoshlar oilasi. Oraliq nazorat.	3
32	Bir pallalilar sinfi: Liliyagullilar tartibi (piyozdoshlar, loladoshlar oilasi: shirachlar, marvaridgullilar avlodlari).	3
33	Bir pallalilar sinfi; qo'ng'irboshlilar tartibi (g'alladoshlar oilasi: makkajo'xori,sholi,bug'doy avlodlari)	3
34	Gerbariydan foydalangan holda o'simliklar oilalarini aniqlash	3
35	Gerbariydan foydalangan holda o'simliklar oilalarini aniqlash	3
36	O'simliklar ekologiyasi, geobotanikasi va geografiyasi	3
jami		108

Mustaqil ta'limni tashkil etishning shakli va mazmuni

Talabaning mustaqil ishi o'rganilayotgan mavzu yuzasidan kengaytirilgan ma'lumotlar yig'ish. Buning uchun axborot texnologiyalarining imkoniyatlaridan keng foydalanish, olingan ma'lumotlarni mustaqil ravishda ishlab chiqish, uning turlari va shakllari referat, slayd, tahlil natijalarining jadvallari, mavzular bo'yicha informatsion vositalardan olingan adabiyotlar ro'yxati, me'yoriy texnik hujjatlarning nusxalari ko'rinishida bo'lishi mumkin. Mustaqil ishga mo'ljallangan mavzular va topshiriqlar talabaning mustaqil ishini tashkil etish bo'yicha kafedrada ishlab chiqilgan va muntazam yangilanib boradigan uslubiy qo'llanmalarda keng yoritilgan.

Talabalar mustaqil ishi uchun botanika fanidan tasdiqlangan namunaviy dasturga kiritilgan mavzular bo'yicha har bir talabaga semestrda alohida topshiriq beriladi. Topshiriq laboratoriya mashg'ulotini olib boradigan o'qituvchilar tomonidan beriladi va o'qituvchi jurnalida belgilanadi. TMI ballari JN o'z ichiga olgan. TMI ni topshirmagan talaba YAB kiritilmaydi.

Talabalar mustaqil ish mavzusi farmatsiya yo'nalishida 98 soat, kasb ta'lim yo'nalishiga 81 soat rejalashtirilgan.

Talabaning mustaqil ishi kafedra arxivida 1 yil mobaynida saqlanadi.

DASTURNING INFORMATSION-USLUBIY TA'MINOTI

Botanika fanini o'zlashtirishda ajratilgan soatlar uchun laboratoriya mashg'ulotlari va ma'ruza darslari ta'limning zamonaviy (xususan interfaol) usullari, pedagogik va axborot – kommunikatsiya (amaliy dastur paketlari, prezentatsion, elektron – didaktik) texnologiyalarini

qo'llash orqali olib boriladi. Ma'ruza va laboratoriya mashg'ulotlari o'tkazish vaqtida pedagogik va axborot texnologiyalarning usullaridan " aqliy xujum", " bumerang" , " vertushka", " blits o'yin", "klaster", kichik guruxlar musobaqalari va taqdimotlardan keng foydalaniladi.

O'quv dala amaliyoti

O'quv rejaga binoan farmatsiya fakulteti talabalari botanika fanidan 12 ish kunidan iborat bo'lgan o'quv dala amaliyotini 4 semestrda o'tadilar. Talabalarning yil davomida botanika fanidan olgan bilimlarini mustaxkamlash, o'simliklar morfologiyasini, sistematikasini va geobotanika asoslarini chuqurroq o'rganish maqsadida yozgi o'quv-dala amaliyoti mashg'ulotlari o'tkaziladi. Botanikadan o'tkaziladigan o'quv-dala amaliyoti davomida talabalar o'simliklar qoplami bilan yaqindan tanishadilar. SHuningdek ular yovvoyi va madaniy o'simliklarning ma'lum xo'jalik ahamiyatiga ega ekanligi, ulardan qimmatbaxo dorivor, em-xashak va texnik o'simlik sifatida foydalanishni ilmiy asosda amalga oshirish mumkinligiga ishonch xosil qiladilar. O'simliklarning nomini aniqlashda aniqlagichdan foydalanish yo'llarini to'la o'zlashtiradilar.

Botanika fanidan o'quv dala amaliyoti iyun-iyul oylarida O'simlik va xayvonot olami genofondi instituti, akademik F.N.Rusanov nomidagi botanika bog'idagi o'simliklarni o'rganadilar.

O'quv dala amaliyoti yakunida talabalar o'z rahbarlariga qoidaga kura rasmiylashtirilgan o'simlik gerbariysini, yozib borgan kundaligini taqdim etadilar va o'rganilgan materiallar yuzasidan o'qituvchining qo'shimcha savollariga javob beradilar. SHu bilan birga yakuniy mashg'ulotda talabalarni o'quv dala amaliyotida olgan bilim va ko'nikmalari 100 ballik tizimida baholanadi. Baholashda vaziyatli masalalar, bumerang, vertushka usullari kabi texnologiyalar qo'llanadi.

O'quv dala amaliyoti rejasi, o'tish tartibi o'tadigan mavzular kafedrada yaratilgan " Botanika fanidan o'quv dala amaliyoti o'tish bo'yicha uslubiy ko'rsatmada keltirilgan.

Botanika fanidan talabalar bilimini reyting tizimi asosida baholash mezonlari

1. Talabalarning fan bo'yicha o'zlashtirishlarini baholash semester davomida muntazam ravishda olib boriladi va quyidagi turlar orqali amalga oshiriladi:

joriy nazorat (JN)

mashg'ulotlardan bo'sh vaqtda talabalar mustaqil ishini baholash *

oraliq nazorat (ON)

yakuniy nazorat (YaN)

2. *Botanika* fanidan talabalarning semestr davomidagi o'zlashtirish ko'rsatkichi 100 ballik tizimda baholanadi.

Ushbu 100 ball nazorat turlari bo'yicha quyidagicha taqsimlanadi:

- joriy nazorat – 60 ball

- oraliq nazorat – 10 ball

- yakuniy nazorat – 30 ball

2.1. 3-4 semestr davomida farmatsiya va kasb ta'limi yo'nalishlarida «Botanika» fani bo'yicha ma'ruza va laboratoriya mashg'ulotlari olib boriladi. Bunda umumiy rejalashtirilgan 242 soat. Farmatsiya yo'nalishlarida: ma'ruza - 36 soat, laboratoriya mashg'ulotlari - 108 soat, mustaqil ish - 98 soat; soatlar kasb ta'limi yo'nalishlarida quyidagicha taqsimlangan: ma'ruza -36 soat, laboratoriya mashg'ulotlari -108 soat, mustaqil ish - 84 soat

3. Talabalar bilimini baholashda quyidagi namunaviy mezonlar inobatga olinadi:

Talaba darsga kelib, unga mutloq tayyorlanmaganida va muhokamada ishtirok etmaganida 2,0 ball qo'yiladi.

4. Kafedra tomonidan botanika fanidan baholash turlarining (JB, TMI, OB va YaB) har biri bo'yicha talabalar bilim darajasini baholashning aniq mezonlari ishlab chiqildi va Markaziy Uslubiy Kengashda tasdiqlandi.

5. Har bir baholash turlari (JB, TMI, OB va YaB) bo'yicha baxolar 100% (ball) hisobidan aniq mezonlar asosida qo'yib boriladi, o'rtacha qiymati hisoblanib, tegishli koeffitsientga ko'paytiriladi va ballari aniqlanadi (Ushbu nizomning talabani botanika bo'yicha attestatsiyadan o'tkazish tartibi bandiga qarang).

6. Talabaning botanika bo'yicha to'plagan umumiy bali har bir baholash turlarida to'plagan ballar yig'indisiga teng bo'ladi.

Izoh: */ Talabaning mustaqil ishi joriy nazorat jarayonida tegishli topshiriqlarni bajarishi va unga ajratilgan ballardan kelib chiqqan holda baholanadi. Bajarilgan mustaqil ishlar bir yil kafedrada saqlanadi/

JORIY NAZORAT

Baholashda talabaning bilim darajasi, laboratoriya mashg'ulot materiallarini o'zlashtirishi, nazariy material muxokamasida va ta'limning interaktiv uslublarida qatnashishning faollik darajasi, shuningdek, amaliy bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish darajasi (ya'ni nazariy, analitik va amaliy yondashuvlar) xisobga olinadi.

JB botanika fanidan 40-45 minutlik darsga tayyorgarligini bilish uchun og'zaki nazorat ishi o'tkaziladi, rasm daftarga uy vazifalarini yozganligi tekshiriladi, og'zaki javobini va echgan testi e'tiborga olib, auditoriyada bajargan ishi qo'shib to'plagan reyting bali qo'yiladi. Har bir mashg'ulotda barcha talabalar baholanishi shart.

Barcha yo'nalishlarda o'qitiladigan fan 3-4 semestr uchun joriy baholash (mustaqil ish bilan birgalikda) 60 ball bilan baholanib talabaning mavzu bo'yicha tayyorgarligi, laboratoriya ishini bajarish, olungan natijalarni hisoblash, umumlashtirish va rasmiylashtirish ballaridan iborat bo'ladi.

Botanika fandan 3 semestrda 18 ta, 4 semestrda 18 ta laboratoriya mashg'uloti rejalashtirilgan bo'lib, ulardan har semestrda 12 tasi (3 semestrda 2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,16,17, 4 semestrda 2,3,4,5,6,7,9,10,12,14,15,17) baholanadi.

Har bir baholanadigan laboratoriya mashg'uloti uchun ajratilgan maksimal ball 5,0 ballni tashkil etadi. Ushbu 5,0 ball quyidagicha taqsimlanadi:

III sem. Sanoat farmatsiyasi yo'nalishi ballari ham farmatsiya yo'nalishi III-VI-sem.ga aynan o'xshash.

Baho	Auditoriyada bajariladigan tajriba va mustaqil ish uchun	Interaktiv texnologiyalardan foydalangan holda og'zaki nazorat	Jami
A'lo	3,0	2,0	5
Yaxshi	2,0	2,0	4
O'rta	2,0	1,0	3
Qon-siz	1,0 dan kam	1,0 dan kam	2

Xar bir semestrda talabalar bilimni baxolash jarayonida quyidagilarga e'tibor berish tavsiya etiladi.

№	Talabaning bilim darajasi	Ballarda
1.	Xulosa va qaror qabul qilish;Ijodiy fikrlay olish; Mustaqil mushoxada yuritish;Amalda qo'llay olish;Moxiyatini tushunish;Bilish, aytib berish; Tasavvurga ega bo'lish.	A'lo (51-60)
2.	Mustaqil mushoxada yuritish;Amalda qo'llay olishMoxiyatini tushunish;Bilish, aytib berish; Tasavvurga ega bo'lish.	Yaxshi (42-50)

3.	Moxiyatini tushunish; Bilish, aytib berish; Tasavvurga ega bo'lish.	O'rta (33-41)
4.	Aniq tasavvurga ega emaslik; Bilmaslik.	Qon-siz (32 dan kam)

Xar bir mavzu uchun baxolash mezonlari kafedrada yaratilgan o'quv – uslubiy majmuada keltirilgan (ilova qilinadi).

ORALIQ NAZORAT

Botanika fandan ON semestr davomida bir marotaba o'tkaziladi. ON ga o'quv mashg'ulotlaridan akademik qarzi bo'lmagan talabalar quyiladi. Oraliq nazorat kafedra majlisi qarori bilan yozma ish, og'zaki suhbat shakllarida yoki ularning kombinatsiyalarida o'tkazilishi mumkin. Har bitta O.N. uchun 5,0 baldan ajratiladi.

Oraliq nazorat bo'yicha to'plangan ballar

№	Baho	Ballarda
1.	A'lo	9-10
2.	Yaxshi	7-8
3.	O'rta	5-6
4.	Qon-siz	4,0

YAKUNIY NAZORAT

Botanika fandan YaN da talabaning bilim, ko'nikma va malakalari fanning umumiy mazmuni doirasida baxolanadi. YaN fan bo'yicha o'quv mashg'ulotlari tugaganidan so'ng har semestrda o'tkaziladi.

JN va ON ga ajratilgan umumiy ballarning xar biridan saralash balini to'plagan talabaga YaN da ishtirok etish xuquqi beriladi.

Botanika fani bo'yicha yakuniy nazorat og'zaki sinov shaklida o'tkaziladi.

№	O'zlashtirish	
	Ballarda	Baho
1.	26,0-30,0	A'lo
2.	21,0-25,0	Yaxshi
3.	17,0-20,0	O'rta
4.	16,0 dan kam	Qon-siz

TALABA BILIMINI BAHOLASH TARTIBI

1. Saralash bali 55,0 ballni tashkil qiladi.

2. JB, OB va YaB turlarida fanni o'zlashtira olmagan (55% dan kam ball to'plagan) yoki uzrli sabab bilan baholash turlarida ishtirok eta olmagan talabalarga quyidagi tartibda qayta baholashdan o'tishga ruxsat beriladi.

- akademik qarzdor talabalrga semestr tugaganidan keyin dekan ruxsatnomasi asosida qayta o'zlashtirishi uchun – 2 hafta muddat beriladi. Akademik qarzdordan qayta topshirishni qabul qilish uchun kafedra mudiri tomonidan o'qituvchi tayinlanadi. Shu muddat davomida o'zlashtira olmagan talaba belgilangan tartibda rektorning buyrug'i bilan talabalar safidan chetlashtiriladi.

Sanoat Farmatsiya yo'nalishi uchun

Kirish

Farmatsevtika institutida botanika fanini o'qitilishining asosiy maqsadi malakali mutaxassislar tayyorlash, tabiatga, o'simliklar dunyosiga, ayniqsa dorivor o'simliklarga nisbatan mehr - muhabbat uyg'otish, tabiiy boyligimizdan to'g'ri va oqilona foydalanish yo'llarini o'rgatadi. Maqsadga erishish uchun botanika fanidan mashg'ulotlar o'ziga xos uslub bilan o'tkaziladi. Chunki farmatsevtlar, dorivor moddalarning ko'pchiligi o'simliklar maxsuli ekanligini hisobga olib, ularni makro va mikroskopik tuzilishini tekshirib aniqlaydi. Natijada anatomiya, morfologiya, sistematikadan bilimga ega bo'lib qolmay, amalda ish bajara olishi zarur. Bu amaliy tajriba turli o'simliklarni qismlari to'g'risida aniq tasavvur hosil qilishga, makroskopik va mikroskopik tomondan aniqlashda farmakognoziya faniga asos bo'ladi. Laboratoriya mashg'ulotining «Anatomiya» bo'limida tayyor kesiklardan foydalanish bilan birga, vaqtincha kesiklar tayyorlash ko'zda tutilgan.

Yaxshi mutaxassis bo'lish uchun talabalar o'simliklarni morfologiyasini, anatomiyasini yaxshi o'zlashtirishi lozim. Sistematikani o'rganilayotganda har bir talaba shaxsiy gerbariy bilan ta'minlanishi shart. Dasturda talaba har tomonlama o'simliklarni o'rganishiga keng o'rin berilgan.

Fanning maqsad va vazifalari

Botanika fani farmatsevtika institutida umumiy teoretik kurs bo'lib, talabalarni ixtisos bo'yicha farmakognoziya, o'simlik fiziologiyasi, bioximiyasi, mikrobiologiyasi, dorivor o'simliklarni o'stirish biologiyasi kabi kurslarni o'tishga tayyorlaydi. Shu bilan birga talabalar botanikaning muhim bo'limlari bilan tanishib, bir vaqtning o'zida o'simliklar dunyosining hayot faoliyatini o'rganadilar, bu esa farmatsevtlar uchun o'ta muhim bo'lgan dorivor o'simliklar va o'simlik homashyolari bilan ishlashga yordam beradi.

Dorivor o'simliklar florasiidan foydalanish, tabiatini va o'simliklar dunyosining resurslarini himoya qilgan va uni tushungan holda olib borilishi kerak.

Fanni o'rganishning vazifalari.

Botanika fanini o'qish natijasida talaba quyidagilarni bilishi shart:

- o'simliklar dunyosining biologik qonuniyatlarini;
- o'simlik organlarining morfologik va anatomik strukturalarining xilma-xilligini;
- yuqorida ko'rsatilgan kurslarda o'rganiladigan dori turlarini o'z ichiga olgan o'simlik guruhlarini;
- homashyoni aniqlashdagi o'simliklarni diagnostik ko'rsatkichlarini bilishdan iborat.

Fan bo'yicha talabning malakasiga qo'yiladigan talablar

“Botanika” o'quv fanini o'zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida talaba:

- o'simlik hujayralari;
- o'simlik to'qimalari va qismlari;
- o'simliklarning sistemaekasi *haqida tasavvurga ega bo'lish*.
- tashqi morfologik xususiyatlari bo'yicha gerbariy na'munalari asosida o'simliklarni aniqlash;
- o'simliklarni oilasi bo'yicha ajrata bilish;
- o'simliklarni morfologik tuzilishi bo'yicha ajrata bilish;

- o‘simlik organlarining mikrostrukturalari va ularning xilma-xil ko‘rinishlarini ajratish;
- tuban va yuqori tipdagi o‘simliklarning tashqi morfologik tuzilishini tasniflab berish;
- o‘simlik to‘qima va hujayralarining elementar tuzilishini bilish va mustaqil ravishda hujayra qobig‘i, sitoplazma, yadro, vakuola (hujayra shirasi), hujayra xosilasi bo‘lgan kraxmal, yog‘, oqsilga mikroreaksiyalar olib borish, o‘simlik xom-ashyosini diagnostik ko‘rsatkichlari bo‘lgan kristallarning bor yo‘qligini aniqlash;
- o‘simlik to‘qimalarida reaktivlar yordamida tirik va o‘lik hujayra elementlarini, hujayraning yog‘ochlangan va sellulyozali qobig‘ini, probkalanishini, qoplovchi to‘qimalarning kutinlashganini, tukchalarning har-xil turlarini va ular tuzilishini xilma-xilligini aniqlashni bilish;
- efir moyi, smola bo‘shliqlarning bor yo‘qligini va ularning tuzilishini aniqlash;
- hosil qiluvchi, qoplovchi, mexanik, o‘tkazuvchi, asosiy va ajratuvchi to‘qimalarning tuzilishini bilish;
- talaba o‘qish davomida o‘simlikni tasniflashi va ularni bir-biridan ajrata bilishi;
- o‘simlikning morfologiyasini *bilishi va ulardan foydalana olishi* kerak;
- Talabaning *ko‘nikmasiga qo‘yiladigan talablar*:
- amaliy mashg‘ulotlarda mikropreparatlarni tayyorlash texnikasini o‘rganish;
- o‘simlik organlarida; ildiz, poya, bargning tuzilishini anatomik ko‘rsatkichlaridan foydalangan holda aniqlash;
- o‘simliklar dunyosining tasnifi va ularning tipi, sinfi, oilasi, turini bilish;
- o‘simliklardan *gerbariy tayyorlash*;
- kattalashtirib ko‘rsatadigan asboblardan foydalanish;
- doimiy va vaqtincha kesiklar tayyorlash va ularni bo‘yash;
- hujayradagi moddalarni aniqlashdagi kimyoviy reaksiyalarni bajara olish *ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak*;

O‘quv rejadagi boshqa fanlar bilan bog‘liqligi

Botanika fani 3 semestrda o‘qitiladi. Dasturni amalga oshirish o‘quv rejasida rejalashtirilgan anorganik kimyo, fizika, lotin tili fanlaridan yetarli bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlik talab etiladi, chunki bu fanlarning ayrim bo‘limlaridan olingan bilimlar talabani botanika fanini o‘zlashtirish vaqtida kerak bo‘ladi.

Fanni o‘qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar

Botanika fanidan o‘quv jarayoni (ma‘ruzalar va laboratoriya mashg‘ulotlari)da zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalar keng qo‘llanishi ko‘zda tutilgan. Jumladan, barcha ma‘ruzalarda “Blits-so‘rov”, munozara, dialog, laboratoriya mashg‘ulotlarida esa “Bumerang”, “Vertushka”, “Klaster”, test, “FSMU” kabi pedagogik texnologiyalar qo‘llaniladi.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim. Bu ta‘lim o‘z mohiyatiga ko‘ra ta‘lim jarayoning barcha ishtirokchilarini to‘laqonli rivojlantirishni ko‘zda tutadi. Bu esa ta‘limni loyihalashtirilayotganda, albatta ma‘lum bir ta‘lim oluvchining shaxsini emas, avvalo, kelgusidagi mutahassislik faoliyati bilan bog‘liq o‘qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondoshilishni nazarda tutadi.

Tizimli yondashuv ta‘lim texnologiyasi tizimning barcha belgilarini o‘zida mujassam etmog‘i lozim: jarayonning mantiqiyiligini, uning barcha bo‘g‘inlarini uzaro bog‘langanligi yahlitligi.

Faoliyatga yunaltirilgan yondashuv. Shaxsning jarayonli sifatlarini shakllantirishga ta'lim oluvchining faoliyatini aktivlashtirish va intinsevashtirish, o'quv jarayonida uning barcha qobiliyatlari va imkoniyatlari, tashabbuskorligini ochishga yunaltirilgan ta'limni ifodalaydi.

Dialogik yondashuv . Bu yondashuv o'quv munosabatlarini yaratish zaruriyatini bildiradi. Uning natijasida shaxsning o'z – o'zini faollashtirishi va o'z- o'zini ko'rsata olish kabi ijodiy faoliyati kuchayadi.

Hamkorlikdagi ta'limni tashkil etish. Demokratik tenglik, ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi faoliyat mazmunini shakllantirishda va erishilgan natijalarni baholashda birgalikda ishlashni joriy etishga e'tiborni qaratish zarurligini bildiradi.

Muammoli ta'lim. Ta'lim mazmunini muammoli tarzda taqdim qilish orqali ta'lim oluvchi faoliyatini aktivlashtirish usullaridan biri. Bunda ilmiy bilimni obektiv qarama – qarshiligi va uni hal etish usullarini , dialitik mushohadani shakllantirish va rivojlantirishni, amaliy faoliyatga ularni ijodiy tarzda qo'llashni mustaqil ijodiy faoliyati ta'minlanadi.

Axborotni taqdim qilishni zamonaviy vositalari va usullarini qo'llash- yangi kompyuter va axborot texnologiyalarni o'quv jarayoniga qo'llash.

O'qitishning usullari va texnikasi Ma'ruza (kirish,mavzuga oid,vizuallashtirish), muammoli ta'lim, keys-stadi, pinbort, paradoks va loyihalash usullari , amaliy ishlar.

O'qitishni tashkil etish shakllari: Dialogik, polilok, muloqot hamkorlik va o'zaro hamkorlikka asoslangan frontal, kollektiv va guruh.

O'qitish vositalari: O'qitishning ananaviy shakllari (darslik, ma'ruza mantni) bilan bir qatorda- kompyuter va axborot texnologiyalari.

Kommunikatsiya usullari: tinglovchilar bilan operativ teskari aloqaga asoslangan bevosita o'zaro munosabatlar.

Teskari aloqa usullari va vositalari: kuzatish, blist-surov, oraliq va joriy va yakunlovchi nazorat natijalarini tahlili asosida o'qitish diagnostikasi.

Boshqarish usullari va vositalari: o'quv mashg'uloti bosqichlarini belgilab beruvchi texnologik karta kurinishidagi o'quv mashg'ulotlarini rejalashtirish, quyilgan maqsadga erishishda o'qituvchi va tenglovchining birgalikdagi harakati, nafaqat auditoriya mashg'ulotlari- balki auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarning nazoratlari.

Monitoring va baholash: o'quv mashg'ulotida ham butun kurs davomida xam o'qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib boorish. Kurs oxirida test topshiriqlari yoki yozma ish variantlari yordamida tinglovchilarning bilimlari baholanadi .

“Botanika” fanini o'qitish jarayonida kompyuter texnologiyasidan, “Stat” statistic dasturlar foydalaniladi. Ayrim mavzular bo'yicha talabalar bilimni baholash test asosida va kompyuter yordamida bajariladi. “Internet” tarmog'idagi ma'lumotlardan foydalaniladi, tarqatma materiallar tayyorlanadi, test tizimi hamda tayanch so'z va iboralar asosida oraliq va yakuniy nazoratlar o'tkaziladi

Botanika fanidan mashg'lotlarning mavzular va soatlar bo'yicha taqsimlanishi

t/r	Mavzular nomi	Jami soat	Ma'ruza	Laboratoriya mashg'lotlari	Mustaqil ta'lim
1	Kirish. Botanika sohasida ishlagan olimlar. Sanoat farmatsiyasida botanika fanining ahamiyati. O'simlik hujayrasi. Osmotik bosim. Sitoplazma. Plastidlar. Hujayradagi oziqli moddalar, kristallar.	10	2	3	5
2	To'qimalar va ularning tuzilishi. Hujayraning bo'linishi va ulardan hosil bo'ladigan to'qimalar. Hosil qiluvchi va qoplovchi to'qimalarning paydo bo'lishi va vazifasi.	10	2	3	5
3	Mexanik, o'tkazuvchi, asosiy va ajratuvchi to'qimalar.	10	2	3	5
4	Ildiz, poya, barg morfologiyasi va anatomik tuzilishi.	10	2	3	5
5	O'simliklarning ko'payishi. O'simliklar sistematikasi. Tuban va yuqori spirali o'simliklar. Ochiq urug'lilar.	10	2	3	5
6	Yopiq urug'li o'simliklarni kelib chiqishi. Reproduktiv organlarning paydo bo'lishi. Gul. Gul formulasi, diagrammasi. Meva. Urug'.	10	2	3	5
7	Bir va ikki pallalilar sinfi, Hususiyatlari, farqlari. Magnoliyadoshlar, ayiqtovondoshlar, ko'knorguldoshlar, karamguldoshlar va gulhayridoshlar oilalari, xususiyatlari, morfologik tuzilishlari, dorivor vakillari.	10	2	3	5
8	Atirguldoshlar dukkaddoshlar selderguldoshlar, ituzumdoshlar, yasnotkaguldoshlar, astraguldoshlar oilalarini xususiyatlari, morfologik tuzilishi, dorivor vakillari.	12	2	3	7
9	Bir pallalilar sinfi. Liliyagullilar va qo'ng'irboshlilar tartibi. Ekologiya, fitotsenologiya va o'simliklar geografiyasi.	12	2	3	7
	jami	94	18	54	49

Asosiy qism: Fanning uslubiy jihatidan uzviy ketma- ketligi

Asosiy qismda fanni mavzulari mantiqiy ketma-ketlikda keltirilgan. Har bir mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va tazyiklar orqali ochib beriladi/ talabalar botanika fanini o'zlashtirishlari uchun o'qitishning ilg'or va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi information pedagogic texnologiyalarni tadbiiq qilish muhim ahamiyatga egadir.

Fanni o'zlashtirishda darslik, o'quv va uslubiy qo'llanmalar, ma'ruza matnlari, tarqatma materiallardan foydalaniladi.

Ma'ruza mashg'ulotlari

Kirish. Botanika sohasida ishlagan olimlar. Sanoat farmatsiyasida botanika fanining ahamiyati. O'simlik hujayrasi. Osmotik bosim. Sitoplazma. Plastidlar. Hujayradagi oziqli moddalar, kristallar.

Botanika fani va uni vazifalari. Botanika fanining bo'limlari. Botanika sohasida ishlagan olimlar. Sanoat farmatsiyasida botanika fanining ahamiyati. O'simlik hujayrasi tuzilishi. Sitoplazma. Plastidlar. Hujayradagi oziqli moddalar, ularni aniqlash reaksiyalari. Kristallar va ularning ahamiyati

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; Q2; Q6

To'qimalar va ularning tuzilishi. Hujayraning bo'linishi va ulardan hosil bo'ladigan to'qimalar. Hosil qiluvchi va qoplovchi to'qimalarning paydo bo'lishi va vazifasi.

O'simlik to'qimalar. Ularning klassifikatsiyasi. Hosil qiluvchi to'qimalarning paydo bo'lishi hamda ularning vazifalari haqida tushuncha. Hujayra bo'linishi. Oddiy va murakkab bo'linish. Qoplovchi to'qimalarga tasnif, ularning xillari, vazifasi

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q4

Mexanik, o'tkazuvchi, asosiy va ajratuvchi to'qimalar.

Mexanik to'qimalarga tasnif, ularning xillari, vazifasi. O'tkazuvchi to'qimalarga tasnif, ularning vazifalari. O'tkazuvchi to'qimalarning elementlari, ularning bajaradigan vazifasi. O'tkazuvchi to'qima bog'lamlari joylashishi. Asosiy to'qimalar, xillari va vazifalari. Ajratuvchi to'qima xillari, ularning tuzilishi va vazifasi

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q4

Ildiz, poya, barg morfologiyasi va anatomik tuzilishi.

O'simlik ildizi, poyasi va bargining vazifasi. Ildiz klassifikatsiyasi. Sochma va o'q ildizlar. Ildiz metamorfozi. Tuganak bakteriyalar mikoriza haqida tushuncha. Ildiz anatomiyasi. Birlamchi va ikkilamchi ildiz tuzilishi. Poya haqida tushuncha. Poyalarning shakli, yo'nalishi, shoxlanishi, poya metamorfozi. Poyalarning ichki tuzilishi. Barg qismlari. Bargning poyada joylashishi. Oddiy va murakkab barglar. Barg metamorfozi. Bargning ichki tuzilishi (dorzoventral, izoloteral va radial barglar) haqida tushuncha

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q4

O'simliklarning ko'payishi. O'simliklar sistematikasi. Tuban va yuqori sporal o'simliklar. Ochiq urug'lilar.

O'simliklarning ko'payishi. Jinssiz ko'payish. Jinli yo'l bilan ko'payish. O'simliklarning rivojlanishi. O'simliklar sistematikasi tarixi. K.Linney sistemasi. Ch.Darvin ta'limoti. Engler sistemasi. Tuban va yuqori sporal o'simliklarga tasnif va farqlari. Ochiq urug'lilarga tasnif, klassifikatsiyasi, vakillari

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3; Q5; Q6; Q7.

Yopiq urug'li o'simliklarni kelib chiqishi. Reproktiv organlarning paydo bo'lishi. Gul. Gul formulasi, diagrammasi. Meva. Urug'.

Yopiq urug'li o'simliklarni kelib chiqishi, xarakterli belgilari. Yopiq urug'lilarni ochiq urug'lilardan farqi. Gul tuzilishi. Gulning formulasi va diagrammasi. To'pgullar. Mevalar. Urug' tuzilishi. Urug'ning unib chiqishi va tuzilishi

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3; Q5; Q6; Q7.

Bir va ikki pallalilar sinfi, Hususiyatlari, farqlari. Magnoliyadoshlar, ayiqtovondoshlar, zirkdoshlar, ko'knorguldoshlar, karamguldoshlar va gulhayridoshlar oilalari, xususiyatlari, morfologik tuzilishlari, dorivor vakillari.

Bir va ikki pallali o'simliklarga tasnif va ularning farqlari. Magnoliyadoshlar, ayiqtovondoshlar, ko'knoriguldoshlar, karamguldoshlar va gulhayridoshlar oilalariga tasnif va ularning asosiy vakillari

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3; Q5; Q6; Q7.

Atirguldoshlar, dukkaldoshlar, selderguldoshlar, ituzumdoshlar, yasnotkaguldoshlar, astraguldoshlar oilalarini xususiyatlari, morfologik tuzilishi, dorivor vakillari.

Atirguldoshlar oilasiga tasnif, klassifikatsiyasi, asosiy vakillari. Dukkaldoshlar oilasi, klassifikatsiyasi, asosiy vakillari, ularning ho'jalikdagi va tibbiyotdagi ahamiyati. Selderguldoshlar oilasi, asosiy vakillari, ahamiyati. Ituzumdoshlar, yasnotkaguldoshlar va astraguldoshlar oilalariga tasnif, asosiy

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3; Q5; Q6; Q7.

Mirtadoshlar, jo'kadoshlar oilalari. Bir pallalilar sinfi. Liliyagullilar va qo'ng'irboshlilar tartibi. Ekologiya, fitotsenologiya va o'simliklar geografiyasi.

Bir pallalilar sinfiga tasnif, klassifikatsiyasi. Liliyagullilar va qo'ng'irboshlilar tartibi.

O'simliklar ekologiyasi. Ekologiya fani, vazifalari, tarixi. O'simliklar oilasining muhofaza qilish. Fitotsenologiya. O'simliklar geografiyasi

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3; Q5; Q6; Q7.

Botanika fani bo'yicha ma'ruza mashg'otlarning kalendar tematik rejasi

№	Mavzu	Soat
1	Kirish. Botanika sohasida ishlagan olimlar. Sanoat farmatsiyasida botanika fanining ahamiyati. O'simlik hujayrasi. Osmotik bosim. Sitoplazma. Plastidalar. Hujayradagi oziqli moddalar, kristallar.	2
2	To'qimalar va ularning tuzilishi. Hujayralarning bo'linishi va ulardan hosil bo'ladigan to'qimalar. Hosil qiluvchi va qoplovchi	

	to'qimalarning paydo bo'lishi va vazifasi.	2
3	Mexanik o'tkazuvchi, asosiy va ajratuvchi to'qimalar.	
4	Ildiz, poya, barg morfologiyasi va anatomik tuzilishi.	2
5	O'simliklarning ko'payishi. O'simliklar sistematikasi. Tuban va yuqori sporali o'simliklar. Ochiq urug'lilar.	2
6	Yopiq urug'li o'simliklarni kelib chiqishi. Reproktiv organlarning paydo bo'lishi. Gul. Gul formulasi, diagrammasi. Meva. Urug'.	2
7	Bir va ikki pallalilar sinfi xususiyatlari, farqlari. Magnoliyadoshlar, ayiqtovondoshlar, ko'knoriguldoshlar, karamguldoshlar va gulhayridoshlar oilalari xususiyatlari, morfologik tuzilishlari, dorivor vakillari.	2
8	Atirguldoshlar, dukkakdoshlar, selderguldoshlar, ituzumdoshlar, yasnotkaguldoshlar, astraguldoshlar oilalarini xususiyatlari, morfologik tuzilishi, dorivor vakillari.	2
9	Bir pallalilar sinfi. Liliyagullilar va qo'ng'irboshlilar tartibi. Ekologiya, fitotsenologiya va o'simliklar geografiyasi.	2
jami		18

Laboratoriya mashg'ulotlarining tavsiya etadigan mavzulari

Mikroskopning tuzilishi. Hujayra tuzilishi. Osmotik bosim. Plastidlar. Hujayradagi zapas oziq moddalar Mikroskopning tuzilishi, undan foydalanish qoidalari, doimiy va vaqtinchalik kesiklar tayyorlash, ularni bo'yash usullari bilan tanishtirish. O'simlik hujayrasining tuzilishi ularning shakli va tirik qismlari, organoidlarning vazifasini o'rganish. Xujayraning turgor, plazmoliz va deplazmoliz holatini kuzatish. Plastidlarni aniqlash, o'simlikni qaysi organlarida uchraydi, vazifasi bilan tanishish, hujayradagi zapas oziqli moddalar va ularni aniqlash reaksiyalarni o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, muammoli ta'lim, munozora, blits o'yin, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4.

Hujayra shirasidagi moddalar. Kristallar, hujayra po'sti. Kristallarning tuzilishini o'rganadilar, o'simliklarda qaysi kristal turlari uchrashini aniqlaydilar. Naqa hujayra shirasi tarkibiga kiruvchi moddalar va ularni aniqlash reaksiyalar bilan tanishadilar.

hujayra po'sti kimyoviy tarkibi va ularni aniqlash reaksiyalari bilan tanishadilar.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, blits o'yin, vertushka usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4.

O'simlik to'qimalari: hosil qiluvchi, qoplovchi, mexanik, o'tkazuvchi, ajratuvchi va asosiy to'qimalar.

O'simlik to'qimalari, ularning turlari, hosil qiluvchi to'qima hamda ularning vazifalari haqida tushuncha berish.. Qoplovchi tuqimaning tuzilishi va kelib chiqishiga ko'ra turlari.

Mexanik to'qima xillari, ularning vazifalari, uchraydigan joylari va ahamiyatini o'rganish. O'tkazuvchi bog'lamlari tuzilishi, ularning xillari, vazifasi va uchraydigan joylari. Asosiy va ajratuvchi to'qimalarning tuzilishi, organlarda joylashuvi, ayrim o'simliklarda o'ziga xos bezlar uchrashi va ularda to'planadigan moddalar haqida tushuncha berish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, blits o'yin, vertushka usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4.

Ildiz, poya va barglarning ichki tuzilishi.

O'tli o'simliklar poyasidagi to'qimalarning joylanishi, ularning vazifasi, bir va ikki pallali o'simlik poyalarining ichki tuzilishidagi farqlarni o'rganish. Bargning ichki tuzilishidagi to'qimalar, ularning vazifasi, assimilyatsion to'qimalarning joylanishiga qarab barg guruhlariga bo'linishini o'rganish. Ildizning birlamchi tuzilishi, ildiz zonolari, ikkilamchi ildizning tuzilishi. kambiyning hosil bo'lishi, ildizmevalarning ichki tuzilishini o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, blits o'yin, vertushka usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4.

Ildiz, poya va barg morfologiyasi. O'simlikning vegetativ organlari - ildiz, poya va barglarning tuzilishi, xilma-xilligi, vazifalari, shakl o'zgarishini o'rganish. Vegetativ organlarning biologik va xo'jalikdagi ahamiyatini o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, blits o'yin, vertushka usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A3; A4; Q1; Q2; Q4.

Tuban sporali o'simliklar: suv o'tlari, zamburug'lar, lishayniklar Zamburug va lishayniklarning tuzilishi, xilma-xilligi, oziqlanishilinishi, klassifikatsiyasi va ahamiyatini o'rganish.

Tuban sporali o'simliklarning o'ziga xos xarakterli belgilari, tarqalishi. Suv o'tlarning tuzilishi, klassifikatsiyasi, yashash sharoiti, ko'payishi, rivojlanishi va ahamiyati.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, blits-o'yin, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3; Q5; Q6; Q7; Q 8.

Yuqori sporali o'simliklar: moxsimonlar, plaunlar va qirqquloqsimonlar. Yuqori sporali o'simliklar xilma-xilligi, yashash sharoiti, ularning ko'payishidagi nasl gallasini va biologik xususiyatlarini o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, blits-o'yin, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3; Q5; Q6; Q7; Q 8.

Ochiq va yopiq urug'li o'simliklar. Gul tuzilishi, gul formulasi va diagrammasi. Ochiq urug'li o'simliklarning o'ziga hos o'ziga xos xarakterli belgilari, klassifikatsiyasi, tarqalishi. Evolyutsion taraqqiyot davrida gulning hosil bo'lishi, gulning tuzilishi, formulasi, diagrammasi, gul qismlarining gul o'rniga joylanish xillari, changchi urug'chining tuzilishi, changlanish xillari va urug'lanish jarayonlari haqida ma'lumot oladilar.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, blits-o'yin, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

To'p gullar. Meva, uning xillari. Urug' tuzilishi. To'pgul va ularning xillari. Oddiy to'pgullar, murakkab to'pgullar, shoxlanishiga qarab, monopodial va simpodial to'pgullar, tabiatda uchrashi, biologik va tibbiyotdagi ahamiyatini o'rganish. Meva, uning tuzilishi, mevaning paydo bo'lishiga qarab turlarga quruq va ho'l mevalarga bo'linishi, urug'ning tuzilishi, , urug' qismlari, unib chiqishi uchun kerak bo'ladigan sharoitlarni o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, blits-o'yin, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

Ikki pallali o'simliklar. Magnoliyadoshlar, ayiqtovondoshlar, ko'knorguldoshlar oilalari

Karamguldoshlar, gulhayridoshlar va atirguldoshlar oilalari. Magnoliyadoshlar , ayiqtovondoshlar, ko'knorguldoshlar, karamguldoshlar, gulxayridoshlar va atirguldoshlar oilalarining umumiy xarakterli belgilari, o'simliklarning hayotiy formalari, tarqalish areali, oila vakillari, tibbiyotda va ho'jalikdagi ahamiyatini o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, blits-o'yin, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

Dukkakdoshlar tartibi. Dukkakdoshlar oilasining umumiy xarakterli belgilari, o'simliklarning hayotiy formalari, tarqalishi, vakillari, tibbiyotdagi va xo'jalikdagi ahamiyati.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

Selderguldoshlar, yasnotkaguldoshlar va ituzumdoshlar oilalari. Selderguldoshlar, ituzumdoshlar va yasnotkaguldoshlar oilasining umumiy xarakterli belgilari, o'simliklarning hayotiy formalari, tarqalishi, vakillari, tibbiyotdagi va xo'jalikdagi ahamiyati.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

Astragullilar oilasi. Astraguldoshlar oilasining umumiy xarakterli belgilari, o'simliklarning hayotiy formalari, tarqalishi, vakillari, tibbiyotdagi va xo'jalikdagi ahamiyati.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

Bir pallalilar sinfi: Liliyagullilar tartibi (piyozlar, lolalar, marvaridgullilar avlodlari) Liliyaguldoshlar oilasining umumiy xarakterli belgilari, o'simliklarning hayotiy formalari, tarqalishi, vakillari, tibbiyotdagi va xo'jalikdagi ahamiyati.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

Qo'ng'irboshlilar tartibi (g'alladoshlar oilasi: makkajo'gori, bug'doy avlodlari).

G'alladoshlar oilasining umumiy xarakterli belgilari, o'simliklarning hayotiy formalari, tarqalishi, vakillari, tibbiyotdagi va xo'jalikdagi ahamiyati.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

Mustaqil ish: gerbariydan foydalangan holda o'simliklar oilalarini aniqlash.

Ma'ruza va amaliy mashg'ulot darslarida olgan bilimlarini mustaxkamlash maqsadida o'simliklar morfologiyasini, anatomiyasini va sistematika fanini bir-biriga bog'liqligi bilan tanishish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

O'simliklar ekologiyasi va geografiyasi. O'simliklar ekologiyasi, ekologik faktorlar, o'simliklarning xayotiy formalari, o'simliklar qoplami va ularning xilma-xilligi, flora, o'simliklar areali, o'simlik qoplaminig xillarini o'rganish.

Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari: *aqliy hujum, test, munozora, , vertushka usuli, bumerang usuli, guruhli fikrlash.*

Adabiyotlar: A1; A2; A4; Q1; Q2; Q3;Q5; Q6; Q7;Q 8.

№	Laboratoriya mashg'ulotlar mavzulari	Dars soat
1.	Mikroskopning tuzilishi. hujayra tuzilishi. Plastidalar. Osmotik bosim. hujayradagi zahira oziq moddalar.	3
2.	Hujayra shirasidagi moddalar. Kristallar, hujayra po'sti.	3
3.	O'simlik to'qimalari: hosil qiluvchi, qoplovchi, mexanik, o'tkazuvchi, ajratuvchi va asosiy to'qimalar.	3
4.	Ildiz, poya va barglarning ichki tuzilishi.	3
5.	Ildiz, poya va barg morfologiyasi.	3
6.	Tuban sporali o'simliklar: suv o'tlari, zamburug'lar, lishayniklar.	3
7.	Yuqori sporali o'simliklar: moxsimonlar, plaunlar va qirqquloqsimonlar.	3
8.	Ochiq va yopiq urug'li o'simliklar. Gul tuzilishi, gul formulasi va diagrammasi.	3
9.	To'pgullar. Meva, uning xillari. Urug' tuzilishi.	3
10.	Ikki pallali o'simliklar. Magnoliyadoshlar, ayiqtovondoshlar, ko'knorguldoshlar oilalari.	3
11.	Karamguldoshlar, gulxayridoshlar va atirguldoshlar oilalari.	3
12.	Dukkakdoshlar oilasi. Oraliq nazorat.	3
13.	Selderguldoshlar, yasnotkaguldoshlar va ituzumdoshlar oilalari.	3
14.	Astraguldoshlar oilasi.	3
15.	Bir pallalilar sinfi: liliyagullilar tartibi (piyozdoshlar, loladoshlar oilasi: shirachlar, marvaridgullilar avlodlari)	3
16.	Qo'ng'irboshlilar tartibi (g'alladoshlar oilasi: makkajo'gori, bug'doy avlodlari)	3

17.	Gerbarydan foydalangan holda o'simliklar oilalarini aniqlash.	3
18.	O'simliklar ekologiyasi va geografiyasi.	3
	jami	54

Mustaqil ta'limni tashkil etishning shakli va mazmuni

Talabaning mustaqil ishi o'rganilayotgan mavzu yuzasidan kengaytirilgan ma'lumotlar yig'ish. Buning uchun axborot texnologiyalarining imkoniyatlaridan keng foydalanish, olingan ma'lumotlarni mustaqil ravishda ishlab chiqish, uning turlari va shakllari referat, slayd, tahlil natijalarining jadvallari, mavzular bo'yicha informatsion vositalardan olingan adabiyotlar ro'yxati, me'yoriy texnik hujjatlarning nusxalari ko'rinishida bo'lishi mumkin. Mustaqil ishga mo'ljallangan mavzular va topshiriqlar talabaning mustaqil ishini tashkil etish bo'yicha kafedrada ishlab chiqilgan va muntazam yangilanib boradigan uslubiy qo'llanmalarda keng yoritilgan.

Talabalar mustaqil ishi uchun botanika fanidan tasdiqlangan namunaviy dasturga kiritilgan mavzular bo'yicha har bir talabaga semestrda alohida topshiriq beriladi. Topshiriq laboratoriya mashg'ulotini olib boradigan o'qituvchilar tomonidan beriladi va o'qituvchi jurnalida belgilanadi. TMI ballari JN o'z ichiga olgan. TMI ni topshirmagan talaba YAB kiritilmaydi.

Talabalar mustaqil ish mavzusi sanoat farmatsiya yo'nalishida 49 soat rejalashtirilgan.

Talabaning mustaqil ishi kafedra arxivida 1 yil mobaynida saqlanadi.

DASTURNING INFORMATSION-USLUBIY TA'MINOTI

Botanika fanini o'zlashtirishda ajratilgan soatlar uchun laboratoriya mashg'ulotlari va ma'ruza darslari ta'limning zamonaviy (xususan interfaol) usullari, pedagogik va axborot – kommunikatsiya (amaliy dastur paketlari, prezentatsion, elektron – didaktik) texnologiyalarini qo'llash orqali olib boriladi. Ma'ruza va laboratoriya mashg'ulotlari o'tkazish vaqtida pedagogik va axborot texnologiyalarining usullaridan “ aqliy xujum”, “ bumerang” , “ vertushka”, “ blits o'yin”, “klaster”, kichik guruxlar musobaqalari va taqdimotlardan keng foydalaniladi.

Botanika fanidan talabalar bilimni reyting tizimi asosida baholash mezonlari

1. Talabalar fan bo'yicha o'zlashtirishlarini baholash semester davomida muntazam ravishda olib boriladi va quyidagi turlar orqali amalga oshiriladi:

joriy nazorat (JN)

mashg'ulotlardan bo'sh vaqtda talabalar mustaqil ishini baholash *

oraliq nazorat (ON)

yakuniy nazorat (YaN)

2. *Botanika* fanidan talabalar semestr davomidagi o'zlashtirish ko'rsatkichi 100 ballik tizimda baholanadi.

Ushbu 100 ball nazorat turlari bo'yicha quyidagicha taqsimlanadi:

- joriy nazorat – 60 ball

- oraliq nazorat – 10 ball

- yakuniy nazorat – 30 ball

2.1. 3- semestr davomida sanoat farmatsiya yo'nalishlarida «Botanika» fani bo'yicha ma'ruza va laboratoriya mashg'ulotlari olib boriladi. Bunda umumiy rejalashtirilgan 121 soat. Sanoat farmatsiya yo'nalishlarida: ma'ruza - 18 soat, laboratoriya mashg'ulotlari - 54 soat, mustaqil ish - 49 soat

3. Talabalar bilimni baholashda quyidagi namunaviy mezonlar inobatga olinadi:

Talaba darsga kelib, unga mutloq tayyorlanmaganida va muhokamada ishtirok etmaganida 2,0 ball qo'yiladi.

4. Kafedra tomonidan botanika fanidan baholash turlarining (JB, TMI, OB va YaB) har biri bo'yicha talabalar bilim darajasini baholashning aniq mezonlari ishlab chiqildi va Markaziy Uslubiy Kengashda tasdiqlandi.

5. Har bir baholash turlari (JB, TMI, OB va YaB) bo'yicha baxolar 100% (ball) hisobidan aniq mezonlar asosida qo'yib boriladi, o'rtacha qiymati hisoblanib, tegishli koeffitsientga ko'paytiriladi va ballari aniqlanadi (Ushbu nizomning talabani botanika bo'yicha attestatsiyadan o'tkazish tartibi bandiga qarang).

6. Talabaning botanika bo'yicha to'plagan umumiy bali har bir baholash turlarida to'plangan ballar yig'indisiga teng bo'ladi.

Izoh: */ Talabaning mustaqil ishi joriy nazorat jarayonida tegishli topshiriqlarni bajarishi va unga ajratilgan ballardan kelib chiqqan holda baholanadi. Bajarilgan mustaqil ishlar bir yil kafedrada saqlanadi/

JORIY NAZORAT

Baholashda talabaning bilim darajasi, laboratoriya mashg'ulot materiallarini o'zlashtirishi, nazariy material muxokamasida va ta'limning interaktiv uslublarida qatnashishning faollik darajasi, shuningdek, amaliy bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish darajasi (ya'ni nazariy, analitik va amaliy yondashuvlar) xisobga olinadi.

JB botanika fanidan 10-15 minutlik darsga tayyorgarligini bilish uchun og'zaki nazorat ishi o'tkaziladi, kundalik daftarga uy vazifalarini yozganligi tekshirilad, og'zaki javobini e'tiborga olib, auditoriyada bajargan ishi va uning kundalikdagi bayonnomasi natijalarini qo'shib kundalik daftari so'nggi jadvalga to'plagan reyting bali qo'yiladi. Har bir mashg'ulotda barcha talabalar baholanishi shart.

Barcha yo'nalishlarda o'qitiladigan fan 3-4 semestr uchun joriy baholash (mustaqil ish bilan birgalikda) 60 ball bilan baholanib talabaning mavzu bo'yicha tayyorgarligi, laboratoriya ishini bajarish, olungan natijalarni hisoblash, umumlashtirish va rasmiylashtirish ballaridan iborat bo'ladi.

Botanika fandan 3 semestrda 18 ta laboratoriya mashg'uloti rejalashtirilgan bo'lib, ulardan 12 tasi (2,3,4,5,7,8,9,11,13,14,16,17,) baholanadi.

Har bir baholanadigan laboratoriya mashg'uloti uchun ajratilgan maxsimal ball 5,0 ballni tashkil etadi. Ushbu 5,0 ball quyidagicha taqsimlanadi:

Baho	Auditoriyada bajariladigan tajriba va mustaqil ish uchun	Interaktiv texnologiyalardan foydalangan holda og'zaki nazorat	Jami
A'lo	3,0	2,0	5
Yaxshi	2,0	2,0	4
O'rta	2,0	1,0	3
Qon-siz	1,0 dan kam	1,0 dan kam	2

Xar bir semestrda talabalar bilimini baxolash jarayonida quyidagilarga e'tibor berish tavsiya etiladi.

№	Talabaning bilim darajasi	Ballarda
1.	Xulosa va qaror qabul qilish; Ijodiy fikrlay olish; Mustaqil mushoxada yuritish; Amalda qo'llay olish; Moxiyatini tushunish; Bilish, aytib berish; Tasavvurga ega bo'lish.	A'lo (51-60)
2.	Mustaqil mushoxada yuritish; Amalda qo'llay olish Moxiyatini tushunish; Bilish, aytib berish; Tasavvurga ega bo'lish.	Yaxshi (42-50)

3.	Moxiyatini tushunish; Bilish, aytib berish; Tasavvurga ega bo'lish.	O'rta (33-41)
4.	Aniq tasavvurga ega emaslik; Bilmaslik.	Qon-siz (32 dan kam)

Xar bir mavzu uchun baxolash mezonlari kafedrada yaratilgan o`quv – uslubiy majmuada keltirilgan (ilova qilinadi).

ORALIQ NAZORAT

Botanika fandan ON semestr davomida bir marotaba o'tkaziladi. ON ga o'quv mashg'ulotlaridan akademik qarzi bo'lmagan talabalar quyiladi. Oraliq nazorat kafedra majlisi qarori bilan yozma ish, og'zaki suhbat shakllarida yoki ularning kombinatsiyalarida o'tkazilishi mumkin. Har bitta O.N. uchun 5,0 baldan ajratiladi.

Oraliq nazorat bo'yicha to'plangan ballar

№	Baho	Ballarda
1.	A'lo	9-10
2.	Yaxshi	7-8
3.	O'rta	5-6
4.	Qon-siz	4,0

YAKUNIY NAZORAT

Botanika fandan YaN da talabaning bilim, ko`nikma va malakalari fanning umumiy mazmuni doirasida baxolanadi. YaN fan bo'yicha o`quv mashg'ulotlari tugaganidan so`ng har semestrda o`tkaziladi.

JN va ON ga ajratilgan umumiy ballarning xar biridan saralash balini to'plagan talabaga YaN da ishtirok etish xuquqi beriladi.

Botanika fani bo'yicha yakuniy nazorat og'zaki sinov shaklida o'tkaziladi.

№	O'zlashtirish	
	Ballarda	Baho
1.	26,0-30,0	A'lo
2.	21,0-25,0	Yaxshi
3.	17,0-20,0	O'rta
4.	16,0 dan kam	Qon-siz

TALABA BILIMINI BAHOLASH TARTIBI

1. Saralash bali 55,0 ballni tashkil qiladi.
2. JB, OB va YaB turlarida fanni o`zlashtira olmagan (55% dan kam ball to'plagan) yoki uzrli sabab bilan baholash turlarida ishtirok eta olmagan talabalarga quyidagi tartibda qayta baholashdan o`tishga ruxsat beriladi.
3. akademik qarzdor talabalrga semestr tugaganidan keyin dekan ruxsatnomasi asosida qayta o`zlashtirishi uchun – 2 hafta muddat beriladi. Akademik qarzdordan qayta topshirishni qabul qilish uchun kafedra mudiri tomonidan o`qituvchi tayinlanadi. Shu muddat davomida o`zlashtira olmagan talaba belgilangan tartibda rektorning buyrug`i bilan talabalar safidan chetlashtiriladi.

II.BOTANIKA FANINING

SILLABUSI

**«BOTANIKA»
fanining
2016/2017 o'quv yili uchun mo'ljallangan
SILLABUSI**

Fanning qisqacha tavsifi			
OTMning nomi va joylashgan manzili:	Toshkent farmasevtika instituti	Oybek ko'chasi, 45	
Kafedra:	Farmakognoziya	"farmatsiya" fakulteti tarkibida	
Ta'lim sohasi va yo'nalishi:	510000 – Sog'liqni saqlash	botanika	
Fanni (kursni) olib boradigan o'qituvchi to'g'risida ma'lumot:	Assistent Atamuratova Nafisa Tillaevna Dotsent Yulchieva Mavluda Turg'unboevna	e - mail:	nafis_1980 @ mail.ru
Dars vaqti va joyi:	1-bino 77-78 auditoriya	Kursning davomiyligi:	02.09.2014-20.06.2015
Individual grafik asosida ishlash vaqti:	dushanba, payshanba va shanba kunlari 14.00 dan 18.00 gacha		
Fanga ajratilgan soatlar	Auditoriya soatlari		Mustaqil ta'lim:
	Ma'ruza:	36	Amaliyot 108
Fanning boshqa fanlar bilan bog'liqligi (prerekvizitlari):	"O'simliklar anatomiyasi va morfologiyasi", "O'simliklar sistematikasi", "Ekologiya", "Anorganika va organik kimyo", "Lotin tili"		
Fanning mazmuni			
Fanning dolzarbligi va qisqacha mazmuni:	<p><u>Fanni o'qitishdan maqsad</u> – Farmasevtika institutida botanika fanini o'qitilishining asosiy maqsadi malakali mutaxassislar tayyorlash, tabiatga, o'simliklar dunyosiga, ayniqsa dorivor o'simliklarga nisbatan mehr - muhabbat uyg'otish, tabiiy boyligimizdan to'g'ri va oqilona foydalanish yo'llarini o'rgatadi. Maqsadga erishish uchun botanika fanidan mashg'ulotlar o'ziga xos uslub bilan o'tkaziladi. Chunki farmasevtlar, dorivor moddalarning ko'pchiligi o'simliklar maxsul ekanligini hisobga olib, ularni makro va mikroskopik tuzilishini tekshirib aniqlaydi. Natijada anatomiya, morfologiya, sistematikadan bilimga ega bo'lib qolmay, amalda ish bajara olishi zarur. Bu amaliy tajriba turli o'simliklarni qismlari to'g'risida aniq tasavvur hosil qilishga, makroskopik va mikroskopik tomondan aniqlashda farmakognoziya faniga asos bo'ladi. Laboratoriya mashg'ulotining «Anatomiya» bo'limida tayyor kesiklardan foydalanish bilan birga, vaqtincha kesiklar tayyorlash ko'zda tutilgan.</p> <p><u>Fanning vazifasi</u> - Botanika fani farmatsevtika institutida umumiy teoretik kurs bo'lib, talabalarni ixtisos bo'yicha farmakognoziya, o'simlik fiziologiyasi, bioximiyasi, mikrobiologiyasi, dorivor o'simliklarni o'stirish biologiyasi kabi kurslarni o'tishga tayyorlaydi. Shu bilan birga talabalar botanikaning muhim bo'limlari bilan tanishib, bir vaqtning o'zida o'simliklar dunyosining hayot faoliyatini o'rganadilar, bu esa farmasevtlar uchun o'ta muhim bo'lgan dorivor o'simliklar va o'simlik homashyolari bilan ishlashga yordam beradi. Dorivor o'simliklar florasidan foydalanish, tabiatini va o'simliklar dunyosining resurslarini himoya qilgan va uni tushungan holda olib borilishi kerak.</p>		
Talabalar uchun talablar	<ul style="list-style-type: none"> - o'qituvchiga va guruhdoshlarga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lish; - universitet ichki tartib - intizom qoidalariga rioya qilish; - uyali telefonni dars davomida o'chirish; - berilgan uy vazifasi va mustaqil ish topshiriqlarini o'z vaqtida va sifatli bajarish; - ko'chirmachilik (plagiat) qat'iyan man etiladi; - darslarga qatnashish majburiy hisoblanadi, dars qoldirilgan holatda qoldirilgan darslar qayta o'zlashtirilishi shart; 		

	<ul style="list-style-type: none"> - darslarga oldindan tayyorlanib kelish va faol ishtirok etish; - talaba o'qituvchidan so'ng, dars xonasiga - mashg'ulotga kiritilmaydi; - talaba reyting ballidan norozi bo'lsa e'lon qilingan vaqtdan boshlab 1 kun mobaynida apellyatsiya komissiyasiga murojat qilishi mumkin
Elektron pochta orqali munosabatlar tartibi	Professor-o'qituvchi va talaba o'rtasidagi aloqa elektron pochta orqali ham amalga oshirilishi mumkin, telefon orqali baho masalasi muhokama qilinmaydi, baholash faqatgina universitet hududida, ajratilgan xonalarda va dars davomida amalga oshiriladi. Elektron pochta ochish vaqti soat 15.00 dan 20.00 gacha

Fan mavzulari va unga ajratilgan saotlar taqsimoti:

No	Mavzular	Ma'ruza	Laboratoriya mashg'uloti	Mustaqil ish
1.	Botanika fani bo'limlari va uni farmatsiyadagi ahamiyati. Hujayra. O'simlik hujayrasi. Osmotik bosim. Sitoplazma. Plastidlar	2	3	5
2.	Hujayradagi oziqli moddalar, kristallar. O'simlik to'qimalari. Hosil qiluvchi va qoplovchi to'qimalar	2	3	5
3.	Mexanik, o'tkazuvchi, ajratuvchi va asosiy to'qimalar.	2	3	5
4.	Ildiz morfologiyasi va anatomik tuzilishi.	2	3	5
5.	Poya morfologiyasi. O't o'simliklar poyasining anatomik tuzilishi. Daraxtsimon o'simliklar poyasining anatomik tuzilishi.	2	3	5
6.	Barg morfologiyasi. Bargning anatomik tuzilishi.	2	3	5
7.	Bargdagi fiziologik jarayonlar. O'simliklarning ko'payishi, o'sishi va rivojlanishi	2	3	5
8.	O'simliklar sistematikasi. Tuban o'simliklarga xarakteristika. Bakteriyalar tuzilishi va ko'payishi	2	3	7
9.	Suv o'tlari, zamburug'lar va lishayniklar.	2	3	7
10.	Yuksak sporal o'simliklarga tasnif. Moxsimonlar. Qirqquloqsimonlilar	2	3	5
11.	Qirqquloqsimonlilar. Yuksak o'simliklar evolyutsiyasi. Ochiq urug'lilar.	2	3	5
12.	Yopiq urug'lilar o'simliklar evolyutsiyasida eng yuksak taraqqiy etganidir. Reproduktiv organlarning paydo bo'lishi. Gul va to'pgullar.	2	3	5
13.	Changlanish va otalanish. Meva, to'pmeva va urug' tuzilishi.	2	3	5
14.	Yopiq urug'li o'simliklar tasnifi. Bir va ikki pallali o'simliklar. Magnoliyadoshlar, ayiqtovondoshlar, zirkdoshlar, ko'knordoshlar.	2	3	5
15.	Grechixadoshlar, choydoshlar, dalachoydoshlar, qovoqdoshlar, karamdoshlar, gulhayridoshlar oilalari.	2	3	5
16.	Atirguldoshlar, selderguldoshlar, dukkadoshlar, ituzumdoshlar, yasnotkaguldoshlar va astraguldoshlar oilalari.	2	3	5
17.	Mirtadoshlar, jo'kadoshlar oilasi. Bir pallalilar sinfi. Liliyagullilar va qo'ng'irboshlilar tartibi.	2	3	7
18.	Ekologiya, fitotsenologiya va o'simliklar geografiyasi.	2	3	7

Jami	36	108	98
------	----	-----	----

Talabalar bilimni baholash tizimi:

t/r	Nazorat turidagi topshiriqlarning nomlanishi	Maksimal yig'ish mumkin bo'lgan ball	JN va ON ballar taqsimoti	
I. Joriy nazoratdagi ballar taqsimoti		60ball	60	10
<i>Ma'ruza va amaliy mashg'ulotlarda</i>		Maksimal ball		
1.	Baholashda talabaning bilim darajasi, laboratoriya mashg'ulot materiallarini o'zlashtirishi, nazariy material muxokamasida va ta'limning interaktiv uslublarida qatnashishning faollik darajasi, shuningdek, amaliy bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish darajasi (ya'ni nazariy, analitik va amaliy yondashuvlar) xisobga olinadi. JB botanika fanidan 10-15 minutlik darsga tayyorgarligini bilish uchun og'zaki nazorat ishi o'tkaziladi, kundalik daftarga uy vazifalarini yozganligi tekshirilad, og'zaki javobini e'tiborga olib, auditoriyada bajargan ishi va uning kundalikdagi bayonnomasi natijalarini qo'shib kundalik daftari so'nggi jadvalga to'plagan reyting bali qo'yiladi. Har bir mashg'ulotda barcha talabalar baholanishi shart.	5		
2.	Talabaning mustaqil ishi joriy nazorat jarayonida tegishli topshiriqlarni bajarishi va unga ajratilgan ballardan kelib chiqqan holda baholanadi.			
II. Oraliq nazorat		10ball		
1.	Botanika fandan ON semestr davomida bir marotaba o'tkaziladi. ON ga o'quv mashg'ulotlaridan akademik qarzi bo'lmagan talabalar quyiladi. Oraliq nazorat kafedra majlisi qarori bilan yozma ish, og'zaki suhbat shakllarida yoki ularning kombinatsiyalarida o'tkazilishi mumkin.	10	Semestrning 12-haftasi	
III. Yakuniy nazorat		30 ball	Semestrning oxirgi ikki haftasida	
<p>Botanika fandan YaN da talabaning bilim, ko'nikma va malakalari fanning umumiy mazmuni doirasida baxolanadi. YaN fan bo'yicha o'quv mashg'ulotlari tugaganidan so'ng har semestrda o'tkaziladi.</p> <p>JN va ON ga ajratilgan umumiy ballarning xar biridan saralash balini to'plagan talabaga YaN da ishtirok etish xuquqi beriladi.</p> <p>Botanika fani bo'yicha yakuniy nazorat test sinov shaklida o'tkaziladi.</p>				
Jami:		100 ball		

Asosiy adabiyotlar:

1. Яковлев Г.П., Челомбитко В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 1990. - 230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. – T.: O'zFan, 2006. – 434 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A., Mustafaeva M.S., Yulchieva M.T. Botanika. – T.: «TAFAKUR BO'STONI» MChJ bosmaxonasi, 2012. – 202 b.
4. Mahkamova X.M. Botanika. – T.: «O'qituvchi» nashriyoti, 1995. – 271 b.

Qo'shimcha adabiyotlar:

1. Hamidov A., Nabiev M.M. «O'zbekiston o'simliklarini aniqlagichi». -T.: 1987. – 235 b.
2. Василев А.Е. «Морфология, анатомия растений». - М.: изд-во “Высшая школа”, 1988. - 435 с.
3. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O'.A. va boshqalar. Dorivor

- o‘simliklarning lotincha-o‘zbekcha-ruscha-arabcha va forsha-tojikcha lug‘ati. -T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
4. Berezovskaya T.P., Dmitruk S.Ye., Grishina Ye.I., Belousov M.V. Основы фармацевтической ботаники.- Tomsk: Pechatnaya manifaktura, 2004. - 294 s.
 5. Xolmatov X.X., Ahmedov O‘.A. Farmakognoziya. 1-2 qism. - T.: «Ibn Sino» nashriyoti, 2007. - 806 b.
 6. Botanika fanidan amaliy mashg‘ulotlar uchun o‘quv-uslubiy ko‘rsatmalar.- T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2006, 2007, 2012.
 7. Mustafaev S.M., Ahmedov O‘.A., Samatova Sh.S. O‘simliklar sistematikasidan amaliy mashg‘ulotlar. - T.: “YuNAKS-PRINT” MChJ bosmaxonasi, 2007. - 127 b.
 8. Ahmedov O‘.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elektron darslik. - T.: 2008
 9. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –15 r.
 10. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu–York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
 11. Рейвн П., Еверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. Т. 1-2. – М.: «Мир», 1990.

II. MODULNI O‘QITISHDA FOYDALANILADIGAN INTERFAOL TA‘LIM METODLARI.


“Insert ” metodi

Insert lokal darajadagi pedagogik texnologiya bo‘lib, talaba tomonidan o‘quv materialidagi asosiy g‘oya va faktik materiallarni aniqlashiga zamin yaratish maqsadida qo‘llaniladi. Insert yordamida ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun ularga talabalarga o‘rganiladigan o‘quv materiallari va maxsus jadval tarqatiladi. Talaba har bir abzatsni o‘rganib chiqib, maxsus jadvalga muayyan simvollar yordamida belgilash tavsiya etiladi. Agar abzatsda berilgan ma‘lumot shu kungacha o‘zlashtirilgan bo‘lsa, u holda «Bilaman»-V, agar ma‘lumot tushunarli va yangi bo‘lsa, u holda «Maqullayman» - +, agar ma‘lumotlar talabaga o‘zlashtirilgan bilimiga mos kelmasa, u holda «O‘rganish lozim» - -, talaba o‘zlashtirish materiallari qiyin bo‘lsa «Tushunmadim» -? Belgisini qo‘yadi.

Abzatslar	Bilaman	Maqullayman	O‘rganish lozim	Tushunmadim
1.O‘simliklar dunyosi xilma xil bo‘lib, tarkibida xlorofill pigmenti bo‘lganligi sababli avtotrof organizmlar hisoblanadi.	V			
2. Avtotrof organizmlarga so‘v o‘tlar, yuksak sporeli o‘simliklar, ochiq urug‘lilar,yopiq urug‘li o‘simliklarni kiritishimiz mumkin.		+		
3. Ba‘zi organizmlar tarkibida plastidalar uchraymaydi ular geteratroflar hisoblanadi.			-	
Geteratoroflar saprofit va parazit xisoblanadi.				?

Venn diagrammasi

Venn diagrammasi talabalarning avval o'zlashtirilgan bilimlarini umumlashtirib, keyingi tushunchalar bilan bog'lash, tahlil qilish, taqqoslash, o'xshashlik va farqlarni aniqlashga yordam beradi. Masalan gulli o'simliklarning oilalarini taqqoslashda qo'yidagi Venn diagrammasidan foydalanishimiz mumkin.



Keys stadi

Keys stadi ya'ni - muammoli ta'lim texnologiyasi o'qitishda muammoli vaziyatlarni vujudga keltirishga asoslanib, uni maqsadga muvofiq holda, darsning turli bosqichlarida, jumladan uy vazifani so'rash, yangi mavzuni o'rganish, o'rganilgan mavzuni umumlashtirish va yakunlashda tavsiya etiladi.

Lishayniklarni dastlab olimlar bitta organizm deb qabul qilingan, 1867 yili rus biologi A.S.Faminn va O.V.Baronetskiylar lishayniklar tanasidagi yashil suv o'ti ksanoriya bo'lib, u mustaqil oddiy bo'linish yo'li bilan ko'payishi, sporalar orqali tarqalishini aniqladilar. Demak ksanoriya mustaqil hayot kechiruvchi so'v uti ekan, lishayniklar qanday organizm, ularni qaysi bo'limga kiritishimiz mumkin.



Atamalar zanjiri

Atamalar zanjiri- bu atamalar va ularning ta'riflari bo'lib, ulardan talabalar o'tgan mavzuni yakunlash yoki yangi mavzuni mustaxkamlashga yordam beradi.

1	geliotropizm	a	erning tortishish kuchi, ya'ni o'simlik organlarning erga nisbatan yo'nalishi xususiyati
2	geotropizm	b	o'simlik organlarning quyoshga nisbatan yo'nalish xususiyati
3	gipokotil	s	poyaning urug'palla bargi bilan birinchi chin bargi orasidagi qismi
4	Epikotil	d	poyaning ildiz bo'ynidan urug'palla bargchasigacha bo'lgan qismi
5	metamorfoz	e	bitta o'simlikda har xil barglarning uchrashi
6	geterofiliya	j	o'simlikning tarixiy taraqqiyot jarayonida muayyan vazifani bajarishga moslasha borishi natijasida organlarning o'zgarishi

Zanjir javoblari: 1-b,2-a, 3-d,4-s,5-j,6-e

Blits-o'yin

Bu metodni o'tkazilish tartibi. Har bir guruh talabalariga yuqorida ko'rsatilgan vazifa tarqatiladi. Talabalar to'g'ri deb hisoblagan raqamni "yakka baxo" qatoriga yozib chiqishadi. O'qituvchi to'g'ri javob e'lon qilgandan keyin, har bir guruh o'z xatolarini "gurux xatosi" qatoriga yozadi. Natijada to'g'ri, noto'g'ri javoblar solishtirilib, gurux baxosi hisoblab chiqiladi.

Guruh baxosi	Guruh xatosi	To'g'ri javob	Yakka xato	Yakka baxo	Gurux ichidan chetlatish	Hujayraning turgor, plazmoliz va deplazmoliz holati
						<p>1. Filtr qogoz qoplag'ich oyna ostidagi suvning bir qismini shimib olgach uning o'rniga eritma kiradi va hujayralarda asta sekin plazmoliz xodisasi yuz beradi. Bunda xlorofill donachalari bir-biriga yopishib hujayraning o'rtasiga to'planadi.</p> <p>2. Valisneriya hujayrasining turgor holati tekshiriladi.</p>

						<p>3. Preparatni qo'zg'atmasdan turib qoplag'ich oyna ostidagi suvni to'yingan osh tuzi bilan almashtiriladi. Buning uchun qoplagich oynaga taqab fil'tr qog'oz tekkaziladi.</p> <p>4. Valisneriya bargidan ozgina olib buyum oynasidagi suv tomchisiga qo'yib yopqich oyna yopiladi.</p> <p>5. Preparatdan osh tuzi eritmasini suvga almash-tirilsa deplazmoliz ho-disasi sodir bo'ladi.</p> <p>6. Turgor holatida xlorofill donachasi hujayraning po'stiga yaqin joyda harakat qiladi. Bu bilan hujayra sitoplazmasining harakati turgor holat va xlorofill donachasi kuzatiladi.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Bumerang treningi

Talabalar kichik guruhlariga bo'linadi va vazifa yozilgan material tarqatiladi. har 1 ta guruh o'z fikrini bayon qiladi va guruhlar orasida savol-javob ketadi.

1 - guruhga beriladigan vazifa

1. Hujayradagi osmotik bosim holati
2. Hujayraning turgor holati
3. Hujayraning plazmoliz va deplazmoliz holati

2- guruhga beriladigan vazifa

1. Plastidalar qanday organoidlar va ularning shakllari
2. Plastidalar rangiga qarab necha xil bo'ladi
3. Plastidalarining uchraydigan joylari

3- guruhga beriladigan vazifa

1. Xloroplast - uchraydigan organlari, vazifasi, biologik ahamiyati.
2. Xromoplast - uchraydigan organlari, vazifasi va biologik ahamiyati
3. Leykoplast - uchraydigan organlari, vazifasi va biologik ahamiyati

Vertushka metodi

Bu treningda guruhlarga material tarqatiladi va har bir guruh yakka holda alohida to'g'ri javobni belgilaydi. Keyin bu materiallar guruhlarga aralashtirib beriladi, yana belgilanadi. Guruhlar soniga qarab aylangandan keyin o'qituvchi va talabalar bilan umumiy to'g'ri javob belgilanadi.

Hosil qiluvchi to'qima xillari va uchraydigan joyi	Uchki meristema	Yon meristema	Interkolyar meristema	Jaroxat meristema	Birlamchi meristema	Ikkilamchi meristema
<p>1.Yosh barglarda poya bo'lib,poyani bo'g'im oralig'i uzun bo'ladi.</p> <p>2.Ildiz poyada silin dirsimon qavat hosil qilib o'simlik eniga o'sadi va qalinlashadi.</p> <p>3.O'simlikning biror yeri shikastlansa jaro-hatlangan joyni tiklaydi.</p> <p>4.Poya va ildizning bo'yiga o'sishini ta'minlaydi.</p> <p>5.Prokambiy birlamchi floema va birlamchi ksilema elementlarini hosil qiladi.</p> <p>6.Kambiy ikkilamchi lub,ikkilamchi yog'ochlik hosil qiladi.</p>						

Ma'ruza – 1

Kirish, botanika fani, bo'limlari va uni farmatsiya sohasidagi ahamiyati. O'simlik hujayrasi. Sitoplazma. Plastidlar

Reja:

1. Tabiatda tirik organizmlar haqida tushuncha.
2. Botanika fani va uning bo'limlari haqida tushuncha.
3. O'simliklarda kechadigan fotosintez protsessi.
4. Botanika fanining farmatsevtikadagi ahamiyati.
5. Hujayraning kashf etilishi va Hujayra nazariyasi
6. Protoplazma (sitoplazma). Hujayradagi fermentlar, Vitaminlar.
7. O'simlik hujayrasining tuzilishi. Yadro. Hujayraning bo'linishi
8. Plastidalar klassifikatsiyasi, ahamiyati.

Tayanch iboralar: *Botanika fanining bo'limlari. O'simlik tirik organizm. Avtotrof va geterotrof tanalar. Hayotni paydo bo'lishi. hujayrasiz mayda tanalar, zamburug'lar va ularni morfofiziologik xususiyati. Simbioz nazariyasi. Autotrof va geterotrof tanalarning tabiatdagi modda almashinuvida tutgan o'rni.*

1.1. Tabiatda tirik organizmlar haqida tushuncha

Tirik organizmlar- tabiatning tarkibiy qismi bo'lib, tevarak atrof muhit bilan chambarchas bog'langan va o'zini yashashi uchun barcha zarur sharoitni shu tabiatdan oladi. Dastlabki tirik moddalar zarrachalardan hosil bo'lgan o'simlik va hayvonlar keyinchalik turli yashash sharoitiga tushib, unga moslashgan, natijada o'zgargan va tuzilishi murakkablashib borgan. Ularda yangi belgilar shakllanib borgan. SHu belgilarga ko'ra hozir o'simliklar olami hayvonot olamidanda keskin farq qiladi. Masalan: umurtqali hayvonlar bilan gulli o'simliklar va boshqalar. Biroq, hujayra nihoyatda murakkab biologik asos bo'lgani uchun dastlabki tirik moddalardan, hatto eng sodda tuzulgan bir hujayrali organizmgacha bir necha yuz millionlab yil davom etadigan uzoq evolyutsion rivojlanish protsessida hosil bo'lgan. O'simliklar butun er yuziga tarqalgan bo'lib, faqat quruqlikda emas, balki ko'l, daryo, dengiz va okeanlarda, ba'zan ancha chuqurliklarda ham o'sadi.

Planetamizda dastlabki okeanlar suvida oddiy anorganik moddalar, uglevodlar, metan va suvdan – murakkab organik birikmalar hosil bo'lgan. Akademik A.I. Oparinning fikriga ko'ra, ularni ayrimlari liqildoq tomchi – koatservantlar shakliga kirgan va keyin murakkablashib, tirik modda hosil bo'lishiga asos hisoblangan.

K. Linney 1767 yil dunyoni 3 qismga bo'ladi:

1. Noorganik jismlar – bularga jonsiz tabiat toshlar
2. Organik dunyo – o'simliklar
3. Tirik harakatlanuchi organizmlar – hayvonlar.

Botanika grek tilidan olingan bo'lib, ko'k-o't ma'nosini bildiradi. Botanika fani o'simliklarning hayotiy protseslarini, ya'ni kelib chiqishini, ko'payishini, rivojlanishi, oziqlanishi va tashqi tuzilishini o'rganadigan fandır.

1.2 Botanika fani va uning bo'limlari haqida tushuncha.

Botanika fani biologik fanning bir tarmog'i hisoblanadi.

1.O'simlik hujayrasini o'rganadigan fan **sitologiya** deyiladi.

2. O‘simlik to‘qimalarini o‘rganadigan fan **gistologiya** deyiladi.

3. O‘simliklarning tashqi tuzilishini o‘rganadigan fan **morfologiya** deyiladi. Morfologiya ham grek tilidan olingan bo‘lib, bu shaklni o‘rganadigan ilm ma’nosini bildiradi.

4. O‘simliklarning ichki tuzilishini o‘rganadigan fan **anatomyiya** deyiladi.

5. O‘simliklarning **fiziologiyasi** va **bioximiyasi**. Bu so‘zlar ham grek tilidan olingan bo‘lib fizik-tabiat, bio-hayot ma’nosini bildiradi. Bu fanlar yordamida o‘simliklarning hujayrasida bo‘ladigan protsessning, masalan: nafas olish, oziqlanish, fotosintez protsesslari va boshqalar o‘rganiladi.

6. O‘simliklar **sistematikasi**. Bu so‘z ham grek tilidan olingan bo‘lib to‘plash, yig‘ish, birlashtirish, ma’nosini bildiradi. Bu fan o‘simliklarning kelib chiqishi jihatidan bir biriga yaqinligini va shunga asosanib er yuzidagi o‘simliklarni gruppalariga bo‘lib o‘rganadigan fandır. Masalan: Tur, avlod, oila, sinflarga bo‘linadi.

7. **Genetika** fani. Bu ham grekcha so‘zdan olingan bo‘lib, ya’ni kelib chiqish ma’nosini bildiradi. Genetika nasl, irsiyat va o‘zgaruvchanlik qonunlarini o‘rganadigan fandır.

8. **Geobotanika**. Bu fan o‘simliklarning er yuzida tarqalishini o‘rgatadi.

9. **Ekologiya**. Bu o‘simliklarning sharoitga moslashishi qaysi sharoitda qanday o‘simlik o‘sishini o‘rganadigan fandır.

Botanika to‘g‘risidagi dastlabki ma’lumotlar eramizdan oldingi IV asrlarda paydo bo‘lgan. Teofrast (371-286 y.) o‘simliklar haqidagi ma’lumotlarni to‘pladi va ularning klassifikatsiyasini yaratdi.

Teofrast barcha o‘simliklarni – daraxt, buta, chala buta va o‘t o‘simlik kabi guruhlarga bo‘ladi. Botanika fanini rivojlantirishda o‘rta asrda yashagan va jahon fani taraqqiyotiga juda katta hissa qo‘shgan buyuk olim Abu Ali ibn Sinoning xizmati kattadir.

Andrea Nezalsin o‘simliklar olamini avvalo 2 bo‘limga yog‘ochli o‘simliklarga (daraxt, buta) hamda chala buta, o‘t o‘simliklarga bo‘ladi. Ularni o‘z navbatida 15 sinfga ajratdi. Sinflarga bo‘lganda guli, meva, uya va undagi urug‘larning sonini hamda murtak tuzilishini asos qilib oladi va 15- sinfga mox, qirqquloq, qirqbo‘g‘im va zamburug‘larni kiritdi.

Ingliz botanigi Djon Rey birinchi marta o‘simliklar olamini sporali (yashirin nikohli) va gulli (ochiq nikohli) o‘simliklarga bo‘lib, gullarni o‘z navbatida bir pallalilar va ikki pallalilarga ajratdi. Djon Rey o‘simliklar sistematikasiga birinchi bo‘lib tur terminini kiritdi.

Botanikani rivojlantirishda shved olimi Karl Linney o‘simliklarni ta’sir etish texnikasini aniqlashni sistematikaga **binar nomenklatura**, ya’ni o‘simliklarni ikki nom bilan atashni, mavjud o‘simliklarni ma’lum sistemaga solib, ularning sun’iy sistemasini yaratishdek buyuk ishlar qildi.

1.3 O‘simliklarda kechadigan fotosintez protsessi.

O‘simliklar hayvonlardan o‘zining yashil rang beruvchi **xlorofill** pigmenti borligi hamda fotosintez protsessi bo‘lishligi bilan farq qiladi.


Biz o‘zimiz uchun kerak bo‘lgan barcha oziq moddalarni o‘simliklardan olamiz. SHuning uchun ham biz o‘simliklarsiz yashay olmaymiz. O‘simliklarda yashil rang beruvchi xlorofill pigmenti bo‘lganligi uchun fotosintez, ya’ni assimilyatsiya protsessi bo‘lib turadi. Bu protses natijasida oddiy noorganik moddalardan organik moddalar vujudga keladi.

Fotosintez protsessi bo‘lishligi uchun xlorofill pigmenti, suv, karbonat angidrid va quyosh nurlari bo‘lishi shart. SHulardan birontasi bo‘lmasa fotosintez protsessi ham bo‘lmaydi.

O‘simliklar erdan suvni, havodan esa karbonat angidridni oladi.



O‘simliklar hujayrasida glyukoza kraxmalga aylanadi.



Biz nafas olganda kislorodni yutib karbonat angidridni chiqaramiz. O‘simliklar esa fotosintez protsessida kislorodni chiqarib turadi, ya’ni o‘simliklar bizni kislorod bilan ta’minlab turadi.

Biz nafas olganda chiqargan karbonat angidriddan o‘simliklar esa fotosintez protsessida foydalanadi. Havoda karbonat angidridning miqdori 0.03% dan oshmaydi.

O‘simliklar bir tonna karbonat angidridni olish uchun 5 mln. kub metr havoni tozalaydi. O‘simliklar fotosintez protsessida karbonat angidridni oladi. Nafas olishda esa odamlarga o‘xshab kislorodni yutadi. O‘simliklar odamlarga o‘xshash kechasiyu- kunduzi kislorod bilan nafas oladi.

YAshil rangdagi o‘simliklar erdan olgan oziq moddasidan tashqari fotosintez protsessi natijasida o‘ziga oziq moddalar tayyorlaydi. O‘ziga-o‘zi oziq modda tayyorlab ovqatlanishi - **avtotrof** oziqlanish deyiladi. Avtoc – o‘ziga o‘zi ma’nosini bildiradi. Ba’zi bir o‘simliklarda ildiz bo‘lmaydi. Masalan: suv o‘tlarida. Bu o‘simliklarning oziqlanishi faqat avtotrof yo‘lda bo‘ladi. Bakteriyalarda, zamburug‘larda va gullaydigan o‘simliklardan zarpechak, devpechak va shumg‘iya deb ataladigan o‘simliklarda yashil rang beruvchi xlorofill bo‘lmaydi. SHuning uchun ham bu o‘simliklar o‘zlariga oziq modda tayyorlay olmaydi. Bunday o‘simliklar **geterotrof** yo‘lda oziqlanadi. Geteroc – o‘zgalari hisobiga ma’nosini bildiradi. Geterotrof oziqlanish o‘z galida 2 ga bo‘linadi.

1. Parazit

2. Saprofit

Parazit oziqlanish tirik organizm hisobiga, saprofit oziqlanish o‘lik organizm hisobiga bo‘ladi.

1.4 Botanika fanining farmatsevtikadagi ahamiyati.

Hozirgi kunda ko‘pgina dori – darmonlar o‘simliklardan olingani uchun botanika fanining farmatsevtikadagi ahamiyati nihoyatda kattadir. MDX florasida juda boy bo‘lib 19000 o‘simlik turini o‘z ichiga oladi. Ularning orasida dorivor o‘simliklar juda ko‘p.

So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra 159 tur yovvoyi dorivor o‘simliklardan tayyorlangan dori turlari va preparatlari meditsinada ishlatiladi. YOvvoyi holda o‘sadigan dorivor o‘simliklar har yili tayyorlanadi.

MDX dorivor o‘simliklaridan olinadigan dorivor mahsulotlar farmatsevtika zavodlari va dorixonalar bosh boshqarmasini talabini qondirmaydi. SHuning uchun dorivor o‘simliklarni ekish keng yo‘lga qo‘yilgan. Hozirgi kunda aholining dorivor o‘simlik uchun talabi juda katta.

1.5 Hujayraning kashf etilishi va Hujayra nazariyasi

Hujayra tirik organizmning asosiy bir bo‘lagi bo‘lib tiriklikda bo‘ladigan hamma protsesslar hujayrada bo‘lib turadi. Hujayra oziqlanish, ko‘payish, o‘sish, nafas olish, tashqi ta’sirotni sezish xususiyatiga ega. O‘simlik organlari hujayradan tashkil topganligini ingliz olimi fizik **Robert Guk** 1665 yilda topgan. R. Guk birinchi marotaba hujayrani mikroskopda ko‘rgan u o‘simlik to‘qimalari hujayradan iborat ekanligini aniqlagan. R. Guk hujayra to‘g‘risida “**Mikrografiya**” deb kitob yozgan. Bu kitobda ukrop, marjon daraxti (buzina) va probkaning ichki tuzilishini ko‘rsatib bergan.

XIX- asrning boshlarida hujayra nazariyasi paydo bo‘ldi. Bu nazariyaning ko‘rsatishicha har bir organizm va organ, to‘qimalari hujayralardan tuzilgan. Hujayra esa bo‘linib ko‘payib turadi.

XIX- asr 1834 yilda rus olimi Peterburg meditsina akademiyasining professori Goryaninov tirik organizm, albatta hujayralardan tashkil topgan deydi. Organik dunyo neorganik dunyodan hujayraviy tuzilishi bilan farq qilishligini isbotlaydi.

1838 yilda nemis olimlari Shleyden (botanik) va Shvan (zoolog) hujayra nazariyasini ilmiy asosda tuzib chiqadi. Bu nazariyaga binoan har bir o'simlik va hayvon organlari hujayradan tuzilgan.¹

Hujayralar bo'linib ko'payib turadi. Tiriklikka xos bo'lgan protsesslarning hammasi hujayrada bo'lib turadi. (nafas olish, oziqlanish, ko'payish va boshqalar).

Fridrix engels XIX - asrda tabiat fanidan 3 ta katta kashfiyotlar bo'lganligini ko'rsatadi.

1. Hujayra nazariyasi.
2. Darvinning evolyutsion ta'limoti.
3. Materiyaning yo'qolmasligi. Energiya saqlash qonuni.

Hujayraning katta kichikligi turlicha bo'ladi. Hujayralar odatda mayda bo'ladi. O'rta hisobda gullaydigan o'simliklar hujayralarining katta kichikligi 10-60 mk gacha bo'ladi. Lekin er yuzida undan ham mayda hujayralar bor.

1965 yilda gollandiya olimi Leven Guk tabiatda ko'zga ko'rinmaydigan o'simliklarni topgan. Bu o'simliklarni **bakterion** deb ataydi. Bakteriya tayoqcha ma'nosini bildiradi. U o'zining "Tabiat sirlari" asarida shu bakteriyalarni tasvirlaydi.

Bakteriyalarning kattaligi o'rtacha hisobda 0.5-1.0 mk gacha bo'ladi. 1898 yilda rus olimi Ivanivskiy bakteriyalardan ham mayda organizmlarni topgan. Bu organizmlarni **virus** deb ataydi. Viruslarning kattaligi o'rta hisobda 0.015-0.07 mk gacha bo'ladi. Lekin o'simliklar dunyosida yirik hujayralar ham uchraydi. Bunday hujayralarni oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin. Masalan: pomidor, tarvuz, limon, apelsin, olma mevalari hujayrasida. Paxta tolasining hujayrasi 6-6.5 sm, suv o'tlaridan xaraning hujayrasi 15 sm ga etadi. O'rta dengiz suvlarida o'sadigan kaularpa suv o'tining hujayrasining kattaligi 1 metr ga etadi. (10-100 sm).

Hujayra shakllari ham turlicha bo'ladi. Tekshirish natijasida hujayra 76 xil shakldan iborat ekanligi aniqlangan. Ularning hammasi 2 ta gruppaga bo'linadi.

1. Parenxima hujayra.
2. Prozenxima hujayra.

Parenxima hujayraning bo'yi bilan eni bir-biriga tengroq yoki bo'yi enidan 4 martadan 8 martagacha kattaroq bo'ladi. Prozenxim hujayraning bo'yi enidan 10 martadan 1000 martagacha katta bo'ladi. Hujayraning eng asosiy va ahamiyatli tirik qismini **protplast** deb ataladi. Protoplast quyidagi qismlardan tashkil topgan:

1. YAdro.
2. Protoplazma (sitoplazma)
3. Plastidalar
4. Xondriosoma.

Bulardan tashqari hujayra po'sti, hujayra shirasi va oziqli hamda chiqindi moddalar bor. Bularning hammasini protoplast ishlab chiqaradi.

1.6 Protoplazma (sitoplazma). Hujayradagi fermentlar, Vitaminlar.

Protoplazma yarim suyuqlik, rangsiz, shilimshiq modda bo'lib asosan oqsildan tashkil topgan.

Oqsil juda murakkab tuzilgan organik modda bo'lib C, H, O dan tuzilgan. Ba'zi bir oqsillarning tarkibida Fe, P ham uchraydi.

1. ¹ Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: "Высшая школа", 2001.-230 с.

Oqsil molekulasi juda ham murakkab tuzilgan. Bug'doyning oqsilida C-685, H-1068, O-196, jo'xorining oqsilida C-736, H-116, O-208.

Protoplazma quruq qismining 70% ni suv tashkil etadi. F. Engels hayot oqsilga bog'liq ekanligini ko'rsatib o'tadi. Oqsildan tashqari protoplazmada yog', karbon suvlari, mineral moddalar va suv bo'ladi. Barg, poya va ildizda suvning miqdori 50-80%, urug' va quruq mevalarda esa suvning miqdori 10-15 % bo'ladi.

Rus olimi Lepeshkinning ko'rsatishicha shilimshiq zamburug'larning tarkibida 82.6 % suv, 17.4 % quruq moddalar bor. SHu quruq moddalardan 40.7% suvda eriydigan, 59.3% suvda erimaydigan.

Sitoplazmada reaksiya ko'proq ishqoriy bo'lib qizil lakmusni ko'kka bo'yaydi. Protoplazma 3 qavatdan tashkil topgan.

1. Eng tashqi qobig' qavati – ektoplazma
2. O'rta suyuq qavati – mezoplazma.
3. Ichki qavat, ya'ni harakatsiz qavati – endoplazma.

Ichki va tashqi qavati (ektoplazma va endoplazma) pardasimon bo'lib yarim o'tkazuvchanlik vazifasini bajaradi. Masalan: suvni yaxshi o'tkazadi, bo'yoqlarni o'tkazmaydi.

Protoplazmaning o'rta qavatidagi mezoplazmada 2 xil jism uchraydi.

1.Xondriosoma

2.Mikrosoma. Bu mikrosoma juda kichkina donacha ma'nosini bildiradi.

Xondriosomalar yumaloq shaklda bo'ladi. **Mikrosomalar** esa nuqtaga o'xshaydi. *Xondriosomalardan kelajakda plastidalar vujudga keladi. Mikrosomalardan esa oziqli va chiqindi moddalar hosil bo'ladi.* Protoplazma hujayra ichida doimo harakatlanib turadi. Bir minutda **0.3 mm dan 10 mm gacha** bo'lgan masofani bosadi. Bir soatda 7 sm masofani bosadi.

Protoplazmaning harakatlanishi 2 xil tipda bo'ladi.

1. Aylana harakat – vrashatelnoe dvijenie
2. Sochilib harakatlanish - stuychatoe dvijenie.

Aylana harakatda protoplazma hujayraning aylanasi bo'yicha harakatlanadi.

Sochilib harakatlanishda esa yadrodan hujayra po'stiga, hujayra po'stidan yadrochaga qarab harakatlanadi. Protoplazmaning harakatlanishi modda almashinuvini tezlashtiradi.

Hujayra protoplazmasida turli reaksiyalar bo'lib turadi. Buning natijasida ko'plab organik moddalar tuziladi va parchalanib turadi. Bu protsesslarning hammasi fermentlar ta'sirida bo'ladi.

Hujayraning butun hayot faoliyatida ishtirok etadigan sitoplazmada uchraydigan organoidlarning qisqacha ta'rifiga to'xtalib o'tamiz. Bu organoidlar electron mikroskoplar kashf qilingandan keyingina o'rganila boshlandi.

Mitoxondriyalar - (yunon. "mitos" – ip, "xondrion" – granula) donacha, tayoqcha, ipcha shaklida bo'lub, bakteriyalar va ko'k yashil suvo'tlardan tashqari barcha o'simlik hamda hayvon hujayralarida uchraydi. Mitoxondriyalar asosan ADF dan ATF ni va qisman DNK kuzatuvda oqsillarni sintez qiladi. Mitoxondriyalarda oqsillar, lipidlar, nafas olishda ishtirok etadigan fermentlar, RNK lar bilan A.B.K.E. kabi vitaminlar uchraydi.

Ribosomalar – 1955 yilda G.Palade tomonidan aniqlangan. Ribosomalarda 50% oqsil va ribonuklein kislotalar, mineral tuzlardan magniy va kalsiy bo'ladi. Ribosomalarning asosiy vazifasi oqsil sintezidir. Ayniqsa, endoplazmatik to'r atrofidagi ribosomalar oqsil sintezida aktiv qatnashadi.

Golji kompleksi - 1898 yilda italiyalik olim Golji tomonidankashf qilingan bo'lib, uni diktiosoma deb ataladi. Diktiosoma tarkibida oqsillar, lipidlar, polisaxaridlar, fermentlar bo'lib, ular hujayradagi suv balansini tartibga solishda, chiqindi va zaharli moddalarni to'plashda hamda hujayra vakuolasi hosil qilishda ishtirok etadi.

Endoplazmatik to‘r – nozik kanalchalardan tuzilgan murakkab sistema bo‘lib, ikki xil shaklga ega. Tashqi membranasi donador (ribosoma bo‘lsa) yoki silliq (ribosoma bo‘lmasa) endoplazmatik to‘r bo‘ladi.

Fermentlar katalizatorlik vazifasini bajarib turadi. Fermentlar 4 ta gruppaga bo‘linadi.

1. Achituvchi fermentlar – **oksidaza**.

2. **Proteaza**. Bu ferment ta‘sirida oqsil moddalar aminokislotalargacha parchalanadi. Bu ferment ta‘sirida oqsil moddalar tiklanadi.

3. **Esteraza**. Bu ferment ta‘sirida moylar spirt bilan kislotaga parchalanadi. SHu gruppaga kiruvchi lipaza fermenti ta‘sirida yog‘ glitserin va kislotasigacha parchalanadi.

4. **Karbogidraza**. Bu ferment ta‘sirida har xil karbon suvlar parchalanadi. Bu gruppaga kiruvchi diastaza fermenti ta‘sirida shakar kraxmalga aylanadi.

Fermentlar faoliyati temperatura ko‘tarilganda ya‘ni 40-50 °C da ko‘payadi. 50° C dan yuqorida susayadi. 100° C da esa fermentlar ishdan chiqadi.

Vitaminlar yunoncha Vita so‘zidan olingan bo‘lib, hayot degan ma‘noni bildiradi. Ularni 1880 yilda rus olimi N.Lunin hamda 1912 yilda esa K.Funk kashf etganlar. Tarkibida turli-tuman organik moddalar saqlovchi vitaminlar fermentlar komponentlari bo‘lib hujayrada katalizator rolini o‘ynaydi. Organizmda vitaminlar etishmasa modda almashinish jarayoni buziladi. Agar ular mutlaqo bo‘lmasa organizmning hayotiy funksiyalari buziladi. Hozirgacha 40 ga yaqin vitaminlar aniqlangan, ularning hammasi toza holda sanoatda ishlab chiqilmoqda va oziq-ovqat ratsionida ishlatilmoqda. Vitaminlarning nomlari yunon alfavitining bosh harflari bilan belgilanadi. SHu sababli ularni A, B, C, D vitaminlari deb aytiladi. Vitaminlar o‘simliklarning ma‘lum bir qismlarida joylashadi.

Masalan, B (B1, B2) gruppaga vitaminlar ko‘pincha urug‘ murtagi va po‘stida yoki javdar, bug‘doy kabi o‘simliklarning yosh maysalarida bo‘ladi. C vitamin na‘matak, limon, qora smorodina mevalarida hamda piyoz boshlarida, e vitamini o‘simlik yog‘larida, bug‘doy, makkajo‘xori maysalarida, sitrus o‘simliklari va pomidor mevasida, K vitamini chayon o‘ti bargida, sabzi ildizmevasida ko‘p bo‘ladi.

Vitaminlar fermentlarning tarkibiy qismi bo‘lib, o‘simlik organizmida faqat modda almashish jarayonida qatnashadi. Vitaminlar tabiatdagi barcha o‘simliklarda oz miqdorda bo‘lib, hujayraning hayotiy jarayonlarida faol ishtirok etadi. Vitaminlar etishmasa o‘simlikning rivojlanishi yaxshi bormaydi.

1.7 O‘simlik hujayrasining tuzilishi. Yadro.

Yadro – “nucleus” grekcha “karion”. Yadro protoplazmaga o‘xshash hujayraning eng asosiy qismlaridan biri bo‘lib hisoblanadi. Protoplazma yadrosiz, yadro esa protoplazmasiz yashay olmaydi. Rus olimi Gerasimovning ko‘rsatishicha hujayradagi hamma protsesslarda yadro ishtirok etadi. Yadrosiz hujayra bo‘lishi mumkin emasligini ko‘rsatadi. 1890 yilda **Gerasimov spirogira suv o‘ti** hujayrasidan yadroni ajratib oladi. Yadrosi bor hujayra normal yashagan. Yadrosi olib tashlangan hujayra esa **42 kundan so‘ng o‘lgan. Yadroni birinchi marta 1831 yilda ingliz olimi botanik Robert Broun orxideya** deb atalgan o‘simlik hujayrasida ko‘radi.

Yadroning shakli yumaloq yoki elipssimon, ba‘zan cho‘ziq va yulduzsimon yadrolar ham uchraydi.

YAdroning katta kichikligi o‘rtacha hisobda 4-36 mk gacha bo‘ladi. Bundan ham kichkina va katta yadrolar uchraydi. Masalan, mog‘or zamburug‘ining yadrosi 1 mk, Sagovnik deb atalgan o‘simlikning yadrosi 500-600 mk gacha bo‘ladi. Odatda o‘simlik hujayrasida 1 tadan yadro bo‘ladi.

Ba‘zi bir hujayralar 2 ta yoki undan ko‘p yadroli bo‘ladi. Masalan, yashil suv o‘tlarida va tuban zamburug‘larida yuztagacha yadro uchraydi. Dengizda yashaydigan

ba'zi bir **qizil suv o'tlari** hujayrasida 4000 tagacha yadro uchraydi. Ko'knorining sutli nayida 1000 tagacha yadro bor.

Ba'zi bir o'simliklarning hujayrasida yadro bo'lmaydi. Masalan, **ko'k yashil suv o'tlari va bakteriyalarda**. Rus olimi Peshkovning ko'rsatishicha bunday o'simliklarda yadro elementlari **protoplazmada tarqoq holda uchraydi**.

Odatda yadro hujayraning turli joylarida uchraydi. Yosh hujayralarda yadro hujayraning 1/3 qismini tashkil etadi. Bunda yadro hujayraning markazida joylashgan. Qari hujayralarda esa yadro hujayraning chetida joylashgan bo'ladi.

Yadro rangsiz, tiniq protoplazmaga nisbatan qattiq kolloid modda. YAdro protoplazmadan o'zining yupqa oq pardasi bilan ajralib turadi. YAdroda ikki xil, ya'ni tashqi va ichki po'sti bor. Tashqi po'stining teshikchasi bor. YAdro ichida yadro suyuqligi joylashgan. YAdro suyuqligi **kariolimfa** deb ataladi. Kariolimfa 2 xil bo'ladi.

1. Xromatin (bo'yaladigan)
2. Axromatin (bo'yalmaydigan).

Yadro sitoplazmaga o'xshash oqsil moddadan tashkil topgan. Yadro oqsilida C, H, O lardan tashqari Fe, P ham bor. SHuning uchun **ham yadro oqsilini nukleoproteid** deb yuritiladi. Bu oqsil oshqozonda hazm bo'lmasligi bilan boshqa oqsillardan farq qiladi. Xromatin nukleoproteiddan tuzilgan. Yadro tarkibida timonuklein kislota bor. Nukleoproteidlarning reaksiyasi kislotali bo'ladi, ya'ni ko'k lakmusni qizartiradi.²

Yadro tarkibida yadrochalar bor. Yadrolarning tarkibi va vazifasi to'liq o'rganilmagan. Yadro harakatlanib turadi. Birinchi harakati protoplazma bilan birgalikda. Bu harakatni sekin harakatlanish deyiladi. Ikkinchi harakati protoplazmasiz o'zi harakat qiladi. Bunday harakatni tez harakatlanish deyiladi. Demak, yadro hujayrada bo'ladigan hamma protsesslarda ishtirok etadi. **Yadro achituvchi fermentlarni ishlab chiqaradi. Hujayraning bo'linishi protsesslarida ishtirok etadi.** Yadroning bo'linishi – hujayraning bo'linishidir.

Hujayraning bo'linishiga hujayradagi jamiki moddalarning har xil ta'sirotlar natijasida ko'payishi va DNK ning ikki marta oshishi sabab bo'ladi. Tirik tanalar uch xil yo'lda bo'linib ko'payadi: amitoz, mitoz, meyo. Xromosomalarda esa endomitoz bo'linish ham sodir bo'ladi.

Hujayraning oddiy yo'l bilan bo'linish – amitoz, tuban tuzilgan o'simliklarning hujayralarida va qarigan, kasallikka duchor bo'lgan hujayralarda sodir bo'ladi.

Qari yoki kasallangan hujayralarda ba'zan yadrolar bo'linadiyu, ammo hujayra ikkiga ajralmay poliploidli yoki patologik hujayralarni hosil qiladi.

Yadroning murakkab bo'linishi ikki xil yo'l bilan:

- 1) o'simlikning vegetativ organlarida kariokinez bo'linish yoki mitoz bo'linish sodir bo'ladi.
- 2) generativ organlarida jinsiy hujayralarda reduksion bo'linish yoki meyo bo'linish sodir bo'ladi.

1.8 Plastidalar klassifikatsiyasi, ahamiyati.

Plastidalar protoplazmaning mezoplazmasidagi xondriosomadan hosil bo'ladi. Plastidalar ham protoplazma va yadroga o'xshash oqsil moddadan tuzilgan. Lekin plastidalar o'zining rang beruvchi pigmentlari bilan yadro va protoplazmadan farq qiladi. Plastidalar ham protoplazma va yadroga o'xshash oqsil moddadan tuzilgan.³ Lekin plastidalar o'zining rang beruvchi pigmentlari bilan yadro va ptotoplazmadan farq qiladi. Plastidalar oqsilida C, O, H lardan tashqari Fe uchraydi. Plastidalar oddiy yo'l

1. ² Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. – T.: O'zbekiston, 2005.- 435 b.

bilan bo‘linib ko‘payib turadi. Plastidalar protoplzma bilan birgalikda hamda o‘zi harakatlanib turadi. Bir sekund 0.12 mm masofani bosadi. Plastidalarining kattaligi o‘rta hisobda 1-12 mk bo‘ladi. Bitta hujayra 20 tadan 100 tagacha uchraydi. Plastidalar 3 ta gruppaga bo‘linadi.

1. Leykoplastlar – rangsiz plastidalar.
2. Xromaoplastlar – rangli plastidalar.
3. Xloroplastlar - rangli plastidalar.

Xloroplast – xloro- yashil rang ma’nosini bildiradi. Xloroplast tarkibida yashil rang beruvchi xlorofill pigmentini saqlaydi. Xloroplast o‘simliklarning er ustki qismida uchraydi. Xloroplastni birinchi marta fransuz farmatsevti Plyate M.C.o‘tgan asrning 90-yillarida yashil rang beruvchi xlorofill pigmenti 2 ta pigmentdan tashkil topganligini ko‘rsatadi:


1. Xlorofill “A” $C_{55}H_{72}O_{54}M$
2. Xlorofill “B” $C_{55}H_{70}O_{64}M$

Xlorofill “A” to‘q yashil, xlorofill “B” sarg‘ish yashil rang beradi. Xlorofill murakkab efirga kiradi. Xlorofill gulli o‘simliklarda yumaloq doira shaklida bo‘lganligi uchun xlorofill donachalari deb yuritiladi. Xlorofillning kattaligi o‘rta hisobda 3-10 mk gacha bo‘ladi. Har xil o‘simlikning hujayrasida xlorofill donachalarining soni turlida bo‘ladi. Xlorofill donachalari hujayrada 20, 40, 60 ba’zan 100 tagacha bo‘lishi mumkin.

Xlorofill faqat o‘simliklar uchun emas odamlar va hayvonlar uchun ham katta ahamiyatga ega. Chunki organik moddalar birinchi marotaba xlorofill ichida hosil bo‘ladi. Organik moddalar fotosintez protsessi ishtirokida hosil bo‘ladi. Fotosintez protsessini assimilyatsiya protsessi deb ham yuritiladi. Rus olimi K. A. Timiryazev fotosintez protsessida xlorofill quyosh nurini yutishini ko‘rsatadi. Uning ko‘rsatishicha xlorofill quyosh spektorning B bilan C oralig‘ida qizil va ko‘k, binafsha nurlarini ko‘proq yutadi.

O‘simliklar quyosh nurining 75% ini yutadi, shundan 5 % gachasi fotosintez protsessida ishtirok etsa , qolgan 70% gachasi o‘simliklarning suv bug‘latishiga sarf bo‘ladi.

Fotosintez protsessida xlorofill va quyosh nuridan tashqari suv va karbonat angidrid kerak bo‘ladi. Bularning qo‘shilishi natijasida oldin chumoli aldegidining 6 molekulasi bir-biri bilanqo‘shilib bir molekula glyukoza hosil qiladi. Bu protsessning qanday mexanizmda borishini olimlar hozirgacha aniqlay olishmayapti.



Suv o‘tlarida plastidalarini xromotofor deb yuritiladi. CHunki bu o‘simliklarda plastidlar shakl jihatidan boshqa o‘simliklardan farq qiladi. Masalan: spiralga, yulduzga va boshqa shakllarga o‘xshash bo‘ladi.

Xromoplast. Xroma – bo‘yoq rang ma’nosini bildiradi. Xromoplast o‘simliklarning er osti va er ustki organlarida uchraydi. SHakli turlicha bo‘ladi. Ba’zi o‘simliklarda yumaloq, boshqalarida esa uch qirrali yoki ninasimon shakllarida bo‘ladi. Xromoplastda

zapas oziq moddalar to'planadi. Xromoplastda rang beruvchi pigmentlar ya'ni karotinooidlar bor. O'simliklarga sariq, qizil, qo'ng'ir rang beradi.

Xromoplast pigmentlaridan karotin - $C_{40}H_{56}$ qizil rang beradi. Ksantofill - $C_{40}H_{56}O_2$ sariq rang beradi. Qo'ng'ir rang beruvchilarning pigmentini fukoksantin - $C_{40}H_{56}O_6$ deyiladi. Odam organizmida karotinooidlar oksidlanib vitamin A ni vujudga keltiradi.

Xromoplastlarning katta kichikligi o'rta hisobda 4-24 m bo'ladi. Xromoplastlar o'simliklar dunyosini er yuzida tarqalishida katta ahamiyatga ega. Chunki xromoplast o'simliklarini gulida va mevasida uchraydi. Meva o'zining chiroyli rangi bilan qushlarni, hayvonlarni o'ziga jalb qiladi. Mevasini eb urug'i tashlanadi. Urug'idan yangi o'simlik o'sib chiqadi.

Leykoplast. Leykoc – oq, rangsiz degan ma'noni bildiradi. Leykoplastda rang beruvchi pigment bo'lmaydi. Leykoplast o'simliklarning er ostki va er ustki organlarida uchraydi. Masalan, o'simliklar bargining epidermasida, kartoshka tugunagida, lavlagining ildiz mevasida uchrashi mumkin. Leykoplastning shakli – sharsimon, tayoqchasimon va boshqa shakllarda bo'ladi. Katta kichikligi ham turlicha. Leykoplastda ikkilamchi kraxmal va ikkilamchi shakar to'planadi. Masalan, kartoshka tugunagida ikkilamchi kraxmal, lavlagida esa ikkilamchi shakar bor.

Plastidlar tashqi muhit ta'sirida o'zgarib bir turdan ikkinchi turga o'tib turadi. Masalan, leykoplast xloroplastga (kartoshka tugunagida er betiga chiqib qolsa ko'karib qoladi). Xloroplast xromoplastga (yashil bargining sarg'ayishi, mevalarning pishishi).

Qaysi bir o'simlikda xloroplast bo'lsa bunday o'simliklar autotrof o'simliklarga kiradi. Xloroplasti bo'lmagan o'simliklarni geteratrof o'simliklarga kiritiladi.

Nazorat savollari

1. Botanika fani qanday bo'limlardan iborat?
2. Botanika fanining rivojlanish tarixi qanday?
3. Farmatsevtikada botanika fanining o'rni qanday?
4. Hujayra qanday tuzilishga ega?
5. Sitoplazmada qanday organoidlar uchraydi?
6. O'simlik hujayrasida qanday vitaminlar uchraydi?
7. Hujayrada qanday fermentlar uchraydi?
8. Yadroning tuzilishi va uning vazifasi?
9. Hujayra qanday usullarda bo'linadi?
10. Plastidalar qanday organoidlar va ularning shakllari, hamda rangiga qarab necha guruhga bo'linadi?

Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o'quv qo'llanmalar ro'yxati

1. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. – T.: O'zbekiston, 2005.- 435 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A., Samatova SH. O'simliklar sistematikasidan amaliy mashg'ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
4. Ahmedov O'.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elaktron darslik.-T.: 2008.
5. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –14p.
6. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
7. Hamidov A., Nabiev M.M. “O'zbekiston o'simliklarini aniqlagichi”.-T.: 1987.-235 b.

8. Васильев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “Высшая школа”, 1988. -435 с.
9. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O‘.A. va boshqalar. Dorivor o‘simliklarning lotincha-o‘zbekcha-ruscha-arabcha va forsha-tojikcha lug‘ati.-T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
10. Березовская Т.П., Дмитрук С.Е., Гришина Е.И., Белоусов М.В. Основы фармацевтической ботаники. – Томск: Печатная мануфактура, 2004.-294 с.
11. Xolmatov X.X., Ahmedov O‘. A. Farmakognosiya. 1-2 qism. – T.: “Ibn Sino” nashiryoti, 2007.- 806 b.

Ma’ruza – 2

Hujayradagi oziqli moddalar. Kristallar. O‘simlik to‘qimalari. Hosil qiluvchi va qoplovchi to‘qimalar

Reja:

1. Hujayradagi oziqli moddalar, ularni aniqlash reaksiyalari.
2. Vakuolalar, hujayra shirasi.
3. Hujayra shirasidagi zaharli modalar.
4. Hujayra pigmentlari.
5. Kristallar, ularning ahamiyati.
6. Hujayra po‘sti.
7. To‘qima tasnifi
8. To‘qimalarning kelib chiqishi va bajaradigan vazifalariga qarab xillari
9. Hosil qiluvchi to‘qima.Birlamchi meristema, Ikkilamchi meristema
10. Hujayraning ko‘payishi, Karokinez bo‘linish,.Reduksion bo‘linish
11. Qoplovchi to‘qima, Epidermis
12. Ikkilamchi qoplovchi to‘qima –periderma
13. Uchlamchi qoplovchi to‘qima (qobiq)

Tayanch iboralar: *O‘simlik hujayrasining tuzilishi, undagi plastidlar. Hujayradagi oziqli moddalar, Ularini aniqlash reaksiyalari. Kristallar va ularni ahamiyati haqida tushuncha beriladi. O‘simlik to‘qimalari, ularning klassifikatsiyasi.Hosil qiluvchi va qoplovchi to‘qimalar, hamda ularning vazifalari haqida tushuncha berish.*

HUJAYRADA UCHRAYDIGAN MODDALAR

Hujayrada uchraydigan moddalarni hujayraning protoplasti ishlab chiqaradi. Hujayrada zapas oziq moddalar va qisman chiqindi moddalar uchraydi. Hujayradagi zapas oziq moddalarga esa kristallar kiradi.

Kraxmal birinchi marotaba assilyatsiya protsessi natijasida xlorofill donachalari ichida hosil bo‘ladi. Xlorofill donachalari ichida hosil bo‘lgan kraxmalni **birlamchi yoki assilyatsion kraxmal** deyiladi. Birlamchi kraxmal xlorofill donachalari ichida uzoq muddat saqlanmaydi. Kraxmalning bir qismi nafas olishga sarf bo‘ladi, bir qismi o‘simlikni boshqa organlariga o‘tadi, yana bir qismi shakarga aylanadi. O‘simlik organlariga tarqaluvchi kraxmalni tranzitor kraxmal deyiladi. Zapas oziq modda sifatida to‘planadigan kraxmalni zapas kraxmal yoki ikkilamchi kraxmal deb yuritiladi.

Kraxmal zapas oziq modda sifatida o‘simlik urug‘larida va er osti qismlarida to‘planadi. Masalan, bug‘doyda 54-75%, guruchda 62-86%, dukkakli o‘simliklarda 33-

43%, jo‘xorida 57-72%, kartoshka tugunagida 12-24% bo‘ladi. Zapas ya‘ni ikkilamchi kraxmal leykoplastda hosil bo‘ladi.⁴


Kraxmal rangsiz tuxumsimon, yumaloq, ko‘p qirralui yoki tayoqcha shaklida bo‘ladi. Jo‘xori va guruchning kraxmali ko‘p qirrali, kartoshka kraxmali yumaloq, suv o‘ti o‘simligining kraxmali tayoqchasimon. Kraxmalning o‘rtacha hisobda kattaligi 2-2.75 mk bo‘ladi. Kraxmal donachasi tuzilishiga qarab 2 xil bo‘ladi:

1. Ekssentrik kraxmal
2. Konsentrik kraxmal.

eksentrik kraxmalning tuzilishida yadrosi chetga joylashgan, konsentrik kraxmalning tuzilishida yadrosi chetga joylashgan bo‘ladi. eksentrik kraxmal misol qilib kartoshka kraxmalini olish mumkin.

Kraxmal organik birikma bo‘lib, u karbon suvlarning uchinchi gruppasiga, ya‘ni polisaxaridlarga kiradi. Kraxmal tarkibida biroz suv, fosfor kislotasi ham bo‘ladi. Kraxmal suvda erimaydi. 70-75 li suvda bo‘kib yoriladi. Natijada kkleyster hosil bo‘ladi. Zavodlarda kraxmalni kuchsiz kislota yordamida eritib ishlatiladi.

O‘simlik hujayrasidagi kraxmal diastaza deb ataladigan ferment ta‘sirida shakarga aylanadi. Kraxmalni shakarga aylanishida bir molekula suv talab etiladi.



Kraxmal lyugol eritmasida (KJ + J₂ + H₂O) binafsha rangga bo‘yaladi.

Kraxmal oddiy, yarim murakkab va murakkab bo‘ladi. Oddiy kraxmallar tuzilishida yadrosi bitta, murakkab kraxmalda esa tuzilish yadrosi ko‘p bo‘ladi. YArim murakkab kraxmalda bir nechta kraxmal donachalari bir-biri bilan qo‘shilib ketgan bo‘ladi.

YArim murakkab kraxmalni kartoshka tugunagida, murakkab kraxmalni esa silida ko‘rish mumkin. O‘simlikda zapas oziq modda sifatida oqsil uchraydi. Masalan kartoshkada 2 %, no‘xatda 22 %, soyada 40 %, jo‘xorida 10%, bug‘doyda 20%, bedada 5%, lavlagida 1%, zamburug‘da 53% gacha uchraydi. Oqsil modda hujayraning sitoplazmasida, vakuolasida va aleyron donachasi ichida uchraydi. Aleyron donasining kattaligi 1 mk-55mk ga bo‘ladi. Aleyron donalari o‘zining yupqa pardasi bilan ajralib turadi, o‘simliklarda, masalan, kanakunjut urug‘ida aleyron donachalarining ichida kristallar bor.⁵

Oqsilni aniqlaydigan reaksiyalar:

1. *Raspaylya reksiyasi*

Oqsil + C₁₂H₂₂O₁₁ + H₂O₄ ----- oqsil pushti rangga bo‘yaladi.

2. *Ksantoprotein reaksiyasi:*

Oqsil + HNO₃ + H₂ ----- oqsil qizil rangga bo‘yaladi.

3. *Oqsil + lyugol eritmasi* ta‘sirida **tilla sariq rangga** bo‘yaladi.

YOG‘. O‘simlik hujayrasida zapas oziq modda sifatida yog‘ ham uchraydi. Masalan, no‘xatda 3%, bug‘doyda 1.5%, jo‘xori 7%, zig‘irda 34%, ko‘knorida 40%, nashada 33%, oshqovoqda 50%, kungaboqarda 53% gacha bo‘ladi.

Yog‘ ham karbon suvga o‘xshash C, O,H lardan tuzilgan. YOg‘ tarkibida glitserin va yog‘ kislotalari uchraydi. YOg‘ karbon suvlariga nisbatan energiya ko‘proq

2. ⁴ Mustafaev S.M., Ahmedov O‘.A. Botanika. – T.: O‘zbekiston, 2005.- 435 b.

3. ⁵ Mustafaev S.M., Ahmedov O‘.A. Botanika. – T.: O‘zbekiston, 2005.- 435 b.

beradi. 1 gr karbon suv 4.2 kkal energiya bersa, 1 g yog‘ 9.3 kkal. Energiya beradi. YOg‘ suvda erimaydi. efirda, benzinda va boshqa erituvchilarda eriydi. YOg‘ ishqor ta‘sirida sovunga aylanadi. YOg‘, glitserin va organic kislotalarga parchalanadi.

YOg‘ tirik hujayrada *lipaza* deb ataladigan ferment ta‘sirida eriydi. YOg‘ **alkanin** deb ataladigan **reaktiv** ta‘sirida **qizil rangga** bo‘yaladi. Sudan III eritmasi ta‘sirida (biroz qizdirilgandan so‘ng) pushti rangga bo‘yaladi.

O‘simlikda uchraydigan yog‘lar 2 xil bo‘ladi:

1. Iz qoldiradigan.
2. Iz qoldirmaydigan yog‘ – efir moylar.

Efir moylar tarkibida kislorodning miqdori juda oz bo‘ladi. Ba‘zida esa kislorod bo‘lmaydi, uning o‘rnida S uchraydi. efir moylar limon, geran, lavanda, kashnich, arpabodiyon, yalpiz va boshqa o‘simliklarda uchrashi mumkin. efir moylar o‘simliklarga xushbo‘y xidga ega bo‘ladi. Masalan, sarimsoq (chesnok) efir moyi. Sarimsoq yoqimsiz hidga ega bo‘lsa ham foydali hisoblanadi.

O‘simlik hujayrasida chiqindi modda sifatida har xil kristallar uchraydi. Kristallar asosan C_2O_4 , $CaCO_3$, $CaSO_4$, SO_2 dan tashkil topgan. Kristallar faqat butguldoshlar oilasiga kiradigan o‘simliklarda uchramaydi. Masalan, karam, rediska, sholg‘om, turp va boshqalar.

Boshqa oilaga kiradigan o‘simliklarda esa kristallar uchraydi. Kristal tuzilishi jihatidan bir necha xil bo‘ladi.

1. **Yakka kristallar.** Bu kristallar kub, rombik, prizma va boshqa shakllarda uchraydi. YAkka kristallarni piyozning ustki po‘stida, mingdevona o‘simligida ko‘rish mumkin. Kristallarning shakli yulduzsimon bo‘lsa **druz** deyiladi. Druzlarning lipa daraxti poyasining po‘stloq qismida bangidevona – o‘simligi bargida, g‘o‘za bargida ko‘rish mumkin. Kristallning shakllari ninasimon bo‘lsa **rafid** deyiladi. Rafidlarni marvaridgul – o‘simligi bargida, kovrak, ungerniya o‘simligining piyoz po‘stida ko‘rish mumkin. Ba‘zan kristallar **qumga** o‘xshash bo‘ladi. Bularning esa krasavka o‘simligi bargida qumga to‘la xalta hujayrani ko‘rish mumkin.

VAKUOLALAR VA HUJAYRA SHIRASI

Hujayraning shirasi vakuolalarida joylashgan. “vakuc” - bo‘shliq ma‘nosini bildiradi. Bir necha yosh hujayralarda vakuclar bo‘lmaydi. Bo‘linishdan to‘xtab o‘sa boshlagan hujayralarda vakuclar vujudga keladi. Hujayraning yoshlik vaqtida vakuslari ko‘p mayda bo‘ladi. Hujayra qarigach mayday vakuslar bir-biri bilan birlashib katta vakuslarni vujudga keltiradi. Bu katta vakuslar hujayraning markaz qismiga joylashib oladi. Hujayradagi protoplazma va yadrolar esa hujayraning chet qismiga chiqib oladi. Vakuolada suvda erigan moddalar to‘planadi. Bo‘linib o‘sa boshlagan hujayralarda vakuola yumaloq va cho‘ziq shaklda uchraydi. Bu vaqtda vakuolalar tarkibida erigan moddalari bo‘lgan suv va gel holatda kolloid bilan to‘lgan bo‘ladi. Keyinchalik vakuolalar yiriklashib shira bilan to‘ladi va hujayra markazini egallab hujayraning 70-90% qismini tashkil etadi. Vakuoladagi shira protoplast ishlab chiqargan moddalar, ya‘ni tonoplast (vakuola membranasi) tanlab o‘tkazgan suyuqlikdir. Vakuoladagi suyuqlik **hujayra shirasi** deyilib, 2-5 pH ga teng bo‘ladi, u turli organic va anorganik moddalarning turli miqdordagi eritmasidir. Vakuolani ximiyaviy tarkibi protoplazmaning ximiyaviy tarkibidan farq qiladi.

Vakuolalarda uchraydigan oziq moddalar azotli yoki azotsiz bo‘ladi. Azotli moddalardan tuzilgan albumin, sho‘r suvda eriydigan globulin oqsillari ham olinadi.

Hujayra shirasida karbon suvlaridan glyukoza, fruktoza, saxaroza, inulin uchraydi. Inulin polisaxaridlarga kiradi ($C_6H_{10}O_5$)_n. Inulin qoqio‘t o‘simligining

ildizida uchraydi. Inulin suvda eriydi. saxaroza, glyukoza nisbatan 1.5 marta, fruktoza glyukoza nisbatan 2.5 marta shirinroq. Glyukoza lavlagida 26 %, shakarqamishda 20%.

Ba'zi bir o'simliklarning hujayra shirasida organik kislotalar uchraydi. Masalan, otquloq o'simligida shavel kislota, olmada olma kislotasi, limonda limon kislotasi, tamaki bargida nikotin kislotasi bor. Antonovka olmada – 0.5%, uzumda 0.3%, limonda 9%, moxorkada 8-10% nikotin kislotasi bor. Ba'zi o'simliklarda organik kislotalar juda kam bo'ladi yoki bo'lmaydi. Ularning reaksiyasi neytral yoki ishqoriy bo'ladi. Masalan, bodring, qovoqda.

Ba'zi o'simliklarning hujayra shirasida oshlovchi modda uchraydi. Oshlovchi moddalar meditsinada oshqozon – ichak kasalliklarida burishtiruvchi modda sifatida ishlatiladi. Og'iz va tomoq shilliq qavatlar yallig'langanda, milkdan oqqanda, og'iz va tamoqni chayish uchun ham ishlatiladi. Oshlovchi moddalar dub daraxti po'stlog'da 10-20% , tol po'stlog'ida 9- 13%, choyda 15-20%, evkalipt galasida 30-40% gacha oshlovchi moddalar uchraydi.

Oshlovchi moddalar $FeCl_3$ eritmasi ta'sirida to'q ko'k rangda qora ranggacha bo'yaladi, ba'zi bir o'simliklarning hujayra shirasida zaharli moddalar uchraydi. Zaharli moddalar 2 ga bo'linadi:

1. Alkaloidlar.
2. Glikozidlar.

Bu har ikkala moddalar murakkab tuzilgan organik moddalar bo'lib alkaloidlar tarkibida azot bo'ladi, glikozidlar tarkibida esa azot bo'lmaydi. Ko'knori o'simligining mevasidan (pichoq bilan tilgandan so'ng) oqib chiqqan shirani opiy deb yuritiladi. Opiyning tarkibida 26 xil alkaloidlar bor. Asosiy alkaloidlari morfin, kodein, papaverin, heroin va boshqalar. Mingdevona o'simligi tarkibida giossiamin, atropine va skopolamin, bangidevona o'simligida ham mingdevonada uchraydigan alkaloidlar uchraydi. Xin daraxti po'stlog'ida xinin, sinxonin, sinxonidin deb ataladigan alkaloidlar uchraydi. Xin daraxti tropik mamlakatlarda o'sadi tamaki o'simligida nikotin alkaloidi uchraydi. CHoy, kofein, teofellin, teobromin alkaloidlari uchraydi.

Glikozidlar saqlaydigan o'simliklarga misollar: angishvonagul tarkibida digitoksin, gitoksin. Marvaridgulda kavallatoksin, kanvalletoksol, kanval-lozid, adonis-mushuko't simarin, adonitoksin deb atalgan yurak glikozidlari uchraydi.

Ra'noguldoshlar, g'alladoshlar oilasiga kiradigan o'simliklarda alkaloidlar bo'lmaydi.

Hujayra vakulosida o'simliklarga har xil rang beruvchi pigmentlar bor. Bular asosan ikki gruppaga bo'linadi.

1. Antotsian
2. Antoxlor.

Antotsian o'simliklarning hujayra shirasini ranggiga qarab nordonlik berib turadi. Hujayra shirasi nordon bo'lsa, o'simliklarga qizil rang berib turadi. Ishqor reaksiyasida ko'k rang beradi, neytral reaksiyada binafsha rang beradi. Antotsian o'simliklarni sovuqdan, quyoshning issiq nuridan saqlab turadi.

Antoxlor o'simliklarga faqat sariq rang berib turadi. Masalan, kartoshkagul, tirnoqgul. O'simlik hujayrasining vakuolasida vitaminlar bo'ladi. Organizmda vitaminlar etishmasligi sababli A vita-minoz kasalligi kelib chiqadi. Vitamin A etishmasa (shapko'r), vitamin C etishmasa singa, vitamin D etishmasa raxit kasalliklari kelib chiqadi. Vitaminlardan vakuolalarda faqat B, C, D lar uchraydi. CHunki bu vitaminlar suvda eriydi. qolgan vitaminlar suvda erimaydi. Suvda erimaydigan vitaminlar esa hujayraning protoplazmasida uchraydi. Vitaminlar asosan sabzavot o'simliklarda va g'alladoshlarda uchraydi. Achchiq danakli bodomning hujayra vakuolasida amigdalini glikozidi bor.

HUJAYRA PO'STI.

Hujayra po'sti hujayraga shakl beradi va ikkinchi bir hujayradan ajratib turadi. Hujayra po'stini hujayraning tirik qismi bo'lgan protoplast ishlab chiqaradi. SHuning uchun ham hujayra po'sti ichki tomondan o'sib qalinlashadi.

Tabiatda uchraydigan tuban o'simliklardan xivchinlilar, zamburug'larning sodda tuzilgan vakillari va ayrim suv o'tlarda hujayra po'sti bo'lmaydi. Bunday hujayralarning protoplasti tashqi tomondan yupqa elastic qatlam – plazmatika pardasi bilan chegaralanadi. Hujayra po'sti protoplastning hayotiy jarayonida hosil bo'ladi. Hujayra po'sti juda pishiq bo'lsa ham hujayraning o'sishiga va cho'zilishiga xalaqit bermaydi. CHunki ularning tuzilishi va ximiyaviy tarkibi shunga moslashgan.

O'simlik hujayra po'sti, ayniqsa yosh hujayralarning po'sti sellyuloza (kletchatka) deb ataladigan organik moddadan tashkil topgan. Kletchatka (sellyuloza) karbon suvlarining uchinchi gruppasiga kiruvchi polisaxaridlardan tashkil topgan. Formulasi ($C_6H_{10}O_5$)_n. Sellyuloza suvda erimaydi, bo'kadi va shishadi. Sellyuloza sitoza deb atalgan ferment ta'sirida shakarga aylanadi. Sellyuloza misol qilib paxtani olish mumkin. Paxtaning 90% i sellyulozadan tashkil topgan. Sellyulozadan qog'oz, portlovchi moddalar, suniy shoyi, kino plyonka, sinmaydigan oyna va boshqalar olinadi. Ba'zi bir o'simliklarning hujayra po'stida yarim kletchatka bo'ladi. Gemisellyuloza ham karbon suvlariga kiradi. Gemisellyuloza zapas oziq modda sifatida piyozda, kofe urug'ida uchratish mumkin. Urug'larning unib chiqish davrida sellyuloza va gemisellyuloza oziq modda sifatida embrionning o'sib chiqishiga sarf bo'ladi. Ba'zi bir o'simliklarning hujayra po'stida pektin deb ataladigan modda bo'ladi. Pektin zapas oziq modda sifatida, olmada, qovunda lavlagi ildiz mevasida bo'ladi.

Hujayraning po'sti o'z hayotida bir qancha o'zgarishlarga uchraydi. Ba'zi bir o'simliklarning hujayra po'sti probkalanadi, ba'zi birlari shilimshiqlanadi, ba'zi birlari esa mineral moddalar bilan to'yinadi.

Agar hujayra po'sti lignin deb ataladigan modda bilan to'yinsa hujayra po'sti yog'ochlanadi. Yog'ochlangan hujayra o'zidan suvni va havoni yaxshi o'tkazmaydi. SHuning uchun ham yog'ochlangan hujayra o'lik bo'ladi. O'tkazuvchi to'qimaning suv naylari, traxeidlari, mexanik to'qima hujayralari lignin moddasi bilan sug'orilgan bo'ladi. Suv naylari orqali suv erigan xoldagi mineral moddalar pastdan yuqoriga, ya'ni ildizdan poyaga, poya orqali bargga boradi, mexanik to'qimalar esa o'simlikka qattiqlik berib turadi. Demak, o'simlik hujayrasi o'lik bo'lsa ham har xil vazifalarni bajarib turadi. Lignin tarkibida karbonning miqdori kletchatkaga nisbatan yuqori bo'ladi. Maslan, kletchatkada 44% karbon suvi bo'lsa, ligninda esa 60% bo'ladi. SHuning uchun ham lignin yoquv ashyosidir. Kletchatkaga nisbatan lignin qizil rangga kiradi. Floroglyutsin eritmasi va konsentrlangan xlorid kislota ta'sir ettirilsa liginin qizil rangga bo'yaladi. **Lignin safranin deb ataladigan bo'yoqda qizil rangga bo'yaladi.**

Kletchatka xlor zink-yod eritmasi ta'sirida xiraroq binafsha rangga bo'yaladi. O'simliklarning ba'zi hujayralari suberin deb ataladigan modda bilan sug'orilib probkalanadi. Probkalanagan hujayra o'zidan suvni va havoni mutlaqo o'tkazmaydi. Bu hujayraning ichi havo bilan to'lgan bo'ladi. Probkalanagan hujayra o'simliklarning tashqi qismida bo'ladi. Masalan, kartoshka tugunagining ustki qismida, daraxtlarning poyasi va shoxlarida.

Probka (po'kak) asosan dub daraxtidan olinadi. Boshqa o'simliklarda esa hujayrada suberinning miqdori kam bo'ladi. Probka olinadigan dub daraxti Qrim va Kavkazda uchraydi.

Probka o'simliklarning tashqi sharoitlaridan, ya'ni issiqdan, sovuqdan va mikroorganizmlardan saqlab turadi. Probka somolyotsozlikda, xolodilnik ishlab chiqarishda va boshqa sohalarda keng miqyosda ishlatiladi. CHunki, probka issiqlikni o'tkazmaydi. **Suberin moddasi Sudan-3 eritmasi ta'sirida pushti rangga bo'yaladi.** Ba'zi bir o'simliklarning hujayra po'sti, ayniqsa o't o'simliklarning hujayra po'sti **kutin** drb ataladigan yog'simon modda bilan qoplangan. Kutin moddasini hujayraning protoplasti ishlab chiqaradi. Kutin ham o'zidan suvni va havoni o'tkazmaydi. Kutin bargning tashqi tomonidan qoplangan bo'lib kutikula qavati qalin bo'ladi. O'rta iqlimda yashaydigan o'simliklarda esa kutikula qavati yupqa bo'ladi. Ba'zi bir o'simliklarni qurg'oqchilikdan saqlaydi. SHilimshiq modda ayniqsa suv o'tlarida bo'ladi. Gullaydigan o'simliklardan bexi va zig'irning urug'ida ham shilimshiq moddalar bor.

Ba'zi bir o'simliklarning hujayra po'sti **xitin** moddasi bilan sug'orilgan. Xitin bu azotli birikma bo'lib, **zamburug'larning va bakteriyalarining po'stida bo'ladi.** Formulasi $C_{18}H_{13}O_5$. Xitin moddasi yod ishtirokida qo'ng'ir rangga bo'yaladi. Ba'zi bir o'simliklarning hujayra po'sti mineral moddalar bilan sug'orilgan bo'ladi.

Mineral moddalar bilan sug'orilgan o'simliklarga misol qilib, diatom suv o'tlari va kiyiko't, qirqbo'g'im o'simliklarida ko'rish mumkin. Ba'zi bir o'simliklarning, ayniqsa daraxtlarning poyasida shilimshiq modda oqib chiqadi. Bu modda tashqariga chiqqandan so'ng qotib qoladi. Qotib qolgan moddani elim deyiladi. O'rik elimi farmatsevtika praktikasida emulsiya tayyorlashda ishlatiladi.

Hujayra po'sti ichki tomondan qalinlashadi. Uning ichida qalinlashib qolgan joyi ham bo'ladi. Bu qalinlashib qolgan joyini teshik deyiladi. Hujayralar bir – birlari bilan shu teshiklar orqali aloqada bo'ladi. Ya'ni shu teshiklar orqali bir-birlariga oziq moddalar o'tib turadi. Bu teshiklardan plazma iplari o'tgan bo'ladi.

Shunday qilib, yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, hujayra tarkibi va po'sti murakkab organik va anorganik birikmalardan tashkil topgan. SHu bilan birga o'simliklar va hayvon hujayrasi bir-biridan farq qiladi, shu bilan birga o'simlik organlaridagi hujayralar ham bir-biriga o'xshamaydi. Bu haqda to'qimalar mavzusida batafsil to'xtaymiz.

Shakli jixatdan o'xshash bo'lib, ma'lum bir yoki bir necha vazifani bajaradigan hujayralar gruppasiga (to'plamiga) to'qima deyiladi. To'qimalar ularni hosil qilgan hujayralarning shakliga qarab parenxima hujayralaridan tashkil topgan parenximatik to'qimalar va prozenxima hujayralaridan tashkil topgan prozenximatik to'qimalarga bo'linadi.

Po'stlari bir-biriga zich taqalgan hujayralardan iborat to'qima zich to'qima deyiladi, hujayra orqali yaxshi taraqqiy etgan to'qima g'ovak to'qima deyiladi. To'qima hosil qiluvchi hujayralar po'stlarining kimyoviy tarkibiga qarab yog'ochlashgan, po'kaklashgan va x.k. deb ta'riflanadi. Xujayra po'stlarining qalinligiga qarab qalin devorli yoki yupqa devorli to'qima deyiladi. Bulardan tashqari tirik va o'lik hujayralardan tuzilgan to'qimalar mavjud. To'qimalar kelib chiqishi jixatidan 2 gruppaga: 1) embrional va 2) Doimiy to'qimalarga bo'linadi: ular birlamchi va ikkilamchi bo'ladi. Embrional to'qima o'zida boshqa hujayralari bo'linib yana yangi hujayralarni hosil qiladi.

Rus botaniklari akademiklar Borodin, Paladin, professorlar Ivanov, Aleksandrov va Rozdorskiylar to'qimalarning bajaradigan vazifalariga binoan, ya'ni fiziologik xususiyatiga asoslanib to'qimalarni 5 gruppaga bo'lishdi.

1. Embrional (tuzuvchi, tashkil etuvchi, yaratuvchi meristema).
2. Qoplovchi to'qima (pokrovnaya tkan)
3. Mexanik to'qima (mexanicheskaya tkan)
4. O'tkazuvchi to'qima (provodyashaya tkan)
5. Asosiy negiz to'qima (osnovnaya tkan).
6. Hosil qiluvchi to'qimalar (Obrazovatelny tkan).

Hosil qiluvchi to'qimalar

O'simliklarning o'suvchi qismlarida bitta yoki bir nechta initsial hujayralar bo'ladi. Masalan: qirqbo'g'im, qirqquloq poyasining uchida bitta initsial hujayra, gullik o'simliklar ildizining, poyasining uchida bir nechta initsial ya'ni boshlang'ich hujayra bo'ladi. Initsial hujayralarning bo'linib ko'payib turishi natijasida «birlamchi meristema» paydo bo'ladi. Birlamchi meristemaning hujayralari kariokinez yo'lida bo'linib ko'payib uch xil qavat hujayralarni paydo qiladi.

1. Tashqi qavati - Dermatogen
2. O'rtacha qavat - Periblema
3. Ichki qavat - Pleroma

Dermatogen qatlami hujayralarning antiklinal, ya'ni o'sish konusi yuzasiga nisbatan perpendikulyar bo'linishi natijasida keyinchalik ildizning birlamchi qoplovchi to'qimasi kelib chiqadi.

Periblema qavati bir necha kator hujayralardan iborat bo'lib, uning hujayralari periklinal, ya'ni o'sish konusi yuzasiga nisbatan parallel bo'linadi va ulardan asosiy to'qima hosil bo'ladi.

Pleroma hujayralari turli yo'nalishda bo'linish xususiyatiga ega bo'lib, ulardan ildizning mexanik va o'tkazuvchi to'qimalari hosil bo'ladi. Poyaning o'sish konusi biri ikkinchisini yopib turuvchi mayda barglar bilan o'ralgan. Ular poyaning uchki qismi bilan birgalikda kurtak hosil qilishi. Poyaning o'sish konusida odatda 2 turdagi hujayralar guruxi ajratiladi: tashqi qavat (tunika) va ichki (korpus). Tunika hujayralari dermatogen hujayralariga o'xshash xususiyatiga ega va ulardan poyaning epidermasi hosil bo'ladi. Korpus qavati hujayralari turli yo'nalishda bo'linishi sababli ulardan poyaning birlamchi tuzilishiga xos bo'lgan barcha to'qimalar kelib chiqadi.

BIRLAMCHI MERISTEMA

Kelib chiqishga ko'ra hosil qiluvchi to'qimalar va ikkilamchi to'qimalarga bo'linadi. Birlamchi meristema urug' murtagida, poya, ildiz va ularning uchlarida yon poyalar hamda kurtaklarda joylashib, yangi organlar-ning hosil bo'lishini shuningdek o'simliklarning bo'yiga o'sishini ta'minlaydi. Birlamchi meristemadan paydo bo'lgan to'qimalarning hammasi birlamchi to'qima deb ataladi. Bir pallalik o'simliklarning to'qimalari birlamchi to'qima. Ikki pallali o'simliklarda birlamchi va ikkilamchi to'qimalar bo'ladi.

IKKILAMCHI MERISTEMA

Ikkilamchi meristemaga boylamlar va probka kambiy yoki fellogen kiradi. Boylamlararo kambiy o'simlik organlarining eniga o'sishini ta'minlaydi, fellogen esa ikkilamchi to'qima peridermani hosil qiladi. O'sayotgan meristema tik hujayralar po'stini tarkibida 92,5% suv qolgan 7,5% quruq qismining tarkibida pektin gemitsellyulomgemitsellyuloza, protein va shu kabi moddalar uchraydi. Bu hujayralarning yadrosi ham katta bo'ladi. YAdro hajmining hujayra sitoplazmasi hajmiga nisbati $3/2 - 4/3$ ni tashkil etadi. Meristema hujayrasida ko'pincha 1 ta yadrocha bo'lib, uning tarkibida proteindan tashqari RNK, fosfolipidlar, oltingugurt, kaliy, kalsiy bor.

1. Tapa meristema (verxushechnaya - Apikal-meristema).
 2. Yon meristema (Bokovaya meristema - Lateral - meristema) Bunga kambiy va fellogen kiradi.
 3. Oraliq meristema (Vstavochneya meristema -Interkolyar meristema).
- Bular g'alladoshlarni poyasidagi bo'g'im oralig'i bo'ladi.

Tapa meristema. (Apikal)

Tepa meristema vegetativ navda va gul navda hosil qiluvchi hamda ildiz uchi meristemalariga bo'linadi va ular ildiz bilan poyalarning uchida joylashadi. Bu meristema hisobiga organlar doimo bo'yiga o'sib turadi. Apikal meristemaning tuzilishi turli organlarda har xil. Masalan endogen usulda o'sadigan ildiz apeksi burglar va yon novdalar xosil qilmaydi. Poya apeksi ekzogen usulda o'sib undan burglar va yon novdalar xosil bo'ladi. Apikal meristemada 3 xil to'qimalar:

- 1) protoderma - qoplovchi to'qima;
- 2) prokambiy - o'tkazuvchi to'qima
- 3) meristema - asosiy tuqima, hosil qiluvchi gruppaga hujayralar mavjud.

Yon meristema. (Lateral meristema).

Yon meristemalarga ildiz va poyalar markaziy slindrining atrofida joylashgan perisikl prokambiy va kambiyalar kiradi. Yon meristema kelib chiqishi jihatidan ikkilamchi meristema bo'lib, u ko'p yillik, ikki pallali o'simliklar ildizi va poyasining ksilema hamda floema qismining o'rtasida ular yuzasiga parallel bo'lib joylashadi va u kambiy deyiladi. Yon meristema organlarning eniga o'sishini ta'minlaydi.

Oraliq meristema (Interkolyar meristema)

Bu meristema poya bo'g'im oralig'ining bazal qismida, ya'ni ostida hamda bargda hosil bo'ladi. Interkolyar o'sish keng tarqalgan u qirqbo'g'im, shuningdek, qo'ng'irboshdoshlar o'simliklarda, seldergullilar va shu kabi boshqa ikki pallali larning vakillarida bo'ladi. Interkolyar o'sish hamma poyalarda uchraydi. Ammo har xil o'simliklarda uning intensivligi va o'sish muddati turlichadir. Masalan, eryong'oq (araxic) o'simligida aktiv interkolyar meristema hujayralarining uzluksiz bo'linishi natijasida rivojlanayotgan meva tuproq ostida hosil bo'ladi. Qo'ng'irboshdoshlar (bug'doy, arpa, javdar, makkajo'xori, sholi) da interkolyar o'sish hisobiga bo'g'im oralig'i uzayadi. Ma'lum vaqtdan keyin bo'g'im oralig'ida o'sish to'xtaydi, amma uning ba'zi joylarida kichik interkolyar o'sish to'qimalari o'z faoliyatini to'xtatmaydi. SHu sababli yotib qolgan poyalar ana shu to'qimalar hisobiga yana qayta tiklanadi.⁶

Meristema avvalo urug'ning embrionida vujudga keladi. Urug'ning unib chiqishida meristema ayrim uchastkalarga bo'linib ketadi. Bular xar bir poyaning, ildizning uchida, xar bir bargning asosiy qismida va poyalarini bo'g'im oralig'larida joylashgan bo'ladi. Meristemaning hujayrasi yupqa va silliq parda bilan o'ralib olgan. Pardasi toza sellyulozadan tuzilgan. Bunda suberin, lignin yo'q. Hujayrasining ichi protoplazma bilan to'lgan. YAdrosi hujayraning markazida joylashgan. Vakuola va plastidlar boshlang'ich davrlardagina bo'lgan.

Ikkilamchi meristema - fellogendan ikkilamchi qoplovchi to'qima paydo bo'ladi.

Yara meristema

O'simlikning biror qismi zararlansa o'sha erda bu meristema hosil bo'lishi mumkin. Yara meristema parenxima to'qimalarning tirik hujayralaridan hosil bo'ladi. Meristema- bir-biri bilan jich joylashgan katta yadroli, po'sti yupqa (pectin va sellyulozali) ,ichi faqat sitoplazma to'lgan vakuolasiz, tirik hujayralar yig'indisidan tashkil topgan. Bu hujayralar intensiv bo'linishi va differensiyalanish xususiyatiga ega. YA'ni ulardan xar xil to'qimalar hosil bo'lib turadi.

4. ⁶ Васильев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “Высшая школа”, 1988. -435 с.

HUJAYRANING KO'PAYISHI

Hujayra bo'linishi natijasida bir va ko'p hujayraki organizmlarning miqdori oshib boradi. Hujayra bo'linishiga olib keladigan sabablar turlicha: 1. Yadro va sitoplazma hajmi nisbatining buzilishi sitoplazma hajmining haddan tashqari ortishiga olib keladi, bu esa yadro tomonidan sitoplazmada bo'lib turadigan hayotiy jarayonlarni boshqarishni mutloqo qiyinlashtiradi. 2. Hujayra ichidagi hosilalar shu darajada ko'payadiki, bu hajmni hujayra po'sti sig'dirolmay qoladi. 3. Turli xil stimulyatorlar ta'siri ham hujayralarning bo'linishiga olib keladi. Ana shunday ta'sir ko'rsatuvchi moddalarga marganets, kaliy tuzlari, gormonlar va boshqalar kiradi. Hujayra bo'linishidan oldin hujayrada kerakli miqdorda oqsil, nuklein kislota hamda energetic moddalar to'planadi. Natijada DNK ikki barobar ko'payadi. Yadro va hujayra asosan uch xil:

1. Oddiy yo'lda bo'linish- amitoz
2. Murakkab bo'linish- mitoz
3. Endomitoz (ba'zi xollarda)

Amitoz bo'linish

Bu bo'linishni birinchi bo'lib rus olimi N. Jelejnov 1840 yilda aniqlangan. Amitoz bo'linishining mohiyati shundaki, bunda hujayra organellalari hamda yadroning strukturaviy o'zgarishsiz hujayra qismi ikkiga bo'linadi. Bunda optik mikroskopda xromosomalarning mitoz bo'linishda bo'ladigan o'zgarishlari kuzatilmaydi. Ba'zan yadroning yadrocha va yadro po'sti erimasdan turib ikkiga bo'linadi. Axromatin iplari hosil bo'lmaydi. Ayrim vaqtlarda amitoz bo'linishda hujayra emas, faqat yadro bo'linadi va natijada ko'p yadroli hujayra yoki poliploidiya hosil bo'ladi.

SHunday qilib, amitozda yadro moddasi yangi hosil bo'gan hujayralar orasida ko'pincha tang taqsimlanmaydi hamda biologik (genetik) bir xil tenglikdagi hujayralar shakllanmaydi. SHu sababli amitoz potologik hodisa deb qaraladi, bu bo'linish ko'pincha qarigan va kasallikka duchor bo'lgan hujayralaeda kuzatiladi.

Bakteriyalar hamda ba'zi suv o'tlari oddiy yo'lda bo'linib ko'payadi. Prof. Karolinskaya 1947 yil gulli o'simliklarning ham ba'zi birlari oddiy yo'lda bo'linishligini ko'rsatadi.

Buni piyozni po'stida va ba'zi bir o'simliklarning poyasida ko'rish mumkin. Hujayraning murakkab yo'lda bo'linishi o'z galida 2 ga bo'linadi.

1. Kariokinez yo'lda bo'linish.
2. Reduksion yo'lda bo'linish.

O'simliklarning vegetativ organlarining (ildiz, poya, barg) hujayralari Kariokinez yo'lda ko'payadi. O'simlikning generativ organlari (gul, meva, urug') ning hujayralari reduksion yo'lda bo'linadi.

K A R I O K I N E Z (MITOZ)

Kario - yadro, kinez - o'zgarish. Hujayraning kario-kinez yo'lda bo'linib ko'payishini 1874 yilda Moskva universitetining prof. Chistyakov plaun va qirqbo'g'im sporalarning rivojlanishini o'rganayotgan paytda o'simliklardagi bo'linishini kashf etgan. Keyinchalik 1875 yilda Bonn universitetining professori Strasburger bu bo'linishni batafsil o'rganib unga mitoz ("mito" –ipcha) deb nom bergan. Bu termin hozirgi vaqtda 1878 yilda Shleyxer taklif qilgan "kariokinez" termini o'rniga ishlatiladi.

Yadro bo'linishidan so'ng butun hujayrani ro'y beradi va yangi hujayra po'sti vujudga keladi. Mitoz bo'linishini mohiyati shundaki, bu bo'linishdan so'ng hosil bo'lgan yangi ikki

hujayralarning har qaysisida irsiy materiallar, ya'ni xromosomalar miqdori bo'linishga qadar bo'lgan ona hujayra xromosomalari miqdoriga teng bo'ladi, bu bo'linishdan keyin hosil bo'lgan ikki hujayrada xromosomalar miqdori kamaymaydi. Boshqacha qilib aytganda xromosomalarning xususiyati saqlanadi.

Hujayraning bo'linishidan navbatdagi bo'lgan davr interfaza yoki interkinez deyiladi. Interfazadan keyin esa mitoz boshlanadi. Interfazada hujayradagi xromosomalarda DNK sintezi bo'ladi, oqsillar va energetik material to'planadi. Bu davrda yana eng muxim vakillardan biri xromosomalarning reduplikatsiyasi, ya'ni ular miqdorining ikki barobar oshishi kuzatiladi. Mitoz bir soatga davom etadi, metotik sikl esa 10-20 soat chamasida bo'ladi. Hujayra kariokinez yo'lida bo'linib, o'z boshidan 4 ta davrni kechiradi:

1. Profaza
2. Metofaza
3. Anafaza
4. Telofaza

Yadro profazada yadroning xromatin moddadan xromosoma vujudga keladi. Xromosomaning borligini 1871 yilda Moskva universitetining prof. CHistyakov topgan. Xromosomaning soni har xil o'simlik hujayrasida har xil bo'ladi. Xromosomaning shakli taqasimon bo'ladi. Xromosomaning bo'yi 20 mk, eni 3 mk. Xromosomaning soni va sifatini tashqi muhit hamda odamlar ta'sirida o'zgartirish mumkin. Rus olimlari xromosoma sonini o'zgartirish bilan bahorgi bug'doyni kuzgi bug'doyga aylantirganlar.

(bahorgi) 28 ta xromosoma

(kuzgi) 42 ta xromosoma

Metafaza yadroning pardasi va yadrocha erib ketadi.

Xromosomalar hujayraning markaziga to'planadi. Bu fazada xromosomalar uzunasiga har qaysisi o'rtasidan 2 ga bo'linadi. Demak, xromosomalarning soni 2 marta oshdi.

Anafaza xromosomalarning yarmi hujayraning bir tomoniga, ikkinchi yarmi 2 tomoniga joylashadi. Xromosomalar bir - birlari bilan axromatin iplari yordamida tortilib turadi. Demak, bu faza xromosomalar hujayralarning 2 ta qutbiga joylashadi.

Telofazada hujayraning har ikkala tomonidan 1 tadan 2 ta yadro hosil bo'ladi. SHundan so'ng hujayra o'rtasidan 2 ga bo'linadi. Natijada, «bitta ona hujayradan 2 ta qiz hujayrasi hosil bo'ladi».

Ona hujayraning xromosomalarining soni qiz hujayralarining xromosomalar soni bilan teng bo'ladi.

ENDOMITOZ

Bu bo'linish hujayraning interfaza holatida, ya'ni uning ichida ro'y beradi. Bunda hujayraning o'zi bo'linmaydi. Endomitozda xromosomalar reduplikatsiyasi (xromosomalarning ikki barobar ortishi) kuzatiladi, lekin xromosomalar hujayra qutbiga tomon ajralmaydi. Bu hodisani birinchi bo'lib, 1925 yilda K.I.Meer kuzatgan.

Endomitoz bo'linishda xromosomalar soni ortadi-yu, axromatin iplari hosil bo'lmaydi, yadrocha va yadro po'sti saqlanib qoladi. Endomitoz hujayralarda bir necha marta takrorlansa unda hosil bo'lgan yadro juda kattalashib, u ko'p miqdorli xromosomaga ega bo'ladi. Mazkur jarayon poliploidga olib keladi. Poliploidlarda xromosomalar soni gaploid yadrodagiga nisbatan uch marta ortsa triploid, to'rt marta ortsa tetraploid yadro deyiladi. Tabiatda poliploidlarni hosil bo'lishi juda katta ahamiyatga ega, chunki ular xo'jalikda ishlatiladigan qimmatbaho maxsulotlarni yaratadi, tanlash va ko'paytirishda keng ishlatiladi.

REDUKSION

Hujayraning reduksion yo'lida bo'linishi 2 tipdan iborat:

1. Geterotipik
2. Gomeotipik

Reduksion bo'linishda ham yadro 4 davrni boshidan kechiradi: Reduksion bo'linishning geterotipik tipida metafazada xromasomalar 2 ga bo'linmaydi. SHuning uchun ham **geterotipik** bo'linishning oxirgi davri telofazada hosil bo'lgan qiz hujayralarda xromasomalarining soni ona hujayrasinikidan 2 marta kam bo'ladi. Hosil bo'lgan hujayra **diploid** reduksion bo'linishning **gomeotipik** tipda hosil bo'lgan qiz hujayralar yadrosi yana bo'lina boshlaydi. Bu bo'linish kariokinezga o'xshash bo'ladi, ya'ni metafazada xromasomalar o'rtasidan 2 ga bo'linishadi. Bu tipda 1 ta ona hujayradan 4 ta qiz hujayra hosil bo'ladi. Bu hujayralarning **tetrada** deyiladi. Qiz hujayralar-ning xromasomalari soni ona hujayralarning xromoso-masi sonidan 2 marta kam bo'ladi.

QOPLOVCHI TO'QIMA.

Qoplovchi to'qima deganda o'simlik tanasini ustki tomondan qoplab turuvchi hujayralar yig'indisiga tushuniladi. O'simlik tanasini qoplovchi to'qimalar tuzilishi va bajaradigan vazifasiga ko'ra har xil bo'ladi. Qoplovchi to'qima o'simlikning barcha organlarini qurib qolishdan va tashqi muhitning boshqa noqulay sharoitlaridan, ya'ni ortiqcha quyosh ta'siridan, kuchli isib ketishdan mexanik shikastlanishdan, zararkuranda mikroorganizmlarning ichki to'qimalarga kirishidan himoya qiladi. Ildizdagi qoplovchi to'qimalar esa suv va unda erigan mineral moddalarni shimishda, tuproqda uchraydigan ba'zi qattiq elementlarni eritish jarayoni hamda ildizning ichki to'qimalarini mexanik taassurotlardan saqlaydi. Qoplovchi to'qima kelib chiqishi va joylashishi jihatdan 3 xil bo'ladi.

1. Birlamchi qoplovchi to'qima - epidermis
2. Ikkilamchi qoplovchi to'qima - periblema.
3. Quruq po'stloq

Epidermis dermatogendan hosil bo'ladi. Ikkilamchi qoplovchi to'qima esa fellogen hosil bo'ladi.

Bir pallali o'simliklarning hamma organlari, ikki pallali o'simliklarning barglari va yosh novdalari epidermis bilan qoplangan, qolgan organlari esa ikkilamchi qoplovchi to'qima bilan qoplangan.

EPIDERMIS

Epidermis bir - biri bilan zich joylashgan tirik parenxima hujayralardan tashkil topgan. . O'simlikning yosh organlarini quyosh nuri ta'sirida qurib qolishdan saqlaydi. Barg orqali bo'lib turadigan transpiratsiyani chegaralaydi va boshqa mexanik ta'sirlardan ximoya qiladi. Epidermis hujayralarida hujayra oralig'i bo'lmaydi. Bir pallali o'simliklarda epidermis hujayra po'sti to'g'ri chiziqli, ikki pallali o'simliklarda esa egri - bugri bo'ladi.

Epidermis hujayralari odatda rangsiz bo'ladi. Ba'zi bir o'simliklarning epidermisida, masalan, qirqquloq o'simligida shuningdek soya va salqin erda yashaydigan o'simliklarning epidermisida xlorofil donachalari bo'ladi. Ba'zi bir o'simliklarning epidermisida antotsian deb atalgan pigment bo'ladi. Masalan, begoniya, tardeskansiya deb atalgan o'simliklarning ranggi qizil va binafsha bo'ladi. Epidermis hujayralarning tashqi qisman, yon po'sti qalinlashgan bo'ladi. Tashqi po'sti kutin moddasi bilan sug'orilgan. Kutin moddadan epidermisning ustida kutikula qavati hosil bo'ladi. Kutikula o'zidan suvni va havoni o'tkazmaydi. SHuning uchun epidermis o'simliklarning ko'p suv bug'latishdan va qurg'oqchilikdan saqlaydi. Ba'zan

epidermisda suv to'planadi. Ba'zi o'simliklarning ustida mum izlari ham bo'ladi. Masalan, olxo'ring mevasida, chinnigulning mevasida, karam bargida. Mum izlari qalinligi 0,1 mm gacha bo'lishi mumkin. Janubiy Amerikadagi, Voskovaya palma deb atalgan o'simlikda mum izlari 5 mm qalinlikda bo'ladi. Mum murakkab tuzilgan efir bo'lib, 100⁰ temperaturada eriydi. Mum ham kutikulaga o'xshash vazifasini bajarib turadi. Epidermisda teshikchalar bo'ladi. Bu teshikchalarni ustitsa (ba'zan og'izchalar deb ham ataladi) deb yuritiladi. Epidermis bilan qoplangan o'simlik organlari ustitsa yordamida suvlarni bug'latib turadi. Gaz almashish protsessi ham ustitsalar yordamida bo'ladi. Ustitsalar doimo ochilib ham yopilib turadi. Ustitsalarning ochilib ham yopilib turishi sharoitga bog'liq bo'ladi. Ustitsalarning ikki tomonida berkituvchi (qamrovchi - замыкающие клетки) hujayra bor. Bu hujayra xlorofil donachalari bo'ladi.

Xlorofil donachalarida fotosintez protsessi bo'lib, shakar to'planadi. SHakarlarga to'yingan hujayra o'ziga suvni tortadi. Natijada bu hujayra TURGOR xolati ro'y beradi. Ana shu vaqtda ustitsalarning teshigi ochiladi. Aksincha xolatda ya'ni fotosintez protsessi to'xtagan vaqtda ustitsalarning hujayralari so'liydi, ya'ni plazmoliz ro'y beradi.

Bu xolatda esa ustitsalarning teshiklari yopiladi. Demak ustitsalar ham ochilib, ham yopilib turadi. Ustitsalarning tagida xavo turadigan bo'shliq joyi bor. Demak mana shu ustitsalar orqali o'simliklar nafas olib, oziqlanib va ortiqcha suvlarni parlantirib turadi. O'simliklarda xavo ustitsalardan tashqari suv chiqarib turadigan ustitsalar ham bo'ladi. Bu ustitsalar gidatodalar deb ataladi. Gidatodalar hamma vaqt ochiq bo'ladi. Chunki uning hujayralari hamma vaqt turgor xolatda turadi. Suvni chiqarib turishi gutatsiya deb ataladi. (gutta tomchi). Gidatodalar barglarning er ustki organlarida bo'ladi. Masalan, poya, barg va boshqalar. O'simlik ildizida ustitsalar bo'lmaydi. Ustitsalar o'simliklarning yashash sharoitiga qarab bargning pastki epidermisi 1 kv mm satxda 100-300 tagacha ustitsalar bo'lishi mumkin. Kungaboqar bargining 1 kv, mm satxda 200 tagacha ustitsa bor.

Epidermisdan har xil tuklar o'sib chiqadi. (valoski, trixoma) Tuklar havoning harakatini susaytiradi, shuning natijasida o'simliklar suvni kam bug'latadi. SHuningdek tuklar o'simliklar issiqdan va sovuqdan saqlab turadi. Ba'zan tuklar boshqa vazifalarni ham bajarib turadi. Masalan, labguldoshlar oilasiga kiruvchi o'simliklardan bezli tuklar efir moylarini ishlab chiqaradi.

Qichitqi, chayono't (krapiva) deb atalgan o'simliklarning tuklari zaxarli bo'ladi. SHu bilan bu tuklar o'simlikni muhofaza qiladi. Ba'zi bir o'simliklarda tuklar tikanga aylanib ketgan bo'ladi. Masalan, yantoq, chaqir tikanak va boshqalar. Jiyda daraxti bargidagi tuklar yulduzsimon shaklda bo'ladi. Bu tuklar ko'p hujayrali, o'siq bo'ladi. SHuning uchun ham jiyda bargi oqish bo'lib ko'rinadi. Ildiz tuklari orqali oziq moddalarni suvda erigan xolda shimadi. Ildiz tuklari tirik bo'ladi. Ular qisqa umrli efemerdir. 10-20 kungacha yashaydi. SHuning uchun ham ularning soni nixoyat darajada ko'p bo'ladi. Tuklar ildizning shimuvchi satxini kengaytirib turadi.

IKKILAMCHI QOPLOVCHI TO'QIMA - PERIDERMA

Birlamchi qoplovchi to'qima epidermisning o'simlik tanasining o'sishi ta'siri oqibatida bo'lina borishi va ko'payishi xar xil o'simliklarda xar xil kechadi. Ayrim o'simliklarda epidermis bir necha oy, hatto bir necha yilgacha yashasa, boshqa o'simliklarda bir necha haftadan bir necha oyga qadar davom etadi. Ikkilamchi qoplovchi to'qima fellogen deb atalgan tug'diruvchi to'qimadan hosil bo'ladi. Ba'zi bir o'simliklarda fellogen epidermis tagida joylashgan hujayralardan tuzilgan bo'ladi. Masalan, qayin, dub, chinor, zarang daraxtlari. Ba'zan fellogen epidermis-ning o'zidan ham hosil bo'ladi. Masalan, olma, tol va boshqalar.

Ba'zan fellogen po'stloqning ichkariroq joylashgan hujayralaridan hosil bo'ladi. Fellogen-ning hujayralari kariokinez usulda bo'linib ko'payib turadi. Natijada fellogen o'zidan yuqoriga probkani (fellemani), ichkariga fellodermani (po'stloqni) ishlab chiqaradi.

Fellemaning tashqi tomoni suberin moddasi bilan sug'orilib probkalanadi. Probka tarkibidagi suberin 58%, sellyuloza 22 %, lignin 15%, suv 5% dir. Probkalanagan hujayra o'zidan, suvni, havoni, changlarni, tovushni, elektrni o'tkazmaydi. SHuning uchun sanoatda probka katta ahamiyatga ega. Masalan, samolyotsozlikda, xolodilnik ishlab chiqarishda va boshqalarda ishlatiladi.

Probkani dub daraxtidan olinadi. Probka beradigan dub daraxti qora dengiz bo'ylarida o'sadi. Probkasi 15 sm gacha bo'ladi. Probka tushib ketmaydi. Probka dub daraxtidan xar 10-15 yilda kesib olinadi. Probkani amurskoe barxatnoe derevo daraxtidan olish mumkin. Bu daraxtning probkasi uncha qalin emas, sifati ham probka dubidan past bo'ladi, shuning uchun ham undan qurtqaruvchi moddalar tayyorlanadi. Probkaning ichi odatda havo bilan to'la bo'ladi. Probka o'simliklarning meva po'stida (anor meva po'sti), tugunagida (kartoshka tugunagida) ham uchraydi. Probka bilan qoplangan o'simlik organlari chechevichkalar orqali nafas olib, suv bug'latib turadi. CHEchevichka bor joyda probka bo'lmaydi. Probka o'rnida yumshoq, siyrak joylashgan hujayralar bo'ladi. Ana shu hujayralar orqali suv bug'lanadi va gaz almashish protsessi bo'ladi. CHEchevichkani ustitsadan farqi shu.

Periderma ba'zan po'kak to'qima deb ham ataladi. Po'kak to'qima epidermisning nobud bo'lishi natijasida meristema deb ataladigan maxsus gormonlar ta'siri hosil qiluvchi to'qima hisobiga shakllanadi.

UCHLAMCHI QOPLOVCHI TO'QIMA (KORKA -QOBIQ)

Ko'p yillik daraxt o'simliklarning poyalarida probka o'rmini asta-sekin quruq po'stloq egallaydi. SH sababli uni ba'zan uchlamchi qoplovchi to'qima deb ham yuritiladi. Daraxtsimon o'simliklar poyasi kambiy qavatini uzluksiz rivojlanishi natijasida doimo eniga o'sib yo'g'onlashib turadi, poyaning ana shunday eniga o'sish davomida 2-3 yildan so'ng periderma yoriladi. Fellogen faoliyatining harakteriga ko'ra turli ko'rinishdagi po'stloq hosil bo'lishi mumkin. Fellogenning doira shaklda joy olishdan xalqasimon po'stloq hosil bo'ladi. Agarda fellogen ayrim bo'laklar shaklida hosil bo'lsa, tangachasimon po'stloq hosil bo'ladi. Poya po'stlog'ining ichki qatlamlaridan yangi fellogen hosil bo'ladi va undan yangi probka qavati rivojlanadi.

Fellogen bir necha yillar davomida probkani ishlab chiqazib turadi. Keyinchalik fellogen hujayralari o'ladi. Po'stloqning ichkari tomonidagi hujayralardan yangi fellogen hosil bo'ladi. Bu hosil bo'lgan fellogen o'zidan yuqoriga probkani, ichkari tomonga esa fellodermani ishlab chiqaradi. Qaytadan hosil bo'lgan probkani tashqari tomondagi xujayralarning hammasi o'ladi. CHunki o'zidan suvni va havoni o'tkazmaydi. Bu hujayralardan oziq moddalar etib bormaydi.

Bu o'lgan hujayralar qobiqqa aylanadi. Qayin daraxtida qobig' 8-10 yildan so'ng, dub daraxtida 25 yildan so'ng, paxtada esa 50 yildan qobig' vujudga keladi. Qobig'ning qadinligi 10 sm ga etadi. Qobig' daraxtlarda vaqti bilan tushib turadi. Qobig'ning tushishi daraxtlarga zarar etkazmaydi. Qobig' 1 qatorda xashoratlarni ham tushib turadi.

Nazorat savollari

1. Hujayrada qanday oziqa moddalar uchraydi?
2. Hujayradagi zapas oziqa moddalarni (kraxmal, oqsil, yog') aniqlash reaksiyalari?
3. Hujayra shirasida uchraydigan moddalar (oshlovchi moddalar, inulin va shilimshiq moddalar- sliz) va ularni aniqlash reaksiyalari?

4. Hujayrada qanday kristallar uchraydi?
5. Hujayra shirasida qanday pigmentlar uchraydi?
6. Hujayra po'stining tuzilishi, vazifasi va kimyoviy tarkibini o'zgarishi va ularni aniqlash reaksiyalari?
7. To'qima nima va ular qanday guruhlarga bo'linadi?
8. Hosil qiluvchi to'qima va uning vazifasi ?
9. Hujayraning reduksion bo'linishi qanday sodir bo'ladi?
10. Qoplovchi to'qimalarning vazifalari va ularning xillari?

Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o'quv qo'llanmalar ro'yxati

1. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. – T.: O'zbekiston, 2005.- 435 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A., Samatova SH. O'simliklar sistematikasidan amaliy mashg'ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
4. Ahmedov O'.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elaktron darslik.-T.: 2008.
5. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –14p.
6. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
7. Hamidov A., Nabiev M.M. “O'zbekiston o'simliklarini aniqlagichi”.-T.: 1987.-235 b.
8. Васильев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “Высшая школа”, 1988. -435 с.
9. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O'.A. va boshqalar. Dorivor o'simliklarning lotincha-o'zbekcha-ruscha-arabcha va forscha-tojikcha lug'ati.-T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
10. Березовская Т.П., Дмитрук С.Е., Гришина Е.И., Белоусов М.В. Основы фармацевтической ботаники. – Томск: Печатная мануфактура, 2004.-294 с.
11. Xolmatov X.X., Ahmedov O'. A. Farmakognoziya. 1-2 qism. – T.: “Ibn Sino” nashriyoti, 2007.- 806 b.

Ma'ruza – 3

Mexanik o'tkazuvchi, ajratuvchi va asosiy to'qimalar

Reja:

1. Mexanik to'qima, ularning vazifasi
2. O'tkazuvchi to'qima, ularning vazifasi
3. Asosiy to'qima, ularning vazifasi
4. Ajratuvchi to'qima, ularning vazifasi
5. Xazm bezlari va osmafolarlar
6. O'simlik organlari (Organografiya)
7. Ildiz morfologiyasi
8. Ildizning anatomiyasi
9. Birlamchi ildizning anatomiyasi
10. Ikkilamchi ildizning anatomiyasi
11. SHakli o'zargan (metamorfoz) ildizlar.
12. Ildizdagi tugunak bakteriyalar va mikoriza

Tayanch iboralar: *Mexanik to'qima. Uning xillari. Mexanik to'qimalarning umumiy xususiyati va vazifasi. Mexanik to'qima xillari: kollenxima, sklereid va sklerenxima. Burchakli, plastinkali va yumshoq kollenximalarning tuzilishi va uchraydigan joylari. Sklereid tuzilishi. Sklerenximaning umumiy xususiyati, tuzilishi va vazifasi. Sklerenxima turlari: tolalar va sklereid. Ksilema tolasi (yog'och tolasi). O'simlik tanasida mexanik to'qimalarning joylanishi. O'tkazuvchi to'qimalar, ksilema va floema. Birlamchi va ikkilamchi ksilema hamda ularning elementlari, xususiyati, bajaradigan vazifasi. Ksilema (yog'ochlik) elementlari. Floema (lub) elementlari.*

MEXANIK TO'QIMA

Ma'lumki, o'simliklarda ularning tanasini tik tutib turadigan va har qanday tashqi muhitning qarshiligiga bardosh bera oladigan skelet yo'q. Bundan tashqari, o'simlikda tashqi muhit qarshiliklari (shamol, bo'ron)ga bardosh beradigan, muskul va uni boshqarib turadigan sistema yo'q. Lekin o'simlik, ko'pincha bu qarshiliklarga osonlik bilan bardosh beradi. Chunki unda tashqi muhit ta'siriga bardosh beradigan, uni mustahkam tutib turadigan to'qimalar kompleksi, mavjud. Ular **mexanik to'qimalar** deb yuritiladi.

Mexanik to'qimalar kelib chiqishi jixatidan 2 ga bulinadi.

1. Parenxim xujayradan kelib chiqqan mexanik tuqima, SHakli prozenxim xujayraga o`xshash.

2. Prozenxim xujayradan kelib chiqqan mexanik tuqima.

SHakli prozenhjim hujayraga o`xshash.

Parenxim hujayradan kelib chiqqan mexanik to'qima 2 xil buladi:

1. Kollenxima.

2. Sklereid.

Prozenxim xujayradan kelib chiqqan mexanik tuqimaga sklerenxima kiradi. Biz bular tug'risida aloxida to'htalib o'tamiz.

Kollenxima hujayralari devorining hamma joyi ham bir xilda qalinlashmaganligi bilan xarakterlanadi. Qalinlashish yoki hujayra burchaklarida sodir bo'ladigan jarayon **burchaksimon koilenxima** deb yuritiladi. Odatda, hujayra devorining bunday qalinlashishi tangental ravishda sodir bo'lib, bu plastinkasimon koilenximadir. Qalinlashish selluloza va pektin moddalari aralashmasining hujayra devoriga qatlam-qatlam bo'lib joylashishi natijasida sodir bo'ladi. Bunda lignin moddasi ishtirok etmaydi. Koilenxima hujayralarining shakli parenximatik hujayra shaklidan prozenximatik hujayra shakliga qadar o'zgarib turadi. Uning o'tmas qirra yon uzunligi ko'pincha 2 mm dan oshmaydi. Koilenxima to'qimalari lub to'qimalariga nisbatan kuchsiz. Uning hujayralari tirik, xlorofilli bo'lib, organlarining o'sishiga halaqit bermaydi. Aksincha, koilenxima hamma vaqt o'sish qismlari bilan bog'liq bo'ladi, unga halaqit bermagan holda mahkamligini oshira boradi. Kollenximaning cho'zilish qobiliyati vaqt o'tishi, o'simlik yoshining ulg'aya borishi bilan pasaya boradi. O'simlik poyasida ikkilamchi qoplovchi to'qimaning shakllanishi bilan bir vaqtda birlamchi to'qima kollenximaning faoliyati to'xtaydi. Ikki pallali o'simliklarda koilenxima epidermis ostida joylashgan bo'ladi. Aksariyat hollarda birlamchi po'stning periferik qismida, barg bandi (qovoq)da, g'alladoshlar poyasining barg bilan tutashgan bo'g'imida uchraydi.

Sklerenxima urugii o'simliklarning barcha organlari (ildiz, poya, barg va guli)da keng tarqalgan. Uning hujayralari bir qadar uzun tortgan, burchaklari o'tkirlashgan bo'lib, hujayra devori bir tekisda qalinlashgan. Odatda, sklerenxima hujayralari juda zich joylashgan bo'lib, hujayra oraliqlarida bo'shliq bo'lmaydi. Alohida olingan sklerenxima hujayrasini qalin devorli yoki **elementar tola** deb atash mumkin).

Qo'shimcha elementar tolalar parenximada tola bog'lamlari shaklida dasta-dasta bo'lib joylashadi. Alohida olingan tola bog'lami **mexanik tola** deyiladi. Sklerenxima hujayralarining


po'sti yog'ochlangan bo'lishi yoki selluloza holda qolishi mumkin. Hujayralarning tirik qismi ko'pincha o'z hayotchanligini yo'qotib, qurib qoladi.

O'zining kelib chiqishiga ko'ra, sklerenxima prokambial hujayralardan yoki perisikl bogiamlaridan hosil bo'ladi. Ikkilamchi sklerenxima kambiydan shakllanadi. O'simlik poyasining po'st qismida joylashgan sklerenxima tolalari **lub tolalar** deb ataladi. Perisiklik tolalarning hujayra devori uzoq vaqtga qadar o'z holatini yo'qotmaydi, lekin ayrim hollarda yog'ochlanishi mumkin.

Kambiydan shakllangan va ksilema (yog'ochlik)da joylashgan sklerenxima tolalari **yog'ochlangan tolalar** deyiladi. Bu tolalarga traxeya tolalari va libriform (Libes — lub, forma — shakl degan ma'noni anglatadi) o'simlikka mahkamlik beradigan yog'ochlik hujayralariga taalluqlidir. Ularning hujayra devori lub tolalaridan farqli ravishda har qanday holda ham yog'ochlangan bo'ladi. Lub tolalari poya va ildizning po'stida, barg bandi va shapalog'ida, gul va meva bandida, ayrim hollarda mevalarda uchraydi. Ular o't o'simliklarda daraxt va butalardagiga nisbatan ko'proq uchraydi. Xurmo daraxti bargida lub tolalari hosil bo'ladi. Lub hujayrasi juda uzun bo'lib, uning devori nihoyatda qalinlashgan bo'ladi. Masalan, zig'ir o'simligining lub hujayralari devori umumiy hajmining 90% gacha boigan qismini tashkil etadi. Lub tolalarining uzunligi bir xil emas, masalan, zig'irda uning o'rtacha uzunligi 40—60 mm, kendirda 2—55 mm, rami o'simligida 350—420 mm ga etadi. Lub tolalarining eni esa hammasi bo'lib bir necha mikron keladi.

Lub tolalarining muhim xususiyati, uning elastikligi bo'lib, to'qimachilik sanoatida ishlatish uchun juda qulay. SHu sababli sanoat uchun sifatli lub tolalarini beradigan o'simliklar zarur. Zig'ir (*linum usitatissimum*), kanop (***Cannabis sativa***), dag'al kanop (***Hibiscus cannabinus***), rami (***Bochntria nivea***) singari o'simliklar sharq mamlakatlari (Xitoy, Hindiston, Pokiston, Misr)da qadimdan qimmatbaho tola beradigan o'simliklar sifatida ishlatilib kelingan.

Libriform, ikkilamchi yog'ochlikda shakllanadi, unda prozenxi-matik hujayralarning bo'yi eniga nisbatan bir necha marta ortiq bo'ladi. Libriform hujayralarining uzunligi 1—1,5 mm dan oshmaydi. Hujayra devori eman, temir daraxti, kashtan singari o'simliklarda nihoyatda qalinlashgan, terak, zarang singari daraxtlarda esa uncha qalinlashmagan bo'ladi. Hujayralararo tirqishlari oddiy tuxumsimon shaklda, unchalik ko'p emas, spiral shaklda joylashgan. Hujayra devori yog'ochlangan bo'lsa, ular juda qattiq va og'ir bo'ladi. Hujayra devorining shakllanishida libriform asosiy rol o'ynaydi.



Turli xil o'simliklarda uchraydigan lub tolalari.

A-kapor poyasimng lub tolalari; B-marvarid tut poyasida; D-temn poyasining

lub tolalari va e-zig'ir poyasi lub tolalari.

Sklereidlar. Pishiqlik to'qimalarning bu turida hujayra devori yog'ochlangan, nihoyatda qalin, izometrik shakldagi toshsimon hujayralar hisoblanadi. Tashqi ko'rinishi jihatidan ular parenximatik hujayralarga o'xshash. **Skelereidlar,** odatda, yog'ochlangan, o'lik hujayralardir. Ular o'simliklarning poyasi, mevalarning qattiq eti va po'stida, danakli o'simliklarning danak qobig'ida boiadi. O'rik, bodom, olxo'ri, gilos, olcha va yong'oq singari o'simliklar danagining qattiqligi sklereid to'qimalari tufaylidir. Ayrim nok, behi singari o'simliklar mevasida toshsimon moddalarning uchrashi sklereid hujayralarning mavjudligidan dalolat beradi. Ma'lumki, ayrim danagi va po'sti qattiq bo'lgan o'simliklarning urug'lari hamda mevalarining mag'zi o'n, hatto yuz yillar davomida saqlanadi. Ayrim tropik o'simliklarning mevasi bir necha yillab dengiz va daryo suvlarida suzib yuradi, nam ehlarda saqlanishiga qaramasdan ularning sklereid to'qimalari juda sekinlik bilan parchalanadi.

Bunday o'simliklar tashqi muhit ta'siriga nihoyatda chidamli boiadi. Bug'doy, arpa, suli va javdar kabilarning ingichka poyasi qanchadan-qancha barg va o'ziga nisbatan bir necha barobar og'ir bo'lgan boshqoqni har xil shamol va to'zonlar ta'siriga qarshi til< • tutib turadi. Daraxtlarning tanasi o'zidan bir necha o'n barobari og'ir yukni ko'tarib tura oladi. O'simliklar tanasi tuzilishidagi hujayralari mahkamlik sabablarini dastlab Galiley, keyin esa R.Gul va N. Grular izohlashga harakat qilganlar. Oradan ancha vaq o'tgach» 1874- yilga kelib nemis botanigi SHvendener injeneriya v< mexanika nuqtai nazaridan to'qimalar o'simliklarning har xi organlarida joylashish qobiliyatlarini (metallar qarshiligi qonun nazariyasi asosida) ishlab chiqdilar.

Aniqlanishicha, o'simlikning hamma organlari ma'um mexanik qonuniyat asosida joylashgan. Ularning bargi, poyasi va ildizi bir-bir bilan mexanik jihatdan uzviy bog'liq boiadi. O'sayotgan o'simlikni barcha organlari markaz bilan bog'langan bo'lib, asosiy tan; muvozanatini saqlab turadi. Mahkamlik elementlari o'simlik tuzilishining periferik qismida joylashgan. Haqiqatan ham poyadagi kollenxima va skelerenxima uning periferik qismida, odamda esa epiderm ostida joylashgan boiadi. Poya markazini yupqa devorli parenxim; egallagan boiadi. Metallarning qarshilik nazariyasiga asosan nim; sababdan ildizda mahkamlik to'qimalari markazda joylashganini izohlab beradi. Ildiz erda joylashganligi tufayli u tashqi mexanik ta'siri natijasida egilish, bukilish, sinish singari holatlarga uchramaydi. Ildi o'simlikni er bag'rida mahkam tutib turish vazifasini bajaradi. Shunga ko'ra, mahkamlik to'qimalari ildizning markazidajoylashgani maqsadg muvofiqdir. nomuvofiq deb izohlaydi. CHunki o'simlik tanasini bir butun deb, u temir-betondan shakllangan buyuk qurilishga o'xshatadi. Bu har ikkala qurilish materiali bir-biri bilan jipslashib, bir-birini to'ldirib turadi. Har qaysisi alohida-alohida bo'lgan taqdirda ular sinib yoki ushlab ketishi mumkin edi. O'simlik tanasida skelerenxima va kollen-xima tolalari tana skeleti rolini o'ynasa, uni o'rab turgan yirik to'qimalar sement rolini o'ynaydi, natijada kishini hayratda qoldiradigan darajadagi mustahkamlik vujudga keladi.

O'TKAZUVCHI TO'QIMA

O'tkazuvchi to'qimalar ham o'simlik organlarida ma'lum bir vazifani bajaradi, ya'ni o'tkazish vazifasini bajaradi.

O'tkazuvchi to'qimalar suv va suvda erigan moddalar usimlik tanasi bo'ylab bir organdan ikkinchi organga o'tib turadi. O'simliklarda asosan 2 xil moddalar xarakat qilib turadi.

1. Ildiz tuklari yordamida tuproqdan shimib olingan suv va suvda erigan xoldagi mineral moddalar.

2. O'simlik organlarida hosil buladigan organik modda ya'ni, uglevodlar, aminokislotalar va boshqalarning suv, eritmasi.

Utkazuvchi to'qima kelib chiqishi jixatidan 2 xil buladi.

1. Birlamchi o'tkazuvchi to'qima.

2. Ikkilamchi o'tkazuvchi to'qima.

Birlamchi o'tkazuvchi to'qima meristemadagi prokambiy-ikkilamchi o'tkazuvchi to'qima kambiydan xosil bo'ladi. pallali usimliklarning o'tkazuvchi to'qimasi birlamchi ikkilamchi

buladi. Bir pallali usimliklarda kambiy bulma: Kambiy o'simliklar tanasining eniga o'stirib tur O'tkazuvchi to'qimalar bajaradigan vazifasiga ko'r 2 ga bo'linadi:

1. Ksilema, (yog'ochlik)
2. Floema, (lub)

Ksilema orqali erdan ildiz tuklari shimib olgan suvsuvda erigan xoldagi mineral moddalar poyaga va sungra bargga o'tib turadi. Floema orqali bargdan fotosintez protsessi natijasida tayyorlangan organik moddalar poyaga va ildizga utib turadi. Ksilemani yuqoriga ko'taruvchi oqim. Floemani tushuvchi oqim deyiladi. Ksilema va floema mahsus elementlardan tashkil topgan.

Ksilemaga o'tkazuvchi, jamg'aruvchi va mahkamlik beruvchi bo-shqa to'qimalar kiradi. U traxeya va traxeidlar deb ataladigan ikkita o'tkazuvchi to'qimalar sistemasiga bo'linadi. Traxeidlar uchi o'tkir uzunchoq bir butun hujayralardan shakllanadi. Hujayraning oxiri o'tkir uchli qiyshaygan bo'lib, ularning uch qismi bilan birlashgan joyi umumiy traxeid naylarini tashkil etuvchi hujayralar o'rtasidagi to'siqqa almashadi.

Traxeidlarda harakat qiladigan suv va unda erigan moddalar shu to'siqda mavjud bo'lgan yupqa parda shaklidagi to'siq tuynuklari orqali o'tadi. Traxeidlar tuynuklarning katta-kichikligiga qarab ikkiga bo'linadi. Naysimon ko'p sonli, keng teshikli va tolasimon — ensiz teshikli traxeidlar. Traxeid hujayralarining uzunligi 1—4 mm ga, eni mm ning yuzdan biriga teng keladi.

Traxeidlar prokambiy tolasi bog'lamlaridan shakllanadi. Ular o'tkazuvchi traxeya nayida siljib, sirg'anib o'sish va boshqa o'suvchi traxeidlarning orasiga o'zining o'tkir uchi bilan suqulib kirish xususiyati bilan farq qiladi.

"Traxeidlar 2 xil vazifani bajaradi.

1. Suv va suvda erigan mineral moddalarni pastdan yuk,or utkazish.
2. O'simlik organlariga lqattiqlik berib turadi.

Suv naylari. Suv naylari ham traxeidlarga o'xshash er ildiz tuklari shimib olgan suv va suvda erigan moddala pastdan yukriga utkazib turadi. Bundan tashqari o'sim tanasiga qattikdik beradi. CHunki suv naylarining lignin moddasi bilan sugorilib yogochlangan. SHuning uchun : suv naylari ulik buladi. Suv naylari bir necha xil shaklda uchraydi. Xalkasimon, buramasimon, narvonsimon, turssh nuk,tasimon.

Traxeidlar bilan suv naylarining tarakdiy etish tarix] rus olimi YAsenko,Xmelniskiy va Rotgertlar tekshi] chik,ganlar. Bu olimlarning kursatishicha avval traxeid; sungra suv naylari paydo buladi.

Biz usimliklarning tarak,k,iy etish tarixidan bilami^ avval ochik, urugli usimliklar, sungra yopik, ZFugli usimlik kelib chik,k,an. Ochik, urugli usimliklarga archa, k,aragay kiradi. Mana shu archa va k,aragaylarda traxeidlar bor, naylari esa bularda uchramaydi. YOpiK, urugli usimliklar olma, urik, yongok, va xokazolarda suv naylari xamda traxeid bor. Demak ochik, urugli usimliklarda fak,at traxeidlar, ei urugli usimliklarda esa traxeidlar xamda suv nayle uchraydi. Suv naylari x;am bir vak,tning uzida paydo bul emas. Avvalo xalkasimon, buramasimon, narvonsimon naylari, keyinrok, esa tursimon va nuktasimon suv nayls vujudga kelgan. Shuning uchun xam suv naylari 2 ga bulinadi.

1. Birlamchi suv naylari.
2. Ikkilamchi suv naylari.


Birlamchi suv naylariga xalkasimon, narvonsim buramasimon suv naylari kiradi. Ikkilamchiga : nuktasimon va tursimon suv naylari kiradi. Ikkilamchi naylari kambiydan xosil buladi. SHuning uchun x;am £ pallali usimliklarda xamda bargda nuktasimon suv nayle uchramaydi.

Traxeya yoki o'tkazuvchi naylar bir-biriga nisbatan tik qatorlai bo'ylab joylashuvchi, uzun tortgan hujayralardan shakllanadi. Uzunasiga joylashgan hujayralar orasida suv va unda erigan moddalai bemalol o'tadigan va umumiy nayni hosil qiladigan maxsus teshiklai bo'ladi. Har bir nay son-sanoqsiz qismlardan iborat bo'lishi mumkin. Traxeyaning o'tkazuvchi naylari traxeidlarga nisbatan ancha keng va uzun bo'ladi. Traxeya naylarining uzunligi ayrim hollarda bir necha metr ga

qadar borishi mumkin. Tropik va subtropik mamlakatlarda tarqalgan lian o'simliklarining traxeya naylari bii necha o'n metrni tashkil qilgan holda, eni 0,1—0,7 mm dan oshmaydi.

Traxeya naylari poya va ildizning uzunligi bo'ylab ustma-ust joylashgan prokambial hujayralardan shakllanadi. O'sish jarayonida bu hujayralar uzayib, suv va unda erigan moddalarni harakatga keltiradi. Bu harakat o'tkazuvchi traxeya naylarining tez o'sishi, vakuolasi kattalasha borishi, hujayra devorining qalinlasha borishini tezlashtiradi. Qalinlashgan hujayra devori asta-sekin yog'ochlanadi. SHu paytga kelib o'tkazuvchi naylarning suv o'tkazuvchanlik qobiliyati kuchayadi. Suv va unda erigan moddalarning kuchli bosimi to'siqlarga ta'sir qiladi, natijada hujayralar orasidagi yupqa po'st teshiklarida o'tkazuvchi naylar vujudga keladi. O'tkazuvchi naylardagi to'siqlarda hosil bo'lgan teshiklar *perforatsiyalar* deyiladi. Hosil bo'lgan te-shiklar atrofidagi yupqa teshilgan po'st qoldig'i *perforatsiyic belbog'idir*. Perforatsiyaning bir necha turi mavjud. Agai perforatsiyani bir belbog' o'rab turgan bo'lsa, u *oddy perforatsiya* deyiladi. Ayrim hollarda belbog' bilinmay ham qoladi va hujayralar qo'shilish chegarasini faqat nayning bir qadar taraigan joyida aniqlash mumkin. O'tkazuvchi naylarning vujudga kelishi tez sodir bo'ladi. Endigina unayotgan kurtaklarda ksilema elementlari shakllanib, ularning devori yog'ochlanadi boshlaydi.⁷

O'tkazuvchi nay va traxeidlarning hujayra devorining yo'g'onla-shish xarakteriga qarab halqa, spiral, narvonsimon, nuqta va elaksimon shakldagi turlari farq qilinadi.



Ksilema elementlari va o'tkazuvchi nay tiplari.

1-yog'och parenximasi; 2-nuqtasimon o'tkazuvchi nay; 3-qoziqsimon; 4-shotisimon; 5-spiral o'tkazuvchi naylar.

Halqa shaklidagi o'tkazuvchi naylar devorida bir-biri bilan bog'liq bo'lmagan ikkilamchi devorning yo'g'onlashishi kuzatikdi. Spiral shaklidagi o'tkazuvchi naylarning devorida ikkilamchi po'stning yo'g'onlashishi lenta shakiida, bir tekisda boradi, Halqali va spiral o'tkazuvchi naylar devorida turli xil tirqish joylashadL Spiral va halqasimon o'tkazuvchi nay elementlari deyarli barcha yopiq urag'li o'simliklarda dastlab ularning o'sish nuqtasida shakllanadi.

O'tkazuvchi nay va traxeidlarni ko'pincha tirik parenxima to'qimalari o'rab turadi. Ular yog'och parenximasi bo'lib, devori juda qalin yog'ochlashgan, sklereid deb yuritiladigan mexanik hujayralarga aylangan. YOg'och parenximasi hujayralari traxeya va traxeidlarni o'rab olib, ularning o'sish qobiliyatini kuchaytiradi. Ksilemaning mahkamlik elementlari esa o'simlik uchun tayanch vazifasini bajaradi.

Traxeidlar 2 xil vazifani bajaradi.

1. Suv va suvda erigan mineral moddalarni pastdan yuqoriga o'tkazish. 2. O'simlik organlariga qattqlik berib turadi.

Suv naylari. Suv naylari ham traxeidlarga o'xshash erdan ildiz tuklari shimib olgan suv va suvda erigan moddalarni pastdan yuqoriga o'tkazib turadi. Bundan tashqari o'simlik tanasiga qattqlik beradi. Chunki suv naylarining po'sti lignin moddasi bilan sug'orilib

1. ⁷ Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –16p.

yog'ochlangan. Shuning uchun suv naylari o'lik bo'ladi. Suv naylari bir necha xil shaklda uchraydi. Xalqasimon, buramasimon, narvonsimon, to'rsimon nuqtasimon.

Traxeidlar bilan suv naylarining taraqqiy etish tarixini rus olimi YAtsenko, Xmelnitskiy va Rotgertlar tekshirib chiqqanlar. Bu olimlarning ko'rsatishicha avval traxeidlar, so'ngra suv naylari paydo bo'ladi.

Biz o'simliklarning taraqqiy etish tarixidan bilamizki avval ochiq urug'li o'simliklar, so'ngra yopiq urug'li o'simlik kelib chiqqan. Ochiq urug'li o'simliklarga archa, qarag'ay kiradi. Mana shu archa va qarag'aylarda traxeidlar bor, naylari esa bularda uchramaydi. Yopiq urug'li o'simliklar olma, o'rik, yong'oq va hakazolarda suv naylari xamda traxeid bor. Demak ochiq urug'li o'simliklarda faqat traxeidlar, yopiq urug'li o'simliklarda esa traxeidlar xamda suv naylari uchraydi. Suv naylari ham bir vaqtning o'zida paydo bo'lgan emas. Avvalo xalqasimon, buramasimon, narvonsimon naylari, keyinroq esa to'rsimon va nuqtasimon suv naylari vujudga kelgan. Shuning uchun ham suv naylari 2 ga bo'linadi.

1. Birlamchi suv naylari.
2. Ikkilamchi suv naylari.

Birlamchi suv naylariga xalqasimon, narvonsimon, buramasimon suv naylari kiradi. Ikkilamchi esa nuqtasimon va to'rsimon suv naylari kiradi. Ikkilamchi suv naylari kambiydan xosil buladi. SHuning uchun ham bir pallali o'simliklarda hamda bargda nuqtasimon suv naylari uchramaydi.

Suv naylarining po'stida oddiy va xoshiyali teshikchalar bor. Ana shu teshikchalar orqali bopcha xujayralarga suv va suvda erigan mineral moddalar o'tib turadi. Suv naylarning uzunligi asosan 10sm-1m gacha bo'ladi. Ba'zan 5 metrgacha xatto 9 m gacha ham bo'ladi. Masalan akatsiya daraxtida 1m_g dub daraxtida 2m, liann o'simliklarida 9 m gacha bo'ladi. Qishda suv naylari tola bilan berkilib qoladi. SHuning uchun ham qishda yuqoriga ko'tarilish oqim to'xtatiladi. Baxorda tolalar erib ketib suv naylarining yo'llari ochiladi.

Ksilemaning parenximasi. Ksilemaning parenximasi tirik xujayradan iborat, bo'lib odatda unga oziq moddalar to'planadi.

Ksilemaning tolasi- libriform. Libriform mexanik to'qimaga kiradi. Libriformning xujayra po'sti qalin yog'ochlangan, qattiq bo'ladi.

Asosiy vazifasi o'simlikka qattqlik berib turish.

Floema elementlari. Floema quyidagi elementlardan tashkil topgan:

1. Elaksimon nay.
2. Yo'ldosh xujayra.
3. Floemaning parenximasi
4. Floemaning tolasi stereid

Floema. Floemaning barcha gistologik elementlari orqali fotosintez jarayoni tufayli o'simlikda hosil bo'lgan murakkab organik moddalar (aminokislotalar, karbonsuvlar, oqsillar, yog'lar, vitaminlai va hokazo) uning barcha organlariga tarqaladi. Bu moddalar harakati, ayniqsa o'sayotgan yosh o'simlik tanasida jadal boradi.

Floema ikki pallali o'simliklarning Odizi va poyasining po'st qismida shakllanadi. SHakllanish vaqtiga ko'ra birlamchi va ikkilamchi floems farq qilinadi. Birlamchi floema o'sish konusi (nuqtasi)da prokambial bog'lamlarining uchki meristema to'qimalarida shakllanadi. Ikkilamchi floema kambiy faoliyati tufayli hosil bo'ladi.

Elaksimon naylar o'tkazuvchi naylardan o'zining tirik holati bilar farq qiladi. Elaksimon naylaming ko'ndalang to'siqlarida mavjuc bo'lgan teshiklar elak shakiida bo'lganligidan ularga shunday norr berilgan. Dastlab elaksimon naylar uzunasiga qator bo'lib joylashgar prokambial hujayralardan hosil bo'ladi. Bunda boshlang'ich elaksimon naylarni hosil qiladigan birinchi ona hujayra eniga boiinadi v* elaksimon naylaming yo'ldosh hujayralarini vujudga keltiradi. Ayrin hollarda boshlang'ich ona hujayra eniga bo'linadi va elaksimon naylaming yo'ldosh hujayralarini vujudga keltiradi., Ayrin hollarda boshlang'ich ona hujayra birdaniga 2—3 marta bo'linadi. Unda bitta elaksimon o'tkazuvchi nayda 2—3 ta yo'ldosh hujayra hosil bo'ladi.

SHakllanishning dastlabki davrida elaksimon naylar hosil qiladigar hujayra, hujayra devori bo'ylab joylashgan sitoplazma, yadro, vakuola va yuqqa po'stga ega bo'ladi. Funktsional faoliyatning boshlanishi bilan i uzayadi va devori bir qadar qalinlashadi. Elaksimon nayni hosil qiladigar hujayraning o'sishi uning devorining cho'zilishi hisobiga boradi

Cho'zilishi davomiada tuynuklar hosil bo'ladi. Vujudga kelgan elaksimon naylar orqali organik moddalarning harakati natijasida ko'ndalang to'siq devoriga kuchli bosim ostida ko'p sonliteshMar vujudga keladi. Devori qalinlashadi, yaltiroq holga keladi va quyosh nurini kuchli ravishda qaytarish qobiyatiga ega bo'ladi. Elaksimon naylar hosil bo'lishi bilan protoplast kesimi o'zgaradi. Organik moddalar oqimi yangi hosil bo'lgan elaksimon naylarni hosil qilgan hujayra sitoplazmasiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Yadro va leykoplast eriydi, sitoplazma va vakuola o'rtasidagi chegara yo'qoladi. Hujayraning hamma organlari bir butun tirik mas-saga aylanadi, hujayra sitoplazmasining harakati to'xtaydi. Sitoplazma o'zining yarim o'tkazuvchanlik qobiliyatini ham yo'qotadi. Unga eritma holiday har qanday organik va anorganik moddalar bemalol o'ta oladi. SHu bilan elaksimon naylarning shakllanishi oxiriga etadi.

Elaksimon o'tkazuvchi naylar suv o'tkazuvchi elementlarga nisbatan bir xilligi, maydaligi, kalta va ingichkaligi bilan farq qiladi.

Chunonchi kartoshka o'simligida elaksimon nayning uzunligi 138

mk ga, nastursiya bargida 240 mkga, ayrim liana o'simliklarida ISO-BOO mk ga qadar boradi. Lekin elaksimon naylarning eni 20—30 mk dan oshmaydi.

Elaksimon o'tkazuvchi naylarning umri ham qisqa bo'ladi. Bir yillik va ko'p yillik o't o'simliklarda elaksimon o'tkazuvchi naylarning umri bir vegetatsiya davriga boradi. Daraxt va butalarda ularning umri 1 yil, ayrim daraxtlarda 3—4 yilga qadar cho'zilishi mumkin. Umri 3—4 yil davom etadigan naylar qishga yaqin unchalik yaxshi o'rganilmagan maxsus amorf modda bilan birikadi. Bahor kelishi bilan yana ochilib, o'z faoliyatini davom ettiradi.

Yo'ldosh xo'jayralar. Ko'pchilik o'simliklarning elaksi nayi yonida yo'ldosh xo'jayra joylashgan. Elaksimon nayga nisbatan yo'ldosh xo'jayra kichik bo'ladi. Yo'ldosh xo'ja tirik bo'lib o'nda o'simliklarni o'stiradigan Auksin kabi bezlar bor.

Floemaning parenximasi. Floemaning parenximasi po'sti selyullozadan tashkil topgan. Floemaning parenximasida zapas oziq moddalar to'planadi.

Floemaning tolasi-stereid. Floemaning tolasi-stereidn xo'jayra po'sti yog'ochlangan yoki yog'ochlanmagan bo'ladi. Floema tolasi juda ham mustaxkam, sinmaydigan, elastik bo'lib o'simlikka qattiqlik berib turadi.

Shunday qilib biz ksilema va floema elementlarini ko'rib chiqdik.

YOg'ochlangan o'simliklarda floema po'stloq qismiga joylashgan. YOg'ochlik qismi ksilema xisoblanadi. *O'tli* o'simliklarning poyasida, ildizida, bargning tomir o'tgan qismida floema bilan ksilema birlashib o'tkazuvchi to'qima bog'lamlari tashkil etadi. O'tkazuvchi to'qima bog'lamlari asosan 4 tipda tuzilgan.

4.Kollotal.

2.Bikollotal.

Z.Kontsentrik.

4.Radial.

Kollateral o'tkazuvchi nay bog'lamlari. Bunda floema va ksilema yonma-yon, ya'ni o'tkazuvchi nayning ksilema bog'lami

lari, ikkinchi yonida esa floema bog'lamlari joylashgan bo'ladi. Poya va ildizning uch qismida, odatda, ksilema markazga qaragan bo'lib, adekvat holda markazga yaqin joylashadi. Floema esa sirt qismida, ya'ni markazdan uzoqda, abaksial holda joylashadi. Bargda uning yuza tomonida ksilema esa uning ost tomonida floema joylashgan

bo'ladi. O'tkazuvchi bog'lamlarning bu tipi barcha o'simliklar uchun xos

Bikollateral o'tkazuvchi nay bog'lamlari. O'tkazuvchi nay bog'lamlarining bu tipida floema ksilemaning har ikkala yon tomonida, va'ni linine ieh va sirt aismida iovlashean bo'ladi. Bikollateral o'tkazuvchi

nay bog'lamlari ksilemaning 2 ta kollateral bog'lamlarining qo'shilishi tufayli vujudga kelgan.

Konsentrik yoki markazlashgan o'tkazuvchi nay bog'lamlari.

O'tkazuvchi naylarning bu tipida floema markazda joylashib, ksilema uni o'rab turadi yoki ksilema markazda bo'lib, floema uni o'rab turadi. Markazlashgan bog'lamlar ko'pchilik paparotniklarda, bir pallalilarda esa marvaridgul o'simligida uchraydi.

Radial yoki nursimon tuzulishli nay o'tkazuvchi bog'lamlari.

O'tkazuvchi nay bog'lamlarininng bu tipi o'ziga xos tuzilishga ega bo'lib odatdagi nay bog'lamlar tuzilishidan keskin farq qiladi. U Ikkipallali o'simliklar ildizining birlamchi tuzilishida namoyon bo'ladi. Bir pallali o'simliklarda esa bunday tuzilishdagi nay bog'lamlari o'simlik umrining oxirigacha saqlanadi. Radial nay bog'lamlari juda murakkab tuzilishga ega.

Floema ksilema bog'lamlari radius bo'ylab navbatlashadi va radius bo'ylab radial nur simmetriyasini hosil qiladi.

Ikkipallali o'simliklarda dastlabki, birlamchi tuzilishdan ikkilamchi tuzilishga o'tishda floema va ksilema bog'lamlarida radial joylashish kollateral joylashish bilan almashinadi. Turli hil o'simliklarda ildiz birlamchi tuzilishining shakillanishida ksilema va floemaning ma'lum sondagi turlari qonuniy ravishda tarkib topgan shunisi qiziqki radial o'tkazuvchi bog'lamlarning bir nurli (Monarx), ikki nurli (Diarx), uch nurli (Triarx), to'rt nurli (Tetrarx), ko'pnurli (Polearx), turlari mavjud. Radial o'tkazuvchi nur bog'lamlari ichida ma'lum darajada keng tarqalgan besh nurli (pentaerx) radial o'tkazuvchi bog'lami hisoblanadi.⁸

ASOSIY TO'QIMA

Asosiy to'qima tirik parenxima xujayradan tuzilgan bo'lib turli vazifalarni bajarib turadi. Asosiy to'qimalarning xujayrasi yumaloq yoki ko'p burchakli bo'lib uning xujayra oralig'i ham bo'ladi. Xujayra po'sti selyullozadan tuzilgan yupqa ba'zan lignin bilan sug'orilib, yog'ochlangan bo'ladi.⁹

Asosiy to'qima vazifasiga qarab bir necha gruppalariga bo'linadi.

1. O'tkazuvchilik vazifasini bajaradigan asosiy to'qima Masalan, ildizning po'stloq xujayralari, o'zak nur xujayralari. O'zak nur xujayralari poyaning yog'ochlik qismida suv va suvda erigan moddalarni o'tkazib turadi.

2	Organik	moddalarni	tayyorlaydigan	to'qimani
assimilyatsion	to'qima	deyladi.	Assimilyatsion	tuqima
o'simlik	bargda,	poyasida	va boshqa	o'rganlarida
Assimilyatsion	to'qimada	xlorofill	donachalari	bo'lib
fotosintez	prosessi	bo'lib	turadi.	Assimilyatsion
				to'qima

3 xil buladi. Masalan, bargda.

1. Qoziqsimon to'qima.(ustinsimon)

2. Bulutsimon to'qima.

3. Chokli parenxima.

Qoziqsimon pakenximning bo'yi cho'ziqroq va bir-biri bilan zich joylashgan, bulutsimon parenxema yumaloq hujayra oralig'i bo'ladi. Bulutsimon parenxema bargda havo almashinib turishida katta ro'l o'ynaydi. Shuning uchun ham uni ventelyatsinniy to'qima deb ham yuritiladi. Bulutsimon parenxemaga qaraganda qoziqsimon parenximada xlorofil donalari ko'p bo'ladi. Chokli parenxima ochiq urug'li o'simliklarning bargda uchraydi masalan.

Qarag'ay , archa barglari. Choklari Parenximani hujayra po'sti ichkariga kirib ketgan shuning uchun ham chokli parenxima deyiladi.

Oziqli moddalarni to'plovchi asosiy to'qima. O'simliklarning xar-hil o'rganlarida ildiz, poya, barg, urug' va mevalarida to'planadi.

Masalan: sabzi, lavlagi rediska, sholg'om va boshqalarning ildiz mevasida, kartoshka tugunagida, karam bargida, g'alladonli o'simliklarning urug'ida, mevali daraxtlarning mevasida to'planadi.

2. ⁹ Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.

Ayirish to'qimalari Moddalar almashinuvi jarayonida hujayralarida o'simlikning o'sishi va rivojlanishi uchun sarflanmaydigan moddalar to'planadi. Ko'pincha bu moddalar almashinuvining oxirgi chiqindi mahsuli hisoblanadi. CHiqindi moddalar maxsus to'qimalarda to'planib, **ular ayirish to'qimalari** deyiladi. Ayirish to'qimalari o'simliklarning turli-tuman a'zolaridan joy olgan bo'lishi mumkin. Ayirish to'qimalarida nihoyatda turli-tuman moddalar to'planadi va ular shakl hamda tuzilishi jihatidan bir-biriga umuman o'xshamaydi.

Ayirish to'qimalar, ichki va tashqi sekretiya to'qimalariga bo'linadi. Tashqi sekretiya ayirish to'qimalariga nektar hosil qiladigan gul bezlari, efir moylari ajratadigan yopishqoq moddalar, alkaloidlar, glukozidlar ajratadigan epidermisda joylashgan bezlar va tuklar kiradi. Tashqi sekretiya to'qimalari bir qadar chuqur joylashgan bo'lishi ham mumkin. Masalan, limon, apelsin o'zidan efir moylari ajratadi. Olma, behi, handalak, qovun singari o'simliklarning mevasida epidermis ham hushbo'y hid tarqatadi.

Ichki sekretiya to'qimalariga ideoplast parenximi to'qimalaridan shakllangan bez va bez ajratadigan chiqindi yo'llar taalluqlidir. Ichki sekretiya bezlari ajratadigan chiqindi yo'llar, ayniqsa, poya va ildizda, qisman bargda uchraydi. Ularda smola, efir moylari, shilimshiq moddalar, mum va boshqalar to'planadi. CHiqindi yo'llar qarag'ay daraxtida, kamfora

Daraxtida, tragakant astragalida, petrushka ildizida bo'ladi.

Kuknorining sutlik nayidan oqib chiqqan shirani opiy deb ataladi. Opiy tarkibida 26 xil alkaloid bor.

Tarmokdangan sutlik nayni semiz o't o'simligida uchratish mumkin. Bo'g'imlik sut naylari suv naylariga o'xshash bo'ladi. Tarmoqlangan sutlik naylar urug'ning embrionida bo'ladi. Urug'dan o'sib chiqqan bu sutlik nay tarmoklanib ildizga, poyaga o'tib ketadi. Sutlik naylari tirik bo'ladi. Sutlik naylar protoplazmasida minglab yadro uchraydi.

Asosiy to'qimalar chiqaruvchi to'qimalar ham o'simlik hayoti uchun muxim to'qimalardan hisoblanadi.

Xazm bezlari va osmaforalar ba'zi xashoratho'r o'simliklarda (rosyanka, muxolovka) uchraydigan hazm bezlaridan tashqi sekretiya kiradi. Mazkur hazm bezlaridan ajralib chiqadigan fermentlar va kislotalar yordamida xashoratlarni tutib oziqlanadilar.

Osmoforalar. X,ushbuy gullarning toj barglari odatda uchuvchan moddalar ajratib turadi. Bu esa changlatuvchi xashoratlarni o'ziga jalb etadi. Ana shu vazifani epiderma qisqa muddat ichida bajaradi. Uzoq muddat gullaydigan o'simliklarda alohida to'qima, xatto organlar shakllanib, unda uchuvchan efir moylari ajratiladi. Osmoforalar deb, shularga aytilib, ular ba'zan qanotsimon yoki tuksimon, kipriksimon shaklda bo'ladi, kup qavatli ajratuvchi tuqimadan tashkil topadi.

Nazorat savollari

1. O'tkazuvchi to'qimalar qanday vazifani bajaradi va ular necha xil bo'ladi?
1. Asosiy to'qimaning xillari va ularning vazifasi?
2. Asosiy to'qima vazifasi, uning xillari
3. Assimilyatsion (xlorenxima) to'qima
4. hamlovchi to'qima
5. SHamollatuvchi (aerenxima) to'qima
6. So'ruvchi to'qima
7. Vellamen – suv shimuvchi to'qima
8. Ajratuvchi to'qima vazifasi, uning xillari
9. Tashqi chiqaruvchi to'qimalar:

Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o'quv
qo'llanmalar ro'yxati

1. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O‘.A. Botanika. – T.: O‘zbekiston, 2005.- 435 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O‘.A., Samatova SH. O‘simliklar sistematikasidan amaliy mashg‘ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
4. Ahmedov O‘.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elektron darslik.-T.: 2008.
5. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –16p.
6. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
7. Hamidov A., Nabiev M.M. “O‘zbekiston o‘simliklarini aniqlagichi”.-T.: 1987.-235 b.
8. Васильев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “Высшая школа”, 1988. -435 с.
9. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O‘.A. va boshqalar. Dorivor o‘simliklarning lotincha-o‘zbekcha-ruscha-arabcha va forsha-tojikcha lug‘ati.-T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
10. Березовская Т.П., Дмитрук С.Е., Гришина Е.И., Белоусов М.В. Основы фармацевтической ботаники. – Томск: Печатная мануфактура, 2004.-294 с.
11. Xolmatov X.X., Ahmedov O‘. A. Farmakognoziya. 1-2 qism. – T.: “Ibn Sino” nashriyoti, 2007.- 806 b.

Ma’ruza - 4

Ildiz morfologiyasi va anatomiyasi.

Ma’ruzaning maqsadi: Ildiz morfologiyasi va anatomiyasi. Poya morfologiyasi va anatomiyasi haqida tushuncha berish.

Ma’ruzaning rejasi:

1. O‘simlik organlari
2. Ildiz morfologiyasi
3. Ildizning anatomiyasi
4. SHakli o‘zgargan ildizlar
5. Ildizdagi tugunak bakteriyalar va mikoriza

Tayanch iboralar: *Yuksak o‘simlik organlarining tuzilishi. Vegetativ va generativ organlar. Asosiy morfologik qonuniyatlar: simmetriya turlari, metomorfoz. Analogik va gamologik organlar. qutblanish, yuksak o‘simliklarni vegetativ organlari, poya, ildiz. Kurtak tuzilishi va o‘shish nuqtasi. Vegetativ va aralash kurtaklar. G‘uncha. Ildiz. Ildiz zonalari. Ildizning o‘shish nuqtasi. Initsial hujayra. Ildiz qinining hosil bo‘lishi va vazifalari. Birlamchi ildiz tuzilishi. Epiblema (rizoderma), birlamchi po‘stloq, markiziy silindr. Meristema hosil qilgan qavatlar: dermatogen, periblema, pleroma. Birlamchi po‘stloq qavati: ekzoderma, mezoderma va endoderma. Endodermaning tuzilishi, vazifasi. Hidrostatik bosim. Peritsikl. Yon ildizning hosil bo‘lishi.*

Ildiz. (Radix)

Ildiz o‘simliklarning asosiy vegetativ organi bo‘lib birinchi marta urug‘ embrionidan o‘sib chiqadi. Urug‘ embryo-nidan o‘sib chiqqan ildiz yaxshi taraqqiy etib ketsa uni bosh ildiz deb ataladi. Asosiy bosh ildizdan yon ildizlar o‘sib chiqadi. Yon ildizlar asosiy bosh ildizning ichki to‘qimalaridan o‘sib chiqadi. Yon ildiz ichki to‘qimalardan o‘sib chiqqani uchun endogen

tipda o'sish deyiladi. Asosiy bosh ildiz va undan o'sib chiqqan birinchi tartibdagi yon ildizlar geotropizm, ya'ni erga qarab o'sish xususiyatiga ega (tikka, yotib, yuqoriga qarab, pastga qarab). Bu ildizlar geotropizm xususiyatiga ega emas. Asosiy bosh ildiz yon ildizlarga nisbatan katta bo'lsa o'q ildiz deyiladi.

Masalan: beda, g'oz, otquloq, yantoq, qoqio't kabi o'simlik ildizlari. Yantoqning asosiy bosh ildizining uzunligi 20 m bo'ladi. Chunki yantoq suvsiz joyda yashaydi. O'q ildiz shoxlangan yoki shoxlanmagan bo'lishi mumkin. Agar o'q ildiz er yuzasiga yaqin joyda shoxlangan bo'lsa shoxlangan o'q ildiz deyiladi. Agar o'q ildiz er ostining chuqurroq erida shoxlanmagan bo'lsa shoxlanmagan o'q ildiz deyiladi. Ikki pallali o'simliklarning ildizi asosan o'q ildiz bo'ladi. Bir pallali o'simliklarda urug' embrionidan o'sib chiqqan bosh ildiz yaxshi taraqqiy etmaydi, bu o'simliklarda bosh ildiz yon ildizlarga nisbatan teng bo'ladi. SHuning uchun xam bir pallali o'simliklarning ildizi (mochkovat'sh koren) deyiladi. Masalan: bug'doy, arpa, sholi, piyoz va boshqa ildizlar. Ildiz o'simliklarning poyasida ba'zan bargidan xam o'sib chiqishi mumkin. Poyadan yoki bargdan o'sib chiqqan ildiz qo'shimcha ildiz (pridatochnsh koren) deyiladi. Bir pallali va ikki pallali o'simliklarda, qo'shimcha ildiz taraqqiy etgan bo'ladi. Ildizning taraqqiy etishi o'simlikning yashash sharoitiga bog'liq. Masalan: tog'larda, toshlarning ustida o'suvchi o'simliklarda ildizning probka qismi yaxshi taraqqiy etgan bo'ladi. Ildiz qinlari esa ko'mir kislotalarini va yana olma kislotalarini ishlab chiqarib turadi. Qumli cho'llarda yashaydigan o'simliklarda yon ildizlar yaxshi taraqqiy etgan bo'ladi. Masalan: qumli cho'llarda ya'ni Qora Qum va Qizil Qumda o'suvchi juzg'unni olsak uning asosiy bosh ildizi 1,5-2m bo'ladi. Yon ildizlari esa 20 m gacha bo'ladi. Saksovluni olsak ildizi er yuzida bir marta shoxlanadi va 3.5-4m chuqurlikda yana bir marta shoxlanadi. Idizda oziq moddalar xam to'planishi mumkin. Bunday ildizlarni ildiz mevalar-(kroneplodi) deb yuritiladi: sabzi, turp, lavlagi, sholg'om, rediska va boshqalar. Bunday ildiz mevalarni qiyofasini o'zgartirgan ildizlar deb yuritiladi. (metamorfoz kornya). Sabzi, turp, lavlagi ildiz mevalari asosiy bosh ildizdan xosil bo'ladi. Bundan tashqari yon ildizlardan xosil bo'lgan ildiz mevalar ham uchraydi. Masalan: kartoshka guli (georgin), parpi (akonit). Qiyofasini o'zgartirgan ildizlar xar xil qo'shimcha vazifalarni bajarib turadi. Ba'zi bir o'simliklarda havo ildizi (vozdushniy koren) bo'ladi. Havo ildizlari yordamida o'simlik havodan namlik olib turadi. Bundan tashqari havo ildizi o'simlikning tanasini tutib turishga yordam beradi. Masalan: tropik o'rmonlarda (daraxt ustida) yashaydigan epifit o'simligining ildizi ingichka bo'lib yuqoridan pastga qarab 'sadi. Buyining uzunligi 4-6 m, enining diametri 1-2 sm, jo'xorida xam havo ildizi bor. Felodendron o'simligida xam havo ildizi bor.

Tayanch ildizlar. Poyadan chiqqan qo'shimcha ildizlar uni tik tutib turishga yordam beradi. Bunday ildizlarning ko'pincha kechpishar, baland bo'yli makkajo'xori, oq jo'xori o'simliklarning pastki bo'ginlarida ko'rish mumkin. So'rg'ich ildizlar. Tekinxo'r o'simliklarda xlorofill donachalari bo'lmaganligi uchun ular boshqa o'simliklardan oziq moddalar hisobiga yashaydi. Bunday o'simliklarda asosiy ildizlar o'rnida so'rg'ich ildizlar bo'ladi. So'rg'ich ildizning po'stloq parenxima xujayralari, o'tkazuvchi bog'lamlari ona o'simlikning floemadagi o'tkazuvchi bog'lamlariga qarab o'sadi. O'sayotgan ildizning uzunchoq parenxima xujayralari gaustoriya xujayralari deb ataladi. Bu zarpechakda, shamqiyada bo'ladi.

Botqoqlik joylarda o'sadigan o'simliklarda nafas oluvchi ildizlar Ham bo'ladi. Nafas oluvchi ildizlar o'simlikning pastki qismida, ya'ni er tagiga er ustiga qarab o'sadi. M: Botqoq sarvisi-kirishi mumkin. Ba'zi bir o'simliklarda tirkak ildizlar bo'ladi. M: tropik o'simliklardan fikusda ko'rish mumkin. Tirkak ildizlar o'simlikning yuqori qismidan chiqib pastga qarab O'sadi. SHu bilan u erga qadalib o'simlikning tanasini tutib turadi. Ildiz sistemasi o'simliklarning er ustki qismlariga nisbatan ba'zan 5-15 martagacha katta bo'ladi.

Ildiz faqat murakkab tuzilgan yuqori o'simliklarda bo'ladi. Suv o'tlarida va moxlarda ildiz bo'lmaydi. Bu o'simliklarda ildiz o'rnida bir yoki ko'p xujayrali tuklar bo'ladi. Bu tuklarni rezoidlar deb ataydi. SHu rezoidlar yordamida suv va suvda erigan mineral moddalarni shimib

oladi. YUqori sporal o'simliklarda suv qirqquloqida Ham ildiz bo'lmaydi. Ildiz vazifasini qiyofasini o'zgartirgan barglar bajarib turadi. YUqori o'simliklardan shumqiya, zarpechak, devpechak o'simliklarida Ham ildiz bo'lmaydi. Bu o'simliklar parazit holda hayot kechiradilar. Uzining so'rg'ich tuklari yordamida boshqa o'simliklardan oziqli moddalarni so'rib oladi. Dukkakdoshlar oilasiga kiruvchi o'simliklarning ildizida tugunak bakteriyalar bo'ladi. Bu bakteriyalar dukakli o'simliklar bilan simbioz xolda yashaydi. (Xamkorlik va qarama-qarshi kurash), tugunak bakteriyalar havoning erkin azotini yutish xususiyatiga ega. SHuning uchun xam tugunak bakteriyalar o'simlikni azot bilan ta'minlab turadi. O'simlikdan esa organik modda oladi. SHuning uchun xam dukakli o'simliklar ekilgan er azotli birikmaga, o'simlik esa oqsilga boy bo'ladi.


Akademik Vilyams o'simliklarni almashlab ekishda dukaklilarga katta ahamiyat beradi. O'simlik ildizida zamburug'lar xam bo'ladi. O'simlik ildizidagi zamburug'lar mikoriza deb ataladi. Grekcha miks-zamburug', riza-ildiz (zamburug'li ildiz). Mikorizalar o'simlik ildizida 3 xil shaklda bo'ladi.

1. Mikorizalar ildizning tashqi tomonida bo'lsa ektotrof mikoriza deyiladi. M: Olxo'ri, dub, terak daraxtlari ildizida bo'ladi.

2. Mikorizalar O'simlik ildizining ichki Qismida uchrasa endotrof mikoriza deyiladi. M: BuQdoy, jO'xori, klupnay, piez ildizlarida kO'rish mumkin.

3. Mikorizalar ildizning tashqi tomonidan tugunak xosil qilsa tugunak mikoriza deyiladi. M: Tamaki, qalampir, pomidor o'simliklarining ildizida ko'rish mumkin.

1881 yilda rus olimi Kamenskiy mikorizalarning tabiatini aniqlagan. Mikorizalar erimaydigan moddalarni eriydigan qolga ketirishda katta ahamiyatga ega. O'simlikning ildizining V₁ vitamin (tiamin) bilan taminlab turadi. Vitamin V₁ ta'sirida o'simlik ildizi kuchli ravishda taraqqiy etadi. Ba'zi bir mikorizalar havoning azotini yutish xususiyatiga ega. SHu bilan o'simlik ildizining azotli birikma bilan taminlab turadi.



Ildizlar.

A - ipsimon ildiz, B - urchiqsimon ildiz,

V - ildiz meva. G – o'kildiz, D - popuk ildiz.

ILDIZ ANATOMIYASI

Ildiz uchki qismi bilan pastga qarab o'sadi. Uning uchida uch qator birlamchi meristema joylashgan xar bir qatorda odatda 4 tadan xujayra bo'ladi, pastki qatordagi meristemada ildizning qini va dermatogen xosil bo'ladi. O'rta qatordagi meristemada pereblema, yuqori qatordagi meristemada esa pleroma xosil bo'ladi. Dermatogendan birlamchi qoplagich to'qima (epidermis), pereblemadan ildizning po'stloqi, pleromadan esa ildizning markaziy silindr qismi tashkil topadi.

Ildiz uchki qismi bilan pastga qarab o'sadi. Uning uchida uch qator birlamchi meristema joylashgan xar bir qatorda odatda 4 tadan xujayra bo'ladi, pastki qatordagi meristemada ildizning qini va dermatogen xosil bo'ladi. O'rta qatordagi meristemada pereblema, yuqori qatordagi meristemada esa pleroma xosil bo'ladi. Dermatogendan birlamchi qoplagich to'qima (epidermis), pereblemadan ildizning po'stlog'i, pleromadan esa ildizning markaziy silindr qismi tashkil topadi.

Ildizning o'suvchi qismi quyidagi 4 ta zonalardan iborat.

1. Ildiz qini zonasi. Ildiz qini meristemani shikastlanishidan saqlab turadi. Hamda ildizning pastga qarab erni yorib o'sishga imkoniyat yaratib beradi. Ildiz qini xujayrasida kraxmal bor. Kraxmallar o'z og'irligi bilan ildizning tikka va to'g'ri o'sishiga yordam beradi.

2. Bo'linuvchi zona. Bu zonada meristema joylashgan meristema xujayralari oddiy yoki kariokinez yo'lida bo'linib ko'payib turadi. Bu bo'linuvchi xujayralarda vakuola bo'lmaydi, yadro xujayralarining markaziga joylashgan. Bu zonaning kattaligi 2 mm oralig'ida bo'ladi.

3. O'suvchi zona. Bu zonada xujayralar bo'linishdan to'xtab o'sa boshlaydi. O'suvchi zonadagi xujayralarda vakuolalar paydo bo'lgan bo'ladi. Bo'linuvchi zona bilan o'suvchi zona birgalikda 3-4 mm kattalikda bo'lib bular ildizning o'suvchi nuqtasi deb ataladi.

4. Shimuvchi zona yoki ildiz tuklari xosil bo'luvchi zona bu zonada birinchi marotaba to'qimalar vujudga keladi. Bu zonaning kattaligi bir necha sm bo'ladi. Ildizning epidermasidan tuklar o'sib chiqadi. Ildiz epidermasini epiblema ham deb yuritiladi. epidermis xujayralarining po'sti yupqa, piktin moddasi bilan qoplangan.

Ildiz epidermisida kutikula qavati va ustitsalari bo'lmaydi. Epidermisdan o'sib chiqqan tuklar bir xujayrali o'simtalar bo'lib, uzunligi 0,16 mm dan 1 sm gacha bo'ladi. Tuklarning umri qisqa bo'ladi. Oz muddat kechiruvchi organlar efemer organlar deyiladi. Tuklar faqat 10-20 kun hayot kechiradi, lekin ularning miqdori juda ko'p bo'ladi. M: Jo'xori ildizining 1mm sathida 425 ta, no'xatda 232 ta tuk bor. Ildiz tuklari tirik bo'ladi. Tuklar ildizning shimuvchi satxini 5 martada n 20 martagacha ortiradi. Ildiz tuklarining ba'zilar olma, ko'mir kislotalarini ishlab chiqaradi. Ildiz tuklari orqali erdan suv va suvda erigan mineral moddalarning shimadi.

Ildizning anatomiyasi 2 ga bo'linadi.

1. Birlamchi ildiz anatomiyasi

2. Ikkilamchi ildiz anatomiyasi

Bir pallali o'simliklarning ildizi birlamchi, Ikki pallali o'simliklarning ildizi esa ikkilamchi, yosh paytda esa birlamchi bo'ladi. Ildiz tashqi tomondan epidermis bilan qoplangan. Epidermisdan tuklar o'sib chiqadi. Ildizning shimuvchi zonasi kundalang kesganimizda ikki qismdan iborat ekanligini ko'rish mumkin.

1. Ildizning po'stloq qismi.

2. Markaziy silindr qismi.

Ildizning po'stloq qismi 3 xil qavat xujayralardan tashkil topgan.

1. Tashqi qavat-ekzoderma.

2. O'rta qavat-mezoderma.

3. Ichki qavat -endoderma.

Ekzoderma-bir necha qator zich joylashgan ko'p qirrali parenxim xujayralardan iborat. Ekzoderma xujayralari o'lik bo'ladi, ya'ni suberin moddasi bilan sug'orilib probkalangan. Ikki pallali o'simliklarda epidermis tushib ketib o'rniga probka hosil bo'lgunga qadar qoplog'ichlik vazifasini bajarib turadi. Ba'zan ekzodermada mexanik to'qima sklerenxima xalqasi ham joylangan bo'ladi.

Mezoderma-bir necha qavat siyrak joylashgan parenxim xujayralardan tashkil topgan. Ba'zan mezoderma xujayra-sida bo'shliq joy xam uchraydi. Bu bo'shliq joyni aerinxima deyiladi. Mezodermada suv va suvda erigan oziq moddalar to'planadi. Ba'zan mezodermada chiqaruvchi organ va yo'llar bo'ladi. Mezoderma oziq moddalarni to'plashdan tashqari o'tkazuvchanlik vazifasini bajarib turadi. Ildiz tuklari shimib olgan oziq moddalar mezoderma orqali markazga o'tadi. Markazga joylashgan ksilemaning suv naylarga tushgan suv va suvda erigan mineral moddalar yuqoriga ko'tarilib ketadi.

Endoderma-odatda bir qator ba'zan ikki qator zich joylashgan parenxim xujayralardan iborat. Endoderma hujayralarning ichki va yon tomonlari probkalanagan bo'lib faqat tashqi mezodermaga qaraganda po'sti yupqaligicha qoladi. Ba'zi endodermaning tashqi va ichki tomoni yupqaligicha qolib yon tomon probkalanadi. Probkalanagan xujayralar o'lik bo'ladi. Bularning orasida ba'zi xujayralar probkalanmaydi. Prokalanmagan xujayralar tirikligicha saqlanib qoladi. Bu xujayraning endodermaning tirik o'tkazuchi xujayrasi deyiladi. Chunki bu xujayralari markaziy silindr qismiga suv va suvda erigan xoldagi mineral moddalar o'tib turadi. **Ildizning markaziy qismi peretsikl deb ataladi.**

Tug'diruvchi to'qimadan boshlanadi. Peretsikl odatda bir qator ba'zan bir necha qator bo'lib joylashgan parenxim xujayralardan tashkil topgan. Peretsikl xujayralari kariokinez yo'lda bo'linib ko'payib turadi. Natijada peretsikldan yon ildizlar o'sib chiqadi. Peretsiklni kambiydan farqi kambiy erta bahordan kech kuzgacha bo'linib ko'payib turadi. Peretsikl esa ma'lum vaqtgacha bo'linib ko'payadi. Ikki pallali o'simliklardan peretsiklda fellogen ham hosil bo'ladi. Ildiz markazida o'zak xujayralari bo'lib uning atrofida ksilema so'ngra floema joylashgan. Ksilema bilan floema radial tipda joylashgan.

Ikki pallali o'simliklarning ildizi yosh vaqtida bir-lamchi so'ngra ikkilamchi tuzilishda bo'ladi. Ildizning ikkilamchi tuzilishida ikkilamchi o'tkazuvchi to'qimalar va ikkilamchi qoplag'ich to'qimalar vujudga keladi. Kambiydan ikkilamchi ksilema va floemalar probka kambiydan (Fellogendan) ikkilamchi qoplag'ich to'qima xosil bo'ladi. Kambiy floema bilan ksilemaning orasiga joylashgan bo'lib o'zidan yuqoriga floema elementlarini ichkariga esa ksilema elementlarini ishlab chiqarib turadi. SHuning uchun ham ikki pallali o'simliklarning poyasi va ildizi bo'yigagina emas eniga ham o'sib turadi. Kambiydan hosil bo'lgan floema, ksilema ikkilamchi ksilema va floema deb yuritiladi. Ikkilamchi ildizning markazida birlamchi ksilema (ya'ni o'zak o'rnida), uning ortida ikkilamchi ksilema joylashgan. Ikkilamchi ksilema ustida kambiy va uning yuqorisida floema so'ngra peretsikl o'rnashgan, peretsiklning yuqorisida ildizning po'stloq qismi bo'ladi. Yon ildizlar mana shu peretsikldan vujudga keladi.¹⁰

Ko'p yillik, ikki pallali o'simliklarning ildizi boshqa tomondan periderma bilan qoplangan. Ildiz markazidan toki po'stlog'iga qadar o'zak nur xujayralari joylashgan. O'zak nur xujayralari ko'ndalangiga yana o'zakdan po'stloqqa tomon oziq moddalarni etkazib turadi.

Ildiz mevalik o'simliklarning ildiz tuzilish jixatidan 3 xil bo'ladi.

1. Ildizning po'stloq qismi kuchli taraqqiy etgan bo'lib, oziqli moddalar asosan po'stloqda to'planadi. M: sabzi.

2. Ildizning markaziy ya'ni ksilema qismi kuchli taraqqiy etgan bo'lib oziqli moddalar shu qismga to'planadi. M: turp, rediska.

3. Ildizning po'stloq hamda markaziy qismi yaxshi taraqqiy etgan bo'lib oziqli moddalar xar ikkalasida to'planadi. M: lavlagi.

Ildiz mevalarni ildiz metamorfozlari ham deb yuritiladi. Ularda oziq moddalar to'planadi. To'plangan oziq moddalar o'simlik, hayvon va inson organizmlari uchun muhim ahamiyatga ega. Ularda turli xildagi organik birikmalar xam to'planadi.


¹⁰ 2. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika.-T.: O'zbekiston, 2005.-435 b.

1. Ildiz qini zonasi. Ildiz Qini meristemani shikastlanishidan saqlab turadi. Hamda ildizning pastga qarab erni yorib o'sishga imkoniyat yaratib beradi. Ildiz qini hujayrasida kraxmal bor. Kraxmallar o'z og'irligi bilan ildizning tikka va to'g'ri o'sishiga yordam beradi.

2. Bo'linuvchi zona. Bu zonada meristema joylashgan meristema xujayralari oddiy yoki kariokinez yo'lida bo'linib ko'payib turadi. Bu bo'linuvchi xujayralarda vakuola bo'lmaydi, yadro xujayralarining markaziga joylashgan. Bu zonaning kattaligi 2 mm oralig'ida bo'ladi.

3. Usuvchi zona. Bu zonada xujayralar bo'linishdan to'xtab o'sa boshlaydi. O'suvchi zonadagi xujairalarda vakuolalar paydo bo'lgan o'ladi. Bo'linuvchi zona bilan o'suvchi zona birgalikda 3-4 mm kattalikda bo'lib bular ildizning o'suvchi nuqtasi deb ataladi.

4. Shimuvchi zona yoki ildiz tuklari xosil bo'luvchi zona. Bu zonada birinchi marotaba to'qimalar vujudga keladi. Bu zonaning kattaligi bir necha sm bo'ladi. Ildizning epidermasidan tuklar o'sib chiqadi. Ildiz epidermasini epiblema ham deb yuritiladi. Epidermis xujayralarining po'sti yupqa, piktin moddasi bilan qoplangan.



A. Bug'doy ildizining uzunasiga kesimi.

- 1 - ildiz qini, 2 - meristema, 3 - dermatogen, 4 - periblema,
5 - pleroma, 6 - epiblema, 7 - birlamchi po'stlok, 8 - markaziy silindr, 9 - tukcha, a -
ximoya zonasi, b - bo'linish zonasi,
v - o'sish zonasi, g - surish zonasi.

Ildiz epidermisida kutikula qavati va ustitsalari bo'lmaydi. Epidermisdan o'sib chiqqan tuklar bir xujayrali o'simtalar bo'lib, uzunligi 0,16 mm dan 1sm gacha bo'ladi. Tuklarning umri qisqa bo'ladi. Oz muddat kechiruvchi organlar efemer organlar deyiladi. Tuklar faqat 10-20 kun hayot kechiradi, lekin ularning miqdori juda ko'p bo'ladi. M: Jo'xori ildizining 1mm 520 sathida 425 ta, no'xatda 232 ta tuk bor. Ildiz tuklari tirik bo'ladi. Tuklar ildizning shimuvchi satxini 5 martada n 20 martagacha ortiradi. Ildiz tuklarining ba'zilar olma, ko'mir kislotalarini ishlab chiqaradi. Ildiz tuklari orqali erdan suv va suvda erigan mineral moddalarning shimadi.

Ildizning anatomiyasi 2 ga bo'linadi.

1. Birlamchi ildiz anatomiyasi

2. Ikkilamchi ildiz anatomiyasi

Bir pallali o'simliklarning ildizi birlamchi, ikki pallali o'simliklarning ildizi esa ikkilamchi, yosh paytda esa birlamchi bo'ladi.

BIRLAMCHI ILDIZ ANATOMIYASI.

Ildiz tashqi tomondan epidermis bilan qoplangan. Epidermisdan tuklar o'sib chiqadi. Ildizning shimuvchi zonasi kundalang kesganimizda ikki qismdan iborat ekanligini ko'rish mumkin.

1. Ildizning po'stloq qismi.

2. Markaziy silindr qismi.

Ildizning po'stloq qismi 3 xil qavat xujayralardan tashkil topgan.

1. Tashqi qavat - ekzoderma.

2. O'rta qavat - mezoderma.

3. Ichki qavat - endoderma.


Ekzoderma - bir necha qator zich joylashgan ko'p qirrali parenxim xujayralardan iborat. Ekzoderma xujayralari o'lik bo'ladi, ya'ni suberin moddasi bilan suqorilib probkalanagan. Ikki pallali o'simliklarda epidermis tushib ketib o'rniga probkahosil bo'lgunga qadar qoplog'ichlik vazifasini bajarib turadi. Ba'zan ekzodermada mexanik to'qima sklerenxima xalqasi Ham joylangan bo'ladi.

Mezoderma-bir necha qavat siyrak joylashgan parenxim xujayralardan tashkil topgan. Ba'zan mezoderma xujayrasida bo'shliq joy xam uchraydi. Bu bo'shliq joyni aerinxima deyiladi. Mezodermada suv va suvda erigan oziq moddalar to'planadi. Ba'zan mezodermada chiqaruvchi organ va yo'llar bo'ladi. Mezoderma oziq moddalarni to'plashdan tashqari o'tkazuvchanlik vazifasini bajarib turadi. Ildiz tuklari shimib olgan oziq moddalar mezoderma orqali markazga o'tadi. Markazga joylashgan ksilemaning suv naylarga tushgan suv va suvda erigan mineral moddalar yuqoriga ko'tarilib ketadi.

Endoderma-odatda bir qator ba'zan ikki qator zich joylashgan parenxim xujayralardan iborat. Endoderma hujayralarning ichki va yon tomonlari probkalanagan bo'lib faqat tashqi mezodermaga qaraganda po'sti yupqaligicha qoladi. Ba'zi endodermaning tashqi va ichki tomoni yupqaligicha qolib yon tomon probkalanadi. Probkalanagan xujayralar o'lik bo'ladi. Bularning orasida ba'zi xujayralar probkalanmaydi. Prokalanmagan xujayralar tirikligicha saqlanib qoladi. Bu xujayraning endodermaning tirik o'tkazuchi xujayrasi deyiladi. Chunki bu xujayralari markaziy silindr Qismiga suv va suvda erigan xoldagi mineral moddalar o'tib turadi. Ildizning markaziy qismi peretsikl deb ataladi.¹¹

Tug'diruvchi to'qimadan boshlanadi. Peretsikl odatda bir qator ba'zan bir necha qator bo'lib joylashgan parenxim xujayralardan tashkil topgan. Peretsikl xujayralari kariokinez yo'lda bo'linib ko'payib turadi. Natijada peretsikldan yon ildizlar o'sib chiqadi. Peretsiklni kambiydan farqi kambiy erta baqordan kech kuzgacha bo'linib ko'payib turadi. Peretsikl esa ma'lum vaqtgacha bo'linib ko'payadi. Ikki pallali o'simliklardan peretsiklda fellogen ham hosil bo'ladi. Ildiz markazida o'zak xujayralari bo'lib uning atrofida ksilema so'ngra floema joylashgan. Ksilema bilan floema radial tipda joylashgan.

¹¹ Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. – T.: O'zbekiston, 2005.- 435 b.



Gulsapsar ildizining ko'ndalang kesimi.

1 - epiblema, 2 - ekzoderma, 3 - mezoderma, 4 - endoderma, 5 - peritsikl, 6 - ksilema, 7 - floema, 8 - o'tkazuvchi hujayra.

IKKILAMCHI ILDIZ ANATOMIYASI.

Ikki pallali o'simliklarning ildizi yosh vaqtida birlamchi so'ngra ikkilamchi tuzilishda bo'ladi. Ildizning ikkilamchi tuzilishida ikkilamchi o'tkazuvchi to'qimalar va ikkilamchi qoplag'ich to'qimalar vujudga keladi. Kambiydan ikkilamchi ksilema va floemalar probka kambisidan (Fellojendan) ikkilamchi qoplag'ich to'qima xosil bo'ladi. Kambiy floema bilan ksilemaning orasiga joylashgan bo'lib o'zidan yuqoriga floema elementlarini ichkariga esa ksilema elementlarini ishlab chiqarib turadi. SHuning uchun ham ikki pallali o'simliklarning poyasi va ildizi bo'yigagina emas eniga ham o'sib turadi. Kambiydan hosil bo'lgan floema, ksilema ikkilamchi ksilema va floema deb yuritiladi. Ikkilamchi ildizning markazida birlamchi ksilema (ya'ni o'zak o'rnida), uning ortida ikkilamchi ksilema joylashgan. Ikkilamchi ksilema ustida kambiy va uning yuqorisida floema so'ngra peretsikl o'rnashgan, peretsiklning yuqorisida ildizning po'stloq qismi bo'ladi. YOn ildizlar mana shu peretsikldan vujudga keladi.

Ko'p yillik, ikki pallali o'simliklarning ildizi boshqa tomondan periderma bilan qoplangan. Ildiz markazidan toki po'stloqiga qadar o'zak nur xujayralari joylashgan. O'zak nur xujayralari ko'ndalangiga yana o'zakdan po'stloqqa tomon oziq moddalarni etkazib turadi.


Ildiz mevalik o'simliklarning ildiz tuzilish jixatidan 3 xil bo'ladi.

1. Ildizning po'stloq qismi kuchli taraqqiy etgan bo'lib, oziqli moddalar asosan po'stloqda to'planadi. M: sabzi.

2. Ildizning markaziy ya'ni ksilema qismi kuchli taraqqiy etgan bo'lib oziqli moddalar shu qismga to'planadi. M: turp, rediska.

3. Ildizning po'stloq hamda markaziy qismi yaxshi taraqqiy etgan bo'lib oziqli moddalar xar ikkalasida to'planadi. M: lavlagi.

Ildiz mevalarni ildiz metamorfozlari ham deb yuritiladi. Ularda oziq moddalar to‘planadi. To‘plangan oziq moddalar O‘simlik, hayvon va inson organizmlari uchun muhim ahamiyatga ega. Ularda turli xildagi organik birikmalar xam to‘planadi.



Kovok ildizining ikkilamchi tuzilishi.

1 - birlamchi yog‘ochlik, **2** – ikkilamchi yog‘ochlik, **3** - kambiy, **4** - floema, **5** – o‘zak nurlari,
6 - koplogich tukima.

Nazorat savollari

1. Ildizlar necha xil bo‘ladi va qanday vazifani bajaradi?
2. Bir pallali o‘simliklar ildizining ichiki tuzilishida qanday to‘qimalar uchraydi?
3. Ikki pallali o‘simlik ildizida to‘qimalarning joylanishi qanday?
4. Ildiz vegetativ organ va uning vazifasi
5. Ildizning kelib chiqishiga ko‘ra xillari.
6. O‘q ildizning tuzilishi.
7. Popuk ildizning tuzilishi.
8. Shakli o‘zgargan ildizlarga nima kiradi.

Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o‘quv qo‘llanmalar ro‘yxati

1. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O‘.A. Botanika. – T.: O‘zbekiston, 2005.- 435 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O‘.A., Samatova SH. O‘simliklar sistematikasidan amaliy mashg‘ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
4. Ahmedov O‘.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elaktron darslik.-T.: 2008.

5. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –16 p.
6. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
7. Hamidov A., Nabiev M.M. “O‘zbekiston o‘simliklarini aniqlagichi”.-T.: 1987.-235 b.
8. Васильев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “Высшая школа”, 1988. -435 с.
9. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O‘.A. va boshqalar. Dorivor o‘simliklarning lotincha-o‘zbekcha-ruscha-arabcha va forsha-tojikcha lug‘ati.-T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
10. Березовская Т.П., Дмитрук С.Е., Гришина Е.И., Белоусов М.В. Основы фармацевтической ботаники. – Томск: Печатная мануфактура, 2004.-294 с.
11. Xolmatov X.X., Ahmedov O‘. A. Farmakognoziya. 1-2 qism. – T.: “Ibn Sino” nashriyoti, 2007.- 806 b.

Ma’ruza № 5

Poya morfologiyasi.O‘t o‘simliklarning poyasining anatomik tuzilishi.Daraxtsimon o‘simliklar poyasining anatomik tuzilishi.

Ma’ruzaning maqsadi: Poya morfologiyasi.O‘t o‘simliklar va daraxtsimon o‘simliklar poyasining anatomik tuzilishi ha-qida tushuncha berish.

Reja:

- 1.Novda va uning qismlari.
- 2.Poyaning yo‘nalish bo‘yicha turlari
- 3.Poyaning shoxlanishi.
- 4.Poyaning shakllari.
- 5.Qiyofasini o‘zgartirgan poyalar yoki poya metamorfozi.
- 6.O‘t o‘simliklar,daraxtsimon o‘simliklar poyasining anatomik tuzilishi.
- 7.Bir pallali o‘simliklar poyasining tuzilishi.
- 8.Bir pallali o‘simliklarning o‘tkazuvchi to‘qima bog‘lamlari
- 9.Ikki pallali o‘simliklar poyasining ichki tuzilishi.
- 10.Ikkilamchi qoplovchi to‘qima periderma va uning tuzilishi.
- 11.Ko‘p yillik yog‘ochli o‘simliklarning poyasining ichki tuzilishi.
- 12.Daraxtsimon o‘simliklarda yillik halqaning paydo bo‘lishi.

Tayanch iboralar: *Poya o‘simlikning asosiy o‘q qismi. Poyaning xillari. Tik o‘sovchi, ko‘tarilib o‘sovchi, sudralib o‘sovchi, chirmashib o‘sovchi, ilashib o‘sovchi lianalar. Poyaning shakli. Ko‘ndalang kesimi bo‘yicha poyaning xilma – xilligi. Poya sirtining tuzilishi. YAshash sharoitiga qarab o‘simlik poyalarining turlari. Novda. Novdani aniqlash. Novda qismining morfologik tuzilishi: barg va poya. Novdaning shakllanishi. Bargning novdaga joylanish qonunlari. Bo‘g‘im va bo‘g‘im oralig‘i. Uzun va qisqargan novdalar va ularning biologik o‘rni.Novdaning shoxlanishi. qiyofasini o‘zgartirgan er ostki va ustki poyalar. Poyaning ichki tuzilishi. prokambiy va o‘tkazuvchi to‘qimalarning o‘zgarishi. Poya va barglarning o‘tkazuvchi to‘qima bog‘lami. Bir va ikki pallali poyalarda o‘tkazuvchi to‘qima bog‘lamlarini paydo bo‘lishi. Bog‘lamli va bog‘lamsiz poya tuzilishi.*

Poya o'simliklarning asosiy vegetative organi bo'lib, birinchi marotaba urug' embrionidan, so'ngra kurtakdan o'sib chiqadi. Poyaning ichida hamma vaqt bosh kurtak bo'ladi. Ba'zan kurtaklar ildiz vabarglardan hosil bo'ladi. YOn novdalar yon kurtaklardan o'sib chiqadi. Qalamcha-lardan kurtaklar hosil bo'ladi. Bunday kurtak qo'shimcha kurtaklar deyiladi. Qo'shimcha kurtaklarning hosil bo'lishiga asosan qalamcha yoki parxish qilib ko'paytiriladi. Kurtaklar 2 xil bo'ladi. 1. vegetativ kurtak. 2. generativ kurtak.

Begetativ kurtakdan novda va barg hosil bo'ladi. Generativ kurtakdan esa gullar ochiladi. Generativ kurtaklarning bandi qisqa o'zi yirik bo'ladi. Kurtaklarning tashqi tomonida qo-biqqa o'xshash qalin qattiq barglari bo'ladi. Bu barglar kurtaklarning sovuqdan chirishiga yo'l qo'ymaydi. Daraxtlar odatda kuzda kurtaklana boshlaydi. Bahorda o'simliklar oldin barg chiqaradi, so'ng gullaydi. Ba'zi o'simliklar esa teskarisi. Masalan: o'rik, yong'oq. Poya o'simliklarning shox – shabbalarini ko'tarib turadi. Erdan olingan tuz va mineral moddalarni barglarga beradi. Buni chiqish oqimi deyiladi. Barglar fotosintez protsessi orqali hosil bo'lgan poya orqali ildizga tushadi, buni tushish oqimi deyiladi.

Poya yordamida o'simliklar vegetativ ravishda ko'payadi. Begetativ ko'payishga qalamcha, parxish kiradi. Poya o'zining uchki qismi bilan yuqoriga qarab o'sadi. Bir pallalik o'simliklarning poyasi bo'g'inlari bilan ham o'sadi (bug'doy, qamish, jo'xori). Chunki ularning bo'g'inlarida meristema bor. Bunday o'sishga interkolyar o'sish deyiladi. O'simliklarning poyasi o'tli yog'ochlangan bo'ladi. O'tli o'simliklar bir yillik yoki ko'p yillik bo'lishi mumkin. Bir yillik o'simliklar vegetatsion davrda ya'ni shu yilning o'zida urug'dan o'sib chiqib shu yilning o'zida urug' hosil qiladi. Masalan: qovun, tarvuz, jo'xori: 2 yillik o'simliklar birinchi yili urug'dan o'sib chiqib, ikkinchi yili urug' beradi. Masalan: sabzi, lavlagi. Ko'p yillik o'simliklar bir necha yillar yashab har yili urug' berishi mumkin. Masalan: ajriq, beda, g'umay, kartoshka, piyoz. Daraxt va butalar h belgi qo'yiladi. Daraxt va butalarning poyasi yog'ochlangan bo'ladi. Daraxtlarning butalardan farqi daraxtlarda ildizdan bitta asosiy poya o'sib chiqadi, bu asosiy poya shoxlanib, o'sib turadi. Butalarda ildizdan bir nechta poya o'sib chiqadi, ularning bo'yi daraxtlardan past bo'ladi. Masalan: na'matak, saksovul, anor. Daraxtlarning bo'yi baland bo'lib, bir necha yil yashaydi, masalan: chinorning bo'yi 30 m, oqterakning bo'yi 40 m, qarag'ay bo'yi 50 m, mamont daraxti 140 m, evkalip daraxtining bo'yi 150 m, xurmo daraxtining bo'yi 500 m bo'ladi, yashash mudati: qarag'ay 500 yil, oqterak 600 yil, olcha 1200 yil, kashtan daraxti 2000 yil, savri daraxti 3000 yil, mamont daraxti 5000 yil. Ba'zi o'tli o'simliklar poyasi juda qisqa (bir necha sm) bo'ladi. Masalan: qoqio't poyasi. O'tli o'simliklarning poyasi silindrsimon, uch qirrali (kartoshka, kiyik o't); 4 qirrali (yalpiz, rayxon); ko'p qirrali (nasha, valeriana). Poya o'zakli yoki o'zaksiz (ichi) bo'lishi mumkin. Masalan: g'alladoshlar olasiga, kovaksimonlar oilasiga vasoyabon gullilar oilasiga kiruvchi o'simliklarning poyasida o'zak bo'lmaydi. Poya er ustida tikka o'sadi. SHuning bilan bir qatorda poya yotib o'sadi (tarvuz, qovun). Ba'zi poyalar osilib o'sadi (mosh, loviya). Ba'zi poyalar chirmashib o'sadi (pechak).

Poya 4xil yo'lda shoxlanib o'sadi.

1. Monopodial shoxlanish
2. Simpodial shoxlanish
3. Dixatomik shoxlanish
4. Soxta dixatomik.

Monopodial. shoxlanganda bosh kurtak o'sishdan to'xtamaydi. YOn kurtakdan o'sib chiqqan novdalar asosiy poyaga eta olmaydi. Masalan: terak, qarag'ay, qayrag'och.

Simpodial. Tipda shoxlanganda bosh kurtak o'sishdan to'xtaganda yon kurtaklarning biri o'sishni davom ettiradi. U ham o'sishdan to'xtagach boshqasi o'sishda davom etadi (olma, o'rik, nok, kartoshka, pomidor). G'o'za monopodial va simpodial shoxlangan bo'ladi. (chekonka qilinmasa monopodial, qilinsa-simpodial).

Dixotomik. SHoxlanish-ko'pincha tuban o'simliklarda bo'ladi. Bu shoxlanishda o'simlik tanasining o'sish nuqtasi hujayralari bo'linib 2 ta bir-biriga teng bo'lgan yangi novda hosil qiladi. Bu yangi novdalar ham o'z navbatida 1 xilda bo'linib o'sadi.

Soxta dixotomik. SHoxlanish-bunda uchki kurtak gullash bilan tugallanadi yoki qurib tushib ketadi .Oʻrnida iz qoladi uning ostida qarama-qarshi joylashgan 2 ta kurtak 1 vaqtida oʻsib ayri hosil qiladi. Bu yangi novdalar ham yana shunday shoxlanadi.Masalan: siren, soxta kashtan.

Baʼzi oʻsimliklarning poyasi qiyofasini oʻzgartirib turli vazifani bajaradi. Masalan: poya tikanga aylanadi yaʼni bunda novdalar oʻsishdan toʻxtab hujayra poʻsti yogʻochlanib tikanga aylangan boʻladi. Tikanga aylangan poya oʻsimlikni himoya qiladi. Masalan akatsiya tikani, jiydaning tikani, gledichiya daraxtining tikani. Baʼzi oʻsimliklarda novdaning bir qismi yaxshi taraqqiy etmasdan ingichka boʻlib gajakka aylangan boʻladi. Gajakka aylangan poya oʻsimliklarning biror narsaga osilib oʻsishiga imkoniyat tugʻdiradi. M: tokning poyasi. Baʼzi oʻsimliklarning poyasi barg vazifasini ham bajaradi. SHuningdek poyada suv zapaslari va oziqli moddalar ham toʻplanadi. M: kaktus va semiz oʻt. Koʻp yillik oʻtli oʻsimliklarning poyasi er ostida ham boʻladi. Baʼzilariniki esa, er ustidam, er ostida ham boʻladi. Er ostidagi poyaga ildiz poya kiradi. Ildizpoyaga misol qilib gulsapsar, sariq gʻumay, beda va boshqalar. Ildizpoya yotib va tik oʻsadi, ajriq, gʻumay, gulsapsarda ildizpoya yotib oʻsadi. Ildizpoyaning ildizdan farqi shundan iboratki ildizpoyada qin va tuklar boʻlmaydi. Ildizpoyani qiyofasini oʻzgartirgan poya deymiz. CHunki bundan barg qoldiqlari va kurtaklar bor. Ildizpoyada oziqli moddalar toʻplanadi va uning yordamida oʻsimliklar vegetative urchiydi koʻpayadi.

TUGUNAK POYA

Bu poyaga kartoshka tugunagini misol qilib olishimiz mumkin. Kartoshka tugunagi ham qiyofasini oʻzgartirgan poya hisoblanadi. CHunki kartoshka tugunagi birinchidan poyadan hosil boʻladi, ikkinchidan unda kurtaklar bor. Kurtaklar kartoshkaning koʻziga joylashgan boʻladi. Kartoshka yordamida oʻsimlik vegetativ koʻpayadi. Kartoshka tugunagida zapas oziq modda-kraxmal toʻplanadi.

Piyoz boshi. Bunga lolaning piyozi,chuchmoma,boychechak piyoz,chesnok va boshqalar kiradi. Piyoz bosh ham qiyofasini oʻzgartirib poyaga kiradi. Piyoz boshining pastki tomonida kichkina oʻzak bor. Bu oʻzak poyasidan yuqoriga qarab barglar,pastga qarab sochma ildiz oʻsib chiqadi.¹²

POYANING ANATOMIYASI

Poyaning anatomiyasi 3 xil boʻladi.

1. BIR PALLALI OʻSIMLIKLARNING POYASINI ANATOMIYASI

2. OʻTLI IKKI PALLALI OʻSIMLIKLAR POYASINING ANATOMIYASI

3.YOGʻOCHLI OʻSIMLIKLAR POYASINING ANATOMIYASI

Bir pallali oʻsimliklarning poyasi birlamchi tuzilishda boʻladi.

Poya tashqi tomondan epidermis bilan qoplangan. Epidermis faqat bir qavat hujayralardan iborat. Epidermisda ustitsalar bor. Ustitsalar bargdagiga qaraganda kamroq uchraydi. Epidermisdan har xil tuklar bir hujayrali tuklar, koʻp hujayrali tuklar, bezli tuklar va boshqalar oʻsib chiqadi. Poya koʻndalang qismida epidermisning ichkarisi (tagi)da birlamchi poʻstloqning tirik parenximalari joylashgan. Baʼzan epidermis tagida mexanik toʻqima-sklerinxima joylashadi.Masalan: joʻxori poyasida. Sklerenxi-ma maʼlum joyda yoki doira boʻyicha bir necha qator joylashgan boʻladi. Poʻtloqning tirik hujayralarida xlorofil donachalari boʻlib, u erda fotosintez protsessi boradi. Fotosintez protsessida organic moddalar toʻplanadi. Poʻstloqning ichki qavatini endoderma deb ataladi. Baʼzan endoderma oʻrnida kraxmalga boy boʻlgan hujayralar uchraydi. Poyaning markaziy slindr qismi tugʻdiruvchi toʻqima peresikldan

1. ¹² Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –15 p.

boshlanadi. Peresikl poyada bir necha hujayralardan iborat. Peresikl ichkarida, ya'ni poyaning markaziy qismida o'tkazuvchi bog'lamlari asosiy to'qimalarda tarqoq joylashgan. Bir pallali o'simliklarda o'tkazuvchi to'qima bog'lami yopiq, ya'ni floema bilan ksilema o'rtasida kambiy bo'lmaydi. O'tkazuvchi to'qima bog'lami kolloterial tipda tuzilgan. YA'ni floema ksilemaning bir tomoniga o'rnashgan. Poyaning markaziy qismidagi o'tkazuvchi to'qima bog'lamlari yirik va katta, chet tomondagilari esa, maydaroq bo'ladi. Lekin o'tkazuvchi to'qima bog'lamlari poyaning chetroq qismida ko'proq bo'ladi. Sababi o'tkazuvchi to'qima bog'lamlari bargdan poyaga o'tib turadi. Bir pallali o'simliklar poyasining markazida o'zak bo'lmaydi (bug'doy poyasining ichi kovak, makkajo'xori poyasining ichi esa g'ovak bo'ladi).

O'tli ikki pallali o'simliklar ham tashqi tomondan epidermis bilan qoplangan. Poya ko'ndalang kesimida epidermis tagida birlamchi po'stloq joylashgan. Birlamchi po'stloqda 2xil mexanik to'qimalarni uchratish mumkin.:

1.Kollenxima.

2.Sklerenxima.

Kollenxima 2 xil bo'ladi: Burchakli va plastinkali. Kollenxima tirik hujayralardan tashkil topgan bo'lib, unda fotosintez protsesslar bo'lib turadi. Poyada ko'proq burchakli kollenxima uchraydi. Bunday hujayralarning faqat 4 ta burchagi yog'ochlangan bo'ladi. Sklerenxima hujayralari hamma tomonidan yog'ochlangan ya'ni o'lik bo'ladi. Sklerenxima poyaga qattiqlik beradi. Kollenxima esa 2 xil vazifani bajaradi. Poyaga elastiklik berish va oziq moddalarni tayyorlash va to'plash. O'tkazuvchi to'qima bog'lamlari poyaning markaziy slindrida, ya'ni asosiy to'qimalarida doira bo'yicha, odatda bir qator, ba'zan ikki qator joylashgan. O'tli ikki pallali o'simliklarning o'tkazuvchi to'qima bog'lamlari ochiq (floema bilan ksilema o'rtasida kambiy bor) hamda kolloterial (ksilemaning bir tomoniga floema joylashgan) yoki bikolloterial (ksilemaning har ikki tomoniga floema joylashgan) tipda tuzilgan. Masalan: Oshqovoq poyasidagi o'tkazuvchi to'qima shunday tipda tuzilgan. O'tkazuvchi to'qima bog'larining orasida oraliq kambiydan yangi o'tkazuvchi to'qima bog'lari hosil bo'lib turadi. Bu yangi hosil bo'lgan o'tkazuvchi to'qima bog'lamlari birinchi hosil bo'lgan bog'lamlarga nisbatan kichikroq bo'ladi. To'plam oralig'idagi kambiy oldingi bog'lamlardagi kambiy bilan qo'shib, kambiy halqasini tashkil qiladi. Ksilema kambiy halqasining ichki tomonidan, floema esa tashqi tomoniga joylashadi. Poyaning markazida odatda o'zak bo'ladi. Labsimongullilar oilasiga, soyabon gullilar oilasiga kiruvchi o'simliklar poyasining o'zagi tez fursatdat nobud bo'lib, poyaning ichi kovak bo'lib qoladi (shalfey, yalpiz, sabzi, ukrop, tmin). O'zak-ning chetki hujayralari tirik saqlanib qoladi. Markazdagi hujayralarning po'sti yog'ochlanadi, ya'ni o'lik bo'ladi.

Yog'ochli o'simliklarning poyasi yosh davrida epidermis bilan, keyichalik ikkilamchi qoplovchi to'qima periderma bilan o'ralib oladi. Peridermani probka kambiysi, ya'ni fellogen ishlab chiqaradi. Fellogen o'zidan yuqoriga fellemani, ichkariga fellodermani ishlab chiqaradi. Fellogenning o'zi epidermisdan yoki po'stloqning tirik hujayralaridan hosil bo'ladi. Probka bilan qoplangan qavat o'zidan suv va havoni o'tkazmaydi. Probka bilan qoplangan poyalarda chechevichkalar bo'ladi. O'simlik chechevichka orqali nafas oladi hamda ortiqcha suvlarni bug'latib turadi. Peridermaning ichkarisida birlamchi po'stloqning hujayralari joylashgan. Ularda oziq moddalar to'planadi. Ba'zan bu hujayralarda kristallar ham uchraydi. Masalan: Lipaning poyasida ko'rish mumkin. Ba'zi bir o'simliklarning po'stloqida smola yo'llari yoki efir moylari ishlab chiqaruvchi bezli hujayralar joylashgan bo'ladi. Poyaning markaziy slindri peresikldan boshlanadi. Peresikldan ichkarida, ya'ni ikkilamchi po'stloqda floema joylashgan. Poyaning yog'ochli qismi ksilema va o'zakdan iborat. Ksilema bilan floema o'rtasida kambiy bo'linib ko'payib turadi. Kambiy hujayralari faqat qishda bo'linishdan to'xtaydi. Kambiy o'zidan yuqoriga floema elementlarini ichkari tomonga esa, ksilema elementlarini ishlab chiqaradi. Floemaga nisbatan ksilema qismi bir necha marotaba ortiq ishlab chiqariladi. SHuning uchun ham poyaning po'stloq qismiga nisbatan yog'ochlik qismi qalin bo'ladi.

Daraxtlarning yog‘ochlik qismiga qarab, yoshini aytish mumkin. Kambiyning kuzda ishlab chiqargan suv naylari mayday, qalin po‘stlik, ksilema elementlari zich joylashgan bo‘ladi. Natijqda bahor bilan kuz o‘rtasida yillik chegara halqa hosil bo‘ladi. Bu halqalarni yillik halqa deyishadi. Yillik halqalarning soniga qarab, o‘simliklarning yoshi aytiladi. O‘zakdan po‘stloqqa qarab o‘zak nur hujayralari joylashgan bo‘ladi. O‘zak nur hujayralari po‘stloqqa suv va mineral moddalarni, po‘stloq-dan markazga esa, organik moddalarni o‘tkazadi. Daraxtlarning yog‘ochlik qismi markaziy tomoni **Yadro** bo‘lib hisoblanadi. Markazda bo‘lgan suv naylari berkiladi. Suv naylari hamda ksilemaning parenxim hujayralarining po‘sti oshlovchi moddalar, smola yoki boshqa organik moddalar bilan sug‘oriladi. SHuning uchun daraxtning poyasi juda mustahkam bo‘ladi. SHuning uchun ham paxtaning poyasi duradgorlikda ishlatiladi. Daraxtlarda **Yadro** 30 yilda tuziladi. YAdroning qattiqligi o‘simlikning yoshiga bog‘liq emas, ob-havoga, tuproqqa bog‘liq. **Yadro** tuzilgandan so‘ng ksilemaning **Yadro** atrofidagi yosh qismi o‘tkazuvchanlik vazifasini bajarib turadi.

Nazorat savollari

1. Poya deb nimaga aytiladi va u qanday vazifalarni bajaradi?
2. Poyalar necha xil shoxlanadi?
3. Er ustki va er ostki qiyofasini o‘zgartirgan poyalar necha xil bo‘ladi?
4. Poyaning ichki tuzilishi necha xil bo‘ladi?
5. Bir pallali o‘tli o‘simliklar ichki tuzilishi qanday?
6. O‘tli ikki pallali o‘simliklar poyasining ichki tuzilishi qanday bo‘ladi?
7. Ko‘p yillik yog‘ochli o‘simliklar poyasining ichki tuzilishi qanday?
8. Poya vegetativ organ va uning vazifasi
9. Poyaning tuzilishi va o‘sishi qanday.
10. O‘simliklar turiga qarab, poyaning shakllari.
11. Tabiatning tashqi muhitiga moslashgan poyaning xillari.
12. Poyaning shoxlanish xillari.
13. Poyaning shoxlanish xillarini ta‘riflang
14. Yer ustki shakli o‘zgargan poyalar.
15. Yer ostki shakli o‘zgargan poyalar.

Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o‘quv qo‘llanmalar ro‘yxati

1. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O‘.A. Botanika. – T.: O‘zbekiston, 2005.- 435 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O‘.A., Samatova SH. O‘simliklar sistematikasidan amaliy mashg‘ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
4. Ahmedov O‘.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elaktron darslik.-T.: 2008.
5. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –15 p.
6. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
7. Hamidov A., Nabiev M.M. “O‘zbekiston o‘simliklarini aniqlagichi”.-T.: 1987.-235 b.
8. Васильев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “Высшая школа”, 1988. -435 с.
9. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O‘.A. va boshqalar. Dorivor o‘simliklarning lotincha-o‘zbekcha-ruscha-arabcha va forsha-tojikcha lug‘ati.-T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.

10. Березовская Т.П., Дмитрук С.Е., Гришина Е.И., Белоусов М.В. Основы фармацевтической ботаники. – Томск: Печатная мануфактура, 2004.-294 с.
11. Xolmatov X.X., Ahmedov O'. A. Farmakognosiya. 1-2 qism. – T.: "Ibn Sino" nashiryoti, 2007.- 806 b.

Ma'ruza - 6

Barg morfologiyasi. Bargning anatomik tuzilishi.

Ma'ruzaning maqsadi:

Barg vazifasi, uning qismlari. Bargning poyada joylanishi. Oddiy va murakkab barglar, qiyofasini o'zgartirgan barglar, bargning ichki tuzilishi to'g'risida tushuncha beriladi.

Reja:

1. Barg vazifasi
2. Barg qismlari
3. Barg plastinkasining tuzilishi
4. Bargning poyaga joylanishi
5. Murakkab barglar
6. Barg metamorfozasi
7. Barg ichki tuzilishining xillari
8. Barg ichki tuzilishining o'simlikning yashash sharoitiga bog'liqligi
9. Dorzoventral barg anatomiyasi
10. Izoloterial barg anatomiyasi
11. Radial barg anatomiyasi

Tayanch iboralar: *Barg. Barg yuksak o'simliklarning asosiy vegetativ organi. Bargdagi muhim biologik jarayonlar: fotosintez, transpiratsiya (suvni bug'latish). To'liq va to'liqsiz barglar. Shakllangan barg qismi: barg plastinkasi, bandli va qo'shimcha barg (yon bargcha). Oddiy va murakkab barglar va ularning xillari. Barg plastinkasining cheti, shakli, uchi, asosi va tomirlanishi. SHaklini o'zgartirgan barglar. Barg metamorfozi. Vazifasiga qarab ichki tuzilishi: dorzoventral, izoloterial, radial barglar. Tashqi muhitga qarab barg tuzilishini moslanishi. Barg mezofili. Ustunsimon to'qima hujayralari. Bulutsimon g'ovak to'qimalar. Motor hujayralar. hoshiyali parenxima hujayralari. Smola yo'li. Eptilial qatlam. O'tkazuvchi sistema. Barg tomir o'tgan qismi: mexanik, asosiy, o'tkazuvchi to'qimalar.*

BARG MORFOLOGIYASI- Folium.

Barg vegetativ a'zo sifatida yuksak o'simliklar uchun xosdir. Barg vositasida o'simliklarning tashqi muhit bilan munosabati amalga oshadi. Barg poyada joylashgan bo'lib, uning o'sish konusidagi merestema hujayralarining rivojlanishidan hosil bo'ladi. Ular poyada o'ziga xos navbat bilan joylashgan bo'lib, uning eniga va bo'yiga o'sishi bargning asosini va barg yaprog'ini hosil qiladi. Barg birinchi marotaba urug' embrionidan yoki kurtakdan o'sib chiqadi. Barg pastki tomoni bilan o'sadi. Ba'zi o'simliklarda masalan qirqquloqsimonlarda barg uchi bilan o'sadi. Ko'pchilik o'simliklar bargi bahorda chiqib kuzda to'kiladi. Ba'zi o'simliklarning bargi esa bir necha yil to'kilmadan turadi. Masalan: qarag'ayning bargi 3 yil,

archaning bargi 10 yil, velvichiya deb atalgan o'simlikning bargi 100 yil to'kilmasdan tura oladi.

Barg quyidagi funksiyalarni bajaradi.

1. Fotosintez
2. Gazlar almashinuvi
3. Suv bug'latish
4. Zahira oziq moddalarni saqlash (karam, piyoz)
5. Himoya vazifasi (tikanaklar)
6. Vegetativ ko'payishga, xizmat qiladi (yapon binafshasi, begoniya)

Barg quyidagi qismlardan tuzilgan bo'ladi va barg bandi, plastinkasi, yon bargcha va barg asosi. Barg asosi bilan novdaga birlashib turadi. Barg bandi barg asosi va yaprog'ini orasida hosil bo'ladi. Uning vazifasi bargni yorug'likka qaratib, maxanik vazifani bajarishidir. U ayrim o'simliklarda yaxshi rivojlangan bo'lsa, ayrimlarida bo'lmaydi, bunday barglar o'troq barglar deyiladi. Bunday barglar g'allagulli o'simliklarda hosil bo'lib, barg qinchasi, tilchasini hosil qilib bo'g'indan bo'g'ingacha masofada joylashadi. YOn bargchalar mayda bo'lib, asosan 2 tadan bo'ladi.

Vazifasi kurtakni himoya qilishidir. Ayrim o'simliklarda ular tushib ketadi. (qamish, olma, nok). Masalan: moshda, g'o'zada uch burchakli bo'lsa, akatsiyada tikanaklarga aylanadi. Vegetatsiya davrida har bir o'simlikda quyidagi toifadagi barglar hosil bo'ladi.

1. Pastki yarusdagi barglarga kurtakdagi, ildizpoyadagi, piyoz boshlardagi barglar kiradi.
2. O'rtayarusdagi barglar haqiqiy yashil barglar hisoblanadi.
3. YUqori yarusdagi barglarga. G'unchani va to'p gullarni o'rab turuvchi barglar kiradi.

Ba'zi o'simliklarning bargi bandsiz bo'ladi, Masalan, ko'knorning bargi. Ba'zi o'simliklarning bargi qinli. Masalan: g'alladoshlarning bargi, soyabongullilarning oilasiga kirgan o'simliklar.

Barg bandli ham bo'ladi. Ba'zi o'simliklarning bargining tagida qo'shimcha bargi ham bo'ladi. Masalan: no'xat, g'o'za barglari tagida.

Agar barg plastinkasi 1 ta bo'lsa *oddiy barg* deyiladi. Barg plastinkasi butun yoki qirqilgan bo'lishi mumkin. Agar barg plastinkasi o'rta tomiriga nisbatan 1/3 qismi qirqilgan bo'lsa, bo'lakli barg deyiladi. masalan: chinor, anjir, g'o'za, terak, dub barglari. Agar barg plastinkasi bundan ham chuqurroq qirqilgan bo'lsa, ammo o'rta tomirigacha etmagan bo'lsa, kesik barg deyiladi. Masalan: qoqio't, jag'-jag'.

Agar barg plastinkasi o'rta tomirigacha qirqilgan bo'lsa, ajralgan barg deyiladi. Masalan: pomidor, kartoshka.

Barg plastinkasining cheti tekis qirrali yoki tishsimon, arrasimon yoki o'yiqsimon bo'lishi mumkin.

Barg plastinkasi har xil shaklda: ninasimon (qarag'ay), chiziqsimon (g'alladoshlar), lantsetsimon (shaftoli, tol), yuraksimon (o'rik), buyraksimon (tugmachagul), tuxumsimon (qora ituzum), o'roqsimon (evkalipt), strelkasimon (pechakgul) va boshqa bo'lishi mumkin.

Barg plastinkasi xar xil kattalikda bo'ladi. Masalan: Gruziyada o'suvchi Pterium o'simligi bargi nihoyat darajada katta bo'ladi. Odam bemalol ko'rpa qilib ustiga yopsa bo'ladi.

Barg poyaga xar xil ravishda o'rnashadi. Ba'zi o'simliklarning bargi poyada ketma-ket o'rnashadi. Masalan: tol, terak barglari. Barg poyada qarama-qarshi o'rnashgan. Masalan: labsimongullilar oilasiga kiradigan o'simliklar (yalpiz, shalfey). Ba'zi o'simliklarning bargi poyada halqasimon ravishda joylashgan. Sambitgul o'simligining bargi 3 tasi bitta joydan chiqqan bo'ladi.

Bargning asosiy bandi bo'lib, shu asosiy bandga bir nechta bargchalar o'zlarining bandchalari bilan joylashgan bo'lsa, *murakkab barg* deyiladi. Murakkab barglar bir necha xil bo'ladi:

1. 3 plastinkali murakkab barg Masalan: qulupnay, bedaning bargi.
2. Toq patli murakkab barg. Masalan: na'matak, yong'oq, akatsiya bargi kiradi.
3. Juft patli murakkab barg Masalan: no'xatning bargi, sariq akatsiyaning bargi.


4. Panjasimon murakkab barg Masalan: nasha, kashtanning bargi

Barg plastinkasining tomirlanishi har xil bo'ladi. Bir pallali o'simliklarning bargi parallel yoki yoysimon tomirlangan bo'ladi. Moy landishining bargi yoysimon, bug'doy, jo'xori, arpaning bargi parallel tomirlangan bo'ladi. Ikki pallali o'simliklarning bargi to'rsimon tomirlangan bo'ladi. To'rsimon tomirlanish 3 xil bo'ladi:

1. PATSIMON TOMIRLANISH
2. BARMOQSIMON (Panjasimon)
3. YULDUZSIMON


TURINI O'ZGARTIRGAN BARGLAR

Evolyutsiya jaryonida ko'pchilik yuksak o'simliklar vegetativ organlarida bo'lgani singari barg ham o'z tashqi ko'rinishini o'zgartirib boshqa fiziologik funksiyani bajaradigan bo'lgan.




Oddiy barglarning turlari:

A-panjasimon o'yilgan; B-patsimon o'yilgan; V- panjasimon bo'lingan; G- patsimon bo'lingan; D- panjasimon qirqilgan; e- patsimon qirqilgan.



Murakkab barglar:

1,2,3-uch bargchali murakkab barglar; 4,5,6-toq patsimon murakkab barglar; 7-juft patsimon murakkab barglar; 8,9,11-pajasimon murakkab barglar; 10-yon bargli jingalakli patsimon murakkab barg.



Barglarning joylanishi:

A-navbatlashib; B-qarama-qarshi;

Barg metamorfoziga tikanaklar, mo'ylovlar, zahira oziq modda to'plovchi barglar, tangacha barglar va hashoratxo'r o'simlik barglari misol bo'ladi. Ko'pchilik hashoratxo'r o'simliklarda barg bandi barg plastinkasi vazifasini bajaradi. Bunga fillodiya deyiladi. Kaktus, astragal, qushqo'nmas o'simliklarida barg plastinkasi tikanaklarga aylanadi. Mosh, no'xot, qovoq, yovvoyi no'xot o'simliklarida barg plastinkasi o'ziga xos mo'ylovlar hosil qiladi. Oq akatsiyada kovil, qarag'ayda yon barglar tikanlar hosil qiladi. Hashoratxo'r o'simliklarda bezli to'qimalar bo'lib, ulardan ishlab chiqarilgan sekretlar hashoratlarni jalb qilish va parchalash xususiyatiga ega. Hashoratxo'r o'simliklarni 450 dan ortiq turi mavjud bo'lib, ular rossiyankalilar, puzirchatkalilar, nepentesoviklar oilasiga mansubdir. Ba'zi o'simliklarning bargi asosiy vazifadan tashqari qo'shimcha vazifalarni ham bajaradi. Masalan, kurtaklarning tashqi tomonidagi qobiqsimon barglar meristemani tashqi sharoitdan saqlab turadi. Piyozning tashqi tomonidagi quruq barglar ichki tomonidagi qismlarini qurib qolishidan saqlaydi. Makkajo'xorining so'tasini o'rab olgan barglar ham jo'xori donini quyosh ta'sirida qurib qolish, chirish va kurtlarning eb ketilishidan saqlaydi.¹³

Ba'zi o'simliklarning barglari qisman yoki butunlay tikonga aylangan bo'ladi. Masalan: qushqo'nmas, qo'ytikan deb atalgan o'simliklarning barglari qisman tikanga aylangan bo'ladi. Kaktus va barbaris o'simliklarining barglari esa butunlay tikanga aylangan. Demak, tikanlar o'simliklarni himoya qiladi. Agava va aloe o'simliklarning barglarida suv zapaslari to'planadi. Ba'zi bir o'simliklarning barglari gajakka aylangan. Bu gajakka aylangan barglar yordamida o'simlik biror narsaga osilib yoki chirmashib o'sad. Masalan, mosh, loviya, no'xot. Avstraliyada o'suvchi Avstraliya akatsiyasining barg bandi yaxshi taraqqiy etib, barg plastinkasiga aylangan bo'ladi. Bunday barglarni fillodiya deb ataladi. Plastinkaga aylangan barg bandida fotosintez protsessi bo'ladi. Demak, barg bandining plastinkasiga aylanishi fotosintez protsessiga bo'lgan talabdan dei hisoblanadi. Ba'zi bir o'simliklarda oqsil modda etishmaganligi sababli barg hashorat tutadigan qopqonga aylanadi. Bunday o'simliklarga: rosyanka, muxolovka, puzirchatka, kuvshinkalar kiradi. O'simlik gul kosachasi, otalik va onalıkları qiyofasini o'zgartirgan barg ekanligini nemis shoiri va tabiatshunosi Gyote aniqlagan. Ba'zi bir o'simliklarning barglari yordamida vegetativ ko'payishi mumkin. Masalan: begoniya va fikus. Ba'zi bir o'simliklarning barglari ildiz vazifasini ham bajaradi. Masalan: suv qirqqulog'i - salviniya Salviniya natans. Bu o'simliklarda 2 xil barg: suvning yuzasidagi va suvning ichkarisidagi barg bor. Suvning ichkarisidagi barg ildiz vazifasini bajaradi. Barg juda ham o'zgaruvchan organ. Bargning o'zgarishi o'simlikning yashash sharoitiga bog'liq. Ba'zan bir tup o'simlikning o'zida ham har xil barglar uchraydi. O'simlikning pastki, o'rtasidagi, yuqoridagi barglari farqlanadi. Odatda o'rta barglar o'simliklar uchun tipik barg bo'lib hisoblanadi.

BARG ANATOMIYASI

Bargning ichki tuzilishi 3 xil bo'ladi:

1. DORZOVENTRAL
2. IZOLOTERIAL
3. RADIAL

Dorzoventral bargning yuqori tomoni pastki tomonga o'xshash bo'lmaydi. Chunki yuqori tomonda qoziqsimon to'qimalar, pastki tomonda esa bulutsimon to'qimalar joylashgan.

1. ¹³ Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –

Izoloterial bargning yuqori tomoni pastki tomoniga o'xshash bo'ladi. Bargning yuqorisida ham pastki tomonida ham qoziqsimon to'qimalar joylashgan.

Radial bargning tuzilishi novdaga o'xshash bo'ladi. Bargning ichki tuzilishi o'simlikning yashash sharoitiga ham bog'likdir.

Issiq sharoitda yashaydigan o'simliklarni **kserofit** o'simliklar deyiladi. O'rta iqlimda yashaydigan o'simliklarni **mezofit** deyiladi.

Suv va nam sharoitda yashaydigan o'simliklarni **gidrofit** deyiladi. O'simliklarning bargi epidermis bilan qoplangan. Ba'zi o'simliklarning bargi ko'p yillik bo'lsa ham, (archa, qarag'ay) epidermis bilan qoplangan. Epidermisning ustida kutikula qavati yoki mum izlari bo'ladi. Kserofit sharoitda yashaydigan o'simliklarning bargining epidermisida kutikula qavat qalin, epidermis bir necha qavat bo'ladi. Bu o'simliklarda qoziqsimon to'qima yaxshi taraqqiy etgan. Mezofit sharoitda yashaydigan o'simliklarda epidermis bir qavat, qoziqsimon to'qima ham bargning yuqori tomonidan odatda bir qavat joylashgan bo'ladi. Ba'zan ikki qavat ham bo'lishi mumkin. Gidrofit sharoitda yashaydigan o'simliklarda qoziqsimon to'qima bo'lmaydi. Kserofit sharoitda yashaydigan o'simliklarda og'izchalar faqat bargning pastki tomoniga joylashgan bo'ladi. Mezofit sharoitda yashaydigan o'simliklarda og'izchalar bargning asosan pastki tomonida, qisman yuqori tomonda joylashgan bo'ladi. Gidrofit sharoitda yashaydigan o'simliklarda esa og'izchalar bargning yuqori va pastki tomonida joylashgan bo'ladi.


Barg plastinkasi 2 qismdan iborat:

1. Bargning yumshoq qismi- mezofill
2. Bargning tomir o'tgan qismi

Bargning yumshoq qismi mezofillda qoziqsimon va bulutsimon to'qimalar joylashgan. Odatda qoziqsimon to'qimaning ichkari tomonida bulutsimon to'qima joylashgan. Qoziqsimon to'qima zich joylashgan bo'ladi. Bulutsimon to'qimaning hujayralari orasida bo'shliq bo'ladi. Bargning mezofill qismida ba'zi hujayralarda kristallar to'planadi. Ba'zilarining hujayrasida suv zapaslari to'planadi. Ba'zan mezofillda toshsimon hujayra sklereid uchraydi. Masalan: choyning bargida. Ba'zan o'simliklarning mezofilida oshlovchi dubil moddalar, efir moylari va boshqa moddalarni ishlab chiqaradigan hujayralari uchraydi. Masalan: lavr, evkalipta, magnoliya va boshqalar. Qoziqsimon va bulutsimon to'qimalarni - assimilyatsion to'qima deb ham yuritiladi. Chunki ularning hujayrasida fotosintez protsessi bo'lib turadi. Bulutsimon to'qima siyrak joylashganligi uchun hujayralar oralaridan havo o'tib turadi. Natijada barg shamollatib turiladi. SHuning uchun bu to'qimani ventilyatsion to'qima deb ham yuritiladi. Bargning tomir o'tgan qismida mexanik to'qima kollenxima, asosiy to'qima, hamda o'tkazuvchi to'qima bog'lamlari joylashgan. O'tkazuvchi to'qima bog'lamlarining soni 1 dan 7 tagacha boradi. O'tkazuvchi to'qima bog'lamida kambiy bo'lmaydi. YA'ni o'tkazuvchi to'qima bog'lami yopiq bo'ladi. O'tkazuvchi to'qima bog'lami kolloteral tipda tuzilgan. Bargning poyadan farqi shundaki unda floema kollenximaning pastki tomoniga joylashgan bo'ladi,. Bargning yumshoq qismiga qattiqlik beruvchi moddalarni idioblast deyiladi.

DORZOVENTRAL BARG TUZILISHI

Dorzoventral bargda yuqori tomonida ustunsimon, pastki tomonida bulutsimon yoki g'ovaksimon to'qimalar joylashgaq\ n bo'ladi. Cho'ziq barg sathiga nisbatan perpendikulyar joylashgan hujayralar ustunsimon parenxima deb atalib, ba'zi o'simliklarda bir qator (g'o'za bargi), ba'zilarida 2—3 qator (sambitgulda) bo'lib joylanadi. Turli shakldagi hujayralardan iborat to'qima bulutsimon yoki g'ovak to'qima deb ataladi.



Dorsoventral bargning tuzilishi.

jv — bezli tukcha, kv — oddiy tukcha, ve — ustki epidermis, pm — qoziqsimon to‘qima, gm — bulutsimon to‘qima, ne — ostki epidermis, ks — ksilema, f — floema, s — sklerenxima, koll — kollenxima, ok — bog‘lamni o‘rab turuvchi hujayra, u — og‘izcha.

Ustunsimon to‘qimalarning zich joylashganligi fotosintez hodisasida quyosh nuridan samarali foydalanishga, assimilyatsiya natijasida hosil bo‘ladigan moddalarni boshqa to‘qimalarga o‘tkazishga yordam beradi.


Bulutsimon to‘qimalar orasida hujayralararo bo‘shliqlar bo‘lyb, ular siyrak joylashgan. Ustunsimon hujayralarda xloroplast ko‘proq, shuning uchun barg ustki tomondan to‘q yashil bo‘lib ko‘rinsa, bulutsimon to‘qima hujayralarida esa xlorofill donachalari kamroq, shu sababli barg ostki tomondan och yashil rangda bo‘ladi. Hujayralararo bo‘shliq orqali suv, havo bug‘lari harakatlanib, ortiqcha miqdordagisi havo yo‘llari orqali tashqi muhitga chiqariladi.

Ustunsimon to‘qimalarda fotosintez jarayoni faol ketsa, bulutsimon to‘qimalarda ko‘proq transpiratsiya (bug‘lanish) hodisasi sodir bo‘ladi. Ustunsimon to‘qima hujayralari o‘tkazuvchi to‘qima hujayralariga yondashgan holda yoki bulutsimon to‘qima o‘zining yassi tomoni bilan ustunsimon to‘qimaga birikib, unda tayyor bo‘lgan organik moddalarni floemaga etkazib beradi. Bu organik moddalarning bir qismi bargning taraqqiyoti uchun sarflansa, qolgan qismi o‘simlikning boshqa organlariga tarqaladi.

Dorzoventral tuzilishga ega bo‘lgan barglar ko‘pincha mezofit o‘rta sharoitda yashaydigan o‘simliklarda uchraydi.

IZOLATERIAL BARG TUZILISHI


Izolateral tuzilishdagi (palisad) barglarda yuqori va pastki epiderma ostida, ya‘ni ikki tomonlama ustunsimon to‘qima joylashgan bo‘ladi. Ustunsimon to‘qimalar orasida bulutsimon to‘qima hujayralari va o‘tkazuvchi to‘qima bog‘lamlari joylashgan bo‘ladi. Bunday barglar asosan kserofit o‘simliklarda (shuvoq, sambitgul), ba‘zan mezofit o‘simliklarda (tol, zig‘ir) uchraydi. Bunday tuzilishdagi barglarda ko‘pincha havo yo‘llari bargning pastki tomonidagi chuqurchalarda joylashadi. Natijada o‘simlik suvni tejab sarflaydi.



Shuvoq bargining ko'ndalang kesimi.

v — tuk, jv — bezli tuk, ev — ustki epidermis, en — ostki epidermis, pt — ustunsimon to'qima, kss — o'rtangi qavat hujayralar, pp — o'tkazuvchi boqlam, k — kutikula.

RADIAL BARG TUZILISHI



Qarag'ay bargining mikroskopik tuzilishi: 1-epidermis, 2-chokli parenxima, 3-smola yo'llari, 4-og'izcha, 5-nedoderma, 6-parenxima hujayralari, 7-sklerenxima, 8-floema.

Radial bargda barg mezofili radius bo'ylab, ya'ni aylana bo'ylab joylashadi. Radial bargga misol qilib, qarag'ay bargini olamiz. Bargning rivojlanishida hamma to'qimalar ham bir tekisda o'sadi. Lekin ninabargli o'simliklarda barg epidermisining o'sishi assimilyatsion

to‘qimaga nisbatan barvaqt to‘xtaydi, natijada assimilyatsion to‘qimani hosil qilayotgan hujayralar o‘shida davom etib, ular egri-bugri holatdagi hoshiyali parenximani hosil qiladi. Qarag‘ayning bargi ko‘p yillik bo‘lsa ham, boshqa barglarga o‘xshash epidermis bilan qoplangan. Epidermis hujayra-larining po‘sti qalin, tashqi tomondan kutikula bilan qoplangan. Og‘izchalar epidermisdan chuquroqda joylashgan. Epidermisni ichkari tomonida mexanik to‘qima gipoderma joylashgan. Gipoderma bargga qattqlik berishdan tashqari, epidermis shikastlanganda qoplog‘ichlik vazifasini bajarib turadi. Bargning assimilyatsion to‘qimasi chokli parenximadan tashkil topgan. CHokli parenximada hujayra ichkari tomonga kiradi. Assimilyatsion to‘qima bargning po‘stloq qismida joylashgan. Bargning po‘stloq qismida smola yo‘llari bor. Smola yo‘li atrofida 2 qavat hujayralar joylashgan. Bir qavati tirik hujayralardan iborat bo‘lib, uni epitelial hujayra deyiladi. Ba‘zi olimlarning fikricha epitelial hujayralar smola ishlab chiqaradi. Epitelial hujayra atrofida mexanik to‘qimaga kiruvchi o‘lik hujayralar joylashgan. Bargning markaziy qismi ichkari tomoniga joylashgan. Markaziy qismida asosiy to‘qima, mexanik to‘qima-sklerenxima hamda o‘tkazuvchi to‘qima bog‘lamlari joylashgan. Radial bargda xuddi poyaga o‘xshab o‘tkazuvchi to‘qima bog‘lamlarida floema ksilemaning yuqori tomoniga joylashgan bo‘ladi. Qarag‘ay ochiq urug‘li o‘simliklarga kirgani uchun o‘tkazuvchi to‘qimada suv naylari bo‘lamaydi. Suv naylari vazifasini traxeidlar bajarib turadi, ya‘ni suv va suvda erigan moddalar traxeidlar orqali o‘tib turadi.

Nazorat savollari

1. Barg qanday vazifani bajaradi?
2. Barg qismlari va ularning morfologik tuzilishi qanday?
3. Qanday turini o‘zgartirgan barglarni bilasiz?
4. Bargning ichki tuzilishi necha xil bo‘ladi?
5. To‘liq barg to‘liqsiz bargdan nima bilan farq qiladi.
6. Barglarning morfologik tuzilishi.
7. Oddiy barg formalari (misol)
8. Murakkab barg formalariga (misol)
9. Barg qirralari xilma-xilligi.
10. Barg plastinkasining qir qilishiga qarab xillari.
11. Barg plastinkasining tomirlanishi.
12. Barglarning katta-kichikligi va yashovchanligi.
13. Barglarning novdalarda joylanish xillari

Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o‘quv qo‘llanmalar ro‘yxati

1. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O‘.A. Botanika. – T.: O‘zbekiston, 2005.- 435 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O‘.A., Samatova SH. O‘simliklar sistematikasidan amaliy mashg‘ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
4. Ahmedov O‘.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elaktron darslik.-T.: 2008.
5. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –15 p.
6. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.

7. Hamidov A., Nabiev M.M. "O'zbekiston o'simliklarini aniqlagichi".-T.: 1987.-235 b.
8. Васильев А.Е. "Морфология, анатомия растений". – М.: Изд-во "Высшая школа", 1988. -435 с.
9. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O'.A. va boshqalar. Dorivor o'simliklarning lotincha-o'zbekcha-ruscha-arabcha va forscha-tojikcha lug'ati.-T.: X.F. "Nizim" bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
10. Березовская Т.П., Дмитрук С.Е., Гришина Е.И., Белоусов М.В. Основы фармацевтической ботаники. – Томск: Печатная мануфактура, 2004.-294 с.
11. Xolmatov X.X., Ahmedov O'. A. Farmakognosiya. 1-2 qism. – T.: "Ibn Sino" nashiryoti, 2007.- 806 b.

Ma'ruza - 7

Bargdagi fizologik protsesslar. O'simliklarning ko'payishi, o'sishi va rivojlanishi

Ma'ruzaning maqsadi:Bargdagi assimilyatsiya, dissimilyatsiya va transpiratsiya protsesslari,ularning ahamiyati.

Reja

- 1.Bargdagi assimilyatsiya protsessi.
- 2.Bargdagi dissimilyatsiya protsessi.
- 3.Bargdagi transpiratsiya protsessi.
- 4.Bargdagi fiziologik protsesslar ahamiyati.
- 5.O'simliklarni ko'payishi va rivojlanishi.

Tayanch iboralar: *O'simlik fiziologiyasi: fotosintez. Fotosintezning ochilish tarixi. Pristli tajribasi. YAn Ingixauz ishlari. Fotosintez haqida zamonaviy tushuncha. Xlorofill tarkibi, tuzilishi, yorug'lik spektorning hosil bo'lishi. Xlorofill, karotin va boshqa pigmentlarni fotosintezda ishtirok etishi. Fotosintezni 2 fazasi: yorug'lik va qorong'ulikda bo'ladigan jarayonlar. Tashqi ta'surotni fotosintez jarayoniga ta'siri.*

O'simliklarni nafas olishi. O'simliklar hayotida nafas olishning ahamiyati va umumiy xususiyatlari. Nafas olishda ishtirok etadigan fermentlar va kimyoviy jarayon. Nafas olishni ichki va tashqi sharoitga bog'liqligi.


BARGNING ASOSIY VAZIFALARI

Assimilyatsiya.Dissimilyatsiya.Traspiratsiya.

1771 yili ingliz olimi Pristli havoda O₂ borligini aniqlaydi. Pristli o'simliklar tomonidan CO₂ o'zlashtirilishi masalasini tekshiradi. Havo tarkibida CO₂ ning miqdori 0,03%. Ammo Pristli qaysi vaqtda o'simliklar CO₂ ni yutishini aniklay olmaydi. Uning shogirdi Gollandiya olimi YAn Ingengauz 1779-yilda o'simliklar CO₂ kunduzgi quyosh bor vaqtida yutilishini aniqladi. Bulardan keyin SHvetsariya olimlari Senebe, Sossyur quyosh bor vaqtida havoda CO₂ kamayib O₂ ko'payishini ,rus olimi Vinogradov CO₂ o'simlik hujayrasida O₂ va karbonga parchalanib, havoga chiqib ketishini payqaydi.1860-yili nemis olimi Saks o'simliklarning hujayrasida CO₂ ning suv bilan qo'shilishidan kraxmal (C₆H₁₂O₅)_n hosil bo'lganligini aniqladi. Kraxmal hosil bo'lishi quyosh nuriga bog'liq bo'lgani uchun, bu protsess "fotosintez" deb ham ataladi.¹⁴

¹⁴. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: "Высшая школа" , 2001.-230 с.

Quyosh nurining ahamiyatini K.A.Timiryazov aniqladi. Timiryazovning ko'rsatishicha o'simlik quyosh nurining 75% ini yutadi. Qolgan 25% i o'simlik organidan yutilmasdan o'tib ketadi. YUtilgan 75% nurning 1-5% i fotosintezda ishtirok etadi. Ba'zan 10% ga yaqini o'simliklar tomonidan sun'iy bug'lantirishga sarf bo'ladi. Timiryazov xlorofillning spektrini aniqladi. YA'ni quyosh spektri 7 ta nurdan iborat bo'lsa, xlorofill 3 tasini yutadi. Timiryazev ko'rsatishicha xlorofill quyoshning B bilan C orasidagi qizil nurni, ko'k va binafsha nurini ko'p yutadi. O'simliklarning bir yildagi fotosintezi uchun 162 tirillion kkal issiqlik sarf bo'ladi. Rus olimi Vinogradov fotosintez protsessida CO₂ emas, balki H₂O parchalanishini isbotladi. U H₂O karbon bilan birikadi O₂ esa havoga chiqib ketadi deb, hisoblaydi. YA'ni u Timiryazev kursatgan fikrni tasdiqlaydi.



CO₂ ildiz orqali olingan suv bilan birikib, chumoli aldegid hosil qiladi. Ortiqcha O₂ havoga chiqib ketadi. CHOH ning 6 molekulasini xlorofill donalarida birikib, 1 molekula shakar hosil bo'ladi (C₆H₁₂O₆).

Rus olimi Butlerov laboratoriyada chumoli aldegid CHOH dan glyukoza C₆H₁₂O₆ olgan, 1 molekula shakar hosil bo'lishi uchun 674 kkal quyosh energiyasi sarf bo'ladi. Assimilyatsiya protsessining formulasini quyidagicha yoziladi.



Ko'pchilik o'simliklarda shakar darhol xlorofill donalari ichida kraxmalga aylanadi.



Shakarning kraxmalga aylanishi diastaza fermenti ta'sirida bo'ladi. Kraxmal ba'zi o'simliklarda lolagullilar oilasiga kiruvchi o'simliklarda (lola, piyoz, sarimsoq piyoz)da bo'lmaydi. Bu o'simliklarda oziqli modda sifatida ikkilamchi shakar va kraxmal to'planadi. Birlamchi shakar va kraxmal qisman sarflanadi, qisman oziqli modda sifatida to'planadi. Oziqli modda sifatida to'plangan shakar va kraxmal "ikkilamchi" deyiladi. Fotosintez jarayoni natijasida barcha tirik organizmlar uchun zarur bo'lgan organik moddalar hosil bo'ladi. Olimlarning hisoblashlaricha Er sharidagi barcha yashil o'simliklar har yili 2 mlrd. t azot, 6 mlrd. t fosfor, 170 mlrd. t uglerod hosil qiladi. Bunda 500 mlrd. t suvni parlatib, 400 mlrd. t organik moddalar hosil qiladi va 460 mlrd. t kislorod ajratib chiqaradi. Nafas olish barg uchun asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayon natijasida murakkab organik moddalar kislorod ishtirokida suv va karbonat angidridga parchalanadi. Parchalanish natijasida hosil bo'lgan energiya organizmlar tomonidan foydalaniladi.


DISSIMILYATSIYA (nafas olish)

O'simliklar hayvon va odamlarga o'xshash havodan O₂ yutib CO₂ chiqaradi. O₂ achitish xususiyatiga ega, yonishga yordam beradi. O₂ ta'sirida oziqli moddalar tuzilgan qismlarga parchalanadi. Natijada oziqli moddalar tarkibidagi yashirin potensial energiya ajralib chiqadi, ya'ni kinetik energiyaga aylanadi. Kinetik energiya hisobiga organizm yashaydi, o'sadi va taraqqiy etadi. Nafas olish protsessini mohiyatini akademik Palladin va professor Kostichevlar tekshirishgan. O'simliklarning yosh va o'suvchi organlarining nafas olishi odamlarning nafas olishi bilan barobar, ba'zan undan ortiq bo'ladi. Masalan, nafas olish protsessida o'z og'irligidan 1-2% yo'qotadi. Unib chiqmoqchi bo'lgan urug'lar ham shuncha og'irligini yo'qotadi. Xamirturish zamburug'ining nafas olishi odamlarga nisbatan 6 marta,


bakteriyalarniki 200 martadan ko'p. Nafas olish protsessiga havodagi O₂ va H₂O larning miqdoriga bog'liq.

Harorat 10°ga ko'tarilsa o'simliklarning nafas olishi 2 marta kuchayadi. Ammo bu kuchayishi 40°-50°gacha boradi. 50° darajadan yuqorida nafas olish protsessi susayadi. Ba'zi o'simliklar qishda nafas olishni davom ettiradi. Masalan: lishayniklar 10°da ham nafas oladi. Daraxtlarning kurtaklari hamda archa va qaragayning ignasimon barglari 20°-25°da ham nafas olishni davom ettiradi. Urug'lar quruqlikda juda sust nafas oladi. Chunki uning tarkibida 10-15% H₂O bor. Una boshlagan urug'larda nafas olish 10.000 marta kuchayadi. Una boshlagan urug'larda 30% H₂O bor. Nafas olish o'simliklarning yoshiga ham bog'liq. Nafas olish yosh organda tez, qari organda sustroq bo'ladi. Ba'zi o'simliklar masalan, ba'zi bakteriya va zamburug'lar O₂ siz ham yashay oladi. O₂ bilan yashovchi o'simliklar aerob o'simliklar deyiladi. Kislorodsiz yashovchilarni anaerob o'simliklar deyiladi. O₂ bilan nafas olishi oksidaza fermenti, kislorodsiz nafas olish esa zimaza fermenti ta'sirida bo'ladi. YA'ni aerob o'simliklar oksidaza fermenti ishtirokida, anaerob o'simliklar zimaza fermenti ishtirokida nafas oladi.

Aerob O₂ bilan nafas olishning reaksiyasi:



Anaerob O₂siz nafas olish reaksiyasi:



O₂ bilan nafas olishda oziqli modda to'liq parchalanadi. SHuning uchun ham 1g molekula shakar hosil bo'lishida ketgan energiyaning hammasi ajralib chiqadi.

O₂ siz nafas olishda oziqli modda qisman parchalanadi. SHakar etil spirtiga aylanadi. SHuning uchun energiya qisman (25 kkal) ajraladi. Energiya spirt tarkibida qoladi.

Assimilyatsion va dissimilyatsion protsessining qarama-qarshiligi quyidagilardan iborat:

1. Assimilyatsiyada o'simliklar CO₂ yutib, O₂ni chik,aradi. Dissimilyatsiyada usimliklar O₂ni yutib, CO₂ni chiqaradi. 2. Assimilyatsiyada oddiy anorganik moddalardan murakkab organik moddalar tuziladi.

Dissimilyatsiyada esa murakkab organik moddalar anorganik moddalarga parchalanadi.

3. Assimilyatsiya natijasida organizm og'irlashadi. Dissimilyatsiya natijasida organizm engillashadi.

4. Assimilyatsiya faqat xlorofill bor hujayralarda bo'ladi. Dissimilyatsiya protsessi hamma tirik hujayralarda bo'ladi. 5. Assimilyatsiya faqat quyosh bor vaqtda, dissimilyatsiya esa hamma vaqtda bo'lib turadi.

6. Assimilyatsiyada energiya to'planadi. Dissimilyatsiyada energiya sarflanadi.

Bu qarama-qarshi protsesslar har bir organizmda bo'lib turadi. Ularning birligi ham bor. Birligi shundan iboratki, tirik organizmning yashashi, o'sishi, taraqqiy etishidir. Bu 2 protsess to'xtasa, organizm halok bo'ladi.

TRANSPIRATSIYA (Suv bug'latish)

O'simliklar suvni erdan juda ko'p miqdorda oladi. Ammo olingan suvlarning 99,8%ini havoga bug'latib chiqaradi. Faqat 0,2% o'simlik hujayrasida qoladi.

O'simliklar tezda ayniqsa tun vaqtida suvni ko'p bug'latadi. Buning natijasida o'simliklarning harorati 1°-4°-6° pasayadi. Natijada o'simliklar o'zini issiqdan saqlab qoladi. Bir tup suli hayoti davomida 6,8 kg suv parlatadi.

Jo'xori 150kg, kungaboqar 200 kg, 1 ga erdagi suli 3.200000 kg (3200 tonna) suv parlatadi.¹⁵

1. ¹⁵ Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. Т. 1-2. – М.: «Мир», 1990.

O'simliklarni ko'payishi. O'sishi va uning qonuniyatlari.

- 1.O'simliklarni ko'payishi.
- 2.O'simliklarni vegetativ ko'payishi.
- 3.Tabiiy vegetativ ko'payish.
- 4.Ildizpoya, tuganak poya, piyozboshi va boshqalar - maxsus organlar orqali ko'payish.
- 5.Su'niy vegetativ ko'payish - qalamcha qilish, payvandlash. Michurin ishlari.
- 6.Jinssiz ko'payish va uning xarakteristikasi.
- 7.Jinsli ko'payish. Gameta va zigota. Izogamiya. Geterogamiya. Oogamiya.
- 8.Jinssiz va jinsli ko'payishning gallanishi.
- 9.O'simliklarni o'sishi. Ichki va tashqi faktorlarni ta'siri. O'stiruvchi moddalar. O'stiruvchi harakatlar.
 - geotropizm
 - fototropizm
 - magnitotropizm.

O'simliklarni ko'payishi.

O'simliklar jinsli, jinssiz va vegetativ yo'llar bilan ko'payadi.

Vegetativ ko'payish ikkiga bo'linadi:

1.Tabiiy vegetativ ko'payish (ildiz poya, tuganak poya, piyozcha)

2.Su'niy vegetativ ko'payish (qalamcha, parxesh, payvandlash).

O'simliklarni ko'payishini CH.Davrin tekshirgan, keyinchalik N.I.Vavilov tomonidan o'rganilgan. O'simliklarni ko'payishi uzoq, evolyutsion yo'lni bosib o'tgan va natijada maxsus ko'paytiruvchi organlar paydo bo'lgan.

Ildizpoya yordamida ko'payishi.

-Banan, bambuk, shakarqamish, iris, reven, landish, yalpiz, sparja va boshqalar. Bo'yimodaron, dala qirqbo'g'imini ildizpoyasi 10-15sm, saxamil grechixasiniki 150-300sm.

Tuganak poya orqali ko'payishi.

Kelib chiqishiga ko'ra tuganak

1)tuganak poya (kartoshka, begoniya, siklamen ernok) va

2)ildiz tuganagi (georgina ildiz tuganagi) bo'ladi.

Tuganak poyada ko'zchalari bo'ladi. Ildiz tuganagida zapas oziqa moddalar bo'ladi. Vegetativ ko'payishda ildiz tuganagini ildiz bo'yinchasida kurtaklar hosil qilib ko'payadi.

Piyozboshi bilan ko'payish.

Piyozboshi - poya metamorfozidir.

-lola

-liliya

-sarimsoq piyoz

-narsiss

Sudralib o'suvchi poya orqali ko'payish.

-qulupnay

-barvinok(vinka)

-malina

-ejevika.

Maxsus organlarsiz vegetativ kupayish.

-qalamcha

-parxesh

Parxesh qilib ko'paytirish.


-siren
-buldonesh
-atirgul

Qalamcha qilib ko'paytirish.

-poya
-ildiz
-barg


Payvand.

Payvand tag
Payvandust.



Vegetativ ko'payish:

A-tog' olmasining ildizlar yordamida ko'payishi; B- qulupnayda yashil novda-gajaklar orqali ko'payish; V-krijovnikni parxish usulida ko'paytirish.



Payvandlashning turlari:

1-kopulirovka; 2-yorma payvand; 3-okulirovka (kurtak payvand); a-payvandust; b-payvandtag.

I.V.Michurin metodlari.

- 1.Yangi yaxshi sort mevali daraxtlarni etishtirish.
- 2.Janubdan shimolga ko'chirish.

O'simliklarni o'sish qonuniyatlari.

Poya va ildiz uchki qismi bilan o'sadi.

Barg asos qismi bilan o'sadi.

Poya va ildiz hamma hayotiy davrda o'sadi, barglari ma'lum bir o'lchamgacha o'sadi. O'sish zonasi: -ildizda-1sm

-poyada- 10sm

-havo ildizlarida-8-10 sm.

Qirqquloqsimonlilardan o'rmon qirqqulog'ini bargi poya kabi uchi bilan o'sadi. Eniga o'sish kambiy yordamida bo'ladi.

Jinssiz ko'payish

Bakteriya, suv o'tlari, zamburug'lar, lishayniklar hujayrani bo'linishi yoki sporasi bilan ko'payadi.

O'simliklarni o'sishiga ichki va tashqi faktorlar ta'sir qiladi:

1.Temperaturani o'sishga ta'siri

- minimum
- optimum
- maksimum.

Ba'zi o'simliklar uchun o'sish temperaturallari

O'simlik	Minimum temperatura	Optimum temperatura	Maksimum temperatura
Bug'doy	0-5°	25-31°	31-37°
Jo'xori	5-10°	37-44°	44-50°
Qovoq	10-15°	37-44°	44-50°
Qovun	15-18°	31-37°	44-50°

O'simliklarni o'sishiga yorug'likni ta'siri :

Daraxtlar: yorug'likni kam sevadi (el, pixta, tis, buk, lipa)
 yorug'likni sevuvchi:(qarag'ay, akatsiya, qayin).

Namlikni o'sishga ta'siri.

Protoplazmani suvga to'yinishi.

Kislorodni o'sishga ta'siri.

Hamma yuksak o'simliklar kislorod bilan hayot kechiradi. Qanchalik tez o'ssa shunchalik ko'p kislorod kerak.

Fitogarmonlarni o'sishga ta'siri.

4 grupp fitogarmonlar ma'lum

- auksinlar,
- gibberlinlar,
- kininlar,
- ingibitorlar.

(abetsizovaya kislota, kumarinlar).

Jinsiy ko'payish 2ta hujayra-gametalarning qo'shilishi orqali sodir bo'ladi. Bu hujayralarning tashqi ko'rinishi bir-biriga o'xshasa ham ichki tuzilishi o'xshamaydi. Bu hujayralarning birini erkak gameta, ikkinchisini urg'ochi gameta deyiladi. Ularning qo'shilishidan zigota hosil bo'ladi. Zigota yangi o'simlikning dastlabki rivojlanish xususiyatiga ega bo'lgan hujayradir. U o'zida ikki organizmning gametalarining qo'shilishi natijasida olgan irsiy belgilarini saqlab qoladi va kelgusida namoyon qiladi. SHu bilan birga yangi belgilar ham paydo qilishi mumkin. Jinsiy ko'payishda organizm yangilanadi va asta sekin sharoitga moslasha boradi. Jinsiy ko'payish ko'pchilik tuban va yuksak o'simliklarda bo'ladi. Ayniqsa suv o'tlaridan qizil va ko'k yashil suv o'tlarida ham bu xildagi ko'payishni ko'rishimiz mumkin. Jinsiy ko'payish qo'shiluvchi hujayralarning ko'rinishlariga qarab 3 turda, ya'ni izogamiya, oogamiya va geterogamiya ko'rinishda sodir bo'ladi.

Izogamiyada morfologik bir xil, lekin fiziologik har xil hujayralar- gametalar qo'shiladi, populyatsiyalanadi. Ulardan biri erkak, ikkinchisi esa urg'ochi gameta hisoblanadi. Ma'lum vaqt o'tgandan so'ng shu zigotadan yangi o'simlik o'sib chiqadi. Ulotrikslarda kuzatiladi.

Geterogamiyada morfologik va fiziologik har xil gametalar qo'shiladi. Bunda urg'ochi gameta yirikroq bo'lib kamroq harakat qiladi. Erkak gameta buning aksi bo'ladi.

Oogamiyada kupayishda urg'ochi gameta sharsimon ko'rinishda bo'lib, mutloq harakat qilmaydi. Erkak gameta harakatchan bo'lib mayda bo'ladi. Qizil va qo'ng'ir suv o'tlarida bunday bo'linish sodir bo'ladi.

Yuqorida aytib o'tilgan jinsiy ko'payishda yadrolar bir-biriga qo'shilganda xromosomalar qo'shilib ketmaydi, balki juftlanadi, qo'shilish natijasida hosil bulgan populyatsiya yadrosi deb ataladi. YAdro xromosomalar soni ikki baravar ko'payadi. Bunda yadro diploid yadro deb ataladi.

GULLI O'SIMLIKlarda JINSIY KO'PAYISH

Yopiq urug'li o'simliklarda jinsiy ko'payish gulning paydo bo'lishiga bog'liq. Gul o'simliklarning jinsiy ko'payishi uchun xizmat qiladigan eng muhim organdir. O'simliklarda

gullar ma'lum tuzilishga ega, bu tuzilish yopiq urug'lilarning har qaysi tiplarida o'ziga xos bo'ladi.

Bizga ma'lumki gul bir necha qismdan iborat bo'ladi: otaliklar, onaliklar, gulkosa barg va gultoji barglaridan tashkil topgan. Gul o'simliklarni jinsiy organi hisoblanadi. Sun'iy chatishtirish orqali bir gul onaligiga boshqa o'simlik changini solib, ya'ni chetdan changlatib yangi nav o'simliklar yaratiladi. Bu soh,ada I.V.Michurin mevali o'simlik xillarini yaratdi, rayonlashtirdi. Michurining ishlari seleksiyaning muhim nazariy asosi bo'lib qoldi.

O'simliklarni quyidagi vegetativ ko'payish usullari mavjud :

Novdalardan parxesh yo'li bilan ko'paytirish. Bunda o'simlikdan chiqqan novdalar egilib tuproq ostiga tushiriladi va ustiga tuproq tortiladi. O'simlik uchlari er yuziga chiqarilib qo'yiladi. Bir yil davomida o'simlik novdalari ko'karib ona o'simlikdan oziq oladi va shu bilan birga er ostida poyadan iddizchalar chiqaradi. Kuzga borib ona o'simlikdan ajratib qo'yilganda ham parxesh qilingan o'simlik mustaqil yashayveradi. Bu usul bilan ko'paytirish ayniqsa bog'dorchilikda qo'l keladi. Tok, tut, malina, krijovnak, ayrim chinnigullar, fikuslar va boshqa o'simliklar parxesh orqali ko'paytiriladi.

Payvand. Payvand yoki transplantatsiya deb, tirik o'simlikning kurtak yoki kurtaklari bor qismini boshqa o'simlikka o'tkazishni aytiladi. O'tkaziladigan o'simlik payvandust, payvandlanadigan o'simlik payvandtag deb ataladi. Payvandni tuban o'simliklarda va gulli o'simliklarda o'tkazish mumkin. Payvandtag payvandustdan organik moddalarni olsa, o'zi esa payvandust uchun suv va suvda erigan mineral moddalarni etkazib beradi. Payvandlash ko'pchilik daraxt o'simliklarda, buta va chala buta o'simliklarda o'tkaziladi. Ayniqsa, urug'dan chiqqanda aynib ketuvchi gibrid o'simlikda payvandlash olib boriladi. Payvandlashning yuzdan ortiq xilma-xil turlari ishlab chiqilgan. O'zbekistan sharoitida keng tarqalgan payvandlash usullaridan:

1.Kurtak payvand. Bu payvand ko'pincha butalar, chala butalar va daraxtlarda o'tkaziladi. SHaftoli, o'rik, gilos, atirgullardan kurtak payvand o'tkaziladi. Buning uchun yuqorida aytilgan o'simliklarni urug'lari ekilib erta bahordan to avgust oylarigacha yaxshilab parvarish qilinadi. Avgust oylarida payvand qilinishi lozim bo'lgan o'simlik ildiz bo'g'izining diametri taxminan 2-3smga etadi. Avgust oylarida ulanish uchun olinishi lozim bo'lgan kurtaklar qalamchalar ko'rinishida tanlab kesib olinib, o'simlik barg bandidan 1,5-2sm qoldirib, barg plastinkasi kesib tashlanadi. Olingan qalamchadan kurtak ohista ko'chirib olinadi va payvandtag o'simlikning ildiz bo'g'zi "T" xarfi shaklida kesiladi va ko'chirilgan po'stloq orasiga kurtak tushirilib, mahkam qilib bog'lab qo'yiladi. O'simlik ulangan, ya'ni payvand qilingan joyiga tuproq tortilib, ko'mib qo'yiladi. Erta bahorda tuproq olinib, ulangan joyining yuqorigi qismi kesib tashlanadi. SHu vaqtdan boshlab o'simlik kurtakdan ko'kara boshlaydi. Bu xildagi payvand orqali juda ko'p xildagi mevali daraxtlarni payvandlash mumkin. Ivan Vladimirovich Michurin ham o'zining noyob mevalarini shu xildagi payvand orqali yaratgan.

2.Iskana yoki yorma payvand. Bu payvandda payvandtag daraxt o'simlik poyasini ko'ndalangiga arralab ajratib olinadi va shu eri yorib uning ichiga payvandust novda ko'rinishida olinib, pastki qismi yo'niladi, uchi o'tkirlab tushiriladi va so'ng mahkam qilib bog'lab qo'yiladi. Bu payvand erta bahorda bizning sharoitda fevral-mart oyining boshlarida o'tkaziladi. CHunki bunda o'simliklar hali uyg'onmagan bo'ladi.

Yuqorida aytilgan har ikki payvand ham bog'dorchilikda keng qo'llaniladi. Bugungi kunda mevali daraxtlarning hammasi ham payvand orqali ko'paytirilmoqda.

O'simliklarning rivojlanish etaplari

O'simlik rivojlanish davrida ularda aniq morfologik va fizologik belgilar paydo bo'ladi. Mana shu belgilarni aniq o'zgarishini etaplar yoki davrlar deyiladi. M.X.CHaylaxyan urug'li o'simliklarni quyidagi etaplarga bo'ladi.

1.Embrional davri- bu o'simlik changlangandan to murtak hosil bo'lgungacha davrni o'z ichiga oladi. Bu davr 2 qismdan iborat:

a) embrion qism- bunda embrion ona o'simlikda hosil bo'lib saqlanib turadi; b) tinchlik qismida o'simlik urug'i hosil bo'lgandan to unishigacha bo'lgan muddat.

2. YOshlik davri- bu o'simlik urug'i uningandan to gul organlari hosil bo'lguncha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu davr turli o'simliklarda turlicha vaqt oralig'ida o'tadi. Masalan: qisqa muddatli efemer o'simlikda bir necha kun bo'lsa, ayrim o'simliklarda bir necha oy va hatto bir necha yilgacha davom etadi. Masalan: rediskada. Bularda o'simlik ildizmevasi etilgandan so'ng uni olib boshqa erga eksak yoki shu joyda turgan holda parvarish qilsak, o'simlik poyasida gul hosil qiluvchi belgilar sodir bo'ladi. Sabzi, sholg'om, turp o'simliklarida esa ikkinchi yili gullash alomati kuzatiladi. SHuning uchun ular ikki yillik o't o'simliklardir. Daraxtli o'simliklarda yoki ba'zi ko'p yillik o'simliklarda gullaguncha bo'ladigan davr bir necha yilni tashkil etadi. Bu davrda o'simlikning tez o'sishi yoki ba'zi o'simlikda vegetativ yo'llar bilan ko'payishi kuzatilgan.

3. Etuklik davri - bu davr o'simlikda gul organlarining hosil bo'lishi va otalaguncha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu davr ham turli o'simliklarda turlicha vaqtda o'tadi.

4. Changlangandan to urug'ining to'liq pishgunicha bo'lgan davr. Qarish davri hisoblanib, bunda o'simlik o'sishi bir muncha sekinroq, boradi. Gullash ancha sust boradi yoki gullamaydi ham.

O'simliklarda gullash turlicha bo'ladi. Masalan: ba'zi o'simliklar har yili gullab, har yili meva beradi, ba'zilar esa hayoti davomida bir marta gullab qurib ketadi. Masalan: sholg'om, turp, sabzi, rediska o'simliklari o'z hayoti davomida bir marta gullaydi. Bu xildagi o'simlikni *monokarp o'simlik* deyiladi.

O't o'simlikdan qulupnay, qo'ypechak, g'umay va boshqalar, ko'pchilik buta va chala butalar, daraxtlar har yili gullaydi va meva beradi. Bunday o'simlikni *polikarp o'simlik* deyiladi

O'simlik organlarida o'sish protsessi.

O'sish - o'simlik hayotining aniq ifodalangan xususiyatlaridan biridir. U o'simlik organizmining ma'lum darajagacha kattalashishidan iborat bo'lib, hujayra va to'qimalarda sodir bo'ladigan ichki protsess va o'zgarishlarga hamda tashqi sharoitga bog'liq. O'sish protsessida o'simlik hujayralarining soni va o'lchami ortishi bilan yangi organlar va yangi elementlar hosil bo'ladi. O'sish hujayralarning ko'payishi va o'simliklar tarkibidagi moddalarning qayta taqsimlanishiga ham bog'liq. O'sish tashqaridan qaraganda juda sekin borayotganga o'xshaydi. O'suvchi o'simlik o'z tanasini rostlab ildiz sistemasi tuproqda mahkam o'rnashadi, poya o'zida shox-shabballarni tutib turadi, ayrim o'simliklarda ilashuvchi, chirmashuvchi organlar orqali poya mustahkamlanadi. O'sish protsessini oddiy protsess deb bo'lmaydi, chunki bunda o'simlik o'z organlari shaklini faqat yiriklashtirib qolmasdan u o'z formasini ham o'zgartirishi mumkin. Masalan: bir o'simlikda bir xildagi barg hosil bo'lmasdan ular turlicha shaklda bo'lishi mumkin. Ayrim o'simlikda shakli o'zgargan barglar yoki poyalar hosil bo'ladi. O'sish protsessida hujayralarning muttasil bo'linishi va shu bilan birga bu hujayralarning cho'zilishi, yiriklashishi ko'zda tutiladi. Bu protsess o'simlik ildiz uchlarida va poyaning uchki meris- temasida sodir bo'ladi. O'simlik organlarining o'sishida oziq moddalarning, yorug'likning etarli bo'lishi va shu bilan birga o'sishga salbiy ta'sir qiluvchi faktorlar: havoning qattiq isib ketishi yoki sovib ketishi, qattiq shamol va hokazolar juda katta ahamiyatga ega. O'simlik o'sishiga ta'sir etuvchi faktorlar *ekologik faktorlar* deb ataladi.

Temperatura. Temperatura ham asosiy faktorlardan hisoblanadi. Har bir o'simlik ma'lum issiq yoki sovuq temperaturada unib chiqadi. Ekiladigan o'simliklarni unib chiqishi tuproq temperaturasiga bog'liq. Masalan: makkajo'xori erta bahorda ekiladi va tuproq temperaturasi 10° atrofida bo'lganda unib chiqadi. CHigit esa kechroq ekiladi, chunki u 12°-14° temperaturani talab qiladi. Demak, o'simliklar ma'lum temperaturada unib chiqadi. Buni

optimal temperatura deb ataladi. Ayrim begona o'tlar anchagina past temperaturada o'sishga moslashgan.

Namlik (suv). O'suvchi o'simlik urug'i temperatura bo'lgani bilan namlik bo'lmasa u unib chiqmaydi. Urug' o'ziga suvni shimib oladi va bo'kadi. Bunda urug'ning hajmi va og'irligi ortadi. Urug' o'z og'irligiga nisbatan bir necha barobar og'irlikdagi suvni shimib olishi mumkin. Suv o'simlik urug'iga kirgandan so'ng u erda fiziologik protsesslar ketadi. Urug'dagi kraxmal parchalanadi. Urug'dagi ildizcha va bargchalar o'sa boshlaydi. Ayrim o'simliklar suvda o'sadi, ular *gidrofitlar* deyiladi. Masalan., nimfa - nilufar yoki kuvshinka. Namlikni yaxshi ko'ruvchi o'simliklar *mezofitlar* deyiladi. Ular asosan tog'da o'suvchi o'simliklar. Qurukda issiqni yaxshi ko'ruvchi o'simliklar hayoti davomida suv tanqisligiga bardosh beradi. Masalan, yantoq.

Yorug'lik. O'sayotgan o'simlikka yorug'likni normal tushib turishi juda katta ahamiyatga ega. Aks holda unib kelayotgan o'simlik o'sishdan to'xtaydi. Yorug'lik natijasida o'simlikda fotosintez protsessi ketadi va asta-sekin o'simlik avtotrof oziqlanishga o'tadi.

SHuni ham aytib o'tish kerakki o'simliklarni yorug'likka bo'lgan talabi turli xildagi o'simliklarda turlicha bo'ladi. Agar o'simlik uchun yorug'lik etarli bo'lmasa bargda ustunsimon hujayralar yaxshi taraqqiy etmaydi, poyada mexanik to'qimalar ham yaxshi taraqqiy etmaydi. Masalan: qamish, zich ekilgan makkajo'xori yoki g'o'za o'simliklari o'zini tik tuta olmasdan tez yiqilib yotib qoladi. Bularidan tashqari g'uza o'simligi o'sish davrida yorug'lik yuqori bo'lgan uzun kunlarni talab qiladi. YOzning o'rtalarida bizning iqlimda kunduz kuni uzoq bo'ladi. SHuning hisobiga tez o'sadi va shonalab gullashga o'tadi.

SHamol. Bu factor ham o'simliklarni o'sishi uchun katta ahamiyatga ega. Ma'lum darajada shamol bo'lib turishi o'simlikni havo olishiga va shu bilan birga suv parlatishiga yordam beradi. Masalan: 4 tomoni devor bilan o'ralgan tor joylarda mevali va mevasiz daraxtlar yuqoridagi faktorlar etarli bo'lsa ham yaxshi o'smaydi va yaxshi shoxlanmaydi. Mutassil shamol bo'lishi ham o'simlikka salbiy ta'sir etadi. Bunda shoxlar sinishi mumkin.

O'simlik organlarining o'sish yo'nalishlariga *tropizm* deyiladi.

Geotropizm. O'simliklarda ildizning doimo vertikal er ostiga kirib borishiga *geotropizm* deyiladi. O'q ildiz doimo er ostiga qarab kirib boradi. Geotropizmga salbiy ta'sir etuvchi omillar past temperatura, oziq moddalarning tuproqda etishmasligi, namlikning etishmasligi va boshqalar.

Fototropizm. O'simliklar doimo yorug'likka intiladi. YUksak o'simliklarning poyasi qorong'ilikdan qochib yorug'likka tomon harakatlanadi. Bu hodisaga *fototropizm* deb ataladi. Bunda o'simlik yorug'lik energiyasidan to'liq foydalanadi. Yorug'lik tushib turuvchi tomonda o'simlik organlari shoxlanadi va barglar hosil bo'ladi. Oftob tik tushgan tomonda mevalar ham chiroyli bo'lib pishadi. Masalan: uzum, olma, nok va boshqalar.

Xemotropizm. Kimyoviy birikmalar o'simlikning bir tomonlama harakatlanishiga yordam beradi. Bunda ayniqsa ildizlar qaerda oziq modda ko'proq bo'lsa, shu tomonga qarab harakatlanadi.

Gidrotropizm. Bunda o'simlik ildizlarining suvga yoki namlikka qarab o'sishi kuzatiladi.

Magnitropizm. Bunda o'simliklar tuproqda ma'lum metallar ko'p bo'lgandagina o'sishi va shu joyni egallab olishi kuzatilgan. SHunga qarab turib er ostidagi ma'danlar - rudalar topilmoqda. Masalan, artemiziyalar-shuvoqlarning ba'zi turlari tuproqda oltin elementi ko'p erlarda keng tarqalgan. Ba'zi o'simliklar sho'r tuproqlarda keng tarqalgan. Bunda tuproqda K, Mg elementlari tuzlari ko'proq protsentda bo'ladi. Bunday o'simliklarni *gallofit o'simliklar* deyiladi.

Yorug'likning davriyligi. 1920-yilda Amerika olimi Garner va Allar o'simlik gullarini yorug'likka bog'liqligini aniqladilar. Ular tamaki,soya va xrizantema o'simliklarini yorug'ik uzoq muddat tushuvchi kunlarda gullash protsessi bo'lmasligini aniqladilar. Agarda qorong'ilik bilan almashtirilganda ularning gullashi kuzatiladi.

O'simlikda rivojlanishning kun va tunga bog'liqligini yorug'likning davriyligi deb nomladilar. Qisqa qilib aytganda kun bilan tunning almashinishi o'simlikning o'sishi va rivojlanishiga

bog'liqdir. Demak, o'simlikning o'sishiga va rivojlanishiga yorug'lik va qorong'ilik to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etadi. SHunga qarab turib biz o'simliklarni qisqa kunli va uzun kunli o'simliklarga bo'lamiz va shu bilan birga neytral o'simliklar (uzun kunda ham, qisqa kunda ham rivojlanish protsessi sodir bo'ladi) ham bor. Kuzda yorug'lik tushishining kamayishi natijasida o'simlikda maxsus ingibitorlar hosil bo'ladi. Kurtaklarda kislota va fenol birikmalari hosil bo'lib, ular o'sish protsessini sekinlashtiradi. Bu moddalarning yo'qolishi o'simlik o'sishini tezlatadi. SHu bilan birga hujayralardagi yog'simon moddalar o'simlikni sovuq urishidan saqlab sovuqqa chidamliligini oshiradi.

Rivojlanish protsessiga ta'sir etuvchi omillar.

Rivojlanish protsessi o'simlikning vegetativ organlari o'sgandan so'ng generativ organlari hosil bo'lishi bilan bog'liq. Rivojlanishga to'g'ridan-to'g'ri 2 ta faktor ta'sir etishi mumkin. Ulardan biri temperatura va ikkinchisi yorug'likdir. Rivojlanishning temperaturaga bog'liqligini *yarovizatsiya* deyiladi. Bunda o'simlik urug'lari yoki vegetativ organlari ma'lum temperaturada ma'lum muddat ushlab turilishi kerak. O'simlik urug'larida buni *tinim davri* deyiladi. Mana bu tinim davri turli o'simliklarda turlicha vaqtni egallaydi. Masalan: ba'zan o'simliklarda bir necha kun bo'lsa, boshqa o'simliklarda bu bir necha oy yillarni tashkil qiladi. Tinim davrida turgan o'simliklarni ekologik faktorlar orqali uyg'otish yoki ko'kartirish mumkin. Ayrim o'simliklarda urug' po'sti qalinlashib unish xususiyatini uzoq vaqtgacha saqlab qolishi mumkin. Ular tashqaridan ta'sir bo'lgandagina ko'karib chiqishi mumkin. Bu narsa o'simlik urug'ining uzoq muddat saqlanganda turlarning saqlanib qolishiga yordam beradi.

Rivojlanish

Gulli o'simlikka chang onalik tugunchasiga tushgandan so'ng otalanish protsessi sodir bo'ladi. SHundan so'ng zigota hosil bo'ladi. Mana shu zigota hosil bo'lgandan so'ng o'simlikning o'sib, gullab va yana zigota hosil bo'lgungacha o'tgan vaqtga o'simlikning *ontogenezi* deyiladi.

Har bir o'simlik o'z ontogenez davrida o'sish va rivojlanish xususiyatiga ega bo'ladi. Bu 2 xususiyat bir-biriga bog'liq, aloqador va shu bilan birga biri ikkinchisiz sodir bo'lmaydigan protsessdir.

O'simlikni o'sishiga o'stirish garmonlari ta'sir qiladi. O'simlik hujayralarini va organlarini o'sishini ta'minlovchi moddalarni *garmonlar* deb ataladi. Garmonlar o'simlik organizmida hosil bo'ladi. Bunday garmonlarni *fitogarmonlar* deb ataladi. Garmonlar o'simlikni o'sishini, rivojlanishini va shu bilan birga o'simlikni sharoitga moslashishini ta'minlaydi. Fitogarmonlarning 4 turi ma'lum:

1. Auksinlar - indolilsirka kislota
2. Gerberellinlar
3. Kininlar
4. O'stiruvchi ingibitorlar.

Yuqorida ko'rsatilgan o'stiruvchi moddalar bilan ishlangan o'simlik organlari intensiv - tezroq ko'karadi. Ularda ildizlar chiqishi tezlashadi. SHuning uchun ham ko'pchilik qalamchalar auksinlar bilan ishlanadi.

Ba'zi auksinlar o'simlik gullaganda ishlatiladi, bunda o'simlik urug'i etilmaydi, urug' hosil bo'lmaydi. Aks holda etli meva etilishi mumkin. Lekin mevada shakar moddalar yuqori protsentda bo'ladi. Ayrim kimyoviy birikmalar o'simlik urug'ini unishini tezlatadi

Nazorat savollari

1. Bargda qanday fiziologik protsesslar bo‘ladi?
2. Fotosintez protsessini yoritishda K.A. Timiryazev ishlari?
3. O‘simliklarda transpiratsiya protsessi qanday boradi?
4. O‘simliklar qanday yo‘l bilan ko‘payadi?
5. O‘simliklarni o‘shiga ta’sir qiladigan qanday omillarni bilasiz?
6. Tuban sporali o‘simliklarda jinsli ko‘payish qanday bo‘ladi?
7. O‘simliklarni qanday vegetativ ko‘payish usullari bor?
8. O‘simlik organlarining o‘sh yo‘nalishlari qanday bo‘ladi?
9. O‘simliklarni o‘shiga ta’sir qiladigan qanday garmonlar bor?

Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o‘quv qo‘llanmalar ro‘yxati

1. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O‘.A. Botanika. – T.: O‘zbekiston, 2005.- 435 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O‘.A., Samatova SH. O‘simliklar sistematikasidan amaliy mashg‘ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
4. Ahmedov O‘.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elaktron darslik.-T.: 2008.
5. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –
6. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
7. Hamidov A., Nabiev M.M. “O‘zbekiston o‘simliklarini aniqlagichi”.-T.: 1987.-235 b.
8. Василев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “ Высшая школа ”, 1988. -435 с.
9. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O‘.A. va boshqalar. Dorivor o‘simliklarning lotincha-o‘zbekcha-ruscha-arabcha va forsha-tojikcha lug‘ati.-T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
10. Berezovskaya T.P., Dmitruk S.E., Grishinna e.I., Belousov M.V. Основы farmatsevticheskoy botaniki. – Tomsk: Pechatnaya manifaktura, 2004.-294 s.
11. Xolmatov X.X., Ahmedov O‘. A. Farmakognoziya. 1-2 qism. – T.: “Ibn Sino” nashriyoti, 2007.- 806 b.
12. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. Т. 1-2. – М.: «Мир», 1990.

Ma’ruza - 8

O‘simliklar sistematikasi. Tuban o‘simliklarga Xarakteristika. Bakteriyalar tuzilishi

Ma’ruzaning maqsadi: O‘simliklar sistematikasi tarixi, K.Linney, Engler sistemasi. Tuban o‘simliklar haqida tushuncha berish. Bakteriyalarning tuzilishi.

Reja

1. o‘simliklar sistematikasi nimani o‘rgatadi.
2. o‘simliklar sistematikasi tarixi.
3. K.Linney sistemasi.
4. Engler sistemasi.
5. Tuban o‘simliklarga xarakteristika.

Tayanch iboralar: *Tuban o'simliklarning umumiy xususiyati. Suv o'tlarining tuzilishi, nomlanishi, pigmentlari. O'simliklarning kelib chi'ishi. Bakteriyalar, haqiqiy suv o'tlari va yuksak o'simliklar. qizil va haqiqiy suv o'tlari. Suv o'tlarining asosiy sinflari: qizil, diatom, qo'ng'ir, yashil suv o'tlari. Suv o'tlarining kelib chiqishi, tanalarining tuzilishi, turlari va evolyutsiyasi. Xloroplast va perenoid xususiyatlari. Evolyutsiyada jinsli jarayonning turlari.*

O'SIMLIKLAR SISTEMATIKA

Sistematika bu o'simliklarni tuzilishi jixatidan bir-biriga yaqinligini aniqlab, gruppaga ajratadi. o'simliklar er yuzida eramizdan 1700 yil ilgari paydo bo'lgan. Er yuzida 500.000 xil o'simlik bor. Yovvoyi o'simliklarning turi 350000, shulardan 200.000 gulli o'simliklar, 150.000 gullamay-digan sporal o'simliklar. MDX florasida 18.000 xil o'simlik borligi aniqlandi. o'simliklarga ayniqsa Kavkaz va o'rta Osiyo bo'yidir. o'rta Osiyo va Kavkaz florasida 7000 o'simlik turi uchraydi. Botanikaning sistematika va morfologiya qismi qadimgi zamonlardan beri tekshirilib kelingan. Misrda bizning eramizdan 3000 yil ilgari uzumchilik taraqqiy eta boshlagan. Misrda dorivor o'simliklarni ekish boshqa mamlakatlarga nisbatan oldin boshlangan. Bu erda bizning eramizdan 2000 yil ilgari kanakunjut-Ricinus comunis.

Bizning davrimizgacha saqlanib qolgan qadimgi zamon o'simliklari xaqidagi ma'lumotlarni grek adabiyotlarida uchratish mumkin. o'sha vaqtda grek olimlaridan Gippokrat, Aristotel, Dioskarid. Gippokrat bizning eramizdan 460-377 yillar ilgari 236 xil dorivor o'simliklarni tasvirlagan. Aristotel va uning shogirdi Teofrast bizning eramizdan 4 asr oldin ko'pgina o'simlik turlarini yozib, ularning foydali xususiyatlarini aniqlaganlar, qamda o'simliklarning 1 pallali va 2 pallali bo'lishini ko'rsatganlar. Teofrast botanikaning otasi xisoblanadi. CHunki uning yozgan kitoblaridan 15 tasi shu fanga baqishlangan. Dioskarid bizning eramizning 1 asrida yashagan. o'zining mashxur "Materia Medica" degan kitobida ko'p dorivor o'simliklarni rasmlari bilan tasvirlagan. qadimgi Rimning o'simliklar bilan shuo'ullanganlaridan Pliney Starshiydir. Dioskarid va Pliney Starshiy gullaydigan va gullamaydigan o'simliklarni aniqlab, ularga lotincha nom bera boshlaganlar. Mas:Achillea, Adonis va boshqalar. o'adimgi zamonlarda dorivor o'simliklar soqasida yozilgan xind kitoblaridan eng aqamiyatlisi "Yadjur veda" qisoblanadi. Bu kitobda ko'rsatilgan dorivor o'simliklar xozir qam o'z qimmatini yo'qotgan emas. Xitoyda o'simliklar xaqida Xon-shen-nun bizning eramizdan 3000 yil ilgari "Bentsao" degan kitob yozgan. o'rta asrlarda o'tgan olimlardan butun dunyoga mashxur bo'lgan atoqli vrach Abu Ali Ibn Sino qisoblanadi o'980-1037).

Avitsenna Buxoroga yaqin joydagi qishloqda tuqilgan. 1020 yilda "Alqonunfit Tib" deb atalgan 5 tomli kitob yozgan. Petr 1 1724 yilda Rossiyada fanlar Akademiyasini ochish to'qrisida buyruq chiqardi. U fanlar akademiyasi oldiga Rossiya florasini tekshirish vazifasini qo'yadi. SHu maqsadda bir qancha ekspeditsiyalar tashkil etiladi. Ekspeditsiya qatnashchisi akademik Pallas "Flora Rossica" degan kitob yozgan.

18 asrning boshlarida shved olimi Karl Linneyo (1707-1778) o'simliklarning sistematikasini tuzadi. U 1000 ga yaqin o'simliklarni morfologik terminlarini ishlab chiqaradi. K.Linney "o'simliklarning turlari: degan asarida 10.000 xil o'simlik turini tasvirlab ularni 1000 ta avlodga, bu avlodni 116 tartibga, tartibni esa 24 sinfga bo'lib chiqadi.

TUR -VID	10.000
AVLOD- ROD	1000
TARTIB - PORYADOK	116
SINF - KLASS	24

Shulardan 23 sinfga gullaydigan o'simliklarni, 1ta sinfga esa, gullamaydigan o'simliklarni kiritadi. Gullamaydigan o'simliklarga suv o'tlarini, zamburuqlarni, moxlarni va qirqquloqsimonlarni kiritadi. K. Lin

ney gullaydigan o'simliklarni "jinsiy urchishi anio'langan" o'YAvnobrachno`e), gullamaydigan o'simliklarni "jinsi ma'lum emas" o'Taynobrachno`e) deb ataydi. K. Linney qar bir o'simlikni 2 nom bilan atalishini kiritadi.

"Binarnaya nomenklatura" deyiladi. Bunda oldin avlod, so'ngra tur nomi yoziladi. Avlod nomini ot, tur nomini sifat qilib olinadi. Mas: paxtaning avlodi, Gossypium Amerika paxtasi.- Gossypium hirsutum, Misr paxtasi -Gossypium barbadense

Oq tut- Morus alba

qora tut- Morus nigra

qizil tut- Morus rubra

K. Linney sistemasi sun'iy sistema qisoblanadi. Chunki Linney o'simliklarning kelib chiqishini, bir-biriga yaqinligini va rivojlanishini qisobga olmagan. Linney idealist olim bo'lgan. Uning fikricha o'simliklar va xayvonlar o'zgarmaydi, ular bir vaqtda yaratilgan. Biz turni shunday tushunamizki, tur bir qancha individlardan iborat bo'lib, tashqi sharoit ta'sirida, odam vositasida, ichki protsesslar natijasida o'zgarib rivojlanib turadi. Tur o'zgarishi mumkin. K. Linneyning o'simliklarni gruppaga bo'lib tekshirishga qozir o'zgartirish kiritilgan:

1. Tur - vid- Specis eng kichik -Sub species
2. Avlod - rod- genus
3. Oila - simeystvo- Familia
4. Tartib - porjadok- Ordo
5. Sinf - klass- clasis
6. Tip - tip- tipus
7. Bo'lim - otdel- divisio

Ba'zan tur yana kichik turlarga bo'linadi. Kichik turni -Sub species deyiladi. Tabiiy sistemani 1-marta 1841 yil Peterburg akademiyasining professori Goryaninov tuzgan. Bu o'simliklarni 4 gruppaga bo'lgan. 1-gruppasida sporal o'simliklar, lishayniklar, moxlar, qirqquloqsimonlar va boshqalar. 2 gruppasiga "soxta uruqlilar"-igna barglilar, qaraqay, archa. 3-gruppasiga "qalla donli o'simliklar, ya'ni bir pallali o'simliklar. 4-gruppasiga-" qaqiqiy uruqli o'simliklar"- 2 pallalilar gruppasi.¹⁶

Suv o'tlari, zamburuqlarni esa, o'ayvonot va o'simliklar dunyosi oraliqidagi organizm deb qisoblaydi. Tabiiy filogenetik sistemani o'simliklarning rivojlanishiga asoslanib, rus olimlaridan Varshava Universitetining professorlaridan Belyaev, Moskva Universitetining professori Gorojankinlar tuzgan. Ular sistemani tuzishda uruqli o'simliklar sporal o'simliklardan paydo bo'lishiga asoslanganlar. Ular o'z sistemasini buyuk ingliz olimi CHarlz Darvin nazariyasiga asoslanib tuzganlar. Darvinning 1859 yilda "Turlarning tabiiy saralanish natijasida kelib chiqishi" degan asari bosilib chiqadi. Bu asarida Darvin o'simlik va qayvon turlarining er yuzida paydo bo'lishi va rivojlanishini ko'rsatadi. Darvin materialist olim bo'lgan. Darvin 3 faktorga asoslanadi:

1. IRSIYAT-nasledstvennost
2. O'ZGARUVCHANLIK-izmenchivost
3. Tabiiy saralanish estetstvenno`y stbor.

1897 yilda Gorojankinning tuzgan "tabiiy filogenetik sistemasi bo'yicha o'simliklar sistemasini 3 ta bo'lim, 7 ta sinfga bo'lgan.

1-bo'lim. -Tuban sporal o'simliklar - Oodoniata

Bu bo'limga 2 ta sinf kiradi a) Aldae -suv o'tlari

b) Fungi -zamburuqlar - Mucophita

2-bo'lim-Yuqori sporal o'simliklar- Archimycetes

Bu bo'limga 3 ta sinf kiradi a) Moxlar - Bryophyta

1. ¹⁶ Mustafaev S.M., Ahmedov O.A., Samatova SH. O'simliklar sistematikasidan amaliy mashg'ulotlar. – T.: "YUNAKS-PRINT" MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.

- b) qirqquloqsimonlar- Polyhodyophyta
 - v) Ochiq uruqlilar- pinophyta
 - 3-bo'lim yopiq uruqli o'simliklar- Angiospermae
- Bu bo'limga 2 ta sinf kiradi

- a) Bir pallalilar- Monocotyledoneae
- b) Ikki pallalilar- Dicotyledoneae

Bundan keyin qam o'simliklar sistemasi o'zgartirilib, mukammallashtirilgan. Xozirgi sistema nemis olimi engler sistemasiga asoslangan.

er yuzidagi qamma o'simliklar 2 ta gruppaga bo'linadi:

1. SPORALILAR- Sporophyta
2. URUG'LILAR- Spermatophyta

a) Sporalilar 2 ta otdelga bo'linadi:

- 1) Tuban sporali o'simliklar- Oogoniatae
- 2) Yuqori sporali o'simliklar- Archegoniatae

TUBAN SPORALILARGA:

Suv o'tlari -Algae ,Bakteriyalar- Bacteriophyta, Zamburuqlar-Fungi Lishayniklar Lichenophyta kiradi.

YUQORI SPORALI O'SIMLIKLARGA:

Moxlar- Bryophyta, qirqquloqsimonlar- Pteridophyta kiradi.

b) URUG'LILARGA

1. Ochiq uruqli o'simliklar- gymnospermae yoki Pinophyta
2. Yopiq uruqli o'simliklar- Angiospermae Magnoliophyta

Tuban sporali o'simliklarning jinsiy organlari bir xujayrali, oddiy tuzilgan. Bularning tanasi organlarga bo'linmaydi.

Yuqori sporali o'simliklarning jinsiy organlari, ko'p xujayrali, murakkab tuzilgan. Bularning tanasi organlarga bo'linadi.

Yopiq uruqli o'simliklarning uruqi meva ichida bo'ladi.

Ochiq uruqli o'simliklarning mevasi bo'lmaydi.

engler sistemasi bo'yicha o'simliklar quyidagi tipga bo'linadi.

1. Bakteriya- Bacteria
2. Ko'k yashil suv o'tlari- Cyanophyceae
3. Yashil suv o'tlari- Chlorophyceae
4. Sariq- Diatomea
5. qo'nqir- Phacophyceae
6. qizil- Rhodophyceae
7. SHilimshiqalar yoki miksomitsetlar- Myxophyta
8. Zamburuqlar-fungi
9. Lishayniklar- Lichenes
10. Moxlar- Bryophyta
11. qirqquloqsimonlar- Pteridophyta
12. Ochiq uruqlilar- gymnospermae
13. Yopiq uruqlilar- Angiospermae

Bakteriyalar bir hujayrali mayda organizmlardir, ularni faqat mikroskopdagina ko'rish mumkin. Ularning hujayralari azot moddadan petin modda aralashgan gemitsellyulozadan tashkil topgan po'stdan va nuklein moddasi tarqov holda joylashgan protoplastdan tashkil topgan. Bakteriyalar tuzilishiga ko'ra sharsimon-kokklar, tayoqchasimon-batsilalar, egilgan va bukilgan spirillalar, spiroxitalarga bo'linadi. Bakteriyalar hujayrasining oddiy bo'linish yo'li bilan juda tez ko'payadi. Ba'zi turlarning hujayrasi har 12-15 takror bo'linish xususiyatiga ega. Ular oziqlanish usuliga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Bir guruh bakteriyalar saprofit- ya'ni tayyor organik parchalanishi hisobiga yashaydi. Ikkinchi guruh bakteriyalar parazit ya'ni tirik

o'simlik, yoki hayvonlar hisobiga yashaydi. Bakteriyalar havo kislorodiga munosabatiga ko'ra ham turlicha yashaydi. Ko'pchilik turlari aerob ya'ni faqat kislorod bo'lganidagina yashay oladi, ba'zilar anaerob bo'lib, kislorodsiz sharoitda ham yashay oladi. Fakultativ aerob yoki fakultativ anaerob bakteriyalar ham bor ular kislorod bor joyda ham yuq joyda ham yashash xususiyatiga ega. Bakteriyalar tabiatda juda katta rol o'ynaydi ular boshqa organizmlar bilan birganlikda tabiatda moddalarning doimiy aylanishida ishtirok etadi. Ular organik substratga tushgandan keyin uni parchalaydi, natijada tuproqqa atmosferaga o'tuvchi yoki yuksak o'simliklar o'zlashtiradigan bir muncha oddiy moddalarni hosil qiladi.¹⁷

Nazorat savollari

1. Suv o'tlarining tuzilishi.
2. Suv o'tlarining autotrof oziqlanishi.
3. Suv o'tlarining hujayralarida qanaqa pigmentlar uchraydi.
4. Ko'k yashil suv o'tlarining ko'payish xillari.
5. Fikotsian pigmenti qaysi suv o'tlar turida uchraydi.
6. Yashil suv o'tlarning ko'payish xillari.
7. Yashil suv o'tlariga kiruvchi vakillari haqida ma'lumot.
8. Diatom suv o'tlarida qanaqa pigment uchraydi.
9. Pinulyariya suv o'tining tuzilishi va ko'payishi.
10. Suv o'tlarning ahamiyati.

Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o'quv qo'llanmalar ro'yxati

1. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. – T.: O'zbekiston, 2005.- 435 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A., Samatova SH. O'simliklar sistematikasidan amaliy mashg'ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
4. Ahmedov O'.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elaktron darslik.-T.: 2008.
5. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –
6. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
7. Hamidov A., Nabiev M.M. “O'zbekiston o'simliklarini aniqlagichi”.-T.: 1987.-235 b.
8. Василев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “ Высшая школа ”, 1988. -435 с.
9. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O'.A. va boshqalar. Dorivor o'simliklarning lotincha-o'zbekcha-ruscha-arabcha va forscha-tojikcha lug'ati.-T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
10. Berezovskaya T.P., Dmitruk S.E., Grishinna e.I., Belousov M.V. Основы farmatsevticheskoy botaniki. – Tomsk: Pechatnaya manifaktura, 2004.-294 s.
11. Xolmatov X.X., Ahmedov O'. A. Farmakognoziya. 1-2 qism. – T.: “Ibn Sino” nashiryoti, 2007.- 806 b.

Ma'ruza - 9

Suvo'tlari, zamburug'lar va lishayniklar.

¹⁷ V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.

Ma'ruzaning maqsadi: Suvo'tlarining tuzilishi, klassifikatsiya, ko'payishi va ahamiyati. Zamburug'larning tuzilishi, oziqlanishi, klassifikatsiyasi, ko'payishi, zarari va ahamiyati. Lishayniklarning tuzilishi, xillari, ko'payishi va ahamiyati haqida tushuncha berish.


Reja

1. Suvo'tlarining tuzilishi
2. Suvo'tlarining yashash sharoiti
3. Suvo'tlarining klassifikatsiyasi
4. Suvo'tlarining ko'payishi
5. Suvo'tlarining kelib chiqishi
6. Suvo'tlarining ahamiyati
7. Zamburug'lar tuzilishi
8. Zamburug'larning oziqlanishi
9. Zamburug'larning klassifikatsiyasi
10. Zamburug'larning ko'payishi
11. Zamburug'larning kelib chiqishi
12. Zamburug'larning zarari va ahamiyati
13. Lishayniklarning tuzilishi va xillari
14. Lishayniklarning ko'payishi
15. Lishayniklarning ahamiyati

Tayanch iboralar: *Suv o'tlari va ularni yashash muhitlari. Bentos, plankton va qurug'likda yashovchi suv o'tlar. qizil suv o'tlari, pigmentlari va oziq moddalari. Ko'payish usullari. Rivojlanish davri. Tarqalishi va ishlatilishi. Diatom suv o'tlarining umumiy tuzilishi, hujayra po'sti, pigmentlari, oziqa moddalari. Yashil o'simliklar bo'limi va ularning xususiyatlari, pigmentlari, oziqlik moddalar. Rivojlanish davri va sinflarga bo'linishi: volvokslar, ulotrikslar, sifonlilar, konyugatlar, ularning umumiy xususiyatlari. Asosiy vakillari (xlomidomanada, volvoks, xlorella, ulotriks, ulva, koularpa, vosheriya, spirogira). Yashil suv o'tlarining ahamiyati. Xara suv o'tlari bo'limi, ularning umumiy xususiyatlari. Tanasining umumiy tuzilishi, ko'payishi. Tuban o'simliklar: zamburug'lar va lishayniklar. Zamburug'lar mitselliysi, oziqlanishi, ko'payishi. Tuban va yuksak zamburug'lar. Zamburug'larning asosiy sinflari: xitridomitsetlar, oomitsetlar, zigomitsetlar, askomitsetlar, bazidiomitsetlar, takomillashmagan zamburug'lar vakillari.*

SUVO'TLARI -Vodorsli

Suvo'tlari morfologik jihatdan juda xilma-xil bo'lib, ular orasida mikroskopik bir hujayralilar bilan bir qatorda bir necha o'n metrga boradigan vakillari ham bor. Suvo'tlari tana holatida yashaydigan o'simliklar, ularda ildiz, poya, barg bo'lmaydi. Biroq ba'zi vakillarning tanasi – tallomi birmuncha murakkab tuzilgan bo'lib, tanasi ayrim qismlarga ajralgan. Suvo'tlarining hujayrasi tashqi tomondan qattiq devor bilan qoplangan. Hujayra sitoplazmasi devor atrofida joylashgan bo'lib, hujayrani to'ldirib turadi. Hujayrada bitta yoki bir necha



mayda vakoulalar mavjud. Yadroning soni ham bir yoki bir necha bo'lishi mumkin. Hujayradagi xromatoforlarda pigmentlar saqlanadi. Xromatoforning shakllari turli-tuman: plastinkali, spiral, lentasimon, to'rsimon, yulduzsimon.

Xlorella:

- 1-hujayra qobig`I;
- 2-sitoplazma; 3-mag`iz;
- 4-xromotofor.

Suvo`tlari chuchuk suvlarda, dengiz va okeanlarda, zax erlarda yashaydi. Ularning ko`p miqdorini tashkil etuvchi mikroskopik to`dasi erkin suzib, fitoplankton hosil qiladi. Suvda yashaydiganlari 3 guruhga bo`linadi:

- 1.Suv ostida yashovchilar – ENTOS
- 2.Suv ichida yashovchilar – PLANKTON
- 2.Suv yuzida yashovchilar

Planktonning chuqurligi 300 m gacha bo`lishi mumkin. Suv havzasining 300 metrdan chuqurroq joyida yashovchi suvo`tlari bentos deyiladi. Ayrim suvo`tlari juda past haroratda ham hayot kechirish qobiliyatini yo`qotmaydi. Hatto qutbda, tog` cho`qqilarida ham yashaydi. Qor xlomidomonadasi qorni qizil, sariq, yashil, qo`ng`ir ranglarga bo`yashi mumkin. Xlorellaning ayrim vakillari ham havoda yashay oladi. Suvo`tlari hujayrasida yashil rang beruvchi xlorofill pigmenti bo`lganligi sababli ovqatlanish jihatidan avtotrof organizm hisoblanadi. Hayot kechirish uchun zarur bo`lgan, oziq moddani o`zlariga o`zi tayyorlaydi, ya`ni hujayrasida fotosintez protsessi bo`ladi.

Ba`zi bir ko`k – yashil suvo`tlari tayyor organik modda hisobiga ham yashaydi, ya`ni ular saprofit holatda yashaydi. Ko`k – yashil suvo`tlarining xromatoforida xlorofilldan tashqari ko`k rang beruvchi fikotsian pigmenti uchraydi. Yashil suvo`tlarida faqat yashil rang beruvchi xlorofill pigmenti uchraydi. Diatom suvo`tlarida xlorofilldan tashqari sariq rang beruvchi diatomin pigmenti bo`ladi. Qo`ng`ir rangli suvo`tlarining xromatoforida xlorofilldan tashqari qo`ng`ir rang beruvchi fukoktsiantin pigmenti uchraydi. Qizil suvo`tlarida xlorofilldan tashqari qizil rang beruvchi fikoeritrin pigmenti bo`ladi. Suvo`tlarining hujayrasida oziqli modda sifatida kraxmal, yog`, oqsil hamda hayvonlarga xos bo`lgan kraxmal – glikogen uchraydi. Glikogen yod ta`sirida qo`ng`ir rangga bo`yaladi. Hozirgi kunda er yuzida 100000 xil suvo`tlari bo`lib, bularning hammasi 5 ta tipga bo`linadi:

- 1.Ko`k – yashil suvo`tlari
- 2.Yashil suvo`tlari
- 3.Sariq suvo`tlari
- 4.Qo`ng`ir suvo`tlari
- 5.Qizil suvo`tlari

Suvo`tlari 3 xil yo`lda ko`payadi.

- 1.Vegetativ ko`payish
- 2.Jinssiz ko`payish
- 3.Jinsli ko`payish

Vegetativ ko`payishda hujayra kariokinez yo`lda bo`linib ko`payadi. SHuningdek hujayrada zoosporalar hosil bo`ladi. Zoosporalarning xivchinlari bor. Xivchinlari yordamida suvda harakatlanib yuradi. Har bir hujayradan 4, 8, 16 dan 64 tagacha 300 spora etilishi mumkin. Zoosporalar suvda bir necha sek yoki minut suzib yurgach to`xtaydi. Xivchinlarini tashlab, o`sib rivojlanadi.



Xlamidomonada:
 1—xivchini; 2—vakuoli;
 3—qobig`i; 4—mag`izi;
 5—xromatofori.

Jinssiz ko'payish zoospora yoki spora yordamida bo'ladi. Mas: ko'k – yashil suvo'tlari, qizil suvo'tlarning jinssiz ko'payishi esa zoosporalar yordamida bo'ladi. Jinssiz ko'payishdagi zoospora va sporalar hujayralarning reduksion bo'lishi natijasida vujudga keladi.

Jinsiy ko'payishda 3 xil tip bor:

1.Izogamiya

2.Geterogamiya

3.Oogamiya

Izogamiya tipda ko'payishda 2 ta morfologik jihatdan o'xshash, fiziologik jihatidan bir–biriga o'xshash bo'lmagan GAMETAlar qo'shilib ko'payadi. GAMETA – jinsli hujayradir.

Geterogamiya tipda ko'payishda morfologik va fiziologik jihatdan har xil bo'lgan gametalar qoshilib ko'payadi. Bu gametalarning 1 tasi katta, sust xarakatchan bo'lib, buni Makrogameta deyiladi. 2–xili kichik, tez xarakatchan bo'lib, buni Mikrogameta deyiladi. Mikrogameta otalik gameta, makrogameta onalik gameta hisoblanadi.

Oogamiya tipda ko'payishda otalik va onalik jinsiy organlari paydo bo'ladi. Otalik jinsiy organini Anteridiya onalik jinsiy organini Oogamiya deyiladi. Anterediyada spermatozoidlar etishadi. Oogamiyada esa tuxum xujayra rivojlanadi. Anteridiya spermatozoidlarni suvga ishlab chiqaradi. Oogamiya xam tuxum hujayralarni suvga ishlab chiqaradi. Spermatozoidlar suvdagi tuxum hujayralar bilan qo'shiladi. Otalangan tuxum hujayrani Oospora deyiladi. Suvo'tlarining ko'payishini Tsenkovskiy, Meer, Kursanov va boshqalar tekshirganlar.¹⁸

SUVO'TLARINING AHAMIYATI

Suvo'tlari suvning havosinidan tozalab, bilan boyitib turadi. Suvo'tlari suvda yashovchi hayvonlar uchun ovqat hisoblanadi. Suvo'tlarining ba'zi turlari odamlar tomonidan ham iste'mol qilinadi. Mas: Laminaria-dengiz karami nomi bilan mashxurdir. Laminarianing bargiga o'xshash qismi 50 m gacha boradi. SHu qismi ovqatga ishlatiladi. Laminariada oqsil, yog' va uglevodlar bor. Suvo'tlari vitaminlarga ham boy bo'ladi. Yaponiya, Xitoy va boshqa mamlakatlarda suvo'tlari bilan er o'g'itlanadi. CHunki uning tarkibida N, Br, C va boshqa birikmalar bo'ladi. Qizil suvo'tlaridan "agar-agar" degan modda olinadi. Bu moddani mikrobiologiya praktikasida bakteriyalarni rivojlantirishda va o'stirishda ishlatiladi. Oziq-ovqat sanoatida esa, marmelad tayyorlashda ishlatiladi. Ba'zi qo'ngir suvo'tlaridan sifatli elim olinadi. Suvo'tlaridan olingan Algin preparati engil ich yumshatuvchi ta'siriga ega (algenat natriy). Sariq suvo'tlarini qoldiqlarini "trepel" deb aytiladi. Bu modda dinamit tayyorlashda va binokorlikda toshlarni pardozlashda ishlatiladi. Shuning uchun uzoq vaqt chirimaydi. Ko'k – yashil suvo'tlarining ba'zi turlari: Anavena va Stratanastoc boshqalar havodagi ni yutish xususiyatiga ega. Ular havodagi ni yutib, erni N li birikma bilan boyitadi. Ko'k-yashil suvo'tlari, yashil suvo'tlari, sariq suvo'tlari dengizlarda organik cho'kmalar hosil qiladi. Bu organik cho'kmalarni Sapropel deyiladi. Sapropel oziq modda va og'it sifatida katta ahamiyatga egadir. Suvo'tlarining ba'zi birlarida Xlorella deb atalgan antibiotik dori olinadi. Xlorella oshqozon kasali, singa, buqoq, gipertomiya kasalliklariga davo.

ZAMBURUG'LAR-Fungi

1. ¹⁸ Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. – T.: O'zbekiston, 2005.- 435 b.

Zamburug'lar er yuzida juda ko'p tarqalgan o'simlik bo'lib, hozirgi kunda 100000 xil turi ma'lum. Zamburug'lar asosan quruqlikda, ba'zilar esa suvda yashaydi. Zamburug'lar oziqlanishi jixatidan geteratrof organizimdir. Geteratrof oziqlanish o'z galida ikkiga bo'linadi.

1. **Parazit holda ovqatlanish**
2. **Saprofit holda ovqatlanish**

Parazit holda ovqatlanish tirik organizm hisobiga, saprofit holda oziqlanish o'lik organizm hisobiga bo'ladi. Zamburug'larda xlorofill donachasi bo'lmaydi. SHuning uchun ham o'zlariga o'zi ovqat tayyorlay olmaydi. Zamburug'larning tanasi GIF deb ataladi. Giflar bir hujayrali yoki ko'p hujayrali tarmoqlangan yoki tamoqlanmagan bo'ladi.



Giflarning eni 1-1,5 mm, bo'yi esa bir necha metrgacha bo'lishi mumkin. Giflar asosan monopodial, qisman simpodial o'sadi. Giflarning hujayra po'sti xitin moddasidan tuzilgan. Hujayralari 1ta yadroli yoki ko'p yadroli bo'ladi. Hujayrada oziqli modda sifatida glikogen va yog' tomchilari to'planadi. Giflarni yig'indisi mitseli deb yuritiladi. Zamburug'larning tanasi yoki mitseliyasi ochiq yoki yopiq erda taraqqiy etadi. Ochiq erda taraqqiy etsa, ekzogen, yopiq joylarda taraqqiy etsa endogen deyiladi. Zamburug'larda qoplovchi, o'tkazuvchi to'qimalari bo'lmaydi. Ularda faqat chiqaruvchi to'qima, ba'zilarida sutli naylar bo'ladi. Chiqaruvchi to'qimada oshlovchi modda-dubil hamda smolaga o'xshash modda chiqarilib turadi. Sutli naylarida zaxarli modda alkaloidlar va boshqa moddalarni uchratish mumkin. Zamburug'lar 1 yillik, 2 yillik, hamda ko'p yillik bo'ladi. Zamburug'larning ko'pchiliga 2 yillikdir.

Zamburug'lar 3 xil yo'lda ko'payadi:

1. **VEGATATIV**
2. **JINSSIZ**
3. **JINSLI**

Vegetativ ko'payishi Oidio kurtaklanib va Xlomdosporalar yordamida bo'ladi. Ba'zi bir zamburug'larda vegetativ ko'payishda kurtaklanib ko'payadi. Bunga achitqi zamburug'ini misol qilish mumkin.

Jinssiz ko'payish sporalar yoki zoosporalar yordamida bo'ladi. Suvda yashaydigan zamburug'lar zoospora tuzib ko'payadi. Quruqlikda yashaydiganlari esa spora hosil qilib ko'payadi. Sporalari nihoyatda



mayda, quruq va ko'p miqdorida tayyorlanadi. Masalan: SHAMPINION deb atalgan zamburug' ikki sutkada ikki mlrd spora hosil qiladi.

Yong'oqning tanasida uchraydigan Po`kak parazit zamburug'ida bir yilda 10 mlrd spora tayyorlanadi.

Jinsli urchishi ikki xil usulda bo'ladi:

a) **Ooganiya**

b) **Konyugatsiya**

YUqori murakkab tuzilgan zamburug'larning jinsiy urchishi bir oz soddalashgan bo'ladi. Ularda fiziologik jixatdan har xil bo'lgan 2 (hujayra) sporalar qo'shilib ko'payadi. Bu sporalarni bipolyar sporalar, ya'ni 2 qutbli sporalar deyiladi. Bittasi "-", 2 chisi "+" qutbli bo'ladi.

Zamburug'larni tipi 5 sinfga bo'linadi.

1. Qadimgi zamburug'lar- Achinycetes

2. Suv o'tlariga o'xshash

zamburug'lar- Phycomycetes.

3. Xaltachali zamburug'lar-

Ascomycetes.

4. Murakkab bazideal zamburug'lar-

Basidionycetes.

5. Aniqlanmagan zamburug'lar- Fungi

imperfect.

Zamburug'larni bazi birlari mas: qo'ziqorinlar oqsil va N li moddalarga boy bo'ladi. Shuning uchun odamlar tomonidan ular iste'mol qilinadi. Shampin'on, Smorchok, Djodevik, Belli grib va boshqalar. Zamburug'lar qishloq xo'jaligida ham ahamiyatga ega. O'simliklar ildizida mikorizalar bo'ladi. Grekcha: Miks- ildiz, ridza- zam. Zamburug'lar ildizning tashqi tomonida joylashgan bo'lsa ektotrof, ildizining ichki organlarida joylashgan bo'lsa, endotrof mikoriza deyiladi. Mikorizalarning axamiyatini 1881 yilda rus olimi Kamenskiy aniqlagan. Mikorizalar o'simliklar ildizini vitaminlar bilan masalan: B₁ bilan ta'minlab turadi. B₁ vitamin o'simlik ildizining o'sishiga yordam beradi. Mikorizalar moddalarni eriydigan xolga keltiradi. Ularning bazi birlari xavodagi erkin N ni yutish xususiyatiga ega. SHu bilan o'simlikni azot bilan taminlab, erni N bilan boyitadi.¹⁹



Zamburug'larning sanoatda axamiyati kattadir. Masalan: achitqi zamburug'i Saccharomycetes glyukozani etil spirtiga aylantiradi. Zamburug'larning tibbiyotda ham axamiyati kattadir. Masalan: shoxkuya (qoramux) Claviceps pupuriea. Bu zamburug' parazit holatda g'alladon o'simliklarida uchraydi. Xaltachali zamburug'ga kiradi. Tarkibida ergotin gruppasiga kiradigan bir qancha alkaloidlar bor. Bu zamburug'dan tayyorlangan ekstrat genekologiya praktikasida qon to'xtatishda ishlatiladi. SHoxkuya alkaloidi mushaklarni qisqartirish xususiyatiga ega. 1942 yili rus olimi Ermoleva Penicilium deb atagan xaltachali zamburug'dan penselin oladi. 1938 yili rus olimi Krasilnikov xali yaxshi aniqlanmagan zamburug'lardan Actinomycetes dan streptomitsen oldi. Zamburug'lardan bo'yoq moddasi olinadi. Masalan: po`kak zamburug'idan. Zamburug'ning axamiyati bilan birga ularning zarari ham bor. Parazit zamburug'i qishloq xo'jaligiga juda katta zarar keltiradi. Masalan: bazidial zamburug'lari sinfiga kiruvchi qora kuya zamburug' (golovnya) Ustilago hamda zang zamburug'i (rjavchiona) Puccinia 1932 y qishloq xo'jaligida 300 million so'mlik zarar etkazgan. Bu zamburug'lardan qutilish yo'li qorakuya va zang zamburug'iga chidamli

2. ¹⁹ Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –48 p


o'simlik navlarini etkazish, ekin ekiladigan dalalarni begona o'tlardan tozalash, urug'ini dorilab ekish va h.k.

LISHAYNIKLAR-Lichenes

Lishayniklar 2 xil o'simlikning birga yashashidan xosil bo'lgan organizmdir. Lishayniklarda suvo'ti hamda zamburug' bor. Lishayniklarda bo'lgan suvo'ti va zamburug' bir-biri bilan simbioz holatda yashaydi. Simbioz bu bir-biriga hamkorlik va qarama-qarshi kurashdir. Zamburug'lardan asosan xaltachali zamburug'lar, ba'zan bazidial zamburug'lar, suvo'tlaridan ko'k-yashil yoki yashil suvo'tlari ishtirok etadi. Lishaynikni tashkil etgan bu 2 organizm bir-biridan foydalanib, qisman bir-biriga zarar etkazib, yashashni davom ettiradi.

Zamburug'lar suvo'tiga suv va mineral modalarni beradi, suvo'tidan esa organik modalarni oladi. Suvo'tining hujayrasida yashil rang beruvchi pigment bo'lmagani uchun, fotosintez bo'lib, organik modda tayyorlanadi.

1867 yil rus olimlari Fomitsen va Baranetskiylar lishayniklarning tanasidan suvo'tlarini ajratib olgan. Erkinlikga chiqqan suvo'tlari kuchli taraqqiy etib, zoosporalar hosil qilib ko'paya boshlagan. Suvo'tlaridan ajrab qolgan zamburug'lar esa normal taraqqiy eta olmagan. Fomitsen va Baranetskiylar suvo'tlari zamburug'ga tushgan asir degan xulosaga kelgan. Bu 2 xil o'simlikni bir-biri bilan qo'shib yashashgan nixoyat darajada sovuqqa va issiqqa chidamli organizm kelib chiqqan. Lishayniklar, suv- o'tlari yoki zamburug'lar yashay olmaydigan joylarda o'sadi va taraqqiy etadi. Masalan: toshlarning ustida, daraxtlarning po'stlog'ida, cho'llarda va boshqa erlarda.



Lishayniklar tashqi ko'rinishi jihatdan 3 ta guruppga bo'linadi:

1. Ko'pikka o'xshash bo'lgan lishayniklar.
2. Bargga o'xshash lishayniklar.
3. SHoxlanib o'sadigan lishayniklar.

Ko'pikka va bargga oxshash lishayniklar toshga, daraxtlarning po'stlog'iga yoki biror narsaga yopishgan xolda gorizontal o'sadi. Shoxlanib o'sadigan lishaynik esa, vertikal o'sadi.

Lishayniklarning anatomiyasi ham 2 xil tipda bo'ladi.

Lishayniklar tanasining tashqi tomonini zamburug' g'iflari o'rab olgan. Ichki tomonida suvo'ti hujayralari joylashgan bo'ladi. Lishayniklarning tanasining ma'lum bir joyda suvo'ti hujayralari bo'lsa, suvo'ti qavatini gonidiya qavat deyiladi. Lishaynikning o'zini geteromer deyiladi. Lishaynikda suvo'ti hujayralari tarqoq holda joylashgan bo'lsa, gomeomer deyiladi .

Lishayniklar 3 xil yo'lda ko'payadi:

- a) **VEGETATIV**
- b) **JINSSIZ**
- c) **JINSLI**

Vegetativ ko'payishda tanasi bo'linib ko'payadi yoki tanasida o'simtalar hosil bo'ladi. Sorediya – bu koptoksimon (tugunsimon) bo'lib, suvo'tlarini zamburug'lar o'rab oladi. (1ta yoki 2ta suvo'tlarini).

Sorediya etilgandan keyin lishaynikni tanasi bosim ta'sirida yoriladi va sorediya shamol yordamida uchib ketadi va qulay sharoitda nam erda o'sib, ko'payadi.

Izideya – lishaynik tanasida yonidan o'sib chiqqan o'simlik bo'lib, shuni yordamida uzilib qulay erga tushib ko'payadi.

Jinssiz ko'payish sporalar yordamida bo'ladi. Zamburug' bilan suvo'ti birgalikda sorediya yoki izideya xosil qilib ko'payishi mumkin. Suvo'ti qaysi suvo'tidan tashkil topgan bo'lsa, shu bo'yicha ko'payadi. Lishayniklarning ba'zi birlari odamlar tomonidan ovqatga ishlatiladi. Masalan: Islandiya lishaynigi. Ba'zi lishayniklardan lakmus bo'yog'i olinadi. Tundrada o'suvchi lishayniklar bug'ular uchun ovqat. Lishayniklar juda sekin o'sadi. Masalan: tundrada o'suvchi lishayniklar 1yilda 3,5 sm o'sishi mumkin. Ba'zi bir lishayniklardan efir moyi olinadi. Ba'zi bir lishayniklar zaxarli bo'lgani uchun ovchilar bo'rilarini zaharlash uchun ishlatadilar

Nazorat savollari

1. Suvo'tlarining tuzilishi, yashash sharoiti va klassifikatsiyasi haqida nimalarni bilasiz?
2. Suvo'tlarining ko'payishini tushuntirib bering?
3. Suvo'tlarining axamiyati to'g'risida nimalarni bilasiz?
4. Zamburug'lar qanday o'simlik, ularning tuzilishi va klassifikatsiyasi haqida nimalarni bilasiz?
5. Zamburug'larning ahamiyati qanday?
6. Lishayniklar qanday organizmlardan tashkil topgan?
7. Lishayniklarni qanday xillari mavjud?
8. Lishayniklarni ko'payishi va ahamiyati?

Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o'quv qo'llanmalar ro'yxati

1. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа” , 2001.-230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. – T.: O'zbekiston, 2005.- 435 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A., Samatova SH. O'simliklar sistematikasidan amaliy mashg'ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
4. Ahmedov O'.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elaktron darslik.-T.: 2008.
5. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –48 p
6. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
7. Hamidov A., Nabiev M.M. “O'zbekiston o'simliklarini aniqlagichi”.-T.: 1987.-235 b.

8. Василев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “Высшая школа”, 1988. -435 с.
9. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O‘.A. va boshqalar. Dorivor o‘simliklarning lotincha-o‘zbekcha-ruscha-arabcha va forsha-tojikcha lug‘ati.-T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
10. Berezovskaya T.P., Dmitruk S.E., Grishinna e.I., Belousov M.V. Основы farmatsevticheskoy botaniki. – Tomsk: Pechatnaya manifaktura, 2004.-294 s.
11. Xolmatov X.X., Ahmedov O‘. A. Farmakognoziya. 1-2 qism. – T.: “Ibn Sino” nashiryoti, 2007.- 806 b.

Ma’ruza – 10

Yuksak sporali o‘simliklarga qisqacha tasnif. Moxsimonlar. Qirqquloqsimonlar .

Ma’ruzaning maqsadi:

1. Yuqori sporali o‘simliklarga qisqacha nasnif.
2. Moxsimonlilar bo‘limi.
3. Jigarsimon moxlar.
4. Poya va bargli moxlar.
5. Torf hosil qiluvchi moxlar.
6. Moxlarning yashash sharoiti.
7. Qirqquloqsimonlar bo‘limi.
8. Qirqquloqlar. O‘rmon qirqqulog‘i.
9. Qirqbo‘g‘imlilar. Dala qirqbo‘g‘imi.
10. Plaunlar. Cho‘qmoqli plaun.
11. Yuqori sporali o‘simliklarning kelib chiqishi.

Tayanch iboralar: *Yuksak sporali o‘simliklarga tasnif. Moxsimonlar. qirqquloqsimonlar. Yuksak sporali o‘simliklarni tuban sporali o‘simliklardan ustunligi. Moxlar va qirqquloqsimonlarning umumiy xususiyati. Yuksak o‘simliklarning umumiy tasnifi va kelib chiqishi. havodan oziqlanish asoslari. Yuksak o‘simliklarda qonuniy nasl gallashtirish sodir bo‘lishi. Yuksak o‘simliklarning asosiy bo‘limlari. Moxsimonlar bo‘limi. Bo‘limning umumiy xususiyatlari. Moxsimonlar sinfi: jigarsimon va poya bargli moxlar, ularning xususiyatlari. Tanasining tuzilishi va ko‘payishi. Rivojlanish davri va ularda nasl gallashtirish. Poya va bargli moxlarning kenja sinflari: torf moxlar, kakku zig‘iri.*

YUQORI SPORALI O‘SIMLIKLAR

Tuban sporali o‘simliklarning jinsiy organlari bir hujayrali, sodda tuzilgan. Tuban sporali o‘simliklar organlarga bo‘linmaydi. Yuqori sporali o‘simliklarning ko‘pchilik vakillari organlarga bo‘linadi. Ba‘zi bir vakillari organlarga bo‘linmaydi. Jinsiy organlari ko‘p hujayrali, murakkab tuzilgan. Yuqori sporali o‘simliklarga 2 ta tip kiradi.

1. Moxsimonlar
2. Qirqquloqsimonlar

MOXSIMONLAR

Bu tipga yuqori sporali o‘simliklarning eng soddagina tuzilganlari kiradi. Shunday bo‘lsa ham ular tuban sporali o‘simliklarga nisbatan yaxshi taraqqiy etgan bo‘ladi. Moxlar quruqlikda

yashashga moslashgan bo'lsa ham ular asosan nam yerni yaxshi ko'radi. Moxlarni ariq bo'ylarida, botqoqliklarda, zax yerlarda uchratish mumkin. Moxlarning ba'zi bir vakillari organlarga bo'linmaydi. Mas: jigarsimon moxlar. Ko'pchilik vakillari organlarga bo'linadi. Bularda haqiqiy tuzilgan barg, poya mavjud. Lekin ildiz bo'lmaydi. Ildiz vazifasini rizoidlar bajarib turadi. Rizoid-epidermisdan o'sib chiqqan mayda tukka o'xshaydi. Moxlarda yuqori o'simliklarga nisbatan to'qimalari yaxshi taraqqiy etmagan. Moxlarning otaligi- anteridiya, onaligi-arxegoniya deyiladi.

Moxlarning jinsli nasli yaxshi taraqqiy etgan. Jinsli naslini gametofit deyiladi. Jinssiz nasli yomon taraqqiy etgan. Jinssiz naslini sporofit deyiladi. Moxlar 3 xil yo'lda ko'payadi.

1. Vegetativ

2. Jinsli

3. Jinssiz

Jinsli va jinssiz ko'payish gallanib turadi. Oldin jinsli, so'ngra jinssiz ko'payish bo'ladi. Jinsli ko'payish natijasida spora hosil bo'ladi. Jinssiz ko'payganda yangi o'simlik hosil bo'ladi. Moxlar 2 sinfga bo'linadi:

1. Jigarsimon moxlar

Bularning ba'zi vakillarining tashqi ko'rinishi jigarga o'xshash bo'ladi. Jigarsimon moxlar organlarga bo'linmagan.

2. Poya va bargli moxlar

Ularda haqiqiy poya va barg bo'ladi.

JIGARSIMON MOXLAR.

Jigarsimon moxlarga vakil qilib Marshansiyani olamiz. Marshansiyani birinchi marta fransuz vrachi Marshanse topgan va o'z nomiga qo'ygan. Marshansiya zax yerlarda, ariq bo'ylarida o'sadi. Uning tanasining tashqi ko'rinishi bargga o'xshash bo'ladi. Tanasining pastki tomonidan, ya'ni epidermisdan o'sib chiqqan rizoidlar yordamida yerga yopishib o'sadi. Marshansiyaning ko'ndalang kesimida tashqi tomoni epidemis bilan qoplangan. Epidermisda ustitsalar joylashgan. Ustitsaning ichkari tomonida havo kamerasi bor. Assimilyatsion hamda zapas oziq moddalarni to'playdigan to'qimalar uchraydi.



Assimilyatsion to'qima hujayralarida xlorofill donachalari bor. Bu hujayralarda fotosintez protsessi bo'lib turadi. Marshansiya tanasining pastki epidermisidan rizoid o'sib chiqqan bo'ladi. Marshansiya 3 xil yo'lda ko'payadi:

1. Vegetativ

2. Jinsli

3. Jinssiz

Vegetativ ko`payish kurtaklar yordamida bo`ladi. Kurtaklar marshansiyaning ustki tomoniga joylashgan. Kurtaklar shamol yordamida uzilib ketib, bu uzilgan kurtaklardan marshansiya o`sib chiqadi. Ya`ni kurtaklar marshansiya tanasiga aylanadi. Marshansiya bir jinsli ikki uyli o`simlik hisoblanadi. Bitta marshansiya onalik ekzempliyar hisoblanadi. Otalik va onalik marshansiyalar bir-birlaridan quyidagicha farq qildi: Otalik marshansiyaning tanasining ustidan o`sib chiqqan plastinka kamroq qirzilgan. Onalik ekzempliyaridagi plastinka ko`proq qirzilgan. Otalik ekzempliyaridagi plastinka dastasi tuksiz va kaltaroq. Onalik ekzempliyaridagi plastinkaning dastasi tukli bo`ladi. Otalik va onalik ekzempliyaridagi plastinkalar ichida jinsiy organlar taraqqiy etadi. Otalik ekzempliyaridagi plastinka ichida bir nechta yumaloq shaklda anteridiya uchraydi. Onalik ekzempliyaridagi plastinka ichida arxeginiyalar taraqqiy etadi.

Arxegoniya ikki qismdan ibborat :

1. Arxegoniyaning bo`yni
2. Arxegoniyaning qorni

Arxegoniyaning qornida tuxum hujayra taraqqiy etadi. Marshansiyaning jinsli ko`payishi yog`ingarchilik vaqtida suv yordamida sodir bo`ladi.

Anteridiyalar ishlab chiqargan spermatozoidlar (otalik ekzempliyaridagi) suvda suzib yuradi. Spermatozoidlar onalik ekzempliyaridagi arxegoniyaning uchiga kirib yopishadi. Natijada arxegoniyaning uchi yoriladi. Spermatozoidlarning kirishiga yo`l ochiladi. Spermatozoidlar arxegoniyaning bo`yni orqali kirib tuxum hujayrani otalantiradi. Otalanish bo`lib o`tgandan so`ng embrion hosil bo`ladi. Shu bilan jinsiy ko`payish tugaydi va jinssiz ko`payish boshlanadi.

Sporogon avval arxegoniyaning qornida joylashgan bo`ladi. Sporogon yorilgandan so`ng uning bandi, arxegoniyani yorib chiqadi. Sporalar yorilgandan so`ng sporogon ham yoriladi. Natijada juda ko`p sporalar va ellateralalar chiqadi.

Ellateralalar –bu jinssiz hujayra. Sporalar qulay sharoitga tushib qolsa, o`sa boshlaydi. Sporalar marshansiyaga aylanadi. Sporalar tashqi ko`rinishi jihatidan bir xil bo`lsa ham, fiziologik jihatdan har xildir. Bitta sporadan otalik marshansiya o`sib chiqsa, 2-sporada onalik marshansiya o`sib chiqadi. Marshansiya oldin jigar kasalligiga ishlatilgan. Hozir esa meditsinada ishlatiladi.

POYA VA BARGLI MOXLAR

Poya va bargli moxlarda haqiqiy poyasi va bargi bor.

Ildizi bo`lmaydi. Ildiz vazifasini rizoidlar bajarib turadi. Bu sinfga vakil qilib “Kakku zig`iri”ni olamiz. Kakku zig`iri MDHning o`rmon zonasida, ba`zan botqoqliklarda o`sadi. Bo`yining uzunligi 40 sm gacha boradi. Bargi ko`ndalang kesimida tashqi tomondan epidermis bilan qoplangan. Bargida mehanik va assimilyatsion to`qimalarni uchratish mumkin.

Barg poyali moxlar sinfi 3ta tartibni o`z ichiga oladi :

1. Yashil moxlar. (Bryales)
2. Sfagnum moxlar. (Sphagnales)
3. Andrea moxlari (Andreales)

Yashil moxlar tartibiga kakku zig`iri va Respublikamizda uchraydigan Funariya moxi kiradi. Kakku zig`iri ikki uyli, ko`p yillik o`simlik bo`lib poyasi tik o`svuchi qizg`ish rangda bo`ladi. Funariya ham boshqa moxlar kabi o`rmon zonalarida o`sadi. Uning bargi poyasiga zich o`rnashgan bo`lib bo`yi 3 sm ga teng. Poyasi och-yashil rangli bo`lib yashil gilamlar tashkil qiladi poyaning yer osti qismida rizoidlar ko`p bo`ladi.

Kakku zig`irida haqiqiy poya va barg bor, ildiz bo`lmaydi, ildiz vazifasini rizoidlar bajarib turadi. Kakku zig`iri uch xil yo`lda ko`payadi.

1. Vegetativ

2. Jinsli

3. Jinssiz

Vegetativ ko'payish rizoidlar yordamida bo'ladi. Oldin jinsli, so'ngra jinssiz ko'payish bo'ladi. Kakku zig'iri marshansiyaga o'xshash bir jinsli, ikki uylik o'simlik hisoblanadi. Bitta ekzempliyada arxegoniyalar taraqqiy etadi. Bitta ekzempliyada anteridiya taraqqiy etadi. Onalik kakku zig'irining bo'yi uzun, otalik kakku zig'irining bo'yi bir oz kaltaroq bo'ladi. Otalik ekzempliyada anteridialarni o'rab turgan qizil bargchalar **parafizalar** bo'ladi. Bu qizil bargchalarni **perianti** deyiladi. Anteridiya uzun xaltachaga o'xshash bo'ladi. Anteridialar ikki xivchinli, harakatchan spermatozoidlarni vujudga keltiradi. Arxegoniyaning shakli kolbaga o'xshash bo'lib ular ham parafizalar bilan o'ralgan. Otalanish protsesi suvning yordamida bo'ladi. Suvda suzib yurgan spermatozoidlar kelib arxegoniyaga yopishadi. Bo'yni orqali kirib, tuxum hujayrani otalantiradi. Natijada embrion paydo bo'ladi. Embrion ko'p hujayrali sporogonga aylanadi. Sporogon band tashkil etadi. Shu holicha u qishlaydi. Kelgusi yili sporogon bandi cho'zilib ketib, poyadagi bargdan uzoqlashadi. Sporogonning yuqori tomonida qalpoqchasi bo'ladi. Bu qalpoqcha sporogonni sovuqdan va issiqdan saqlaydi. Bu qalpoqchalar bahorda tushib ketadi. Qalpoqcha ostidagi qalpoqcha esa sporogonning ichki tomonini yopib turadi. Sporogon ichida sporangiya hujayralari taraqqiy etadi. Sporangiya hujayralarining reduksion bo'linishi natijasida sporalar vujudga keladi. Sporalar yetilgandan so'ng sporangiya devoriy yoriladi. Sporogonning qopqochasi ochilib, sporalar tarqalib ketadi. Sporalar juda mayda, sariq rangli bo'ladi. Sporalar qulay joyga tushib qolsa, kakku zig'iriga aylanadi. Sporalar fiziologik jihatidan har xil. Bitta sporadan otalik kakku zig'iri, ikkinchi sporadan onalik kakku zig'iri vujudga keladi.²⁰

TORF HOSIL QILUVCHI MOXLAR



Sfagnum bir-biriga o'xshash bo'lgan 300 dan ortiq turga ega. Asosan u MDH ning shimol va g'arbida, mineral moddalari kam bo'lgan suvlarida, nam va botqoqliklarda o'sadi. Tarkibida Ca tuzlari bor suvga chidayolmaydi. Shuning uchun ham ohakli tuproqda o'smaydi. Sfagnum namlikning 99% ini o'ziga shimib. Natijada sfagnum o'sgan yer botqoqlikka aylanadi. Sfagnumning yuqori tomoni asta sekin o'sib boraveradi. Pastki tomoni esa asta sekin qurib boradi. Natijada qurigan tomoni yig'ilib torf botqoqligiga aylanadi. Torf bakteriyalarini o'ldirish xususiyatiga ega. Shuning uchun u tibbiyotda yara bog'lovchi material ya'ni paxta sifatida ishlatiladi. Torf yoquv ashyosi, hamda o'g'it sifatida qo'llaniladi.²¹

QIRQQULOQSIMONLAR TIPI

Qirqquloqsimonlar toshko'mir davrida yer yuzida ko'p tarqalgan o'simlik hisoblanadi. U davrda daraxtsimon paprotniklarning juda katta o'rmonlari bo'lgan. Bu daraxtlarning balandligi 20-30m bo'lgan. Yerdan qazib olingan bu o'simliklarning toshga aylangan qoldiqlari

1. ²⁰ V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
2. ²¹ Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –50 p

va ularning tosh ko'mir davrining o'simligi ekanligini bildiradi. Hozirgi vaqtda ham Avstraliya, Yangi Zelandiya, Braziliya mamlakatlarida o'sadigan tuzilgan turlari uchraydi. Bularning tashqi ko'rinishi palmaga o'xshaydi. Qirqquloqsimonlilar moxlardan shu bilan farqlanadiki, ularning sporofit nasli yaxshi taraqqiy etgan. Moxsimonlarda ildiz bo'lmaydi, qirqquloqsimonlilarda haqiqiy ildiz bo'ladi. Qirqquloqsimonlilar quruqda o'ssa ham, ular soya salqinni yaxshi ko'radi. Qirqquloqsimonlilar orasida suvda o'sadigani ham uchraydi. Masalan: suv qirqqulog'i. qirqquloqsimonlilarning o'tkazuvchi to'qimalari yaxshi taraqqiy etgan. Ularda floema va ksilema elementlarini ko'rish mumkin. O'tkazuvchi to'qima elementlari konsentrik, yani ksilema markazida joylashgan.

Qirqquloqsimonlilar 3 sinifga bo'linadi:

1. Qirqquloqlar

2. Qirqbo'g'inlar

3. Plaunlar

Qirqquloqsimonlarning turlari 8000 dan oshadi. Qirqquloqlar yer sharining cho'l zonasidan tashqari hamma yerida tarqalgan. Havosi nam bo'lgan joylarda, o'rmonlarda, ba'zilar tog'li joylarda o'sadi. Ba'zi qirqquloqlar madaniy o'simliklar orasida begona o't sifatida uchraydi. Mas: Gruziyada choy plantatsiyasida orlyak deb atalgan qirqquloq uchraydi. Uning bargi shu darjada katta bo'ladiki, odam ko'rpa o'rnida yopib yotsa bo'ladi.

Qirqquloqlarning urug'langan tuxum hujayrasidan vujudga kelganva rivojlangan sporafit moxlarnikiga nisbatan ancha yirik, tashqi va ichki tuzilishi ham murakkab bo'lib, unda barg, poya va ildiz bo'ladi. Ba'zi qirqquloqlarning sporafiti ancha yirik bo'lib, tashqi ko'rinishidan gulli o'simliklarga o'xshaydi.

Qirqbo'g'imlilar

Qirqbo'g'inlar poyasida bo'g'im va bo'g'im oraliqlari bo'lishi bilan xarakterlidir. Bo'g'imida mayda reduksiyalangan barglar bo'ladi. Qirqbo'g'inlar ariq bo'ylarida, nam yerlarda, madaniy o'simliklar orasida begona o't sifatida uchraydi. O'rta Osiyoda o'sadigan vakillaridan biri dala qirq bo'g'imi (*Equisetum arvense*) dir. Dala qirqbo'g'imining ildiz poyasida tugunaklar bo'lib, yoz davomida zapas oziq moddalar (krahal) saqlashga moslashgan.

Dala qirqbo'g'imi yoz faslida 2 xil novda chiqaradi. Erta bahorda qoramtir-to'q jigarrangli novda o'sib, bo'yi 8-12 sm ga yetadi. Bu tik o'suvchi bahorgi novda oziq moddalar bilan to'yingan bo'lib, ularning poyasi bo'g'im va bo'g'im oraliqlarga bo'linganligi bilan xarakterlidir. Har qaysi bo'g'inda tangacha simon, nishtarga o'xshash reduksiyalangan barglar joylashadi. Yozgi novdalar yashil rangda bo'lib, asossan, assimlyatsiya qilishga moslashgan. Qirqbo'g'im o'simligida ham gallanib ko'payish kuzatiladi. Sparangiylar sporali boshqachalarida 6-8 tadan joylashadi. Sporangilar ichida ko'p miqdorda elaterali sporala pishib yetilgandan so'ng, tashqariga chiqib sochiladi. Spora to'q yashil rangli shar simon hujayradan iborat bolib, qalin po'st bilan o'raladi, uni spiral shaklda o'ralga 2 ta tasma-elaterlar o'rab turadi. Bir xil sporalar o'sib urg'ochi gametofit, 2 xillari esa erkak gametofit hosil qiladi. Urg'ochi o'simta ancha yirik bo'lib, unda arxegoniya yetiladi. Erkak o'simta mayda bo'lib, unda anteridiy hosil bo'ladi. Otalanish suv yordamida bo'ladi. Otalangan tuxum hujayralardan zigota, undan esa yangi qirqbo'g'im xosil bo'ladi.

Plaunsimonlar.

Plaunlarning poyasi dixatomik ravishda shoxlanishi bilan boshqa sinflardan farq qiladi. Plaunsimonlarga uncha katta bo'lmagan ko'p yillik yashil o'tlar, poyasining uzunligi 1-3 metrgacha yetadigan yer bag'irlab o'sadigan o'simliklar kiradi. Plaunsimonlarda sporafit nasl ustun bo'ladi.

Jinssiz ko'payish sporalar yordamida, jinsli ko'p ayish jinsiy organlar yordamida bo'ladi. Plaunsimonlilarda oldin jinssiz, so'ngra jinsiy ko'payish bo'ladi. Moxlarda aksincha bo'ladi. O'simtalar bir uyli ikki jinsli yoki ikki uyli bir jinsli bo'lishi mumkin. otalanish protsessi yog'ingarchilik vaqtida bo'ladi. Otalangan tuxum hujayradan jinssiz nasl- sporafit o'sib chiqadi. Sporafit – bu ildiz, poya, bargli haqiqiy o'simlikdir. Jinssiz nasl – sporofitda

sporangiya hujayralarining reduksiyon yo`lda bo`linishi natijasida sporalar hosil bo`ladi. Sporalar shamol yordamida tarqaladi. Agar sporalar bir xil bo`lsa undan ikki jinsli o`simta o`sib chiqadi. Sporalar har xil bo`lsa ikki uyli bir jinsli o`simta o`si chiqadi. Sporalar katta va kichik bo`lishi mumkin. Kichik sporalarni mikrospora, katta sporalarni makrospora deyiladi.

Mikrosporalar mikrosporangiyalarda makrosporalar esa makrosporalarda taraqqiy etadi. Mikrosporadan otalik o`simtasi o`sib chiqadi. Bu otalik o`simtada anteridiyalar taraqqiy etadi. Makrosporadan onalik o`simtasi o`sib chiqadi. Unda arxegoniyalar taraqqiy etadi.

O`rmon qirqqulog`ining ildiz poyasidan gijja haydaydigan ekstrakt tayyorlanadi . qirqbo`g`inning poyasi siydik haydovchi dori sifatida ishlatiladi. Apteka plaunning sporasi detskaya pudra va pilyula tayyorlashda , bir-biriga yopishib qolmasliga uchun sporadan sepiladi. Og`ir sanoatda metallarni quyishda , qolipga sporasi solib qo`yiladi.

Nazorat savollari

1. Tuban va yuqori sporali o`simliklar farqi?
2. Moxlar qanday ko`payadi?
3. Jigarsimon moxlarning tuzilishi va ko`payishi?
4. Poya va bargli moxlarning tuzilishi va ko`payishi?
5. Qirqquloqsimonlilar klassifikatsiyasi?
6. Qirqquloqlarning moxlardan farqi?
7. Qirqbo`g`imlilar tuzilishi?
8. Qirqbo`g`imning ko`payishi?
9. Plaunsimonlar, tuzilishi, ko`payishi?
10. Qirqquloqsimonlilar ahamiyati?

Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o`quv qo`llanmalar ro`yxati

1. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O`.A. Botanika. – T.: O`zbekiston, 2005.- 435 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O`.A., Samatova SH. O`simliklar sistematikasidan amaliy mashg`ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
4. Ahmedov O`.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elaktron darslik.-T.: 2008.
5. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –50 p
6. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
7. Hamidov A., Nabiev M.M. “O`zbekiston o`simliklarini aniqlagichi”.-T.: 1987.-235 b.
8. Василев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “ Высшая школа ”, 1988. -435 с.
9. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O`.A. va boshqalar. Dorivor o`simliklarning lotincha-o`zbekcha-ruscha-arabcha va forscha-tojikcha lug`ati.-T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
10. Berezovskaya T.P., Dmitruk S.E., Grishinna e.I., Belousov M.V. Основы farmatsevticheskoy botaniki. – Tomsk: Pechatnaya manifaktura, 2004.-294 s.
11. Xolmatov X.X., Ahmedov O`. A. Farmakognoziya. 1-2 qism. – T.: “Ibn Sino” nashiryoti, 2007.- 806 b.

MA`RUZA – 11

Qirqquloqsimonlilar. Yuksak o`simliklar evolyutsiyasi.Ochiq urug`lilar.

Ma'ruzaning maqsadi:

Chin qirqquloqlar va suv qirqquloqlari haqida tushuncha, qirqbo'g'implilar, plaunlar tuzilishi, ko'payishi. Ochiq urug'lilarga tasnif, klassifikatsiyasi, tuzilishi, ko'payishi haqida tushuncha berish.

Reja:

1. O'rmon qirqqulog'ining tuzilishi, ko'payishi.
2. Suv qirqqulog'ining tuzilishi, ko'payishi.
3. Qirqbo'g'implilarga tasnif.
4. Dala qirqbo'g'imining tuzilishi, ko'payishi.
5. Plaunlar tuzilishi, ko'payishi.
6. Bir xil va har xil sporali plaunlar.
7. Ochiq urug'lilarga tasnif, klassifikatsiyasi.
8. Ochiq urug'lilarning tuzilishi, ko'payishi.
9. Igna barglilar sinfiga harakteristika.
10. Igna barglilarning ko'payishi.

Tayanch iboralar: *Ochiq urug'li o'simliklar. Urug'li o'simliklar. Ochiq urug'lilarni asosiy vakillari. Urug'li o'simliklarni xususiyati. Evolyutsion jarayonda urug'ni kelib chiqishi. Ochiq urug'li o'simliklarni kelib chiqishi. Kubbalarning tuzilishi. Urug'kurtak va chang tuzilishi. Changlanish va otalanish. Ochiq urug'li o'simliklarning sinflari: sagovniklar, bennetitlar, ginkolar, gnetumlar va ignabarglilar. Ninabarglilar sinfiga tasnif. Ninabarglilar oilasi: qarag'aydoshlar, sarvidoshlar, toksodiyadoshlar, araukariyadoshlar, zarnabdosshlar.*

CHIN QIRQQULOQLAR TARTIBI

Bu tartibga o'rmon qirqqulog'i kiradi.

O'rmon qirqqulog'i (*Dryopteris filixmas*) salqin o'rmonlarda, butalar orasida, nam yerda, O'rta Osiyoning tog'li rayonlarida uchraydi. O'rmon qirqqulog'I ko'p yillik o't o'simlik. Ildizpoyasi yo'g'on qoramtir bo'lib, tangacha barg bilan qoplangan. Ildizpoyaning uchida bo'yi 1m gacha yetadigan ko'p patsimon yashil rangli barg o'sib chiqadi. Yoshlik vaqtida bargning uchi gajaksimon qayrilgan bo'ladi. Barglar kuzda qurib, tushib ketadi. Bargning ostki qismi qoladi. Bu qolgan burglar hisobiga ildizpoya tobora yo'g'onlashib boradi. Yoz paytlarining oxirida bargning orqa tomonida mayda g'uddalar-soruslar paydo bo'la boshlaydi. Bularning shakli yumaloq bo'ladi. Soruslar barg o'rtasida tomirlar bo'ylab, ikki qator bo'lib joylashadi.

Soruslar-sporangiyaning yig'indisidir. Chunki sorusning ichida bir qancha tuxumsimon sporangiyalar joylashgan bo'ladi. Sporangiyalarning o'sib chiqqan joyini planset deyiladi. Sporangiyalari ko'p hujayrali bo'lib, ularning tashqi tomonidagi bir qator hujayrasini tapetum deyiladi. Ichki tomonidagi hujayralarini arxospora deyiladi. Bu hujayralar reduksion tipda bo'linishi natijasida har bir hujayradan 4 tadan spora-tetraspora hosil bo'ladi. Sporalarning rangi qo'ng'ir bo'ladi. Sporalarning hujayra po'sti 2 qavat bo'lib yetilgandan so'ng tashqi qavati yorilib ketadi. Bir tup o'simlikda millionlab spora hosil bo'lishi mumkin. Nam yerga tushgan spora una boshlaydi. Natijada diametri 0,5-1 sm bo'lgan yashil rangli yuraksimon o'simta o'sib chiqadi. Bu o'simta rizoidlar yordamida yerga yopishgan bo'ladi. O'simtada xlorofill donachalari bo'lganligi sababli fotosintez protsessi ham bo'lib o'tadi. O'simta bir uyli ikki jinsli. Shu o'simtada anteridiya ham, arxegoniya ham taraqqiy etadi. O'simta o'rmon

qirqqulog'ining jinsli nasli gametofit hisoblanadi. Spora hosil qilgan o'simlikning o'zi jinsiz nasl-sporafit hisoblanadi.

O'simta qisqa umrli efemerdir. U faqat 1-2 hafta yashay oladi. Jinsiy ko'payish yog'ingarchilik vaqtida bo'ladi. Anteridiya ishlab chiqqan spermatozoidlar suvda suzib yuradi. Bu spermatozoidlarni o'ziga jalb qilishi uchun arxegoniya "olma kislotasini" ishlab chiqadi. Spermatozoidlar arxegoniyaning bo'yniga kelib yopishadi. . . . , natijada arxegoniyaning tuxum hujayrasini otalantirgandan so'ng embrion hosil bo'ladi. Embriondan yangi o'simlik o'sib chiqadi.



SUV QIRQQULOQLARI TARTIBI

Har xil sporal qirqquloqlarga suv qirqqulog'ini misol qilib olamiz. Suv betida suzib yuruvchi 1 yillik o't o'simlik. Poyasi gorizontal ravishda shoxlangan. Bargi 2xil bo'ladi.

a) Suvning betidagi bargi

b) Suvning ostidagi bargi

Suvning betidagi bargi yashil. Unda xlorofill donachalari bo'ladi. Bu bargda fotosintez protsesi bo'lib turadi. Suvning ostidagi bargi qo'ng'ir rangli bo'lib ildiz vazifasini bajaradi. Qo'ng'ir rangli barglarda soruslar joylashgan. Soruslar ichida sporangiyalar taraqqiy etadi. Sporangiyalar 2 xil bo'ladi: mikrosporangiyalar va makrosporangiyalar. Mikrosporangiyalarda mikrosporalar, makrosporangiyalarda makrosporalar yetiladi. Soruslar kuzda uzilib, suv tagiga cho'kib ketadi. Suv tagida qishlaydi. Bahorda makro-va mikrosporangiyalar sorusdan ajralmagan holda suvni yuziga ko'tariladi. Mikrosporalar sporangiyadan ajralmagan holda otalik o'simtasini hosil qiladi. Bu o'simtada 2ta anteridiya bo'lib, anteridiyalar spermatozoidlarni ishlab chiqaradi. Makrosporalar sporangiyadan ajralmagan holda onalik o'simtasini vujudga keltiradi. Onalik o'simtasida bir nechta arxegoniya yetiladi. Spermatozoidlar suvda suzib kelib arxegoniyaning bo'yni orqali kirib, tuxum hujayrani otalantiradi. Bunda embrion hosil bo'ladi. Embriondan yangi o'simlik o'sib chiqadi.

QIRQBO'G'IMLILAR

Bu sinfga 1ta oila, 25 turdan iborat. Qirqbo'g'imlilar ko'p yillik o't o'simlik hisoblanadi. Bular yer sharining Avstraliyadan boshqa hamma qismida tarqalgan. Shulardan 11 turi MDHning har xil joylarida, 3 turi O'z.Rda uchraydi. Janubiy Amerikaning tropic qismida

uchraydigan qirqbi;g'imning poyasining yo'g'onligi 2sm,uzunligi esa 12mga yetadi.Ubutalarga osilib o'sadi.

Dala qirqbo'g'imi ko'p yillik o't bo'lib, uning ildizpoyasi yerga chuqur o'rtnashgan.Ildizpoyada kattaligi danakdek keladigan tugunagi bor.Bu tugunakda zapas oziq moddalar to'planadi.Ildiz poyadan yer betiga poyalalar o'sib chiqadi.Bu poyalarning uzunligi 1m gacha bo'lishi mumkin.Qirqbo'g'imning poyasi 2 xil bo'ladi.

1.Vegetativ yoki assimillatsion poya-yozgi.

2.Spora beruvchi poya-bahorgi.

Vegetativ poya yashil rangda bo'lib, kech bahorda o'sib chiqadi, kuzda qurib qoladi. Bu poyani "yozgi poya" deb ham yuritiladi. Spora beruvchi poya jigarang-pushti bo'lib, erta bahorda o'sib chiqadi. Sporalar yetilib to'kilgandan so'ng qurub qoladi. Poyasida bir qancha bo'g'in oraliqlari bo'lgani uchun bu o'simlikni halq orasida qiriq bo'g'im deyiladi. Poyasidagi epidermis hujayralari kremniziom (qumga o'hshash) bilan sug'orilgan. Bargi juda mayda, reduksiyalangan, uchburchakli bo'lib, poyaga tagi bilan doira shaklida o'rtnashgan. Poyasining ko'ndalang kesimida tashqi tomonidan epidermis bilan qoplangan. Epidermis ostida ustitsalar joylashgan. So'ngra mehanik to'qima po'stloq hujayralari, peresikil bilan o'raglan o'tkazuvchi to'qima bog'lamlari uchridi. O'tkazuvchi to'qima bo'g'lamlari yopiq, ya'ni floema bilan ksilema o'rtasida kamby bo'lmaydiy bo'lmaydi. Dala qiriq bo'g'imi vegetative, jinssiz va jinsiy yo'l bilan ko'payadi. Vegetativ ko'payishi ildiz poya yoki tunganaklari yordamida bo'ladi. Jinsiz ko'payish sporalar yordamida, jinsli ko'payish o'simtada, ya'ni gametofitda taraqiy etgan jinsiy o'rganlar yordamida bo'ladi. Sporalar bahorgi poyaning uchiga joylashgan boshqochalarda vujudga keladi. Spora beruvchi boshqochachilari barglardan tashkil topgan. Sporachilari barglarning ostki tomonidan 6-8 tagacha sparangiyalar doira shaklida joylashgan. Sparangiyalarning shakli ko'zachaga o'hshash bo'ladi. Sparangiyalar ichida ko'p miqdorda sporalar taraqiy etadi. Sporasi sharsimon qoramtir –yashil hujayralardan iborat bo'lib, ikki qavat po'st bilan o'raglan. Tashqi po'sti "ekzina" ichki po'sti "intina" deb ataladi.Sporaning 4 ta spiral simon elaterasi bo'ladi. Elateralari havo nam bo'lgan vaqtda to'g'rilanib, yozilib ketadi. Bu elateralari sporalarning bir biriga ilashib tarqalishiga yordam beradi. Sporalar morfologik jihatdan bir hil bo'lsa ham, Fiziologik jihatdan har hil bo'ladi. Bir hil sporadan otalik o'simta o'sib chiqsa, ikkinchi sporadan onalik o'simta o'sib chiqadi. O'simtalarning otalik yoki onalik bo'lishiga tashqi muhit ham bog'liq. O'simta ikki uylik, bir jinsli, agar spora organik moddasi ko'p bo'lgan unumdor yerga tushib qolsa, undan onalik o'simtasi, qumli yerga tushib qolsa, otalik o'simtaga aylanadi. Jinsli ko'payish suvi yordamida sodir bo'ladi.²²

Anteridiya ishlab chiqqan spermatozoidlar suvda suzib borib, arhegoniyani bo'yni orqali kirib tuhum hujayrani otalantiradi. Natijada embrion hosil bo'ladi. Embriondan yangi o'simlik-jinssiz nasil- sporofit o'sib chiqadi. Qiriq bo'g'imning yozgi poyasi tibbiyotda siydik haydovchi dori sifatida ishlatiladi. Qiriq bo'g'imning epidermis hujayrasi kremnezem bilan sug'orilgani uchun misgarlikda ishlatiladi. Bahorgi poya ba'zan ovqat uchun istemol qilinadi.

PLAUNLAR TARTIBI

3. ²² Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –50 p



Plaunlar sinfiy 2 tartibga bo`linadi 1. Bir xil sporali plaunlar

2. Har xil sporali plaunlar

Bir xil sporali plaunlarga vakil qilib apteka plaunini olamiz.

Apteka plauni o`rmonlarda, qarag`ayzorlarda uchraydi. O`rta Osiyoda uchramaydi. Poyasining uzunligi 70 sm bo`ladi. Apteka plauni doim yashil, ko`p yillik o`t o`simlik. Poyasi dixatomik ravishda o`sadi. Bargi mayda, bigiz shaklida bo`ladi. Tik o`suvchi poyasi qo`shaloq yoki yakka boshqochalari bilan tamom bo`ladi. Boshqoqcha sporacha barglardan tashkil topgan. Sporachi barglarning ichida shakli byurak simon sporangiyalar taraqqiy etadi ichida sporalar vujudga keladi. Bu sporalar spo`rangiya hujayralarning reduksion yo`lida bo`linishi natijasida hosil bo`ladi. Sporalar nihoyatda mayda va yengil, quruq bo`ladi. Spo`ralar yetilgandan so`ng sporangiyalar yoriladi. Natijada sporalar shamol yordamida tarqalib ketadi. Qulay sharoyitga tushib qolgan spora una boshlaydi. Sporadan tunganakga o`xshash o`simta o`sib chiqadi. Bu o`simtada anteridiya va arxegoniya taraqqiy etadi. Anteridiya va arxegoniyalarning taraqqiy etishi uchun 10-12 yil vaqt ketadi. Apteka plaunining o`simtasi bir uyli 2 jinslidir. Otolanish protsesi bahorda, yog`ingarchilikda bo`ladi. Anteridiyada ishlab chiqqan spermatozoidlar arxegoniyaning tuxum hujayrasini otalantirgandan so`ng embrion hosil bo`ladi. Embriondan yangi o`simlik o`sib chiqadi. Bu o`simlik jinsiz nasil-sporofit. Apteka plauni detskaya prisipka sifatida, pilyula tayorlashda sporadan sepib qo`yiladi, yani pilyulalar pirga yopishib qolmaydi. Og`ir sanoatda eritilgan metallarni qoliplashda ishlatiladi.

Har xil sporali plaunlarga selaginellani misol qilib olamiz. Bu o`simlik xam ko`p yillik o`simlik, doym yashil o`tli o`simlik, poyasi dixatomik ravishda shoxlangan. Tik va yotib o`suvchi poyalari bo`ladi. Vertikal poyasida boshqochasi bor. Boshqochasida ikki xil : katta – makrosporangiyalar va kichik mikro sporangeyalar bo`ladi. Mikrosporangiyalardan mikro spora taraqqiy etiladi, undan otalik o`sib chiqadi. Makrosporangiyalardan makrospora taraqqiy etiladi, undan onalik o`simta o`sib chiqadi. O`simtasi ikki uyli bir jinsli. Otolanish yog`ingarchilikda bo`ladi.

Ochiq urug`lilar tipi

Ochiq urug`li o`simliklar bir tomonidan yuqori sporali o`simliklarga o`xshaydi. Ochiq urug`li o`simliklar urug` beradigan qirq-quloqlardan, yopiq urug`li o`simliklar ochiq urug`li o`simliklardan kelib chiqan.

Ochiq urug`li o`simliklarga butalar, daraxtlar kiradi

Yopiq urug`li o`simliklar orasida daraxtlar, butalar, yarim butalar va o`tli o`simliklar uchraydi. Ochiq urug`li o`simliklar asosan monopodial tipda shohlanadi . yopiq urug`li o`simliklar esa monopodial, simpodial va dixatomik ravishda shohlanadi.

Ochiq urug`li o`simliklarda suv naylari bo`lmaydi. Suv naylari traxeidlar bajarib turadi. Yopiq urug`li o`simliklarni to`qimasida suv naylari xamda traxeidlar bo`ladi. Ochiq urug`li o`simliklarning urug` kurtagi ochiq yerda taraqqiy etadi.

Yopiq urug`li o`simliklarni urug`I mevaning ichida taraqqiy etadi.

Ochiq urug`lilarda esa urug` g`uddalarda taraqqiy etadi. Bular meva bo`lmaydi. Ochiq urug`li o`simliklardagini aks, yopiq urug`li o`simliklarni mevasi bo`ladi. Ochiq urug`li o`simliklarining endosperma to`qimasi otalanish prosesidan oldin hosil bo`ladi.

Yopiq urug`li o`simliklarda esa endosperma to`qimasi otalanishdan keyin hosil bo`ladi.

Ochiq urug`li o`simliklarda qo`shaloq otalanish bo`lmaydi, yopiq urug`li o`simliklarda esa qo`shaloq otalanish bo`ladi. Ochiq urug`li o`simliklarning ko`pchiligi doimo yashil o`simlik hisoblanadi. Ochiq urugli o`simliklar 7 sinfga bo`linida:

1. Urug`li paporotniklar
2. Sagovniklar
3. Bennetitlar
4. Kordaitlar
5. Ginkgolar
6. Igna barglilar
7. Ignacha barglilar

URUG`LI QIRQQULOQLAR

Ular o`zining tashqi ko`rinishi bilan hozirgi daraxtsimon qirqquloqlarga o`hshaydi, lekin har xil sporal bo`lib, urug` yordamida ko`payishi bilan ulardan farq qiladi.

Uning poyasida qo`sh patsimon yirik-yirik murakkab burglar bo`ladi, ularning asosiy bandlari ko`pincha bixotomik shoxlanadi.

Poya o`zak qismining juda rivojlangan bo`lishi va kambiy halqasi yordamida ikkilamchi tartibda qalinlasha olgani bilan ajralib turadi. Ikkilamchi yog`och, hozirgi ochiq urug`lilardagiga o`hshash, traxeidlardan tuzilgan, po`stlog`i ancha qalin bo`lgan. Liginoptenis mikro, makrosporalar hosil qilgan.

SAGOVNIKLAR

Sagovniklar hozir yashab turgan o`simliklar bo`lib, eski (Cycas, Masrozamia, Bowenia, Encephalarhos, Stangeria kabi avlodlar) va yangi dunyoning (Zamia, Microcycas, Ceratoramia, Pion avlodlari) tropik va subtropik mintaqalarida taqalgan 9 ta avlodni o`z ichiga oladi.

Sagovniklar-ustunsimon oddiy poyali daraxtlardan, poyasi ahyon-ahyonda shohlangan bo`ladi. Poyasining uchida juda yirik, patsimon qalin- qattiq burglar tojdek bo`lib turadi. Mikrosporangilari tangacha simon mikrasporofillarning chetida turadi yoki tangacha simon makro sporofillardan joy olgan, mikrosporofinllari to`p-to`p bo`lib, otalik kubalarini hosil qiladim Makrosporongiylar (urug`kurtaklar) makrosporofinlarning chetida turadi yoki tangachasimon mikrosporofillardan hosil bo`lgan onalik kubbalaridan joy oladi. Bu tartibga Cucas (yoki sagovnik) misol bo`la oladi.

Barcha ochiq urug`lilar singari, Cucas har xil sporal o`simlik bo`lib, makro va mikrosporalar bilan ko`payadi.

Ko`pchilik sagovniklar Cucasga o`hshash, aksari shohlamaydigan to`g`ri poyali o`simliklar bo`lib, poyasining uchida uzunligi 2,5-3 m ga boradigan yirik burglar chiqaradi. Sagovniklarning poyalari odatda metr bilan o`lchanadi. Eng katta barglar bilan qoplanishi gulning atrofidagi gulqo`rg`onini eslatadi. Ularning changlanishi shamol va hashorotlar yordamida sodir bo`ladi. Bennetitlarning urug`ida murtak to`la rivojlangan, oziq moddalar ikki pallada to`plangan.

Kordaitlar

Kordaitlar asosan paleozoy erasida o`sb, hozir qurib bitgan o`simliklar tartibidir. Tartibning eng myahshi o`rganilgan vakili Cordates avlodidir.

Tanasida yog`och zonasi bilan yahshi rivojlangan, o`sha yog`och qismi tuzulishi jihatidan ninabarglilarning yog`och qismiga o`hshab ketadi.

Ginkgolar

Ginkgoales tartibi hozir Ginkgoaceae degan atigi bitta oyilani o`z ichiga oladi, bu oilaninig birdan bir vakili Ginkgo (Ginkgo biloba) dir.

Ginkgo biloba daraxt o`simlik bo`lib, balandligi 30-40 metirga, yo`g`onligi 3-4 metrga yetadi .Mas: Avstraliyada o`suvchi Macroramia Hopei ning poyasi shuncha keladi.

Bennetitlar

Bennetitlar tashqi ko`rinishidan sagovniklarga o`hshab yura davrida rivojlangan, yer yuzini qoplab so`ng yuqori bo`r davrida butunlay yo`qolib ketgan o`simliklardir. Bennetitlarning ichki tuzilishi urug`li qirqquloqlilar bilan sagovniklarning ichki tuzilishiga juda yaqin. Ularning poyalarida kambiyalarini, lub va ancha qalin po`stloq, birlamchi, ikkilamchi yog`ochlik xalqalarni xosil qiladi.

Bennetitlarni g`uddasi o`zidan oldingi sinf o`simliklarning g`uddasidan ikki jinsliliigi bilan farq qiladi. G`uddaning tashqi tomonidagi ko`plab mikrosporangiyalarda mikrosporalalar yetilsa, g`uddaning markazidagi juda qisqargan makrosporoftida bitta urug` kurtak rivojlanadi. Sporoftlar tashqi tomondan po`stlog`I to`q kulrang va silliq bo`lib, keginchalik xar tomonga yoyilib ketadigan piramida shox- shabasini hosil qiladi.

Ginkgo barglari juda g`alati: ular odatda ikki bo`lakga bo`lingan uch burchak plastinkadan iborat bo`lib, uzun bandga aylanadi, ba`zan plastinkasi yaxlit bo`ladi.

Ginkgo-2 uyli o`simlikdir: uning mikro-va makrosporangiyalari har xil individda hosil bo`ladi.



IGNA BARGLILAR

Bu sinifga 6 ta oyila, 40 avlod, 450 tur kiradi. Ular hozirgi zamon iqlimiga ham moslashgan. Igna barglilar sinfiga daraxtlar, qisman butalar kiradi. Bu sinfga kiruvchi o`simliklardan yer yuzida ko`p tarqalganlilari: Sosna-Qarag`ay, Archa, pixta kiparis, majavelnik va boshqalar. Ignabarglilarning bargi qattiq, ensiz, igna simon, ba`zan tangacha simon bo`lib, Yosh shoxchalarda spiral yoki qarama qarshi joylashgan. Igna barglilarning barglarining ko`pchiligi igna simon bo`lgani uchun ularga shunday nom berilgan. Igna barglilar asosan monopodial, qisman simpodial tipda shoxlanadi. Masalan: Mamont daraxti simpodial shoxlangan bo`ladi. Bu daraxt yer yuzida uchraydigan daraxtlarning eng kattasidir. Uning bo`yi 150 m, eni 40 m bo`lib, u uzoq yil yashaydi.

Igna bargli o`simliklarning ildizida ildiz qini bo`lmaydi. Ildiz qini o`rnida ektotrof mikorizlar bo`ladi. Igna barglilar jinssiz va jinsli yo`lda ko`payadi. Igna barglilarga vakil qilib oddiy qarag`ayni olamiz.

Oddiy qarag`ay 1 uyli, doim yashil 2 jinsli o`simlik bo`lib, yer yuzida juda ko`p tarqalgan. Qarag`ay daraxtining bo`yi 40-50 m bo`lib, u 500 y- gacha yashaydi. Qarag`aydaraxtining poyasida va bargida smola yo`llari bo`lib, unda smola ishlanib chiqadi. Shuning uchun ham poyasini binokorlikda ko`p ishlatiladi. Qarag`ay poyasi uzoq muddatgacha chirimaydi. Qarag`ayning otalik va onalik gullari g`uddalarda joylashgan bo`ladi. Bu g`uddalarda turini o`zgartirgan barglardan tashkil topgan. Otalik guli-mikrosporalistik, onalik guli esa makrosporalistik deb ataladi. Otalik gulining pastki tomonida changdon /mikrosporangiyalar/ taraqqiy etadi. Makrosporangiya hujayralarining reduksion bo`linishinatisida mikrosporalalar, ya`ni changlar hosil bo`ladi. Chang 2 qavat po`st bilan qoplangan.

1. Ekzina –tashqi qavati
2. Intina – ichki qavati.

Qarag`ayni o`zi sporofit, chang, urug` kurtak arhegoniya-gametofit, chang bilan tuxum xujayra qo`shilib ya`ni gametofit bilan gametofit qo`shilib diploid jinssiz ganloid nasil xosil bo`ladi.

Ekzina bilan intina orasida bo`shliq bo`lib, u yer havo bilan to`lgan, shuning uchun xam qarag`ay change havoda uzoq muddat tura oladi. Changda 2 xil yadro bo`ladi:

1. Anteridial yadro
2. Vegetativ yadro.

Onalik g`uddasi 2 hil turni o`zgartirgan barglardan tashkil tobgan, 1- xili g`uddaning tashqi tomonida bo`lib, qoplag`ichlik vazifasini bajaradi. Buni “korushaya cheshuya” deyiladi. Bu barg urug`I hosil qilmaydi. 2 xil bargi urug` beruvchi bargsemennaya cheshuya deyiladi. Urug` beruvchi bargni pastki tomonida 2 ta urug` kurtagi, ya`ni makrosporangiya joylashgan. Urug` kurtagi quyidagi qisimlardan tashkil tobgan.

1. Urug` kurtagining bandi-funikulus.
2. Urug` kurtagining qoplog`ch to`qimasi- integument
3. Urug` kurtagining asosiy to`qimasi-nusellus
4. Chang yo`li-mikropille.

Urug` kurtagining markazida bola qopchig`i, endosperma hamda 2 ta arhegoniya- korpuskula joylashgan. Qarag`ay shamol yordamida changlanuvchi o`simlikga kiradi. Qarag`ay changchi shamol yordamida onalik g`uddasiga kelib tushadi. Onalik g`uddasidagi urug` kurtagining asosiy to`qimasi- nutsellusga chang kirib, 1 yil dam oladi. 2 yili una boshlaydi.

Changning anteridial yadro`si 2 ga bo`linadi. Natijada 2 xil yadro xosil bo`ladi:

-
1. Bazal yadro

2. Generativ yadro.

Changning vegetativ yadro`si esa, chang trubkasiga aylanib ketadi. Anteridial yadro`dan xosil bo`lgan bazal yadro chang trubkasining o`shiga yordam beradi. Generativ yadro bolinib, 2 ta spermiya hosil qiladi. Spermiyalarning 1 si chang trubkasi orqali siljib kirib, arhegoniyalarning 1 tasini otalantiradi. 2 chi arhegoniya otalanmasdan qoladi. Otalangan arhegoniyadan embrion vujudga keladi. Onalik g`uddasi otalanish prosesidan

oldin qizg`ish rangda bo`lib, otalagandan so`ng yashil rangli bo`lib qoladi. Urug` yetilishi davrida qo`ng`ir rangga aylanadi. Qarag`ayni otalanish prosesini rus olimi Gorojanin tekshirgan.

Qarag`ay poyasidan skipidar, bargidan smola olinadi. Skipidar bod kasaligida surtiladi.

IGNACHA BARGLILAR SINFI

Bu sinfga kiruvchi o`simliklar 1 uyli 2 jinsli yoki 2 uyli 1jinsli bo`ladi. Bularda smola yo`lari mutlaqo bo`lmaydi. Ignacha barglilar sinfi quydagi tartibga bo`linadi:

1.Efedralar

Efedra buta bo`lib, u tog`li rayonlarda va cho`larda uchraydi. Efedraning tashqi ko`rinishi qiriq bo`g`imga o`hshab ketadi. Efedra 2 uyli 1 jinsli o`simlik. Efedradan efedrin degan alkaloid olinadi. Efedrin alkaloidi tibbiyotda katta ahamyatga ega. U bod va boshqa kasalliklarga ishlatiladi.

2.Velvichiyalar.

Velvichiyalar tartibidan faqat 1 tur saqlanib qolgan. Bu tur, ya`ni velvichiya janubiy Afrikada o`sadi.

Nazorat savollari

1. O`rmon qirqqulog`ining morfologiyasi,ko`pyishi?
2. Suv qirqqulog`ining morfologiyasi va ko`payishi.
3. Qirqbo;g;imlarning morfologiyasi vako`payishi?
4. Apteka plauninig morfologiyasi va ko`payishi?
5. O`rmon qirqqulog`ining morfologiyasi,ko`pyishi?
6. Suv qirqqulog`ining morfologiyasi va ko`payishi.
7. Qirqbo;g;imlarning morfologiyasi vako`payishi?
8. Apteka plauninig morfologiyasi va ko`payishi?
9. Ochiq urug`lilar tasnifi ?
10. Oddiy qarag`ay o`aimligining morfologiyasi va ko`payishi?

Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o`quv qo`llanmalar ro`uxati

1. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O`.A. Botanika. – T.: O`zbekiston, 2005.- 435 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O`.A., Samatova SH. O`simliklar sistematikasidan amaliy mashg`ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
4. Ahmedov O`.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elaktron darslik.-T.: 2008.
5. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –66 p
6. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
7. Hamidov A., Nabiev M.M. “O`zbekiston o`simliklarini aniqlagichi”.-T.: 1987.-235 b.
8. Василев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “ Высшая школа ”, 1988. -435 с.
9. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O`.A. va boshqalar. Dorivor o`simliklarning lotincha-o`zbekcha-ruscha-arabcha va forsha-tojikcha lug`ati.-T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
10. Berezovskaya T.P., Dmitruk S.E., Grishinna e.I., Belousov M.V. Основы farmatsevticheskoy botaniki. – Tomsk: Pechatnaya manifaktura, 2004.-294 s.

11. Xolmatov X.X., Ahmedov O'. A. Farmakognoziya. 1-2 qism. – T.: “Ibn Sino” nashiryoti, 2007.- 806 b.

MA'RUZA – 12

Yopiq urug'lilar - o'simliklar evolyusiyasida eng yuksak taraqqiy etgandir. Reproduktiv organlarning paydo bo'lishi. Gul va to'p gullar.

Ma'ruzaning maqsadi:

Yopiq urug'lilarni kelib chiqishi, xarakterli belgilari. Gul va to'p gullar tuzilishi.

Reja:

1. Yopiq urug'li o'simliklarning kelib chiqishi.
2. Yopiq urug'li o'simliklarning xarakterli belgilari.
3. Yopiq urug'li o'simliklarning sinflari.
4. Gulli o'simliklarning kelib chiqishi haqidagi Vetshteyn va G.Galer nazariyalari.
5. Gulli o'simliklarning klassifikatsiyasi.
6. Gulning tuzilishi.
7. Gul qismlari.
8. Gulning urug'lanish va changlanishi.
9. Gul formulalari va diagrammasi.
10. To'pgullar tuzilishi.
11. To'pgullarning xillari.
12. To'pgullarning xarakterli belgilari.

Tayanch iboralar: *Yopiq urug'li o'simliklar o'simliklar evolyutsiyasida eng yuksak taraqqiy etganidir. Reproduktiv organlarning paydo bo'lishi. Gul va to'pgullar. Yopiq urug'li o'simliklarning kelib chiqishi. Vegetativ va generativ organlardagi asosiy o'zgarishlar.*

Gul, gul o'rni, hashorotlar yordamida changlanishga moslanish, (qo'sh otalanish va meva) va vegetativ organlardagi (o'tkazuvchi to'qima mukammalashuvi) o'zgarishlar. O'simliklar hayotiy formalarini xilma – xilligi. hozirgi yopiq urug'li o'simliklarni shakllanishdagi o'rni. Yopiq urug'li o'simliklarni kelib chiqishidagi tasavvur. Yopiq urug'lilarni evolyutsion sistemalari: A.Engler, Ch.Bessi, X.Gallid, A.L.Taxtadjan va boshqalar. Evolyutsion sistemaning tuzilishini asosiy kriteriyalari. Evolyutsion morfologik belgilar.

Gulli o'simliklar yoki yopiq urug'li o'simliklar, o'simliklar dunyosining eng yosh va keng tarqalgan guruhi bo'lib hozirgi geologik davrining hukmron o'simligi hisoblanadi. Ularning tuzilishi nihoyatda xilma-xilligi, turlarning ko'pligi, kishilar va hayvonlar hayotida tutgan o'rni bilan o'simliklarning boshqa guruhlaridan keskin farq qiladi. Tarixiy manbalarga qaraganda yopiq urug'li o'simliklarning dastlabki vakillari mezozoy erasining yura davrlarida paydo bo'la boshlagan. Keyinroq davrlar o'tishi bilan ular yer yuziga keng tarqala boshlagan. Yopiq urug'lilar o'zidan oldin paydo bo'lgan o'simliklarning morfologik tuzulishidan tubdan

o'zgarishi, tabiatga moslashishi va reproduktiv qismlar – gullarini mukammal hosil bo'lishi bilan ustun turadi.²³

Yopiq urug'li o'simliklarning keng tarqalishiga asosiy sabab, bu vaqtga kelib havoda quyuvq bulutlar kamayib havo namligi kamaygan, quyosh nuri erga ko'proq tushgan. Yalang'och urug'larning qurg'oqchilikka moslashgan igna barglardan boshqa vakillari nobud bo'lgan. Ular o'rniga tuzilishi va biologik xususiyatlari bilan yangi muhitda, ya'ni qurg'oq havoda yashashga moslashgan yangi yosh tip -yopiq urug'lilar keng tarqala boshlaydi, juda qisqa vaqt ichida ular biosferani egallab shu davrning hukmron o'simliklar guruhiga aylandi. Murakkab tuzilishga ega bo'lgan urug' ochiq urug'lilarda ikkinchi yili hosil bo'lsa, yopiq urug'lilarda hatto ikki uch haftada hosil bo'lishi mumkin.

Reproduktiv yoki generative organlarni murakkablanishi bilan birga yopiq urug'lilarda morfologik va anatomik o'zgarishlar ham sodir boadi.

Yopiq urug'lilar guruhiga 200.000 dan ortiqroq tur kiradi. Bu ochiq urug'lilardan 400 marta ko'proq ekanligini ko'rsatadi. Yalang'och urug'lilarning taxminan 500 turi ma'lum.

Yopiq urug'li o'simliklarning vakillari odam uchun oziq-ovqat, hayvonlarga yem-xashak, sanoat uchun xom-ashyo manbai hisoblanadi. Yer shari aholisining asosiy ovqati bug'doy, sholi, jo'xori, kartoshka; mevalardan olma, o'rik, uzum, qovun-tarvuz; texnik o'simliklardan g'o'za, zig'ir, lavlagi, shakar qamish va xilma-xil dorivor o'simliklar yopiq urug'li o'simliklarning vakillaridir.

Yopiq urug'li o'simliklarning ko'payib, yer yuziga tarqalishiga asosiy sabab, ularning yashovchanligi, qurg'oqchilikka tez moslasha olishidir.

Hozirgi vaqtda ochiq urug'li o'simliklar faqat daraxt va butalardan iborat bo'lsa, yopiq urug'li o'simliklarning turli vakillari mavjud. Shu bilan birga ular organlarida metamorfozalar ham mavjud.

Yopiq urug'lilar anatomik tuzilishi ham yalang'och o'simliklardan ustun turadi. Ular poyasida traxeyalar va suv naylari bo'ladi. Bu o'simliklar ildizdan suvni osonroq so'rishga va butlatishga yordam beradi. Bulardan tashqari yopiq urug'lilar quyidagi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi.

1. Yopiq urug'li o'simliklarning urug'i meva ichida bo'ladi, shuning uchun ham ular "Yopiq urug'li o'simliklar" deb ataladi.

2. Ularda otalik hamda mevacha (onalik)dan iborat gul bo'ladi. Ba'zi istisno e'tiborga olinmaganda, ularda gulqo'rg'on bor. Gullari juda xilma-xil shaklda bo'ladi.

3. Gullarning changlanishini va urug' hamda mevalarning tarqalishi har xil yo'llar bilan boradi, ya'ni shamol, hashoratlar, qushlar va suv yordamida changlanadi. Yopiq urug'lilarning qariyb 90% hashoratlar yordamida changlanadi.

4. Bu o'simliklar ikkilamchi urug'lanadi, buning natijasida faqat murtak emas, balki endosperm ham hosil qiladi.

5. Yopiq urug'lilarning urug' ko'rtagi urug'ga, tuguncha mevaga aylanadi va mevalar mevacha barglarining himoyasida etiladi.

6. Yopiq urug'li o'simliklar morfologik va anatomik jihatdan boshqa tipdagi o'simliklarga nisbatan juda ham murakkab tuzilgan.

Yopiq urug'lilarning nasllari changlanishda, yuqori o'simliklarning boshqalari singari, sporofit nasl hukmronlik qiladi. Ammo sporofit nasl yopiq urug'lilarda juda yaxshi taraqqiy etgan bo'lib qariyb individning hamma qismini tashkil etadi. Gametofit nasl nihoyatda reduksiyalangan bo'lib, sporofitdan ajralmagan holda gulda uning hisobiga taraqqiy etadi. Gametofit ayrim jinsli bo'ladi. Erkak gametofit changining o'sishdan hosil bo'lgan chang naychasi va uning ichidagi bitta vegetativ, ikkita spermii deb yuritiladigan xivchinsiz generativ

2. ²³ Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. Т. 1-2. – М.: «Мир», 1990.

yadrodan, urg'ochi gametofit esa urug'ko'rtakda joylashgan 8 ta yadroli mo'rtak xaltasidan iborat.

Yopiq urug'lilarda arxegoniy taraqqiy etmaydi.

Yopiq urug'lilarning kelib chiqishi hali juda aniq hal etilmagan. Lekin bu haqda turli xildagi fikrlar ma'lum. Masalan, ayrim olimlar yopiq urug'li o'simliklar urug'li paporotniklardan, boshqalar bennetit yoki gnetumlardan kelib chiqqan deb taxmin qiladilar. Biroq yalang'och urug'lilar bilan yopiq urug'lilar o'rtasidagi oraliq shakllar noma'lum.

Yopiq urug'lilarning kelib chiqishi masalasini hal etishda gulning kelib chiqishini hal etish kerak.

Gulni kelib chiqishi haqida asosan 2 ta nazariya mavjud.

1. Avstraliyalik olim Vetshteyn nazariyasi.

2. Nemis olimi G.Galir va ingliz olimlari A.N.Arber va D.Parken nazariyalaridir.

Vetshteyn nazarisiga ko'ra, gul aslida efedraga o'xshash yalang'och urug'lilarning o'zgargan va soddalashgan tupguldand iborat. To'pguldagi har bir otalik va onalik ayrim gul hisoblanadi. Bu nazariya psevdant yoki soxtagul nazariya deb ataladi. Bu nazariyaga muvofiq soddalashgan gullar ayrim jinsli, oddiy gulqo'rg'onli yoki gulqo'rg'onsiz bo'ladi.

Ikkinchi nazariya, bennetitlar topilib, fanga ma'lum bo'lgandan keyin, ya'ni 1905 yilda yaratiladi. Bu nazariyaga ko'ra yopiq urug'lilarni guli yalang'och urug'lilarga qarashli bo'lgan bennetitlar ajdodining ikki jinsli va o'zgargan qubyasi strobildan iborat. Biroq bennetitlar strobil-gullarida chin onalikni yo'qligini va mikroprofilining shoxlangan bo'lishi bilan chin guldand farq qiladi. Ikkinchi tomonidan, bennetitlarning strobili o'zining umumiy tuzilishi jihatidan yopiq urug'lilarning eng ibtidoiy vakili bo'lgan mangoliyaning guliga o'xshab ketadi. Arber va Parkinlar bennetitlar strobilining yuqorida tasvirlangan tuzilishini hisobga olgan holda, bennetitlar strobili guli bilan yopiq urug'lilar guli oraligidagi taxminiy, ya'ni gipotetik gulning tasviriy sxemasini yaratadilar.

Yopiq urug'lilar shimoldan janubga tomon ko'proq tarqala boradi. Mas: Frans Iosif Erida gulli o'simliklarning 37 turi, O'rta Osiyoning togli qismida 6.000 (tekislik va sahro qismida 600) turi o'sadi. Hindistonda 21.000 turi, Afrikada 13000, Braziliyada 40.000 turi uchraydi. Tropik zonalarda hammasi bo'lib, yopiq urug'lilarning 12.0000, subtropiqaa esa 60.000 ga yaqin turi o'sadi.

Keying ma'lumotlarga asoslanib A.Taxtadjyan hozirgi zamon oddiy formadagi yopiq urug'lilardan kelib chiqqan dastlabki joyi Sharqiy osiyodagi qadimgi materik – Katoziya deb hisoblaydi. Sernam tuproqlarda gulli o'simliklardan 80% ya'ni 120.000 ga taqin daraxt va bo'ta osimliklardan mavjudligi, shu hudud yopiq urug'lilar kelib chiqishidan boshlang'ich markazi ekanligini hisoblaydi.

Reproduktiv organlarning paydo bo'lishi:

Reproduktiv (generativ) organlar jinsiy ko'payish vazifasini bajaradi. Reprodukativ organlar evolyusion taraqqiyotdan turli xil pog'onalarida faqat ko'payish organi vazifasini bajargan. Aksaryat hollarda bir hujayralilardan bu organi faqat jinsiy ko'payish vazifasini o'taydi. Reprodukativ organlarda jinsiy jarayon mavjud bo'lgan barcha o'simliklarda hosil bo'lavermaydi. Xususan konyugat va diatom suv o'tlari hamda bazidiyoli zamburug'larda retrodukativ organlar yuq. Jinsiy ko'payishda ularning vegetativ hujayralaridan protoplasti qo'shiladi. Ular ko'pincha gallanib, sporalar orqali ko'payadi.

Organizmi jinsiy ko'payishi uchun xizmat qiluvchi organlarga generative yoki reprodukativ organlar deyiladi. Yuksak o'simliklarning ko'payish organi gul deb ataladi. Gul deganda changchi va urug'chi tushuniladi.

Poleobotanika ma'lumotlariga ko'ra, gulning qazilma qoldiqlari mezazoy erasidan yura davridagi qatlamlaridan topilgan. Gulning paydo bo'lishi haqida ham aniq va ko'pchilik

tamonidan isbot qilingan gipotezaga ega emasmiz. Gulning kelib chiqishi to'g'risida strobilyar va Evant nazariyalari mavjud.

Strobilyar nazariyasiga ko'ra, gul ninabargli o'simliklar qubbasini o'zgarishi natijasida vujudga kelgan deb qaraladi. Evant nazariyasiga ko'ra esa gul metamorfozlashgan (shakli o'zgargan) novda hisoblanadi. Ko'proq Evant nazariyasiga tayaniladi.

Gulli o'simliklarning klassifikatsiyasi.

Jon Reydan keyin, ya'ni 1682 yildan boshlab, to shu kungacha gulli o'simliklarni 2 sinfga: ikki pallali yoki ikki urug'lilar va bir pallalilar yoki bir urug'lilarga bo'lish qabul qilingan. Bir pallalilarning mo'rtagi, bir urug' bargli bo'lib, bosh ildizi tezda nobud bo'ladi. Uning o'rniga qo'shimcha popuk ildizlar taraqqiy etadi. Barglari parallel tomirlangan, guli ko'pincha oddiy gul qo'rg'onli bo'lib, gul qismlari doirada 3 tadan joylashgan bo'ladi.

Bu ikki sinf orasidagi farqlarni tubandagi jadvaldan yanada yaqinroq ko'rish mumkin.

№	Organlar	2 pallalilarda	1 pallalilarda
1.	Murtagi	Ikki urug'bargli	bir urug'bargli
2.	Urug'i	Enosperm yoki endosperimsiz	Endospermli
3.	Ildiz sis-si	O'q ildizli	popuk ildizli
4.	Nay tolalari to'plami	ochiq konsentrik joylashgan	yopiq tartibsiz joylashgan
5.	Kambiy	poyasi kambiyli yo'gonlasha oladi	kambiysiz yo'gonlasha olmaydi
6.	Barglari	har-xil shaklda, murakkab	oddiy, qirralari tekis, lentasimon
7.	Barg tomirlanishi	to'rsimon	parallel yoki yoysimon
8.	Gul tuzilishi va uning joylashishi	qo'sh gulqo'rg'onli 5-4 tadan bo'lib joylashgan ba'zan ko'p	gulqo'rg'oni oddiy, qismlari 3 tadan bo'lib joylashgan.

Umuman olganda har ikkala sinf ko'zga yaqqol tashlanadigan qator belgilarga ega. Bundan tashqari, bu sinf vakillari o'zaro vegetativ yo'l bilan ham jinsiy yo'l bilan ham hech bir chatishmaydi. Gul qismlarining joylanish qonuniyati, diagrammalari va formulalari.

Gul o'simliklarning turlariga, ularning biologiyasiga, gul a'zolarining joylashishiga qarab xilma-xil shaklda bo'ladi.

Ko'pchilik o'simliklarning gul qismlari doira yoki siklik ba'zi bir ajdodlarda esa birin-ketin spiral yoki asiklik shaklda joylashadi. Asiklik gullar magnoliyadoshlar, ayiqtovondoshlar oilasining vakillarida uchraydi.

Gul qismlarining joylashishida asiklik gullarning siklik gullarga o'tish hollarini ham uchratish mumkin. Bunday gullar chala doirali yoki gemisiklik gullar deb ataladi. Shu xildagi gul qismlarining ba'zi biri (kosachabarglar) doira, boshqalari esa (otalik va onaliklar) spiral holda o'rnashadi.

Gul qismlari karrali nisbatlar va doiraning gallashtirish qonuniyati asosida joylashadi.

Karrali nisbatlar qoidasi. Bu qoidaga muvofiq ikki pallali o'simlik gul doiralari ko'pincha 5, 4 va 2 qismli bo'ladi. Masalan: zig'ir o'simligining kosachabargi 5 ta, tojbargi 5 ta, otaligi 10 ta, meva bargi 5 ta.

Bir pallalilarda 3 qismli, masalan: lolada gultojbarglar 6 ta bo'lib, 2 qator joylashgan 3 + 3. Ootaligi 3 + 3 tadan, onalik uch meva bargdan iborat.

Gul diagrammasi va formulasi. Gulning sxematik tuzilishi, gul qismlarining bir-biriga bo'lgan nisbati diagramma va formulalarda yaqqol ko'rinadi. Gul tuzilishida gorizontaal yuzaning sxematik proeksiyasi diagramma deb ataladi.

Doiradagi gulning ayrim qismlari har-xil shartli belgilar bilan ko'rsatiladi. Diagramma ochilmagan gul g'unchasining ko'ndalang kesimiga qarab tuzilgan. Diagrammada gulqo'rg'on qismlari yoy shaklida ko'rsatiladi. Kosachabarglar sirtidan o'rtasiga tumorchasi bor yo'ylar bilan, tojibarglar tumorchasiz oddiy yo'ylar bilan ifodalanadi. Otaliklar ochilmagan changdonning ko'ndalang kesimi shaklida, onaliklar tugunchaning ko'ndalang kesimi shaklida ko'rsatiladi. Agar gul qismlari tutashgan bo'lsa ular birlashtiriladi. Diagrammalar 2 xil bo'ladi.


1. Empirik diagrammada to'la ochilgan va voyaga etgan gul tasvirlanadi.
2. Nazariy diagramma gulning tarixiy rivojlanishi hisobga olingan holda tuziladi.

GUL-FLOS

Gul o'simliklarning urchuvchi, ya'ni ko'payuvchi generativ organidir. Gul qisqargan novdadan tashkil topgan. Gulning o'rni va bandi qisqargan novda, gulning boshqa qismlari esa qiyofasini o'zgartirgan barg. Gulning hamma qismlari gul o'rniga joylashgan. Gul qiyofasini o'zgartirgan novda, barg ekanligini XVIII asrda nemis shoiri va tabiatshunosi Gyote aniqlagan.

Gul asosan quyidagi qismlardan tashkil topgan:

1. Gul bandi (*pedicilus*)
2. Gul o'rni (*torus*)
3. Gulqo'rg'oni (*pereantium*)
4. Kosacha (*calyx*)
5. Gul tojisi (*Carolla*)
6. 1 ta toj barg (*Sepalla*)
7. 1 ta kosachabarg (*Petula*)



Demak gul qismlari dastlab gul kurtagi ichida shakllanadi.

Gul kurtagi tashqi tomondan qiyofasini o'zgartirgan barglar bilan qoplangan. Gul kurtagina 2 ta tipi mavjud bo'lib, biri haqiqiy, ikkinchini aralashdir. Haqiqiy gul kurtagida hosil qismi bilan kurtak qoplamasi bo'lsa, aralash kurtak hosil qismi bilan boshlang'ich vegetativ novda mavjud bo'ladi. Gul yon bargi bilan gul orasidagi novda gul bandi deb ataladi. Gul bandining uchki qismi kengayib, gul o'rni - torus hosil qiladi. Gul o'rni turli o'simliklarda turlicha bo'ladi. Gul o'rni ayrim hollarda gulqo'rg'onning pastki qismi, changchi va urug'chilar bilan birga o'sib, o'ziga xos shakliga kirish, gipantiya deyiladi.

Gipantiy atirgullilar va ayrim dukkaklilarga xosdir. Gipantiy meva hosil bo'lishida ishtirok etadi.

Gul - steril va fertil (hosildor) qismlardan iborat. Steril qismiga - gulqo'rg'oni (kosacha va tojibarg) fertil qismiga (changchi va urug'chi) kiradi

Ba'zan gul qo'rg'oni oddiy bo'ladi. Gul o'rnida faqat kosacha yoki tojibarg joylashgan bo'lsa oddiy gulqo'rg'on deyiladi. Gul kosachasimonlarga otquloq, lavlagi misol bo'ladi. Gul tojsimonlarga lola, gulsapsar, marvaridgul kiradi. Kosacha bo'lsa, tojisi bo'lmaydi va aksincha. Gulning asosiy qismlari otalik va onaliklaridir.

6. Otalik

Otalik 3 qismdan tashkil topgan.

- a) otalik ipi
- b) changdon
- v) chang

7. Onaligi

1. Onalik og'izchasi
2. Onalik ustunchasi
3. Onalik tugunchasi

Gul qo'rg'oni faqat kosachadan tashkil topgan bo'lsa, kosachasimon gul (nasha, lavlagi, krapiva) bo'ladi.



Gul qo'rg'onida faqat gul tojisi bo'lsa, tojsimon gul (lola, gulsapsar, liliya) deyiladi.

Raflezya guli

Oddiy gul qo'rg'onida kosacha yoki tojbargi bo'ladi. Murakkab gul qo'rg'onida ikkalasi ham bo'ladi. Kosacha *Calex* - bu kosacha barglardan tashkil topgan. Kosacha barglar bir-biri bilan birlashgan, gulhayrisimonlilar, dukkakililar, yasnotkaguldoshlar birlashgan.

Ba'zi o'simliklarda kosacha barglar yaxshi rivojlanmaydi. Masalan: uzumda, selderguldoshlar oilasiga

kiradigan o'simliklarda esa, kosacha barg tukka aylanib ketgan bo'ladi. Kosacha barglar odatda bir qator doira bo'lib joylashgan bo'ladi. Ba'zi o'simliklarda esa kosachabarg 2-3 qator joylashgan. Masalan; atirgullilar oilasi, gulxayrisimonlar oilasida.

Kosachaning 2 va 3 chi qatoridagi barglari kosacha tagi bargi deb ataladi. Kosacha barglar odatda yashil rangli bo'ladi, ya'ni kosacha bargda xlorofill donachalari bor. Kosacha bargda fotosintez prosessi bo'lib turadi. Shuningdek kosachabarg gulning ichki qismini tashqi sharoitdan saqlab turadi. Ba'zi o'simliklarda kosacha barg gul ochilgandan so'ng tushib ketadi (lolaqizg'aldoq, ko'knori) ba'zi o'simliklarda barg uzoq saqlanadi. (olma, nok).

GUL TOJISI-COROLLA

Gul tojisi tojbarglardan tashkil topgan. Tojbarglar ham bir - biri bilan birlashgan yoki birlashmagan bo'ladi. Masalan: pechakgullilar oilasiga kiruvchi o'simliklarning tojbarglari birlashib ketgan, karamguldoshlar oilasida birlashmagan. Toj barglarning shakllari turlicha bo'ladi. Karamguldoshlar oilasiga kiradigan o'simliklarning toj bargi butsimon, astraguldoshlar oilasiga kiradigan o'simliklarning gul tojisi voronkasimon, chuchmomagullilar oilasiga kiradigan o'simliklarning gul tojisi qo'ng'iroqsimon, yasnotgullilar oilasiga kiradigan o'simliklarning gul tojisi labsimon, dukkakililar hamda binafshagullilar oilasida gul tojisi kapalaksimon. Gul toji har-xil rangda bo'ladi. Gul tojisining har-xil rangga bo'yalishi xujayra shirasidagi antosian, antoxlor pigmentlari hamda xromoplastdagi karotin va ksantofill pigmentlariga bog'liq. Antosian, xujayra shirasining nordonlik yoki ishkriy bo'lishiga qarab har xil rang beradi: Oq va qora rang beruvchi pigment bo'lmaydi. Antosian qizil, ko'k, binafsha ranglar, antoxlor va ksantofill sariq rang beradi. Karotin qizg'ish rang beradi. Gullarning oq bo'lishi quyosh nurining qaytarilishiga bog'liq. Qoramtir rang esa to'q qizil va to'q ko'k rangdan hosil bo'ladi. Ba'zan toj barglarning rangi o'zgarishi ham mumkin. Mas. Paxtaning gul tojisi avval sariq, so'ngra pushti rangga bo'yaladi. Gulning tojisi o'z hidi va rangi bilan hashoratlarni o'ziga jalb etadi. Hashoratlar esa o'simliklarni changlatadi. Kosacha va toj barglar gulning o'rnida doira bo'yicha to'g'ri joylashgan bo'lsa, to'g'ri gul-aktinomorf deyiladi. To'g'ri gulni bir necha barobar bo'laklarga bo'lish mumkin. Qiyshiq gulni esa, faqat 1 marta teng bo'lakka bo'lish (ajratish) mumkn.

To'g'ri gulni polisimmetrik qiyshiq gulni esa monosimmetrik deb ham yuritiladi.



Ba'zi o'simliklarning guli barobar qismlarga 1 marta ham bo'linmaydi. Masalan: Valeriana. Bunday gullarni asimmetrik gul deb yuritiladi.

Kosacha va toj barglar gulning eng kerakli qismi hisoblanadi. Gul qo'rg'oni bo'lmasligi ham mumkin. Masalan: qiyoyoq o't, tol, terak g'alladonli o'simliklar.

Gulning eng kerakli va ahamiyatli qismi - otalik va onaliklaridir. Otaligi:

Otaligi 3 qismdan iborat: Otalik ipi, changdon, chang.

Otaliklar ham bir biri bilan birlashgan yoki birlashmagan bo'ladi. Masalan: Murakkabgullilar oilasiga kiradigan o'simliklarning otaliklari hatto changdonlari bilan bir-biriga yopishib ketgan. Dukkaklilar, gulxayrisimonlilar oilasiga kiradigan o'simliklarning otaliklari iplari bilan bir-biriga yopishgan.

Gulxayrisimongullilar oilasiga kiradigan o'simliklarning otaligi juda ko'p bo'lib, otaliklarning hammasi bir-biri bilan yopishib ketgan. Bunday otaliklarni "bir guruhli" (odnobratstvennie) deyiladi.

Dukkaklilar oilasida otaligi 10 ta bo'lib, shundan 9 tasi bir-biri bilan birlashgan, 1 tasi birlashmagan. Bunday otaliklarni "ikki guruhli deyiladi". Lipa daraxtining otaligi "ko'p guruhli". Onaligi:

Onalik 3 qismdan tashkil topgan: Onalikning pastki kengaygan qismi-onalik tuguni, tugundan onalik ustuni o'sib chiqadi. Onalik ustunining yuqori tomonida og'izcha bo'ladi. Ba'zi o'simliklarning onalik ustunchasi bo'lmaydi. Masalan: ko'knorida. Bunda onalik og'izchasi tugunchaga yopishgan bo'ladi. Onalik tugundan esa meva hosil bo'ladi. Shuning uchun mevaning ichida urug' bo'ladi. Onalik tuguni 1,2,3 yoki ko'p xonalik bo'lishi mumkin. Gulda onaliklar ko'p bo'lib, birlashmagan bo'lsa, apokarp, birlashib ketgan bo'lsa, senokarp deyiladi. Masalan: ayiqtovon, qulupnay o'simliklarining onaligi apokarp: lola, gulsafsarda senokarp. O'simlik gullarida ham otalik ham onaliklari bo'ladi, buni 2 jinsli deyiladi. Gulda otalik yoki faqat onaligi bo'lsa, bir jinsli deyiladi. Bir jinsli gullar bitga o'simlikda bo'lsa, buni bir uyli o'simlik deyiladi. Masalan: jo'xori, qarag'ay.

Agar otalik gullari bir o'simlikda, onaliklari esa 2 bir o'simlikda bo'lsa, buni 2 uyli o'simlik deyiladi. Masalan: Tol, nasha, ba'zi o'simliklar 3 uyli ham bo'ladi. Bularda, 1-sida otalik gul, 2-sida onalik gul, 3-sida ham otalik ham onalik bo'ladi. 3 uyli o'simliklarga chinni gullilar oilasiga kiruvchi o'simliklar misol bo'ladi. Agar bir o'simlikda ham otalik ham onalik guli, hamda 2 jinsli guli bo'lsa, bunday o'simliklarni poligam o'simliklar deyiladi. Masalan: qovun, kungaboqar va boshqalar.

Gulning qismlari gul o'rnida doira bo'ylab joylashgan bo'lsa, sikliq agar gul qismlari gul o'rnida baland-past joylashgan bo'lsa, asiklik gul-spiral gul deyiladi. Gulning kosachasi va toj barglari doira bo'ylab joylashib, faqat otalik va onaliklari bilan baland - past joylashgan bo'lsa, yarim spiral-gemesiklik gul deyiladi.

Doira bo'ylab joylashgan gulga lola, spiral gulga magnoliya, gamesiklik gulga ayiqtovon misol bo'ladi.

Changdondan chiqqan chang donachalarining urug'chining tumshuqchasiga tushushiga changlanish deb ataladi. O'simliklar olamida o'zidan changlanish va chetdan changlanishi mavjud. Bitta gulning changi aynan shu gul urug'chisining tumshuqchasiga kelib tushushiga o'zidan changlanish deyiladi. O'zidan changlanuvchi o'simliklarning guli odatda ko'rimsiz va hidsiz bo'ladi. O'zidan changlanish salbiy xodisa hisoblanadi.

Bir o'simlikning chang donachalarini boshqa o'simlik urug'chisining tumshuqchasiga tushishi chetdan changlanish deyiladi.

O'simliklarning chetdan changlanishda shamol va hashoratlar yordamida changlanishi muhim rol o'ynaydi. Chetdan changlanish ijobiy hisoblanadi. Shamol yordamida changlanishga anemofiliya (yunoncha: «anemos» - shamol, «fileo» - hoxlamoq) deyiladi. Bunga yong'oq, terak makkajo'xori, eman, kanop va qand lavlagilarning changlanishini misol qilishimiz mumkin. Bunday gullar mayda va changlari engil bo'lib, uzoq joylarga tarqalishi mumkin (2 km gacha). O'simliklarning hashoratlar yordamida changlanishi entomofiliya (yunoncha. «entomon» - hashorot, «fileo» - sevaman) deb ataladi. Bunday gullar yirik toj bargi uzoqdan ko'zga tashlanadigan, nektarlari esa sershira suyuqlik chiqaradi.

Changlanishda toj barglarning ahamiyati juda katta hisoblanadi.

GUL FORMULASI VA DIAGRAMMASI

- Bir yillik o'tli o'simlik -
- 2 yillik o'tli o'simlik -
- Ko'p yillik o'tli o'simlik -
- Daraxt va butalar -
- To'g'ri gul aktinomorf -
- Qiyshiq gul zigomorf -
- Bir jinsli otalik gul - Mars -
- Bir jinsli onalik gul-Venera -
- 2 jinsli gul -
- K yoki Ca-kosacha bargi-
- C yoki Co-toj bargi-
- A-otaligi-
- G-onaligi-

Kosacha, toj barg, otalik va onaliklarning soni raqam bilan ko'rsatiladi. Agar ular birlashib ketgan bo'lsa, raqam qavs ichiga olib qo'yiladi. Ularning soni 10 tadan 12 tagacha bo'lsa, raqam ko'rsatiladi. Undan ko'p bo'lsa, cheksiz alomati qo'yiladi.

Onalik tuguni yuqorida joylashgan bo'lsa onalik sonining pastiga chizib qo'yiladi. Agar onalik tuguni pastda joylashgan bo'lsa, onalik sonining yuqorisiga chiziq qo'yiladi.

Gul qo'rg'oni oddiy bo'lsa, R harfi qo'yiladi. + Ca₄ Co₄ A₄₊₂ U₍₂₎ - karamgullilar - rediska, turup, karom gullarining formulasi + Ca₍₅₎ Co₅ AU₍₃₋₅₎ g'o'za gulining formulasi. + Ca₅ Co₅ A U -Ayiqtovongullilar: sedana, ayiqtovon.

Ko'pchilik o'simliklarning guli bir nechta bo'lib gul to'plamlarini tashkil etadi. To'p gullarning shakllari bir necha xil bo'ladi:

1. Shingil.

Shingilga o'xshash gul tuplarida gulning o'qida pastdan yuqoriga qarab gullari ochiladi. Pastki gullarning bandi yuqori gullarnikiga nisbatan bir oz uzunroq bo'ladi. Masalan; butasimon gullilar oilasi: jag'-jag', supurgi o't, gorchisa.

2. Qalqonsimon to'p gul. Qalqonsimon to'pgullar bir sathga joylashgan bo'ladi. Chunki ularning gul o'qidagi pastki gullari uzun bandli, yuqoridagi gullari esa qisqa bandli bo'ladi. Xulosa qilib aytganda gul o'qidan o'sib chiqqan gullar bitta sathni egallaydi: olma, do'lana, nok.

3. Oddiy boshog. Oddiy boshog shingilga o'xshash tupgul. Lekin uning gullari gul o'qida bandsiz joilashgan bo'ladi, masalan; zupturum, qayoq o't.



4. Murakkab boshqoq-

Bunda gullarning asosiy o'qi tarmoqalanib ketadi. Asosiy o'qining tarmog'ida ayrim boshqoqlar joylashgan bo'ladi. Masalan. Bug'doy, arpa, so'li.



5. Oddiy soyabon.

Oddiy soyabonda gul o'qining yuqori tomonidan barobar bandli gullar o'sib chiqib, 1 ta sathni egallaydi. Masalan; olcha, piyoz, chesnok.



13-rasm. Sabzi gulining murakkab soyaboni.

6. Murakkab soyabon.

Bunda asosiy gul o'qidan qo'shimcha gul o'qchalar o'sib chiqadi. Bu gul o'qchalarda barobar bandli gullar joylashgan. Masalan; sabzi, ukrop, kashnich.

7. Supurgi boshqoq. Bu tarmoqlanib ketgan shingildan iborat. Masalan: uzum, siren, sholi, tariq, makkajo'xorining otalik guli.

8. So'ta. So'tada gul o'q yo'g'on bo'lib, yaxshi taraqqiy etgan, gullar esa gul o'qiga bandsiz joylashgan. So'tani qoplag'ich barglari o'rab olgan.

9. Boshcha. Boshchada gulining uchi kengaygan bo'lib, bandsiz, gullari zich joylashgan bo'ladi. Masalan. yovvoyi beda-klever

10. Savatcha.

Bunda gullar savatchaga to'plangan bo'ladi. Ularda gullarning uchi tarelka yoki plastinkaga o'xshab o'sgan bo'ladi. Gullar shu gulning o'qiga bandsiz o'rnavgan. Masalan: astragullilar oilasi-qoqi o't, romashka.



11. Kuchala. Kuchalada gul o'qi ingichka bo'ladi. Gullar gul o'qiga bandi bilan joylashgan bo'lib, pastga qarab osilgan bo'ladi. Masalan: yong'oq, tol.

Tibbiyotda ko'pchilik o'simliklar gullaridan foydalaniladi. Binobarin boychechak o'simligining guli tomoq og'riqlari kasalliklarini davolashda; yapon saforasi o'simligining gulidan vitamin P (rutin) olishda foydalaniladi.

Tirnoqgul o'simligining guli bo'yoq tayyorlashda ishlatiladi. Ba'zi bir mamlakatlarda o'simlik g'unchalari sabzavot sifatida foydalaniladi. Gulidagi nectar asal olishda (grechixa lipa kabi o'simliklar) olishda ahamiyatga ega.

Nazorat savollari

1. Yopiq urug'li o'simliklarga umumiy tasnif.
2. Yopiq urug'lilar qanday kelib chiqan?
3. Bir va ikki pallali o'simliklarni farqi nimada?
4. Gul tuzilishini izohlab bering?
5. gultojibarglarining ahamiyati?
6. To'pgullarning xillari?

Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o'quv qo'llanmalar ro'yxati

1. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. – T.: O'zbekiston, 2005.- 435 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A., Samatova SH. O'simliklar sistematikasidan amaliy mashg'ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
4. Ahmedov O'.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elaktron darslik.-T.: 2008.
5. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –
6. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
7. Hamidov A., Nabiev M.M. “O'zbekiston o'simliklarini aniqlagichi”.-T.: 1987.-235 b.
8. Василев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “ Высшая школа ”, 1988. -435 с.
9. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O'.A. va boshqalar. Dorivor o'simliklarning lotincha-o'zbekcha-ruscha-arabcha va forscha-tojikcha lug'ati.-T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
10. Berezovskaya T.P., Dmitruk S.E., Grishinna e.I., Belousov M.V. Основы farmatsevticheskoy botaniki. – Tomsk: Pechatnaya manifaktura, 2004.-294 s.
11. Xolmatov X.X., Ahmedov O'. A. Farmakognoziya. 1-2 qism. – T.: “Ibn Sino” nashiryoti, 2007.- 806 b.
12. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. Т. 1-2. – М.: «Мир», 1990.

MA'RUZA – 13

Changlanish va otalanish. Meva, to'p meva va urug' tuzilishi.

Ma'ruzaning maqsadi:

Changlanish va otalanish haqida tushuncha. Mevani hosil bo'lishi. To'pmeva va urug' tuzilishi to'g'risida tushuncha berish.

Reja:

1. Changlanish va otalanish haqida tushuncha.
2. O'z-o'zidan va chetdan changlanish.

3. Mikrosporogenez va makrosporogenezni taraqqiy etishi va rivojlanishi.
4. Urug'lanish.
5. Gulli yoki yopiq urug'li o'simliklar.
6. Yopiq urug'li o'simliklar urug' kurtagining tuzilishi
7. Yopiq urug'li o'simliklarning qo'shaloq otalanishi.
8. Meva hosil bo'lishi.
9. Meva xillari.
10. Oddiy meva va murakkab meva.
11. To'p meva.
12. Urug'.
13. Urug'ning hosil bo'lishi va fiziologiyasi.
14. Urug'larni tuzilishi va tiplari.
15. Urug'ning unib chiqishi.

Tayanch iboralar: *Megasporogenez. Megasporalar. Bola qopchig'i embrion xaltasi, changlanish va otalanish (urug'lanish). O'z – o'zidan va chetdan changlanish. Chetdan changlanish tiplari: entomofil va anemofil changlanishlar. O'z – o'zidan va chetdan changlanishga moslanishlar: dixogamiya, geterostiliya va boshqalar. Kleystogamiya, geterostiliya va qo'shaloq urug'lanish. Urug'ni hosil bo'lishi, endosperm va uning tuzilishi. Gulning kelib chiqishidagi asosiy qonuniyatlar: evant, psevdant nazariyalari. Gul to'g'risida yangi tushunchalar. Gul evolyutsiyasining asosiy yo'nalishlari. Bir va ikki pallali o'simliklarning gullarini farqlari.*

CHANGLANISH- OTALANISH (chang tuzilishi)

Changning otalik changdonidan onalik og'izchasiga kelib tushishi changlanish deyiladi. Changlanishi 2 xil bo'ladi:

1. O'z - o'zidan changlanish-Avtogamiya
 2. Chetdan changlanish-Ksenogamiya
O'z-o'zidan changlanish, bu jarayon quyidagicha kechadi.
 - 1) Avtogamiya - urug'chining tumshuqchasiga shu gulning changdonidan chiqqan chang tushadi. Bunday changlanish asosan 2 jinsli gullarda o'tadi.
 - 2) Geyterogamiya - bir o'simlik individum o'rtasida bo'ladi, ya'ni bir gul changdonidan chiqqan chang shu o'simlik individumidagi ikkinchi gulning tumshuqchasiga tushadi.
 - 3) Kleystogamiya - bunda gul ochilmasdan oldin, ya'ni yopiqlik paytida changlanish bo'ladi. Kleystogam gullarni binafsha (viola), eryleng'oq (Arachis), arpa (Hordeum) o'simliklarida ko'rish mumkin.

Buyuk biolog Charlz Darvin o'zining 27 yil mobaynida o'simlik gulining tuzilishini o'rgandi. Ch.Darvin changlanish usullarini tekshirib ko'rdi. Darvin o'simliklarning o'zidan changlanishi tabiatda ozroq bo'lishi, chetdan changlanish esa ko'proq bo'lishini ko'rdi. Darvin o'simliklarning o'zidan changlanishida hosili sog'lom bo'lmasligini, chetdan changlanishda hosili sog'lom va o'zgaruvchan bo'lishini ta'kidlab o'tadi. Ivan Vladimirdorovich, Michurin o'simliklarning chetdan changlanishini evolyutsiya taraqqiyot davrida progressiv faktor deb hisobladi. O'zidan changlanuvchi o'simliklarga: arpa, bug'doy, nuxat, loviya, so'li, tariq, pamidor, g'o'za, zig'ir kiradi. Bu o'simliklar ba'zan chetdan ham changlanib turadi. Ba'zan paxta, zig'ir 3-5% chetdan changlanadi. Ba'zida ularda chetdan changlanish 50% gacha boradi.

Faqat o'zidan changlanuvchi o'simliklar juda kam uchraydi. Bularning gullari mayda, ko'rimsiz va ochilmaydigan bo'ladi. Bunday gullarni kleystogam gullar deyiladi. Masalan: Eryong'oq (Arachis), arpa (Hordeum). Yeryong'oqning er ustidagi gullari hosil bermay, tuproq ostki kleystogam gullari hosil beradi. Binafsha (viola) ning bahorgi chiroyli gullari hosil bermaydi. Yozgi ko'rimsiz gullari esa hosil beradi, o'zidan changlangan bo'ladi. (Fabaceae) Dukkaklilar oilasidagi ba'zi o'simliklarning - loviya, nuxat g'unchalik vaqtida o'zidan

changlanadi. Arpa, bug'doylarning ham gullari qinli barglardan ochilmasdan turib changlanib qo'yadi. O'simliklarning ko'pchiligi odatda chetdan changlanadi. Shu jumladan 2 jinsli gullar ham chetdan changlanadi. Chunki bu gullarda otalik-onalıkları bo'lsa ham ular bir vaqtda voyaga etmaydi. Bunday hodisani dixogamiya deyiladi. (*dixo-ayrim*). Ba'zan o'simliklarning otaligi oldin etishadi. Bunday o'simliklar protandriya deyiladi. (protos-oldin, gandriya-mujchina). Bularga astradoshlar (Asteraceae), chinniguldoshlar (Caryophyllaceae), yasnotkaguldoshlar (Lamiaceae) oilasiga kiruvchi o'simliklar misol bo'ladi.

O'simliklarda otaliklaridan oldin onalıkları etishish xodisasi ham bo'ladi. Bu protogoniya deyiladi, karamguldoshlar (Brassicaceae), atirguldoshlar (Roseaceae), zirkdoshlar (Berberidaceae). Ba'zi o'simliklarda otalik onalıkları baland past joylashgan bo'ladi, bular geterostiliya deyiladi. Masalan: primula (Primula), grechixa (Fagopyrum). Shuningdek ba'zi o'simliklarning otalik changi onaligi uchun zaharli hisoblanadi. Buni orxid deb ataluvchi tropik o'simliklarda ko'ramiz. Qora bug'doy o'simligining otalik changi onaligini changlata olmaydi. Shuning uchun ham ko'pchilik o'simliklar chetdan changlanadi. Chetdan changlanish 2 narsa ishtirokida bo'ladi:

1. Shamol -Anemofil
2. Hashoratlar yordamida -Entomofil

Ba'zi o'simliklar, mayda qushlar, mayda hayvonlar yordamida changlanadi. Hashorotlar yordamida changlanishni entomofiliya deyiladi. Entomofil o'simliklarning guli yaxshi rivojlangan, ko'pincha tupgullarga birlashgan bo'ladi. Gultoj barglari yaqqol ko'zga tashlanadi. Ranglari: oq, pushti, sariq, ko'k qizil. Gullarida nektar bezlari yaxshi rivojlangan, changlari yirik tukli, yopishqoq bo'ladi. Urik, gilos, shaftoli, anjir, nok kabi daraxt o'simliklar hashoratlar yordamida changlanadilar. Masalan: tropik mamlakatlarda ba'zi o'simliklar va mayda daraxtlar kalibri degan kichkina qush yordamida changlanadi. Avstraliya o'rmonlaridagi o'simliklar olmaxonlar yordamida changlanadi. O'simliklar suv yordamida ham changlanadi. Bunday changlanish gidrofiliya, o'simliklar esa gidrofil o'simliklar deyiladi. Suvda o'sadigan elodeya, valisneriya o'simliklari suv yordamida changlanadi. Bularning changlarining po'sti bir qavat, changni tashqi qavatida ekzina bo'lmaydi. Changning shakli ipsimon. Changning solishtirma og'irligi suvning solishtirma og'irligi bilan teng. Shamol bilan changlanadigan o'simliklar anemofil o'simliklar, changlanish esa anemofiliya deb ataladi. Anemofil o'simliklarning gullari ko'rimsiz, mayda va ko'pincha kuchala tupgulga birlashgan. Nektar bezlari yo'q. Shamol yordamida changlanuvchi o'simliklarga ochiq urug'li o'simliklardan: archa, qarag'ay, yopiq urug'li o'simliklardan: terak, tol, yong'oq, nasha, jo'xori kiradi. Masalan: qand lavlagining otalik changi shu qadar engilki 2000 m balandlikka ko'tarila oladi. Shamol yordamida changlanuvchi o'simliklarning changlari juda ko'p bo'ladi va kichikroq bo'ladi. Masalan: o'rmon yong'og'ining 1 ta otalik gulining kuchalasida 4 mln. chang bo'ladi.

1 ta jo'xorining otalik tup gulida 50 mln. chang bo'ladi.

Shamol yordamida changlanuvchi o'simliklarning gul to'plamlari, otalıkları, tebranib turadi. Onalik og'izchasi ham katta bo'ladi. O'simliklarning ko'pchilik qismi hashoratlar yordamida changlanadi. Gulli o'simliklarning 9/10 qismi hashorat, 1/10 qismi shamol yordamida changlanadi. Hashoratlar yordamida changlangan o'simliklarning gullari katta, chiroyli, hidli bo'ladi. Ko'knori, gulsafsar, beda, mevali daraxtlar. Hashoratlar yordamida changlanuvchi o'simliklar gullarida shira ishlab chiqaradigan nektarniklari bor. Bo'lar shirani ishlab chiqaradigan nektar deyiladi. Uning tarkibida 25-90% suv, 3-72% saxaroza, glyukoza bo'ladi. Bulardan tashqari hashoratlar o'simlik changidan oziqlanadi. Masalan: asalari chang bilan lichinkalarini boqadi. Hashoratlar yordamida changlanuvchi o'simliklarda nektarning qaerda bo'lishini ko'rsatuvchi belgilari bor. Masalan: gulsafsarning toj bargida sariq tukchalar, lola, lolaqizg'aldoq ko'knorini tojbargida qora dog'lar bor.

OTALIK CHANGINING TARAQQIY ETISHI VA RIVOJLANISHI MIKROSPORAGENEZ

Otalik changi changdoni ichida; changdonning epidermisida, ya'ni subepidermal qavatida bo'lgan meristemaning ba'zi bir hujayralari boshqalariga nisbatan kuchliroq taraqqiy etgan bo'ladi. Bu hujayralar birlamchi arxesoralar deyiladi. Birlamchi arxesoralar kariokinez yulida 2 marta bo'linib ko'payib 4 ta xujayrani hosil qiladi. Hosil bo'lgan xujayralarning 2 tasi fibroz, 3-si tapetum, 4-si ikkilamchi arxespora deb ataladi. Ikkilamchi arxesoralarining xujayrasi reduksion yo'lda bo'linib, 4 ta qiz xujayrani hosil qiladi. Bu 4 ta xujayrani tetrada deyiladi. Tetradaning har bir xujayrasi rivojlanib changga aylanadi. Chang 2 qavat pust bilan o'ralgan. Tashqi qavati ekzina, ichki qavati intina. Ekzina qalin bo'ladi. Intina yupqa bo'ladi, sellulozadan tashkil topgan. Changning ichida 2 ta yadro vegetativ va generativ yadro bo'ladi. Generativ yadrodan ikkita spermiy (otalik gametalari) hosil bo'ladi. Vegetativ hujayradan chang naychasi o'sib spermiylarning mo'rtak xaltachasiga etib borish yo'li hisoblanadi.

Onalik embrion xaltachasining rivojlanishi va tuzilishi MAKROSPORAGENEZ

Onalik tugunining subepidermal qavatida meristemadan birlamchi arxespora hosil bo'ladi. Birlamchi arxespora 2 marta bo'linib, 4 ta xujayra hosil qiladi. Birlamchi arxespora 2 marta bo'lingandan 4 ta hujayra hosil bo'lgandan so'ng hujayralarning yuqoridagi 2 tasi pariental qavat, 3 - chisi tapetum, 4 - si 2 - lamchi arxespora deyiladi. 2 -lamchi arxespora reduksion yo'lda ko'payadi. Natijada 4 ta qiz hujayra - tetrada hosil bo'ladi. Tetradaning 3 tasi nobud bo'ladi, 1 tasi rivojlanadi. Tetradaning 1 ta hujayrasining yadrosi 3 marta bo'linadi. Natijada bu hujayrada 8 ta yadro hosil bo'ladi. Yadroning 4 tasi hujayraning shimol qutbida, 4 tasi janub qutbida joylashadi. Yuqoridan 1 tasi o'rta tushadi. Pastdan ham 1 tasi o'rta tushadi. Bu yadrolar qo'shiladi. Bu qo'shilgan yadrolarni bola qopchig'ining markaziy yadrosi yoki ikkilamchi yadro deyiladi.

Yuqorida qolgan 3 ta yadroning 1 tasini tuxum xujayra, qolgan 2 tasini sinergida deyiladi. Pastdagi 3 tasini esa antipodalar deyiladi. Demak, yetilgan bola qopchig'ida 7 ta yadro bo'ladi.

Makrosporagenez- urug'kurtak ichida murtak xaltachasi joy oladi va bu yerda urug'lanish sodir bo'ladi. Urug'kurtak kichik bo'rtmachalar shakldagi meva bargchalardan boshlanadi. Bunda dastlab nutsellus, keyin ichki, so'ngra tashqi integument qoplag'ichlar vujudga keladi. Nutsellusning shakillanishida epidermis ostidagi eng yirik hujayradan biri meyoza bo'linishi natijasida to'rtta yirik gaploid xramasomali makrospora vujudga keladi. Ulardan uchtasi keyinchalik nobud bo'ladi va qolgan bittasidan murtak xaltachasi rivojlanadi.

YOPIQ URUG'LI O'SIMLIKLAR URUG' KURTAGINING TUZILISHI

Urug' kurtagi quyidagi qismlardan tashkil topgan.

1. Urug' kurtagining bandi-funikulus
2. Urug' kurtagining krplogich tuqimasi-intugument.

Odatda intugument 2 qavat bo'ladi. Tashqi va ichki intugument. Intugumentning yuqorisi ochiq bo'ladi. Bu ochiq qolgan joyni changni kirish yo'li, yoki mikropile deyiladi. Urug' kurtakning ostki qismi, ya'ni funikulusga o'tish joyi esa xalaza deyiladi.

3. Urug' kurtagining asosiy to'qimasi-nutsellus.
4. Bola qopchig'i.


Urug' kurtagining o'sib chiqqan joyini plasent deyiladi. Onalik tugunida urug' kurtagi 1 tadan bir nechta minggacha bo'lishi mumkin. Bunda changlanish va otalanish prosessi bo'lib o'tgandan so'ng urug' kurtakdan urug' hosil bo'ladi. Onalik tuguni ichida urug' kurtagi to'g'ri, qiyshiq yoki teskari joylashgan bo'ladi.

To'g'ri joylashgan urug' kurtakni atrop deyiladi. Bunda mikropile funikulusining qarama-qarshi tomoniga joylashgan. Buni astraguldoshlar oilasiga kiruvchi o'simliklarda ko'ramiz. Urug' kurtak qiyshiq joylashgan ham bo'ladi. Bunda urug' kurtak 90° ga aylangan.

Qiyshiq joylashgan urug' kurtakni kampilotrop deyiladi. Bunda mikropile funikulusning yon tomonidan joylashgan. (karamguldoshlar, chinigullilar). Onalik tugunida urug' kurtak teskari joylashgan bo'lsa anatrop deyiladi. Teskari joylashgan urug' kurtak 180° ga burilgan. Mikropile funikulusining yoniga joylashgan. Masalan: bug'doy, paxtaning urug' kurtagi, anatrop ko'p uchraydi.

YOPIQ URUG'LI O'SIMLIKLARNING QO'SHALOQ OTALANISHI.

HOW FLOWERING PLANTS REPRODUCE



Chang onalik og'izchasiga tushgandan so'ng changning ichki po'sti intinadan chang trubkasi o'sib chiqadi. Changning vegetativ yadrosi changning trubkasini o'sishiga yordam beradi.

Chang trubkasi bola krpchigiga usib kirgach vegetativ yadro erib ketadi. Benerativ yadro esa chang trubkasida bo'linib, 2 ta spermiya hosil qiladi. Bu spermiyalar bola qopchig'iga kirib, 1 tasi bola qopchig'idagi tuxum xujayra bilan, 2 - si esa bola qopchig'idagi 2 - lamchi markaziy yadro bilan qo'shiladi. Bu tipdagi otalanish – qo'shaloq otalanish deyiladi. Qo'shaloq otalanishni 1898 yili rus olimi Navashin topgan. O'talanish prosessi bo'lib o'tgandan so'ng tuxum xujayradan urug'ning embrioni vujudga keladi. Bola qopchig'ining 2 - lamchi markaziy yadrosidan esa urug'ning endospermasi hosil bo'ladi. Urug' kurtagining qoplovchi to'qimasi - intugumentdan urug'ning pusti hosil bo'ladi.²⁴

MEVA- Fructus

1. ²⁴ Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. – T.: O'zbekiston, 2005.- 435 b.

Changlanish va otalanish prosessi natijasida onalik tugunidan meva, urug' ko'rtagidan esa urug' rivojlanadi. Onalik tugunining o'zidan hosil bo'lgan mevaga chin meva deyiladi (olcha, shaftoli). Ba'zan mevalarning hosil bo'lishida onalik tugunidan tashqari gul o'rni yoki kosacha bargi ishtirok etsa soxta meva deyiladi. Masalan: olma, o'rik, nok, qulupnay, tarvuz, qovun. Meva qati tugunchaning devoridan hosil bo'lib, uch qavatga ega:

1. Ekzokarp
2. Mezokarp
3. Endokarp

Agar meva 1 ta onaliqaan hosil bo'lsa oddiy meva deyiladi. Masalan: Shaftoli, o'rik. Meva bir necha onaliklardan hosil bo'lsa, murakkab meva deyiladi. Masalan: maymunjon, ayiqtovon. Ba'zi o'simliklarning mevasi bir qancha gullarining onaliklaridan hosil bo'lsa tup meva deyiladi. Masalan: tut, anjir, lavlagi mevasi.

Mevalar tarkibidagi suvning miqdoriga qarab 2 ga bo'linadi. Quruq mevalar va ho'l mevalarga. Quruq mevalar tarkibida 10-15 %, ho'l meva tarkibida 70-90 % suv bo'ladi.

Quruq mevalar 2 ga bo'linadi.

1. Pishganda ochiladigan quruq mevalar

2. Pishganda ochilmaydigan quruq mevalar. Pishganda ochilmaydigan quruq mevalar:

1. Doncha-bir urug'li meva bo'lib, urug' mevasiga yopishib ketgan. Masalan: Bug'doy, sholi, arpa, jo'xori.

2. Pista-bir urug'li, pishganda ochilmaydigan quruq meva bo'lib, mevasi urug'ga yopishmagan. Masalan: qoqio't, kungaboqar, qiyoc o'tlarining mevasi.

3. Qo'shaloq pista - Selderguldoshlar oilasiga kiruvchi o'simliklarning mevasi: Masalan: sabzi, o'krop, kashnich, petrushka.

4. Qanotli pista-bunga manzarali daraxtlar - zarang, qayrag'och, qayinlarning mevasi.

5. Yong'oq bir urug'li pishganda ochilmaydigan quruq meva, urug'i mevaga yopishmagan bo'ladi. Mevasi yog'ochlangan toshsimon xujayradan tuzilgan. Masalan: o'rmon yong'og'i, nasha, dubning mevasi, kashtanning mevasi.

Pishganda ochiladigan quruq mevalar:

1. Bargcha.

Bir xonali, ko'p urug'li, pishganda bir tomoni bilan yorilib ochiluvchi meva. Masalan: ayiqtovon, parpi, sedana.

2. Dukkak-bob.

Bir urug'li, asosan ko'p urug'li, ba'zan 1 yoki 2 urug'li, pishganda har 2 tomoni bilan yorilib ochiladigan quruq meva. Masalan: dukkaklilar oilasiga kiruvchi o'simliklar: mosh, nuxat, loviya, beda, yeryong'oq, akasiya.

3. Qo'zoq - qo'zoqcha.

Ikki xonali, ko'p urug'li, pishganda har tomoni bilan yorilib, pastdan yuqoriga ochiluvchi quruq meva. Qo'zoqning bo'yi enidan 4 va undan ortiq marta katta. Qo'zoqchanning bo'yi eni bilan barobar bo'ladi, yoki sal kattaroq bo'lishi mumkin. Masalan: Karamdoshlar oilasi (Brassicaceae) Qo'zoq - karam, sholg'om, rediska. Qo'zoqcha-jag'-jag'.

4. Ko'sak.

Bir xonali yoki ko'p xonali, hamma vaqt ko'p urug'li, pishganda har xil usullar bilan ochiluvchi quruq meva. Masalan: G'o'za, ko'knori, gulsafsar, bangidevona, mingdevona, choy, xina.


Xo'l mevalar ham 2 ga bo'linadi: 1. Danakli xo'l mevalar.

2. Danaksiz xo'l mevalar.

Danakli mevalar bir urug'li bo'lib, mevasining ichki qavati, toshsimon xujayradan tuzilgan.

1. Ekzokarp-tashqi.
2. Mezokarp-o'rta.
3. Endokarp-ichki.

Danaksiz mevalar ko'p urug'li bo'ladi. Masalan: uzum, anor, qovun, tarvuz, pamidor.



URUG'. URUG'NING UNIB CHIQISHI VA TUZILISHI.

Urug' o'simlikning jinsiy ko'payishi natijasida hosil bo'lib, nasl tarqatishda xizmat qiladi. Urug' asosan urug'lanish jarayonidan so'ng hosil bo'ladi. Lekin ayrim hollarda urug'lanish sodir bo'lmay ham urug' hosil bo'lishi mumkin (apomiksis).


Urug'da oziq moddalar, nasl murtagi va ularni himoya qilish uchun o'rab turgan alohida qobig'i bo'ladi.

Sporaga nam tegishi bilan o'simlik o'sib chiqadi.

Lekin urug' ma'lum bir tinim davrni o'tmay turib ko'karib chiqmaydi. Urug' sporaga nisbatan ishonchli universaldir. Taraqqiyot natijasida endosperm ham rivojlanadi, lekin murtakning kattalashishi natijasida oziq moddalar murtakning o'zida tuplanib endosperm qisqaradi, hatto reduksiyaga uchrashi ham mumkin.

Urug' onalik tugunidagi urug' kurtakdan hosil bo'ladi. Urug' kurtakning qoplag'ich to'qimasi intugumentdan, urug'ning po'sti, bola qopchig'idan urug'ning endosperma to'qimasi, tuxum hujayradan urug'ning urug' embrioni hosil bo'ladi. Bir pallalilar sinfiga kiruvchi o'simliklarning urug' pallasi 1 ta, 2 pallali o'simliklar sinfiga kiruvchi o'simliklarning urug' pallasi 2 ta bo'ladi. Bir pallali va ba'zi bir 2 pallali o'simliklar (sabzi, zig'ir, nasha, kanakunjutlarda) oziq moddalar urug'ning endospermasida to'planadi. 2 pallali o'simliklarning ko'pchiligida endosperma bo'lmaidi. Chunki ularda endosperma urug' pishguncha embrionning rivojlanishiga sarf bo'ladi. Bunday o'simliklarda zapas oziq moddalar urug'ning pallasiga to'planadi. Masalan: chigit, loviya, oshqovoq, nuxat. Nusellus oziq modda sifatida sarflanmay qolsa, u endosperm kabi vazifani bajaradi. Nusellus urug'da saqlanib qolsa, uni perisperm deb ataladi. Masalan; Chinniguldoshlar (Caryophyllaceae), Ituzumdoshlar (Solanaceae) oilasi o'simliklarida.

G'alladoshlarning urug'lari ba'zan qobiqsimon bargga o'ralib, yopishib ketgan bo'ladi. Masalan: arpa, so'li, sholi. Ba'zilarida yopishmagan – bug'doy, jo'xori. Urug'lar odatda mayda bo'ladi. Ba'zi o'simliklarning urug'i katta bo'ladi. Masalan: yong'oq, palma, xurmo. Yovvoyi holdagi o'simliklarning urug'i madaniy o'simliklarning urug'iga nisbatan juda ko'p bo'ladi. Masalan: 1 tup shumgiya (zarazixa) 200 ming dona urug' bo'ladi. Yovvoyi gultojxo'roz 500.000 dona urug' beradi.



Urug'ning unib chiqashi uchun suv, T^0 , havoning O_2 bo'lishi shart. Suv ishtirokida urug'dagi oziq moddalar eriydi, kraxmal shakarga aylanadi. Suvni shimib olgan urug' shishadi, bukadi, natijada po'stlog'i yorilib, embrion o'sib chiqadi. T^0 esa, urug' xujayrasidagi fermentlarni harakatga keltiradi. Fermentlar ta'sirida oziqli moddalar eriydi. T^0 3 ta darajaga bo'linadi.

1. Eng past daraja - minimum

2. O'rta daraja - optimum

3. Yuqori daraja - maksimum

Har xil o'simliklar har-xil T^0 ni talab etadi. Masalan: Bada $+1^0 + 30^0 + 37^0$

Bug'doyning $+ 3^0 + 25^0 + 30^0$

G'o'za $+ 12^0 + 32^0 + 40^0$; Oshqovoq $+ 1^0 + 37^0 + 44^0$.

Havoning O_2 o'simliklarning unib chiqayotgan urug'ining nafas olishi uchun zarur. Unayotgan urug' kuchli nafas oladi. Nisbatan olganda odamning nafas olishi bilan teng.

Tinim holatdagi urug'lar har xil vaqtda, har xil holatda chiqishi mumkin. Bir pallali o'simliklar urug'ining tinim holati juda osonlik bilan nam va issiqlik ta'sirida rivojlanishga o'tadi. Ba'zi urug'lar sovuq ta'sirida unib chiqsa, ba'zilari iliq suvda ivitilgandan so'ng unib chiqadi. Tabiatda shunday urug'lar borki, ularning urug' po'stini mexanik yo'l bilan tilinmasa unib chiqmaydi. Ba'zi bir urug'lar unuvchanligini yuz yillargacha saqlab qoladi masalan: yantoq, ajriq.

Nazorat savollari

1. Changlanish deb nimaga aytiladi va ularning usullari necha xil bo'ladi?
2. O'talik changining taraqqiy etishi va rivojlanishi qanday boradi?
3. Onalik tugunchasining rivojlanishi va tuzilishi qanday?
4. Urug' kurtak tuzilishi?
5. Qo'sh urug'lanishning mohiyati nimalardan iborat?
6. Meva gulning qaysi qismidan hosil bo'ladi va ularning xillari?
7. Urug' qanday qismlardan hosil bo'ladi?
8. Urug'ning unib chiqishi uchun qanday sharoitlar kerak?

Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o'quv qo'llanmalar ro'yxati

1. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. – T.: O'zbekiston, 2005.- 435 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A., Samatova SH. O'simliklar sistematikasidan amaliy mashg'ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
4. Ahmedov O'.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elaktron darslik.-T.: 2008.
5. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –
6. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
7. Hamidov A., Nabiev M.M. “O'zbekiston o'simliklarini aniqlagichi”.-T.: 1987.-235 b.
8. Василев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “ Высшая школа ”, 1988. -435 с.
9. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O'.A. va boshqalar. Dorivor o'simliklarning lotincha-o'zbekcha-ruscha-arabcha va forsha-tojikcha lug'ati.-T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
10. Berezovskaya T.P., Dmitruk S.E., Grishinna e.I., Belousov M.V. Основы farmatsevticheskoy botaniki. – Tomsk: Pechatnaya manifaktura, 2004.-294 s.
11. Xolmatov X.X., Ahmedov O'. A. Farmakognoziya. 1-2 qism. – T.: “Ibn Sino” nashiryoti, 2007.- 806 b.

MA'RUZA – 14

Yopiq urug'li o'simliklar tasnifi. Bir va ikki pallali o'simliklar. Magnoliyadoshlar, ayiqtovondoshlar, ko'knoridoshlar.

Ma'ruzaning maqsadi:

Yopiq urug'li o'simliklar tasnifi. Bir va ikki pallali o'simliklar. Ikki pallali o'simliklardan magnoliyaguldoshlar, ayiqtovondoshlar va ko'knoriguldoshlar oilalariga xarakteristika.

Reja:

- 1.Yopiq urug'lilarning kelib chiqishi va tasnifi.
- 2.Yopiq urug'lilar bo'limining xilma-xilligi sabablari va ularning geografik-ekologik tarqalishi.
- 3.Bir va ikki pallali o'simliklar.
- 4.Ikki pallalilar sinfi – Dicotyledones.
- 5.Magnoliyaguldoshlar oilasi tasnifi.
- 6.Ayiqtovondoshlar oilasi tasnifi.
- 7.Ko'knoriguldoshlar oilasi tasnifi.

Tayanch iboralar: *Yopiq urug'li o'simliklar tasnifi. Bir va ikki pallali o'simliklarni farqlari. Urug' murtak. Ildiz tuzilishi. Anatomik tuzilishi. Poyalardagi o'tkazuvchi to'qima bog'lamlar. Poya va ildizlarning eniga yo'g'onlashishi. Barglarning tuzilishi. Barg qirralarining shakli, tomirlanishi. Gul qo'rg'on a'zolari. Magnoliyadoshlar oilasi: magnoliya, lola daraxtlari, ayiqtovondoshlar oilasi: ayiqtovon, jungar parpisi, mushuk o'ti, bahor adonisi. Ko'knoriguldoshlar oilasi: ko'knori, lolaqizg'aldoq, shotara o'simliklar. Lotincha nomi, geografik tarqalishi, morfologik tuzilishi. Gulining tuzilishi. Gul formulasi.*

Yopiq urug'li o'simliklar bo'limi – Agniospermatophyta yoki Anthophyta.

Yopiq urug'lilar – hozir yer yuzidagi barcha o'simliklar orasida ustunlik qilayotgan eng katta bo'limdir.

Ular bir qancha belgilari bilan o'simliklar olamining boshqa vakillaridan keskin farq qiladi.

Gulli o'simliklar yoki yopiq urug'li o'simliklar, o'simliklar dunyosining eng yosh va keng tarqalgan guruxi bo'lib hozirgi geologik davrining xukmron o'simligi hisoblanadi. Ularning tuzilishi nihoyatda xilma-xilligi, turlarning ko'pligi, kishilar va xayvonlar hayotida tutgan o'rni bilan o'simliklarning boshqa guruxlaridan keskin farq qiladi. Tarixiy manbalarga qaraganda yopiq urug'li o'simliklarning dastlabki vakillari mezazoy erasining yura davrlarida paydo bo'la boshlagan. Keyinroq davrlariga kelib ular yer yuziga keng tarqala boshlagan.

Yopiq urug'li o'simliklarning keng tarqalishiga asosiy sabab bu vaqtga kelib havoda quyuq bulutlar kamayib havo namligi kamaygan, quyosh nuri yerga ko'proq tushgan. Yalang'och urug'larning qurg'oqchilikka moslashgan igna barglardan boshqa vakillari nobud bo'lgan. Ular o'rniga tuzilishi va biologik xususiyatlari bilan yangi muxitda, ya'ni qurg'oq havoda yashashga moslashgan yangi yosh tip-yopiq urug'lilar keng tarqala boshlaydi, juda qisqa vaqt ichida ular biosferani egallab shu davrning xukmron o'simliklar guruxiga aylandi.

Yopiq urug'lilar guruxiga 200 000 dan ortiqroq tur kiradi. Bu ochiq urug'lilardan 400 marta ko'proq ekanli-gini ko'rsatadi. Yalang'och urug'lilarning taxminan 500 turi ma'lum. Yopiq urug'li o'simliklarning vakillari odam uchun oziq-ovqat, xayvonlarga yem-xashak, sanoat uchun xom ashyo manbai bo'ladi. Yer shari aholisining asosiy ovqati bug'doy, sholi, jo'xori, kartoshka, mevalardan olma, o'rik, uzum, qovun-tarvuz texnik o'simliklardan g'o'za, zig'ir, lavlagi, shakar qamish va xilma xil dorivor o'simliklar yopiq urug'li o'simliklarning vakillaridir.

Yopiq urug'li o'simliklarning ko'payib, yer yuziga tarqalishiga asosiy sabab, ularning yashovchanligi, qurg'oqchilikka tez moslasha olishi. Hozirgi vaqtda ochiq urug'li o'simliklar faqat daraxt va butalardan iborat bo'lsa, yopiq urug'li o'simliklarning turli vakillari mavjud. Shu bilan birga ular organlarida metamorfozalar ham mavjud.

1.Yopiq urug'lilarning urug'i meva ichida bo'ladi, shuning uchun ham bu o'simliklar

“Yopiq urug’lilar” deb ataladi.

2.Ularning changchi va urug’chidan tashkil topgan guli bor. Gullari juda xilma-xil, shakli bilan bir-biridan farq qiladi.

3.Changlanishi hamda urug’ va mevalarning tarqalishi turli usullarda: shamol, hasharotlar, qushlar, suv orqali amalga oshadi. Qariyb, ularning 90%ga yaqini hasharotlar, 10%i shamol yordamida changlanadi.

4.Ularda qo’sh urug’lanish sodir bo’ladi va natijada faqat murtak emas, balki endosperm ham vujudga keladi. Ularning urug’lanishi uchun

suvli muhit bo’lishi shart emas. Bu xususiyat faqat gulli o’simliklar ya’ni yopiq urug’lilar uchun xos.

5.Yopiq urug’lilarning urug’ kurtagi urug’ga, tugunchasi esa mevaga aylanadi, urug’i mevabarglar ichida yetiladi.

6.Yopiq urug’lilar boshqa o’simlik guruhlariga nisbatan juda murakkab morfologik va anatomik tuzilishga ega. Yopiq urug’lilarning meva qobig’i bilan himoyalanganligi va boshqa bir qator o’ziga xos belgilari bilan ularning o’zidan oldingi, biologik-morfologik jihatdan ungacha takomillashmagan o’simliklarga nisbatan yerdagi hozirgi hayot sharoitiga yaxshi moslashgan, yuksak darajada tuzilgan o’simlik ekanligini ifodalaydi. Ularning hayot tarzi turli-tumandir.

Reproduktiv yoki generativ organlarni murakkablashishi bilan birga yopiq urug’lilarda morfologik va anatomik o’zgarishlar ham sodir bo’ladi. Barglarida simpodial tomirlanish, poyalarining o’tkazuvchi sistemasida traxeidlarni asosiy vazifasini bajaradigan suv naylari va floemadagi elaksimon hujayralar elaksimon naylarga aylanadi, uning yonida yo’ldosh hujayralari paydo bo’ladi.

Yopiq urug’li o’simliklar ikki sinfga : Ikki pallalilar va bir pallalilar sinflariga bo’linadi. Bu sinflarning har birining o’ziga xos belgi, xususiyatlari yig’indisi bilan xarakterlanadi.

Magnoliyatoifali yoki yopiq urug’li o’simliklar o’zlarining tuzilishi va tarqalishi bo’yicha nafaqat o’simliklar dunyosida, balki butun organik olamdagi eng katta gurux hisoblanadi. Hozirgi vaqtda ularning 250 mingdan ortiq turi ma’lum bo’lib, 533 ta oila va 13 ming turkumni tashkil etadi. Bular shakli va xajmi bo’yicha ham eng yirik organizmlar hisoblanib, ular orasida 1sm. dan (suvda o’suvchi Lemna) 150 metr balandlikdagi (Avstraliyada o’suvchi evkalipt) o’lkan daraxtlar mavjud. Gulli o’simliklar yoshi, kelib chiqishi bo’yicha eng yosh Mezozoy erasining bo’r davridan boshlab rivojlangan o’simliklar hisoblanadi. Hozirda ular Er yuzi bo’ylab tarqalishi va tuzilishi bo’yicha eng murakkab va xilma-xil moslashuvga ega bo’lgan o’simliklar hisoblanadi. Ular dunyoning hamma qit’alarida ekvatorning issiq tropik o’rmonlaridan tortib, Shimoliy Arktika muzliklarigacha tarqalgan. ekologik nuqtai-nazardan ham ular turli xil sharoitlarda (muhitda) o’sishga moslashgan: issiq jazirama cho’ldan eng baland tog’ cho’qqilarigacha, chuchuk va sho’r suv xavzalaridan (ko’l, soy, daryo, dengiz, okean) boshlab ohakli, gipsli, toshli va boshqa jinslardan iborat bo’lgan joylarda tarqalgan. Gulli o’simliklarning bu darajada turlar sonining ko’p bo’lishi, shaklan xilma-xiligi, geografik va ekologik diapazonining kengligi ularning murakkab tuzilganligiga va qator o’ziga xos belgilarga ega ekanligiga olib kelgan.

2. Gulli o’simliklar quyidagi belgilari bilan ochiq urug’li va sporal o’simliklardan farq qiladi:

1. Urug’ning to’liq ximoyalanganligi (yopiqligi), urug’ kurtagini tuguncha ichida joylashganligi.

2. Bularda urug’chining va eng muhimi mevaning hosil bo’lishidir.

3. Bularda haqiqiy gulning paydo bo’lishi bilan changlanish va urug’lanishi jarayonida qo’sh urug’lanishni amalga oshishidir (S.Navashin, 1898).

4. Gulli o’simliklarda gametofit nasl ochiq urug’lilarga qaraganda o’ta qisqarganligi va juda tez taraqqiy etganligi bilan ajralib turadi.

Gametofit nasl-ayrim jinsli. erkak gametofit-chang, chang naychasi va unda harakat qilayotgan vegetativ va generativ xujayralardan iborat. Urg`ochi gametofit-bu urug`chidagi murtak xaltasi va unda joylashgan 8-ta xujayradan (tuxum xujayra markaziy xujayra, antipod va sinergitlar) tashkil topgan. Sporofit nasl mohiyati jihatidan 2-ta o`simlikdan: asosiy o`simlik va zigota tarqqiyotidagi embriondan (murtak) iborat.

5. Ichki anatomik tuzilishi bo`yicha ular rivojlangan bo`lib, ikkilamchi yog`ochligida ksilema, floema, haqiqiy o`tkazuvchi naychalar traxeyalar va yo`ldosh xujayralarning bo`lishidir.

6. Morfologik tuzilishi jihatidan bularning xilma-xil ko`rinishiga, turli hil moslamalarga egaligi va turli hil sharoitda yashovchanligidir.

7. Hayotiy shakllarining xilma xil bo`lishi kelib chiqishi bo`yicha, eng yoshi-o`t o`simliklar ekanligi, bulardagi muhim belgi hisoblanadi.

3. Gulli o`simliklarning kelib chiqishi.

Gulli o`simliklar dastlabki qazilma holdagi qoldiqlari (chaglari, barglari) Mezozoy erasining oxiri Bo`r davrining 2-yarmiga xos yotqiziq-laridan boshlab uchray boshlaydi. Umuman shu davridan boshlab gulli o`simliklarga mansub paleobotanik ma`lumotlar dunyoning ko`p joylaridan topilgan. Gulli o`simliklar filogeniyasining to`g`ri, ilmiy asosda hal qilishda dastlab qachon, qaerda, qanday yo`l bilan gulli o`simliklar paydo bo`lgan degan savolga javob berish bilan oydinlashadi. Ko`pchilik botanik (paleobotanik) olimlar tomonidan qachon degan savolga «Mezozoy» erasining oxiri bo`r davrining 2- yarimidan boshlab gulli o`simliklar paydo bo`lgan degan fikr bir xilda bildiriladi.

Bunga sabab o`sha- bo`r davrida er planetasida qator kosmagonik o`zgarishlar bo`lgan, quyosh radiatsiyasi ko`chaygan, havo harorati keskin ko`tarilgan, so`ng yana haroratning pasayishi kuzatilgan. Ayniqsa shimol tomonda erning juda ko`p qismi «Buyuk muzlik» bilan qoplangan. Bu o`zgarishlar geograf, geolog, klimatolog, paleogeograf va boshqalar tomonidan tasdiqlangan. Shu sababdan ham bo`r davrida gulli o`simliklar paydo bo`lgan deb hisoblanadi. Qaerda? degan savolga hozirgacha turlicha fikrlar bildiriladi. Aksariyat paleobotanik topilmalar ekvatorga yaqin bo`lgan tropik va subtropik xududlaridan topilgan. Paleobotanik olimlar A. Krshitofovich, V.Sveshnikovalar fikricha gulli o`simliklar dastlab qadimgi Gondvana qit`asining shimolida paydo bo`lgan deb qaraladi. Ular tomonidan Shpitsbergan oroli, Grelandiya hududlaridan topilgan gulli o`simliklarning chaglari Bo`r davriga xosligi aytiladi.

Bu yo`nalishda bir muncha to`liq, asosli fikrlarni taniqli paleobotanik olim A. Taxtadjyan (1964), Toron R. Thorne (1976) nazariyalari: dastlab paydo bo`lgan joy qadimgi Panfik qit`asining tropik hududlari yoki hozirgi Osiyo qit`asining sharqiy-janubidagi orollar-Yangi Zelandiya, Yangi Gvineya qit`asining Filippin, ayniqsa Fidji orollari hisoblanadi. Chunki u erda hozirda ham gulli o`simliklarning eng qadimgi va sodda tuzilgan vakillari ko`p uchraydi. Maslan: magnoliya, lola daraxti va boshqalar.

Bular qanday yo`l bilan kelib chiqqan? Degan savolga ham turli fikrlar bildiriladi. Ularning filogeniyasining hal qilishidagi muhim masala gulning paydo bo`lishini hal qilish bilan bog`liq. Bu yo`nalishda qator fikrlar, nazariyalar o`rtaga tashlangan. Shulardan muhimlari quyidagilar:

1. Nemis, (Avstraliya) olimi P. Vettshteyn (1901) tomonidan fanga kiritilib keyinchalik «soxta-gul»- Pseudanthos – nazariya nomini olgan. Bu nazariyaga muvofiq gul ochiq urug`lilar vakili bo`lgan gnetumlar (oraliq formasi efedralar) qubbasining shakl o`zgarishdan kelib chiqqan deb qaraladi. Bulardagi qubbalaridagi ayrim jinsli bo`lishi, to`liq 2 jinsli gulning paydo bo`lishiga zamin bo`ldi deyishiga to`g`ri kelmadi.

2. Bu nazariya ingliz paleobotaniklari Arber, Parkin va ular bilan deyarli bir vaqtda boshqa ingliz botaniklari Besi, Gallir (1869) ishlab chiqqan «Chin gul» - Euanthos nazariya. Bu nazariyaga muvofiq «2 jinsli gul-bu shakli o`zgargan bennettitlarning 2 jinsli qubbasidir. Bennettitlarning qubbalaridagi mikrosporofil bargchalarining o`zgarishidan changchilar, megasporafillarning o`zgarishidan urug`chilar paydo bo`lgan» deb talqin qilinadi.

Bu nazariyani to`ldiruvchi yana muxim asos shundaki, bennettitlar va urug`li

paporotniklarning yuqolib ketgan davri (bo`r davri) gulli o`simliklarning paydo bo`lishiga to`g`ri keladi. Akademik A. Taxtadjyan (1986) yuqoridagi «chin gul» nazariyasini ma`qullagan xolda, «gul-bu shakli o`zgargan bennettitlarning 2 jinsli qubbasidir. Bennettitlar o`z yo`lida urug`li paporotniklardan paydo bo`lgan» degan to`ldirishni kiritadi. Lekin, shuni qayd etish kerakki, shu kunga qadar bu fikrlar to`liq isbotini topmagan. Sababi, keyingi tekshirishlar shuni ko`rsatmoqdaki, gulli o`simliklarning ko`pchiligi uchun xos bo`lgan urug`dagi oqsil moddalar bennettitlar urug`ida yo`q ekanligi aniqlangan. Gulli o`simlikni kelib chiqishi bo`yicha yana ko`p olimlar o`z fikrlarini bildirganlar. Masalan: Nazariyotchi botanik olim, O`rta Osiyo florasining taniqli tadqiqotchisi M. G. Popov «Gulli o`simliklar gibridizatsiya – duragaylanish» yo`li bilan kelib chiqqan degan fikrni bildiradi. Bu gipoteza ham munozarali va ko`p isbot talab qiladi.

Ikki pallalilar sinfi – Dicotyledones.

Bu sinf vakillari quyidagi belgilar bilan xarakterlanadi: murtagi ikki urug`pallali, urug`lari endospermsiz yoki endosperimli va persperimli. Anatomik tuzilishi jihatidan birlamchi va ikkilamchi. Barglari oddiy va murakkab. Barg qirralari va shakllari har xil. Barg tomirlanishi to`rsimon tomirlangan. Hayot shakllari daraxtsimon, butasimon, chalabutasimon va o`tsimon. Asosiy ildizi yaxshi rivojlangan. Kambiy qavati bo`lganligidan, tanasi ikkilamchi yo`g`onlashish xususiyatiga ega. Naychalar to`dasi ochiq. Gullari besh bo`lakli tipda. Gulqo`rg`oni ko`pincha qo`sh bo`ladi.

Biroq bu barcha belgilar emas, ammo ular ikki pallali o`simliklarni bir pallalilardan farq qilishga imkon beradi. Ikki pallali o`simliklarni birontasi bir pallalilar bilan chatishmaydi, hatto ular bir-biriga payvand qilinsa, payvand ham tutmaydi.

Ikki pallalilarning ichki tuzilishi

Bir pallalilar sinfi – Monocotyledones.

Bu sinf vakillari yer yuzining hamma joylarida tarqalgan bo`lib, tarkibida 4ta kenja sinf, 104 oila, 3000 avlod, va 63000 turni birlashtirgan.

Bir pallali o`simliklar o`ziga xos belgilari bilan ikki pallalilardan farq qiladi. Bu sinfga kiradigan o`simliklarning ichki tuzilishi ham bir-biridan farq qiladi. Ularning urug` murtagi bir pallali. Urug`lari endosperimli. Anatomik tuzilishi faqat birlamchi.

Bir pallalilarning ichki tuzilishi

Poyadagi o`tkazuvchi bog`lamlari yopiq (kambiysiz), kollateral va tartibsiz joylashgan. Ularda poya va ildizlarining yo`g`onlashmasligiga sabab po`stloq bilan markaziy silindr qismi o`rtasida ikkilamchi paydo qiluvchi to`qima – kambiy qavatining bo`lmasligidir. Lekin ayrim bir pallalilardan yog`ochsimon dratsena, yukkalarda kambiyning hosil bo`lishi bilan birga ular eniga yo`g`onlashadi. Bir pallali o`simliklarning bir vaqt qurib qolishi tufayli poyasining pastki tomonidan qo`shimcha ildizlar o`sib chiqib sochma – popuk ildizni hosil qiladi. Barglari faqat oddiy, qirralari butun, parallel yoki yoysimon tomirlangan. Barg shakllari lansetsimon, lentasimon, chiziqsimon, naychasimon, tuxumsimon bo`ladi. Gulqo`rg`oni oddiy, asosan uch a`zoli. Hayot shakllari o`t, qisman daraxtsimon o`simliklar.

Hozirgi yopiq urug`lilardan ko`p mevalilar (magnoliyagullilar, ayiqtovongullilar, zirkullilar) va ba`zi boshqa o`simliklar eng oddiy o`simliklar hisoblanadi. Ko`p mevalilarning juda ko`p oddiy belgilari xos bo`lgan tipik gulining spetsifik tuzilganligi buning isbotidir. Ularning gul o`rni konussimon, gultoji ayrim gulbargli, gulbarglari ko`p, ular spiralsimon joylashgan va hokazo. Changchi va



urug'chilarning ko'pligi bu o'simliklar uchun ayniqsa xarakterli.

Ko'p mevalilar qabilasi – (Polycarpicae).

Ko'p mevalilar qabilasi 23ta oilani o'z ichiga oladi. Bu qabilaga kiruvchi daraxtlardan magnoliyadoshlar, lavrdoshlar, zirkdoshlar, o't o'simliklardan esa ayiqtovondoshlar eng tipikdir.

Ko'p mevalilarning gullari xilma-xil bo'lgani bilan ular sodda tipda tuzilgan.

Biz faqat magnoliyadoshlar va ayiqtovondoshlarni ko'rib chiqamiz.

Magnoliyadoshlar oilasi – Magnoliaceae.

Bu oilaga faqat daraxt va butasimon o'simliklar kiradi. Ularning 12 avlod 100 ga yaqin turi bor. Ularning asosiy vatani Shimoliy yarim sharimizdagi subtropik iqlimli joylardir. Barglari oddiy, ko'pincha yon bargchalari bo'ladi, yirik, navbat bilan joylashgan. Bu oila vakillarining ba'zilar doim yashil tursa, ba'zilar kuzda bargini to'kadi. Barglarida efir moy chiqaradigan ichki bezchalar bor. Bu oilaga mansub bo'lgan ayrim o'simliklarning ikkilamchi o'tkazuvchi naychalari o'rnida ochiq urug'lilar kabi teshikchalar bilan o'ralgan traxeidlar bo'ladi. Gullari ko'pincha ikki jinsli, aktinomorf bo'lib, gul o'rni cho'ziq. Gulqo'rg'on bargchalari har xil sonda, 6 tadan 12 tagacha va bundan ko'proq bo'lib, ba'zi vakillarida spiral holda joy olsa, ba'zilarida doiralar hosil qiladi, ko'pincha uch bo'lakli bo'ladi. 3tadan doira bo'lib joylashganlarida tashqisi ranggi bilan boshqalardan farq qiladi va kosacha hosil qiladi. Talaygina otaliklar, urug'kurtaklari tugunchalar chetidan joy oladigan ko'p a'zoli apokarp genitsey hosil qiluvchi meva barglari senokarp spiral bo'lib joylashgan. Gulqo'rg'on bargchalari ranglari odatda oq yoki pushti. Mevasi barglardan iborat bo'lgan g'uddaga o'xshagan to'pmeva.

Bu oilaning tipik vakili magnoliya avlodidir.

Uning qisman Sharqiy Osiyoda, qisman Shimoliy Amerikada uchraydigan 30 ga yaqin turi bor. Magnoliyalarning ba'zi turlari Floridada yovvoyi holda o'sadi. Subtropik iqlimli rayon bo'lgan Qrim va Zakavkazda ekib o'stiriladi. Park va bog'larda, asl vatani shimoliy Amerika bo'lgan yirik gulli magnoliya (*M.grandiflora*) ekiladi. Bu o'simlik kalta bandli, barglari katta-katta va oddiy, cheti butun, qalin, yaltiroq bo'ladigan daraxtdir. Shu barglarining yonbarglari kurtakdan hali ochilmagan yosh barglarni saqlab turadi. Yakka-yakka bo'ladigan yirik-yirik gullarining diametri 10 smga boradi va bundan ham oshadi. Gullari oq yoki pushti rangda bo'lib, juda xushbo'y.

Gul o'rni cho'ziq konussimon shaklda. Unda gulqo'rg'oni 6-12ta nimrang, yirik-yirik, bargchalari uch a'zoli doira bo'lib turadi. Changdonlar cho'zinchoq bo'lib, bog'lam atrofidan joy oladi. Gul o'rnini 2/3 bo'lagini yuqori qismini ginetsiy egallagan. Spiral holda joylashgan talaygina meva bargchalarining har qaysisi mustaqil onalik hosil qiladi, shu bilan birga o'rta tomirdan bukilib turadigan meva bargchasining chetlari bir-biriga qo'shilib ketadi va shu tariqa yuzaga kelgan bir uyali tugunchadan, ko'pincha 2 ta urug'kurtak joy oladi(ba'zi turlarida urug'kurtaklar 6 donagacha bo'ladi). Onalik ustunchasi yo'q, shuning uchun og'izchanning chang ushlaydigan yuzasi meva bargchasining chetida, yuqori qismida turadi. Tugunchasi ustki.

Gullash tamom bo'lgandan keyin gulqo'rg'on bargchalari bilan otaliklari tushib ketadi, ularning o'rni esa chuqurcha-chuqurcha bo'lib qoladi: gul o'rni qalinlashadi va onaliklardan kulrang tukli bir talay bargsimon meva hosil bo'ladi, ular qorin chokidan ochiladi. Shu mevalarni bo'yi 5-7 sm va bundan ko'proq keladigan cho'zinchoq "qubba" hosil qiladi. Pishib yetilgan urug'lari qizil rangda bo'ladi va etdor po'st bilan qoplanib ipdek uzun bandida pastga osilib turadi.



Magnoliya daraxtining gullari.

Magnoliyagullilarning boshqa vakillaridan lola daraxti (Liriodendron) ni ko'rsatish mumkin. Bu avlod vakillari Kavkaz, Qrim va O'rta Osiyoning janubidagi Ashxobod va Dushanbedagi parklarda, hozirgi vaqtda Toshkentdagi parklarda ham o'stirilmoqda. Lola daraxtining bo'yi magnoliyaning bo'yidan biroz balandroq, 40mga yetadi. Lola daraxtining barglari oddiy, panjasimon o'yilgan bo'lib, poyada ketma-ket joylashgan. Gulqo'rg'oni uch qavat. Gullarining diametri 6-8sm, changchilari cheksiz, mevalari ikki urug'li qanotcha. Bu darxtning gullari sirtidan lolaga birmuncha o'xshaydi, lekin rangi loladek ochiq bo'lmaydi, ko'kimtir-sariq rangli bo'ladi. Lola daraxti Amerikada "oq terak" deb ataladi. Uning yog'ochidan har xil asboblari tayyorlanadi. Magnoliyagullilarning ko'pchiligi dekorativ o'simlik sifatida o'stiriladi. Bu oila vakillari eng qadimgi o'simliklardan biridir. Bo'r davriga taaluqli qazilma qoldiqlar shundan guvohlik beradi. Oddiy novdaga xos ko'pgina belgilarni saqlab qolgan oddiy tuzilishli gullar, shuningdek boshqa morfologik belgilar bu oilaning qadim zamonlardan qolganligiga mos keladi. Ularning ba'zi vakillarining yog'och qismida suv naylari yo'q, shunga ko'ra suv o'tkazuvchi elementlar hoshiyador teshikchali traxeidlardaning iborat bo'ladi, shu tufayli bularning yog'och qismi ninabarglarning yog'och qismiga juda o'xshab ketadi.²⁵

Aviqtovondoshlar oilasi – Ranunculaceae.

Bu oila 45 turkum 2000 dan ortiq turni o'z ichiga oladigan katta oila bo'lib, ko'pchilik vakillari bir va ko'p yillik o'tlardir. Ba'zan buta va lianasimon butalar ham uchraydi. Ularning barglari navbatlashib joylashgan, ko'pincha panjasimon yoki patsimon qirqilgan yon barglari bo'lmaydi. Bu oila vakillarining gullari har xil tuzilgan: ba'zilarida aktinomorf, ba'zilarida zigomorf bo'lsa, goho siklik, goho doirali bo'ladi. Ularning guli shingil va boshqosimon gul to'plamlaridan iborat yoki yakka holda joylashgan. Gullari ikki jinsli. Gulqo'rg'oni murakkab ba'zan oddiy (qarg'atuyoqlar-Anemone). Gulkosa 5ta, ba'zan 3-20 ta, gultoji ochiq rangli, tojbargi 2-20 ta, ba'zan mayda bo'lib, shiradonlarga aylangan. Onaligi ko'p, erkin, changdoni esa gulning ichkarisiga yoki tashqarisiga qaragan bo'ladi. Genitseyi ko'p, ba'zan bitta, apokarp tipda tuzilgan, onaligi bir meva bargli. Tugunchasi ustki, bir uyali, 1ta yoki bir nechta urug'kurtakli.

1. ²⁵ V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.



Ayiqtovondoshlarning asosiy gul tuzilishi

Bu oila vakillarining xarakterli belgisi otaliklarining magnoliyadoshlar oilasining vakillaridagi singari cheksiz bo'lib, ko'pincha spiral joylanishi, onaligining qariyb hamma vaqt erkin bo'lishidir. Ayiqtovondoshlarning to'qimasida efir moyi bezlari bo'lmasa ham, lekin tarkibida chorva mollari uchun zaharli bo'lgan alkaloidlar, glikozidlar, saponinlar bo'ladi. Shuning uchun bu oila vakillarini mollar xush ko'rib yemaydi, ko'plari zaharli o'tlar hisoblanadi. Ovqat uchun faqat bir turi sedana (*Nigella sativa*) ekiladi.

Ayiqtovondoshlar oilasi ba'zi turlarining mevasi bargsimon bo'lsa, ba'zilarining mevalari ochilmaydigan yong'oqchalar holida bo'ladi. Ba'zan rezavor va ko'sakcha mevalilari ham uchraydi.

Bu oilaga kiruvchi tipik vakillardan biri **ayiqtovon (*Ranunculus*)** avlodidir. Bu avlod 600 turga ega. Bular orasida o'rta mintaqada eng ko'p uchraydiganlaridan *zaharli ayiqtovon (R. sceleratus)*, *o'rmalovchi ayiqtovon (R. repens)*, *o'yuvchi ayiqtovon (R. acer)* ni aytib o'tish mumkin.

O'rmalovchi ayiqtovon (*Ranunculus repens*) .

Nam joylarda ko'p uchraydigan o't bo'lib, ildiz yonidan chiqqan uchta-uchtalik yopirma barglari (rozetkasi) bor. Gullari simoz tipda shoxlanadigan yopiq to'pgulda joylashgan. Gulning qo'sh gulqo'rg'oni bor. Bu gulqo'rg'on, 5 ta gulkosacha va och sariq rangli 5 ta gultojbarglardan tashkil topgan. Har qaysi gulbarg tagida nektardonli kichkina chuqurcha bor, bu chuqurcha sariq rangli tangacha bilan bekilib turadi. Otaliklar soni cheksiz sonda bo'lib, spiral holda joylashgan. Ulardan yuqoriroqda talaygina onaliklar joylashgan. Har qaysi onalik bitta meva barghasidan iborat bo'lib, ularda ko'zga arang ilashadigan ustuncha bor. Bir uyali tugunchada bitta urug'kurtak bo'ladi. Mevasi ochilmaydigan quruq meva – yong'oqchadan iborat.



O'rmalovchi ayiqtovon – *Ranunculus repens*

Dala ayiqtovoni (*R. parvensis*).

Bir yillik o't o'simlik, bo'yi 10-30 sm. Mevalari ilmoqli tugunchalarga ega. zararli va zaharli begona o't hisoblanadi.

Zaharli ayiqtovon (*R. Sceleratus*).

Ko'p yillik o't o'simlik, bo'yi 20-55 sm, poyasi yumshoq va kovak. Botqoqlarda, daryo va ariq bo'ylarida o'sadi.

O'yuvchi ayiqtovon (R. Acer).

Ko'p yillik, zaharli o't o'simlik, bo'yi 80 sm gacha yetadi. Barglari barmoqsimon qirzilgan. Ildizoldi barglari uzun bandli, poyaga o'rnashgan barglarining bandi qisqa bo'lishi ham mumkin. Daryo bo'ylari, zax yerlarda va ariq bo'ylarida o'sadi.

Severtsev ayiqtovoni (R. Severtsovii).

Ko'p yillik o't o'simlik. Adir va tog' etaklarida tarqalgan.

Bu oilaga: *Adonis yoki suvur o't - Adonis, sedana - Nigella, isparak - Delphinium, akonit - Aconitum, uchma - Ceratocephalus* kabi avlodlar ham kiradi.



R. aquatilis

R. bulbosus

R. ficaria

R. multifidus

Uchma avlodi (Ceratocephalus).

Ular erta bahorgi, efemer o't o'simliklar. Barglari uchta qirzilgan va ildiz oldiga o'rnashgan. O'simlikning bo'yi 1dan 10 sm gacha, poyasi bargsiz. Gullari aktinomorf, ikki jinsli, hasharotlar yordamida changlanadi. Gulkosa va gultojbarglari 5 tadan, erkin o'sgan, changchilari 5 -15 tagacha, urug'chisi cheksiz. Gullagan davrida hayvonlar uchun zaharli hisoblanadi. O'zbekistonda 2 turi: *C. orthoceras* va *C. falcatus* uchraydi.

Trollius avlodi (Trollius). Ular ko'p yillik o't o'simlik. Barglari oddiy panjasimon.

Kalujnitsa avlodi (Caltha). Erta bahorda gullaydigan zaharli o't o'simlik. Nam yerlarda o'sadi. Botqoq kalujnitsasi (*C. palustris*) gullari yirik va sariq rangda.

Anemone avlodi (Anemone) ko'p yillik o't o'simlik. Barglari uchta yoki panjasimon, poyaga ketma-ket o'rnashgan, ildizoldi barglari ham bo'ladi.

Bandchali anemone (A. petilosa) bo'yi 20 sm atrofida bo'ladi. Efemorand, erta bahorda gullaydi, gultojbarglari sariq rangda. Zaharli o'simlik.

Adonis avlodi (Adonis).

Bu avlodning hamdo'stlik mamlakatlarida tarqalgan 11 turidan 9 tasi O'rta Osiyoda uchraydi. Ularning jamisi ko'p yillik o't o'simlik. Gul qo'rg'oni murakkab, to'g'ri gul, ikki jinsli, kosachabarglari 5 ta birlashmagan, tojibarglari cheksiz, changchi va urug'chilari cheksiz. Mevasi ko'p urug'li. O'zbekistonda bu avlodning *turkiston suvur o'ti (A. chrysocastus)* deb yuritiladigan turi Zarafshon, Oloy va Turkiston tizma tog'larining mayin tuproqli yon bog'irlarida keng tarqalgan. U baland bo'yli, yirik sariq gulli, o'ziga xos xushbo'y hid taratadi. Tibbiyotda dori-darmon olish uchun ishlatiladigan adonizin shu o'simlikdan olinadi.

Akonit avlodi - (Aconitum).

Bu avlod vakillari ildizlari tugunaksimon, bo'rtgan, poyasi tik chiqqan, barglari panjasimon qirzilgan, yirik gulli o't o'simliklar bo'lib, ularning gullari noto'g'ri, ko'k,

binafsha, sariq ba'zan oq ranglidir. Gulqo'rg'oni tojsimon. Mevasi ko'p urug'li, bargsimon bo'ladi. Akonitning barcha turlarida akonitin alkaloidi bor. Tanasining barcha qismi zaharlidir. Ko'pincha dorivor va dekorativ o'simlik sifatida ekib o'stiriladi. Dori bo'ladigan o'simliklar orasida bahor suvur o'ti (*Adonis vernalis*) hammadan ko'proq ishlatiladi. Bularning yer ustki qismidan yurak kasalliklarini davolashda qo'llaniladigan preparat tayyorlanadi. Pionlar, isparaklar manzarali o'simliklar sifatida ekib o'stiriladi.



Akonit o'simligi

Delfinium avlodi (Delphinium) - Isparak avlodi. Bir va ko'p yillik o't o'simlik. Barglari chuqur qirqilgan. Gullari zigomorf, sochoq to'pgulga yig'ilgan. Hamma vakillari tarkibida delfinin moddasini saqlaydi. Gullari chiroyli bo'lgani uchun ayrim turlari manzarali o'simlik sifatida o'stiriladi.

Klematis avlodi (Clematis). Bu avlodning vakillari liana, chala buta va daraxtsimon shakllarda mavjuddirlar. Sharq klematisi (*C. orientalis*) iloncho'p deb ataladi, bu o'simlik to'qaylarda yovvoyi holda uchraydi. Poyasi sut shiraga boy. Urug'lari uzun tukchalarga ega.

Taliktrum avlodi (Thalictrum) ning vakillari ko'proq tog'larda tarqalgan bo'lib, shamol yordamida changlanadi.

Sallaguldoshlar - *Paeoniaceae*

Yovvoyi sallagul

***Paeonia hybrida* Pall.** O'zbekistonda soni qisqarib borayotgan kamyob, manzarali tur.

Qisqacha tavsifi.

Bo'yi 25-75 sm oralig'idagi ko'p yillik o't. Ildizi urchuqsimon yo'g'onlashgan. Barglari bandli, ikki karra uch bo'lakli, bo'laklari qalami-nashtarsimon. Gullari yirik, diametri 6-10 sm. Mevasi tarvaqaylagan, qalin tukli. Urug'i yaltiroq, qora rangli. Iyun-iyul oylarida gullab, iyul-avgustda mevasi yetiladi.

Tarqalishi.

Chotqol, qurama, Zarafshon va Hisor tizmalarida tarqalgan (Toshkent, Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlari). Qirg'iziston, Qozog'iston, G'arbiy Sibirda hamda Jung'oriyada ham uchraydi.

O'sish sharoiti.

Dengiz sathidan 1500-2000 m balandlikda chirindili mayda jinsli tuproqlarda va daraxtlarning tagida o'sadi.

Soni.

Tabiatda 200-250 tupi borligi aniqlangan bo'lib, bulardan ayrimlari yo'qolib ketgan. Masalan, 1960 yillargacha Chotqol biosfera qo'riqxonasi (Boshqizilsoy)da o'sib turgan sallagullar butunlay yo'qolib ketgan. Ular faqat qo'riqlanadigan va chiqib bo'lmaydigan joylarda saqlanib qolgan.

Ko'payishi.

Urug'idan ko'payadi.

O'simlik soni va arealining o'zgarish sabablari.

Gullarining uzib olinishi va tuplarining ildizi bilan qazib olib hovlilarga ekilishi hamda

chorva mollarining ko`plab boqilishi oqibatida kamayib bormoqda.

Madaniylashtirilishi.

Ko`pgina botanika bog`larida muvaffaqiyatli ravishda ekib kelinmoqda.

Muhofaza choralari.

Qizil kitobga kiritilgan. Chotqol biosfera qo`riqxonasining Maydontol bo`limida qo`riqlanadi.

Zirkdoshlar oilasi –Berberidaceae tashqi ko`rinishi har xil bo`lgan 150 ga yaqin o`simliklar turi, asosan butalar, qisman shingilsimon to`pgulli ko`p yillik o`tlar. Gulqo`rg`on barglari ikki xil bo`ladi, gulbargsimon tashqi va gulbargsimon ammo nektardonlari bor ichki barglar. Tashqi va ichki barlag xuddi otaliklar singari ucha`zoli doiralar bo`lib, joy oladi. (doiralar oltitacha shulardan ikkitasi nektardonli bo`ladi). Bitta meva bargchasidan hosil bo`lgan birdan bir onaliklarning bir uyali ustki tugunchasida bittadan yeki bir nechtagacha urug` kurtaklar bor. Urug`kurtaklar qorin choki bo`ylab, yeki shu chok tagida yotadi. Mevasi rezavor meva yeki yong`oqcha.

Bu oilaning tipik vakili zirk avlodidir. Oddiy zirk butasimon o`simlik bo`lib, shaklan ovalga uxshagan barglarining chetlari arrasimon, ular kalta tortgan yon novdalardan chiqadi. Uzun novdalarning barglari uch ayrili tikanga aylangan. Sariq rangi gullari osilib turadigan shingilsimon tupgullarni hosil qiladi. Bir uyali ustki tugunchasidan och qizil sersuv nordon etli chuzinchoq meva paydo bo`ladi. Zirk asosan dekorativ o`simlik sifatida ekib o`stiriladi. Zirk barglaridan tayyorlangan spirtli damlama ginekologiyada bachadon muskullar tonusini ko`tarish, to`qqandan so`ng ba`zi kasalliklarini davolashda, qon ketishini tuxtatishda, o`t xaydovchi vositasi sifatida ishlatiladi. Ildizidan berin alkaloidining tuzi tibbiyotda surunkali gepatit, gepatoxolesistit va o`t pufagidagi tosh kasalliklarini davolashda qo`llaniladi.

Ko`knoridoshar oilasi – Papaveraceae.

Bu oilaning aksariyat qismi bir va ko`p yillik o`tlardir, ularda, odatda bo`gimlarga bo`lingan sut naylari yoki sut hujayralari bo`ladi. O`simlikda sutsimon shira bo`lmasa, maxsus moddsi bor cho`ziq hujayralar yuzaga keladi. U 26 avlodga oid 250 turni o`z ichiga oladi. O`rta Osiyoda 8 turkumga oid 35 turi uchraydi. Bu oilaga kiradigan o`simliklar asosan o`tlar, qisman butalardir. Barglari ko`pincha patsimon qirqilgan, navbatlashib yoki qarama-qarshi joylashgan, yonbargsiz.

Gullari yakka-yakka yoki to`pgulda joylashadi. Aktinomorf ba`zan zigomorf. Kosachabargi 2 ta, gultojbargi 4 ta, ba`zan 6ta, kosachasi faqat g`unchaligidagina bo`ladi, guli ochilishi bilan tezda tushib ketadi. Otaligi 2-4 ta, yoki cheksiz, doira bo`lib joylashgan. Onaligi 2 ta yoki bir nechta meva bargli, senokarp tipda, tugunchasi ostki yoki qisman yarim ostki, bir uyali, mevasi ko`p urug`li ko`sakcha yoki yong`oqchadir. Urug`lari mayda, endospermli, hasharotlar vositasida changlanadi.

O`zbekistonda oilaning ko`knor (Papaver) va qizg`aldoq (Roemeriya) turkumlariga mansub turlar keng tarqalgan.

Bu oilaning eng tipik vakillaridan biri – **Ko`knoridir (Papaver).** Bu avlodning yer yuzida 110 dan oriq turi keng tarqalgan. Hamdo`stlik mamlakatlarida 50 tur, shu jumladan, O`zbekistonda 5 turi tarqalgan bo`lib, shundan bitta *Papaver povoninum* turi madaniylashtirilgan. U bir yillik o`t, poyasi sut suyuqligi aralash mum qatlami bilan qoplangan bo`lib, ko`kimtir zangori rangli. U bo`yi 1mga yetadi. Uning gullari yirik, ko`pincha binafsha, pushti, va oqish rangli, ko`sakchasi yirik, bochkasimon va silliq, tarkibida 26 xil alkaloid saqlaydi, urug`lari mayda, ko`p va seryog` bo`ladi. Ba`zan otaliklarining bir qismi metamarfozlanishi sababli gulbarglari to`rttadan oshiq bo`ladi, doira bo`lib turadi. Onaligi 8-12 meva bargchadan tuzilgan bo`lib, kattakon tugunchasi va chetlari go`yo shu`laga o`xshab, parrak-parrak bo`lib turadigan disksimon tumshuqchasi bor. Urug`ining 50% ini yog` tashkil etadi. Nonvoychilikda ishlatiladi.

Ko`sakchasi ko`kligida ko`ndalanggiga tilinganda chiqqan oqimtir sut-shira havoda qo`ng`ir tus oladi. O`simlik mevasida 1,5-2,5 % alkaloidlar bo`ladi. Shu modda “opiy” yoki “chakida” deb ataladi. Opiy tarkibidagi alkaloidlar 2-20 %ni tashkil etadi. Shu tarzda olinib

ko'paytirilgan opiyalar farmatsevtika sanoatiga jo'natiladi. Undan tibbiyotda muhim ahamiyatga ega bo'lgan morfin, kodein, papaverin singari alkaloidlar olinadi. Ulardan tayyorlangan dorilar og'riq qoldirishda, yo'talga qarshi, me'da-ichak kasalliklari; gipertoniya, bronxial astma va boshqa kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Bulardan tashqari organik kislotalar va fermentlar glikozidlar ham uchrab turadi. O'simlikning urug'idan tashqari boshqa organlari ham zaharli hisoblanadi.

Ko'knorning mayda-mayda bo'ladigan urug'larida 40% dan ortiq, goho 50% moy bo'ladi. Ko'knori moyi ma'zali va hadeganda ochilmaydigan bo'lganligidan juda yaxshi masalliq hisoblanadi. Ko'knori moyi qizitmasdan presslash yo'li bilan qora rangli badxo'r fraksiya ajratib olinadi.



Qizil gulli ko'knor .

Papaver parsoninum

Ko'knor o'simligi

Papaver somniferum

Ko'knor (*P. somniferum*) bir yillik o't o'simlik. bo'yi 1m gacha o'sadi. Bu o'simlik oqimtir sut shiraga boy. Sut shiraning tarkibida morfin, kodein, papaverin, tabeinga o'xshash 26 xil alkaloid bor. Ko'knor urug'ining tarkibidan 50 % gacha yuqori sifatli yog' olinadi va ovqat uchun ishlatiladi.

Qizilgulli ko'knor (*P.parsoninum*).

Bir yillik o't o'simlik bo'lib, guli qizil rangda. Apreldan boshlab chamandek ochiladigan va keng tarqalgan o'simlik. *Sharq ko'knorisi (P.orientalis)*. U bo'yi 1m ga yetadigan tukli, ko'p yillik o't o'simlik. Tojbarlari yirik, uzunligi 9 sm , to'q qizil rangli, tag tomoniga yaqinlashgan sari qora dog'li bo'la boradi. Manzarali o'simlik sifatida ekiladi.

Sharq ko'knorisi (*P.orientales*) ko'p yillik o't o'simlik. Bo'yi 1m gacha o'sadi. Gullari yirik va chiroyli, manzarali o'simlik sifatida o'stiriladi.

Remeriya avlodi (*Roemeria*).

Bu avlod vakillari barglari odatda ikki karra patsimon, chuqur qirqilgan, kichikroq, bir yillik, ikki va ko'p yillik o't o'simliklardir.



Qizg'aldoq (*R.refracta*).

Qizil gulli ko'knordan qizil tojbarning ostida qora dog'i bo'lishi va mevasining dukkakga o'xshashligi bilan farq qiladigan bir yillik o't o'simlik.

Sharq qizg'aldog'i (R.orientalis) esa tojbargi binafsha rangli, pastida dog'i yo'q , bo'yi 5-20 sm o'simlik.

Glaucium avlodi (Glaucium). Bir va ko'p yillik o't o'simlik. Ildizi sut shirasini saqlaydi. *G. elegans* va *G. fimbriigerum* turlari keng tarqalgan. Zaharli o'simlik. Tog' etaklari va adirlarda o'sadi. Bu o'simlikning barglari va poyasi oqimtir tusda.

Ko'knorining opiy beradigan navidan tibbiyotda dori sifatida ishlatiladi. Yog' beradigan navining urug'ida 48% gacha yog' bo'ladi. Urug'idan yog' olishdan tashqari, konditer sanoatida ham ishlatiladi, chunki uning tarkibida alkaloid bo'lmaydi. Lolaqizg'aldoqdan konditer sanoatida ishlatish uchun bo'yoq olinadi. Uning tojbarglarini xalq tibbiyotida qizamiq kasalligini davolashda keng ishlatiladi.

Nazorat savollari

1. Yopiq urug'lilarga tasnif?
2. Magnoliyatoifalar yoki yopiq urug'lilar bo'limining xilma-xilliligini sabablari va ularning geografik-ekologik tarqalishi. Filogeniyasi?
3. Magnoliyadoshlar oilasiga tasnif?
4. Ayiqtovondoshlar oilasiga tasnif?
5. Ko'knoriguldoshlar oilasiga tasnif?

Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o'quv qo'llanmalar ro'yxati

1. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. – T.: O'zbekiston, 2005.- 435 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A., Samatova SH. O'simliklar sistematikasidan amaliy mashg'ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
4. Ahmedov O'.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elaktron darslik.-T.: 2008.
5. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –
6. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
7. Hamidov A., Nabiev M.M. “O'zbekiston o'simliklarini aniqlagichi”.-T.: 1987.-235 b.
8. Василев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “ Высшая школа ”, 1988. -435 с.
9. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O'.A. va boshqalar. Dorivor o'simliklarning lotincha-o'zbekcha-ruscha-arabcha va forschacha-tojikcha lug'ati.-T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
10. Berezovskaya T.P., Dmitruk S.E., Grishinna e.I., Belousov M.V. Основы farmatsevticheskoy botaniki. – Tomsk: Pechatnaya manifaktura, 2004.-294 s.
11. Xolmatov X.X., Ahmedov O'. A. Farmakognoziya. 1-2 qism. – T.: “Ibn Sino” nashiryoti, 2007.- 806 b.

MA'RUZA – 15

Grechixadoshlar, choydoshlar, dalachoydoshlar, qovoqdoshlar, karamguldoshlar, gulxayridoshlar oilalari.

Ma'ruzaning maqsadi:

Grechixadoshlar, choydoshlar, dalachoydoshlar, qovoqdoshlar, karamguldoshlar, gulxayridoshlar oilalariga tasnif va ularning asosiy vakillari to'g'risida tushuncha berish.

Reja:

1. Grechixadoshlar oilasiga tasnif.
2. Choydoshlar oilasiga tasnif.
3. Dalachoydoshlar oilasiga tasnif.
4. Qovoqdoshlar oilasiga tasnif.
5. Karamguldoshlar oilasiga tasnif.
6. Gulxayridoshlar oilasiga tasnif.

Tayanch iboralar: *Grechixadoshlar oilasi: ekiladigan grechixa, movul, oddiy otquloq, rovoch, suv qalampir, toron. Choydoshlar oilasi: xitoy choyi, hind choyi, Yaponiya kamelliyasi, xitoy kamelliyasi. Dalachoydoshlar oilasi: dalachoy, qizilpoycha. Qovoqdoshlar oilasi: oddiy qovoq, oddiy bodring, eyiladigan tarvuz, qovun, qozonyuvgich. Karamguldoshlar oilasi: karam, jag' – jag', gorchitsa, qurtena, katran. Gulxayridoshlar oilasi: gulhayri, gulibaxmal, tugmachagul, kanop, g'o'za. Lotincha nomi, geografik tarqalishi, morfologik tuzilishi, ahamiyati. Gul tuzilishi. Gul formulasi.*

Grechixadoshlar oilasi – Polygonaceae

Bu oila 30 avlod, 800 ga yaqin turdan iborat. Bu oila vakillari asosan shimoliy mintaqalarda o'sadi. O'zbekistonda 7 avlod, 150ga yaqin tur mavjud. Bu oilaga asosan o't, buta, tropik mintaqalarda daraxt o'simliklar kiradi. Barglari qarama-qarshi joylashgan, ikkita pardasimon yon barglari birikib o'sib, naycha hosil qiladi.

Gullari mayda, to'g'ri, ikki jinsli yoki bir jinsli, ko'pincha murakkab tuzilgan ro'vak yoki boshhoqsimon to'pgulga yi'g'ilgan. Gullari anemofil yoki entomofil. Nektar saqlovchi qo'sh bezlari tojbarglarning tub qismida joylashgan. Gulqo'rg'oni oddiy kosachasimon yoki tojsimon, oq, yashil, pushti rangli, 3-6 tagacha, ba'zan o'zgarib, urug'i bilan saqlanib qoladi. Changchilari 6-9 tagacha, ikkita bargchadan tuzilgan. Tugunchasi ustki, bir uyali.

Mevasi ko'pincha uch qirrali, yong'oqcha, ko'plarida gulqo'rg'oni bilan o'ralgan, bu esa ularning shamol yordamida tarqalishiga moslashgan. Urug'ida unsimon endosperm rivojlangan.

Grechixadoshlar oilasiga mansub o'simliklarda ko'p miqdorda antotsionlar, pigmentlar, flavanoidlar, antraglikozidlar, oshlovchi moddalar saqlanadi.

Grechixa avlodi (Fagopyrum).

Bu avlodning vakillari bir yillik, ko'p yillik, o'simliklardir. Ularning otaligi 8ta, onaligi 3 meva bargli va 3 tumshuqli, mevasi 3 qirrali yong'oqcha bo'ladi. Gulqo'rg'oni 3 a'zoli, ikki doiradan, androtseyi ham 3 a'zoli, 2 doiradan joy olgan, genitseyi 3 a'zoli senokarp holida bo'lgan trimer gulni asosiy gul tipi deb hisoblansa bo'ladi. Bu oilaning ba'zi vakillarida otaliklarining soni 9 tagacha bo'ladi va bundan ham oshadi.

Grechixa – F. sagitatum .

Bir yillik o't bo'lib, poyasi shoxlanib o'sadi va bo'yi 70 sm gacha boradi. Bu o'simlik yuraksimon uchburchak yoki yuraxsion nayza barglar chiqaradi. Gullari qalqonsimon to'pgullarda joylashgan. Guli 5 bo'lakli oq yoki pushti rangli oddiy gulqo'rg'ondan iborat. Onaligida 3ta ustunchasi bor, ularda boshhoqsimon tumshuqcha bo'ladi. Mevasi 3 qirrali, silliq yong'oqchadir. Urug'i kraxmalli, doni uchun ekiladi va yaxshi asal beruvchi o'simliklardan hisoblanadi. Urug'i ovqatga ishlatilgani uchun "shimoliy guruch" ham deyiladi.

Tatar grechixasi – F. tataricum. Begona o't sifatida uchraydi.

Ravoch – Rheum.

Ko'p yillik, yo'g'on ildizpoyali o't o'simlik. Yer usti poyasining bo'yi 2 m gacha o'sadi. Barglari ildiz oldiga o'rnashgan, katta, barg bandi uzun va go'shtdor bo'lib, organik kislotalarga vitaminlarga hamda mineral tuzlarga boy hisoblanadi. Bahorgi barglari ovqatga

ishlatiladi va kompot, murabbo tayyorlanadi. Grechixalardan faqat ikki otaligi bilan farq qiladi, shunda guldagi otaliklar atigi 8ta bo'lib qoladi, shu bilan birga ichki gulqo'rg'on doirasining bir bargi yo'qolib, gulqo'rg'oni 5 a'zoli bo'lib qoladi.

Rheum tataricum

R. maxima, *R. tataricum* turlari ko'p uchraydi, bularning ildizlarida 10% gacha tannid moddasi bo'ladi. Ravoch turkumining O'rta Osiyoda 12 turi tarqalgan. O'zbekistonda ravoch turlari dorivor, oshlovchi, bo'yoqbop va sabzavot o'simligi sifatida foydalaniladi. *Maksimovich ravochi* (*Rh. maximovich*)ning balandligi 40-100 sm, poyasi dag'al, tubi zangsimon qo'ng'ir, barg qini bilan o'ralgan. Bo'yi 40-85 sm keladigan *yirik mevali katta bargli ravoch* (*Rh. macroarpum*) va poyasi tubidan shoxlangan, silliq poyali, balandligi 50-100sm *yuraksimon ravoch* (*Rh. cardatum*) keng tarqalgan.

Otquloq avlodi – Rumex. Bu avlodning O'rta Osiyo tog'larida 23 turi tarqalgan bo'lib, ularning aksariyat qismi ko'p yillik o't-o'simlik. Gullari ikki va ayrim jinsli. Bir yoki ikki uyli o'simliklarning turlari tog'lar, zax yerlar va ariq bo'ylarida o'sadi. O'zbekistonda 10 ta turi uchraydi. Otquloq ildizida 18% gacha teri oshlash sanoatida keng qo'llaniladigan oshlovchi tannid moddasi bor. Uning *mayda bargli otquloq* (*R. crispus*), *tugunchali otquloq* (*R. conglomeratus*), *Suriya otquloq'i* (*R. syriacus*), *shovul yoki nordon otquloq* (*R. acetosa*), *oddiy otquloq* (*R. confertis*) va boshqa turlari tarqalgan. Shovul otquloq (*R. acetosa*) ovqatga ishlatiladi.



Rumex obtusifolius



Rumex crispus

Toron avlodi – Polygonum.

Polygonum scandens L

Toron turkumining 56 turi O'rta Osiyoning cho'l, adir, tog' va yaylov zonasida keng tarqalgan. Ular bir yillik va ko'p yillik o't, buta va yarim butacha.

Polygonum polymorphum.

Turkumning asosiy turlari: *Oshlovchi toron* (*R. cariarium*). Bo'yi 60-150 sm. Ildizi yo'g'on, undan bir nechta poya chiqadi. Barg pardasi qoramtir, qo'ng'ir, 20-25 mm. To'p guli yirik, kuchli shoxlangan ro'vak, uzunligi 35 sm gacha, iyun, avgust oylarida gullab urug'laydi. Tog' zonasidagi toshloqli yoki sernam mayin tuproqli yerlarda o'sadi. Toron ildizidan 20 % gacha oshlovchi modda olinadi. Toronning O'zbekistonda *kelintil toroni* (*P. persicaria*), *qamchigul toroni* (*P. lapatifolium*) singari turlari keng tarqalgan.²⁶

Qush tili, qizil tasma – P. aviculare.

Bir yillik o't-o'simlik, poyasi yarim yotib o'sadi. Bu o'simlik hamma yerda mavjud, mollar va parrandalarga beriladi, meditsinada undan qon to'xtatadigan dori olinadi.



1. ²⁶ Hamidov A., Nabiev M.M. "O'zbekiston o'simliklari aniqdagi" -T.: 1987, 25 b.

Polygonum aviculare

Suv qalampir – P. hydropiper.

Bir yillik o't o'simlik, ariq yerlari va zax yerlarda o'sadi. Bu o'simlikdan qon to'xtatadigan dori olinadi. Gullari va barglari qalampirning mazasini bergani uchun bu o'simlik *suv qalampiri* . deyiladi

Polygonum hydropiper.

Tomir dori – P.amphibium.

Ko'p yillik ildizpoyali o't o'simlik. Ildizpoyasida 18 %, barglarida 10 % gacha dubil moddasi bo'ladi, meditsinada undan dori olinadi.

Polygonum affine.

Juzg'un avlodi (Calligonum) cho'llarda o'suvchi buta yoki daraxt o'simliklardir. Barglarining shakli o'zgarib, ipsimon shaklga kirgan. Pizil qandim (*C. caput Medusae*) va to'rsimon juzg'un (*C. canselatum*) ko'chma qumlarni mustahkamlash va to'xtatish uchun ekilmoqda.

*Tomir dori (P.amphibium), suv qalampiri (P.hydropiper), qiziltasma (P.aviculare), toron (P.coriarum)*lar tibbiyotda keng qo'llaniladi. Ulardan olingan moddalar turli kasalliklar qatori qon to'xtatishda ishlatiladi. *Xitoy yoki tangut ravochi (Rheum palmatum var. tanguticum)* ko'p mamlakatlarda madaniy holda o'stirilib, tibbiyotda ich yuritish sifatida sano bargi bilan bir qatorda ishlatiladi.

Shovullar (Rheum), taram-taram ravoch (R.undulatum), qora dengiz ravochi (R. rhaponticum) sabzavot sifatida ekiladi. Ular qandolatchilikda ham ishlatiladi. Ko'pgina grechixadoshlar serasal o'simliklardir.

Choydoshlar oilasi – Theaceae.

Bu oila vakillari ko'pincha doimiy yashil daraxt yoki butalardir. Ularning barglari oddiy, chetlari tekis, birin-ketin joylashgandir. Yonbarglari bo'ladi yoki bo'lmaydi. Gullari to'g'ri, ikki jinsli yoki ayrim jinslidir. Kosachabargchalari 5-7 ta . Tojbarglari 5ta, ba'zan 4ta yoki bir qancha va kosachabarglari singari tagi qo'shilib o'sgan yoki erkin bo'ladi. O'taligi ko'pincha cheksizdir, 5 ta bog'lam tashkil etadi va tojbarglarining tagiga birikkan bo'ladi. Onaligi 2 yoki ko'p, ko'pincha 3-5 mevbargli, tugunchasi ustki, ikki va ko'pincha 3-5 uyali, mevasi ko'sakcha yoki kamdan-kam rezavor mevadir. Bu oila 30 avlod 400 turdan tashkil topgan bo'lib, uning vakillari tropik va subtropik mamlakatlarda tarqalgan. Muhim avlodlariga choy (*Thea*) va kameliya (*Camellia*)lar kiradi.

Choy avlodi (Thea).

Bu avlod vakillari doimiy yashil buta yoki kichikroq daraxt o'simliklardir. Ularning barglari etli, ovalsimon, uchiga tomon ensizlangan va qisqa bandlidir. Barglari yoshligida tukchalar bilan qoplanib turadi, keyinchalik barg yetilganidan keyin tuklari to'kilib, yalang'och bo'lib qoladi. Gullari bittadan, tojbarglari 5-9 ta, tagi tutash, oq va sarg'ish, pushtiga moyilroq rangli bo'ladi.

Mevasi yog'ochlangan ko'sakcha, har qaysi uyasida bittadan olchadek urug'i bo'ladi.

Choy o'simligi asli Sharqiy-Janubiy Osiyodan chiqqan , bu o'simlik asosan tropik va subtropiklarda (Hindiston, Seylon, Yava, Xitoy) ko'p ekiladi. Choyning yer shari bo'yicha 4 ta turi ma'lum. Shundan ikkitasi Xitoy choyi (*Th. Sinensis*) va assam yoki hind choyi (*Th. Assana*) nam subtropik mamlakatlarda ekiladi. Hind choyi bo'yi 10-15 m balandlikdagi daraxt, barglari cho'ziq bo'ladi. Xitoy choyi esa 2-3m balandlikdagi butadir. Uning barglari esa cho'ziq tuxumsimon bo'ladi. Xitoy choyi va hind choyi gibridlari asosan G'arbiy Gruziyada, Ozarbayjonning Lenkoran rayonida, Krasnodar o'lkasining janubida ekiladi. Asli vatani Hindixitoy tog'li o'rmonlari hisoblanadi.

Nerv faoliyatini yaxshilash, hordiq chiqarish maqsadida yer kurrasining qariyb barcha aholisi tomonidan ichiladigan choy shu o'simlikning bargidan tayyorlanadi. Choy o'simligining bargida 20-28% tannidlar, 2-5% kofein, 0,01% efir moyi, C, B1,B2, K vitaminlari, rutin va organik kislotalar hamda mineral moddalar bor. Choy bargining tarkibida

5% ga qadar *tein* deb ataladigan kishining asabiga tez ta'sir qiluvchi modda mavjud. Choyning ho'l barglari yig'ilib, maxsus usulda quritiladi, undan ko'k choy va qora choy olinadi. Yer yuzining iliq, iqlimli mamlakatlarida har yili 8 mln sentner choy tayyorlanadi. Yevropaga choy birinchi bor Portugaliyaga 1517-yilda, Rossiyaga 1639-yilda keltirilgan. O'rta Osiyo bilan Xitoy savdo-sotiq ishlari 1000 yildan ortiq ekanligini inobatga olsak, xalqimizning choyni iste'mol qilish tarixi ham shu vaqtga teng desak xato qilmaymiz.

Choy plantatsiyasi.

Kamelia (*Camellia japonica*) ham shu avlodga mansubdir. Bu o'simlik chiroyli buta holida bo'ladi va asli Janubiy Sharqiy Osiyodan chiqqan. Kamelia yirik-yirik bo'ladigan oq yoki pushti rangli seryaproq gullari uchun dekorativ o'simlik o'rnida ekiladi, uning har xil navlari bor. Kamelianing gullari ostki tomonidan spiral holda joylashgan 5-8 ta tangachasimon bargchalar bilan o'ralgan, o'sha bargchalar sekin-asta kosachabargchalarga



Kamellia gullari aylanadi, shu sababli kosacha bilan tangachasimon barglar o'rtasidagi chegara hamisha ham aniq bo'lavermaydi. Ba'zan gulkosachabarglar ham asta-sekin gulbarglariga aylanadi, shu bilan birga gulbarglarning soni noaniq, ammo, odatda kamida 5ta bo'ladi. Gulbargi 5ta bo'lsa, 5ta yuqori kosachabarglar bilan navbatlashib turadi va gulqo'rg'oni ikki doirali bo'lib qoladi. Kamelianing otlagi bir talay, onaligida bir uyali tuguncha bor.

Kamellia

Dalachoydoshlar oilasi – Guttiferae.

Bu oila vakillari daraxt, ba'zan ko'p yillik o't, goho epifit va liana o'simliklardir. Ularning barglari oddiy, qarama-qarshi mutovka shaklida joylashgan, ko'pincha yonbarglari bo'lmaydi. Barglarida yorug' nuqtalar, ya'ni moy kameralari yoki hatto shoxlarga ham o'tadigan uzun-uzun moy yo'llari bor. Gullari ikki jinsli yoki bir jinsli va tog'ri, spiral holda yoki doira bo'lib, chala qalqonsimon yoki ro'vak to'pgulda joylashgan. Qo'sh gulqo'rg'onli bo'lib, kosacha va tojbarglarining soni har xildir. Tojbarglari ko'pincha 5ta, ba'zan 4ta, sariq goho qizil, to'q qizil rangda bo'ladi. Otaligi ko'p, ba'zan 16-18ta, aksari osti birikkan bo'lib, 3-5 bog'lamni tashkil etadi. Onaligi ko'pincha 3-5 uyali. Tugunchasi uch xonali, uch ustunchali va tumshuqchali. Mevasi ko'sakcha, danakcha yoki rezavor meva.

Dalachoydoshlar oilasi 47avlod 850 turdan iborat bo'lib, asosan tropik mamlakatlarda tarqalgan. Shundan O'zbekistonda faqat 3 turdan iborat dalachoy avlodi tarqalgan.



Dalachoydoshlar oilasi gullarii

Dalachoy avlodi (*Hypericum*).

Bu avlod vakillari o't yoki chala buta o'simliklaridir. Ularning barglari qarama-qarshi joylashgan, qariyb bandsiz. Gullari sariq, kosacha va tojbarglari 5tadan, otalıkları cheksiz, tagi qo'shilib o'sgan. Mevasi 3uyali ko'sakcha, urug' ko'p va endospermsizdir. Dalachoyning 3turi O'zbekiston florasida uchraydi.

Dalachoy (*H. perforatum*).

Bu o'simlik ko'p yillik o't o'simlik. Bo'yining bir qadar uzunligi, poyasining silliqiligi, to'pgulining qalqonsimon yoki dumaloq tuxumsimonligi bilan xarakterlanadi. Tojbarglari 15-20mm bo'lib, otaligi gultojidan qisqa bo'ladi. U keng tarqalgan o'simlik bo'lib, ko'proq bedapoyalarda va bog'larda begona o't sifatida o'sadi, adir va tog' zonasining sernam yerlarida keng tarqalgan. Tibbiyotda yarani bitiruvchi va qon to'xtatuvchi dori sifatida, shuningdek, bod kasalini davolashda ishlatiladi.

Qizilpoycha (*H.scabrum*).

Bu bo'yi 20-40sm keladigan tanasining hammasi g'adir-budur, ildizlari yog'ochlangan ko'p yillik o'tdir. Uning gullari sariq, otalıkları tojbarglardan uzunroq, adir va tog'larning yon bag'irlarida tarqalgan.

Choy o't – *Hypericum elogaum*.

Bo'yi 40-50 sm. Barglari qarama-qarshi o'rnashgan, gullari ro'vaksimon to'pgulda joylashgan. Tog' zonasining toshloq va mayin tuproqli yerlarida o'sadi.

Ahamiyati.

Bu oila vakillari orasida foydali vakillari ko'p. Ammo ularning dalachoylar avlodidan boshqa hammasi tropik mamlakatlarda tarqalgan. Ularning bargida efir moyi juda ko'p bo'ladi. Ba'zi vakillaridan smolali moddalar va yelim, ba'zilarining urug'idan moy olinadi. Undan tashqari uning tarkibida oshlovchi, oq bo'yoq bo'luvchi moddalar ham uchraydi. Tunda beixtiyor siyish kasaliga duchor bo'lgan bolalarga yotish oldidan dalachoyning bir stakan damlamasi ichiriladi. Tropik o'lkalarda o'sadigan talaygina vakillari qora yog'och beradigan bo'lganidan iqtisodiy jihatdan muhim ahamiyatga ega.

Ovovqodoshlar oilasi – *Cucurbitaceae*.

Qovovquldoshlar oilasi 90 turkumga mansub 800 turdan ortiq o'simlikdan iborat. Ular asosan tropik mamlakatlarda keng tarqalgan. Hamdo'stlik mamlakatlarida 14 turkumga mansub 24 turi turli-tuman ob-havo sharoitlarida o'sadi. Bu oila vakillari asosan bir yillik va ko'p yillik o'rmalab o'suvchi o't o'simliklar, ba'zan chala buta, buta va kichik daraxtlardir. Ularning barglari oddiy, navbatlashib o'rnashgan, ko'pincha bo'lakchali yoki anchagina o'yilgan, panjasimon yoki patsimon, yonbargchalari bo'lmaydi.

Ilashuvchi poyalarida barg qo'ltig'idan chiqqan oddiy yoki murakkab gajaklari bo'ladi, ular shu gajaklar vositasida tayanchlarga ilashadi. Gajaklari metamorfozga uchragan novdadir, unda metamorfozga uchragan yo bitta birinchi barg bo'ladi (bu xildagi gajak sodda gajak deb ataladi) yoki metamorfozga uchragan bir nechta barg bo'ladi (shoxlangan gajak).

Gullari yolg'iz yoki barg qo'ltig'idan to'p bo'lib chiqib, kichik simozli to'pgullardan joy olishi ham mumkin. Ko'pincha bir jinsli, aktinomorf va 4 doirali. Gulqo'rg'on a'zolari doirada 5tdan bo'lib joylashadi. Gultojisi tutash, kamdan-kam holda ayrim-ayrim tojbarglardan iborat. Changchisi 3-5 ta bo'lib, ular o'zaro har xil birikib o'sgan yoki erkin (yakka-yakka) bo'ladi. Onaligi 2-5 ko'pincha 3 mevabargli bo'ladi. Tugunchasi ostki, 3 uyali va ko'p urug' kurtakli. Mevasi yirik rezavor (qovoq deb ataladi), kamdan-kam holda ko'sak mevadir. Urug'i endospermsiz bo'ladi.

Qovovqodoshlar 90 avlod 760 turdan iborat bo'lib, yer sharining tropik va subtropik mamlakatlarida tarqalgan. Gullarining shakliga qarab, bu oila **qo'ng'iroqodoshlar** va **varonkadoshlar** oilachalariga bo'linadi.

Qo'ng'iroqodoshlarga tubandagi avlodlar kiradi:

Qovoq avlodi (*Cucurbita*).

Bu avlod vakillari bir yillik va ko'p yillik o'rmalab o'suvchi o'simliklardir. Palagi yirik, poyasining ichi bo'sh bo'ladi. Qovoqlarning anatomik tuzilishida bikollateral o'tkazuvchi bog'lamlari bo'lishi bilan farqlanadi. Gajaklari sershox, guli ayrim jinsli, qo'ng'iroqsimon va

sariq rangli. Qovoqlar Janubiy Amerikadan kelib chiqqan. Bu avlodning 23 turi bor. Shulardan 3 turi ekiladi:

Kartoshka qovoq (C.maxima).

Uning meva bandi va palagi silindrsimon. Mevasi juda yirik bo'lib, ogirligi 60-80 kg ga yetadi. Bu turning ovqatga ishlatiladigan, yem-hashak va manzarali o'simlik sifatida ekiladigan navlari bor.

Oddiy qovoq (C.pepo).

Uning palagi va meva bargini o'tkir qirrali bo'ladi. Oddiy qovoqning palak bermay, tanasi to'p bo'lib o'sadigan va mevasi cho'ziq silindrik xili "kabachki", yassi mevali xili *patison* deb ataladi.

Oshqovoq (C.moschata).

Palagi o'tmas qirrali silindrik, uzun bo'lib, meva bandi qirrali.

Varonkadoshlarga quyidagi avlodlar(turkumlar) kiradi:

Qovun(Melo), *bodring(Cucumis)*, *tarvuz(Citrullus)*, *qozonyuvgich (Luffa)* va boshqalar.

Tarvuz – Citrullus.

Poyasi palakli, tana bargini tuklar bilan qoplangan, bir va ko'p yillik. Bargini ikki qayta patsimon qirrali. Gajaklari 2-3 bo'lakchali. Gullari ikki jinsli, mayda, sarg'ish. Mevasi ko'p urug'li, sersuv, soxta meva. Unga 7 tur kiradi. Afrika va Osiyoning cho'l va chala cho'llarida tarqalgan. Ayrim turlari Afg'oniston va Hindistonda yovvoyi holda o'sadi. Tarvuz avlodining 2 turi ekib o'stiriladi. Tarvuz issiqni qovunlardan ham ko'proq talab qiladi.

Yeyiladigan tarvuz (C. edulis).

Mevalarining eti qattiq bo'ladi. Vatani Kalaxari sahrosi bo'lib, O'rta Osiyoda ko'p ekiladi.

Hashaki tarvuz (C. vulgaris).

Poyasi yo'gon bir yillik, gullari va mevalari yirik, o't o'simlik. Eti qattiq, mazasi bir oz taxir. Quruq yerlarda o'sishga moslashgan, hashaki tarvuz yem-hashak sifatida o'stiriladi.

Qovun (melo).

Mazkur avlod vakillari bir yillik, palakli, o'simlik. Gajaklari oddiy. Gullari bir va ikki jinsli. Poyasi va bargi dag'al tuklar bilan qoplangan. Urug'chi guli changchi guliga nisbatan yirik. Mevasi yirik, seret, hushbo'y, suvli va shirin. Bu avlodga 10 tur mansub bo'lib, ularning turli navlari o'stiriladi. Qovunlar Osiyoning tropik va subtropik mamlakatlarida tarqalgan.

Qovunlarning xilma-xil navlari Markaziy Osiyo respublikalari va Janubiy Qozog'istonda o'stiriladi. *Tarrak – M.flexiosus* yoki *pechak qovun* yoki *atirqovun – M. dudaim* xillari turli qit'alarda o'stiriladi.

Bodring (Cucumis).

U yer bag'irlab o'sadigan palakli o'simlik. Bargini yuraksimon 5 bo'lakli, o'tkir burchakli. Gullari ayrim jinsli. Changchi gullari shingil to'pgulda, urug'chi gullari yakka-yakka joylashgan. Gullari barg qo'ltig'ida hosil bo'ladi. Gajagi oddiy, mevasi cho'ziq, 3 uyalidir. Bu avlodga 30 tur kiradi. Afrika va Osiyoning issiq mamlakatlarida tarqalgan. Ekiladigan bodringning

Cucumis sativus L Cucumis anguria

Cucumis metuliferus.

(C. sativus) yovvoyilari no'malum. Vatani quyi Hindiston va Hindixitoy, navlari ko'p, mevasi yangiligida yeyiladi.

Qozonyuvgich (Luffa).



Luffa aegyptiaca

Luffa cylindrica

Luffaning ichki tuzlishi

Mazkur avlod vakillari bir yillik o'tsimon o'simlik. Poyasidagi gajaklari bilan ilashib o'suvchi gullari sariq, oq rangli. Mevasi cho'ziq, uch uyali, quruq meva. Qozonyuvgichlarning 7 turi ma'lum, 2 turi mochalka sifatida o'stiriladi.

Xo'jalikdagi va tibbiyotdagi ahamiyati.

Bu oilaga kiruvchi o'simliklarning ko'pchiligi oziq-ovqat, yem-hashak, dorivor va manzarali o'simliklar sifatida ishlatiladi. Tarvuzdan shinni qilinadi, urug'idan esa ovqatga va sovungarchilikda ishlatiladigan yog' olinadi. Bu oila vakillari urug'ida moy bo'lishi bilan, barcha organ va to'qimalarida achchiq glikozidlar, golotsitin, brionin, brioidin, alkaloidlardan xomen, emetin va har xil organik kislotalarning bo'lishi bilan xarakterlanadi.

Shimoliy Afrika bilan Janubiy Osiyoning sahrolarida tarvuzga juda yaqin o'simlik – kolotsint yoki kolokvint (*Citullus colocynthis*) o'sadi; uning zaharli taxir mevalaridan olinadigan ekstrakt meditsinada kuchli surgi dori sifatida qo'llaniladi. Qovoq urug'larini ham iste'mol qilsa bo'ladi, ulardan ovqatga ishlatiladigan moy ham olish mumkin. Shifokorlar me'da-ichak kasalligi bilan kasallangan bemorlarga qovoqdan tayyorlangan taomlar iste'mol qilishni tavsiya etadilar.

Qovunlar eramizdan 500-600 yil muqaddam ekila boshlagan. Hozir ularning tarkibida qandning miqdori 6-11%ga yetadi. Bodring o'simligi urug'i ham juda foydalidir.

Karamguldoshlar oilasi – Cruciferae.

Bu oilaga mansub o'simliklar bir yillik, ikki yillik o't o'simliklar, buta va chala butalardan iborat, asosan Shimoliy yarim sharning mo'tadil va sovuq iqlimli viloyatlarida tarqalgan. Bu oilaning o'stiriladigan vakillari va begona o'tlari juda ko'p. Barglari oddiy, yon bargsiz, butun yoki qirqilgan bo'lib, poyada ketma-ket joylashgan. To'pgullari asosan shingilda o'rnamashgan. Gullari aktinomorf, kamdan-kam zigomorf, ikki jinsli, gulqo'rg'oni murakkab. Gulkosa barglari 4ta erkin, tojbargi 4ta, qarama-qarshi holda butsimon joylashgan. Changchilari 6 ta, ikki guruxli, ya'ni ikkitasi qisqa va to'rttasi uzun changchi iplariga ega. Urug'chisi bitta, 2 ta meva barglarning birikib o'sishidan hosil bo'ladi, tugunchasi ustki. Gullari hashorot yordamida changlanadi. Mevalari qo'zoq yoki qo'zoqcha, ba'zan yong'oqcha. Urug'lari endospermsiz, ammo moy ko'p to'planadi. Karamdoshlar oilasi karam (*Brassica*), gorchitsa (*Sinapis*), qurtena (*Sisymbrium*), chitir (*Euclidium*), indou (*Eruca*), katran (*Crambe*), jag'-jag' (*Capsella*), lepidium (*Lepidium*), turp (*Raphanus*) turkumlariga bo'linadi.

Gul formulasi: * $\text{Ca}_4 \text{Co}_4 \text{A}_{2+4} \text{G}_{(2)}$

Jag'-jag' turkumi – Capsella

Jag'-jag' (achambiti) – *Capsella bursa pastoris*. Bir yillak, bo'yi 20 – 30 (ba'zan 60) sm ga yetadigan o't o'simlik. Poyasi tik o'suvchi shoxlangan yoki shoxlanmagan. Ildizoldi barglari bandli, cho'ziq lansetsimon bo'lib, turlicha qirqilgan barg plastinkasiga ega. Poyadagi barglari mayda bo'lib, poyada ketma-ket joylashgan. Gullari shingilga to'plangan. Mevasi – qo'zoqcha. Aprel oyidan boshlab kuzgacha gullaydi, mevasi iyundan boshlab yetiladi. Jag'-jag' o'simligi preparatlari tuqqandan keyin va bachadon kasalliklarida qon oqishini to'xtatish uchun hamda bachadon zaiflashganda uni tonuslovchi vosita sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari uning tarkibida "C" va "K" vitaminlari mavjud.

Gorchitsa turkumi – Sinapis.

Bir yillik o't o'simlik. Poya va barglari oddiy tuklar bilan qoplangan. Bu avlodga: oq gorchitsa (*Sinapis alba*), dala gorchitsasi (*Sinapis arvensis*), sarept gorchitsasi, qo'ng'ir gorchitsa (*Sinapis juncea*), qora gorchitsa (*Sinapis nigra*) kabi turlar kiradi. Gorchitsa preparatlari yallig'lanish xarakteriga ega bo'lgan kasalliklarda, miozit, bronxit va bod kasalliklarida qo'llaniladi. Uni yog'I ovqatga ham ishlatiladi.

Karam turkumi – (Brassica).

Bu avlodning vakillari bir, ikki yoki ko'p yillik o't o'simliklar. Eng muhim turlaridan biri karamdir. Bosh karam (*Brassica oleracea var capitofa*) muhim sabzavot o'simlik hisobida ekiladi.

Brassica oleracea - Bosh karam

Capsella – Jag' –jag'

O'sma turkumi – Isatis.

Bo'yoqbosh o'sma (*Isatis tinctoria*) ikki yillik o't o'simlik bo'lib bo'yi 30- 100 sm ga yetadi. Ildizoldi barglari cho'zinch'q, bandli, chetlari notekis. Poyaga o'mashgan barglari qalami-nashtarsimon yoki qalamibarg, o'troq, yubi bilan poyani bir oz o'rab turadi. Gullari sariq. Qo'zoqchasi 13-16 mm. Aprel-santabr oylarida gullab meva beradi. Asosan vohalarda madaniy va yovvoyi holda uchraydi. Bo'yoq olishda sanoatda keng foydalaniladi.

Chitir turkumi – Euclidium.

Bu turkumning keng tarqaldan turlaridan biri oq chitir (*Euclidium syriacum*) – erta bahorgi o'simlik, gullagan davrida oqsilga boy bo'ladi. Meva hosil qilgandan keyin, qattiq bo'lib efemer o'simlik hisoblanadi.

Turp turkumi – Raphanus.

Yovvoyi turp (*Raphanus raphanistrum*) bir yillik o't o'simlik bo'lib, bo'yi 20-60 sm. Poyasi bir oz tukli. Barglari qilsimon tukli, arra tishli. Poyaning uchidagi barglari butun. May-iyun oylarida gullaydi va urug'laydi.

Madaniy turp (*Raphanus sativus*) ikki yillik sabzavot o'simlik bo'lib bo'yi 80 sm.ga yetadi. Ildizi yo'g'on, etdor. Guli oq, ppushti yoki binafsha rang. Aprel-iyun oylarida gullab urug'laydi.

Xulosa qilib aytganda bu oilaga kiruvchi madaniy turlar sabzavot o'simlik sifatida, tabiiy holda o'sadiganlari tibbiyotda ishlatiladi.

Gulxayridoshlar oilasi – Malvaceae.

Bu olianing vakillari daraxtsimon, butasimin va o'tsimon o'simliklar bo'lib, eng sovuq rayonlardan tashqari hamma yerda tarqalgan. Barglari oddiy, butun, bo'lakli, uzun bandli. Barg

plastinkasining tomirlanishi panjasimon. Gullari yakka yoki to'pgulda o'rnashgan, ko'pincha barg qo'ltig'ida joylashgan. Gullari aktinomorf, ikki jinsli, gulqo'rg'ni murakkab. Gulkosachabarglari 5 ta koosachabargning qo'shilishidan, gultojbarglari 5 ta erkin, ba'zan ostki qismidan birikkan bo'ladi. Changchilari cheksiz, ba'zan chang iplari qo'shilib urig'chini o'rab oladi. Urug'chisi 3 ta mevacha bargning qo'shilishidan hosil bo'ladi, tugunchasi ustki. Mevasi ko'p urug'li ko'sak meva yoki qanoyli meva. Bu oilaga mansub ko'pgina o'simliklar ximiyaviy tomonidan yaxshi o'rganilmagan. O'rganilgan o'simliklarda fenol kislotalar, saponinlar, oshlovchi va qand moddalari, flavonoidlar, vitaminlar uchraydi. Alkaloidlar bu oilda aniqlanmagan.

Gul formulasi: * $\text{Ca}_{(5)} \text{Co}_5 \text{A}_\infty \text{G}_{(3)}$

Gulxayridoshlar oilsi quyidagi turkumlarga bo'linadi: gulxayri (Althaea), xibiskus (Hibiskus), g'o'za (Gossypium), tugmachagul (Malva), baxmalgul (Alcea), dag'al kanop (Abutilon Adans).

Gulxayri turkumi – Althaea.

Bu turkum dorivor gulxayri (Althaea officinalis), arman gulxayrisi (Althaea armeniaca), kanopsimon gulxayri (althaea cannabina) kabi turlarni o'z ichiga oladi.

Gulxayri ko'p yillik, bo'yi 150-160 sm bo'ladigan o't o'simlik. Ildizpoyasi kalta, yo'g'on. O'q ildizi 50 sm uzunlikda bo'lib, yuqori qismi yog'ochlashgan bo'ladi. Poyasi bitta yoki bir nechta, tik o'suvchi, silindirsimon, kam shoxli, pastki qismi yog'ochlashgan. Bargi oddiy bo'lib poyada bandi bilan ketma-ket joylashgan, poyaning yuqori qismidagilari butun, tuxumsimon, o'rta va pastkilari esa uch yoki besh bo'lakli, qo'shimcha bargi mayday, ingichka lansetsimonyoki chiziqsimon. Barg plastinkasi o'tkir uchli va tishsimon qirrali bo'ladi. Gullari barg qo'ltig'ida, poya va shoxlari uchida joylashgan bo'ladi. Gulkosasi ikki qavatli, pastki kosacha 8-12 bo'lakka ajralgan, ustki kosachasi esa besh bo'lakli. Kosachabarglari meva bilan qoladi. Tojbargi 5 tabo'lib, pushti rangda. Chanchilari ko'p, ipi bilan birlashib, naycha hosil qiladi.

Dorivor gulxayri – Althaea officinalis

Urug'chi tuguni 15-25 xonali, ustki. Mevasi yassi, yumaloq, serurug, quruq meva. Gulxayri ildizi preparatlari o'rab oluvchi, balg'am ko'chiruvchi hamda yallig'lanishga qarshi dori sifatida ishlatiladi.

Tugmachagul turkumi – Malva.

Tugmachagul bir yillik o't bo'lib bo'yi 10-40 sm. Poyasi yer bag'irlab, ba'zan bi oz ko'tarilib o'sadi, shoxlangan. Barglari uzun bandli, 5-7 bo'lakli. Gullari barg qo'ltig'ida joylashgan, gulbandli. Guli pushti. Aprel-sentabr oylarida gullab urug'laydi. Sug'oriladigan va bahorikor yerlarda o'sadi. Begona o't.

G'o'za turkumi – Gossypium.

G'o'za turkumidan oddiy g'o'za (Gossypium nirsutum), misr g'o'zasi (Gossypium barbadense), jaydari g'o'za (Gossypium herbaceum) kaki turlar kiradi.

G'o'za 1-2 m keladigan bir yillik o't o'simlik sifatida o'stiriladi. Poyasi shoxlangan. Bargi besh, ba'zan uch bo'lakli bo'lib, poya va shoxlariga bandi bilan ketma-ket joylashgan. Guli ko'p va yirik bo'lib, yakka holda uzun bandlari bilan barg qo'ltig'iga joylashgan. Gulkosachasi yashil rangli va ikki qavatli: tashqi tomonidabir-biri bilan birlashmagan uchta kosachabargi, ichki tomonida bir-biri bilan birlashgan 5 ta kosachabargi bo'ladi. Gultojisi varonka shaklida bo'lib, 5 ta alohida-alohida bo'ladi. Tojbargning rangi g'o'za turiga qarab och sariqdan to sariq rangacha bo'ladi. Tojbargning rangi otalaninsh jarayonidan keyin ham o'zgaradi. Changchilari ko'p sonli, bir-biri bilan birlashib urug'chini o'rab oladi. Mevasi 3-5 xonali, pishganda ochiladigan ko'sak. G'o'za urug'i (chigit)dan o'sib chiqqan tuklar paxta deyiladi. Tibbiyotda



oddiy paxta kompress qilish uchun ishlatiladi. Bu o'simlikni sanoatda, xo'jalikda va tibbiyotdagi o'rni beqiyosdir.



G'o'za turkumi - Gossypium

Nazorat savollari

1. Grechixadoshlar oilasiga tasnif bering?
2. Grechixadoshlar oilasiga kiruvchi avlodlarga tasnif bering?
3. Grechixadoshlarning tibbiyotda va xo'jalikda qanday ahamiyati bor?
4. Choy avlodining asosiy xarakterli belgilari va ularning qanday vakillarini bilasiz?
5. Dalachoy avlodiga tasnif va uning vakillaridan qaysilarini bilasiz?
6. Qovoq avlodiga mansub o'simliklariga tasnif bering va ularning tibbiyotdagi va xo'jalikdagi ahamiyatini ayting?
7. Karamguldoshlar oilasiga xarakteristika va asosiy vakillarini ayting?
8. Gulxayridoshlar oilasiga umumiy xarakteristika va muhim ahamiyatga ega bo'lgan vakillarini ayting?

Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o'quv qo'llanmalar ro'yxati

1. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. – T.: O'zbekiston, 2005.- 435 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A., Samatova SH. O'simliklar sistematikasidan amaliy mashg'ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
4. Ahmedov O'.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elektron darslik.-T.: 2008.
5. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –
6. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
7. Hamidov A., Nabiev M.M. “O'zbekiston o'simliklarini aniqlagichi”.-T.: 1987.-235 b.
8. Василев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “ Высшая школа ”, 1988. -435 с.
9. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O'.A. va boshqalar. Dorivor o'simliklarning lotincha-o'zbekcha-ruscha-arabcha va forsha-tojikcha lug'ati.-T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
10. Berezovskaya T.P., Dmitruk S.E., Grishinna e.I., Belousov M.V. Основы farmatsevticheskoy botaniki. – Tomsk: Pechatnaya manifaktura, 2004.-294 s.
11. Xolmatov X.X., Ahmedov O'. A. Farmakognoziya. 1-2 qism. – T.: “Ibn Sino” nashiryoti, 2007.- 806 b.

MA'RUZA 16

Atirguldoshlar, selderguldoshlar, dukkaldoshlar, ituzumdoshlar, yasnotkaguldoshlar va astraguldoshlar oilalari.

Ma'ruzaning maqsadi:

Karamguldoshlar, gulxayridoshlar, atirguldoshlar, selderguldoshlar, dukkaldoshlar, ituzumdoshlar, yasnotkaguldoshlar va astraguldoshlar oilalariga tasnif ularning asosiy vakillari to'g'risida tushuncha berish.

Reja:

1. Atirguldoshlar oilasiga tasnif.
2. Tobulg'iguldoshlar va Itburunlar(atirgullilar) kenja oilalari vakillari
3. Olma va olxo'rigullilar kenja oilasiga kiruvchi vakillari
4. Selderguldoshlar oilasiga tasnif.
5. Dukkaldoshlar tartibiga tasnif.
6. Mimosagullilar oilasiga tasnif.
7. Kapalakgullilar oilasining vakillari.
8. Tsezalpingullilar oilasiga tasnif.
9. Ituzumdoshlar oilasiga tasnif.
10. Yasnotkaguldoshlar (labguldoshlar) oilasiga tasnif.
11. Astraguldoshlar oilasiga tasnif.

Tayanch iboralar :*Atirguldoshlar oilasi: na'matak, malina, er tut. Olmaguldoshlar oilasi: olma, nok, behi, do'lana. Olho'riguldoshlar oilasi: bodom, tog'olcha, o'rik, olcha, shaftoli o'simliklar. Dukkaldoshlar tartib va uning oilalari: akatsiya, sano, tikan daraxti (gledichiya), no'xat, chuchukmiya, beda, termopsis. Selderguldoshlar oilasi: qora zira, sassiq kavrak, dorixona ukropi, kashnich, sabzi. Ituzumdoshlar oilasi: ituzum, bangidevona, mingdevona, belladonna, fizalis, garmdori, chin tamaki, chilim tamaki, pomidor, baqlajon, kartoshka. Yasnotkaguldoshlar oilasi: yalpiz, dorivor mavrak. Astraguldoshlar oilasi: kungaboqar, bo'tako'z, romashka, qoqio't, topinambur (ernok), bo'ymadaron, shuvoq, sachratqi.*

Atirguldoshlar oilasi – Rosaceae.

Bu oilaga kiruvchi o'simliklarning hayotiy shakllari doim yashil yoki barglarining to'kadigan daraxt, buta, ko'p yillik o't o'simliklaridan iborat. Barglari turli shakllarda bo'lib, oddiy va murakkab, yon bargchali bo'lib poyada ketma-ket joylashgan. Murakkab barglari asosan uch yoki toq patsimon. Gullari to'pgul yoki yakka o'rnashgan, ikki jinsli, aktinomorf, murakkab gulqo'rg'onli. Gulkosasi 4-5 ta bargchaga ega, kosacha barglarining soni ikki barobar ortganda ost kosacha hosil qiladi. Gultojbarglari erkin o'sadi, 4-5ta. Changchilari 5 -10 tadan doira bo'lib joylashgan. Urug'chisi bitta ba'zan ko'p. Ra'noguldoshlarning gullaridagi xarakterli xususiyat ularni boshqa oilalardan ajratib turadi. U ham bo'lsa, guldon-gipantiya. Guldon o'ziga hos bo'lib, gulkosacha, tojbarglarning chanchi bilan gul o'rin to'qimalarini birlashishidan vujudga keladi. Gipantiya-guldonning shakllari turlicha: likopcha, kosacha, qo'ng'iroqcha, tekis, do'ng bo'lishi mumkin. Gul tuguni ustki va yarim pastki bo'lishi mumkin. Asosan hashoratlar bilan changlanadi. Mevalari bargmeva, ko'sakmeva, yong'oqcha, pista, olma, danakli meva, to'pmeva va soxta meva. Urug'lari endospermsiz. Bu oilaning

vakillari har xil qandlarga, vitaminlarga, turli fermentlarga, organik kislotalar va efir moylariga boy. Atirguldoshlar oilasi xo'jalik ahamiyatiga ega bo'lgan xilma-xil meva daraxtlar hamda manzarali o'simliklarni o'z ichiga oladi. Atirguldoshlar oilasining gullari, mevalari turli xilda bo'lgani uchun ular 4 ta kenja oilaga bo'linadi:

1. Tobulg'iguldoshlar – Spiraeoideae – $\text{Ca}_{(5)} \text{Co}_{(5)} \text{A}_{\infty} \text{G}_{6-10}$
2. Itburunlar(atirgullilar) – Rosoideae – $\text{Ca}_{(5)} \text{Co}_5 \text{A}_{\infty} \text{G}_{\infty}$
3. Olma gullilar – Pomoideae – $\text{Ca}_{(5)} \text{Co}_5 \text{A}_{\infty} \text{G}_{(5)}$
4. Olxo'ri gullilar – Prunoideae – $\text{Ca}_{(5)} \text{Co}_5 \text{A}_{\infty} \text{G}_1$

Tobulg'iguldoshlar kenja oilasi – Spiraeoideae

Oila vakillari buta o'simliklardir. Barglari oddiy yoki murakkab, gullari mayday, sochoq yoki qalqonsimon to'pgulda joylashgan. Mevalari bargmeva. Bu kenja oilaga tobulg'i avlodi (Spiraea) kiradi. Bu avlod vakillari barglari butun, cheti tekis yoki tishli. Tugunchasi bir nechta urug'chidan tashkil topgan – murakkab, mevasi ham murakkab: bir nechta mevacha yeg'indisidan tashkil topgan, ularning hammasi gulning ustidan ko'rinib turadi. Gullari oq, pushti yoki qizil. Urug'lari qanotsiz. Bu turkum yapon tobulg'isi (S. japonica), o'rtancha tobulg'i (S. media), dalachoybarg tobulg'i (S. hypericifolia), tukdor tobulg'i (S. pilosa) kabi turlarni o'z ichiga oladi.

Itburunlar(atirgullilar) kenja oilasi - Rosoideae

Bu oilaning vakillari buta, chala buta, o't o'simliklardir. Barglari poyada ketma-ket joylashgan bo'lib toq patsimon, murakkab yoki o'yilgan oddiy bo'lib yon bargchalarga ega. Bu kenja oilaning gul formulasiga nazar solar ekanmiz ularning urug'chisi ko'plagini bilishimiz mumkin. Shu belgisi bilan atirguldoshlar oilasining boshqa kenja oilalaridan farqlanib turadi. Bu kenja oila malina (Rubus idaeus), qulupnay (Fragaria), g'ozpanja (Potentilla), na'matak yoki itburun (Rosa) turkumlrini o'z ichiga oladi.

Malina turkumi – Rubus idaeus.

Boyi 1-2 m ga yetadigan yarim buta. Ildizpoyadan ikki yillik yer ustki novdalar o'sib chiqadi. Birinchi yilgi novdalari yashil, yog'ochlanmagan, mayday tikanli bo'lib, meva qilmaydi. Bu poya qishga borib yog'ochlanadi, tikanlari ham yo'qoladi va kelasi yili iyun-iyul oylarida gullaydi. Mevasi pishgandan keyin eski poyasi qurib qoladi. Ildizpoyadan har yili yangi poyalar o'sib chiqadi. Barglari toq patli murakkab, 5-7 ta bargchadan tashkil topgan bo'lib, poyada uzun bandi bilan ketma-met joylashgan. Poyaning yuqori qismidagibarglari ko'pincha uch plastinkali bo'ladi. Bargchasi tuhumsimon, yuqori tomoni tuksiz, pastki tomoni esa tukli. Qo'shimcha barglari ipsimon shaklga ega. Gullari ko'rimsiz, yashil-oq rangli, qalqonsimon ro'vakka to'plangan. Gulkosasi 5 ta qirqilgan, meva bilan birga qoladi. Tojbargi 5 ta, otaligi va onaligi ko'p sonli. Mevasi – qizil rangli, danakli, murakkab ho'l meva. Quritilgan mevalari turli shamollash kasalliklarida terlatuvchi dori sifatida qo'llaniladi. Ho'l mevadan tayyorlangan sharbat farmasevtikada suyuq dorilar ta'mini yaxshilash uchun ishlatiladi.

Qulupnay turkumi – Fragaria

Bu turkumga o'rmon qulupnayi (yertut) – Fragaria versa turini misol qilib olsak, u ko'p yillik, bo'yi 5-20 sm bo'lgan qo'ng'ir rang ildizpoyali va mayday ildizli o't o'simlik. Barglari uzun bandli, uch plastinkali. Gullari yirik, uzun bandli. Mevasi – tuxumsimon yoki keng ellipsimon, qizil rangli, gul o'rnidan hosil bo'lgan soxta meva. Bu o'simlik barg va mevasidan dorivor preparatlar tsinga va boshqa avitominoz kasalliklarida, siydik haydovchi dori sifatida, podagrada, kam qonlikda, bachadondan qon oqishini to'xtatish uchun yara, teri va boshqa kasalliklarni davolashda ishlatiladi.

G'ozpanja turkumi – Potentilla.

Bu turkumga sharq g'ozpanjasi (*P. orientalis*), pakana g'ozpanja (*P. supina*), tik o'suvchi g'ozpanja (*P. erecta*), osiyo g'ozpanjasi (*P. asiatica*) va boshqa turlarni o'z ichiga oladi.

Tik o'suvchi g'ozpanja lo'p yillik, bo'yi 15-20 sm ga yetadigan o't o'simlik. Poyasi ko'tarilib o'suvchi yoki tik o'suvchi, yuqori qismi shoxlangan. Poyadagi barglari doimo uch plastinkali, ketma-ket joylashadi. Bu o'simlikning dorivor preparatlari burushtiruvchi va antiseptic dori sifatida og'izning shilliq qavatlarini yallig'lanishida va anginada og'iz chayish uchun ishlatiladi.

Na'matak yoki itburun turkumi - Rosa



Na'matak – Rosa



Umumiy ko'rinishi va mevasi

Na'matak turlari bo'yi 2 m ga yetdigan tikanli buta. Novdasi egiluvchan bo'lib, yaltiroq, qo'ng'ir-qizil va qizil-jigarrang tusli po'stloq bilan qoplangan. Barglari (5-7 ta) tuxumsimon shaklli va arrasimonqirrali. Gullari yirik, yakka yoki 2-3 tadan shoxlarga o'rnashgan. Guli qizil, pushti, sariq yoki oq rangli, hushbo'y hidli. Guloldi barglari lansetsimon. Kosacha va toj bargi 5 tadan, otalik va onaliklari ko'p sonli. Mevasi – gul o'rnidan hosil bo'lgan shirali soxta meva. Ichida onaliklaridan hosil bo'lgan bir nechta haqiqiy meva - yong'oqchalar bor. Yong'oqcha o'tkir uchli, sertuk bo'lib, burchaksimon shaklga ega. Na'matak turlari o'rmonlarda, ariq bo'ylatida, butalar orasida, tog'larning quruq toshloq yon bag'irlarida va boshqa yerlarda o'sadi. Uning ayrim turlari bir-biridan mevasining, novda po'stlog'idagitikanning rangi, shakli, katta kichikligi hamda novdadagi tikanlar soni va joylashishiga qarab farq qiladi.

Olma gullilar kenja oilasi – Pomoideae

Bu kenja oila vakillari daraxt, ba'zan buta o'simliklardir. Barglari asosan oddiy plastinkasi butun yoki qirg'ilgan. Urug'chi tugunchasi ostki, kosachabarg soxta meva hosil bo'lishida ishtirok etadi. Bu kenja oilga kiradigan o'simliklar, asosan mo'tadil iqlimli kenglikda o'sadigan mevali o'simliklardir. Olmagullilar kenja oilasi olma (*Malus*), nok (*Pirus*), bexi (*Cydonia*), do'lana (*Crataegus*) turkumlarni o'z ichiga oladi.

Olma turkumi – Malus.

Bu avlod daraxt va buta o'simliklarni o'z ichiga oladi. Barglari tuxumsimon, ostki tomoni bir hujayrali, soyabon to'pgulga o'rnashgan. Urug'chining ustunchalari 5 ta bo'lib yarmigacha birikib o'sgan bo'ladi. Changchilari ko'p bo'lib 18-50 tagacha, chang xaltachalari sariq tusda. Mevasida 5 – 15% qand, olma kislotasi, temir, pectin moddalari bo'ladi.

Bu avlodning keng tarqalgan turlari uy olmasi (*M. domestica*), do'lana olma, xitoy olmasi (*M. prunifolia*).

Nok turkumi - Pirus

Bu avlod vakillari barglari asosan, butun, faqat bir qismigina patsimon bo'lingan. Novdalari tikansiz. Mevasi bandiga qarabingichkalashadi. Barglari oddiy, gullari esa shoda to'pgulga joylashgan. Changchilarining chang xaltalari binafsha tusda. Urug'chining ustunchalari 5 ta erkin o'sgan. Mevasida tosh xujayralari bo'ladi. Bu avlodning ahamiyatli vakillari oddiy nok (*P. communis*), turkman noki (*P. turkomanica*).

Do'lana turkumi - *Crataegus*

Do'lana turlari bo'yi 5 m ga yetadigan buta yoki kichik daraxt. Novdalari qizil yoki kul rangli bo'lib, siyrak joylashgan yo'g'on, qattiq, 2.5-4 sm uzunlikdagi tikanlar bilan qoplangan. Bargi oddiy, tukli, teskari tuxumsimon yoki romb shaklda, uncha chuqur bo'lmagan 3-7 bo'lakli (bo'laklari arrasimon qirrali) bo'lib, poyada bandi bilan ketma-ket o'rnashgan. Qo'shimcha barglari o'roqsimon yoki qiyshiq yuraksimon shaklli va yirik tishsimon qirrali. Gullari qalqonsimon to'pgulni hosil qiladi. Mevasi to'q qizil, qora, sariq yoki to'qsariq tangli, sharsimon, ellipsimonyoki tuxumsimon shaklli, 2-5 ta danakli ho'l meva. Do'lananing mevasi tarkibida triterpin saponinlar, xlorogen, kofe kislota, efir moyi va boshqa moddalar bor. Do'lananing dorivor preparatlari yurak kasalliklarida ishlatiladi.

Olxo'ri gullilar kenja oilasi – Prunoideae

Daraxt va buta o'simliklar bo'lib barglari oddiy, butun, poyada ketma-ket joylashgan. Gullari yakka yoki oddiy soyabon to'pgulda joylashgan. Hashoratlar yordamida changlanadi. Mevalari danakli. Olxo'ri gullilar kenja oilasi bodom (*Amygdalus*), tog'olcha (*Prunus*), o'rik (*Armeniaca*), shaftoli (*Persica*), olcha (*Cerasus*) turkumlarini o'z ichiga oladi.



Olcha - *Cerasus*



Shaftoli - *Persica*

Bodom avlodi – *Amygdalus*

Bodom daraxtining bo'yi 2-5, ba'zan 8 m bo'ladi. Novdalari qizg'ish jigarrang, shoxlarining po'stlog'I kulrang-qo'ng'ir, tanasiniki esa qoramtir. Bargi oddiy, lansetsimon yoki ensiz ellipsimon, o'tkir uchli, cheti esa o'tmas, mayday tishsimon bo'lib, bandi bilan poyada ketma-ket o'rnashgan. Gullari oq yoki och pushti rangda bo'li, shoxlarida yakka-yakka joylashgan. Mevasi qiyshiq yoki choziq tuxumsimon danakli meva. Bodomning ikki tur xili uchraydi,

ularni faqat mag'izini achchiq –chuchukligiga qarab ajratish mumkin: chuchuk bodom – *A. communis* L. varietas D. C. va achchiq bodom – *A. communis* L. varietas amara D.C.

Po'sti olib tashlangan chuchuk bodom urug'idan tayyorlangan emulsiya me'da-ichak og'riqlarini qoldirish uchun, moyi esa ich yumshatuvchi dori sifatida qo'llaniladi. Farmasevtikada bodom moyi ba'zi dorilar (kamfora va boshqalar) ni eritish hamda surtma tayyorlash uchun ishlatiladi.

Xulosa qilib aytganda atirguldoshlar oilasiga kiruvchi o'simliklarning ko'pchiligi iste'mol qilinadi, vitaminlar, efir moylari, yog'lar olinib, ular tibbiyotda atir-upa sanoatida qo'llaniladi.

Selderguldoshlar (soyabonguldoshlar) oilasi - Apiaceae.

Bu oilaga kiradigan o'simliklarning ko'pchiligi o'tsimon o'simliklar bo'lib, chala buta va buta o'simliklari kam uchraydi. O'tsimon o'simliklar asosan shimoliy yarim sharning mo'tadil iqlimli zonasida, buta va chala buta o'simliklari esa tropik va subtropik mamlakatlarda o'sadi.



Selderguldoshlar oilasi – Apiaceae

Barglari navbat bilan joylashgan, yonbargsiz, chetlari tekis yoki bir necha joyidan chuqur qirg'ilgan bo'lib poyani qinlari bilan birmuncha o'rab oladi. Poyaning er ustki qismini ichi kovak, unda moy yo'llari bor, bo'g'im va bo'g'im oraliqlari bilinib turadi. Gullari mayda bo'lib, soyabonsimon to'pgullarga to'planadi. Murakkab soyabonning asosi gulyonbarglardan iborat umumiy o'rama ichiga olingan, soyabonlarning asosida ham mana shunday kichik o'ramachalar bor. O'rama va o'ramachalarning shakli, kattaligi va qay xilda joylashganligi o'simliklarni to'g'ri sistemasiga imkon beradigan muhim belgi hisoblanadi. Gullari aktinomorf, ikki jinsli, ba'zan bir jinsli (bir yoki 2 uyli) lari ham uchraydi. Ba'zi bir o'simliklarda to'pgullarning chetidagi tashqi toj barglar ichkaridagilarga qaraganda yirikroq bo'ladi. Gul kosachalari juda ham qiyalangan, kosachasi 5 tishli, mayda ko'pincha rivojlanmay ham qoladi. Toj barglari 5 ta, tutashmagan, uchi gulning ichkarisiga qarab bukilgan bo'ladi. Otaligi ham 5 ta, g'unchada toj bargiga o'xshab ichkari tomon qaragan holda yotadi. Urug'chisi 2 meva bargli, tugunchasi ostki, 2 uyali, har qaysi uyasi bir urug'kurtakli. Tuguncha 2 ustunchali bo'lib, har qaysi ustunchaning asosini nektardon o'rab turadi. Gullari proteandrin tipda (otaliklari onaliklaridan ilgari etiladi), hashoratlar yordamida chetdan changlanadi. Mevasi pishgandan keyin 2 ta meva chaga ajralib, karnoforda, ya'ni ipsimon qo'shoq meva band uchida bir qancha vaqt osilib turuvchi qo'sh pistachadir. Urug'i endospermli va mevaqati bilan zich qo'shilib o'sgan. Selderguldoshlar oilasi 3500 taga yaqin turni o'z ichiga olgan. Gul formulasi: $\text{Ca}_{(5)} \text{Co}_5 \text{A}_5 \text{G}_{(1)}$

Bu oilaning katta ahamiyatga ega bo'lgan turlari quyidagilardir:

Sabzilar avlodi - Daucus

Bu avlod vakillari 2 yillik va ko'p yillik o't o'simliklardir. Ularning gullari 1 yoki 2 jinsli, oq yoki sarg'ish, o'rtasidagi gullari qizil rangda. Mevasi cho'ziq, 5 ta tikanaksimon qovurg'ali. Bu avlod 60 turdan iborat. Shimoliy yarim sharda, shu jumladan O'zbekistonda ham tarqalgan.

Yovvoyi sabzi (*D. carota*). Yevropa va Osiyo mamlakatlarida uchraydi. 2 yillik o't o'simlik. Bu sabzi ildizining dag'al va mayda bo'lishi bilan ekma sabzidan farq qiladi.

Ekma sabzi (*D. sativus*) 2 yillik o'simlik. Chala buta va buta o'simliklari kam uchraydi. O'tsimon o'simliklar asosan shimoliy yarim sharning mo'tadil iqlimli zonasida, buta va chala buta o'simliklari esa tropik va subtropik mamlakatlarda o'sadi. Birinchi yili uzun bandli 2-3 marta patsimon qirqilgan to'pbarg va ildizmeva hosil qiladi. Ikkinchi yili sershox poya chiqaradi va oq gullar hosil bo'ladi. Mevasi o'ziga xos hidli ingichka o'tkir tikanchalar bilan qoplangan. Shuning uchun bular o'zaro bir-biriga yopishishadi. Sabzi sabzavot sifatida va mollarga oziqa sifatida ekiladi.

Kashnich (*Coriandrum sativum*). U gullari oq 2 jinsli, urug'i silliq, bir oz dumaloq yoki ovalsimon, barglari qirqilgan bir yillik tuksiz yashil o'simlikdir. Vatani O'rta dengiz. Kashnich mevasida 0,8% gacha korindrin efir moyi bor. 18% gacha yog' bo'lib, u sovun ishlab chiqarishda va to'qimachilik sanoatida ishlatiladi. Bargi taomlarga ko'k sifatida ishlatiladi.

Petrushka (*Petroselinum crispus*). U ildizlari urchiqsimon, barglari 2-3 marta patsimon qirqilgan, gullari sarg'ish, oq, qizg'ish tusli 2 yillik o'simlik. Uning hamma qismi yoqimli hid va ta'mga ega. Urug'ida efir moyi bor.

Tmin yoki qora zira (*Carum*). Bu ko'p yillik yoki 2 yillik, ko'pincha tunganaksiz o't o'simlikdir. Barglari 2-3 marta patsimon qirqilgan. Gullari 2 jinsli oq pushti yoki qizil rangli. Mevasi cho'ziq, yonidan siqilgan, egatidagi moy yo'llari bitta. Urug'ining ich tomoni yassi. 2 ta turi (*C. carvi* va *C. atrisanguineum*) O'zbekiston florasida tarqalgan. Birinchi turi 2 yillik tuksiz o'simlik. U guli oq yoki pushti, bo'yi 40-60 sm poyasi yakka egatli ichi bo'sh ayri bo'lib shoxlangan. Urug'i cho'ziq xushbo'y hidli, jigarrang. Tog'li rayonlarda o'sadi.



Ukrop – *Foeniculum*



Selder – *Apium*

Dukkaklilar tartibi - Fabales.

Bu tartibga kiradigan o'simliklar daraxtlar, lianalar, butalar va o'tlar holida bo'lib, odatda qatorma-qator turadigan yonbargli murakkab barglar chiqaradi. Gullari pentamer (ba'zan tetramer), zigomorf yoki aktinomorf bo'lib, dumaloq gulqo'rg'oni besh a'zoli doiralardan tashkil topgan changchilari va bir a'zoli urug'chisi bor. Gul tugunchasi yuqori tomonda, bir uyada. Bu tartibga o'simliklarning eng tipik belgisi mevalarning loviya shaklida (yoki loviyaga o'xshaydigan boshcha shaklda) bo'lishidir.

Dukkaklilar tartibi 3 ta oilaga bo'linadi:

1. Mimosagullilar oilasi – Mimosaceae – $\text{Ca}_{(5)} \text{Co}_5 \text{A}_\infty \text{G}_1$
2. Kapalakgullilar oilasi – Papilionaceae – $\text{Ca}_{(5)} \text{Co}_{1+2+(2)} \text{A}_{(9)+1} \text{G}_1$
3. Tsezalpingullilar oilasi – Ceasalpiniaceae – $\text{Ca}_{(5)} \text{Co}_{(5)} \text{A}_{10} \text{G}_1$

Mimosagullilar (Mimosaceae) oilasi.

Bu oilaga kiradigan o'simliklar asosan daraxtlar holida bo'lib, yonbarglari bor, patsimon yoki qo'shpatsimon murakkab barglar chiqaradi. Gullari aktinomorf, ahyon-ahyonda zigomorf va mayda-mayda bo'lib, kallak yoki boshoqsimon to'pgul hosil qiladi.

Gulqo'rg'onidan ochiq rangli uzun-uzun otalik iplari chiqib turadi, o'sha iplarning ochiq rangi(sariq, pushti yoki qizil) changlovchi hashoratlarni jalb qiladi. Gulqo'rg'oni qo'shaloq yoki gultoji taraqqiy qilmay qolganligi natijasida ba'zan oddiy bo'ladi.

Kosachabarg asosan beshta (lekin, ko'pincha to'rtga, uchta yoki oltita) bo'lib, bir-biriga qo'shilib, goho qo'shilmay o'sadi. Gulbarglarining soni kosacha barglarning soniga baravar, ular qo'shilmagan yoki ba'zan bir-biriga birmuncha o'sgan bo'ladi.

Otaliklarining soni turlicha. Ba'zi avlodlarida ularning soni kosachabarglar soniga baravar bo'lsa, ba'zilarida ikki marta ko'p, yoki bir talay. Otalik iplari goho mutlaqo erkin tursa, goho qo'shilib o'sib naycha hosil qiladi, yoki gultoj bilan qo'shilib ketgan bo'ladi. Birdan-bir meva bargchasi ustki, tugunchali, bir uyali onalik hosil qiladi. Mevasi loviya shaklida bo'lib, ochiladi.

Mimosagullilar oilasining vakillari ikkala yarim sharning tropik va subtropik zonalarida keng tarqalgandir. Bu oilaning eng katta vakili akatsiya (Acacia) avlodiga taxminan 500 tacha tur kiradi, ularning yarmidan ko'prog'i Avstraliyada tarqalgan.



MIMOSA PUDICA



ACACIA NEGEV

Avstraliyada o'sadigan akatsiyalar ko'pincha plastinkalari hiyla yoki tamoman reduktsiyalangan, bandi vertikal tekislikda keng tortgan barglar chiqaradi (fillodiy), bu assimilyatsiya qiladigan yuza yetarli darajada keng bo'lgani holda bug'lanishning haddan tashqari kuchayishiga yo'l qo'ymaydi. Akatsiya (Acacia) avlodining turlari Afrikada ham keng tarqalgan bo'lib, barglarini to'kadigan tropik daraxtlari o'rmonlarda uchraydi va savannalarga manzara berishda xissa qo'shadi. Afrika akatsiyalari ba'zan tepasidan bosilgandek bo'lib ko'rinadigan g'alati shox-shabba chiqaradi, soyabon akatsiya deb shuni aytiladi. Ba'zi akatsiyalarning yonbarglari tikanga aylangan, ularni ichi kavak bo'lishi ham mumkin, ichi kovak shunday tikanlar chumolilarga in bo'ladi. Chumolilar barglarning uchida bo'ladigan yassi qsimon alohida ortiqlar to'qimasi

(oziqli tanalar) bilan oziqlanadi, o'sha tanalarda azotli moddalar bilan moy bo'ladi. Talaygina akatsiyalar gulli moddasini beradi, ayniqsa senegal akatsiyasi (*Acacia arabia*) va boshqa ba'zi turlari, shu jihatdan juda qadrlil va qimmatli mahsulot beradi. Akatsiyalardan olinadigan gummi texnikada Gummi arabicum deb ataladi. Akatsiyalarning po'stlog'ida oshlovchi moddalar ko'p, bu moddalar import qilinib Yevropaga keltiriladi.

Kapalakgullilar (*Papilionaceae*) oilasi.

Bu oilaga kiradigan o'simliklar o'tlar, yarim butalar, goho daraxtlar holida bo'lib, yonbargli patsimon yoki barmoqsimon murakkab, ba'zan oddiy barglar chiqaradi. Gullari odatda o'rtacha yoki mayda bo'ladi, gullari mayda bo'lsa, odatda shingil, ba'zan boshcha, soyabon yoki boshhoqsimon

To'pgul holida bo'lib turadi. Gulning tuzilishi juda tipikdir. Beshta kosachabargi qo'shib o'sgan va goho aktinomorf, goho zigomorf. Gulning 5 ta gulbargidan elkan deb ataladigan orqa bargi hammasidan katta bo'lib ajralib turadi, uning yuqori qismi (qayirmasi) bandchasiga nisbatan deyarli to'g'ri burchak ostida joy oladi. Elkanning chetlari bandchani eshkak yoki qanotlar deb ataladigan ikki yonbargini yopib turadi, bu barglar assimetrik tuzilgan. Qanotlar, o'z navbatida ikkita pastki barglarni qoplab turadi, bu barglar ham assimetrik tuzilgan bo'lib, bandchasi bor, ular boshdan oyoq yoki faqat yuqori qismdan bir-biriga qo'shib o'sadi va qayiqcha deb ataladigan bir tuzilma hosil qiladi. Gulning otaligi 10 ta, gulida otaligi 9 ta yoki 5 ta bo'ladigan kapalakgullilar oilasi kamdan-kam istisno tariqasidagina uchraydi. Ko'pincha 9 ta otalik iplari onalik atrofida bir-biri bilan qo'shib, tutashmas naycha hosil qiladi, qo'shib o'smay, erkin turadigan 10-otalikning birmuncha keng tortgan, ipi o'sha naychani tirqishini yopib turadi. Ahyon-ahyonda 10 ta otalikning hammasi bir-biri bilan qo'shib ketadi, yoki aksincha, hammasi erkin qoladi.

Onaligi, dukkaklilarning hamma vakillaridagidek, bir uyali, ustki tugunchasi bor bitta meva bargchadan iborat. Mevalari ikki palla bo'lib ochiladigan loviya shaklida, ular quruq yoki ba'zan suvli bo'ladi. Ba'zan loviya holiday mevalar ochilib, munchoqsimon bo'lib qoladi va bir mevali bo'g'implarga bo'linadi. Ba'zi kapalakgullilar oilasining mevalari mayda, bir urug'li, ya'ni yong'oqchaga aylangan bo'ladi. Kapalakgullilar oilasining ko'pchiligi hashoratlar bilan changlanadi, gullarning murakkab tuzilganligi ham shunga bog'liq. Ochiq rangli guljojida elkan qayirmasi yaqqol bo'lib ko'rinib turadi: changlovchi hashoratlarni jalb etishda shu tuzilma asosiy rolni o'ynasa ajab emas. Kapalakgullilar oilasi o'zining xo'jalikda tutgan ahamiyati jihatidan yopiq urug'li o'simliklarning eng muhim oilalaridan biridir. Ularning ahamiyati birinchi galda kapalakgullilarning va umuman dukkaklilarning *Bacterium radiclecola* degan umumiy nom bilan ataladigan bakteriyalar bilan birga yashashga bog'liq. *Bacterium radiclecola* turlari orasida fiziologik jihatdan mustaqil bo'lgan bir qancha formalar borki, ularning har biri kapalakgullilar oilasining ma'lum bir turlari yoki tur guruxlari bilan birga yashaydi. Ildiz tuklari orqali tuproqdan birlamchi ildiz po'stiga o'tadigan tugunak bakteriyalarning urchishi natijasida ildiz parenximasi o'sib qalinlashadi va tugunaklar deb ataladigan o'simtalar hosil qiladi. Ildizdan joy oladigan bakteriyalar atmosferadagi azotni (uning zapasi tuganmasdir) juda yaxshi o'zlashtira oladi va shu azotni tabiatda biologik moddalar almashinuviga kiritadi. Tugunak bakteriyalar ishlab chiqaradigan oqsil moddalarni dukkakli o'simliklar o'zlashtiradi, shunga ko'ra azot kam tuproqda ham yaxshi o'saveradi. Dukkakli o'simlikning ildizi va boshqa qismlari chiriganda birikmalar holida to'plangan organik azot zapasi tuproqqa o'tadi va chirib hamda boshqa bakteriyalar ishtiroki bilan yashil o'simliklarga azotli oziq beradigan manba bo'lib qoladi.

Dukkaklilar tartibi turlarining yarmidan ko'prog'ini o'z ichiga oladigan kapalakgullilar oilasi butun yer yuzidagi o'rta iqlimli mamlakatlarga tarqalgan bo'lib, o't va butasimon formalar

ko'rinishida o'sadi, ammo kapalakgullilar orasida tropiklarga yaqin joylarda, asosan daraxtlar hoida o'sadigan vakillar ham uchraydi. Kapalakgullilar oilasi odatda ikki gruppaga bo'linadi: a) otaliklari erkin turadigan kapalakgullilar oilasi va b) 10 ta otalikning hammasi yoki ko'pincha faqat 9 tasi qo'shylib o'sadigan va 10-si erkin qolib, otalik naychasi tirqishini berkitib turadigan kapalakgullilar. Birinchi gruppaga kiradigan kapalakgullilar oilasi *Caesalpiniaceae* ga hammadan yaqin turadi va shu o'simliklar vositasi bilan atirgullilar oilasiga bog'lanadi.

Kapalakgullilar oilasi orasida oziq - ovqat bo'ladigan o'simliklardan quyidagilar ayniqsa muhimdir.

No'xat (*Pisum sativum*) juft patsimon barglar chiqaradigan o'tsimon o'simlikdir, barglari yirik yonbargli bo'ladi va uchidan shoxlangan jingalaklar chiqaradi, gullari oq. No'xat ovqatga ishlatilishi jihatidan juda katta ahamiyatga ega, chunki urug'lari oqsillarga boyligi jihatidan go'shtga yaqin turadi (lekin dukkaklilarning oqsillari hayvon oqsillariga nisbatan kamroq xazm bo'ladi), bundan tashqari, talaygina kraxmali bo'ladi.

Ba'zi navlarning mevalari shakarga boy bo'ladi va yetilmagan hoida ovqatga ishlatiladi. No'xatning asosiy mahsuloti (urug'i) dan tashqari yer ustki vegetativ qismlaridan ham foydalaniladi, ular oqsilga boy bo'lganidan qimmatli em-xashak o'rnini bosadi. No'xat ko'p azot to'playdigan o'simlik bo'lgani uchun, keyin ekiladigan o'simliklarning hosiliga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Loviya (*Phaseolus vulgaris*) ning bir qancha navlari bor, ular urug'larning katta-kichikligi, shakli va rangi bilangina emas, balki quruqlikka chidamligi, tezpisharligi bilan ham ajralib turadi va hokazo. Bu o'simlikning ona vatani janubiy Amerikadir degan ma'lumotlar bor. Loviya ko'pincha janubiy rayonlarda ekiladi, shimolda havoning nam va salqin bo'lshi loviyaning o'sishiga to'sqinlik qiladi. O'rta Osiyoda loviyaning alohida bir turi mosh (*Phaseolus Mungo*) ko'p tarqalgan, mosh ham ovqatga ishlatiladi.

Yeryong'oq (*Arachis hypogara*) - o't o'simligi bo'lib, juft patsimon barglar va sariq gullar chiqaradi. Guli ochilib to'kilgandan keyin tuguncha bandi (ginofor) cho'zilib, pastga qayriladi, natijada tuguncha tuproqqa kiradi va shu yerda loviyasimon meva tugadi. Meva yoni quruq bo'lib yuzasi turlaydi. Har qaysi mevada (dukkakda) bir nechtadan doni bo'ladi. Donida 55% ga yaqin moy va 25-35% oqsil bor. Yeryong'oqdan olinadigan moy eng yaxshi o'simlik moylaridan hisoblanadi va zaytun moyidan uncha qolishmaydi.

Sebarga (*Trifolium*) uch qo'shaloq (ba'zan besh qo'shaloq) g'alati barglar chiqaradigan o't o'simliklarini o'z ichiga oladi. Boshcha-boshcha bo'lib turadigan gullari birmuncha mayda va qizil, pushti oq, goho sariq va qo'ng'ir bo'ladi. Mevalari bitta ba'zan 2-6 ta urug' tugadigan va sal yoriladigan loviya holidadir. Qishloq xo'jaligida qizil sebarga yoki yovvoyi sebarga (*Trifolium pratense*) katta ahamiyatga ega.

Termopsis (*Thermopsis lanceolata*) -qirlarda, Volga bo'ylarida, Sibir va O'rta Osiyoda ko'p uchraydi va ba'zan begona o't hoida o'sadi.

Bu o'simlikdan yo'talga qarshi dori olinadi, shu bilan birga termopsisning chetdan keltiriladigan ipekakuana ildizining o'rnini bosa olishi hozir aniqlangan.

Bo'yoq beradigan drok (*Genista tinctoris*) - qirlarda, qisman o'rmonlarda o'sadigan buta o'simlikligining shingil - shingil sariq gullaridan och sariq rangli yaxshi bo'yoq olinadi. Tropik, qisman subtropik mintaqada ko'p ekiladigan *Indigofera tinctoria* indigo degan aynamas ko'k bo'yoq beradi.

Kapalakgullilarning ba'zi daraxtsimon formalari juda qattiq, qimmatli yog'och beradi;masalan, qizil sandal daraxti va afrika qora daraxti shular jumlasidandir.

Bizda o'sadigan sariq akatsiya (*Caragana arborescens*) va shunga yaqin turadigan derez (*G. frutex*) turi yashil devor qilib ekiladi.

Bir yillik kapalakgulli o'simliklardan lyupin (*Lupinus*) o't o't o'simlik bo'lib, barmoqsimon-murakkab g'alati barglar chiqaradi. Gullari oq, sariq yoki ko'p rangda, shingil -shingil bo'lib turadi. Qishloq xo'jaligida sariq lyupin (*L.luteus*), ingichka bargli lyupin (*L. angustifolius*) va oq lyupin (*L. albus*) ning ahamiyati bor. Lyupinlar ikki jihatdan ahamiyatga ega. Ular juda ko'p azot to'playdi, shunga ko'ra qum tuproqli ariq yerlar ham azotga ancha boy bo'lib qoladi. Ikkinchi tomondan, lyupinlar oqsilga juda boy bo'lib, yaxshi em - xashak o'rnini bosadi.

Tsezalpingullilar (*Cesalpiniaceae*) oilasi.

Bu oilaga kiradigan o'simliklar daraxtlar, lianalar, butalar goho o'tlar holida bo'ladi va ketma-ket joylashgan, qo'sh patsimon, goho oddiy barglar chiqaradi (oddiy barglar murakkab barglarning reduksiyanishi natijasida yuzaga keladi) va hamisha yonbarglari bo'ladi. Gullari ba'zan deyarli aktinomorf, lekin odatda zigomorf, siklik bo'lib, odatda besh a'zoli, ba'zan to'rt a'zoli doiralardan tashkil topadi. Kosachabarglari odatda erkin turadi. Gulbarglarning soni kosachabarglarning soniga teng yoki undan kamroq, ular katta-kichik bo'ladi, shu bilan birga orqa tomondagi eng yirik gulbargi yon gulbarglarning chetlari bilan qoplanib turadi, yon gulbarglarini esa pastki gulbarglar bekitib turadi. Otalıkları o'nta bo'lib, ikkita doira hosil qiladi. Ular bir-biriga qo'shilmaydiyu, lekin iplari ba'zan bir-biriga birmuncha qo'shilib o'sadi. Ba'zan otalıklar butunlay reduksiyanib ketadi, natijada changchilari besh a'zoli bo'lib qoladi. Onaligi bir uyali, tugunchasi bor meva bargchadan iborat bo'lib, ba'zan gul o'rnida hosil bo'lgan band chiqaradi. Mevasi ba'zan ochiladigan ba'zan ochilmaydigan loviya shaklida. Ba'zi vakillarining urug'i endospermlidir.

Shimoliy Amerikada o'sadigan gledichiya degan daraxt (*Gleditschia trianthos*) juda diqqatga sazovordir, bu daraxt uzunligi 10 santimetrdan oshadigan oddiy yoki shoxlangan tikanlar chiqaradi. Gledichiya Krim, Kavkaz va O'rta Osiyoda dekorativ daraxt o'rnida o'stiriladi, bu o'simlik yaxshi asal beradi, uni Ixoto o'rmonlari barpo qilishda ko'plab ekiladi.

Ituzumdoshlar oilasi – Solanum.

Bu avlod vakillari gullari to'g'ri tuzilgan, oq, ko'k, qizil, binafsha, sariq rangli, gulto'ji yulduzsimon, qisqa naylidir. Otaligi 5 ta, bandi qisqa, changdoni chetlari bilan birlashib nay hosil qiladi. Changdoni uchidagi teshikchalari orqali yorilib, ochiladi. Urug'lari endospermlı. Bu gulli o'simliklarning eng yirik avlodlaridan bo'lib, 1300 dan ortiqroq turni o'z ichiga oladi. Uning vakillari asosan markaziy va janubiy Amerikada, Afrikada, bir qismi Yevro Osiyo va Amerikaning o'rta iqlimli zonalarida o'sadi. Ituzumning MDX florasida 18, O'zbekistonda 7 turi uchraydi. Dexqonchilikdagi bir necha muhim o'simliklar shu avlodga kiradi.

Gul formulasi: $\text{Ca}_{(5)} \text{Co}_{(5)} \text{A}_5 \text{G}_{(2)}$



S. tuberosum

S. melongena

Nicotiana

Kartoshka- *S. tuberosum*. Bu yer ostidagi ipchalarda o'zgargan ildizpoya tuganaklar hosil qiladigan ko'p yillik o't o'simliklardir, to'p gullari murakkab gajak, gullari to'g'ri tuzilgan oq sariq, pushti va och binafsha rangli, gulto'ji voronkasimon. Changdoni sariq, mevasi 2 uyali, kattaligi olchadek, yashil rangli rezavor meva. Kartoshkaning vatani Janubiy Amerika bo'lib, 16 asr oxirlarida Yevropaga keltirilgan.

Tuganagida 12-25% kraxmal, 2% chamasida moy, shu miqdorda oqsil hamda "A", "B₁", "B₂", "B₆", "C", "K" vitaminlari bo'lganligidan bir yillik sabzavot va texnika o'simligi sifatida yer sharining ko'p qismida ekiladi. Kartoshka yovvoyi holda janubiy markaziy Amerikaning And tog'larida o'sadi. Rossiyada 18 asrdan boshlab, O'zbekistonda esa 19 asrning 2 yarmidan ekila boshlandi. Kartoshkaning 2000 dan ortiq navi bor. Dunyo dexqonchiligi bo'yicha kartoshka ekiladigan maydon 20 million ga etadi. O'zbekistonda kartoshkaning ertagi navlaridan Kurer, Nimrang, Epikuo, Ekron, Pochki navlaridan Lorx, Qaychi barg,

Gollandskiy va boshqalar ekiladi.

Ituzum - *S. nigrum*. Bu bir yillik, mevasi dumaloq, urug'i sariq begona o'tdir. U hamma yerda uchraydi. Bizda mevasi qora ituzum o'sgan joylarda qizil mevali ituzum ham o'sadi. Har ikki turning mevasida "S" vitamini juda ko'p.

Pomidor avlodi. Ituzumlarga eng yaqin avlod hisoblanadi.

Pomidor – *L. esculentum*. Bu mayin tukli o'ziga xos hidli, bir yillik o'simlikdir. Barglari uzuk-uzuk katta qismi toq patsimon, bo'lakchalarga bo'lingan. Gullari murakkab yoki oddiy gajak yoki shingil tipida to'pgul hosil qiladi. Gulto'ji sariq, changdonlari yonidagi tik yoriqchalar orqali ochiladi. Mevasi sersuv mevadir. Vatani janubiy Amerikadir. U erda ko'p yillik o'simlik hisoblanadi va daraxtga o'xshash turlari yovvoyi holda o'sadi. Navlari g'oyat ko'p bo'lib, keng miqyosda ekiladi. 16 asrning oxirida (1569 yil) pomidor urug'i ekib, tajriba qilish maqsadida Angliyaga keltiriladi. Pomidor Rossiyada ham birinchi marta 1780 yili ekilib ko'riladi. Odessada 1850 yildan ekila boshlaydi. 19 asrning 1 yarimlaridan boshlab

O'rta Osiyoda ham ekila boshlaydi. Pomidorning mevasi "C", "B₁", "B₂", "B₆", "P", "PP", "K" vitaminlarga va karotinga (provitamin A) juda boydir. O'zbekistonda pomidorning tez pishar navlaridan Bizon va sporka-grebovakiy, kechpishar navlaridan Chudo-Riika, Budyoka, Maglob va boshqalar ekiladi.

Garmdori avlodi-Capsicum. Bu avlod 30 turdan tashkil topgan. Ularning Vatani Janubiy Amerikaning shimolidir. U yerda bir necha turlari ekiladi va yovvoyi holda o'sadi.

Qalampir- *C. annum*. Bu bir yillik, poyasi tik chiqqan ayri-ayri bo'lib o'sgan o't o'simlikdir. Gullari och xira, oq yoki binafsha rangli, mevasi cho'ziq konussimon, tuxumsimon, sharsimon, ko'pincha och qizil rangli rezavor mevadir.

Mevasi vitamin "A","C"ga boyligi jihatidan (270 mg% gacha) sabzavot o'simliklari orasida birinchi o'rinda turadi. Vatani Mexikadir. Uning navlari ko'p. Achchiq navlarida kapsitsin alkaloidi ko'p bo'ladi, ziravor sifatida ishlatiladi. Shirin navlari esa salat va do'lma qilib ovqatga ishlatiladi.

Belladonna – Atropa belladonna. Bu mevasi olchaga o'xshash, ammo 2 uyali, ko'p urug'li, suvli rezavor - meva hamma qismi zaxarli o't o'simlikdir. Qrim, Kavkaz va Karpat tog'larida o'sadi. Ba'zi tadqiqotchilar Kavkazda o'suvchi belladonnani alohida mustaqil tur deb hisoblaydilar. Bu eng muxim dori o'simliklardan bo'lib, Ukrainada ekiladi. Hamma organida ham atropin, giosiamin, beladonain, skopolamin alkaloidi bor.

Mingdevona avlodi – Hyoscyamus Bu avlod vakillari 11 turdan iborat zaharli begona o'tlar bo'lib, Yevropada, Osiyoda va Shimoliy Amerikada tarqalgandir. MDX florasida 8, O'zbekistonda 5 turi bo'lib bulardan qora mingdevona ayniqsa ko'p tarqalgan, bu barglari yirma, tuxumsimon, chetlari o'yilgan, patsiz tanasi yopishqoq bezlar bilan qoplangan. Ikki yillik o't o'simlikdir. Gullari biroz zigomorf tuzilgan gajaksimon to'p gul hosil qiladi. Kosachasi ko'sakchasimon, tishlari keng uchburchakli. Gultoji och sariq, bo'g'zi qoramtir ko'k rangli taram-taram, binafsha tomirli. Mevasi uchidagi bo'rtganroq qopqoqchasi orqali ochiluvchi ko'p urug'li ko'sakcha, ko'sagi cho'ziq idishga o'xshash bo'lganidan mingdevona, ba'zi yerlarda shayton kosa ham deb ataladi. Barglari va tanasi tibbiyotda keng qo'llaniladi.

Bangidevona avlodi – Datura Bu avlod vakillari 15 turdan iborat o't va butalardir. Ular ko'proq issiqroq mamlakatlarda tarqalgan. Mevasi sirtidan tikanli ko'pincha to'rt pallaga bo'linuvchi, kosachasi tag qismida qoluvchi ko'p urug'li ko'sakdir. O'zbekistonda 4 turi bor, shundan oddiy bangidevona (D.stramonium) juda ko'p tarqalgan. Oddiy bangidevonaning guli oq, yakka-yakka voronkasimon, xila yoqimsiz hidli, poyasi yashil, yuqori qismi ayri bo'lib shoxlangan bir yillik o't o'simlikdir. Qishloqlarda xonadonlar tevaragida, xususan axlatlar tashlangan yerlarda begona o't sifatida g'o'zalar orasida o'sadi. Hamma qismi zaharli atropin, giossiamin, sikopolamin alkaloidlari bor. Barglari tibbiyotda ishlatiladi. Mollar tegmaydi.

Tamaki avlodi - Nicotiana. Bu avlod 40dan ortiqroq turdan iborat bo'lib, asosan Amerikada, bir qismi boshqa qitalarda tarqalgan. Tamaki buta yoki o't o'simlik bo'lib, gullari yirik, gultoji varonkasimon, nayi varonkasimon yoki qo'ng'iroqsimon bo'ladi. Mevasi tuxumsimon yoki qariyib sharsimon, mayda urug'li ko'sak bo'lib, uchidan yorilib 2 yoki 4 pallaga ajraladi. Tamakining 2 turi bir yillik o'simlik sifatida ekiladi.

Ituzumguldoshlarning xo'jalikdagi ahamiyati.

Bu oilaga qarashli turlari dexqonchilikda muhim ahamiyatga ega. Chunki kartoshka, pomidor, baqlajon, qalampir, pag'-pag' va shu kabilar keng miqyosda ovqat va sabzavot o'simligi sifatida ekiladi. Belladonna, mingdevona, bangidevona, skapoliya va boshqalar dorivor o'simlik sifatida ekiladi. Tamaki va moxorkalar narkotik o'simlik sifatida ekiladi. Tamakining urug'idan tamaki yog' olinadi. Moxorka bargidan limon kislotasi olinadi. Ituzumdoshlarda har xil zaharli alkaloidlar -salonin, leropin, giossiamin va boshqalar, ba'zan glikozidlar bo'lganidan ularning ko'pchiligi zaharli bo'ladi. Shu sababdan mollar emaydi, bular orasida ituzum, bangidevona, mingdevona, oq shingil va boshqa begona o'tlar ham uchraydi.

Yasnotkaguldoshlar (labguldoshlar) oilasi – Lamiceae.

Bu katta oilaga o't, chala buta va buta o'simliklari kiradi. Poyasi 4 qirrali, barglari qarama-qarshi joylashadi. Yon barglari bo'lmaydi. Gullari zigomorf, ikki jinsli, gultojisi 2 ta toj bargining qo'shilib o'sishidan vujudga kelgan bo'lib, qalpoqsimon yoki yassi shaklda bo'ladi. Ostki lab 3 ta toj bargdan vujudga kelgan bo'lib, yotiq holatda yoki pastga egilib turadi va aksariyat o'simliklarda bu toj barglarning o'rtadagisi 2 ga ajralgan bo'ladi. Kosachalari besh

tishli, barglari qo'shilib o'sgan bo'lib ba'zan ikki labli bo'ladi va lablarning ustki 3 ta toj bargdan, ostkisi 2 ta toj bargdan tuziladi, changchilari 4 ta gultoj naychasiga qo'shilib o'sadi va oldingi 2 tasi keyingi 2 tasiga qaraganda uzunroq bo'ladi. Ba'zan 2 tagina changchi bo'lib, qolgan changchilar reduksiyalangan,

Urug'chilari 2 ta mevacha bargdan tuzilgan tugunchali ustki 4 uyalidir. Gullarning bandi juda qisqa bo'lib gullar uchki barglarining qo'ltiqida oddiy to'pgullarga to'plangan bu kichik to'p gullar esa shingil boshcha yoki ro'vakga o'xshash murakkab to'pgullar hosil qiladi. Gulning changgi tumshuqchasidan oldin etiladi. Gullar hashorotlar yordamida chetdan changlanadi. Mevalari bir urug'li 4 ta yong'oqchaga ochiladi. Urug'ida endosperm bo'ladi. Labgullilarning aksari turlari efir moyli o'simliklardir. Labgullilar oilasining 200 turkumi va 3500 turi bor. Ular butun yer yuzining deyarli hamma joyida uchraydi va o'rmon, dasht, sahro va tog'larda o'sadi. Gul formulasi $Ca_{(5)} Co_{(2/3)} A_4 G_{(2)}$



Yalpiz - Mentha

Mavrak turkumi - (Salvia). Ko'p yillik o't, chala buta o'simliklar. Uning Osiyoda 20 dan ko'p turi uchraydi. Ular tog'li rayonlarda ko'p tarqalgan. S.officinalis turi dori tayyorlashda ishlatiladi.

Yalpiz turi (Mentha) –Ko'p yillik o't o'simliklari bo'lib efir moylidir. Bu oilaning vakillari asosan zax yerlarda, ariq va kanal bo'ylarida tarqalgan. O'zbekiston florasida Osiyo yalpizi (M.asiatica) keng tarqalgan. Cho'l yalpiz (M.arvensis) va jingalak yalpizlar (M. crispa) ekiladi.

Oddiy rayhon-(Acimum basilicum). Bir yillik o't o'simlik, uning oq rayhon, qora rayhon, osh rayhon turlari ma'lum. Ular ziravor va xushbo'y o'simlik sifatida ekiladi.

Yasnotkalar turkumi-Lamium. Bir va ko'p yillik o't o'simliklar. O'zbekiston florasida pushti yasnotka (L.amplexicanle) va oq yasnotka (L.alba) turlari begona o't sifatida o'sadi. L.alla dori tayyorlashda ishlatiladi. Ular asal beruvchi o'simlik hisoblanadi.

Kiyik o'tlar turkumi-Ziziphora. Bular tarkibida efir moylari bor, bir yillik va ko'p yillik o'tlardir.

Tog' jambili (origanum)- Faqat bir turi (o.thyantum) O'zbekiston florasida tarqalgan.

Lavanda turkumi-Lavandula. - Asl lavanda L.vera, bu gullari ko'p yoki to'q binafsha rangli juda xushbo'y hidli chala butadir. Efir moyi olish uchun Qrimda, Kavkazda va Moldaviyada ekiladi. Efir moyidan odikalonlar tayyorlanadi. Qurtilgan gullari kiyimlarni kuyadan saqlash uchun sepiladi.

Yasnotkaguldoshlarning (Labguldoshlarning) xo'jalikdagi ahamiyati. Bu oila vakillari efir moyiga boy bo'lgandan ularning ko'pgina vakillari efir moyi olish uchun ekiladi. Masalan: Mavrak(muskat mavragi), lavanda va boshqalar. Bulardan olingan efir moyi atir - upa sanoatida, ovqat va likyor-arog ishlab chiqarish sanoatida qo'llaniladi. Bir necha turlari

masalan: tog' jambuli, logaxilus, limon o'ti, dorivor mavrak, arslonquyruq va boshqalar tibbiyotda ishlatiladi. Yalpiz, osh rayhon, jambul va boshqalar ovqat mazasini yaxshilashda ishlatiladi.

Astraguldoshlar (Murakkabgullilar) oilasi –Asteraceae (Compositae)

Astraguldoshlar (murakkabgullilar) - eng katta o'simliklar oilasi bo'lib, 800 dan ortiq avlodni va 14 mingdan ko'proq turni (ba'zan sistematiklar hisobicha hatto 25 ming turni) o'z ichiga oladi, bu oilaning ko'pchilik vakillari o'tlar, ba'zilar yarim butalar, butalar va xatto kamdan kam daraxtsimon o'simliklardir. Ko'pchiligining barglari navbatma navbat joylashgan yon bargsiz. Bu oilaning nomi savatchasimon to'pgullarga qarab qo'yilgan, ularning to'pguli sirtidan qaraganda alohida-alohida guldek bo'lib ko'rinadi. Gul savatchalari o'z navbatida talaygina vakillarda murakkab supurgisimon, qalqonsimon to'pgullar hosil qiladi va hakoza. Savatchaning asosida (past tomonida) mayda - mayda bargdan tuzilgan va to'pgulga zich taqalib turgan o'rama bor, bu tuzilmani hosil qilgan barglar talaygina vakillardan cherepitsaga o'xshab joy oladi va yashil yoki boshqa rangda bo'ladi, ular turmushda yanglishib gulkosacha deb o'ylaydilar. Gul o'rni yassi tarelkaga o'xshaydi. Yoki bo'rtgan yo bo'lmasa botiq bo'ladi: ba'zan avlodlarda gul o'rin yalang'och, boshqalarda esa tokchalar yoki tukchalar bilan qoplangan. Gullari 4 doirali, 5 a'zoli (genetsiydan boshqasi), ko'pchiligida mayda-mayda bo'ladi: ba'zilarida savatchadagi gullarining hammasi bir xil, boshqalarida esa tashqi gullari ichki gullaridan farq qiladi. Tipik gul kosachasi yo'q, ba'zi vakillarida tugunchasining uchida gul kosachabargida to'g'ri keladigan 5 ta pardachasimon o'simta bor, ko'pchiligida (lekin hammasida emas) .



Gulkosachaga to'g'ri keladigan bir talay sodda yoki murakkab tukchalar, goho ipchalar bo'ladi, ular mekada saqlanib qoladi va o'sib, popuk yoki qanotchaga aylanadi, bular mevalarning shamol yordamida tarqalishiga yordam beradi. Gul tojbarglari hamisha qo'shilib o'sadi, har xil shaklda, aktinomorf yoki zigomorf bo'ladi. Gultojsi tuzilishiga ko'ra 4 xil tipda bo'ladi:

1. Naysimon - aktinomorf, ikki jinsli, tojbarglari 5 ta, birlashgan. Changchilari 5 ta urug'chisi ikkita meva bargning qo'shilishidan hosil bo'lgan. Tugunchasi ostki. Naychasimon gullar savatchaning (kungaboqar) o'rtasida joylashgan bo'ladi.

2. Varonkasimon – zigamorf, jinssiz yani changchi va urug'chisi bo'lmaydi. Tojbarglari varonkasimon 5 ta birlashgan. Bu gullar meva bermasdan, hashoratlarni jalb qilish uchun xizmat qiladi. Bunga bo'tako'zning chetki gullari misol bo'ladi.

3. Tilsimon – zigamorf, ikki jinsli, gultoji tilsimon bo'lib 5 ta tojbargning birikishidan hosil bo'lgan. Changchilari 5 ta birlashgan, urug'chilari esa 2 ta meva bargning birikishidan hosil bo'lgan. Meva beruvchi gul hisoblanadi. Bularga qoqi o't, sachratqi va bo'ztikanlar misol bo'ladi.

4. Soxta tilsimon – zigamorf, bir jinsli ya'ni urg'ochi gul. Gultojsi 3 ta gultojbargning birikishidan hosil bo'lgan. Ular 2 labli bo'lib, ustki 2 ta labi reduksiyalangan, pastki 3 ta labi birlashgan. Tashqi ko'rinishidan chin tilsimon gullarga o'xshaydi, lekin undan tishning uchta bo'lishi hamda savatchaning chetida joylashishi bilan farq qiladi. Soxta tilsimon gullar rangli bo'lib, hashoratlarni jalb etadi. Bunga moychechak, kungaboqarlarning chekka gullari misol bo'ladi.

To'rt xil gulning ichida naychasimon qadimiy hisoblanadi. Qolgan uch xili tabiiy tanlanish jarayonida biologic moslanish natijasida naychasimon guldan kelib chiqqan mevasi bir urug'li pista. Urug'i endospermsiz.

Astragullilarda kaychuk to'playdigan smola yo'llari, sut naychalari mavjud. Ildizlarida inulin to'playdi.

Kungaboqar avlodi – Helianthus



Helianthus



Achillea

Oddiy kungaboqar (*H. annuus*) – bir yillik o't o'simlik, urug'ida 35-47% moy bor. Poyasi 3-4 m gacha tik o'sadi. Barglari oddiy, butun qirrali, poyaga ketma-kret joylashgan, poyaning ostki bo'g'inlarida barglari esa qarama-qarshi o'rinishi mumkin. Poya va barglari bezli va qattiq tuklar bilan qoplangan. Savatchalarida ikki xil gullar bor. Markazida naychasimon, chetlarida esa soxta tilsimon gullar joylashgan. Savatchalari ikki qavat o'rama barglarga ega. Savatchada 200-1000 tagacha guli bo'ladi.

Bo'tako'zlar avlodi – Centaurea

Bu kattagina avlodning ko'pchilik turlari o'rta dengiz oblastlarida uchrasa, 100 ga yaqin turi boshqa joylarda uchraydi. Ularning savatchasi chetidagi gullari shaklan voronkaga o'xshaydi va jinssiz bo'ladi.

Sikoriylar avlodi – Cichorium Bu kichkina avlodning sobiq ittifoqning o'rta va janubiy mintaqasida yalangliklarda, yo'l chetlarida yovvoyi holda o'sadigan (*C. intybus*) ko'proq tarqalgandir. Bu ko'p yillik o'simlik, chiroyli, havo rang gullar chiqaradi va yo'g'on ildizli xillari bir yillik ekin tariqasida ekiladi. Uning ildizlari qovurilib surogat kofe o'rnida ishlatiladi, shuningdek tabiiy kofega qo'shiladi (10-20%) shunda kofe ancha qorayadi va mazasi taxirroq bo'lib qoladi. (Glikozid intibit). Bu avlodning endiviy degan boshqa turi sabzavot qatorida ekiladi.

Nazorat savollari

1. Olxo'ri gullilar kenja o'lsi va ularning vakillari?
2. Selderguldoshlar oilasiga umumiy xarakteristika va muhim ahamiyatga ega bo'lgan vakillarini ayting?
3. Dukkaklilar tartibiga umumiy xarakteristika va ular qaysi oilalarga bo'linadi?
4. Mimosagullilar oilasiga umumiy xarakteristika va ularning qaysi vakillarini bilasiz?
5. Kapalakgullilar oilasiga umumiy xarakteristika
6. va ularning asosiy vakillari?
7. Tsezalpingullilar oilasiga umumiy xarakteristika va ularning asosiy vakillarini ayting?
8. Ituzumdoshlar oilasiga xarakteristika va asosiy vakillarini ayting?
9. Yasnotkaguldoshlar oilasiga umumiy xarakteristika va asosiy vakillari?
10. Astraguldoshlar oilasiga umumiy xarakteristika va bu oilaga kiruvchi vakillarini gul tuzilishini ayting?

Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o'quv

qo'llanmalar ro'yxati

1. Яковлев Г. П., Челомбитко В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. – T.: O'zbekiston, 2005.- 435 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A., Samatova SH. O'simliklar sistematikasidan amaliy mashg'ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
4. Ahmedov O'.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elaktron darslik.-T.: 2008.
5. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –
6. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
7. Hamidov A., Nabiev M.M. “O'zbekiston o'simliklarini aniqlagichi”.-T.: 1987.-235 b.
8. Василев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “ Высшая школа ”, 1988. -435 с.
9. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O'.A. va boshqalar. Dorivor o'simliklarning lotincha-o'zbekcha-ruscha-arabcha va forsha-tojikcha lug'ati.-T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
10. Berezovskaya T.P., Dmitruk S.E., Grishinna e.I., Belousov M.V. Основы farmatsevticheskoy botaniki. – Tomsk: Pechatnaya manifaktura, 2004.-294 s.
11. Xolmatov X.X., Ahmedov O'. A. Farmakognoziya. 1-2 qism. – T.: “Ibn Sino” nashiryoti, 2007.- 806 b.

Ma'ruza № 17

mirtadoshlar, jo'kadoshlar oilasi. Bir pallalilar sinfi. Loladoshlar, piyozdoshlar qiyokdoshlar va g'alladoshlar oilalari.

Ma'ruzaning maqsadi:

Mirtadoshlar va jo'kadoshlar oilasining umumiy tasnifi, tuzilishi, vakillari, tibbiyotdagi va xo'jalikdagi ahamiyati. Bir pallalilar sinfiga qisqacha tasnif. Loladoshlar, piyozdoshlar, qiyokdoshlar va g'alladoshlar oilalariga tasnif va ularning asosiy vakillari to'g'risida

Reja:

1. Mirtadoshlar. Jo'kadoshlar oilasining umumiy xarakteristika
2. Bir pallalilar sinfiga qisqacha tasnif.
3. Loladoshlar oilasiga tasnif.
4. Greyg lolasi, daraxtsimon aloy
5. Piyozdoshlar oilasiga tasnif.
6. Sarimsoq piyozi
7. May marvaridguli
8. Dorivor sarsabil
9. Qiyokdoshlar oilasiga tasnif.
10. G'alladoshlar oilasiga tasnif.
10. Makkajo'xori o'simligi
11. Suli o'simligi

Tayanch iboralar: *mirtadoshlar oilasi, mirta, evkalipt o'simliklari, jo'kadoshlar oilasi, yuraksimon jo'ka Lolaguldoshlar oilasi: kaufman shirachi, olcha shirachi, sariq savrinjon, grey lolasi, Farg'ona lolasi, kaufman lolasi. Piyozguldoshlar oilasi: oddiy piyoz, sarimsoq piyoz, apteka sarsabili. Bardidoshlar oilasi: qum rangi, iloq, tuganakli salomalaykum. G'alladoshlar oilasi: bambuksimonlar, tariqsimonlar, qo'ng'irboshsimonlar. Bambuksimonlar oilasi: bambuk, saza, arundinariya, filostaxis. Tariqsimondoshlar oilasi: ekiladigan makkajo'xori, oddiy jo'xori, oq jo'xori, g'umoy, shakarqamish, ekiladigan sholi.*

Mirtadoshlar Myrtaseae- oilasi. Bu oilaga kiradigan o'simliklar daraxt vabutalar xolida bo'lib, qarama-qarshi joylashgan. yonbargsiz barglar chiqoradi. To'qimalarida doimo efir moy chiqoradigan dumaloq lizigen bezchalari bo'ladi. Gullarida turtta yeki beshta kosacha barglar va shuncha gulbargalaridan keyin bir talay otalıkları keladi. Ular bir-birlariga qo'shib turadi. Tugunchasi bir yeki ko'p uyali bo'lib, qadaqsimon gulo'rniga otib turadi, ko'pincha pastki bo'ladi. Mevalari har xil shirali rezavor, danakli, quruq (ko'sakcha, pista).

Mirtalar oilasiga 3000 yaqin tur kiradi. Ularning ko'pchiligi tropik zonalarida o'sadi. Shirali meva qiladigan vakillaridan mirtani *Myrtus communis* aytib utish mumkin. Mirta O'rta dengiz bo'ylarida o'sadi va janubda manzarali o'simlik sifatida ekiladi. Doim yashil turadigan bu buta qarama qarshi joylagan bargalar va uncha uzun gul bandida turadigan juda xush buy gullarni chiqoradi. Qora va shirali bo'ladigan mevasi ham xushbuy xidga ega. Ba'zi mirtlar mevasini iste'mol qilsa bo'ladi. Bu oilaga kiruvchi yana bir vakil evkaliptlar kenja oilasini o'z ichiga oladi. Evkaliptlar asosan Avstraliyada o'sadi va qisman boshqa joylarda ham o'sadi. Bular xilma xil o'simliklar orasida o'sadigan daraxt va butalar bo'lib, ko'pincha katta maydonlarda asosiy o'rinni egallaydi. Masalan Avstraliyaning janubida o'rmon bo'lib o'sadigan *Eucalyptus amygdalina* shu jumladandir. Bu juda balan bo'yli daraxt. Barglarida mumg'ubor borligidan kulrang tusda bo'ladi. Yesh daraxtlarda barglar odatda serbarg bo'lib, qarama-qarshi joy oladi. Hamda gorizantal tekislikda keng tortadi., bir muncha qariroq daraxtlarda esa barglar boshqacha shaklga kirib (geterofiliya)xodisasiga yaxshi misob bula oladi. Barg uchi qayrilgan qilichga o'xshab qoladi. Barg plastinkasi esa vertikal joylashadi bu esa suvni ortiqcha bo'g'lanishiga yo'l qo'ymaydi. Evkalipt barglarida efir moylari bo'lib, ular parfyumeriya sanoatida va texnikada ishlatiladi.²⁷

Jo'kadoshlar (Tilliaceae) oilasi. Bu oilaga kiradigan o'simliklar daraxtlar, butalar, ba'zan o'tlar xolida o'sadi va oddiy, yaxlit yoki bo'laklarga bo'lingan barglar chiqaradi. Barglarida

1. ²⁷ V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.

yon bargchalari bo'ladi. Po'stlog'i bilan o'zagida odatda shilimshiq moddalar turadigan kameralari bor. ularning gulkosachasi va gultoji bor, gul barglari ancha yirik, ochiq rangli va nektardonli bo'ladi. Otaliklarning soni xar – xil. Gullari xidli ko'kimtir – sariq to'g'ri tuzilgan ikki jinsli, ba'zan ayrim jinsli bo'ladi. Kosacha va tojibarglari beshtadan, ba'zan tojibargsiz bo'ladi. Otalıkları ko'p yoki 5 – 10 ta. Changdonlari ikki uyali bo'lmay, xamisha 4 uyali bo'ladi. Onaligi bitta ustki tugunchali, mevasi oddiy ko'sakcha yoki bir urug'li yong'oqcha. Urug'i endospermli va seryog' bo'ladi. MDX davlatlarida yurakbarg jo'ka *Tilia cordata* eng ko'p tarqalgan. Bu simpodial ravishda shoxlangan katta daraxt bo'lib, bargi qalin shox – shabba chiqaradi. Yuraksimon barglari birin – ketin joy olib turadi va kurtaklari yozilganida pardasimon nozik yonbarglarini tashlaydi. Kurtaklar paydo bo'lganda yuzaga keladigan eng birinchi barglarining yonbargchalari metamorfozga uchrab, pushti kurtak tangachalariga aylanadi. Jo'ka yozning o'rtalarida gullaydi va diametri 3 – 5 sm. keladigan qalqonsimon bir talay yirik to'pgullar bilan qoplanadi. To'pgulning umumiy bandida pardaga o'xshagan oppoq yirik gul yon bargi bo'ladi. Bu barg mevalarda xam saqlanib qoladi va mevalarning shamol bilan tarqalishiga yordam beradi. Gulda besh bargli gulkosacha, beshta oq va sal sariq rang gulbargi va besh bog'lam bo'lib turadigan birtalay otaliklar bor. Tugunchasi besh uyali bo'lib yuqorida joylashgan. Xar qaysi uyasida ikkitadan urug' kurtagi bor. Ustuncha boshchasimon tumshuqcha bilan tugallanadi. Mevasi pishib yetilgan paytda tugunchaning beshta uyasidan to'rttasi yoki uchasi yetilmay qoladi, natijada meva ochilmaydigan va bir yoki ikki urug'li bo'lib qoladi. Jo'ka o'ziga xos xushbo'y xid chiqadi, guollarining shu xidi va chiroyli rangi xashorotlarni, jumladan asalarini jalb etadi. Jo'kalar yaxshi asal beruvchi o'simliklar bo'lib, gullagan davrida ertalab va kunning ikkinchi yarmida ko'p miqdorda nektar chiqaradi. Quritilgan gullari esa tibbiyotda ter chiqaruvchi dori sifatida ishlatiladi.

BIR PALLALILAR SINFI-MONOCOTYLEDONEAE.

Gulli o'simliklarning bu katta sinfiga, asosan mo'tadil iqlimli, shimoliy kengliklarda tarqalgan o't o'simliklar, shuningdek subtropik va ayniqsa tropik oblastlarga xos bir muncha kam tarqalgan daraxtsimon o'simliklar kiradi.

Bir pallali o'simliklar o'ziga xos quyidagi belgilari bilan ikki pallalilardan farq qiladi.

1. Bu sinfga mansub ko'pchilik o'simlik vakillarining urugida faqat bitta urug' palla bo'ladi.
2. Bosh ildizi barvaqt qurib qolib qo'shimcha ildizlari rivojlanadi.
3. Barglari asosan, paralel yoki yoysimon ba'zan to'rsimon tomirlangan bo'ladi.
4. Naychalar bog'lami tutash (kamby qatlamisiz) bo'ladi va ular ko'pincha sochilib joylashadi.
5. Ko'pchilik hollarda gullari 3 bo'lakchali va besh qinrralidir.

Bu sinfga kiradigan ko'pchilik bir pallali o'simliklarning poya va ildizlari kamby qatlamli bo'lmaganligidan ular, odatda yo'g'on tortib (ikkilamchi) o'smaydi. Ikkilamchi o'sish bir pallalilarning faqat ba'zi turigagina (yog'ochsimon drasena, yukkalarga) xos, bu poyaning periferik qismida hosil bo'ladigan ikkilamchi meristema (hosil qiluvchi to'qima) ning bo'lishi natijasida ro'y beradi.

Bir pallalilar turlarining soni ikki pallalilar turlari sonining 1/3 ko'ra kamrog'ini tashkil qiladi. Lekin birpallalilar individning soni jihatidan o'tloqlar, cho'llar, katta - katta daryolarning sohilidagi sersuv erlari asosiy manzara fonini hosil qiladi.

Bizning floramızda bir pallalilardan faqat o't o'simliklar bo'lib, ular o'tloq, dasht, shuningdek, tog' va cho'l yaylovlarda o'sadi. Odatda, bir pallali o'simliklar orasida ildiz poyali ko'p yillik, shuningdek, tunganakli va piyozli o'simliklar uchraydi. Piyozsimonlar asosan yilning qurg'oqchilik davri aniq ifodalangan oblastlar uchun xosdir. Bir pallali o'simliklar inson hayotida katta ahamiyatga ega. Bug'doy, javdar, makkajo'xori, shakarqamish, palma

kabilardan oziq - ovqat tayyorlanadi, shunigdek, har xil em - xashak, texnika xom ashyosi va manzarali o'simliklar sifatida qo'llaniladi.

Loladoshlar tartibi-Liliales.Loladoshlar oilasi-Liliaceae.

Bu oilaga 10 avlod, 470 tur kiradi, ulardan 230 ga yaqini madaniy holda o'stiriladi. Bu oilaga mansub o'simliklar asosan o'rta iqlimli mintaqalarda, Sharqiy Osiyoda, Himolayda tarqalgan.

Bu oilaga asosan yo'g'on ildiz poyali, piyozli yoki tugunakli ko'p yillik o't o'simliklar kiradi. Ba'zi daraxtlar (yukka, drasena, aloe kabilalar) va qisman lianalar kiradi. Barglari lansetsimon chizikdi, ba'zan elips shaklli, parallel yoki yoysimon tomirli, guli 2 jinsli aktinomorf, odatda shingil, boshqoq, ro'vak va shu singari to'p gullarga yig'ilgan. Yirik gullari yakka b'zoli. Gul formulasi $R_{33} A_3.3G_{(3)}$ Ko'pchiligining tutunchasi ustki. Mevasi chokidan chatnaydigan ko'sakcha. Bu oilaga kiradigan avlodlardan Savrijon (Colchicum), shirach (Eremurus), piyozgul (Lilioideae), boychechak (usaqa), lola (tulipa), va liliya (Lilium) kabilarni misol qilish

Greyg lolasi - T. gregii

Greyg lolasi lolalar avlodiga mansub bo'lib, u aprelning oxiri - mayning boshlarida adir va tog'larning quyi qismidagi yonbag'irlarda ochiladi, yirik gulli, kurkam o'simlik. Bo'yi 20 - 45 sm. Piyozli tuxumsimon yoki yumaloq. Barglari 3-4 dona, ustida to'q binafsha rangli doglari bor. Guli bitta, yirik sargish -kizil, changchi iplari qora va sariq, changdonlari sariq, binafsha rang yoki kulrang. Uning mevasi 3 chanoqqa bo'linib ochiladigan ko'sakcha, iyulda pishadi. Greyg lolasi urugidan va piyozidan ko'payadi. Urugdan o'sgan lola 9-10 yilda, piyozchasidan o'sgani esa 4-5 yilda gullab urug beradi. Uning guli juda chiroyli. Keyingi paytlarda odamlarning shavqatsiz yulishi, piyozchalarini kovlab olishi natijasida juda kamayib ketdi. Hozirgi paytda u muhofaza qilinadi va O'zbekistonning qizil kitobiga kiritilgan.

Daraxtsimon aloy - Aloe arborescens Mill.

Er yuzida aloening 250 dan ortiq turi mavjud. Ular orasida bo'yi 10 m ga etadiganlari ham mavjud. Aloelar yovvoyi holda Afrikada, Hindistonda, Madagaskar, va Saudiya Arabistonida tarqalgan. Bizda xonalarda va issikxonalarda o'stiriladigan aloe Afrikadan chiqqan. Daraxtsimon aloe bo'yi 4 m ga etadigan sershira doim yashil daraxtsimon o'simlik, poyasi tik o'suvchi bo'lib, pastki qismi shoxlangan. Poyasining asos qismidan chiqqan juda ko'p yon kurtaklar o'simlikning vegetativ ko'payishida katta ahamiyatga ega. Bargi yumshoq, etdor, sershira yashil qilichsimon yuqori tomoni botiq, pastki tomoni do'ng qirrasini tikanli uzunligi 20-65 sm, qalinligi 12-15 mm ga teng bo'lib, qini bilan poyada ketma ket joylashgan. Gullari to'pbarg, o'rtasidan chiqqan uzun silindrsimon gul o'qiga joylashib shingil to'pgulni hosil qiladi. Gulqo'rg'oni oddiy tojsimon naycha shaklida qizg'ish gultojbargli b ta bo'lib 3 tadan 2 qator joylashgan. Otaligi 6 ta bular ham 2 qator o'rnashgan. Mevasi o'tmas 3 qirrali, silindrsimon, ko'sakcha. Aloe xona sharoitida kamdan kam gullaydi. Shunday qilib loladoshlar oilasiga bir va ko'p yillik o'simliklar kiradi. Ularni ichida aloe singari dorivorlari ham, lola kabi manzarali o'simliklar ham ko'p uchraydi.

Aloe tarkibida antrasen unumlari, smola, efir moylari saqlaydi. U tibbiyotda turli xil kasalliklarda, xususan, ichni yumshatadigan, o't haydaydigan va bakteresid ta'sir ko'rsatadigan, yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadigan vosita sifatida foydalaniladi.

Amarillilar tartibi - Amarilidales. Piyozguldoshlar oilasi - Alliaceae.

Bu oilaga 32 avlod 750 tur o'simliklar kiradi. Shulardan 310 tasi piyozlar avlodiga mansubdir. O'zbekiston florasida bu oiladan 165 turi uchraydi. Piyozguldoshlar er qismining hamma qismida, xususan dasht va cho'l zonalarida keng tarqalgan. Barcha piyozguldoshlar o't o'simligi bo'lib-, er ostida piyozboshi yoki ildizpoyasi bo'ladi. Efemeroidlari ham uchraydi. Barglari ildizoldi, bandsiz, ensiz lentasimon, trubkasimon shakllarda uchraydi. Gullari ochilguncha pardasimon o'rama bilan qoplangan bo'lib, oddiy soyabon hosil qiladi va u gul strelkasining uch qismiga joylashgan. Gulqo'rg'oni oddiy, 6 a'zoli erkin yoki pastki qismi birlashgan, ko'pincha ikki doira bo'lib o'rnamashadi. Gulqo'rg'oni rangli, tojbargli yoki rangsiz yupqa pardasimon bo'lsa, kosachabargli. Changchisi 6 ta gulqo'rg'oni bilan birlashgan. Urug'chisi 3 ta meva bargdan tuzilgan, qo'shilib o'sgan 3 uyali, tuguncha ustki. Ba'zan ustunchasi ostki, mevasi chokidan chatnovchi ko'sakcha, ba'zan ho'l meva.

Gulning formulasi $R_{3-3} A_{3-3} G_{(3)}$

Piyozguldoshlarning xarakterli belgisi uning «tirik tug'uvchanligidir», chunki piyozboshi yonida mayda piyozchalar hosil bo'ladi. Masalan sarimsoq piyozi (*A. Sativum*) doim shu yo'l bilan ko'payadi. Bu oilaga oddiy piyoz *Allium sepa* L., sarimsoq -*A. Sativum* L., yovvoyi cho'l piyozi *ASiffithianun*, cho'l piyozi - *A caspium* lar kiradi. Ular ichida cho'lpiyoz zaharli o'simlik hisoblanadi.

Ko'pgina piyozguldoshlarga mansub o'simliklarda oltingugurt sakdovchi moddalar bo'ladi. Ularning ko'pchiligi tibbiyotda qo'llaniladi. Shulardan biri sarimsoq piyozi. (*Asativum*.L)

Sarimsoq piyozi - *Allium sativum*.L

Bo'yi 100 sm gacha boradigan ko'p yillik o'tsimon o'simlik. Piyozi tuxumsimon shaklda bo'lib, 7 donadan 30 donagacha boradigan mayda - mayda piyozchalardan tashkil topgan. Bu pallalari oqish rangda bo'ladigan, pardadek umumiy pust bilan o'ralgan. Pallalari ham, o'z navbatida pushti yoki binafsha rang pust bilan qoplangan, uzunligi 4 sm gacha boradi. Poyalari taxminan yarmiga qadar barg qinlari bilan o'ralgan, ustki qismi gullagunicha halqaga o'xshab qayrilib turadi. Gullari uzun bandli bo'lib, soyabonsimon to'pgul hosil qiladi. Odatda meva va urug tugmaydi.

Sarimsoq piyozi jahonning ko'p mamlakatlarida, jumladan O'rta Osiyoning hamma rayonlarida ekiladi.

Sarimsoq piyozi tarkibida 0,3% gacha alanin, 0,4% gacha efir moyi, 0,06% atrofida yogli- moy fitosterin, azotli moddalar, fitonsidlar, anchagina mikdordagi askarbinat kislota bor.

Sarimsoq piyozi tarkibidagi moddalar me'da ichak yo'lini ishini kuchaytiradi, o't, siydik haydaydigan, og'riq qoldiradigan, balg'am ko'chiradigan va bakteresid xususiyatlarga

May marvaridguli - *Convallaria majalis* L

Marvaridgul o'simligi Kavkaz va Uzoq Sharq o'rmonlarida tarqalgan. Ildizpoyali o't o'simlik. Poyasi shoxlanmaydi, barglari yoysimon tomirlangan, oddiy. Gullari unchalik katta emas, xushbo'y oq gullar, tojbargli, bir tomonlama shingilga to'rlangan.

Gulformulasi $R_{(6)} A_{(3+3)} G_{(3)}$

Mevasi kizil rangda, rezavor meva. Urugi endospermlil. Marvaridgul barglaridan yurak glikoziddari olinadi, shuningdek saponinlar ham to'planadi. Tibbiyotda yurak kasalliklarini davolashda keng ishlatiladi. Gullaridan olingan efir moylari parfyumeriyada qo'llaniladi.

Dorivor sarsabil - *Asparagus acutifolius* L

Sarsabil - bo'yi 150 sm gacha boradigan ko'p yillik o'tsimon o'simlik. Ildizpoyasi yo'g'on bir talay ildizlar chiqaradi. Poyalari to'g'ri o'sib, ko'p shoxlanadi, tuksiz. Barglari reduksiyalanib pardasimon kichik - kichik tangachalarga aylangan. Gullari mayda, yashil - sariq rangda, uzun - uzun bandli. Mevasining diametri 5 mm gacha boradigan olti urugli dumaloq rezavor meva. Urug'lari ikki tomondan qisilib kelgan, dumaloq shaklda.

May - iyulda gullaydi, iyun oxirlari - iyulda mevalari etila boshlaydi.

Tojikiston, Kavkaz va G'arbiy Sibirda dasht - qirlar, butazorlar orasida o'sadi. O'rta Osiyoda kup joylarda ekiladi

Uning ildizpoyasi bilan ildizlari va yosh novdalari dorivorlik xususiyatiga ega, bu organlar o'z tarkibida asparagin va saponin moddalarini saklaydi. Etilgan mevalarida 36% gacha qand moddolari, kapsantin bilan fizamin, uruglarida 16% yogli moy topilgan.

Tibbiyotda sarsabil siydik haydovchi, yurak ishini yaxshilovchi, o't haydovchi vosita sifatida ishlatiladi.

Qiyogullilar tartibi - Cyperales. Qiyogullilar oilasi - Suregaseae

Bu oilaga 120 taga yaqin avlod va 5600 taga yaqin tur kiradi. Uzbekistan florasida 16 avlod 90 turi uchraydi. Er yuzining hamma xududlarida, asosan botqoqliklarda o'simlik qoplamini hosil qiladi. Bu oilaga kiradigan o'simliklarning ko'pchiligi ko'p yillik, **ILDIZPOYAAI**, poyasinint uzunligi 4 m gacha etishi mumkin. Ularning poyalari 3 qirrali, silindrsimon.

Barglarining ko'pchiligi 3 qator bo'lib joylashgan, ularning ko'pi poyaning pastidan chiqadi. Barglari poyani mahkam o'rab olgan va ko'pincha chetlari qo'shilib o'sadigan qin va ingichka plastinkaga bo'linadi. Barg qini barg plastinkasiga aylangan joyida poyani o'rab turadigan tilcha bo'ladi. Gullari mayda, ko'rimsiz, ikki jinsli yoki bir jinsli bo'lib, shamol yordamida changlanadi. Ular boshqosimon simoz to'pgullar hosil qiladi. To'pgullar o'z navbatida boshchasimon, soyabonsimon, supurgisimon murakkab to'pgullar bo'lib bir biriga qo'shiladi. Gullarning gulqo'rg'oni 6 ta pardacha yoki tangacha ko'rinishida yoki 1-6 ta yoki bir talay qilchalar ko'rinishida bo'ladi. Yo bo'lmasa butunlay reduksiyalanib ketadi, bu hollarda gullari yalang'och bo'lib qoladi. Changdonlar asosi bilan otaliklar ipiga birlashgan. Onaligi 1 ta, unda bir uyali ustki tuguncha va 2 ta yoki 1 ta ustunchalari hamda tumshuqchalari bor, tugunchasi 3 ta, goho 2 ta meva bargchadan yuzaga keladi.

Urug' kurtagi 1 ta, anatrop mevasi - yong'oqcha hamda urug'idagi embrioni unsimon endosperm bilan o'ralgan.

Qiyogullarning amaliy ahamiyatlari juda kam. Ular xashak bo'ladigan o'tlar sifatida, ko'pchiligi dag'al bemaza xashak beradi, tarkibida fosfor va kal'siy kam bo'ladi.

Qiyogullilarning eng ko'p tarqalgan avlodlari quyidagilar dir:

Rang avlodi (Sagex) - bu avlodga 2000 ga yaqin tur kiradi. O'zbekistonda 43 turi uchraydi. Bu avlod vakillari ildizpoyali ko'p yillik bo'lib, nam va botqoq erda, soy va ariq bo'ylarida, cho'l hamda baland tog'larda o'sib, qalin o'tzorlar hosil qiladi. Qum rangi (S. arenaria) - ko'chma qumlar harakatini to'xtatish va em - xashak uchun ekiladi.

Salomalaykum avlodi (Cyperus) Bu avlodning 14 turi O'rta Osiyoda, 8 turi O'zbekistonda uchraydi. Ular sernam va botqoq erlarda o'sadi. Tugunakli salomalaykum (S. rotundus) havfli begona o't hisoblanadi, dalada juda tez ko'payadi, ko'p yillik o't o'simlik, ildizpoyasi 2 xil

1) pastga qarab o'sgan ildizpoyasi

2) gorizontal o'sgan ildizpoyalari bor.

Qiyog avlodi (Scirpus) O'rta Osiyoda **19**, O'zbekistonda **11** turi uchraydi. Zax va botqoq joylarda, ko'l va soy qirg'oqlarida qo'lqiyog'i (S. fcustris), qirg'oq qiyog'i (S.littarales) turlari o'sadi.

G'alladoshlar tartibi Graminales Boshqodoshlar oilasi - Graminerae

Bu oilaga bir yillik, ikki yillik va ko'p yillik o'simliklar va ba'zan bo'yi bir necha metr ga etadigan daraxt o'simliklar kiradi. Poyalari poxol bo'lib, bo'g'im va bo'g'im oraliqlari bor,

poyaning bo'gim oralari ichi bo'sh (kovak). Barglari chiziqli oddiy barg qini va barg plastinkasidan iborat bo'lib ko'pincha barg ko'rinib turadigan tilchasi bor: Barglari poyaga navbat bilan joylashadi. Tilchaga yopishib turib, barg qini bilan poxol poya oralig'idagi bo'shlikdagi bo'shliqqa suv kirishiga yo'l bermaydi. Tilcha sistematik belgi bo'lib, uning shakli va katta kichikligi har xil bo'ladi. Qin bo'g'inlar oralig'idagi o'sish zonalarini himoya qiladi. Va ayni vaqtda poyani chidamliligini orttiradi.

Boshokdoshlarning oilasi tuproq yuzasidagi yoki undan yuqori turgan qismida to'planish bo'g'imidan shoxlaydi. G'alladoshlarning guli bir yoki ikki jinsli bo'lib, ular dastlabki to'pgul-boshoqchalarga yig'ilgan. Boshoqchalar ham o'z navbatida murakkab to'pgullar: murakkabboshoq, murakkab rovak, popuk va so'tani hosil qiladi. Boshoqchani tuzilishi har xil bo'lib, u sistematik belgi hisoblanadi. Tipik boshoqning butun boshoqchani maxkam o'rab oladigan bir juft po'sti bo'ladi. Po'sti ichida 1 ta yoki ko'p gul turadi. Ustki gul po'stining 2 ta qirrasini bor, bu uning gulqo'rg'onini tutashib o'sgan 2 ta bargchasidan iborat ekanligini ko'rsatadi. Bundan keyin 2 ta, ba'zan 3 ta va undan ham ko'p 2 ga ajralgan gulqo'rg'on pardasi (Lodikulae) joylashgan. Bu parda galladoshlarning gullash biologiyasida katta ahamiyatga egadir. Gullash oldidan pardalar nihoyatda shishib ketadi va shuning uchun gul pusti ochiladigan, bu esa changchi va urugchilarning gul ichida chiqishiga imkon beradi.

Changchi ko'pincha 3 ta , ba'zan 1, 2, b ta yoki undan ko'p bo'ladi. Changchilarning ko'p miqdorda quruq va engil chang chikaradigan yirik changdoni bo'ladi. Changchi iplari o'simlik gullaguncha qisqa bo'ladi, lekin gullash vaqtida tez uzayadi va changdonlarini guldan tashqariga chiqaradi. Changchi tushib o'sgan 2-3 ta meva bargchadan tuzilgan. Changchi og'izchasi 2 bo'lakchali, ba'zan 1-3 bo'lakchali patsimon, faqat makkajo'xorining urug'chi og'izchasi ipsimon. Tugunchasi ustki, bir uyali to'g'ri yoki bir oz egilgan 1 ta urug'kurtakda bo'ladi.

Boshokdar shamol yordamida, faqat ba'zilar o'z-o'zidan changlanadi. Mevasi don bo'lib, u gulqo'rg'on bilan zich tutashib o'sadi. Endosperma juda rivojlangan.

Ko'p yillik boshoklar to'planish usuliga qarab 3 ta tipga bo'linadi.

1. Ildizpoyali boshoqlar boshokdoshlarning to'planish bo'g'imlaridan birmuncha uzun novdalar chiqadi, ular er tagiga gorizontal holatda o'suvchi ildiz poyalardir. Bug'doyiq, suv bugdoyiq, qamish ildizpoyali boshokdoshlarga misol bo'la oladi.

2. Siyrak to'planuvchi boshokdoshlar Bularning bo'g'imi ham er yuzasida bo'ladi, lekin bo'g'imdan chiqqan novdalar er ustidagi asosiy poyaga nisbatan o'tkir burchak bilan ko'tariladi.

3. Zich to'planuvchi boshokdoshlar Bularning ildizpoyali hamda siyrak to'planuvchi boshokdoshlardan farqi shuki, to'planish bo'g'imi er yuzasidan yuqorida bo'ladi. Har qaysi bo'g'imidan oralikdari juda qisqa bo'lgan novdalari chiqadi. Har bir novda o'zining to'planish bo'g'imini hosil qiladi. Undan xuddi yuqorida aytilganidek ichki yon novdalar paydo bo'ladi. Natijada, zich to'p vujudga keladi, zich to'planuvchi boshokdoshlarga chalov betagalar misol bo'la oladi.

Boshokdoshlarning to'planish tipi tuproq hosil bo'lishda katta ahamiyatga ega. Boshokdoshlar oilasi 3 ta kenja oilaga bo'linadi.

1. Bambuksimonlar
2. Tariqsimonlar



3. Qo'ng'irboshsimonlar

Bulardan MDX da 2 tasi ya'ni tariqsimonlar va qo'ng'irboshsimonlar kenja oilalariga mansub o'simliklar

Bambuklar kenja oilasi -Bambuseae Bu oilaning deyarli hamma vakillari ildiz poyali ko'p yillik o'simliklar bo'lib, juda shoxlab ketadigan ko'p yillik daraxtsimon poyalar chiqaradi. Poyalarining bo'yi ba'zilarida 40 m ga, yo'g'onligi 30 sm ga boradi. To'pgullari supirgisimon, ko'pchiligining gullarida 3 ta lodikula, b ta otalik, 3 -2 ta ustuncha bor. Mevasi don, ba'zilarida yong'oqcha yoki rezavor meva holida 200 dan oshiq turi tropik va subtropik mintaqalarda o'sadi. Yovvoyi holda o'sadigan bambuklarni erli aholi deyarli hamma ho'jalik ishlarida ishlatadi.

Tariqsimonlar kenja oilasi-Panicoideae.

Oilacha vakillari asosan o't o'simliklar, ba'zan poyalari yog'ochlashadi. Oddiy boshqochalari 1 gulli, bittasi bir jinsli erkak gul bo'lib, ikkinchisi ikki jinsli gul. Boshkacha qobikdari ikkitadan ko'p. Bu oilachaga bir qancha muhim ekinlar kiradi. Eng muhimlari makkajo'xori avlodi (Zea) , jo'xori avlodi (Sorghum) (bu avlodga oddiy jo'xori, oq jo'xori, qand jo'xori, sudan o'ti, g'umay kabi o'simliklar kiradi), shakarqamish avlodi (Saccharum), tariq avlodi (Panicum) Suli avlodi (Avena), Chalov avlodi (Stipa), Sholi avlodi (Oryza), Silen avlodi (Aristida) kabilar hisoblanadi.

Makkajo'xori -Zea mays

1 yillik don o'simlik. Poyasining bo'yi 1-3 m gacha boradigan va bundan balandroq bo'ladi, boshqochali ro'vak, pastki qismlaridan esa murakkab to'pgullar chiqaradi. Barglari navbat bilan joylashgan, cho'ziq shaklda. Gullari - bir jinsli, mayda, gul qo'rg'oni yo'q. Mevasining rang tusi har xil, ancha yirik bo'ladigan yalang'och don hosil qiladi.

Hamma joylarda ekiladi, asl vatani janubiy Amerika Makkajo'xori popugida sintosterol, stigmasterol, efir moyi, S va K vitaminlar, alkaloidlar, organik kislotalar va boshqa moddalar bor.

Tibbiyotda makkajo'xori popugi siydik, o't haydaydigan vosita sifatida tavsiya etilgan.

Qo'ng'irboshsimonlar kenja oilasi - Poaeoideae. Boshqochalari bir yoki ko'p gulli. Bu oila o'z ichiga muhim don va xashak o'simliklarini qamrab oladi. Bu oilachaga qo'ng'irbosh avlodi (Roa), javdar avlodi (Secale) , Arpa avlodi (Hordeum) kabilar kiradi.


Sulilar turkumi-Avena

Bo'yi 120 sm gacha boradigan, poyasi yalong'och bo'ladigan bir yillik o'tsimon o'simlik. Poyasi ichi kovak bo'lib, qavarib chiqib turadigan qattiq bo'g'imlari bor. Barglari uzun nashtarsimon uchi o'tkirlashib kelgan. Gullari - ikki jinsli, mevasi boshqalarda bo'ladigan cho'zinchoqroq shaklli don.

May - iyulda gullaydi, doni iyun' - avgustda etiladi.

Suli donlarida anchagina (16% gacha) oqsil, uglevodlar yog' moddalari, kletchatka, va ko'pgina makro va mikroelementlar bor. Unda avenin degan alkaloid va efir moyi ham bor. Shuni takidlab o'tish kerakki, ekiladigan suli egallaydigan maydon jihatidan jahon ho'jaligida

g'alla ekinlari orasida 4 -o'rinda turadi. (bug'doy, makkajo'xori, sholilardan keyin) Zamonaviy tabobatda sulidan tayyorlangan qaynatmalar siydik o't, el haydaydigan va odamni terlatadigan xossalarga ega ekanligi anikdangan. Suli yallig'lanishga qarshi ta'sirga ham ega bo'lib, markaziy nerv sistemasi va yurak ishini ham



Marvaridgul



Piyoz va sarimsoq



zafar'on

Nazorat savollari

1. Loladoshlar oilasiga umumiy xarakteristika va shu oilaga kiruvchi o'simliklar hayotiy formasini ayting?
2. Qiyog'gullilar oilasining umumiy xarakteristika va asosiy vakillari?
3. Bir pallali o'simliklarning xarakterli belgilari.
4. Piyozdoshlar kenja oilasiga umumiy xarakteristika
5. Bu oilaga kiradigan o'simliklarning axamiyati.
6. Marvaridgullilar avlodi vakillarining tuzilishi.
7. Liliyagullilar kenja oilasiga umumiy xarakteristika
8. Bu oilaga kiradigan o'simliklarning axamiyati
9. Shirachlar avlodi vakillarining tuzilishi va turlari.

Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o'quv

qo'llanmalar ro'yxati

1. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. – T.: O'zbekiston, 2005.- 435 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A., Samatova SH. O'simliklar sistemikasidan amaliy mashg'ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
4. Ahmedov O'.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elaktron darslik.-T.: 2008.
5. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –
6. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
7. Hamidov A., Nabiev M.M. “O'zbekiston o'simliklarini aniqlagichi”.-T.: 1987.-235 b.
8. Василев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “ Высшая школа ”, 1988. -435 с.
9. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O'.A. va boshqalar. Dorivor o'simliklarning lotincha-o'zbekcha-ruscha-arabcha va forsha-tojikcha lug'ati.-T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
10. Berezovskaya T.P., Dmitruk S.E., Grishinna e.I., Belousov M.V. Основы farmatsevticheskoy botaniki. – Tomsk: Pechatnaya manifaktura, 2004.-294 s.
11. Xolmatov X.X., Ahmedov O'. A. Farmakognoziya. 1-2 qism. – T.: “Ibn Sino” nashriyoti, 2007.- 806 b.

Ma'ruza № 18

Ekologiya, fitosenologiya va o'simliklar geografiyasi

Ma'ruzaning maqsadi:

O'simliklar ekologiyasi, fitosenologiya va geografiyasi haqida tushuncha berish.

Reja:

1. Ekologiya fani , predmeti.
2. Tabiatni muhofaza qilishning madaniy va estetik ahamiyati.
3. Ekologiyaning rivojlanish tarixi.
4. Tabiatni muhofaza qilishda jamoatchilik.
5. Ekologik ta'lim - tarbiya -biosferani saqlab qolishning muhim omillari.
6. Biosenoz haqida tushuncha.
7. Geobotanika asoslari.
8. Tabiatni muhofaza qilish.
9. Ekologik omillar.

Tayanch iboralar: O'simliklar ekologiyasi, ekologik faktorlar, fitosenologiya va o'simliklar geografiyasi. O'simliklarni hayotiy formalari, o'simliklar qoplami, o'simliklar florasi, o'simliklar areali va tarqalishi, o'simliklarni ma'daniylashtirish, o'simliklar qoplamini xillari. Endem va kosmopolit o'simliklar. Relekt (qadimgi davrdan saqlanib kelayotgan) o'simliklar. Endemizm xodisasi. Flora va fora elementlari. O'zbekiston florasidagi eng muhim elementlar. Yer sharining floristik viloyatlari. O'simliklarning ekologik elementlari. O'simliklar ekologiyasi vazifa va uslublari. Ekosistemalar. Organizmning yashash muxiti. Muxit faktorlari haqida tushuncha. Muxit faktorlari va populyatsiyalari. Biotik, abiotik va antropogen omillar. Iqlim omillari: yorug'lik, issiqlik, namlik (suv), havo tarkibi va x.k. Gidrofît, mezofît, kserofît va sukkulent o'simliklar. Issiqlik – ekologiya omili sifatida. Yorug'lik – ekologik omillar. Yorug'sevar, issiqsevar va soyaga chidamli o'simliklar.

EKOLOGIYA PREDMETI, VAZIFALARI, TARIXI VA FANLAR BILAN BOG'LIQLIGI

Inson tabiat ogushida yashaydi, ijod etadi, faoliyat ko'rsatadi, uning kurkam manzarasidan zavq oladi, sahovatli marhamatlaridan bahramand bo'ladi. Tabiat, u qanday ko'rinishida bo'lishidan qat'iy nazar o'zgacha gashtli fusunkor bo'lishi mumkin. Bizni o'rab turgan tabiatning kurkam manzarasi nafaqat qushlar, musavvirlar, shoirlar, bastakor-mashshoqlar, xonandalar uchun ilhombaxsh ko'rinishi bo'libgina qolmasdan, balki kishilarining ruhiyatini engillashtiruvchi ma'naviy ozuqa beruvchi tabiiy manbaa bo'lib xizmat qiladi.

"Ekologiya" so'zi yunoncha so'zdan olingan bo'lib, - "oykos" -uy, joy, "logos" - fan demakdir. Bu so'z nemis olimi E.Gekkel' tomonidan 1869 yilda "Organizmlarning umumiy morfologiyasi" deb nomlangan asarida berilgan.

Botanika faniga esa 1895 yil Varming tomonidan kiritilgan. 1910 yili botaniklar kongressida ekologiya mustaqil fan sifatida vujudga keldi.

Ekologiyaning predmeti - organizmlar gruppasi va tashqi muhit orasidagi bog'lanishlarning tuzilishi va unta bog'liq bo'lgan jonlanish, taraqqiy etish, tarqalish va konkurentlar xususiyatlarini o'rganadi.

Hayotning hamma ko'rinishlari- o'simliklarning formasi, evolyusiyasi tashqi muqitning ta'siriga bog'likdir. Masalan, o'simlik namlik etarli bo'lgan joyda va quruq adir sharoitida ekilsa, bir xil urug'dan unib chiqqan o'simliklar bir-biridan butunlay kuchli farq qiladi. Namlik etarli joyda o'simlik barglari katta-katta, o'simlik baland bo'lib o'sadi. Qurg'oqchilik joyda esa mayda bargli, past bo'yli, barglari tukchalar bilan qoplangan.

Ekologiya antropogen va har xil omillar ta'sirida tabiatdagi bog'lanishlarning buzilishi to'grisida ma'lumot beradi. U tabiiy resurslardan rasional foydalanishda va tabiatni muhofaza qilishda ilmiy asos bo'lib hizmat qiladi. Masalan, har yili o'rmon ho'jaliklari tabiatda o'suvchi dorivor o'simliklarni yig'ib, olib dori tayorlash uchun topshiradi. Bunda agar yig'ib olinayotgan o'simliklar mikdori qayta o'sib chiqayotgan o'simliklar mikdoridan oshsa, unda o'simliklar sekin-asta yo'qola boshlaydi. Shuning uchun dorivor o'simliklarni yig'ish faqatgina ilmiy tomondan asoslangan normalar asosida terib topshirilishi kerak.

Bu normalar va yig'ish muddatlari o'simliklar jamoasi qayta tiklanishi uchun asos bo'lishi kerak.

Hozirgi vaqtda ekologiya fani bir necha fanlar kompleksidan iborat bo'lib - ekonomika, texnika, madaniy fanlarning vazifalarini o'z ichiga oladi, lekin biologik muammolar bu kompleksda asosiy bo'lib qoladi, chunki odam, hayvonlar va o'simliklar dunyosi, bu biologik ob'ektlar bo'lib bir-birlari bilan va tashqi muhit bilan o'zaro bog'likdir.

Hozirgi zamon ekologiyasining mazmunini quyidagi biologik spektr tuzilishida yozsa bo'ladi.

A'zo gen—hujayra—to'qima -----organ ----- organizm -----
populyasiya ----- jamoa + abiotik muhit = ekosistema.

Ekologiya asosan bu spektorning o'ng qismida joylashgan, ya'ni organizm darajasidan yuqori bo'lgan sistemalarni o'rganadi.

Ekologiya organizmlardan boshlab ekosistema va biosferagacha bo'lgan ma'lumotlarni o'rganadi.

Organizmlar birgalikda o'sib abiotik muhit bilan aloqaga kirib ekologik sistemani tashkil qiladi. Sistema deganda bir-biriga tartibli ta'sir qiladigan va bir-biri bilan bog'langan komponentlarning tarkibiy qismlarining bir butunligini tushunamiz. Eng katta ekologik sistema bu biosferadir.

Populyasiya - bu bir turga mansub individdarning ma'lum territoriyada tarkalganligidir. Biosfera yoki koinot-bu erdagi tirik organizmlarning erning fizik muhiti bilan birlik hosil qilishdir.

Hozirgi zamonda ekologiyaning ma'nosi-ekosistema shaklida kengaytirilgan. Ekosistema deganda biz butun biosferani tushunamiz. Bu shuni ko'rsatadiki, biologiyaning hamma bo'limlarida ekologik metod qo'llanilishi kerak.

Ekologiya - bu organizmlar va tashqi muhit orasidagi bog'lanishlarni o'rganuvchi fan bo'lib, u hayvon va o'simliklarning moslashuvini, hosildorligini, ko'payish dinamikasini, populyasiyalar va biosenozlar biomassasini o'rganadi.

Ekologiya kuyidagi kislarga bo'linadi. autekologiya -organizmlar ekologiyasi, sinekologiya-jamoalar ekologiyasi. Evolyusion ekologiya, qishloq xo'jaligi ekologiyasi, radiasion ekologiya, koinot ekologiya, biosfera ekologiyasi, fiziologik ekologiyasi, embriologik, anatomik ekologiya, morfologik ekologiya, ijtimoiy ekologiya, landshaftlar ekologiyasi. Ekologiyaning vazifalari

Atrof-muxitdagi antropogen o'zgarishlarni o'rganish va bu muhitni yaxshilash usullarini asoslash. Atrof muhitni sog'lomlashtirish, uning musaffoligini asrash borasida so'z borar ekan, avvalo bizni o'rab turgan tabiatga hurmat bilan qarash lozim bo'ladi.

Tabiiy resurslardan rasional, unumli, foydalanishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish. Inson, ho'jalik faoliyati ta'siri ostida tabiatda ro'y beradigan o'zgarishlarni oldindan bilish, inson yashaydigan muhitni saqlab qolish.

Ekologik xavfning oldindan anikdash va uning oldini olish. Tabiatda kam uchraydigan va yo'qolib borayotgan o'simliklar va hayvonlarning muxofazasi, ko'paytirish yo'llarini ishlab

Muhitning sifatini yaxshilash. Hayvonning tozaligini, suvning tozaligini asrash, ifloslanishga yo'l qo'ymaslik. Atrof muhitning ifloslanishi, sanoat korxonalari, bo'rdoqichilik majmualari chiqarib tashlaydigan chiqindilarni etarlicha zararsizlantirmaslik ham sabab bo'ladi.

Fan - texnika nihoyatda taraqqiy etgan hozirgi paytda, qishloq ho'jalik maqsulotlari etishtirishda o'ta ta'sirchan kimyoviy moddalarni ko'plab ishlatish, atrof - muhit va etishtirilgan ne'matlar ifloslanishiga, shuningdek odamlar orasida bir kancha xastaliklar avj olishiga olib kelmokda.

So'z tabiatning ozor topishi, ekologik muvozanatning buzilishi ustida borar ekan, hozir Orol dengizining kurib borishi bilan bog'liq ekologik vaziyat naqadar noxush asoratlar berayotganligini eslatib o'tmasdan bo'lmaydi.

Yuqori hosildorlikning asosi - o'simliklarning optimal zichligini aniqlash. Biz o'zimiz yashayotgan sayyoraga nazar tashlasak, ko'p narsalarning guvohi bo'lamiz: inson so'nggi 100-50 yil davomida tabiatning er qobig'i bo'lmish biosferani shunchalik o'zgartirib yubordiki, - natijada uning million yillar davomida tarkib topgan go'zalligi va musafoligiga rahna solindi, noyob nabotot va jonivorlar namunalari kamayib ketdi.

Populyasiyalarning mikdorini tartibga solish.

Biologik rekul'tivasiya ishlari. Buzilgan tabiiy sistemalarni tiklash, shu jumladan. foydalanishdan chiqarib tashlangan qishloq xo'jalik ekin maydonlarini yana ishga solish - rekul'tivasiya. Yaylovlarni, suv xavzalari va boshqa ekosistemalar maxsuldorligini tiklash. Biosenojarlar hosil qilish: Sun'iy yaylovlar hosil qilish (qumlarining ko'chishini to'xtatish, tuproq eroziyasiga qarshi kurashish, shaharlarni obodonlashtirish.

Qishloq xo'jalik ekinlarini ekologik rayonlashtirish.

Ekologik ongni tarbiyalash, ekologik madaniyatni yaratish, ommaviy axborot vositalari ishini faollashtirish. Ekologik ta'lim va tarbiya quyidagi asosli bo'limlarni o'z ichiga oladi:

1. Talaba va o'qituvchilarni tabiat go'zalliklarini sevish, ulardan estetik zavq olish ruhida tarbiyalash.

2. Jonli va jonsiz tabiatning rivojlanish qonuniyatlari, tabiatning rivojlanish qonuniyatlari, tabiat bilan jamiyat o'rtasidagi murakkab o'zaro munosabatlar, shuningdek, inson ho'jalik faoliyatining tabiatga ta'siri oqibatlarini haqida bilim berish.

3. Talaba va o'quvchilarda ekologik madaniyatni tarbiyalash. Tabiatni sevish, undan to'g'ri va ongli ravishda foydalana bilishni tarbiyalash ekologik tarbiya va madaniyatning asosi bo'lib, kishilarda tabiat oldida mas'uliyatni anglash malakasini hosil qiladi. Vatanni sevish, vatanparvarlik tabiatni sevishdan boshlanadi. Binobarin, o'quvchilarda tabiatga nisbatan haqiqiy muhabbat tuyg'usini hosil qilmay turib, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, mumkin emas. Insonning tabiat quchog'ida bo'lishi uni ruhan tetiklashtirib, uning mehnat qobiliyatini va ijodiy faoliyatini oshiradi. Ekologik tarbiya quyidagi masalalarni o'z ichiga oladi:

a) kishilarga maxsus ekologik bilim va tarbiya berib, ularda bu sohada muayyan malaka hosil qilish;

b) ekologik o'zgarishlarni oldindan ko'ra bilishni tarbiyalash;

v) ekologik madaniyatni singdirish va tarbiyalash;

g) kishilarni tabiat «in'omlari» dan to'g'ri foydalanish ruhida tarbiyalash.

Ekologik tarbiya ahloqiy tarbiyaning ajralmas qismidir. Kishilarda ekologik ong, tafakkurni, ekologik dunyo qarashni hosil qilish tabiatni dialektik tushunishga yordam beradi.

Hamma bosqichlarda ekologik ta'lim va tarbiyani talab etilgan darajada amalga oshirish uchun bu vazifaning muhimligini va mas'uliyatini yaxshi bilgan insonni tayyorlash zarur.

EKOLOGIYANING QISOQACHA RIVOJLANISH TARIXI.

Fandagi boshqa yo'nalishlar kabi, ekologiya ham doimo rivojlanib kelgan. Gippokrat, Aristotel' va boshqa qadimgi yunon mutafakkirlarining mehnatlarida biz ekologik yo'nalishlarni aniq ko'ramiz. Lekin ular "ekologiya" terminlarini ishlatishmagan.

Bu termin nemis biologi, evolyusionist Ernest Gekkel' tomonidan 1869 yil taklif kilingan. Ungacha 18-19 asrlarda buyuk olimlar o'zlarining bu sohaga hissalarini qo'shib kelishgan, ular ham "ekologiya" terminini ishlatishmagan.

Ingliz botanigi Richard Bredlinning ishlarini ko'rib chiqilsa u biologik hosildorlik aniq bir tushunchaga ega bo'lgan mana bu masalalarni o'rganish hozirgi zamon ekologiyasi muxim yo'nalishlarini tashkil qiladi.

Ekologiyaning rivojlanishi tabiatni o'rganish va uni kuzatib yozish bilan boshlangan, bu fransuz Jan Anri Faber o'zining entomologiya estaliklari yozgan davr edi (1870-1871).

Ekologiyaning rivojlanishi muhitni o'rganish bilan unda yashaydigan turlar va ularning o'zaro munosabati, simbioz, boshqa turlar bilan munosabatlarini o'rganish bilan boshlangan edi. Bu ekologiyaning rivojlanishida birinchi vazifadir. Ikkinchi vazifasida ekologiya o'z rivojlanishida ko'proq ekosistemalarni funksional birlik sifatida karay boshladi. Rivojlanishning 3 chi vazifasida ekologiyani butun e'tiborini ekosistemalarning o'zaro ta'siriga qaratdi. Biosfera-tirik organizmlar va insoniyat yashash muxitidir. U erda hamma ekosistemalarning birligini tashkil qiladi. Planeta - erimizni ham ekosistema deb qarashimiz mumkin. Rivojlanishning 4 vazifasida -insoniyatning biosferada tutgan o'rmini o'rganiladi.

Biz ekologiyaning tarixida 4 ta davrni ajratishimiz mumkin, 1-davr kadimgi davrdan to 18 asr oxirigacha o'rganuvchilarning zoologiya va botanika sohasidagi ishlarida ekologik bilish elementlarning paydo bo'lishi bilan tarflanadi.

"Zoologiyaning otasi" hisoblanmish Aristotel' (384-322 y. eramizdan avval) va "botanikaning otasi" Teofrast (272-28) ishlarida va qadimgi xitoy olimlarining ishlarida hayvon va o'simliklar -yashash sharoitiga bog'liq holda ko'rib chiqilgan ya'ni ekologik jihatdan.

Aristotel' 500 ta tur hayvonni o'rganib, ularning xulq atvori, ko'chib yurishi, xaqida ma'lumotlar qoldirgan.

Toefrast o'simliklarning shakli va o'sishi-iklim,tuproq sharoitiga bog'liqligini aniqladi. U o'simliklarning hayot formalarini ekologik klassifikasiyasini berdi.

Muxim ekologik kuzatishlarni 18 asr tabiatshunoslari K. Linney, J.Byuffen,Pallas va hokazo asarlarida uchratamiz.

K.Linney (1707-1779) tur doimiyligi gipotezasini yaratdi, va o'simlik, hayvon ilmiy sistemasini asoslab berdi,binar nomenklaturani kiritdi.

AT.Bologov (1738-1833 y) muhitning o'simliklarga ta'sirini o'rgatdi.

Rus akademigi P.S.Pallas (1741-1811) organizmlarning tashqi muxit ta'sirida tarqalishi,yashashi va o'zgaruvchanligini ta'riflab berdi.

Yuqorida nomlari aytilgan olimlar, zoologlar, botaniklar va boshqa tabiatshunoslar faoliyati natijasida 18 asrning oxiriga kelib zoologiyada va botanikada juda katta ekologik material to'plandi, tabiiy sharoitda turli organizmlarning yashashiga oid bo'lgan tajribalar yigildi.

2- davrda ekologiyaning rivojlanishi botanik va zoologik geografiyaning rivojlanishi bilan bog'lidir.

Botanika va geografiyaning asoschilaridan biri nemis tabiatshunosi AGumbol'd (1769-1859), u fanga o'simlik formalari, assosiasiya haqida, assosiasiya tushunchasini va shunga o'xshash muhim, ekologiya uchun tushunchalarni kiritadi. Bu tutyanchalar keyinchalik keng ishlatila boshlandi.

Moskva universitetining professori, zoolog K.F.Rul'e hayvonlar ekologiyasi sohasida katta ishlar olib bordi va bir qator asarlar qoldirdi. 1814-58 y. hayvonlar va tashqi muhit o'rtasidagi murakkab munosabatini o'rgandi. Rul'ening o'quvchisi Seversev Rossiyada hayvonlar ekologiyasi to'g'risida chuqur ma'lumotlar qoldirdi. Bu klassik ish 1950 yil boshqatdan nashr etildi. Bu dunyo miqyosidagi zoolog olim edi.

Shvesiyalik botanik olim Ogyust Pirma dekanol' o'simliklar va tashqi muhit orasidagi bog'lanishni o'rganuvchi fan - epirologiya yoki auteekologiya fanini ajratdi.

O'simliklar ekologiyasini asoslagan olimlardan biri O.P. Dekandolning ugli - Al'fonis Dekandol' xisoblanadi. U o'zining "O'simliklar geografiyasi" kitobida issikdik, yoruglik, namlik, tuproqqa asoslanib, o'simliklar yashaydigan muhit klasifikatsiyasini beradi. U o'simlik turlarining turli tuproqlar bilan bog'likligini birinchi marta ko'rsatib berdi.

Ekologiya rivojlanishining 3-davri davrimizning galabasi bilan bog'likdir. Bu davrda biologiyaning e'tibori moslanish, adaptatsiya ni o'rganishga qaratildi.

Ch. Darvinning tarixiy xizmati shundan iborat ediki, u o'zining tabiatda tanlanish va turlarining kelib chiqishi " kitobida, 1859 y. organizmning rivojlanishini evolyusion ilmiy nazariyasini berdi, bu esa ekologiya tarixida yangi davr bo'ldi. Tabiatdagi yashash uchun kurash, ya'ni tur va muhit o'rtasidagi har qanday qarama-qarshiliklarning ko'rinishi tabiiy tanlanishga olib keladi.²⁸

Bu haqida K.A.Temiryazov o'z asarlarida shunday deb yozadi. "Moslanish tushunchasining kelib chiqishi, aniqlanishi bilan -Gekkel' tomonidan o'ylab chiqilgan va ekologiya nomini olgan yangi oblast' paydo bo'ldi".

Xaqiqatdan ham, davrinizm 2 ta biologik fan -genetika va ekologiyaning paydo bo'lshida asosiy rol' o'ynadi.

Ekologiyaning keyingi taraqqiyotida 1877 y. nemis olimi K.Mebius tomonidan biosenoz ta'limotining ishlab chiqilishi katta ahamiyatga ega bo'ladi. Shu munosabat bilan ekologiyada yangi yo'nalish-jamoa ekologiyasi rivojlana boshladi .4

1898 yilda Shimperning " Geografiya rasteniy na fiziologicheskoy osnove" degan kitob bosmadan chikdi. Bu kitobda ekologiyaning o'simliklar fiziologiyasi bilan yaqinlashish ko'rsatilgan.

Ekologiyaning rivojlanish 4 davri ekologiyaning umumiy biologik fan sifatida rivojlanishi bilan xarakterlanadi. Bu vaqtga kelib V.Shelfordning 1933 y " Muhit va jamoa", bu asar keyinchalik F.Klemints "Hayvonlar ekologiyasi asoslari" nomi bilan yozilgan darslik bo'lib qoldi va V.Shel'fordning 1933 "Bioekologiya", E.Odushning "Ekologiya" 1963, Riklfsning "Ekologiya" 1979 yil kitoblari paydo bo'ldi.

20 asrda ekologik metodlarning takomillashishi bilan yangi ekologik omillar: kun uzunligi, tuproq eritmasining reaksiyasi, mikroelementlar ta'siri o'rganila boshlandi.

Antropogen omillarning tabiatga ta'siri kuchayishi natijasida ekologiya o'rganadigan masalalar kengaydi Masalan, havoning gazlar bilan zaxarlanishi, radiasiyalash va Sanoat ekologiyasi vujudga keldi.

Amerikada bu yillarda indikasion botanika rivojlandi ya'ni tuproqning har xil xususiyatlarini ko'rsatuvchi o'simliklar xaqida.

B.Ch.Bernadskiyning ilmiy ishlarida Biosfera to'g'risidagi ta'limotlar berilib, tirik organizmlarning roli to'g'risida aytilgan.

B.V.Dokuchaevning ilmiy ishlari Morozov tomonidan "O'rmon to'g'risidagi ma'lumotlar" kitobida davom ettirildi. Bunda o'rmon o'simliklari ekologiyasi asosi berilgan. Bu soxada Visoskiyning ilmiy ishlari katta ahamiyatga ega.

1. ²⁸ Mustafaev S.M., Ahmedov O.A., Samatova Sh. O'simliklar sistematikasidan amaliy mashg'ulotlar. – T.: "YUNAKS-PRINT" MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.

O'rta asrlarda O'rta Osiyoda yashagan olimlardan Muxammad muso al Xorazmiy, Abu Nosir Farobiy, A.R. Beruniy va boshqalar tabiat fanlarining rivojlanishida katta hissa qo'shdilar.

O'rta asrda Abu Ali Ibn Sino dorivor o'simliklarning morfologiyasi nomlarining kelib chiqishi, tarkibi va geografiyasini o'rganib, shu to'g'risida qimmatli ma'lumotlar qoldirgan. U o'z fikrini bayon etishda doimo muhit bilan odamning o'zaro munosabatlarini eslatib o'tadi. Uning aytganlari hali ham o'z ahamiyatini yo'qotgan emas.

Maxmud Qoshg'ariyning ishlarida ekologiya haqida fikrlarini uchratamiz. Ular yozgan kitobida 200 ta o'simlik to'g'risida ekologik, morfologik va geografik ma'lumotlar bor.

Hali ekologiya fani yo'q bo'lgan davrda tabiat va undagi muvozanat, tabiatni e'zozlash haqida qimmatli fikrlar aytilgan. Masalan: Al-Xorazmiy o'zining bir risolasida shunday dedi: "Bilinki, daryoning ko'z yoshlari uning boshida ham-kulfat tushganligini bildiradi. Odamlar daryodan mehringizni darig' tutmanglar!". Bu bilan buyuk olim nimalarni ko'zda tutdi ekan. Extimol u daryo suvining ortiqcha isrof bo'lishini nazarda tutgandir !.

O'rta Osiyo o'simliklari va hayvonlari to'grisida botanik va geografik ma'lumotlarni Bobur asarlarida uchratamiz.

Bobur nomi aytilganda bazilar uni shoir deb biladi. Bir chekkasi bu tushuncha to'g'ri ham. Bobur g'azallari juda jozibador, har kimga manzur. Ammo Bobur faqat shoirgina bo'lmay, balki podshoh, sarkarda, tarixchi va bog'bon, sayyoh va tabiatshunos bo'lgan.

Bobur asarlari misoli tagi yo'q bir xazina "Boburnoma" yoki Boburiya - Z.M. Boburning eng yirik asaridir. Bu Boburning Farg'onadagi yoshlik kunlaridan, to Hindistonda podshoh bo'lgungacha yuz bergan jami voqealarning mufassal tarifi. Asarda Boburning yurgan, ko'rgan-kechirganlari, yurgan joylarining tabiati, boyligi, odamlari, urf-odati, hayvonoti va ekinlari va boshqalar tasvirlangan. Har bir kasb egasi bu kitobda o'ziga xos, keragicha ma'lumot topali. Unda er, suv, havo turli tabiiy hodisalarga tegishli xalq so'zlari ko'plab topiladi.

"Boburnoma"ni o'qigan va o'rgangan har bir kishi, uni tabiat va geografiyani yaxshi bilgan o'lkashunos va olim yozgan degan xulosaga keladi.

Bobur o'lkani bilgan kishilarni xurmat qilgan, ularning qadriga etgan va ular bilan xamisha maslahatlashgan.

"Biron safarga chiqishdan oldin er, suv bilur kishilarni chorlab, atrof va tomonlarni surishtirar edi".

Bobur har bir xududni ma'lum bir tartibda tasvirlaydi. Avvalo joyning geografik o'rni, so'ngra qaysi iqlimga mansubligi, har xil shifobaxsh joylari, o'simliklari, qazilmalari, hayvonot va aholisi beriladi.

Bobur tabiatdagi ba'zi hodisalarni tasvirlaganda, ularni mutlaqo mo'jizalarga bog'lamaydi. Bobur iqlim va meteorologik hodisalar bilan qiziqqan. U o'zi bergan har bir mamlakatning qaysi ikdimiga mansubligini yozadi.

Bu haqiqatdan ham ajoyib fikrlardir, bunda Farg'ona ikdimining qisqa holati nimaga bog'liq ekanligi to'ppa-to'g'ri aytilgan.

Demak, havo oqimlari g'arbdan sharqqa qarab esishi ham unga ma'lum bo'lgan.

Bobur ajoyib geobotanik bo'lgan. U o'simliklarni sevgan yaxshi bilgan. U O'zbekistondagi juda ko'p dorilarni, ularning hosiyatlari va ahamiyatini tariflagani; bog'bon bo'lgan kishi, mirishkor kishi, asl tabiatshunosgina buning uddasidan chiqa oladi.

Bobur o'simliklar to'grisida juda ko'p qimmatli fikrlarni aytganki, ularni maxsus o'rganmoq kerak. Uning ilmiy geografik merosini o'rganish uchun, uning asarlaridan har bir tabiatshunos ilxom topadi.

Boburning "tabiat viloyatlari shaydosi bo'lishi uning avlodlariga ham o'z ta'sirini ko'rsatganki, o'g'illari Xumoyun, Kamron, qizi Gulbadanbegim hayotida ham ko'ramiz.

Biz yuqorida nomlari tilga olingan va ko'plab bobolarimiz merosini chuquroq o'rganishimiz va kelajak avlodni tarbiyalashda foydalanishimiz lozimdir.

Global ekologiyaning taraqqiyotida V.N.Sukachevning biosnoz to'g'risidagi ta'limoti kuchli burilish vujudga keladi. Umumiy ekologiyaning rivojlanishida katta xissa qo'shgan olimlar bularga: - D.N. Kashkarov, S.A. Seversov. Ekologik parazitologiyada: V.N. Beklemishev, V.A. Dogel', E.N. Pavlovskiy: ekologik entomologiyada - V. Vasesov, N.A. Gerbil'skiy, K.M. Deryugin, L.A. Zenkevich, S.A. Zernov: o'simliklar ekologiyasida: I.G. Serebryakov, E.P. Korovin, K.Z. Zokirov va boshqalar.

Ekologik fiziologiyaning rivojlanishida olimlarimizning qilgan ishlari kattadir. O'simliklarning qurg'oqchilikka chidamliligini Maksimov, Yu.S. Grigor'evlar o'rgandilar, yorug'lik ta'sirini Ivanov, fotosintez ekologiyasini Lyubimenko, Nichiprovich, Zalenskiy, Voznesenskiylar: o'simliklarning sho'rga chidamligini G.A. Xenkellar o'rgandilar, sovuqqa chidamligini Tumanov o'rgandi. Shuningdek ekologiyaning rivojlanishida Ramenskiy, Shennikovlarning xizmati katta bo'ldi.

Populyasiya ekologiyasi 1930 yilda ekologiyaning yangi tarmog'i, ingliz olimi El'ton tomonidan rivojlantirildi. U ayrim organizmlarni o'rganishdan populyasiyalarni o'rganishga o'tish kerakligini aytdi, chunki moslanish proseslari populyasiyada bo'ladi. Populyasion ekologiyaning rivojlanishida Seversov, Shvars, Naumov, Viktorov, Rabotnov va Uranovlar katta rol o'ynadilar 1940 yillarda tabiiy sistemalarni o'rganish asosida yangi yo'nalishlar kelib chikdi.

1935 yilda fanga "ekosistema" terminini ingliz Tensli

1942 yilda esa V.N. Sukachev "biosnoz" terminini berdi. Biosnoz haqida ta'limotni ilgari surdilar. Bu tushunchalarda organizmlar va abiotik muhit orasida boglanishlar ifodalanadi va modda aylanishi to'grisida aytilgan.

O'ZBEKISTONDA EKOLOGIYA FANINING QISQACHA RIVOJLANISH TARIXI

Yuqorida aytib o'tganimiz kabi, bizning bukj allomalarimiz tabiat, tirik organizmlar va ularning tashki muxit bilan o'zaro aloqasiga doyr masalalarga to'xtalganlar.

O'zRFA qoshidagi Botanika, Zoologiya va Parazitologiya instituta olimlari o'simlik va hayvonlar ekologiyasiga bog'langan ishlar olib borishgan, hozirda ham bu ishlar olib borilmokda.

O'rta Osiyo o'simliklar olamini o'rganishda-M.S. Popov akademiklar: K.P. Korovin, K.Z. Zokirov, A.M. Muzaffarov, I.I. Granitov, S. Saxobidinov, A.I. Vvedenskiy kabi olimlarning nomi bilan bog'liq.

O'zbekistonda ekologik yo'nalishdagi ishlarning asoschilari-D.N. Kashkarov, E.P. Korovinlar edi. 30 yillarda Kashkarovning ekologiya masalalari hal qiladigan qaror: Muqim va jamoa, Turkiston hayvonlari", Hayvonlar ekologiyasi asoslari" kabi yirik ilmiy asarlar chop etiladi. Ular ekologik ilmiy tadqiqot ishlarini rejalashtirish, ekolog mutaxassislar tayyorlash masalasini o'rtaga tashlaydilar, ularning nihoyatda zarurligini aytishgan.

Shu yillarda Korovin-o'simliklar jamoasi va muxitni birgalikda o'rganish kerakligini aytadi. Cho'l zonasining imliklarini o'rganish maqsadida kompleks ekspedisiyalar tashkil qiladi.

Korovin, Granitov kabi olimlar rahbarligida cho'l mintaqasidagi yaylovlarni yaxshilash borasida, u erdagi kserofit guruhiga oid o'simliklarni o'rganishga kirishiladi.

1950 yilda ekologiya ishlarining dolzarbligi munosabatini hisobga olib, UzRFA Botanika institutida V.A. Burgin rahbarligida xodimlari tomonidan cho'l va chalacho'l sharoitida o'simliklarning qurg'oqchilikka moslanish yo'llari o'rganildi.

O'rta Osiyoda ekologiya sohasida katta ilmiy ishlar D.N. Kashkarov, E.P. Korovin, M.G. Popov, K.Z. Zokirov, I.I. Grani-tovlar tomonidan olib borildi.

Danil Nikolaevich Kashkarov tomonidan bizning sobiq davlatimizda birinchi marta kompleks zoologik kuzatishlar metodikasi ishlab chiqildi. U bir qator ekologiya

masalalarini hal qilishda rol' o'ynagan kitoblar qoldirdi. Bu "Sreda i soobshestvo"/"Jivotnie Turkestana, "Osnovi ekologii jivotnix va boshqalar.

O'zbekistonda ekologik izlanishlarning yana bir asoschisi va tashkilotchisi E.P.Korovin edi. U 30-yillarda o'simliklar jamoasi va muxitini birgalikda o'rganish kerakligini aytdi. Bunday ilmiy kuzatish keyinchalik 1967-1987 yillarda Fargona vodiysi sharoitida kompleks ekologik ishlar b.f.d.O.X.Xasanov va R.S.Vernik va boshqalar tomonidan davom ettirildi. Natijada adir o'simliklarning ekologik klassifikatsiyasi berildi.

Hozirda bunday ishlar Jizzax cho'llarida, Orol sharoitida davom ettirilmokda.

D.N.Kashkarovning dastlabki ishlari kemiruvchilarni o'rganishga bagishlangan edi. Ularning biologiyasi, sistemasi va zarariga e'tibor berish bilan birga hayvonlar ekologiyasi bo'yicha ham ish olib borildi.

1928 y. u AQSh ga boradi va 7 oy davomida yirik ekologlarning ishlari bilan tanishadi. UzRFA ning akademiklari T.Z.Zohidov, AM.Muhammadiev, muxbir a'zolaridan M.A.Sultonov, R.O.Olimjonov, V.V.Yaxantovlar O'zbekistonda zoologiya tadqiqotlarining rivojlanishida o'z hissalarini qo'shgan olimlardir. Zoologiya tadqiqotlari UzRFA ning Zoologiya va parazitologiya ishlari faoliyati bilan bog'likdir. M.A.Sultonovning "O'zbekiston qushlarining gel'mentlari", 1963 y V.V.Yaxantovning "Hashoratlar ekologiyasi" 1963 y. Vohidovning "qizilqum cho'lining biosenozlari kabi asarlari paydo bo'ldi.

1981-85 yillarda Uzbeki stoila ovlanadigan kamyob hayvonlar. Ekosistemasini o'rganishga kirishildi. Sut emizuvchi noyob hayvonlarning sonini kamayib ketish sabablari, ularning arealini tanlash, kamyoblarini sakdash va ulardan oqilona foydalanish yo'llari ishlab chiqildi.

1979 yillarda ixtiologiya va gidrologiya laboratoriyasi xodimlari O'zbekistonning suv atroflari, suv ifloslanishi, suv hayvonlari ekologiyasi va suv resurslaridan foydalanish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib bordilar.

Hozirgi paytda Botanika institutida ekologik fiziologiya, ekologik anatomiya, ekologik embriologiya sohasida ilmiy ishlar olib borilmokda.

20-asrning 2-yarmida odamlarning koinotga ta'sirining kuchayishi natijasida atrof-muhitdagi antropogen o'zgarishlarini o'rganish va bu muhitni yaxshilash katta ahamiyatga ega. Atrof-muhitning zaharlanishi odamlar sog'lig'iga, o'simlik va hayvonlarning hayotiga yomon ta'sir ko'rsatadi. Masalan: Tojikistondagi alyuminiy zavodi, ftor birikmalari chiqarib turadi, natijada mevalar, o'simliklar va hayvonlar zaharlanmokda. Shuning uchun zavod va fabrikalar qurish uchun oldin ekologik ekspertizadan ruxsat olinadi.

BIOSENOZ XAQIDA TUSHUNCHA

Tabiatda hayot uchun zarur bo'lgan biogen moddalar to'xtovsiz ravishda aylanib turadi. Avtotrof organizmlar atrof- muhitdan kimyoviy moddalarni o'zlashtiradi, bu moddalar geterotroflar orqali qaytadan atrof-muhitga qaytadi. Bu jarayon juda murakkab formalarda boradi. Har qaysi tur organik moddasi energiyaning faqat bir kesimidan foydalaniladi va uni ma'lum bosqichga parchalaydi.

Tirik mavjudotlar guruhini va ularning yashash muhitini o'z ichiga olgan funksional sistema - ekologik sistema deb ataladi.

Bizga yaxshi ma'lumki, tabiatda o'simlik va hayvonlar jamoa holidi yashaydilar. Jamoa deganda-rivojlanishning turli bosqichlarida bo'lgan bir gurux organizmlarning muayyan sharoitda, birgalikda yashashi tushuniladi. Bunda ular o'zaro munosabatda bo'ladilar. Bundan kelib chiqib: muayyan sharoitda o'simlik, hayvon, zamburug' va mikroorganizmlarning birgalikda yashashi- biosenoz deyiladi.

Agarda bir qancha o'simlik birgalikda qavm bo'lib yashasa fitosenoz, (o'sish jamoasi) bir qancha tur hayvonlar birgalikda qavm bo'lib yashasa-zoosenoz (hayvonlar jamoasi) deyiladi.

Yoki oddiyroq qilib aytganimizda muayyan maydonda tarkalgan, birgalikda yashovchi va bir-biri bilan bog'liq bo'lgan organizmlar gruppasi-biosenoz deyiladi.

Biosenoz-lotin tilidan olingan so'z bo'lib,"bios"-hayot," senoz "umumiy deb tarjima qilinadi.

"Biosenoz" terminini nemis biolog Mebius tomonidan 1877 y.berilgan. Bu o'simliklar, hayvonlar va mikroorganizmlarning birga yashashi bo'lib, ular ma'lum erda eki suv xavzasida bo'lishi mumkin. Biosenozdagi organizmlar bir-birovi bilan va abiotik muhit bilan bog'liqdir.

GEOBOTANIKA ASOSLARI

Tabiatdagi o'simliklarning kelib chikishi va turlarini sistematiklar, tuzilishini morfologlar va o'simliklar jamoalarini geobotaniklar o'rganadilar, Demak, geobotanika — Er sharidagi jamiki o'simliklarning tuproq muhitiga bo'lgan munosabati va tuproqning o'simliklarga ta'sirini, o'simlik turlari yig'indisini tashkil etadigan jamoasini o'rganadi.

U ma'lum o'simlik jamoasidan tortib yer sharidagi o'simliklar koplamini ham o'rganadi.

Tabiatdagi o'simliklar dunyosi ikki tomonlama o'rganiladi. Biri o'simliklar florasi balsa, ikkinchisi o'simliklar jamoasi. «O'zbekiston florasi» deganda, O'zbekiston xududida usuvchi o'simlik turlarining yig'indisi yoki ruyxati tushuniladi. «O'zbekiston o'simliklari» deganda esa mazkur x,ududda uchrovchi tabiiy va sun'iy o'simliklar jamoasi tushunilib, bu ma'lumotlarni geobotanika yoki fitosenologiya" fani o'rganadi. O'simliklar jamoasi — *fitosenoz* deb atalsa, xayvonlar jamoasi *zoosenoz* deyiladi. Fitosenoz va zoosenoz birgalikda umumiy biologik *biosenozni* tashkil etadi. Biosenoz tabiatdagi barcha tirik organizmlar jamoasi demakdir.

Tabiatdagi tirik organizmlar o'zaro bir-birlari bilan bog'liq bo'lgan adlda, ular tashqi muhit iklim va tuproq, muhiti bilan aloqada bo'ladi. Bunday o'zaro munosabatlar biogeosenologiya soxasida o'rganiladi. Biogeosenologiyaning bir qismi bo'lgan geobotanika faqat o'simliklar jamoasini o'z ichiga oladi.

O'simliklar tashqi muxit bilan boglangan xolda, xayotining turli bosqichlarida o'zaro munosabatda bo'ladi. Bunday munosabatlar yoruglik uchun, usish va rivojlanish uchun bo'lgan intilishda ruyobga chiqadi. Bu munosabatlar o'zaro x,amkorlik va rakobatlik kabi kurinishda namoyon bo'ladi. Natijada, individlar (yoki turlar) ichida tanlanish jarayoni sodir bo'ladi. Bunday tanlanishda ayrim individlar jadal rivojlanish imkoniyatiga ega bulsalar, ayrimlari inkirozga tomon boradilar.

Xozirgi vaqtda geobotanika fani oldida turgan muadm vazifa o'simliklar koplaming ahamiyatini aniklash, tabiiy resurslarni o'rganish, ularni xaritaga tushirish va eng muximi mazkur resurslardan oqilona foydalanib, salbiy yullarni ijobiy yo'llarga o'zgartirishni ilmiy asosda tushuntirib berishdan iboratdir.

Tabiatni muhofaza qilish

MDXda o'simlik olami ya'ni florasi(flora bu o'simlik olami so'zidan iborat) 19 ming turdan iborat. O'zbekistonda esa 4183 turga etadi. Ularning orasida sanoat, qishloq ho'jaligi va tibbiyotda katta ahamiyatga ega bo'lgan o'simliklar tashkil etadi.

O'simliksiz hayot er yuzida bo'lmagan bo'lar edi. Odamlarning va hayvonlarning hayoti o'simliklarga bog'liq. Masalan, nafas olishimiz va ovqatlanishimiz ham o'simliklarga bog'liq. O'simliklar havoni O₂ bilan boyitib turadi, SO₂ gazini kamaytirib turadi.

Oziq - ovqat o'simliklariga bug'doy, arpa, makkajo'xori, tariq, suli, sholi, mosh, loviya, no'xat, kungaboqar, eryleng'oq, zig'ir, kunjut, g'o'za. Zig'ir bilan g'o'zani oziq-ovqat hamda texnika o'simliklariga kiritiladi. Dorivor o'simliklarga kanakunjut, shaftoli, makkajo'xori, yalpiz, mavrak, qora zira, archa (kubba preparatlari siydik haydovchi, siydik yo'llarini dizinfeksiya qiluvchi, balg'am ko'chiruvchi hamda ovqat xazm qilish prosesini yaxshilaydi). Valeriana, qarag'ay kurtagi (archa qubbasiga o'xshash, bargi singa kasalligini davolashda ishlatiladi), Kamfora daraxti, arpabodiyon bu o'simliklarning mevasi va moyi ishlatiladi. Mevasi va moyi medisinada bronxit kassaligida balgam ko'chiruvchi, ichak faoliyatini yaxshilovchi, el haydovchi dori sifatida ishlatiladi. Moychechak (ichak yopishib qolganda va ich ketganda va ginekologik kasalliklarni davolashda ishlatiladi, ogiz tomoq chayqashda shifobaxsh vanna tayyorlashda ishlatiladi), kora andiz - balgam ko'chiruvchi dori sifatida hamda meda va ichak kasalliklarida ishlatiladi, ermon - ishtaxa ochadigan va ovqat hazm qilishni yaxshilaydigan hamda, jigar, o't pufagi va gastrit kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Bo'ymadaron me'da - ichak kasalliklarini va qon to'xtatuvchi dori sifatida ishlatiladi. Gulhayri, zupturum, gorchisa(xantal), achchiq bodom, achchiq bodom suvi bemorni tinchlantiruvchi va og'riq qoldiruvchi dori, chuchuk bodom urugi ich yumshatuvchi, emulsiya tayyorlashda ishlatiladi. Qoqio't -ishtaxa ochuvchi, o't haydovchi dori sifatida ishlatiladi, sanbitgul xonalarda o'stiriladi, yurak kasalligida, nashasimon kendir, adonis, marvaridgul, erizimum, angishvona gul, jen'shen aqliy va jismoniy jihatdan charchaganda, mehnat qobiliyati susayganda, qon bosimi pasayganda organizmning umumiy tonusini ko'taruvchi dori sifatida ishlatiladi. Araliya, eluterokokk, xitoy limonnigi, levzey, exinopanaks bular jeninenga o'xshash ishlatiladi.

Serquyosh o'lkamiz shifobaxsh o'simliklarga boy. Muqaddas tuprog'imizdagi xar bir giyoh mo'jiza, inson dardiga davo, umriga umr qo'shadi. Viz ana shu giyohlarni yanada ko'paytirish uchun qayg'urishimiz kerak, zeroki bu giyoxlar dardimizga davo, o'lkamiz xusni.

Siz tibbiyotda xodimlari shifobaxsh o'simliklarni kamayib ketishiga yo'l. qo'ymakg, ularni. ko'p&ytirish. uchun. yordam ber'tt, qaysi vaqtda o'simlikni yig'ishni o'zingiz bilib oling va boshqalarga o'rgating.

Hayvonlardan olinadigan dorivor mahsulotlar ustida to'xtalib o'tmoqchiman.

QIZIL KITOB TO'G'RISIDA

Tabiatni muxofaza qilish, o'simlik dunyosini, hayvonot dunyosi bilan birga saqlashda qo'riqxonalar muqim rol' o'ynaydi.

Qo'riqxonalardan barcha tabiiy kompleks shundayligicha saqlanadi. Ularning xududidagi daraxt va butalarni kesish, pichan tayyorlash, mol boqish, baliq va boshqa hayvon va qushlarni ovlash, meva va boshqa narsalarni yig'ish taqiqlanadi. Davlat qo'riqxonalarining asosiy vazifasi mazkur tabiat zonasi uchun tipik bo'lgan zonani tabiiyligicha saqlash va undagi o'simlik, hayvon va qushlarni o'rganishdir. Bu erda qimmatli hayvon va o'simliklar sonini tiklash bo'yicha ulkan ilmiy tadqiqot ishlari olib boriladi.

Mashhur bo'lgan qo'riqxonalardan: O'rta Osiyoda qoraqum cho'lida Repetek qo'riqxonasi. Orol dengizining cho'l orolida Borsakelmas qo'riqxonasi, maydoni 18,5 ming

km Amudaryo havzasidagi Payg'ambar orol qo'riqxonasi, Tyan'-Shan' Chotkol tog'-o'rmon qo'riqxonasi, Sari-Chelak qo'riqxonasi, Jizzax viloyatida Zomin tog'-o'rmon qo'riqxonasi.

EKOLOGIK OMILLAR

Ekologiya so'zi grekcha «*oykos*» — uy, «*logos*» — bilim degan ma'noni bildirib, 1866 yili E. Gekkel tomonidan tavsiya qilingan. Hozirgi vaqtda ekologiya deganda tirik tabiatga, o'zi yashab turgan tashqi muxitining kursatadigan ta'sirini o'rgatadigan fan tushuniladi.

Tashqi muxit deganda tirik tanani qurshab olgan barcha abiotik va biotik omillar (faktorlar) tushuniladi. Er sharida dayot bundan 1 milliard 700 million yil ilgari paydo bo'lgan. Unda xujayragacha bo'lgan sodda to'zilgan avtotrof va getyerotrof xoldagi orga-nizmlarning tashqi muxit ta'sirida rivojlanishidan eng yuksak bosqichda turgan gulli o'simliklar paydo bo'lgan. Tarixiy evolyusion tarakkietda tashqi muxit o'zgarishiga moslasha olgan o'simlik individlari saklanib kolgan va tarkala borgan.

Xulosa qilib aytganda tirik organizmning xayotini tashqi muxitsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Keyingi bir necha un yillar ichida insonning tirik tabiat va tashqi muxitga kilgan ta'siri natijasida ona vatanimiz, zilol suvlarimiz, musaffo xavomiz zaxarlandi. Tabiiy o'simliklar o'sadigan joylar rejasiz bir tomonlama o'zlashtirilib genafondimiz juda qisqarib ketdi. Tabiiy o'simliklar, jumladan dorivor o'simliklar, xar xil tabiblar, pulga uch insonlar, xatto ayrim geologlar tomonidan yukotilyapti. Buning oldi olinmasa kelajak avlod kechira olmaydi gan vokealar . sodir bo'ladi. Shularni xisobga olgan xolda o'simliklar ekologiyasiga insonlar katta e'tibor bilan karashlari, tabiatni muxofaza kilishlari lozim. Tashqi muxit *ekologik omil* (faktor) deb yuritiladi.

O'simlikka ta'sir qiladigan xar bir ekologik omil bula oladi. Ekologik omillarning biri ikkinchisi o'rnini bosa olmaydi.

Ekologik omilni 3 ta guruxga bo'lib o'rganish mumkin.

1. *Abiotik omillar.* Bunga iklim (issiklik, yoruglik, xavo okimi, shamol, suv) tuproq va rel'ef kabi omillar kiradi.

2. *Biotik omillar.* Bunga o'simliklarga xayvonlarning va xayvonlarga o'simliklarning ta'siri, xatto o'simliklarni o'zaro ta'siri xam kiradi.

3. *Antropogen omillar.* Bunga o'simliklarga insonlarning kursatadigan ta'siri kiradi.

Ayrim tarixiy omillar xam aloxida omil sifatida o'rganiladi.

Jamiki ekologik omillar asosan o'simliklarga birgalikda ta'sir kursatadi. Masalan, tuproqning tarkibi, suv, xavo, issiklik kabilar o'simliklarga bevosita ta'sir kursatsa, umumiy ta'sir etuvchi omillarga rel'ef, tog jinlari, tuproq tarkibining o'zgarishi, muayyan xudud iklimining o'zgarishi kiradi.

Iklim omillari. O'simliklarga ta'sir qiladigan iklim omillariga suv, xavo, yoruglik, xarorat, shamol kiradi. Bu omillar o'simliklarga o'ziga xos tarzida ta'sir kursatadi.

Suv.

Suv tirik tabiatning bir qismi bo'lgan o'simlik xayoti uchun Xam eng muxim omillardan xisoblanadi. Tirik tabiatni suvsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Suv tirik tanani tashkil kilgan xujayralarning asosiy qismini tashkil qiladi. Xujayradagi barcha jarayonlar suvsiz sodir bo'lmaydi. Xujayrada sodir bo'ladigan jarayonlar: fotosintez (assimilyasiya), nafas olish (dissimilyasiya) va suv buglatish (transpirasiya) ma'lum miqdordagi suv ishtirokida amalga oshadi.

Tabiatdagi suv yomg'ir, kor, dul, shudring, tuman, kirov, mo'z kurinishlarida uchraydi. O'simliklarga suv ikki manba (tuproq va atmosfer) orqali ta'sir qiladi. Suvni o'simlik yerdan ildiz suruvchi tukchalari orqali surib oladi. Tuproqdagi suvning umumiy

miqdori va uning fasllar buylab taqsimlanishi o'simlik xayoti uchun juda katta ahamiyatga ega. Yiliga juda ko'p miqdorda yog'in tushadigan (10.000 mm) tropik iklimli sharoitdagi viloyatlarda o'simliklar yaxshi rivojlanadi va ularning turlari nixoyatda ko'p bo'ladi. Yiliga (8 mm) juda kam yogin yogadigan ulkalarda (cho'l zonasida) xam o'simliklar shu sharoitga moslashib o'sadi. Lekin ularning turlari kam bo'ladi. YOGINNING o'simlik xayotiga ta'sirini O'rta Osiyo misolida kurish mumkin. O'rta Osiyoning togli mintakala-rida yiliga 2000 ml gacha yomg'ir yogadi va bu yogin yil fasllari buylab taqsimlanadi. Yoz oylarida xam tez-tez yomg'ir yogib turishi o'simliklarning yaxshi usishiga yordam qiladi va bu yerlarda 7 mingga yakin tur o'simliklar o'sadi. O'rta Osiyoning cho'l zonasida yomg'ir yoz faslida yogmaydi, shuning uchun bu zona florasida 800 ga yakin o'simlik turlari uchraydi.

O'simliklar tanasidagi suvni boshqarishiga karab ikki guruxga bo'linadi. Bir gurux o'simliklar tanasidagi suv rejimini faol boshqara olmaydi. Bularga yupqa bargli kirkkuloklar va suv o'tlar kiradi. Ikkinchi gurux o'simliklar tanasidagi suv rejimini ogizchalari faol boshqaradi. Bunday o'simliklarga yuksak o'simliklar misol bo'ladi. Er sharining turli ulkalarida yashaydigan o'simliklar, xar xil miqdorda suv bilan ta'minlanadi. Suv bilan ta'minlanish me'yoriga karab tabiatdagi o'simliklar quyidagi guruxlarga bo'linadi.

Gidrofitlar.

Bunday o'simliklarning tanasi asosan suvda bo'lib, bir qismi suvdan tashqariga chiqib turadi. Gidrofitlar tanasida mexanik tukimalar rivojlanmaydi, aksincha aerenxima kuchli rivojlanadi. Barglaridagi ko'tikula deyarli yupqa bo'lib, ogizchalar faqat barglarning ustki epidyermisida bo'ladi. Suv o'simlikka bo'tun tanasi bilan shimilgani uchun o'tkazuvchi gukima va ildiz suruvchi tuklari yaxshi rivojlanmaydi. Barg mezofilidagi xujayralar faqat bulo'tsimondir.

Gidrofitlarga suvo'tlar, suv grechixasi, nilufar, valesnyeriya, elodeya kabi o'simliklar misol bo'ladi.

Gigrofitlar.

Gigrofitlar gidrofitlardan farq qilib, kuruk-likdagi namlik sharoitida yashaydi. Botkoklikda, dare buylarida urmonlarda yashagani uchun barglari yirik, ko'tikulasiz, tuksiz, ogizchalari bargning ikki tomonida bo'ladi. Suv ko'p bo'lgani uchun aloxida ochik xolda to'zilgan ogizchalar mavjud bo'lib ular *gidatodlar* deb ataladi. Ayrim o'simliklarda bir mino'tda bir necha unlab suv tomchisi gidratrdlardan tomib turadi. Ular tanasidagi suv bosimi 8—10 atmosferaga kadar boradi. Gigrofit o'simliklarga savagich, kamish, kiyok va madaniy o'simliklardan sholi misol bo'ladi.

Mezofitlar.

Mezofitlarga namligi etarli bo'lgan urtacha sharoitdagi tuproqda o'sadigan o'simliklar misol bo'ladi. Bularga urmonlarda, dalalarda o'sadigan o'simliklardan: go'za, beda, kovun, tarvo'z, pomidor va barcha mevali daraxtlar misol bo'ladi. Mezofitlar ildizidagi bosim 10—15 atmosferaga teng bo'lib, kuchli tarmoklanib, tuproqda katta xajmni tashkil etadi.

Ksyerofitlar.

Tuproqdagi namlik miqdori xar xil bo'ladigan dasht va cho'llar uchun kurgokchilikka chidamli o'simliklar misol bo'ladi. Ularda transpirasiya jarayoni xam turlicha (gox tez, gox suet). Ksyerofitlar anatomik va morfologik jixatdan kurgokchilikka moslashgan o'simliklar xisoblanadi. Ularning barglari katta bo'lmaydi, namlik tankis bo'lganda, xatto yosh novdalari barglarini tukib yuborishi mumkin (kumli akasiya). Ksyerofitlarning xujayra-lari mayda bo'lib, pusti kalın, koziksımon tukimalar yaxshi rivojlangan, zich joylashgan ogizchalari barg yuzasidan ichkari-rokka joylashadi. Ildizdagi bosim ayrim xollarda 100 atmosferaga etishi mumkin. Ularning ildizi juda chukur — 20 m gacha boradi. Masalan, beda, kora saksovul 16—

18 m va yantoklar ildizi yerga 20 m chukurlikka kadam borishi mumkin. Ksyerofitlarga shuvok, ermon, ok va kora saksovul, jo'zgin, pista kabilar kiradi.

Ksyerofitlarning ayrim turlari *sukkulentlar* deb ataladi. Ular tabiatga ajoyib tuzilishi bilan moslanadi. Chunki ularning poya va barglarida nasos xususiyatiga ega bo'lgan tukimlar rivojlanadi. Fotosintez jarayoni kundo'zi ogizchalarning yopik xolatida xam sodir bo'ladi (fotosintez jarayoni mavzusida bu xakda yoritilgan). Sukkulentlarga shakarkamish, agava, aloe, kaktuslar, so'tlamalar misol bulishi mumkin. O'rta Osiyo cho'llarining sho'rxok yerlarida o'sadigan shuralarning xujayra shirasi konsentrasiyasi katta bo'lgani uchun ularning surish kuchi yukori bo'ladi. Shuradan tashqari seta, xaridandon, syersazon kabilar misol bo'lib, ular *galofitlar* deb yuritiladi. Gidrofitlar tabiatdagi xamma o'simliklarning eng qadimiysi bo'lib, xayoti faqat suvda o'tadi. Lekin gidrofitlarga ayrim gulli o'simliklarning ajdodlari kuruklikda yashovchi o'simliklar bo'lganligi sababli, ularning yana suvda yashashga kaytishi o'zok evolyusion tarakkiyot natijasida sodir bo'lgan. Shuning uchun ularning morfologiyasida katta o'zgarishlar bo'lgan. Masalan, chastuxadoshlar oilasiga mansub o'simliklarni bargi 3 xil: suvda, suv yuzasida va suv ustida yashaydi.

Qurg'oqchilik sodir bo'ladigan joylarda cho'l, dashtlarda efemyer va efemyeroidlar yashaydi.

Efemyer o'simliklarning ontogenezi juda qisqa (xatto 3—4 xaf-ta) bo'ladi. Ularga erta baxorda urug'dan ko'karib yogingarchilik tugashi va xarorat 30° ga ko'tarilishi bilan xayotini tugatuvchi bir yillik o'simliklar kiradi. Jazirama issikda ularning urug'lari tuqiladi, tanasi kurib koladi. Issiq va sovukka chidamli urug'laridan keyingi yil baxorda yangi o'simlik usib chiqadi. Efemyerlarga huytikan, qizg'aldok, chitir, shotara kabilar misol bo'ladi.

Efemyeroid o'simliklarga ko'p yillik o't o'simliklardan, lola, boychechak, sapsargul yoki korakosh, kung'irbosh kabilar misol bo'ladi. Ular xam efemyer o'simliklarga uxshash qisqa davrlik bo'lib, asosan baxorda yogingarchilik davrida yashaydi. Issiq boshlanishi bilan yer ustki qismi kurib koladi. Lekin yer ostki qismi, ildiz tugunagi, piyoz boshi ildizpoyasi saklanib koladi va kalin pustga uralib, kulay sharoitgacha tinim davrini o'taydi.

Shunday qilib, efemyerlarning urug'lari, efemyeroidlarning yer ostki qismi noqulay sharoitga moslashgan.

Nazorat savollari

1. O'simliklar ekologiyasi xaqida
1. Ekologik muxit ta'rifi va tasniflanishi
2. Ekologik omillarni organizmga ta'siri
3. Abiotik omillar ta'siri
4. Biotik omillar ta'siri
5. Antropogen omillar ta'siri
6. O'simliklarning tuproq va xavo namligiga bo'lgan talabiga ko'ra sharoitlarga qarab xillari

Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o'quv

qo'llanmalar ro'yxati

1. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. – T.: O'zbekiston, 2005.- 435 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A., Samatova SH. O'simliklar sistematikasidan amaliy mashg'ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
4. Ahmedov O'.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elektron darslik.-T.: 2008.
5. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –
6. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
7. Hamidov A., Nabiev M.M. “O'zbekiston o'simliklarini aniqlagichi”.-T.: 1987.-235 b.
8. Василев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “ Высшая школа ”, 1988. -435 с.
9. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O'.A. va boshqalar. Dorivor o'simliklarning lotincha-o'zbekcha-ruscha-arabcha va forsha-tojikcha lug'ati.-T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
10. Berezovskaya T.P., Dmitruk S.E., Grishinna e.I., Belousov M.V. Основы farmatsevticheskoy botaniki. – Tomsk: Pechatnaya manufaktura, 2004.-294 s.
11. Xolmatov X.X., Ahmedov O'. A. Farmakognoziya. 1-2 qism. – T.: “Ibn Sino” nashiryoti, 2007.- 806 b.

Laboratoriya mashg'ulot – 1

Mavzu: Mikroskop va hujayraning tuzilishi

1. Darsning maqsadi:

O'simliklarning ichki tuzilishini o'rganishda mikroskopdan foydalaniladi. Mikroskop kichik buyumlarni kattalashtirib ko'rsatadigan asbob. hozirgi paytda turli xil mikroskoplar mavjud. Mikroskopni birinchi marta 1665 yilda ingliz olimi Robert Guk kashf etgan. Mikroskop orqali oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan hujayra qismlarini ham ko'rish mumkin. O'simlik ichki tuzilishini o'rganishda biologik mikroskoplardan foydalaniladi. hozirgi zamon biologik mikroskoplari ob'ektlarni ikki ming martagacha, elektron mikroskoplari esa qirqming martagacha kattalashtirib ko'rsatadi.

O'simlikning organini mikroskopda ko'rish bilan uning son-sanoqsiz mayda hujayralardan iborat ekanligini bilamiz. hujayra o'simlikning tarkibiy qismidir. O'simlik tirik, o'lik, bir va ko'p hujayralardan tashkil topib, ular nafas oladi, oziqlanadi, o'sadi, rivojlanadi, ko'payadi.

Hujayra yumaloq, kubiksimon, prizmasimon va boshqa shakllarda bo'ladi. hujayralar shakli jihatidan parenxima va prozenximaga bo'linadi. Parenxima hujayraning hamma tomoni taxminan bir xil o'lchamga, eni bo'yiga teng yoki bir oz kattaroq bo'ladi. Ular dumaloq, ko'p qirrali, plastinkasimon, yulduzchasimon shakllarda bo'ladi. Masalan, piyoz po'sti hujayrasida. Prozenxima hujayraning shakli cho'ziq, ya'ni bo'yi enidan bir necha marta uzun bo'ladi. Masalan, paxta tolasining hujayrasida.

2. Darsning vazifasi:

Mikroskopning tuzilishi, undan foydalanish qoidalari, doimiy va vaqtinchalik kesiklar tayyorlash, ularni bo'yash usullari bilan tanishadilar.

O'simlik hujayrasining tuzilishi, ularning shakli va tirik qismlari, organoidlarining vazifasini o'rganish nazarda tutilgan.

3. O'quv jarayonining mazmuni

1. Mikroskop qanday asbob va uning turlari
2. Mikroskopning optik va mexanik qismlari, ularning vazifalari
3. Mikroskop bilan ishlash qoidalari
4. Fokus oraliqini topish
5. Kesiklar tayyorlash
6. Kesiklarni reaktivlar bilan bo'yash
7. Hujayraning tuzilishi
8. Hujayra shakllari: parenxima va prozenxima hujayralar
9. Hujayra organoidlari va ularning vazifasi

4. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl) vosita, usul, nazorat, baholash).

- a) Darsning turi – suhbat
- b) Metod: - Bumerang, Blits uyin

- v) Forma (shakl) – guruh
- g) Vosita – doska, tarqatma material, tablitsa, tayyor preparat
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko‘rish)
- j) Baholash – o‘z-o‘zini va umumiy baholash

5. Metod – Bumerang, Blitz o‘yin

Bumerang treningi

Talabalar kichik guruhlariga bo‘linadi va vazifa yozilgan material tarqatiladi. har 1 ta guruh o‘z fikrini bayon qiladi va guruhlar orasida savol-javob ketadi.

1 – guruhga berilgan vazifa

1. Mikroskopning vazifasi va xillari
2. Mikroskopning asosiy qismlari
3. Mikroskopning optik qismlari va uning vazifalari
4. Mikroskopning mexanik qismlari va uning vazifalari

2 – guruhga beriladigan vazifa

1. Mikroskop bilan ishlash qoidalari
2. Fokus oralig‘i qanday topiladi
3. Kichik ob‘ektivdan katta ob‘ektivga o‘tish usullari
4. Kesiklarni tayyorlash tartibi va ularni bo‘yash

3- guruhga beriladigan vazifa

1. Hujayraning shakllari
2. Hujayraning tirik va o‘lik qismi
3. Hujayradagi organoidlar
4. Hujayra qismlarining tuzilishi va vazifasi

Blitz o‘yin

Metodni o‘tkazilish tartibi. Har bir guruh talabalariga yuqorida ko‘rsatilgan vazifa tarqatiladi. Talabalar to‘g‘ri deb hisoblagan raqamni “yakka baho” qatoriga yozib chiqadi. O‘qituvchi to‘g‘ri javob e‘lon qilgandan keyin, Har bir guruh o‘z xatolarini “guruh xatosi” qatoriga yozadi. Natijada to‘g‘ri, noto‘g‘ri javoblar solishtirilib, guruh bahosi hisoblab chiqiladi.

Guruh bahosi	Guruh xatosi	To‘g‘ri javob	Yakka xato	Yakka baho	Guruh ichidan chetlatish	Mikroskop bilan ishlash usulini o‘rganish
						1. Mikroskop bilan ishlashdan oldin kuzguni Har tomonga aylantirib yoruqlik diafragma teshigi tomon yo‘naltiriladi va ko‘z bilan okulyardan Harab yoruqlik topiladi.

						<p>2. Mikroskopning tozaligini tekshirib, tutg'ich qismidan ushlab ish stolida siljimaydigan qilib qo'yish kerak.</p> <p>3. Mikroskopning 7x okulyari va 8x ob'ektividan foydalanib yoruqlik to'planadi.</p> <p>4. Preparatga yon tomonidan Harab turib, mikroskop trubkasini katta vint yordamida preparatga juda yaqin kelguncha G'oraliq 1 sm bo'lgunchaG' tushiriladi.</p> <p>5. Mikroskopning katta ob'ektivi (40x) orqali ko'rishda mikropreparatlarni mikroskop stolidan qo'zg'atmasdan katta vint yordamida ob'ektiv ko'tarilib, uning o'rniga katta ob'ektiv almashtiriladi.</p> <p>6. Ish stolining o'ng tomoniga rasm chizish uchun maxsus daftar va chap tomonga ishlash uchun kerakli narsalar qo'yila-di.</p> <p>7. Tayyorlangan preparatni mikroskop stolining markazidagi teshikka to'g'rilab qo'yiladi.</p> <p>8. Okulyar orqali qarab, ob'ekt tasviri ko'ringuncha fokusi to'g'rilanadi G'oraliq 1-2 mm. bo'lguncha</p> <p>9. Okulyardan qarab, mak-rovintni ob'ekt ko'ringuncha oldinga va orqaga burab boriladi va tasvir topiladi.</p>
--	--	--	--	--	--	---

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar.

1 – mashg'ulot: Mikroskop bilan ishlash usulini o'rganish

Ob'ekt: Mikroskop, piyoz

- a) Mikroskopni tozaligini tekshirish
- b) Ish stoliga mikroskopni o'rnidan siljimaydigan qilib qo'yish
- v) Ish stolining o'ng tomoni ish daftari va chap tomoniga ishlash uchun kerakli asboblar: suv, pipetka, preparoval nina, buyum va qoplovich oynalar, filtr qog'oz, spirt lampa, yumshoq latta qo'yiladi.
- g) Mikroskop ko'zgusini Har tomonga Harakatlantirib yoruqlik tutiladi.
- d) Yoruqlik tutish mikroskopning 7x okulyari va 8x ob'ektividan foydalaniladi.
- e) Preparatdagi ob'ekt buyum stolchasiidagi teshikka to'g'ri qilib o'rnashtiriladi.
- j) Ob'ektlar aniq ko'rinishi uchun fokus oraliqi topiladi. Okulyardan ko'z bilan Harab katta vintni ob'ekt tasviri ko'ringuncha buraladi. Mikroskopga qo'yilgan buyum chap ko'z bilan ko'riladi, o'ng ko'z esa ob'ektning rasmini chizishga yordam beradi.

2 – mashg'ulot: Kesiklar tayyorlash va piyoz po'sti hujayrasining tuzilishini tekshirish.

Piyozning seret qobig'idan nina yoki pintset bilan rangsiz po'stidan shilib, buyum oynasidagi suv tomchisiga qoq'ayiladi. So'ngra nina uchi bilan to'g'rilab, ustiga qoplag'ich oyna yopiladi.

Tayyorlangan kesiklar mikroskopning kichik va katta ob'ektivi orqali tekshiriladi.

Kesiklarni bo'yash uchun suv o'rniga lyugol eritmasi tomiziladi.

Bo'yalgan kesik mikroskopning kichik va katta ob'ektivi orqali Haralganda piyoz pardasining hujayralari yupqa po'st bilan qoplanganligi va ichida vakuola, sitoplazma, yadro borligi ko'riladi.

Topshiriq: Biologik mikroskopni va hujayra tuzilishini rasmini chizib, hamma qismlarini nomini yozing.

Laboratoriya mashg'ulot-2

Mavzu: Osmotik bosim. Plastidlar.

1. Darsning maqsadi:

Hujayra ichidagi suyuqlik hujayra shirasi deyiladi. Bu suyuqlikda organik va mineral moddalar erigan holda bo'ladi. hujayra shirasi voyaga etgan hujayralarda protoplazmaning hayot faoliyati natijasida vujudga keladi. hujayra shirasida erigan moddalar ma'lum bosim hosil qiladi. U osmotik bosim deb ataladi. Osmotik bosim eritma konsentratsiyasiga bog'liq bo'lib, u qancha kuchli bo'lsa osmotik bosim ham shuncha kuchli bo'ladi.

Hujayraning turgor holati deb – hujayra shirasida suv ko'payib ketib hujayraning taranglanishiga aytiladi.

Hujayra turgor holatda bo'lganda uning ichidagi moddalar hujayra po'stiga zich yopishib turadi.

Bunday holatdagi hujayraga to'yingan eritmalar (10 % osh tuzi, 30% qand eritmasi) tomizilsa, ya'ni osmotik bosimi hujayra shirasi osmotik bosimidan kuchliroq bo'lgan eritma vositasi bilan hujayra shirasining bir qismi olib tashlansa, hujayra ichidagi moddalar to'planib hujayra po'stidan qochadi. Hujayraning bunday holatini plazmoliz deyiladi.

Plazmoliz holatidagi hujayraga suv ta'sir ettirilsa u yana turgor holatiga o'tadi, bu xodisa deplazmoliz deb ataladi.

Plastidlar protoplazmada sochilib yotgan har xil shakl va rangga ega bo'lgan mayda oqsil tanachalardir. Plastidlar rangiga qarab 3 xilga bo'linadi:

Xloroplastlar (yashil)


Xromoplastlar (qizil, sariq)

Leykoplastlar (rangsiz)

Xloroplast – o'simlikning barcha yashil qismida uchraydi. Bu plastida xlorofill (yashil), karotin (qizil), ksantofill (sariq) pigmentlar uchraydi. O'simliklarda karbonat anhidrid va suvdan organik modda vujudga kelishida xloroplast ishtirok etadi.

Xloroplast ishtiroki quyosh nuri ta'siri bilan organik moddalarning hosil bo'lishi xodisasini fotosintez deb ataladi. Buni quyidagi formula bilan ko'rsatish mumkin.

xlorofill



Bu protsessda avval saxaroza paydo bo'lib, u tezda glyukozaga aylanadi va o'simliklarning organlarida zapas modda hisobida to'planadi.

Xromoplast – to'q sariq, qizil rangda bo'lib, gullarning gultoj bargida, pishgan mevalarda va ildizmevalarda uchraydi.

Leykoplast – rangsiz plastidadan iborat bo'lib, o'simliklarning kurtagida, poyasida, ildizi, tunganagi va piyozboshida uchraydi. Leykoplastlar zapas oziq modda – ikkilamchi kraxmalni to'playdi.

2. Darsning vazifasi:

Hujayraning turgor, plazmoliz va deplazmoliz holatini kuzatish, plastidlarni aniqlash.

3. O'quv jarayonining mazmuni:

1. Hujayraning osmotik bosimi
2. Hujayraning turgor holati
3. Hujayraning plazmoliz va deplazmoliz holati
4. Plastidalar – hujayra organoidi
5. Plastidalarining shakllari
6. Plastidalarining xillari
7. Xloroplastlarning uchraydigan organlari, vazifasi va biologik ahamiyati
8. Xromoplastning uchraydigan organlari va vazifasi
9. Leykoplastning uchraydigan organlari, vazifasi

4. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita, usul, nazorat, baholash).

- a) Darsning turi – suhbat
- b) Metod – Bumerang, Blitz o'yin, Vertushka
- v) Forma – (shakl) guruh
- g) Vosita – doska, tarqatma material, mikroskop, tayyor preparatlar, tablitsa
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko'rish)
- j) Baholash – o'z-o'zini va umumiy baholash

5. Metod – Bumerang, Blitz o'yin, Vertushka

Bumerang treningi.

Talabalar kichik guruhlarga bo'linadi va vazifa yozilgan material tarqatiladi. har 1 ta guruh o'z fikrlarni bayon qiladi va guruh orasida savol javob ketadi.

1 – guruhga beriladigan vazifa

1. Hujayradagi osmotik bosim holati
2. Hujayraning turgor holati
3. Hujayraning plazmoliz va deplazmoliz holati

2 – guruhga beriladigan vazifa

1. Plastidalar qanday organoidlar va ularning shakllari
2. Plastidalar rangiga qarab necha xil bo'ladi
3. Plastidalarning uchraydigan joylari

3 – guruhga beriladigan vazifa

1. Xloroplast – uchraydigan organlari, vazifasi, biologik ahamiyati
2. Xromoplast – uchraydigan organlari, vazifasi va biologik ahamiyati
3. Leykoplast – uchraydigan organlari, vazifasi va biologik ahamiyati

Blits – o'yin

Guruh bahosi	Guruh xatosi	To'g'ri javob	YAkka xato	YAkka baho	Guruh ishidan chetlatish	hujayraning turgor, Plazmoliz va deplazmoliz holati
						<p>1. Filtr qog'oz qoplog'ich oyna ostidagi suvning bir qismini shimib olgach uning o'rniga eritma kiradi va hujayralarda asta sekin plazmoliz hodisasi yuz beradi. Bunda xlorofill donachalari bir-biriga yopishib hujayraning o'rtasiga to'planadi.</p> <p>2. Valisneriya hujayra-sining turgor holati tekshiriladi.</p> <p>3. Preparatni qo'zg'atmas-dan turib qoplog'ich oyna ostidagi suvni to'yingan osh tuzi bilan almash-tiriladi. Buning uchun, qoplog'ich oynaga taqab filtr qog'oz tegiziladi.</p> <p>4. Valisneriya bargidan ozgina olib buyum oyna-sidagi suv tomchisiga qo'yib yopg'ich oyna yopiladi.</p> <p>5. Preparatdagi osh tuzi eritmasi suv almashtirilsa deplazmoliz hodisasi sodir bo'ladi.</p> <p>6. Turgor holatida xlorofill donachasi hujayraning po'stiga yaqin joyda harakat qiladi. Bu bilan hujayra sitoplazmasining harakati turgor holat va xlorofill</p>

						donachasi kuzatiladi.
--	--	--	--	--	--	-----------------------

Bu metodning o‘tkazilish tartibi.

Har bir guruh talabalariga yuqorida ko‘rsatilgan vazifa tarqatiladi. Talabalar to‘g‘ri deb hisoblagan raqamni “yakka baho” qatoriga yozib chiqiladi. O‘qituvchi to‘g‘ri javob e‘lon qilgandan keyin, har bir guruh o‘z xatolarini “guruh xatosi” qatoriga yozadi. Natijada to‘g‘ri, noto‘g‘ri javoblar solishtirilib, guruh bahosi hisoblab chiqiladi.

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar.

1 – topshiriq: hujayraning turgor, plazmoliz va deplazmoliz holatini kuzatish, plastidlarni aniqlash.

Ob’ektlar: valisneriya, pomidor, marjon daraxtining bargi

- 1- tajriba: Turgor va plazmoliz holatini kuzatish uchun valisneriya o‘simligidan preparat tayyorlash.
- 2 – tajriba: Xromoplastni aniqlash uchun buyum oynasiga pomidorni yumshog‘ etidan ozgina solib suv tomizib, qoplag‘ich oyna bilan yopib kuzating.
- 3 – tajriba: Marjon daraxtining bargini epidermisi shilini, mikroskopning katta ob’ektivida kuzatilganda – leykoplastlar yadro atrofida yaltillab ko‘rinadi.

Laboratoriya mashg‘ulot-3

Mavzu: Hujayradagi zahira moddalar.

1. Darsning maqsadi:

Hujayradagi zahira moddalar.

Hujayrada o‘simlikning rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan organik moddalar zapasi vujudga kelib turadi. Bunday zapas moddalar o‘simlik ildizi, ildizpoyasi, kartoshkasi, piyoz, mevasi va urug‘idagi parenxima hujayralarida to‘planadi.

Tsitoplazmadagi zapas moddalarga uglevodlar, oqsillar va yog‘lardan iborat organik moddalar kiradi.

Uglevodlar. Sitoplazmada kraxmal (S6 N10 O5)n shaklida vujudga keladi. Kraxmal dumaloq, tuxumsimon shakldagi donachalardan iborat bo‘lib, u assimilyatsion yoki birlamchi va zapas kraxmal yoki ikkilamchi kraxmal holida vujudga keladi.

Birlamchi kraxmal barglarda assimilyatsiya tufayli hosil bo‘ladi. U diastaza fermenti ta‘sirida shakarga aylanadi. SHakar suvda yaxshi erib, o‘simlik tanasi bo‘ylab harakat qilib urug‘, ildiz, tunganakga borib, amilaza fermenti ta‘sirida ikkidamchi kraxmalga aylanadi.

Kraxmal donachalari tuzilishi jihatidan oddiy va murakkab bo‘ladi.

Oddiy donachalarni hosil etuvchi markaz bitta bo‘ladi. Oddiy kraxmallarni hosil qiluvchi markaz hujayraning o‘rtasida bo‘lsa kentsentrik, chekkasida bo‘lsa ekstsentrik kraxmal deyiladi.

Murakkab kraxmal donachalarining har biri bir necha donachalardan iborat bo‘lib, o‘zaro zich qo‘shilgan, ammo bir –biridan osongina ajraladigan bo‘ladi.

YArim murakkab donachalarda – kraxmal donachasining hosil etish markazi bir nechta bo‘lib, ular o‘ziga xos umumiy qavat bilan o‘ralgan bo‘ladi.

Oqsillar.

Oqsillar oziqa moddalar sifatida o'simliklar urug'ida oddiy va murakkab aleyron yoki protein donachasi holida to'planadi.

Aleyron donachalar yumaloq yoki oval shaklida bo'lib, hujayra shirasining qurib quyuqlanishidan hosil bo'ladi.

Mayda aleyron donachalari oddiy aleyron donachalari deyilib, uning tarkibida boshqa qo'shilmalar bo'lmaydi.

Murakkab aleyron donachalar yirik va murakkab tuzilishga ega bo'lib ularning tarkibida glaboid va kristalloidlar mavjud bo'ladi.

Yog'lar.

Yog'lar yumaloq, tiniq tomchi shaklida bo'lib o'simliklarning mevasi va urug'ida to'planadi. Suvda erimaydi, ammo efir va benzin kabi organik erituvchilarda eriydi.

2. Darsning vazifasi:

Hujayradagi zapas oziqli moddalar va ularning aniqlash reaksiyalarini o'rganish.

3. O'quv jarayonining mazmuni:

2. Zapas oziq moddalarning ahamiyati
3. Zapas oziq moddalarning turlari
4. Oqsillar – tuzilishi uchraydigan joyi
5. Yog'lar – tuzilishi uchraydigan joyi
6. Uglevodlar – tuzilishi uchraydigan joyi
7. Oziqli moddalarni mikroreaksiyalar bilan aniqlash usullari

4. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita, usul, nazorat, baholash).

- a) Darsning turi – suhbat
- b) Metod – Bumerang, Blitz o'yin, Vertushka
- v) Forma – (shakl) guruh
- g) Vosita – doska, tarqatma material, mikroskop, tayyor preparatlar, tablitsa
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko'rish)
- j) Baholash – o'z-o'zini va umumiy baholash

5. Metod – Bumerang, Blitz o'yin, Vertushka

Bumerang treningi.

Talabalar kichik guruhlarga bo'linadi va vazifa yozilgan material tarqatiladi. har 1 ta guruh o'z fikrlarni bayon qiladi va guruh orasida savol javob ketadi.

1 – guruhga beriladigan vazifa

1. Zapas oziq moddalar o'simlikning qaysi organidagi hujayralarida to'planadi
2. Zapas oziq moddalarning vazifasi
3. Zapas oziq moddalarning xillari

2 – guruhga beriladigan vazifa

1. Uglevodlarning tuzilishi va ularning aniqlash usuli
2. Oqsillarning tuzilishi va ularning aniqlash usuli
3. Yog'larning tuzilishi va ularni aniqlash usuli

Vertushka metodi

№	hujayradagi zapas oziq mod-dalar va plastidlar	Sudan III	Lyugol	yashil	sariq qizil	rangsiz
---	--	-----------	--------	--------	-------------	---------

1	Kraxmal donachalari ko'kim-tir binafsha ranga bo'yaladi.					
2	Yog' tomchisi qizil ranga bo'yaladi.					
3	Oqsil donachalari tilla sariq rangga					
4	bo'yaladi					
5	Xloroplast					
6	Leykoplast Xromoplast					

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar.

1 – topshiriq: hujayradagi zapas oziq moddalarni aniqlash.

Ob'ektlar: kanakunjut urug'i, kartoshka tunganagi

1 – tajriba: Kartoshka tunganagidan ozrog' qirqib olib buyum oynasiga qoqoyiladi va uning ustiga Lyugol eritmasi tomizib qoplog'ich oyna bilan yopib mikroskopda ko'riladi. Bunda kraxmal donachalari ko'kimtir binafsha ranga bo'yalgani kuzatiladi.

2 – tajriba: Kanakunjut urug'ining qattiq po'sti olib tashlanib, mag'izi buyum oynasiga surtiladi. Uning ustiga Sudan III eritmasi tomizib qizdiriladi. So'ng bir tomchi suv tomizilib qoplag'ich oyna bilan yopib mikroskopda ko'riladi. Bunda yog' tomchilarining qizil ranga bo'yalganligi kuzatiladi.

3 – tajriba: Yana kanakunjut urug'ining mag'zi buyum oynasiga surtiladi. Uning ustiga Lyugol eritmasidan tomizilib qoplag'ich oyna bilan yopib mikroskopda ko'riladi. Bunda oqsil donachalari tilla sariq rangga bo'yalgani kuzatiladi.

Topshiriq: kraxmal, oqsil va yog' tomchilarining rasmini chizib nomini yozing.

Laboratoriya mashg'ulot-4

Mavzu: “Kristallar, ularning tuzilishi, vakuola va hujayra po'sti”

1. Darsning maqsadi:

Hujayrada to'planadigan chiqindi moddalar, hujayra shirasi va hujayra po'stining holatlari, vazifalari, ximiyaviy o'zgarishlari va ularni aniqlash usullari o'rganiladi.

2. O'quv jarayonining mazmuni:

1. CHiqindi moddalar qanday holatda bo'lishi
2. Kristallar hujayraning qaysi qismida to'planadi
3. Kristallarning kimyoviy tarkibi va shakllari
4. hujayra shirasining hosil bo'lishi
5. hujayra vakuolasidagi moddalar va ularni aniqlash usullari
6. hujayra po'stining vazifasi
7. hujayra po'stida kechadigan kimyoviy o'zgarishlar
8. hujayra po'stining kimyoviy tarkibini aniqlash usullari

4. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita, usul, nazorat, baholash)

- a) Darsning turi - suhbat
- b) Metod – Vertushka, Bumerang
- v) Forma – (shakl) guruh
- g) Vosita – doska, tarqatma material, tablitsa

- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko‘rish)
- j) Baholash – o‘z-o‘zini va umumiy baholash

5. Metod – Bumerang, Vertushka.

Bumerang metodi

Bu metodda – talabalar kichik guruhlariga bo‘linadi. O‘qituvchi har bir guruhga vazifa yozilgan material tarqatadi. har bir guruh talabalari berilgan vazifa bo‘yicha o‘z fikrlarini bayon qiladi va guruhlar orasida savol - javob ketadi.

1 – guruhga beriladigan vazifa

1. Chiqindi moddalarning kimyoviy tarkibi qanday
2. Kristallar necha xil bo‘ladi
3. Kristallar qaysi o‘simliklarda uchraydi

2 – guruhga beriladigan vazifa

1. Hujayra shirasi nima
2. Hujayra shirasida uchraydigan moddalar
3. Hujayra shirasidagi moddalarni aniqlash usullari

3 – guruhga beriladigan vazifa

1. Hujayra po‘stining bajaradigan vazifasi
2. Hujayra po‘sti qanday kimyoviy o‘zgarishlarga uchraydi
3. Hujayra po‘stini aniqlaydigan reaksiya

Vertushka

№	Chiqindi moddalar uch- raydigan o‘simliklar va shakllari	yakka kris- tallar	rafid- lar	druz- lar	qumli kris- tallar	sfero- kris- tallar	tsisto- litlar
1	Belladonna bargida						
2	Marvaridgul bargida						
3	qo‘nog‘ bargida						
4	Anjir bargida						
5	Piyoz po‘stida						
6	Tutdoshlar oilasida						
7	Bangidevona bargida						
8	Tradetskantsiya bargida						
9	G‘o‘za bargida						
10	Agava bargida						
11	Krapiva bargida						
12	Fikus bargida						

Vertushka

№	Hujayra po'stining kimyoviy tarkibining o'zgarishi	Yog'och-lanish	Po'kak-lanish	SHi-lim-shiq-la-nish	Ku-tin-lanish	Mine-ral-lanish	Tsel-lyulo-za
1	hujayra po'stida qum-tuproq bilan kaltsiy yoki magniyli tuzlar uchrasa						
2	hujayra po'sti lignin moddasi bilan to'yinsa						
3	O'zida nam saqlab hujayrani qurib qolish-dan asraydi						
4	hujayra po'sti suberin moddasi bilan to'yinsa						
5	O'zidan suv va havoni yaxshi o'tkazadi						
6	hujayra po'sti yog'simon modda bilan to'yinsa						

5. Mustaqil bajarish uchun vazifalar.

Ob'ektlarni o'rganish: Chiqindi moddalar, vakuola va hujayra po'sti

Ob'ektlar bo'yicha ma'lumotlar.

Chiqindi moddalar. O'simliklarning hujayra shirasida ko'pincha chiqindi moddalar hosil bo'ladi. Chiqindi moddalar kristallar holida uchraydi. Bu kristallar oksalat kislotaning kaltsiy tuzidan iborat bo'lib, o'simlikni hayvon va hashoratlarning eyishidan saqlaydi.

O'simlik hujayrasida uch xil kristallar ko'prog' uchraydi.

Yakka kristallar uch burchak, to'rt burchak, kubik, prizma, romb kabi shakllarda bo'ladi. Yakka kristallar piyoz qobig'ida to'planadi.

Druzlar – yulduz shaklidagi qirrali kristallar bo'lib, bangidevona, g'o'za kabi o'simliklarda to'planadi.

Rafidlar – ignasimon, ikki uchi o'tkir kristallardir. Ular mavaridgulda uchraydi.

Ba'zi o'simliklarda qumli xaltachalar, shingil shaklidagi – sistolitlar, fikus, krapiva bargida to'planadi.

Hujayraning markaziy qismida vakuolalar deb ataladigan pufakchalar yoki bo'shliqlar bo'ladi. Yoshrog' hujayralarda vakuolalar hujayra sitoplazmasi orasida tarqoq holda joylashgan bo'lib, hujayra voyaga etishi bilan ular kattalashib boradi. Vakuolalar turli organik mineral moddalarning suvli eritmasi bilan to'la bo'ladi.

Hujayra shirasi – yopishqoq suyuqlik bo'lib, tarkibida shakar, har xil organik kislotalar, inulin, oshlovchi moddalar, alkaloidlar, glyukozalar, efir moylar va boshqa moddalar ham uchraydi.

Hujayra shirasida ikki xil pigment (bo'yovchi modda): antotsian va antoxlor bo'ladi. hujayra shirasining muhiti ishqoriy va nordon bo'lishi mumkin. hujayra shirasi nordon reaksiyada bo'lsa, antotsian uni qizartiradi, ishqoriy bo'lsa – moviy tusga kiritadi. Antoxlor gul va mevalarni sariq tusga kiritadi. SHu pigmentlar tufayli gullar rang-barang bo'lib, hashoratlarni o'ziga jalb etadi.

Hujayra shirasidagi erigan moddalarning ayrimlari zapas holda to'plansa, boshhalari chiqindi moddalar bo'lib, ular hujayra hayotida ahamiyatga ega.

Hujayra po'sti.

Hujayra po'sti protoplastning mahsuli hisoblanadi. hujayra po'sti hujayralarni bir – biridan ajratib, ularni ma'lum shaklga kiritib, protoplastni tashqi nog'ulay ta'sirotlardan saqlaydi.

Hujayra po'stida teshikchalar bo'lib, shu teshikchalar orqali hujayralar o'zaro munosabatda bo'ladi; bunda yonma – yon joylashgan ikkita hujayra teshikchalari bir –biriga qaragan bo'ladi.

Hujayra po'stining kimyoviy tarkibi o'simlik turiga qarab har xil bo'ladi. U asosan selluloza, gemitsellyuloza va pektindan iborat bo'ladi.

Zamburug' va bakteriyaning hujayra po'sti azot va xitin moddasidan tuzilgan. Ko'k-yashil suv o'tlari esa pektin moddalaridan tarkib topgan.

Gemitsellyuloza selluloza tarkibi va mustahkam emasligi bilan farqlanadi. hujayra po'sti sellulozadan tarkib topgan bo'lsa, u o'zidan suv va havoni osongina o'tkazib tura oladi.

Hujayra po'stining kimyoviy tarkibi yoshiga qarab o'zgarib turadi. Chunki ularning devori xossalarini o'zgartirib yuboradigan organik va mineral moddalarni shimib oladi. Bu o'zgarishlar asosan, bir necha protsesslardan: yog'ochlanish, po'kaklanish, shilimshiqanish va minerallanish kabilardan iborat.

hujayra po'sti organik modda lignin bilan to'yinsa – yog'ochlanadi, suberin bilan to'yinsa po'kaklanadi, kutinlashganda mumsimon (moysimon) modda bilan to'yingan bo'ladi.

Suberin va Kutin tirik hujayralarda hosil bo'ladi va to'planadi, chunki ular sitoplazmaning mahsulidir.

Shilimshiqanish suv o'tlarida, zamburug'larda, behi urug'ida bo'ladi; shilimshiq moda namni saqlab hujayrani qurib qolishdan asraydi.

6. Mustaqil ishlash tartibi.

1 – topshiriq: Hujayradagi chiqindi moddalar

Ob'ektlar: Piyoz po'sti, bangdevona va marvaridgul

1 – tajriba: Piyozning sirtqi quruq po'stidan olib mikroskopda ko'riladi. Bunda romb, kub, to'rtburchak shaklidagi rangsiz yaltirog' yakka kristallarni ko'rish mumkin.

2 – tajriba: Bangidevona bargidan ozgina olib mikroskopda qaralsa, ko'p miqdordagi murakkab kristallarni (yulduz shaklidagi druzlar) kuzatish mumkin.

3 – tajriba: Marvaridgul bargidan ozgina olib mikroskopda ko'rilganda ignasimon shakldagi rafidlarni kuzatish mumkin.

2 – topshiriq: Hujayra shirasida uchraydigan moddalarni aniqlash.

Ob'ektlar: dub daraxtining po'stlog'i, qoqi o't ildizi, altey o'simligining ildizi

Reaktivlar: kontsentrlangan N₂ SO₄, qora tush, temir xlorid, 20% timolni spirtidagi eritmasi.

1 – tajriba: Dub daraxtining po'stlog'iga temir xlorid (FeCl₃) eritmasidan tomizilib – oshlovchi moddani ko'k qoramtir rangga bo'yalishi kuzatiladi.

2 – tajriba: Altey ildizidan ozirog' olib unga qora tush tomizilsa, shilimshiq modda – sliz bo'yalmaydi hujayraning hamma qismi qoraga bo'yaladi.

3 – tajriba: Qoqi o't ildizidan ozrog' olib 20% timolni spirtidagi eritmasi va kontsentrlangan N₂ SO₄ eritmasidan tomizilib, spirt lampasida biroz qizdirilsa, inulin olcha ranga bo'yaladi.

3 – topshiriq: Hujayra po'stining kimyoviy tarkibining o'zgarishi.

Ob'ekt: gugurt cho'pi, probka (po'kak), paxta tolas

Reaktivlar: Sudan III, floriglyutsin va ZnCl₂ eritmasi

1 – tajriba: Gugurt cho'piga oldin floriglyutsin eritmasi tomizib keyin shisha tayyog'cha yordamida xlorid kislotaga ta'sir ettirilsa gugurt cho'pi qizaradi.

- 2 – tajriba: Paxta tolasiga ZnCl₂ eritmasidan tomizilsa, kletchatka binafsha ranga bo‘yalishi kuzatiladi.
- 3 – tajriba: Po‘kak bo‘lakchasidan ozgina olib buyum oynasiga qo‘yiladi. Unga Sudan III eritmasi tomizilsa, hujayra devorlari qizaradi.
- Topshiriq:** Talabalar tajribalarni bajargandan so‘ng rasm daftarlariga kristallarning rasmini chizib nomini yozadilar.

Laboratoriya mashg‘ulot-5

Mavzu: Hosil qiluvchi to‘qimalar xillari va joylashishi. Birlamchi va ikkilamchi hosil qiluvchi to‘qima

1. Darsning maqsadi: O‘simlik to‘qimalari ularning turlari, hosil qiluvchi to‘qima: birlamchi va ikkilamchi hosil qiluvchi to‘qimalarning joylanishini o‘rganadilar.

2. O‘quv jarayonining mazmuni:

1. To‘qima haqida tushuncha
2. Kelib chiqishi jihatidan to‘qima xillari.
3. Embrional va doimiy to‘qimalar.
4. Hosil qiluvchi to‘qimalar (meristemalar).
5. Birlamchi va ikkilamchi meristema

3. O‘quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita, usul, nazorat, baholash).

- a) Darsning turi – suhbat
- b) Metod – Bumerang, Vertushka
- v) Forma – (shakl) guruh
- g) Vosita – doska, tarqatma material, mikroskop, tayyor preparatlar, fiksirlangan material, tablisa
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko‘rish)
- j) Baholash – o‘z-o‘zini va umumiy baholash

4. Metod – Vertushka, Bumerang

Vertushka metodi

Bu treningda guruhlariga material tarqatiladi va har bir guruh yakka holda to‘g‘ri javobni belgilaydi. Keyin bu materiallar guruhlariga aralashtirib beriladi, yana belgilanadi. Guruhlar soniga qarab aylangandan keyin o‘qituvchi va talabalar bilan umumiy to‘g‘ri javob belgilaniladi.

Hosil qiluvchi to‘qima xillari va uchraydigan joyi	Uchki meris - tema	YOn meris-tema	Inter kolyar meristema	Jarohat meris-temasi	Birlamchi-meriste-	Ikki-lamchi meristema
--	--------------------	----------------	------------------------	----------------------	--------------------	-----------------------

					ma	
1. Yosh barglarda poya bo'g'imlarida bo'lib, poyaning bo'g'im oralig'i uzun bo'ladi.						
2. Ildiz va poyada silindrsimon qavat hosil qilib o'simlik eniga o'sadi va qalinlashadi.						
3. O'simlikning biror eri shikastlansa jarohatlangan joyni tiklaydi.						
4. Poya va ildizning bo'yiga o'sishini ta'minlaydi.						
5. Prokambiy birlamchi floema va birlamchi ksilema elementlarini hosil qiladi.						
6. Kambiy ikkilamchi lub, ikkilamchi yog'ochlik hosil qiladi.						

5. Mustaqil bajarish uchun vazifalar

Ob'ektlar bo'yicha ma'lumotlar.

O'simlik organizimi har biri ma'lum vazifani bajaradigan har xil to'qimalardan iborat bo'ladi.

Kelib chiqishi, tuzilishi bir xil bo'lgan umumiy fiziologik xususiyatga ega bo'lgan va bir xil vazifani bajaradigan hujayralar to'plami to'qima deb ataladi.

To'qimalar hujayrasining shakliga ko'ra 2 xil guruhga bo'linadi:

1. Parenxima
2. Prozenxima

Parenxima to'qimalar-parenximatik hujayralardan tashkil topgan.

Prozenxima to'qimalar-prozenximatik hujayralardan tashkil topgan.

To'qimalar kelib chiqishiga ko'ra embrional va doimiy bo'ladi.

Embrional to'qima deb, o'zidan boshqa to'qimalarni hosil qiladigan to'qimaga aytiladi.

Embrional to'qima hujayralari bo'linib yangi hujayralar hosil qiladi, bu yangi hujayralardan prokambiy to'qima hosil bo'ladi. Hosil qiluvchi to'qimadan paydo bo'lgan hujayralar ma'lum shaklga kirib, doimiy to'qimaga aylanadi.

Prokambiy to'qima hujayralari bo'linib kambiy (ikkilamchi hosil qiluvchi) to'qimani hosil qiladi.

Hosil qiluvchi to'qima-meristema

Hosil qiluvchi to'qimalar o'simliklarning o'sish nuqtalarida poya va ildizning o'sish konusida bo'ladi. O'sish konusidagi hujayralarning bo'linishi hisobiga ildiz va poya bo'yiga o'sadi. Birlamchi meristema hujayralari bir xil mayda yupqa selyuloza po'stli parenxima hujayralaridan iborat bo'ladi. Hujayra ichida quyuc donador protoplazma va yirik yadro

bo'ladi. O'sish konusidagi inisial(boshlang'ich) hujayraning bo'linishi natijasida yangi to'qimalar hosil bo'ladi.

Poyaning o'sish nuqtasi bilan ildizning o'sish nuqtasidagi meristema taxminan bir xil bo'ladi.

Poyaning konus nuqtasini tekshirsak uni uchta qavatdan iborat ekanligini ko'ramiz.

1. Dermatogen-bir qator joylashgan tashqi hujayralar qavati bo'lib,bundan epidermis hosil bo'ladi.
2. Periblema-bu oraliq hujayralar qavati bo'lib dermatogen ostida bir necha qator bo'lib joylashadi va bundan birlamchi po'stloq hosil bo'ladi.
3. Pleroma-markaziy qavat bo'lib,u bir necha qavat bo'yiga cho'zilgan hujayralardan iborat. Pleromadan markaziy silindir hosil bo'ladi.

Hosil qiluvchi to'qimalar o'simlik hayotida katta ahamiyatga ega. CHunki ularning ishtirokisiz o'simlik o'smaydi va yangi organlar hosil bo'lmaydi.

6. Mustaqil ishlash tartibi

Kerakli jihozlar: O'simlik organidan tayyorlangan fiksirlangan material. Safranin, Sudan III eritmasi va tayyor preparatlar.

1- tajriba. Poyaning o'sish konusi.

Mikroskopning katta ob'ektivida bo'linish nuqtasidagi hujayralarni kuzating (tayyor preparat).

2-tajriba. Ildiz zonalari. Mikroskop ostida ildizning quyidagi qismlarni ko'ring: 1. Ildiz qini. 2. Bo'linish zonasi-meristema. 3. O'sish zonasi-(dermatogen,periblema,pleroma) 4. So'rish zonasi epiblema (rizoderma), birlamchi po'stloq,markaziy silindr (tayyor preparat).

Topshiriqlar: Poya meristemasining umumiy ko'rinishi, ildizning o'sish zonalari rasmi chiziladi.

Laboratoriya mashg'ulot-- 6

Mavzu: Qoplovchi va mexanik to'qimalar.

1. Darsning maqsadi:

Talabalar dars davomida qoplovchi va mexanik to'qima xillari, ularning joylanishini o'rganadilar.

2.O'quv jarayonining mazmuni:

1. Qoplovchi to'qimaning vazifasi va uning xillari.
2. Birlamchi qoplovchi to'qima-epidermisning hosil bo'lishi
3. Ikkilamchi qoplovchi to'qima-peridermaning hosil bo'lishi
4. Uchlamchi qoplovchi to'qima-quruq po'stloq, uning hosil bo'lishi, vazifasi
5. Mexanik to'qimaning xillari va vazifasi.
6. Kollenximaning qalinlashishi, xillari uchraydigan joyi.
7. Sklerenximaning tuzilishi, xillari uchraydigan joyi
8. Sklereidlar tuzilishi, uchraydigan joyi.

3. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita, usul, nazorat, baholash).

- a) Darsning turi – suhbat
- b) Metod – Bumerang, Vertushka
- v) Forma – (shakl) guruh

- g) Vosita – doska, tarqatma material, mikroskop, tayyor preparatlar, fiksirlangan material, tablisa
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko‘rish)
- j) Baholash – o‘z-o‘zini va umumiy baholash

4. Metod – Vertushka, Bumerang

Bumerang treningi

Talabalar kichik guruhlariga bo‘linadi va vazifa yozilgan material tarqatiladi. Har bir guruh o‘z fikrini bayon qiladi va guruhlar orsida savol-javob ketadi.

1-guruhga beriladigan vazifa

- 1. Qoplovchi to‘qima, paydo bo‘lishi va vazifasi
- 2. Birlamchi qoplovchi to‘qima-epiderma
- 3. Epiderma hujayralaridagi og‘izcha va tukchalar

2-guruhga beriladigan vazifa

- 1. Periderma, tuzilishi, uchraydigan joyi
- 2. Fellema, fellojen, fellodermaning tuzilishi, vazifasi
- 3. Yasmiqchaning paydo bo‘lishi, vazifasi

3-guruhga beriladigan vazifa

- 1. Uchlamchi qoplovchi to‘qima-quruq po‘stloq-paydo bo‘lishi, tuzilishi
- 2. Mexanik to‘qima vazifasi, xillari
- 3. Kollenximaning tuzilishi, xillari

4-guruhga beriladigan vazifa

- 1. Sklerenxima, tuzilishi, xillari
- 2. Sklereidlar tuzilishi, uchraydigan joyi
- 3. Mexanik to‘qimalarning ahamiyati

Vertushka metodi

Bu treningda guruhlariga material tarqatiladi va har bir guruh yakka holda to‘g‘ri javobni belgilaydi. Keyin bu materiallar guruhlariga aralashtirib beriladi, yana belgilanadi. Guruhlar soniga qarab aylangandan keyin o‘qituvchi va talabalar bilan umumiy to‘g‘ri javob belgilaniladi.

№	Mexanik to‘qima xillari, tuzilishi	Plastinka li	Burchakl i	YUmsho q	Sklerenxi ma	Lubtola	YOg‘och lik tolasi	Stereid
---	------------------------------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------	---------	-----------------------	---------

1.	Poyaning po'stloq qismida joylashgan, ingichka uchli cho'zinchoq hujayralardan tashkil topgan, hujayra qobig'i sellulozali bo'lib, o't o'simliklar poyasida uchraydi						
2.	Hujayralari tirik hujayra po'sti sellulozali, qalin, epiderma ostidagi birlamchi po'stloqning parenxim hujayralaridan paydo bo'lgan hujayra po'stining burchaklari qalinlashgan						
3.	Qobig'i juda qalin yog'ochlashgan po'stli, radial kanalchalar shaklidagi ingichka teshikchalari bo'lgan o'lik parenxim hujayralardan tuzilgan						
4.	Kambiydan hosil bo'lgan va yog'ochlik (ksixema)qismida joylashgan mexanik to'qima						
5.	Poyaning po'stloq qismida joylashgan sklerenxima turi						
6.	Hujayraning tangental devorlari qalinlashgan mexanik to'qima						
7.	Hujayra devorlari orasida bo'shliq bo'lgan mexanik to'qima						

5. Mustaqil bajarish uchun vazifalar

Ob'ektlar bo'yicha ma'lumotlar.

Qoplovchi to'qimalar

Qoplovchi to'qimalar o'simliklar tanasini tashqi qismida joylashgan bo'lib, uning organlarini tashqi noqulay sharoit ta'siridan, ya'ni haddan tashqari qizib ketish yoki sovub ketishdan, to'qimalar ichiga suv, zararli bakteriyalar va zamburug'lar kirishidan, o'simlikni ortiqcha suv bug'latishdan, mexanik shikastlanishdan saqlaydi.

Qoplovchi to'qima kelib chiqishiga ko'ra uch xil bo'ladi: epiderma yoki po'st, periderma, po'stloq bo'ladi.

Epiderma. Epiderma o'simlikning barg va yosh novdalarini tashqi tomondan o'rab turuvchi bir qator, ba'zan ikki, uch qator bo'lib zich joylashgan tirik hujayralardan iborat.

Epiderma hujayralari rangsiz uning ichida protonlazma va vakuolalar mavjud. Epiderma tashqi ko'rinishi jihatidan turli o'simliklarda turlicha bo'ladi.

Masalan: ikki pallali o'simliklarda epiderma hujayralarining bo'yi bilan eni baravar, hujayra po'sti egri-bugri bo'lsa, bir pallali o'simliklarda esa cho'ziq, hujayra devorlari tekis bo'ladi.

Epidermaning sirti ko'pincha mumsimon modda kutin bilan qoplangan bo'lib, yaltiroq tashqi qavat-kutikulani hosil qiladi. Kutikula o'zidan suv va gazlarni o'tkazmaydi, natijada himoya vazifasini yanada oshiradi. O'simliklarda gaz almashinish va suv bug'lanish jarayonlari alohida teshikchalar-og'izchalar orqali bo'ladi; bu og'izchalar epidermis hujayralari orasiga joylashgan bo'ladi, Og'izchalar ikkita loviyasimon shaklli qamrovchi hujayradan tuzilgan bo'lib, bu hujayralar gaz va suv bug'latib turadigan teshikni hosil qiladi. Qamrovchi hujayralar epidermining boshqa hujayralaridan tarkibida xloroplast bo'lishi bilan farq qiladi. Hujayralar devorining bir xilda qalin emasligi hamda ularning bir xilda tarang bo'lib turmasligi sababli og'izcha ochilib yoki yopilib turishi mumkin. Qamrovchi hujayralar tarang vaqtida og'izcha ochiq, so'ligan vaqtida esa bekiladi.

Epiderma sirti tukchalar bilan qoplangan bo'ladi. tukchalar bajaradigan vazifasi va tuzilishi jihatidan bir hujayrali, ko'p hujayrali, oddiy va bezli bo'ladi; shakliga ko'ra-to'g'ri, shoxlangan, boshchali, yulduzsimon bo'ladi. Bezli tukchalarda efir moylari, kislotalar hamda fermentlar bo'ladi.

Periderma. Ko'p yillik o'simliklarning organlarida epiderma o'rnini ikkilamchi qoplovchi to'qima-probka (periderma) egallaydi. Periderma uch qavatdan: fellema, fellogen, fellodermadan iborat.

Fellema (po'kak) bir necha qavat o'lik hujayralardan tashkil topgan bo'lib, o'zidan suv va havoni o'tkazmaydi.

Fellogen Hujayrasi ichida sitoplazma va yassi shaklli hujayralardan iborat yupqa po'stli yadrosi bo'ladi. Fellogen hujayralari bo'linib ko'payib tashqi tomondan felloderma to'qimasini hosil qiladi.

Periderma ba'zi o'simlikda fellogen epidermaning o'zidan yoki subepidermal qavat hujayrasidan paydo bo'ladi.

Po'kak to'qimaning ayrim hujayralari uzilib yasmiqchalar hosil qiladi. Ular orqali suv parlanish va havo almashinish jarayoni sodir bo'ladi.

Po'stloq. Ko'p yillik daraxt o'simliklarining poyasida probka o'rnini quruq po'stloq egallaydi. Daraxtsimon o'simliklar poyasi kambiy qavatining uzluksiz rivojlanishi hisobiga eniga o'sib yo'g'onlashib turadi. Natijada periderma ham yoriladi. Po'stloqning chuqurroq qismida yangidan periderma qavatini hosil qiladigan fellogen to'qimasi hosil bo'ladi. Fellogen qavatining qayta-qayta hosil bo'lishi natijasida po'stloq to'qimalari qurib, o'lik qoplovchi to'qima-quruq po'stloq hosil qiladi.

Mexanik to'qima

Mexanik to'qima o'simlikka mustahkamlik beradi. Bu to'qimalarning uch xili mavjud: kollenxima, sklerenxima, sklereidlar.

Kollenxima-to'qimasi tirik parenxima hujayralaridan iborat. Ularda protoplazma, yadro va xlorofill donachalari bo'ladi. Hujayra po'sti selyulozadan tashkil topgan. Kollenxima to'qima hujayralarining devorlari har xil qalinlashishi mumkin. Hujayra burchaklari qalinlashgan bo'lsa, buni burchakli kollenxima deyiladi. Hujayraning tangektal devorlari qalinlashib, radial devorlari yupqaligicha qolsa, plastinkali kollenxima, qalinlashgan hujayra devorlari orasida hujayralararo bo'shliq bo'lsa yumshoq kollenxima deb ataladi. Kollenxima to'qimasi ikki pallali o'imliklarning yosh poyalari va barg bandida uchraydi.

Sklerenxima. Bu to'qima poya epidermasining ostida hamda o'tkazuvchi bog'lamlar atrofida joylashadi. Hosil bo'lishiga ko'ra birlamchi va ikkilamchi sklerenxima mavjud. Birlamchi sklerenxima prokambiy va peresikldan, ikkilamchi sklerenxima kambiydan hosil bo'ladi. Sklerenxima-poyaning po'sloq qismida uchrasa, lub tolalari yoki stereid deb ataladi. Agar sklerenxima o'simlikning yog'ochlik qismida uchrab, kambiydan hosil bo'lsa, yog'ochlik tolasi yoki libriform deyiladi. Ba'zi libriform hujayralar bo'shlig'ida to'siqlar libriform deyiladi. Bunday hujayralar tok va shu kabi o'simliklarda uchraydi.

Sklereid. Bu hujayralarning po'sti qalinlashgan va yog'ochlangan. Sklereidlar o'lik hujayralar hisoblanadi. Bular o'simliklarning turli organlarida: o'simlik poyasi va bargida, nok va behi mevasining etida, shaftoli, o'rik danagida, yong'oq po'chog'ida uchraydi.

6. Mustaqil ishlash tartibi

Kerakli jihozlar: O'simlik organidan tayyorlangan fiksirlangan material. Safranin, Sudan III eritmasi va tayyor preparatlar.

1-tajriba. Bir pallali o'simliklar bargining epidermis tuzilishi. Gulsafsar bargining pastki tomonidan shilib, mikroskopik preparat tayyorlang va mikroskopning katta ob'ektivida ko'rib, quyidagilarga e'tibor bering:

1. Epidermis hujayrasi. 2. Og'izchaning tutashtiruvchi hujayralari xloroplastlari bilan, og'izcha teshigi, og'izcha atrofidagi hujayralar. Bir pallali o'simliklar epidermis hujayralarining shakliga e'tibor bering.

2-tajriba. Ikki pallali o'simlik bargi epidermisining tuzilishi. Bu tajribani marjon (buzina) daraxti bargida ko'riladi. Bu preparatni xuddi 1-tajriba kabi tayyorlanadi. Bir va ikki pallali o'simlik epidermisini solishtirib ko'ring.

3-tajriba. Tayyor preparat: oshqovoqning poyasidan tayyorlangan preparatdan qoplovchi va mexanik to'qimalarni joylanishini, tuzilishini ko'ring.

4 – tajriba: - Makkajo'xori poyasidan ko'ndalangiga kesib preparat tayyorlanadi. Qilinadigan ishlar oshqovoq poyasidagiga o'xshash bajariladi. Poya tashqi tomonidan epidermis bilan qoplangan. Epidermis tagida qizil rangga bo'yalgan sklerenxima halqasi joylashgan. So'ngra hamma tomoni asosiy to'qima bilan o'ralgan holda joylashgan o'tkazuvchi to'qima bog'lamlari ko'rinadi. O'tkazuvchi to'qima bog'lamlari sinchiklab ko'riladi. U kollateral (ksilemaning bir tomoniga floema joylashgan) va ochiq (floema bilan ksilema o'rtasida kambiy bo'ladi) bog'lam ekanligi aniqlanadi.

Topshiriqlar: birlamchi va ikkilamchi qoplovchi to'qimalar, kollennxima, sklerenxima rasmi chiziladi.

Laboratoriya mashg'ulot— 7

Mavzu: “O'tkazuvchi to'qimalar. O'tkazuvchi to'qima elementlari va bog'lamlari”

1. Darsning maqsadi:

O'tkazuvchi to'qima, ularning xillari vazifasi, bog'lamlari, uchraydigan joylari haqida tushuncha berish. O'simlik organizmida suv va suvda erigan moddalar doimo harakatda bo'ladi. Bu moddalarning harakati o'tkazuvchi to'qimalar orqali, ya'ni ksilemadan suv va unda erigan moddalar pastdan yuqoriga, bunda ildizdan poya va bargga ko'tariladi (ko'tariluvchi oqim), floemadan esa assimilyatsiya natijasida hosil bo'lgan organik moddalar yuqoridan pastga, ya'ni bargdan poya va ildizlarga harakatlanadi (tushuvchi oqim).

Ksilema to'qimasi tarkibiga – traxeya, traxeidlar, ksilema tolasi – libriform va ksilema parenximasi kiradi.

Traxeyalar ingichka kapillyarlardan tashkil topgan bo'lib, ular hujayralarning uzun qator bo'lib joylashishidan hosil bo'ladi. Kapillyar silindr shaklida bo'lib, ichida ko'ndalang

to'siqlar bo'maydi, qobig'i notekis qalinlashib yog'ochlangan bo'ladi. Traxeyalarning qobig'i spiral, halqasimon, narvonsimon, to'rli va nuqtali shaklda qalinlashgan bo'ladi.

Traxeidlar – ingichka uchli, yog'ochlashgan, qalin devorli, o'lik prozenxim hujayralardan tashkil topgan bo'lib, asosan nina bargli daraxtlarda, paporotniksimonlarda uchraydi.

Floema tushuvchi oqim bo'lib, uning tarkibiga elaksimon naylar, yo'ldosh hujayralar, floema tolasi – stereid va floema parenximalari kiradi.

Elaksimon naylar uzunasiga birlashgan naysimon hujayralardan iborat, ularning birlashgan ko'ndalang to'siqlarida mayda teshiklar xuddi elakga o'xshab joylashgan bo'lgani uchun elaksimon naylar deyiladi. Elaksimon naylar yonida maxsus tirik yadroli hujayralar bo'lib ular yo'ldosh hujayralar deyiladi. Elaksimon nay va yo'ldosh hujayralar yonma yon joylashgan bo'lib, har ikkalasi ham kambiy va prokambiyning bitta hujayrasidan hosil bo'ladi. SHuning uchun bu hujayralar harindosh hujayralar bo'lib, elaksimon naylar nobud bo'lsa, yo'ldosh hujayra ham halokatga uchraydi.

Ochiq urug'li o'simliklarda yo'ldosh hujayra bo'lmaydi.

O'tkazuvchi to'qimaning barcha elementlari qo'shilib, o'tkazuvchi bog'larni hosil qiladi. har bir o'tkazuvchi bog'larni keng ovalsimon yoki tuxumsimon bo'lib turli xil to'qimalardan tuzilgan.

Daraxt o'simliklar

Floema va ksilemaning joylashishiga harab o'tkazuvchi bog'larni quyidagicha bo'ladi.

Yopiq kollateral bog'larni prokambiy to'liq sarflanib, floema bilan ksilema yonma – yon joylashadi (masalan makkajo'xorida).

Ochiq kollateral bog'larni prokambiyning bir qismi kambiyga aylanib floema bilan ksilema o'rtasida joylashgan bo'ladi (ikki pallali o'simliklarda uchraydi).

Ochiq bikollateral bog'larni floema ksilemaning ikki tomonida, floema bilan ksilema o'rtasida kambiy joylashgan bo'ladi (masalan qovoq poyasida).

Kontsentrik bog'larni floema ksilemani batamom o'rab olgan bo'ladi yoki aksincha ksilema floemani o'rab oladi (bunday bog'larni ildizpoyalarda uchraydi).

Radial o'tkazuvchi bog'larni asosiy qismini ksilema tashkil qilib, radial nur shaklida joylashadi. Radial nurlar orasida floema joylashadi. (bu bog'larni birlamchi ildiz tuzilishiga ega bo'lgan o'simliklarda uchraydi).da floema daraxtning po'stloq qismida, ksilema yog'ochlik qismida joylashib, o'tkazuvchanlik vazifasini bajaradi. O't o'simliklarining po'stloq va yog'ochlik qismi yaxshi rivojlanmagan shuning uchun floema bilan ksilema bog'larni hosil qiladi. Bu bog'larni orqali moddalar harakatda bo'ladi.

Metod – Bumerang, Vertushka

Bumerang terningi

Talabalar kichik guruhlariga bo'linadi va vazifa yozilgan material tarqatiladi. har bitta guruh o'z fikrlarini bayon qiladi va guruhlar orasida savol – javob

1 – guruhga beriladigan vazifa

1. O'tkazuvchi to'qimalarning vazifasi
2. YUqoriga ko'tariluvchi oqim
3. Past ga tushuvchi oqim

2 – guruhga beriladigan vazifa

Floema va uning elementlari

- a) elaksimon nay
- b) yo'ldosh hujayra
- v) floema parenximasi

g) lub tolasi – stereid

3 – guruhga beriladigan vazifa

Ksilema va uning elementlari

a) traxeya

b) traxeidlar

v) yog‘ochlik parenximasi

g) yog‘ochlik tolasi – libriform

4 – guruhga beriladigan vazifa

O‘tkazuvchi to‘qima bog‘lamlari

a) YOpiq kollateral

b) Ochiq bikollateral

v) Kotsentrik

g) Radial

Vertushka metodi.

Bu treningda guruhlariga material tarqatiladi va har bir guruh yakka holda to‘g‘ri javobni belgilaydi. Keyin bu materiallar guruhlariga aralashtirib beriladi, yana belgilanadi. Guruhlar soniga harab aylangan-dan keyin o‘qituvchi va talabalar bilan umumiy to‘g‘ri javob belgilaniladi.

O‘tkazuvchi bog‘lam xillari	Yopiq kollateral bog‘lam	Ochiq kolle-teral bog‘lam	Ochq bikollateral bog‘lam	Radial bog‘lam	Kon-tsentrrik Bog‘lam
1. Floema ksilemaning atrofini o‘rab oladi, ba‘zan ksilema floemani atrofini o‘rab oladi 2. Ksilemaning ikki tomonida floema joylashgan bo‘ladi 3. Floema ksilema bilan yonmayon joylashib turadi 4. Ksilema markazda radial nurlar hosil qilib joylashadi, nurlar orasida floema joylashadi. 5. Prokambiyning bir qismi kambiyga aylanib, floema bilan ksilema o‘rtasida joylashgan bo‘lsa					

Mustaqil bajarish uchun vazifalar.

Ob’ektlarni o‘rganish: O‘tkazuvchi to‘qimalar, ksilema va floema elementlari va o‘tkazuvchi to‘qima bog‘lamlari.

O‘simlik organizmida suv va suvda erigan moddalar doimo harakatda bo‘ladi. Bu moddalarning harakati o‘tkazuvchi to‘qimalar orqali, ya’ni ksilemadan suv va unda erigan moddalar pastdan yuqoriga, bunda ildizdan poya va bargga ko‘tariladi (ko‘tariluvchi oqim), floemadan esa assimilyatsiya natijasida hosil bo‘lgan organik moddalar yuqoridan pastga, ya’ni bargdan poya va ildizlarga harakatlanadi (tushuvchi oqim).

Ksilema to‘qimasi tarkibiga – traxeya, traxeidlar, ksilema tolasi – libriform va ksilema parenximasi kiradi.

Traxeyalar ingichka kapillyarlardan tashkil topgan bo'lib, ular hujayralarning uzun qator bo'lib joylashishidan hosil bo'ladi. Kapillyar silindr shaklida bo'lib, ichida ko'ndalang to'siqlar bo'maydi, qobig'i notekis qalinlashib yog'ochlangan bo'ladi. Traxeyalarning qobig'i spiral, halqasimon, narvonsimon, to'rli va nuqtali shaklda qalinlashgan bo'ladi.

Traxeidlar – ingichka uchli, yog'ochlashgan, qalin devorli, o'lik prozenxim hujayralardan tashkil topgan bo'lib, asosan nina bargli daraxtlarda, paporotniksimonlarda uchraydi.

Floema tushuvchi oqim bo'lib, uning tarkibiga elaksimon naylar, yo'ldosh hujayralar, floema tolasi – stereid va floema parenximalari kiradi.

Elaksimon naylar uzunasiga birlashgan naysimon hujayralardan iborat, ularning birlashgan ko'ndalang to'siqlarida mayda teshiklar xuddi elakga o'xshab joylashgan bo'lgani uchun elaksimon naylar deyiladi. Elaksimon naylar yonida maxsus tirik yadroli hujayralar bo'lib ular yo'ldosh hujayralar deyiladi. Elaksimon nay va yo'ldosh hujayralar yonma yon joylashgan bo'lib, har ikkalasi ham kambiy va prokambiyning bitta hujayrasidan hosil bo'ladi. Shuning uchun bu hujayralar harindosh hujayralar bo'lib, elaksimon naylar nobud bo'lsa, yo'ldosh hujayra ham halokatga uchraydi.

Ochiq urug'li o'simliklarda yo'ldosh hujayra bo'lmaydi.

O'tkazuvchi to'qimaning barcha elementlari qo'shib, o'tkazuvchi bog'lamni hosil qiladi. har bir o'tkazuvchi bog'lam keng ovalsimon yoki tuxumsimon bo'lib turli xil to'qimalardan tuzilgan.

Daraxt o'simliklar

Floema va ksilemaning joylashishiga arab o'tkazuvchi bog'lamlar quyidagicha bo'ladi.

Yopiq kollateral bog'lamda prokambiy to'liq sarflanib, floema bilan ksilema yonma – yon joylashadi (masalan makkajo'xorida).

Ochiq kollateral bog'lamda prokambiyning bir qismi kambiyga aylanib floema bilan ksilema o'rtasida joylashgan bo'ladi (ikki pallali o'simliklarda uchraydi).

Ochiq bikollateral bog'lamlarda, floema ksilemaning ikki tomonida, floema bilan ksilema o'rtasida kambiy joylashgan bo'ladi (masalan qovoq poyasida).

Kontsentrik bog'lamlarda floema ksilemani batamom o'rab olgan bo'ladi yoki aksincha ksilema floemani o'rab oladi (bunday bog'lam ildizpoyalarda uchraydi).

Radial o'tkazuvchi bog'lamlarning asosiy qismini ksilema tashkil qilib, radial nur shaklida joylashadi. Radial nurlar orasida floema joylashadi. (bu bog'lam birlamchi ildiz tuzilishiga ega bo'lgan o'simliklarda uchraydi).da floema daraxtning po'stloq qismida, ksilema yog'ochlik qismida joylashib, o'tkazuvchanlik vazifasini bajaradi. O't o'simliklarining po'stloq va yog'ochlik qismi yaxshi rivojlanmagan shuning uchun floema bilan ksilema bog'lam hosil qiladi. Bu bog'lamlar orqali moddalar harakatda bo'ladi.

Mustaqil ishlash tartibi.

1 – tajriba: - Oshqovoq poyasidan ko'ndalangiga kesib, preparat tayyorlanadi. Bir nechta qirqib olingan poyadan eng yupqasini ajratib olib, safranin reaktividan tomiziladi va qoplag'ich oyna bilan yopiladi. Mikroskopning kichik ob'ektivida poyaning umumiy ko'rinishi kuzatiladi. Bunda katta va kichik o'tkazuvchi to'qima bog'lamini ko'rish mumkin. Barcha yog'ochlangan hujayralar qizil ranga bo'yalib ko'riladi. Poyaning hamma qismi, poya epidermisi va undan chiqqan hujayrali tuklar, epidermis ostidagi burchakli kollenxima va sklerenxima halqasi ko'zdan kechiriladi. Asosiy to'qima bilan o'ralgan o'tkazuvchi to'qima bog'lamlari ko'riladi. O'tkazuvchi to'qima bog'lamlari doira bo'yicha tartibli ravishda joylashgan. Bu preparatdan bitta o'tkazuvchi to'qima bog'lami o'rganiladi. O'tkazuvchi to'qima bog'lami bikollateral ravishda tuzilgan

(ksilemaning har ikkala tomoniga floema joylashgan, ya'ni tashqi va ichki floema) va ochiq (tashqi floema bilan ksilema o'rtasida kambiy bor) bog'lama bo'ladi.

- 2 – tajriba: - Makkajo'xori poyasidan ko'ndalangiga kesib preparat tayyorlanadi. qilinadigan ishlar oshqovoq poyasidagiga o'xshash bajariladi. Poya tashqi tomonidan epidermis bilan qoplangan. Epidermis tagida qizil rangga bo'yalgan sklerenxima halqasi joylashgan. So'ngra hamma tomoni asosiy to'qima bilan o'ralgan holda joylashgan o'tkazuvchi to'qima bog'lamlari ko'rinadi. O'tkazuvchi to'qima bog'lamlari sinchiklab ko'riladi. U kollateral (ksilemaning bir tomoniga floema joylashgan) va ochiq (floema bilan ksilema o'rtasida kambiy bo'ladi) bog'lama ekanligi aniqlanadi.
- 3- tajriba: - Kungaboharning uzunasiga kesilgan tayyor preparatidan foydalaniladi. Mikroskopning kichik ob'ektivida qizil rangga bo'yalgan suv naylar va traxeidlar ko'riladi. Eng yirik suv naylaridan to'rsimon, teshiksimon, halqasimon, narvonsimon suv naylari hamda sklerenxima va elaksimon naylar mikroskop ostida ko'riladi.
- 4 – tajriba: - Makkajo'xori poyasining uzunasiga kesilgan tayyor preparati mikroskop ostida ko'riladi. SHu bilan birga oshqovoqning uzunasiga kesilgan poyasi bilan taqqoslanadi. Makkajo'xori poyasida suv naylari bor yo'g'ligi aniqlanadi.
- 5 – tajriba: - Orlyak paprotnigining ildizpoyasidan kesilgan tayyor preparatidan foydalaniladi. Bu preparatdan kontsentrik holda joylashgan o'tkazuvchi to'qima bog'lamlari ko'riladi. YUqorida ko'rsatilgan preparatlarni o'rganish davrida to'qimalarni joylanishi hamda alohida o'tkazuvchi to'qima bog'lamlari rasmi chiziladi.
- 6 – tajriba: - Tayyor preparat: gulsafsar ildizining ko'ndalang kesimi. Radial o'tkazuvchi to'qima bog'lama ahamiyat bering.

Topshiriqlar: - Ksilema va uning elementlari, floema va uning elementlari. O'tkazuvchi to'qima bog'lamlarini, to'qimalarni ildizpoyalarda joylanishini chizib oling.

Laboratoriya mashg'ulot— 8

Mavzu: “Asosiy va ajratuvchi to'qimalar”

1. Darsning vazifasi:

Asosiy va ajratuvchi to'qimalarning tuzilishi, organlarda joylashuvi, ayrim o'simliklarda o'ziga xos bezlar uchrashi va ularda to'planadigan moddalar haqida tushuncha berish.

O'simlik organlarining ko'pchilik qismi yirik, hujayra po'sti yupqa, modda almashinuvi jarayonida faol ishtirok etadilar. Bu hujayralar asosan birlamchi va ikkilamchi meristemalardan hosil bo'ladi va asosiy to'qimalar deb ataladi. Asosiy to'qimalar bir necha guruhga bo'linadi:

Assimilyatsion to'qima (xlorenxima) - Xlorofill donachalari ko'p bo'lgan to'qima assimilyatsion to'qima (xlorenxima) deb ataladi. Bu to'qima asosan barglarda, gullarda, yashil mevalarda va o't o'simliklarning poyalari uchraydi. To'qimaning asosiy vazifasi – fotosintez.

G'amlovchi to'qima- Fotosintez natijasida hosil bo'lgan moddalar oziq modda sifatida to'planishi mumkin. Bunday to'qima urug'li o'simliklarning hamma organlarida bor. Kraxmal, aleyron donachalari, yog' moddalar guruxiga kirib, ular g'amlovchi parenxima hujayralarining sitoplazmasida saqlanadi.

SHamollatuvchi to'qima.(aerenxima) - hujayralararo bo'shliqlari ko'p va keng bo'lgan parenximaga aerenxima deb ataladi. Aerenxima o'simlikning qamma havo, ya'ni nafas olish uchun kerak bo'lgan kislorodni etkazib beradi. Aerenxima suvda va botqoqlikda o'sadigan o'simliklarning poya, barg va ildizlarida yaxshi rivojlanadi. Parenximaning asosiy vazifasi assimilyatsion to'qimalarni kislorod bilan taminlashdir.

So'ruvchi to'qima - Bu to'qima o'simlik hayotida katta rol o'ynaydi. So'ruvchi to'qima ildizning so'rish zonasida joylashgan bo'lib, u ildiz tuklari va po'stloqning yosh parenxima hujayralaridan iborat.

Vellamen - Ko'p qavatli suv shimuvchi ilma-teshik o'lik hujayralardan tashkil topgan bo'lib, epifitlarning havo ildizlarida uchraydi. Bunga misol qilib, solabdoshlar, kuchaladoshlar oilasidagi o'simliklarning havo ildizlarini olish mumkin.

Ajratuvchi to'qimalar

Moddalar almashinuvi jarayonida o'simliklar o'zidan har xil moddalarni ajratib chiharadi. Ajratuvchi to'qimaning ikki turi: ichki va tashi sekretsiya to'qimalari mavjud. Ichki sekretsiya to'qimalariga sxizogen va lizigen yo'llar deb ataluvchi to'qimalar, maxsus idioblastlar va qismlarga ajralgan murakkab sut naychalari yoki sutdonlar kiradi. Bu to'qimalarda ko'pincha oshlovchi moddalar, smolalar, efir moylari va kristallar to'planadi. Sut naychalari o'simliklar tanasida tarmoqlanib ketgan kanallar sistemasidan iborat. Ular ayrim parenxima hujayralardan yoki bir qancha hujayralarning birlashib ketishidan hosil bo'ladi. Sut naychalari doimo tirik bo'lib, unda kauchuk, smola tomchilari, kraxmal donachalari va alkaloidlar mavjud. Sutsimon shira ko'knori, sachratqi, qoqi o'ti kabi o'simlik organlarida uchraydi.

Murakkab yoki qismlarga ajralgan sutdonlar murtak rivojlanayotgan paytda gipokotilda va urug' pallarida hosil bo'la boshlaydi. Apikal meristemaning differentsiatsiyalanishi natijasida yangi sutdon yo'llar hosil bo'ladi, keyinchalik ular birlamchi sutdon yo'llari bilan qo'shib, umumiy murakkab sutdon yo'llari sistemasini tashkil qiladi. Astraguldoshlar, ko'knoridoshlar oilasiga mansub o'simliklarda bu qildagi sutdon uchratiladi.

Oddiy yoki qismlarga ajralmagan sutdon yo'llari murtakdagi boshlang'ich ildizga va urug' palla o'rtasida joylashgan bitta yoki bir necha xil hujayralarning kengayib rivojlanishi natijasida paydo bo'ladi. Bunday sutdonlarning ba'zilar tarmoqlanmasdan silindrsimon ko'rinishni oladi. Chayon o'ti va nashada sutdonlar kuchli tarmoqlangan, ya'ni ular o'simlik tanasi bo'ylab tarqalgandir.

Sxizogen va lizigen bo'shliqlar.

Sxizogen yo'llar to'qimalardagi hujayralararo bo'shliqlarning kengayishi natijasida hosil bo'ladi. Bu xildagi bo'shliqlar suv o'tlaridan laminariyada uchraydi. Lizigen bo'shliqlarning kelib chiqishi biroz boshqacharoq ular to'qimalardagi guruh hujayralarning erib ketishi natijasida hosil bo'ladi. Bunday bo'shliqlar sitrus o'simliklarida, qarag'aylarda esa smola yo'llari shaklida ko'rinadi.

Organlarda smola yo'llari vertikal va gorizantal joylashgan bo'lishi mumkin.

4. Metod – Vertushka

Vertushka metodi

Bu treningda 3 ta yoki 5 ta guruhga material tarqatiladi va har bir guruh yakka holda belgilaydi. Keyin bu material guruhlarga aralashtirib beriladi, yana belgilanadi, 3 yoki 5 marta aylangandan keyin o'qituvchi va talabalar bilan umumiy to'g'ri javob o'rtoqlashiladi.

№	Asosiy to‘qima xillari	Xloren-xima	G‘am-lovchi	So‘ruvchi	Aeren-xima	Vella-men	Urug‘-murtak-dan so‘-ruvchi qatlam
1	Ildizining so‘rish zonasida joyla-shib, markaziy o‘t-kazuvchi to‘qimaga etkazib beradi						
2	Bu parenxima hujayralarida oziq modda to‘planadi						
3	Xloroplastlari bo‘lgan parenxima hujayralar						
4	hujayralararo bo‘shliqlari bo‘lgan parenxima						
5	hujayralarda suv to‘playdigan paren-xim hujayralar						
6	Urug‘murtak qalqo-nida bo‘ladigan asosiy to‘qima						

2. O‘quv jarayonining mazmuni:

10. Asosiy to‘qima vazifasi, uning xillari
11. Assimilyatsion (xlorenxima) to‘qima
12. hamlovchi to‘qima
13. SHamollatuvchi (aerenxima) to‘qima
14. So‘ruvchi to‘qima
15. Vellamen – suv shimuvchi to‘qima
16. Ajratuvchi to‘qima vazifasi, uning xillari
17. Tashqi chiharuvchi to‘qimalar:
 - a) bezchali tuklar (trixomalar)
 - b) o‘smalar (emergentlar)
 - v) nektardonlar
 - g) gidatodalar
 - c) hazm bezlari
 - e) osmaforalar
9. Ichki chiharuvchi to‘qimalar:
 - a) idioblastlar
 - b) sxizogen bo‘shliq
 - v) lizigen bo‘shliq
 - g) efir moy kanallari
 - d) smola yo‘li
10. Sut naylari:
 - c) bo‘g‘imli sut naylari
 - d) bo‘g‘imsiz sut naylari

3. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita, usul, nazorat, baholash)

- a) Darsning turi - suhbat
- b) Metod – Vertushka
- v) Forma – (shakl) guruh
- g) Vosita – doska, taqatma material, mikroskop, tayyor preparatlar, tablitsa
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko'rish)
- j) Baholash – o'z-o'zini va umumiy baholash

4. Metod – Vertushka

Vertushka metodi

Bu treningda 3 ta yoki 5 ta guruhga material tarqatiladi va har bir guruh yakka holda belgilaydi. Keyin bu material guruhlarga aralashtirib beriladi, yana belgilanadi, 3 yoki 5 marta aylangandan keyin o'qituvchi va talabalar bilan umumiy to'g'ri javob o'rtoqlashiladi.

№	Asosiy to'qima xillari	Xloren-xima	G'am-lovchi	So'ruvchi	Aeren-xima	Vella-men	Urug'-murtakdan so'ruvchi qatlam
1	Ildizining so'rish zonasida joyla-shib, markaziy o't-kazuvchi to'qimaga etkazib beradi						
2	Bu parenxima hujayralarida oziq modda to'planadi						
3	Xloroplastlari bo'lgan parenxima hujayralar						
4	hujayralararo bo'shliqlari bo'lgan parenxima						
5	hujayralarda suv to'playdigan paren-xim hujayralar						
6	Urug'murtak qalqo-nida bo'ladigan asosiy to'qima						

Vertushka metodi

Bu treningda 3 ta yoki 5 ta guruhga material tarqatiladi va har bir guruh yakka holda belgilaydi. Keyin bu material guruhlarga aralashtirib beriladi, yana belgilanadi, 3 yoki 5 marta aylangandan keyin o'qituvchi va talabalar bilan umumiy to'g'ri javob o'rtoqlashiladi.

№	Tashqi chiharuvchi	Bezcha-	O'sma-	Nektar-	Gidatoda-	Xazm	Osma-
---	--------------------	---------	--------	---------	-----------	------	-------

	to'qima	li tuklar	lar	donlar	lar	bez-lari	fora-lar
1	Fermentlar va kis-lotalar yordamida hashoratlarni tu-tib oziqlanadi						
2	O'simlikning guli-da bo'lib, qandsi-mon – suyuqlik aj-ratadi						
3	Bezchalarning hosil bo'lishida paren-xim hujayralari ishtirok etgan, osonlik bilan sinadigan o'yuvchi moddasi bo'lgan						
4	Suv tomchilatib turadigan to'qima						
5	O'simlik guli toj-barglarida uchuvchan efir moylari ajratib turadigan to'qima						
6	Epiderma hujayralaridan hosil bo'ladigan, sekretlar (suyuqliklar) bo'l-gan kutikula qavat						

5. Mustaqil bajarish uchun vazifalar

Ob'ektlarni o'rganish : Asosiy to'qima.Ajratuvchi to'qimalar.

Ob'ektlar bo'yicha ma'lumotlar.

O'simlik organlarining ko'pchilik qismi yirik, hujayra po'sti yupqa, modda almashinuvi jarayonida faol ishtirok etadilar.Bu hujayralar asosan birlamchi va ikkilamchi meristemalardan hosil bo'ladi va asosiy to'qimalar deb ataladi.Asosiy to'qimalar bir necha guruhga bo'linadi:

Assimlyatsion to'qima (xlorenxima) - Xlorofill donachalari ko'p bo'lgan to'qima assimilyatsion to'qima (xlorenxima) deb ataladi. Bu to'qima asosan barglarda, gullarda, yashil mevalarda va o't o'simliklarning poyalarida uchraydi. To'qimaning asosiy vazifasi – fotosintez.

G'amlovchi to'qima- Fotosintez natijasida hosil bo'lgan moddalar oziq modda sifatida to'planishi mumkin. Bunday to'qima urug'li o'simliklarning hamma organlarida bor. Kraxmal, aleyron donachalari, yog' moddalar guruxiga kirib, ular g'amlovchi parenxima hujayralarining sitoplazmasida saqlanadi.

SHamollatuvchi to'qima.(aerenxima) - hujayralararo bo'shliqlari ko'p va keng bo'lgan parenximaga aerenxima deb ataladi. Aerenxima o'simlikning qamma havo, ya'ni nafas olish uchun kerak bo'lgan kislorodni etkazib beradi. Aerenxima suvda va botqoqlikda o'sadigan o'simliklarning poya, barg va ildizlarida yaxshi rivojlanadi. Parenximaning asosiy vazifasi assimilyatsion to'qimalarni kislorod bilan taminlashdir.

So'ruvchi to'qima - Bu to'qima o'simlik hayotida katta rol o'ynaydi. So'ruvchi to'qima ildizning so'rish zonasida joylashgan bo'lib, u ildiz tuklari va po'stloqning yosh parenxima hujayralaridan iborat.

Vellamen - Ko'p qavatli suv shimuvchi ilma-teshik o'lik hujayralardan tashkil topgan bo'lib, epifitlarning havo ildizlarida uchraydi. Bunga misol qilib, solabdoshlar, kuchaladoshlar oilasidagi o'simliklarning havo ildizlarini olish mumkin.

Ajratuvchi to'qimalar

Moddalar almashinuvi jarayonida o'simliklar o'zidan har xil moddalarni ajratib chiqaradi. Ajratuvchi to'qimaning ikki turi: ichki va tashqi sekretiya to'qimalari mavjud. Ichki sekretiya to'qimalariga sxizogen va lizigen yo'llar deb ataluvchi to'qimalar, maxsus idioblastlar va qismlarga ajralgan murakkab sut naychalari yoki sutdonlar kiradi. Bu to'qimalarda ko'pincha oshlovchi moddalar, smolalar, efir moylari va kristallar to'planadi. Sut naychalari o'simliklar tanasida tarmoqlanib ketgan kanallar sistemasidan iborat. Ular ayrim parenxima hujayralardan yoki bir qancha hujayralarning birlashib ketishidan hosil bo'ladi. Sut naychalari doimo tirik bo'lib, unda kauchuk, smola tomchilari, kraxmal donachalari va alkaloidlar mavjud. Sutsimon shira ko'knori, sachratqi, qoqi o'ti kabi o'simlik organlarida uchraydi.

Murakkab yoki qismlarga ajralgan sutdonlar murtak rivojlanayotgan paytda gipokotilda va urug' pallarida hosil bo'la boshlaydi. Apikal meristemaning differentsiatsiyalanishi natijasida yangi sutdon yo'llar hosil bo'ladi, keyinchalik ular birlamchi sutdon yo'llari bilan qo'shib, umumiy murakkab sutdon yo'llari sistemasini tashkil qiladi. Astraguldoshlar, ko'knoridoshlar oilasiga mansub o'simliklarda bu qildagi sutdon uchratiladi.

Oddiy yoki qismlarga ajralmagan sutdon yo'llari murtakdagi boshlang'ich ildizga va urug' palla o'rtasida joylashgan bitta yoki bir necha xil xujayralarning kengayib rivojlanishi natijasida paydo bo'ladi. Bunday sutdonlarning ba'zilar tarmoqlanmasdan silindrsimon ko'rinishni oladi. CHayon o'ti va nashada sutdonlar kuchli tarmoqlangan, ya'ni ular o'simlik tanasi bo'ylab tarqalgandir.

Sxizogen va lizigen bo'shliqlar.

Sxizogen yo'llar to'qimalardagi hujayralararo bo'shliqlarning kengayishi natijasida hosil bo'ladi. Bu xildagi bo'shliqlar suv o'tlaridan laminariyada uchraydi. Lizigen bo'shliqlarning kelib chiqishi biroz boshqacharoq ular to'qimalardagi guruh hujayralarning erib ketishi natijasida hosil bo'ladi. Bunday bo'shliqlar sitrus o'simliklarida, qarag'aylarda esa smola yo'llari shaklida ko'rinadi.

Organlarda smola yo'llari vertikal va gorizantal joylashgan bo'lishi mumkin.

Tashqi sekretiya to'qimalarga o'simlikning vegetativ va generativ organlarining sirtida joylashgan har xil bezli tuklar hamda guldagi nektar bezlari kiradi. Bu to'qimalar efir moylari, nektar va suv ajratib turadi.

Epiderma hujayralaridan hosil bo'lgan bezli tuklar (trixomalar) o'zlarida to'planadigan smola va efir moylarini qattiq, suyuq yoki gaz holatda tashqi muhitga ajratib turadi. Ixtisoslashgan epidermis xujayralarning smola, yelim va shilimshiq ishlab chiqarishi o'simliklarda juda ko'p uchraydigan xodisadir. Masalan, chinnigullilar oilasiga kiradigan *viscaria viscosa* nomli yopishqoq o'simlikda poyasining bo'g'imlari tagida yopishqoq tasmalar xosil bo'ladi. Bu tasmalarning epidermisi ajratuvchi xujayralarni ya'ni donador protoplazmaga boy tashqi devorida so'rg'ichsimon, o'siqlari bo'lgan yirik – yirik xujayralarni xosil qiladi. Ko'p o'simliklarda bezsimon ko'p xujayrali tuklar mavjud. Bu tuklar bir xujayrali masalan navruzgul, pelargoniya yoki ko'p xujayrali boshchadan iborat masalan xmel, qoraqatda. Tuklarning xamma xujayralari tirik bo'lib, boshcha xujayralari donador protoplazmaga boy bo'lib, yirik yadrosi bor. Bu xujayralarning chiqaradigan suyuqliklari, asosan efir moylari yoki shu moylarda erigan smolalardan iborat bo'lib, kutikula ostida to'planadi, bunda kutikula pufakcha ko'rinishida bir yoki bir tup xujayralar ustida ko'tarilib turadi va o'z – o'zidan yoki hayvon, yo bo'lmasa odam tekkanida yoriladi, shundan keyin kutikula yana asliga kelishi va

sekret chiqara boshlashi mumkin. Hashoraxo‘r o‘simliklarda bunday tuklar yopishqoq pepsin va tripsin moddalarni ajratib turadi. Gidatodalar suv ustitsalari (og‘izchalari) bo‘lib, eng faol ajratuvchi organlardan biridir. Ular orqali suv tashhariga tomchilab turadi. Masalan: ko‘zacha bargli koloxaziya o‘simlik bargidagi gidatodalar 1 minutda 180 tomchiga yaqin suv ajratishi mumkin. Nektar bezlaridan qandli suyuqlik (nektar) chiqaruvchi organlar bo‘lib, odatda, guldan joy oladi: nektar chetdan changlanadigan o‘simliklarda hayvonlarni odatda xashorotlarni o‘ziga jalb etadi.

Kerakli jihozlar: 1.O‘simlik organidan tayyorlangan fiksirlangan material. 2. Safranin, flyuroglyutsin bo‘yog‘i, Sudan III eritmasi va kontsentrik xlorid kislota.

6. Mustaqil ishlash tartibi.

1-tajriba: - Qoqi o‘tni ildizdan uzunasiga yupqa qilib kesib preparat tayyorlanadi. Mikroskop ostida sut naylari ko‘riladi.

2-tajriba: - Tayyor preparat: qarag‘ay novdasidan tayyorlangan preparatdan sxizogenli to‘qimalarni ko‘ring.

3-tajriba: - Mandarin, apelsin yoki limon bargidan (tayyorlangan preparatdan) lizigenli chiharuvchi to‘qimalarni ko‘ring.

4-tajriba: - Bezli tuki bo‘lgan o‘simliklarni bargini epidermisidan preparat tayyorlab, bezli va bezsiz tuklarni aniqlash (geran, jiyda, kampirchopon barglari ko‘riladi).

Topshiriqlar: - Sut naylari, tashqi va ichki ajratuvchi to‘qimalar, tuklar, bezli tuklarni rasmi chiziladi.

Laboratoriya mashg‘ulot-9

Mavzu: “Ildizning birlamchi va ikkilamchi tuzilishi”

1. Darsning maqsadi:

Ildizning birlamchi tuzilishi, ildiz zonalari, ikkilamchi ildizning tuzilishi, kambiyning hosil bo‘lishi, ildizmevalarning ichki tuzilishini o‘rganish.

Ob‘ektlar bo‘yicha ma’lumotlar.

Ildiz o‘shish konusining tuzilishini o‘rganish uchun bir pallali o‘simlik ildizining uchki qismini uzunasiga kesib, mikroskop ostida qaraganimizda ildiz uchi g‘ilof bilan qoplanganligini ko‘rish mumkin. g‘ilof o‘sayotgan ildizning nozik uchini – ildizning o‘shish konusini shikastlanishdan saqlab turadi. Ildiz g‘ilofi hujayralari yirik bo‘lib, sirt tomonidan doimo ajralib, ichki tomondan beto‘xtov o‘shib turadi. O‘shish nuqtasi ichki hujayralarning ko‘ndalang bo‘linishi natijasida o‘shish nuqtasi uzayadi, uzunasiga bo‘linish natijasida esa yo‘g‘onlashadi. Bo‘linish nuqtasidan birmuncha yuqoriroq o‘shish zonasi bo‘lib, uning uzunligi bir necha mmga etadi. Bu zona hujayralari tez o‘sadi va cho‘ziladi. O‘shish zonasidan keyin so‘rish zonasi boshlanadi, bunda ildiz tukchalari borligini ko‘rish mumkin. SHu tukchalar orqali suv va unda erigan mineral moddalar so‘rilib turadi. Tukchalar uzunligi 1 mmga etadi.

Mustaqil ishlash tartibi

1 – tajriba: - Bug‘doy ildizining uzunasiga kesimidan ildiz zonalarini ko‘rish:

- a) ildiz qini
- b) bo‘linish qismi
- v) o‘sovchi qismi
- g) so‘ruvchi qismi

2 – tajriba: - Gulsafsar ildizidan vaqtinchalik preparat tayyorlab, so‘rish zonasidan, ildizning birlamchi tuzilishini o‘rganish:

- a) epiblema
- b) ekzoderma
- v) mezoderma
- g) endoderma
- d) peretsikl
- e) radial bog‘lam
- j) o‘zak

3 – tajriba: - Tayyor preparatdan kambiyni hosil bo‘lishini ko‘rib, birlamchi ildizni ikkilamchi ildizga o‘tishini o‘rganish.

Metod – Vertushka, Blits o‘yin

Vertushka metodi

№	Ildiz zonalarini	Ildiz hinchasi	Bo‘linuvchi zona	O‘sovchi zona	So‘ruvchi zona
1	Ildiz o‘shish nuqtasining eng uchida joylashgan bitta bo‘linadigan hujayra initsial hujayra deyilib bo‘linish xususiyatiga ega hujayralardan tuzilgan				
2	Ildizning bu zonasidagi epiblema hujayralarining bir qismi tashqi tomonga bo‘rtib o‘shib, tukchalarni hosil qiladi. Bu tukchalar suvni shimadi.				
3					
4	Ildizning uchki qismida, tashqi tomoni sellyulozali, shilim-shiqlangan parenxim hujayralar yig‘indisi				

Bo‘linish zonasidan yuqoriga hujayralar ajralib chiqib, bo‘li-nishdan to‘xtab yirik-lashadi. Bu zona -					
--	--	--	--	--	--

2. O‘quv jarayonining mazmuni:

1. Ildiz qanday zonalardan tuzilgan
2. Ildiz zonalarining vazifasi va tuzilishi.
 - a) ildiz qini
 - b) bo‘linuvchi zona
 - v) o‘suvchi zona
 - g) so‘ruvchi zona
3. Ildizning ichki tuzilishini qaysi zonadan o‘rganish mumkin
4. So‘ruvchi zona qanday to‘qimalardan paydo bo‘ladi.
5. Birlamchi ildiz qismlari:
 - a) epiblema
 - b) birlamchi po‘stloq
 - v) markaziy silindr
6. Markaziy silindrda joylashgan to‘g‘ima turlari, vazifasi
7. Kambiyning hosil bo‘lishi
8. Ikkilamchi ildiz tuzilishi
9. Ildizmevalarning ichki tuzilishi

4. O‘quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita, usul, nazorat, baholash)

- a) Darsning turi – suhbat
- b) Metod – Blitz o‘yin, Bumerang
- v) Forma (shakl) – guruh
- g) Vosita – doska, tarqatma material, tablitsa, tayyor preparat, fiksirlangan material, mikroskop.
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko‘rish)
- j) Baholash – o‘z-o‘zini va umumiy baholash

5. Metod – Blitz o‘yin

Blitz o‘yin

Guruh bahosi	Guruh xatosi	To‘g‘ri javob	Yakka xato	Yakka baho	Guruh ichidan chetlatish	Ildizning birlamchi tuzilishi
						1. Doira shaklini olgan kambiy hujayralari ich-kariga

					<p>ikkilamchi ksilemani, tashqariga ikkilam-chi floemani hosil qiladi.</p> <p>2. Ularning hujayralari bo‘linishi natijasida esa ikkilamchi ksilema yuzaga keladi.</p> <p>3. Ikki pallali va ochiq urug‘li o‘simliklarda ildiz ikkilamchi tuzilishga o‘tadi.</p> <p>4. Bu halqani hosil qilishdan oldin, paren-xima hujayralarning kambiy yoylari bo‘linib, floemaga nisbatan ikki-lamchi ksilemani ko‘proq hosil qiladi va birlamchi floemani o‘z o‘rnidan siqib chiqaradi, kambiy doi-ra shaklini oladi.</p> <p>5. Markaziy silindrda floema va ksilema orasi-dagi yupqa po‘stli paren-xima hujayrasi cho‘zilib ikkilamchi hosil qiluvchi to‘g‘ima kambiy yoylarini hosil qiladi.</p> <p>6. Kambiydan tashqarida qolgan peretsikl hamda po‘stloq parenximasining tashqi hujayralaridan fellogen qavati hosil bo‘ladi. Fellogen qavati peridermani hosil qiladi.</p> <p>7. SHu paytda ksilema nurining uchida joylash-gan peretsikl va parenxi-ma hujayralari hosil qilgan kambiy yoylari tutashib, kambiy halqasi-ni hosil qiladi.</p>
--	--	--	--	--	---

6. Mustaqil bajarish uchun vazifa

Ob’ektlarni o‘rganish: Ildizning birlamchi tuzilishi, ildizning ikkilamchi tuzilishi.

Ob’ektlar bo‘yicha ma’lumotlar.

Ildiz o‘shish konusining tuzilishini o‘rganish uchun bir pallali o‘simlik ildizining uchki qismini uzunasiga kesib, mikroskop ostida qaraganimizda ildiz uchi g‘ilof bilan qoplanganligini ko‘rish mumkin. g‘ilof o‘sayotgan ildizning nozik uchini – ildizning o‘shish konusini shikastlanishdan saqlab turadi. Ildiz g‘ilofi hujayralari yirik bo‘lib, sirt tomonidan doimo ajralib, ichki tomondan beto‘xtov o‘shib turadi. O‘shish nuqtasi ichki hujayralarning ko‘ndalang bo‘linishi natijasida o‘shish nuqtasi uzayadi, uzunasiga bo‘linish natijasida esa yo‘g‘onlashadi. Bo‘linish nuqtasidan birmuncha yuqoriroq o‘shish zonasi bo‘lib, uning uzunligi bir necha mmga etadi. Bu zona hujayralari tez o‘sadi va cho‘ziladi. O‘shish zonasidan keyin

so‘rish zonasi boshlanadi, bunda ildiz tukchalari borligini ko‘rish mumkin. SHu tukchalar orqali suv va unda erigan mineral moddalar so‘rilib turadi. Tukchalar uzunligi 1 mmga etadi.

7. Mustaqil ishlash tartibi

1 – tajriba: - Bug‘doy ildizining uzunasiga kesimidan ildiz zonalarini ko‘rish:

- a) ildiz qini
- b) bo‘linish qismi
- v) o‘sovchi qismi
- g) so‘ruvchi qismi

2 – tajriba: - Gulsafsar ildizidan vaqtinchalik preparat tayyorlab, so‘rish zonasidan, ildizning birlamchi tuzilishini o‘rganish:

- a) epiblema
- b) ekzoderma
- v) mezoderma
- g) endoderma
- d) peretsikl
- e) radial bog‘lam
- j) o‘zak

3 – tajriba: - Tayyor preparatdan kambiyini hosil bo‘lishini ko‘rib, birlamchi ildizni ikkilamchi ildizga o‘tishini o‘rganish.

4 – tajriba: - Oshqovoq ildizidan tayyorlangan preparatdan ildizning ikkilamchi tuzilishini o‘rganish

5 – tajriba: - Tayyor preparatdan ildizmevalarning ichki tuzilishini o‘rganish

Topshiriq: - birlamchi va ikkilamchi ildiz tuzilishi va ularda to‘g‘imalarni joylanishini rasmini chizib, nomlarini yozish.

Laboratoriya mashg‘ulot – 10

Mavzu: “Bargning anatomik tuzilishi”

1. Darsning maqsadi:

Bargning ichki tuzilishi uning irsiy xususiyatiga, ekologik sharoitga va boshqa omillarga bog‘liq. Barg ikki asosiy qismdan: barg eti (mezofill) va tomirlaridan iborat.

Barg mezofill qismida assimilyatsion to‘g‘imalar joylashgan. Tomir qismida o‘tkazuvchi naylar bo‘lib, suv va unda erigan mineral moddalar oqadi.

Assimilyatsion to‘g‘imalar – bulutsimon va uutsimon hujayralardan iborat bo‘lib, ustunsimon hujayralarda fotosintez protsessi ketadi, bulutsimon hujayralarda gaz almashinuv protsessi ketadi.

Assimilyatsion to‘qimalarning joylanishiga harab, bargning ichki tuzilishi 3 xil guruhga bo‘linadi: a) dorzoventral b) izoloteral v) radial.

Bir pallali o‘simliklar bargining ichki tuzilishi ikki pallalilar bargidan birmuncha farq qiladi. Bir pallali o‘simliklar bargida ustunsimon parenxima bo‘lmaydi, hamma hujayralar bulutsimon hujayralardan iborat.

2. Darsning vazifasi:

Bargning ichki tuzilishidagi to‘g‘imalar, ularning vazifasi, assmilyatsion to‘g‘imalarning joylanishiga harab bargning guruhlarga bo‘linishini o‘rganish.

TEZKOR SO'ROV UCHUN SAVOLLAR

1. Bargning ichki tuzilishi qanday omillarga bog'liq
2. Bargda necha xil to'g'ima mavjud, va ularning vazifasi qanday
3. Bargning ostki va ustki tomoni epiderma hujayralarining tuzilishi qanday
4. Barg eti (mezofill) qismidagi parenxima hujayra turlari va ularning vazifasi
5. Assimilyatsion to'g'imalar joylanishiga qarab, barg xillari
6. Dorzoventral barg tuzilishi
7. Izolotal barg tuzilishi
8. Radial barg tuzilishi
9. Bargning tomir qismidagi o'tkazuvchi sistema tuzilishi
10. Bir pallali o'simliklar bargining ichki tuzilishini ikki pallalilardan farqi

Metod - Vertushka

Vertushka metodi

№	Assimilyatsion to'g'ima-ning joylanishiga qarab, bargning ichki tuzilishi	Dorzoventral	Izolotal	Radial
1	Barglarda yuqori va pastki epiderma tomonida, ya'ni ikki tomonlama ustunsimon to'g'ima joylashgan bo'ladi.			
2	Barglarda yuqori tomonida ustunsimon, pastki tomonida bulutsimon yoki g'ovaksimon to'g'imalar joylashgan bo'ladi.			
3	Barglarda assimilyatsion to'g'ima radius bo'ylab, ya'ni aylana bo'ylab joylashadi. Barg epidermi-sining o'sishi barvaqt to'xtashi natijasida assimilyatsion to'g'ima o'sishda davom etib, egri-bugri holatdagi xoshiyali parenximani hosil qiladi.			

Bumerang metodi

1 – guruhga beriladigan vazifa

1. Bargda necha xil to'g'imalar mavjud
2. Bargda epiderma hujayralarining tuzilishi, vazifalari.

2 – guruhga beriladigan vazifa

1. Bargda assimilyatsion to'g'ima turlari va vazifasi

2. Assimilyatsion to‘g‘imaning joylanishiga harab, barg xillari

3 – guruhga beriladigan vazifa

1. Dorzoventral barg tuzilishi va undagi to‘g‘imalarning joylanishi
2. Izoloterial barg tuzilishi va undagi to‘g‘imalarning joylanishi.

4 – guruhga beriladigan vazifa

1. Radial barg tuzilishi va undagi to‘g‘imalarning joylanishi
2. Barg o‘tkazuvchi sistema tuzilishi

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar

1 – tajriba: - Kameliya bargining ko‘ndalang kesimini (tayyor preparat) mikroskop ostida ko‘rish, dorzoventral bargning yumshoq qismidagi qoziqsimon va bulutsimon to‘g‘imalarni o‘rganish. Bargning tomir o‘tgan qismidagi mexanik va o‘tkazuvchi to‘g‘imalarni aniqlash, rasmini chizib, nomlarini yozish.

2 – tajriba: - Qarag‘ay bargining radial tuzilishi. qarag‘ay bargini ko‘ndalangiga kesib, vaqtinchalik preparat tayyorlash va quyidagi to‘g‘imalarni o‘rganish:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a) kutikula | j) endoderma |
| b) epidermis | z) peretsikl |
| v) og‘izcha | i) yopiq kollateral bog‘lam |
| g) gipoderma | l) sklerenxima |
| d) chokli parenxima | k) asosiy to‘g‘ima |
| e) smola yo‘llari | |

3 – tajriba: - Qarag‘ay bargining ko‘ndalang kesimini tayyor preparatda ko‘rib, bargning radial tuzilishini o‘rganish

4 – tajriba: - Sambitgul, sho‘ra bargini kesib, preparat tayyorlang. Ustunsimon, bulutsimon to‘g‘imalarning joylanishiga qarab izoloterial barg tuzilishini o‘rganish. Bargning orqa tomonidagi chu‘urchalarga joylashgan og‘izcha va tukchalarni toping.

Topshiriq: Dorzoventral, izolateral va radial barglarda to‘g‘imalarning joylanishini rasmini chizib, qismlarini nomlarini yozing.

Laboratoriya mashg‘ulot – 11

Mavzu: “O‘tli o‘simliklar poyasining ichki tuzilishi”

1. Darsning maqsadi:

Gulli o‘simliklarning har qanday poyasi uchidagi kurtak bilan o‘sadi. Kurtakning uchida o‘shish nuqtasi yoki konus bo‘ladi. O‘shish konusining birlamchi meristemasidan hosil bo‘lgan hujayralar poyaning birlamchi tuzilishini hosil qiladi. Bir pallali o‘simliklar poyasi tashqi tomondan epidermis bilan qoplangan. Epidermis ostida bir necha qavat mexanik to‘g‘ima – sklerenxima, sklerenxima ostida asosiy parenxima joylashgan. Asosiy parenxima hujayralarining oralarida yopiq tolali nay bog‘lamlari bo‘lib, ular tartibsiz joylashgan.

Ikki pallali o'simliklarning poyasi birlamchi yo'g'onlashgach, prokambiyning bir qismidan kambiy hosil bo'ladi, natijada ularda ikkilamchi yo'g'onlashish boshlanadi. Epiderma ostida kollennxima va po'stloq parenximasini bo'lib, po'stloqda ba'zan sklerennxima ham kuzatiladi. Poyaning o'rtasiga yaqin joylashgan parenxima hujayralarida ochiq kollateral o'tkazuvchi bog'lama aylana bo'ylab, bir sathda joylashadi.

2. Darsning vazifasi:

O'tli o'simliklar poyasidagi to'g'imalarning joylanishi, ularning vazifasi, bir va ikki pallali o'simlik poyalarining ichki tuzilishidagi farqlarni o'rganish.

TEZKOR SO'ROV UCHUN SAVOLLAR

1. O'tli o'simliklarning poyasida qanday qoplovchi to'g'imalar mavjud
2. O'tli o'simliklar poyasida hosil qiluvchi to'g'ima turlari va vazifalari
3. Bir pallali o'simliklar o'tkazuvchi to'g'ima bog'lamlarining ikki pallalilarnikidan farqi
4. Bir pallali o'simliklar poyasining ichki tuzilishi
5. Ikki pallali o'simliklar poyasining birlamchi tuzilishi
6. Ikki pallali o'simliklar poyasining ikkilamchi tuzilishi

Blits o'yin

Guruh bahosi	Guruh xatosi	To'g'ri javob	YAkka xato	YAkka baho	Guruh ichidan chetlatish	Ikki pallali o'tli o'simlik poyalarining ichki tuzilishi
						<ol style="list-style-type: none"> 1. Kollennxima asosan epidermis ostida, sklerennxima esa poyaning marka-ziga yaqinroq halqasimon yoki bo'lak-bo'lak bo'lib joylashadi. 2. Birlamchi po'soq asosan xlorofill donachalari bo'lgan parenxima to'g'imalardan tashkil topgan. 3. Endoderмага yaqin turgan peretsikldan boshlab, markaziy silindr boshlanadi. 4. Uning tarkibiga mexanik to'g'ima – kollennxima va sklerennximalar kiradi. 5. Ikki pallali o'simliklarda poya – epidermis birlamchi po'stloq, marka-ziy silindrga bo'linadi. 6. Birlamchi po'stloqning markazga yaqin qismi endoderma deb ataladi. 7. O'tkazuvchi bog'lamlar

						<p>ochiq kollateral tipda bo‘ladi.</p> <p>8. Peretsikldan markazga harab floema va ksilema orasida kambiy bo‘lgan o‘tkazuvchi bog‘lamlar joylashgan.</p> <p>9. Peretsikldan ko‘pchilik o‘simliklarda qo‘shimcha ildiz va kurtak hamda ikkilamchi meristema hosil bo‘ladi.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Bumerang metodi

1 – guruhga beriladigan vazifa

1. Poyaning ichki tuzilishida meristema hujayralarining vazifasi
2. O‘tli o‘simliklar poyasida qanday qoplovchi to‘g‘imalar mavjud

2 – guruhga beriladigan vazifa

1. Bir pallali o‘simliklar poyasining ichki tuzilishi
2. Bir pallali o‘simliklar o‘tkazuvchi to‘g‘ima bog‘lamlarining ikki pallalilarnikidan farqi

3 – guruhga beriladigan vazifa

1. Ikki pallali o‘simliklar poyasining birlamchi tuzilishi
2. Ikki pallali o‘simliklar poyasining bir pallali o‘simliklar poyasining anatomik tuzilishidagi farqi

4 – guruhga beriladigan vazifa

1. Ikki pallali o‘tli o‘simliklar poyasining ikkilamchi tuzilishi
2. Poyaning ichki tuzilishida, yo‘g‘onlashishida kambiy hujayralarining vazifasi

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar

1 – tajriba: - Makkajo‘xori poyasidan ko‘ndalang kesik tayyorlab, unga safranin eritmasidan tomiziladi. Bunda kollateral bog‘lamni, ya‘ni ksilemaning bir tomonida floema joylashgan bo‘lib, yopiq bog‘lam ekanligi kuzatiladi. Bir pallali o‘simlikda o‘tkazuvchi to‘qma bog‘lamlari tartibsiz joylashgan bo‘ladi.

2 – tajriba: - Ikki pallali o‘simlikni poyasi, oshqovoqdan ko‘ndalang kesik tayyorlab, unga safranin reaktividan tomizib, mikroskopda ko‘riladi va o‘tkazuvchi to‘g‘ima bog‘lamlari bikollateral tipda tuzilganligi aniqlanadi. Bunda ksilemaning har ikki tomonida floema joylashgan bo‘lib, kambiy borligi uchun ochiq bog‘lamligi kuzatiladi. Ikki pallali o‘simliklarni o‘tkazuvchi to‘g‘ima bog‘lamlari tartibli joylashganini ko‘riladi.

3 – tajriba: - Ikki pallali o‘simlikni poyasidan kesik tayyorlab, floema va ksilema bog‘lam shaklida bo‘lmay, balki tutash, ya‘ni aylana shaklida joylashganini ko‘rish.

Topshiriq: - Bir va ikki pallali o‘tli o‘simlik poyalarida to‘g‘imalarning joylanishini rasmini chizib, qismlarini yozing. Bog‘lamsiz poya tuzilishining rasmini chizib, nomini yozing.

Mavzu: “Yog‘ochli o‘simliklar poyasining anatomik tuzilishi”

1. Darsning maqsadi:

Yog‘ochli o‘simliklar poyasi 3 qismga bo‘linadi: po‘stloq, yog‘ochlik va o‘zak. Daraxtlar poyasining ustki tomoni periderma bilan qoplangan. Daraxtning po‘stloq qismi ikkiga bo‘linadi: birlamchi po‘stloq unga peridermadan ikkilamchi floemagacha bo‘lgan to‘g‘imalar kiradi. Bu to‘g‘imalar - kollenxima, oziq moddalar to‘plovchi asosiy to‘g‘imalar, peretsikl qoldig‘i va birlamchi floemadan iborat. Ikkilamchi po‘stloqqa ikkilamchi floema elementlari va o‘zak nur hujayrasi kiradi. Po‘stloq bilan yog‘ochlikni kambiy chegaralab turadi.

Yog‘ochlik qismida o‘tkazuvchi to‘g‘ima har xil naycha va traxeidlardan iborat. YOg‘ochlik parenximasida oziqli moddalar to‘planadi. O‘zak nur hujayralari poyada radius bo‘ylab joylashgani uchun, radial nurlar deb ham ataladi.

Daraxtli o‘simliklarning eniga yo‘g‘onlashuvi kambiy faoliyatiga bog‘liq. O‘zak qismi poyaning markazida joylashgan bo‘lib, uning hujayralari har xil moddalar - oshlovchi moddalar ta‘sirida qoramtir, sariq, qo‘ng‘ir tusga kiradi.

2. Darsning vazifasi:

Daraxtli o‘simliklar poyasidagi to‘g‘imalarning joylanishini, vazifalarini, poyalarning eniga yo‘g‘onlashuvi kambiy faoliyatini o‘rganish.

TEZKOR SO‘ROV UCHUN SAVOLLAR

1. Ikkilamchi qoplovchi to‘g‘ima – periderma va uning tuzilishi
2. Daraxtsimon o‘simliklar poyasining ichki tuzilishidagi qismlari
3. Birlamchi po‘stloqdagi to‘g‘imalar va ularning vazifasi
4. Ikkilamchi po‘stloqdagi to‘g‘imalar va ularning vazifasi
5. Ikilamchi yog‘ochlikdagi to‘g‘imalar va ularning tuzilishi
6. O‘simlik poyasining yo‘g‘onlashuvida kambiy faoliyati
7. Yillik halqaning hosil bo‘lishi
8. YOg‘ochlik yarosi tarkibi va vazifasi
9. Nina bargli o‘simliklar poyasining ichki tuzilishi

5. Metod - Vertushka

№	YOg‘ochli o‘simliklar poyasidagi hujayralar	Peri-derma	Bir-lamchi po‘stloq	Ikki-lamchi po‘stloq	Ikki-lamchi yog‘ochlik	Birlamchi yog‘ochlik	O‘zak
1	Epiderma qoldiqlari						
2	Kollenxima						
3	Sklerenxima – lib-riform						
4	O‘zak nur hujayra-lari (birlamchi)						
5	YOg‘ochlik yadrosi						
6	Birlamchi floema						
7	Yirik suv naychalari						
8	Radial nurlar						

10	Ikkilamchi lub						
11	Prokambiy qoldiqlari						
12	Fellema, fellogen,						
13	felloderma						
14	Kuzgi yog'ochlik						
15	Po'stloq parenximasi						
16	Floema tolasi						
	Bahorgi yog'ochlik (yillik halqa)						
	Ikkilamchi nur hujayralari						

Blits o'yin

Guruh bahosi	Guruh xatosi	To'g'ri javob	Yakka xato	Yakka baho	Guruh ichidan chetlatish	YOg'ochli o'simliklar poyasining ichki tuzilishi
						<p>1. Birlamchi po'stloqda peretsikl qoldiqlari, oziq modda to'plovchi pa-renxima hujayralari, birlamchi floema hujayralari bo'ladi.</p> <p>2. Bahorda kambiy hujayralari ichkariga harab, bo'linib, yog'ochlikning yirik suv kanalchalarini hosil qiladi.</p> <p>3. Ikkilamchi yog'ochlikda har xil naychalar va tra-xeidlardan, oziq moddalar to'plovchi yog'ochlik parenximasidan iborat.</p> <p>4. Po'stloq qism ikkiga bo'linadi: birlamchi po'st-loq va ikkilamchi po'stloq</p> <p>5. Daraxtsimon o'simliklar poyasining ko'ndalang kesimi 3 qismdan iborat: po'stloq, yog'ochlik, o'zak.</p> <p>6. Hosil bo'lgan bu yirik suv naychalar kuzdagi mayda hujayralardan farq qilib, yillik halqani hosil qiladi.</p> <p>7. Ikkilamchi yog'ochlikda joylashgan mexanik to'qi-ma vazifasini bajaruvchi sklerenxima libri-form deb</p>

						<p>ataladi.</p> <p>8. Daraxtlar poyasining ustki tomoni periderma bilan qoplangan.</p> <p>9. O‘zak nurlari yirik parenxima hujayralardan iborat bo‘lib, poyada ra-dius bo‘ylab joylashgan.</p> <p>10. Ikkilamchi po‘stloqda ikkilamchi foema elementlari va o‘zak nur hujayralari joylashgan</p> <p>11. Po‘stloq bilan yog‘ochlikni kambiy chegaralab turadi.</p>
--	--	--	--	--	--	---

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar

- 1 – tajriba: - Ko‘p yillik tok o‘simligining novdasidan kesma tayyorlab, yog‘ochlik qismini safranin eritmasi bilan bo‘yab to‘g‘imalarni joylanishini aniqlang
- 2 – tajriba: - Lipa daraxtining novdasidan tayyorlangan tayyor preparatni ko‘rib, to‘g‘imalarni joylanishini aniqlang:
- a) peridermadagi fellema, fellogen, fellodermanni kuzating
 - b) birlamchi po‘stloqni chegarasini kuzating
 - v) ikkilamchi to‘g‘imadagi floema elementlarini kuzatib, o‘zak nur hujayrasini ajrating
 - g) kambiyini o‘rganish
 - d) yog‘ochlikda joylashgan mayda va yirik suv kanalini kuzatib, yillik halqalarini sanash
 - e) o‘zakdagi hujayralarni o‘rganish
- 3 – tajriba: - Qarag‘ay poyasidagi smola yo‘llari, po‘stloq va yog‘ochlik qismidagi to‘g‘imalar bilan tanishish.

Topshiriq: - YOg‘ochli poyaning ichki tuzilishidagi to‘g‘imalarni o‘rganib, rasmini chizish.

Laboratoriya mashg‘ulot– 13, 14

Mavzu: «Mustaqil amaliy mashg‘ulot. Fiksirlangan materialdan foydalanib, yuksak o‘simliklarning organlarining anatomik tuzilishi orqali aniqlash»

1. Darsning maqsadi:

Talabalar amaliy mashg'ulot davomida olgan bilimlarini yanada mustahkamlash maqsadida quyidagi mashg'ulot o'tkaziladi. O'simlik organlarining aniqlash kalitidan foydalanib, to'g'imalarning joylanishini o'rganish xolda o'simlik organlarini (ildiz, poya, barg) va sinfini (bir, ikki pallali) aniqlaydilar.

2. Darsning vazifasi:

Yuksak o'simliklar organlaridan kesik tayyorlash, kesiklardagi to'g'imalarning joylanishini o'rganish va o'simlik organlarini va sinfini aniqlash.

3. O'quv jarayonining mazmuni:

1. Ildiz zonalari
2. Birlamchi ildiz tuzilishi
3. So'ruvchi zonasining ko'ndalang kesimi:
 - a) epiblema b) birlamchi po'stloq qismi
 - v) markaziy silindr tuzilishi
4. Ikkilamchi ildiz tuzilishi
5. Ildizmevalarning ichki tuzilishi
6. Ko'p yillik daraxtlarning ildizining tuzilishi
7. Bargning ichki tuzilishi
8. Bargdagi assimilyatsion to'g'ima turlari
9. Bir pallali o'simliklar poyasining ichki tuzilishi
10. Ikki pallali o'simliklar poyasining ichki tuzilishi
11. Ikki pallali o'tli o'simliklar poyasida o'tkazuvchi to'g'imalarni bog'lamsiz tuzilishi
12. Ildizpoyadagi bog'lamlarning turlari va joylanishi

4. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita, usul, nazorat, baholash)

- a) Darsning turi – suhbat
- b) Metod – Bumerang, Vertushka
- v) Forma (shakl) – guruh
- g) Vosita – doska, tablitsa, tarqatma material, fiksirlangan material
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko'rish)
- j) Baholash – o'z – o'zini, va umumiy baholash

5. Metod – Vertushka Vertushka metodi.

№	To'qimalar	hosil qiluvchi	qoplovchi	Mexanik	O'tkazuvchi	Asosiy	CHiharuvchi
1	Periderma						
2	Peritsikl						
3	Sxizogen yo'llar						
4	Fellogen						
5	Sklerenxima						
6	Assimilyatsion to'g'ima						

7	Kambiy						
8	Floema						
9	Qobiq						
10	Lizigen						
11	Prokambiy						
12	Gidatodlar						
13	Epidermis						
14	Ksilema						
15	Kollenxima						
16	g'amlovchi parenxima						
17	Bezli tuklar, o'smalar						
18	Sklereid						

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar.

Har bir talabaga shisha idishga solingan o'simliklarni vegetativ organlari beriladi. Berilgan o'simliklarning bittasini olib, lezviya bilan kundalangiga bir necha marta yupqa kesik tayyorlang.

Preparatingizni yog'ochli qismini safranin reaktivi bilan bo'yang. Natijada sklerenxima, suv kanallari va yog'ochlangan hujayralar qizil ranga bo'yaladi. Preparatingizni ikkinchisiga Sudan III tomizing. Natijada probka, kutikula qizqish ranga bo'yaladi. Uchinchi preparatingizga xlor – sink-yod eritmasini tomizsangiz, klechatka va kraxmal ko'kintir – binafsha tusga kiradi. Uch xil bo'yalgan preparatingizdagi to'g'imalarning joylanishini aniqlang va xarakterli belgilarini aniqlab, plan va tablitsadan foydalanib, preparatingizni o'simlikning qaysi organi va qaysi sinfga mansub ekanligini quyidagi kaliy orqali aniqlang:

O'simliklarning ko'ndalang kesigidan ichki tuzilishini aniqlaydigan kalit.

Topshiriq: 1) Kesiklarni tayyorlab mikroskoid ko'riladi va qaysi organ ekanligi aniqlanadi.

2) Preparatlar rasmlari ishlanib, o'qituvchi tomonidan tekshirib, baholanadi.

Laboratoriya mashg'ulot-15

Mavzu: "Vegetativ organlar morfologiyasi. Ildiz morfologiyasi"

1. Darsning maqsadi:

O'simlikning ildizi, poyasi, bargi vegetativ organi hisoblanadi. Vegetativ organlari bir yillik o'simliklarda ko'pincha urug'ning unib chiqishidan boshlanib va yangi urug'ning paydo bo'lishi bilan tugaydi. Ildiz o'simlikning muhim vegetativ organlaridan biri bo'lib, quyidagi vazifalarni bajaradi:

- tuproqdan suv va unda erigan mineral organik moddalarni so'rish
- o'simlik tanasini tuproqda mustahkam tutib turadi
- ildizda oziq moddalar to'playdi
- vegetativ ko'payish uchun xizmat qiladi
- ildiz tuproqda mikroorganizmlar bilan aloqada bo'ladi.

Ildizlar kelib chiqishiga ko‘ra asosiy, yon va qo‘shimcha ildizlarga, tashqi ko‘rinishidan o‘q ildiz va popuk ildizga bo‘linadi.

2. Darsning vazifasi:

O‘simlikning vegetativ organlari – ildiz tuzilishi, xilma-xilligi, vazifalari, shakl o‘zgarishini o‘rganish. Vegetativ organlarning biologik va xo‘jalikdagi ahamiyatini o‘rganish.

3. O‘quv jarayonining mazmuni.

1. O‘simlikning vegetativ organlari
2. Ildizning asosiy vazifalari
3. Ildizning kelib chiqishiga ko‘ra xillari
4. Ildizning tashqi ko‘rinishiga qarab xillari
5. SHakli o‘zgargan ildizlar va ularning vazifasi

4. O‘quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita, usul, nazorat, baholash)

- a) Darsning turi - suhbat
- b) Metod – F.S.M.U, Vertushka, Bumerang
- v) Forma – (shakl) guruh
- g) Vosita – doska, tarqatma material, tablitsa, gerbariy
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko‘rish)
- j) Baholash – o‘z-o‘zini va umumiy baholash

5. Metod – F.S.M.U, Vertushka, Bumerang

F.S.M.U. – texnologiyasi

Mavzu: Ildiz va uning xillari

F – fikringizni bayon eting

S – fikringiz bayoniga sabab ko‘rsating

M – ko‘rsatgan sababingizni isbotlovchi dalil ko‘rsating

U – fikringizni umumlashtiring

Bu metodni o‘tkazish uchun, talabalarni kichik guruhlariga bo‘lamiz va bitta guruh fikr va dalillarini to‘rtta bosqich bilan yozma yoki og‘zaki namoyon qiladi.

Trening oxirida o‘qituvchi tomonidan fikrlar umumlashtiriladi.

F – Ildiz – vegetativ organ

S – Ildiz ko‘payish organi, suv va unda erigan moddalarni so‘rish, o‘simlikni mustaham tutadi.

M – havo ildizlar, o‘simliklar poyasidan ildizlar chiqib havoda osilib turadi, bunday ildizlar havoda suv bug‘larini o‘zlashtirish xususiyatiga ega.

Vertushka metodi

Bu treningda 3 ta yoki 5 ta guruhga material tarqatiladi va har bir guruh yakka holda belgilaydi. Keyin bu material guruhlariga aralashtirib beriladi, yana belgilanadi, 3 yoki 5 marta aylangandan keyin o‘qituvchi va talabalar bilan umumiy to‘g‘ri javob o‘rtoqlashiladi.

№	SHakli o‘zgargan ildizlar	Ildiz-	Ildiz –	Tayanch	So‘rg‘ich	Havo
---	---------------------------	--------	---------	---------	-----------	------

		mevalar	tugunaklar	ildizlar	ildiz	ildizlari
1	Parazit o'simliklarda xlorofill donachalari bo'lmaganligi uchun ular boshqa o'simliklardagi oziq moddalar hisobiga yashaydi					
2	Yon va qo'shimcha ildizlar o'zida zapas oziq moddalar to'playdi					
3	O'simlik poyasidan ildiz-lar chiqib, havoda osilib turadi va bu ildizlar havodagi suv bug'larini o'zlashtiradi					
4	Asosiy ildiz shaklini o'zgartirib yo'g'onlashadi va o'zida zapas oziq moddalar to'playdi					
5	Poyadan chiqqan qo'shimcha ildizlar uni tik tutib turishiga yordam beradi.					

Vertushka metodi

Bu treningda 3 ta yoki 5 ta guruhga material tarqatiladi va har bir guruh yakka holda belgilaydi. Keyin bu material guruhlarga aralashtirib beriladi, yana belgilanadi, 3 yoki 5 marta aylangandan keyin o'qituvchi va talabalar bilan umumiy to'g'ri javob o'rtoqlashiladi.

№	Poyaning shoxlanish turlari	Monopodial	Simpodial	Dixotomik	Soxta dixotomik	To'planish
1	Asosiy poyadagi uchki kurtak ma'lum vaqtdan so'ng o'sishdan to'xtaydi, uchki kurtak tikancha yoki jingalakka aylanadi, uning ostidagi yon kurtak esa o'sishni davom ettiradi					
2	Poyaning uchki kurtagi o'simlik nobud bo'lguncha o'sishni davom ettira-veradi. Uning yon kurtak-laridan yon novdalar ham hosil bo'lib turadi. O'simlikni asosiy poyasi yo'g'onlashadi					
3	Novdaning uchki kurtagi o'sishdan to'xtab, gulga aylanadi, uning ostida harama-harshi joylash-gan kurtak esa o'sib, ikkita novda hosil qila-di.					

4	Poya ma'lum bir miqdorda o'sgach, uchki qismi ikkiga bo'linadi, keyinroq birining uchi yana ikkiga bo'linib ketadi					
5	G'allasimon o'simliklar-da er osti va er ustki bo'g'imlaridan bir qancha qo'shimcha ildizlar hosil qiladi, ularning ba'zi birlari bo'g'imli novda-lar hosil qiladi.					

Bumerang metodi

1 - guruhga beriladigan vazifa

1. Poya vegetativ organ va uning vazifasi
2. Poyaning tuzilishi va o'sishi qanday

2 - guruhga beriladigan vazifa

1. O'simliklar turiga qarab, poyaning shakllari
2. Tabiatning tashqi muhitiga moslashgan poyaning xillari

3 - guruhga beriladigan vazifa

1. Poyaning shoxlanish xillari
2. Poyaning shoxlanish xillarini ta'riflang

4 - guruhga beriladigan vazifa

1. Er osti shakli o'zgargan poyalar
2. Er ustki shakli o'zgargan poyalar

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar.

- 1 – tajriba: - Bir pallali o'simliklar uchun xos bo'lgan sochma ildizni bug'doy, arpa makkajo'xori o'simligi gerbariyidan qo'shimcha va yon ildizlarni lupa orqali ko'rib, ularning tuzilishiga e'tibor berish
- 2 – tajriba: - Ikki pallali o'simliklar uchun xos bo'lgan o'q ildizni qovoq o'simligi gerbariyidan asosiy, qo'shimcha, yon ildizlarni tuzilishini o'rganish
- 3 – tajriba: - Tablitsadan foydalanib, shakli o'zgargan ildizlar – ildizmeva, ildiztugunaklarni tuzilishini o'rganish
- 4 – tajriba: - Poyalarning shakli va o'sishiga qarab xillarini tablitsa va gerbariy va gerbariydan foydalanib o'rganish
- 5 – tajriba: - Tablitsa va gerbariydan foydalangan holda, shakli o'zgargan poyalarni o'rganish

Topshiriq: - Ildiz va poyalarning xillari, va metamorfozlarni rasmini chizib, nomlarini yozish

Mavzu: “Vegetativ organlar morfologiyasi. Poya morfologiyasi”

1. Darsning maqsadi:

Poya o‘simlikning er ustidagi bargsiz, kurtaksiz qismi bo‘lib, bargni ildiz bilan bog‘laydi. Uning vazifasi suv va unda erigan mineral moddalarni ildizdan bargga etkazish hamda bargda hosil bo‘lgan organik moddalarni ildizga o‘tkazishdan iborat. Bargli poya novda deb ataladi. Barglarning poyaga birikkan joyida odatda kichik bo‘rtmalar xosil bo‘ladi, ular poya bo‘g‘imlari deb ataladi. Bir bo‘g‘im bilan ikkinchi bo‘g‘im orasidagi masofa bo‘g‘im orlig‘i deb ataladi. Novda o‘qi bilan barg orasida hosil bo‘ladigan burchak barg qo‘ltig‘i deb ataladi. Har bir novda uchki kurtakdan rivojlanadi. Uchki kurtak poyaning bo‘g‘imlar oralig‘i qisqargan va bir – biri ustiga cherepitsa singari mingyashgan barg boshlang‘ichlari bilan qoplangan boshlang‘ich murtagidir. Uchki kurtakning boshlang‘ich barglari birinchi meristemadan iborat va u poyaning o‘sish konusi deb ataladigan konus shaklidagi uchki qismini himoya qiladi. Poyaning o‘sish konusi asosida boshlag‘ich bargning kichik do‘mboqchalari bo‘ladi. Birlamchi do‘mboqchalar qo‘ltig‘ida ikkilamchi do‘mboqchalar joylashgan bo‘lib, bulardan keyinchalik novdani qo‘ltiq kurtaklar vujudga keladi. Uchki va yon kurtaklar sovuq tushishi bilan tinim xolatiga o‘tadi, bunday kurtaklar qishlovchi kurtaklar deb ataladi. Qo‘shimcha kurtaklar ham bo‘ladi. Ular ildiz va poyalarda muayyan morfologik qonuniyatdan qat’iy nazar joylashadi.

2. Darsning vazifasi:

O‘simlikning vegetativ organlari –poyaning tuzilishi, xilma-xilligi, vazifalari, shakl o‘zgarishini o‘rganish. Vegetativ organlarning biologik va xo‘jalikdagi ahamiyatini o‘rganish.

3. O‘quv jarayonining mazmuni.

1. Poyaning asosiy vazifasi
2. Poyaning tuzilishi va o‘sishi
3. Poyaning shakllari
4. O‘sishiga qarab poyaning xilma – xilligi
5. Poyaning shoxlanish xillari
6. O‘simliklarning hayotiy formasi (daraxt, buta, chala buta, o‘t o‘simlik)
7. Qiyofasini o‘zgartirgan er ustki va er ostki poyalar

4. O‘quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita, usul, nazorat, baholash)

- a) Darsning turi - suhbat
- b) Metod – F.S.M.U, Vertushka, Bumerang
- v) Forma – (shakl) guruh
- g) Vosita – doska, tarqatma material, tablitsa, gerbariy
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko‘rish)
- j) Baholash – o‘z-o‘zini va umumiy baholash

5. Metod – F.S.M.U, Vertushka, Bumerang

F.S.M.U. – texnologiyasi

Mavzu: Ildiz va uning xillari

F – fikringizni bayon eting

- S – fikringiz bayoniga sabab ko‘rsating
 M – ko‘rsatgan sababingizni isbotlovchi dalil ko‘rsating
 U – fikringizni umumlashtiring

Bu metodni o‘tkazish uchun, talabalarni kichik guruhlariga bo‘lamiz va bitta guruh fikr va dalillarini to‘rtta bosqich bilan yozma yoki og‘zaki namoyon qiladi. Trening oxirida o‘qituvchi tomonidan fikrlar umumlashtiriladi.

- F – Ildiz – vegetativ organ
 S – Ildiz ko‘payish organi, suv va unda erigan moddalarni so‘rish, o‘simlikni mustaham tutadi.
 M – havo ildizlar, o‘simliklar poyasidan ildizlar chiqib havoda osilib turadi, bunday ildizlar havoda suv bug‘larini o‘zlashtirish xususiyatiga ega.

Vertushka metodi

Bu treningda 3 ta yoki 5 ta guruhga material tarqatiladi va har bir guruh yakka holda belgilaydi. Keyin bu material guruhlariga aralashtirib beriladi, yana belgilanadi, 3 yoki 5 marta aylangandan keyin o‘qituvchi va talabalar bilan umumiy to‘g‘ri javob o‘rtoqlashiladi.

№	Poyaning shoxlanish turlari	Monopodial	Simpodial	Dixotomik	Soxta dixotomik	To‘planish
1	Asosiy poyadagi uchki kurtak ma’lum vaqtdan so‘ng o‘shidan to‘xtaydi, uchki kurtak tikancha yoki jingalakka aylanadi, uning ostidagi yon kurtak esa o‘shini davom ettiradi					
2	Poyaning uchki kurtagi o‘simlik nobud bo‘lguncha o‘shini davom ettira-veradi. Uning yon kurtak-laridan yon novdalar ham hosil bo‘lib turadi. O‘simlikni asosiy poyasi yo‘g‘onlashadi					
3	Novdaning uchki kurtagi o‘shidan to‘xtab, gulga aylanadi, uning ostida harama-harshi joylash-gan kurtak esa o‘sib, ikkita novda hosil qila-di.					
4	Poya ma’lum bir miqdorda o‘sgach, uchki qismi ikkiga bo‘linadi, keyinroq birining uchi yana ikkiga bo‘linib ketadi					
5	G‘allasimon o‘simliklar-da er osti va er ustki					

	bo'g'imlaridan bir qancha qo'shimcha ildizlar hosil qiladi, ularning ba'zi birlari bo'g'imli novda-lar hosil qiladi.					
--	--	--	--	--	--	--

Bumerang metodi

1 - guruhga beriladigan vazifa

3. Poya vegetativ organ va uning vazifasi
4. Poyaning tuzilishi va o'sishi qanday

2 - guruhga beriladigan vazifa

3. O'simliklar turiga qarab, poyaning shakllari
4. Tabiatning tashqi muhitiga moslashgan poyaning xillari

3 - guruhga beriladigan vazifa

3. Poyaning shoxlanish xillari
4. Poyaning shoxlanish xillarini ta'riflang

4 - guruhga beriladigan vazifa

3. Er osti shakli o'zgargan poyalar
4. Er ustki shakli o'zgargan poyalar

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar.

- 1 – tajriba: - Bir pallali o'simliklar uchun xos bo'lgan sochma ildizni bug'doy, arpa makkajo'xori o'simligi gerbariyidan qo'shimcha va yon ildizlarni lupa orqali ko'rib, ularning tuzilishiga e'tibor berish
- 2 – tajriba: - Ikki pallali o'simliklar uchun xos bo'lgan o'q ildizni qovoq o'simligi gerbariyidan asosiy, qo'shimcha, yon ildizlarni tuzilishini o'rganish
- 3 – tajriba: - Tablitsadan foydalanib, shakli o'zgargan ildizlar – ildizmeva, ildiztugunaklarni tuzilishini o'rganish
- 4 – tajriba: - Poyalarning shakli va o'sishiga qarab xillarini tablitsa va gerbariy va gerbariydan foydalanib o'rganish
- 5 – tajriba: - Tablitsa va gerbariydan foydalangan holda, shakli o'zgargan poyalarni o'rganish

Topshiriq: - Ildiz va poyalarning xillari, va metamorfozlarni rasmini chizib, nomlarini yozish

Laboratoriya mashg'ulot – 17

Mavzu: “Barg morfologiyasi”

1. Darsning maqsadi:

Barg o‘simliklarning asosiy vegetativ organi, quyidagi vazifalarni bajaradi:

- a) barg organik moddalar hosil qiladi
- b) barg suvni bug‘lantirib, transpiratsiya vazifasini bajaradi
- v) barg orqali o‘simlik nafas oladi
- g) o‘simliklarning tashqi sharoitga moslashish organi bo‘lib xizmat qiladi
- d) barglar to‘kilib o‘simlik hayotini saqlab qoladi
- e) zapas oziq moddalar to‘playdi.

O‘simliklarning barglari shakli jihatidan xilma – xil bo‘lishiga qaramay, ikki gruppaga – oddiy va murakkab barglarga bo‘lib o‘rganiladi. Oddiy bargda bitta barg bandida bitta barg plastinkasi joylashadi. Oddiy barglarning shakli, uchining tuzilishi, tomirlanishi va qirralari xilma – xil tuzilgan bo‘ladi. Murakkab barglar – barg bandida bir nechta barg plastinkasi bo‘lgan barglarga aytiladi. Barg bajaradigan funktsiyasiga qarab o‘z shaklini o‘zgartirishi mumkin.

2. Darsning vazifasi:

Bargning tashqi tuzilishi, barg qirralari, tomirlanish, qirqilishi, barglarning poyada joylashishi, barg metamorfozini o‘rganish

3. O‘quv jarayonining mazmuni

Barg qanday vazifalarni bajaradi
To‘liq barg to‘liqsiz bargdan nima bilan farq qiladi.
Barglarning morfologik tuzilishi
Oddiy barg formalari
Barg qirralari xilma-xilligi
Barg plastinkasining qirqilishiga qarab xillari
Barg plastinkasining tomirlanishi
Barglarning katta – kichikligi va yashovchanligi
Barglarning novdalarda joylashishi
SHakli o‘zgargan barglar (barg metamorfozi)

4. O‘quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita, usul, nazorat, baholash)

- a) Darsning turi - suhbat
- b) Metod – Vertushka, Bumerang
- v) Forma – (shakl) guruh
- g) Vosita – doska, tarqatma material, tablitsa, gerbariy
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko‘rish)
- j) Baholash – o‘z-o‘zini va umumiy baholash

5. Metod – Vertushka, Bumerang

Vertushka metodi

Bu treningda 3 ta yoki 5 ta guruhga material tarqatiladi va har bir guruh yakka holda belgilaydi. Keyin bu material guruhlarga aralashtirib beriladi, yana belgilanadi, 3 yoki 5 marta aylangandan keyin o'qituvchi va talabalar bilan umumiy to'g'ri javob o'rtoqlashiladi.

№	Barg tomirlanishi	yoysimon	parallel	to'rsimon	patsimon	barmoqsimon
1	Bir xil yo'nalishdagi tomirlar boshlanish va tugallanish joylarida birlashsa					
2	Bir xil yo'nalishdagi tomirlar tutashmasa					
3	Barg tomirlari shoxla-nib ketgan bo'lsa					
4	Barg tomirlari shoxlan-gan bo'lib, barg plas-tinkasi butun bo'lsa					
5	Barg tomirlari shoxlan-gan bo'lib, barg plastin-kasi qirqilgan bo'lsa					
№	Barglarning novdalarda joylashishi	navbat bilan	harama - harshi	xalqa-simon		
1	Novdaning har qaysi bo'limida bir biriga qarab ikkita barg joylashsa					
2	Novdaning har qaysi bo'limidan faqat bittadan barg chiqib, novda bo'ylab pastdan yuqoriga qarab joylashsa					
3	Novda bo'g'imida uch va undan ziyod barglar joylashsa					

Bumerang metodi

1 - guruhga beriladigan vazifa

1. Barg vazifasi nimadan iborat
2. Barg necha qismdan tuzilgan
3. Barg necha xil guruhga bo'linadi.

2 - guruhga beriladigan vazifa

1. Barg shakllari

2. Barg plastinkasining qirralari
3. Barg plastinkasining qirqilishiga qarab xillari

3 - guruhga beriladigan vazifa

2. Barg plastinkasining tomirlanishi
3. Barglarning katta-kichikligi va yashovchanligi
4. Barglarning poyada joylashishi

4 - guruhga beriladigan vazifa

1. Murakkab barg turlari
2. SHakli o'zgargan barglar
3. hashoratxo'r o'simliklar

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar

Dars davomida barg morfologiyasiga oid gerbariyalar va fiksirlangan materiallardan foydalanib

- a) barg plastinkasining shakli
- b) barg qismlarini (to'liq, to'liqsiz)
- v) barg plastinkasining qirralarini
- g) barg plastinkasining qirqilishi (bo'lakli, kesik, ajralgan)
- d) barg tomirlanish turlarini
- e) murakkab barg turlarini
- j) shakli o'zgargan barglar, ularning xilma –xilligi va poyada joylashuvi bilan tanishish

Topshiriq: - Barg morfologiyasiga oid rasmlarni chizib, ularning qismlarini yozish, barg tomirlanishini kuzatib, sinflarga ajratib, rasmini chizing.

Laboratoriya mashg'ulot – 18

Mavzu: Gerbariyga qarab ildiz, poya va barglarning morfologik tuzilishini o'rganish.

1. Darsning maqsadi:

Dars jarayonida talabalar amaliy mashg'ulotlardan olgan bilimlarini yanada mustahkamlash uchun o'simlik vegetativ organlarini (ildiz, poya, barg) gerbariyga qarab, morfologik analiz qilib o'rganadilar.

2. Darsning vazifasi:

Gerbariydan foydalanib o'simliklarning ildiz, poya va barglarining tashqi tuzilishini o'rganadilar.

3. O'quv jarayonining mazmuni:

1. Ildizning asosiy vazifasi

2. Ildizning kelib chiqishiga ko`ra xillari
3. Bir pallali o`simliklarning ildiz sistemasi
4. Ikki pallali o`simliklarning ildiz sistemasi
5. SHakli o`zgargan ildizlar va ularning vazifasi
6. Poyaning shakllari
7. O`shishiga qarab poyaning xilma-xilligi
8. Poyaning shoxlanish xillari
9. O`simliklarning hayotiy formasi (daraxt, buta, chalabuta, o`t o`simlik)
10. Qiyofasini o`zgartirgan er ustki va er ostki poyalar
11. To`liq barg to`liqsiz bargdan nimasi bilan farq qiladi
12. Oddiy barg formalari
13. Barg qirralari xilma-xilligi
14. Barg plastinkasining qirqilishiga qarab xillari
15. Barg plastinkasining tomirlanishi
16. Barglarning katta kichikligi va yashovchanligi
17. Barglarning novdalarda joylashishi
18. SHakli o`zgargan barglar (barg metamorfozi)

4. O`quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma, (shakl), vosita, usul, nazorat, baholash)

- a) Darsning turi – suhbat
- b) Metod – Vertushka
- v) Forma (shakl) – gurux
- g) Vosita – doska, tarqatma material, tablitsa, gerbariy
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko`rish)
- j) Baholash – o`z-o`zini va umumiy baholash

Vertushka metodi

Bu treningda 3 ta yoki 5 ta guruhga material tarqatiladi va har bir gurux yakka holda to`g`ri javobni belgilaydi. Keyin bu materiallar guruhlarga aralashtirilib beriladi, yana belgilanadi, 3 yoki 5 marta aylangandan keyin o`qituvchi va talabalar bilan umumiy va to`g`ri javob o`rtoqlashiladi.

№	Ildiz shakllari	Popuk ildiz	O`q ildiz	Ildiz meva	Ildiz tuganak	Tayanch ildiz
1	Makkajo`xori					
2	Sabzi					
3	Arpa					
4	Yantoq					
5	Sholg`om					
6	Georgin (kartoshka gul)					
7	Batat					

8	G`o`za					
9	Suli					
10	O`rik					

5. Mustaqil ishlash tartibi.

Har bir talaba gerbariy olib, undagi o`simlikning alohida organlarini morfologik tuzilishini sinchiklab tekshirib o`rganadi. O`simliklarning ta`rifini yozishda albatta, ma`lum rejaga rioya etish zarur.

Albomning chap tomoniga o`simlik vegetativ organlarining morfologik tuzilishini ta`rifi yoziladi. Morfologik analizning to`g`riligini talabalar, o`qituvchidan so`rab bilishlari kerak.

Albomning o`ng tomoniga ildiz, poya va barg rasmi chizib, qismlari yozib qo`yiladi.

O`simlik morfologiyasini ta`riflash rejasi:

1. Er osti organi:

a) Ildiz. Ildiz sistemasi tipini aniqlash (o`q ildiz, popuk ildiz) metamorfoz:

b) Ildizpoya. O`shish xususiyatlari (tik yoki yoniga)

v) Piyozbosh. Kattaligi, rangi.

g) Tuganak. SHakli, rangi, kattaligi

2. Poya. Poyaning turlari: yog`ochli, qisman yog`ochli, o`tli.

a) Shakli yumaloq, yumaloq bo`g`imli, uch qirrali, to`rt qirrali, ko`p qirrali, yassi;

b) O`shish yo`nalishi: tik o`suvchi, o`rmlab o`suvchi, ilashib o`suvchi, chirmashib o`suvchi, sudralib o`suvchi va boshqalar;

v) Shoxlanishlar: monopodial, simpodial, dixotomik, soxta dixotomik;

g) Poyaning metamorfozi: gajak, jingalak va tikanlarning necha mm yoki sm ekanligi o`lchab yoziladi.

3. Barg. Oddiy yoki murakkab bargligi aniqlanadi.

Agar oddiy barg bo`lsa:

a) Barg plastinkasining shakliga qarab lentasimon, lantsetsimon, ninasimon, tuxumsimon, teskari tuxumsimon, yumaloq, ellipssimon, panjasimon, yuraksimon, uchburchak, strelkasimon, buyraksimon, duksimon va boshqalar.

b) Tomirlanishi: parallel, yoysimon, to`rsimon, patsimon, panjasimon, yulduzsimon.

v) Barg plastinkasining qirralari: tekis, oddiy tishchali, qo`sh tishchali, arrasimon tishli, o`yiq, ilon izi va boshqalar.

g) Barg qirqilishi: bo`lakli, qirqilgan, ajralgan.

Endi murakkab barglarni ko`rib chiqamiz.

d) Uch bargchali, besh, etti bargchali (panjasimon), toq panjasimon, juft panjasimon. Qolgan qismlari oddiy barg singari aniqlanadi.

e) Barglarning poyalarda joylanishi: ketma-ket, qarama-qarshi va halqasimon.

IV- semestr

Laboratoriya mashg`uloti – 1

Mavzu: Tuban sporali o`simliklar: Suv o`tlari

Darsning maqsadi:

Tuban o'simliklar sodda tuzilgan organizmlar bo'lib, ularning tanasi organlarga bo'linmaydi. Ularning tanasi tallom deb ataladi. Tuban o'simliklar 1 xujayrali, ko'p xujayrali, koloniyali tuzilishga ega. Tuban o'simliklar: - Suv o'tlari-Algae, zamburug'lar – (Mucophyta), Lishayniklarga – (Lichenophyta) va Bakteriyalar (Bacteriophyta) ga klassifikatsiyalanadi. Lekin bakteriyalar bo'limini mikrobiologiya kafedrasida o'rganiladi.

Suv o'tlari Algae – autotrof organizmlar, chunki xujayralarida xlorofill bo'lganligi sababli autotrof oziqlanadi.

Xujayrasidagi xromotaforida turli pigmentlar saqlanadi. Pigmentlarning rangiga qarab, suv o'tlari xilma-xil .

Darsning vazifasi:

Suv o'tlarining tuzilishi, yashash sharoiti, koo'payishi, rivojlanishi, ahamiyati.

O'quv jarayonining mazmuni.

Tuban o'simliklarning xarakterli belgilari, tuzilishi, autotrof, geterotrof oziqlanishi, ko'payishi, rivojlanishi va klassifikatsiyasi

Suv o'tlarining tallomdan ya'ni hujayraviy tuzilishga ega ekanligi

Suv o'tlarining autotrof oziqlanishi

Suv o'tlari hujayralarida turli pigmentlarning bo'lishi

Suv o'tlarida ko'payish xillari (vegetativ, jinssiz, jinsli)

Pigmentlarning xillariga qarab, suv o'tlarining xilma-xilligi

- a) Yashil suv o'tlari – Chloprophyta
- b) Ko'k – yashil suvo'tlari – Cyanophyta
- v) Diatom suv o'tlari – Diatomeae
- g) qizil suv o'tlari – Rhodophyta
- d) qo'nqir suv o'tlari – Rhaeophyta

O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita usul, nazorat, baholash)

- a) Darsning turi – suhbat
- b) Metod: - Bumerang, Vertushka, FSMU.
- v) Forma (shakl) – guruh
- g) Vosita – doska, tarqatma material, tablitsa, tayyor preparat, gerbariy
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko'rish)
- j) Baholash – o'z-o'zini va umumiy baholash

Vertushka metodi

Bu treningda 3 ta yoki 5 ta guruhga material tarqatiladi va xar bir guruh yakka holda belgilaydi. Keyin bu material guruhlarga aralashtirib beriladi, yana belgilanadi, 3 yoki 5 marta aylangandan keyin o'qituvchi va talabalar bilan umumiy to'g'ri javob o'rtoqlashiladi.

№	Suv o'tlari va zamburug'lar	Oddiy (vegetativ)	Jinssiz	Jinsli
---	-----------------------------	-------------------	---------	--------

1	Ostsillatoriya			
2	Vosheriya			
3	Laminariya			
4	Volvoks			
5	Xara			
6	Spirogira			
7	Xlamidomonada			
8	Moqor zamburug'i			
9	Achitqi zamburug'i			
10	Shoxkuya zamburug'i			
11	qorakuya zamburug'i			

Suv o'ti

F – fikringizni bayon eting
S – fikringiz bayoniga sabab ko'rsating
M – ko'rsatgan sababingizni isbotlovchi dalil ko'rsating
U – fikringizni umumlashtiring

Suv o'tlari – tuban sporali o'simliklar va xilma – xilligi

Umumiy vazifa

Kichik guruhlariga bo'lamiz va xar 1 ta guruh fikr va dalillarini 4 ta bosqich bilan yozishadi. Kichik guruhlar yozgan fikrlarini himoya qiladi. Trening – o'qituvchi tomonidan fikrlar umumlashtiriladi.

Masalan 1 ta guruh javobi

F – Suv o'ti – tuban sporali o'simlik – tallomli, xilma –xil turlari ko'p
S – 1 xujayrali, ko'p xujayrali, xromataforlari turlicha
M – Ostsillatoriya, ko'p xujayrali, xromatoforida fikotsian (ko'k yashil) pigmenti bor
U – umumlashtirish

Mustaqil bajarish uchun vazifalar

Ob'ektlarni o'rganish: Suv o'tlari, zamburug'lar, lishayniklar

Ob'ektlar bo'yicha ma'lumotlar

Suv o'tlari – Algae. hayoti suv bilan bog'liq, tanasi tallomdan iborat, xlorofilli o'simliklarga suv o'tlari deyiladi. Suv o'tlari chuchuk va sho'r suvlarda, nam tuproq va zaxkash erlarda uchraydi. Tanasining tuzilishiga qarab, 1 hujayrali, ko'p hujayrali, kolloniyali bo'ladi.

hujayradagi xromatoforlarida pigmentlar saqlaydi. Suv o'tlari ko'k yashil, sariq, qo'ng'ir, qizil rangda bo'ladi. Lekin hamma suv o'tlarida xlorofill mavjud bo'ladi. Suv o'tlari vegetativ, jinssiz, jinsli yo'l bilan ko'payadi.

Ko'k – yashil suvo'tlari – Cyanophyceae bo'limi tanasining tuzilishi jihatidan bir hujayrali yoki koloniyali bo'lib yashaydigan organizmlar. Bu o'simliklarga yashil rang beruvchi xlorofill va ko'k rang beruvchi fikotsian pigmentlar bo'ladi. Ularda yaxlit yadro bo'lmasdan, sochilgan xolatda yadro moddasi bo'ladi. Oddiy bo'linish yo'li bilan ko'payadi. Noqulay sharoitga tushganda spora xosil qiladi.

Ko'k – yashil suvo'tlarini o'rganish uchun – ipsimon tuzilishga ega bo'lgan Ostsillatoriya (ossillatoria), Lingbiya (Lyngbia), koloniyalilarga nostok (Noctok) suvo'tlari kiradi.

Yashil suv o'tlari - Chlorophyceae bo'limi tanasining tuzilishida xlorofill pigmenti bo'lib, ular bir hujayrali, koloniyali bo'lib yashaydigan organizmlar. Yashil suv o'tlari vegetativ, jinssiz va noqulay sharoit tug'ilganda jinsli yo'l bilan, ya'ni koopulyatsiya va kon'yugatsiya usulida ko'payadi.

Yashil suv o'tlari 3 sinfga bo'linadi.

- a) chin yashil suv o'tlari – Euchlophyceae
- b) konyugantlar – Conigotae
- v) Xaralar – Charae

Chin yashil suv o'tlariga – volvokslar, xlorokokk, xlorella, ulotriks, kaulerpa suvo'tlari kiradi.

Konyugantlarga – spiragira suv o'ti kiradi.

Xaralarga – xara suvo'tlari misol bo'ladi.

Diatom suv o'tlari – Diatomea. Bir hujayrali, kolloniyali organizmlar. Ular oqar suvlarda, ko'lmak suvlarda, tuproqda uchraydi. Ular uchun xarakterli belgi po'stining 2 qavatli bo'lishi. Tashqi qavat gil tuproqli va ichki qavati pektinlidir. Tanasining tashqi qavati 2 palladan iborat bo'lib, tashqi epiteka, ichki gipoteka qavatlarini bir – birini qoplab turadi. Xromatoforlarida diatomin pigmenti sariq rangni beradi. hujayra oddiy vegetativ, jinsli yo'l bilan ko'payadi.

Qo'ng'ir suv o'tlari - Rhaeophyta. Ko'p hujayrali dengiz o'simliklari. Xromatoforlarida fukoktsiantin pigmenti bo'lib, qo'ng'ir rang beradi. qo'ng'ir suv o'tlarining tallomi xilma-xil shaklli, tuzilishi jihatidan birmuncha yuksak o'simliklarga o'xshab ketadi. Ularning tanasi murakkab tuzilgan bo'lib, ayrimlarida «ildiz, poya, barg» kabi organlarni eslatadi. qo'ng'ir suv o'tlari vegetativ, jinssiz, jinsli yo'l bilan ko'payadi. Ularga – laminariya, fukus kabi vakillar kiradi.

Qizil suv o'tlari - Rhodophyta. Ko'p hujayrali, tallomli oddiy yoki tarmoqlangan ip, plastinka va poya xamda bargsimon qismlarga ajralgan tuzilishda bo'ladi. qizil suv o'tlari hujayra po'sti ichki selluloza va tashqi qavati pektin moddasidan iborat. Bu modda suv o'ti tallomining shilimshiqanishiga sabab bo'ladi. Ularning tarkibidagi shilimshiqsimon moddalardan shakar, pektin, oqsildan iborat agar-agar olinadi. Xromatoforida qizil rang beruvchi fikoeritrin pigmenti bo'ladi. qizil suv o'tlari jinsli va jinssiz yo'l bilan ko'payadi.

Qizil suv o'tlaridan ko'p uchraydigan vakillari Delesseriya, anfeltsiya kiradi.

Mustaqil ishlash tartibi

- 1 – tajriba.** Tayyor preparatdan, gerbariydan foydalanib, yashil suv o'tlari ko'riladi. Vosheriya, spirogira, suv o'tlari bilan tanishib chiqiladi. Tablitsadan foydalanib, ularning morfologiyasi va ko'payishi bilan tanishib chiqiladi.
- 2 – tajriba.** Sariq suv o'tlaridan va ularning xillari tablitsa orqali pinnulariya bilan tanishib chiqiladi. Xarakterli pigmenti ko'rsatiladi.
- 3 – tajriba.** Qo'ng'ir suv o'tlari va qizil suv o'tlariga oid o'simliklar tayyor preparatdan, tablitsadan tanishib chiqiladi. Ularning o'ziga xos pigmentlari bilan tanishib chiqiladi. Fukus, laminariya

gerbariylari bilan tanishib chiqiladi.
Topshiriq. Talabalar tajribalarni bajarganlaridan keyin, albomlariga suvo'tlari rasmlarini chizadilar.

Laboratoriya mashg'uloti – 2

Mavzu: Zamburug'lar, lishayniklar

Darsning maqsadi:

Zamburug'lar Mucophyta, Fungi – geterotrof organizm, sababi ularda plastidalar bo'lmaydi. Ular saprofit va parazit qolida qayot kechirishadi. Zamburug' tanasi mitselliidan tuzilgan. Mitselliid mayda ipchalar yig'indisi gifalardan tuzilgan. Lishayniklar Lichenophyta – tanasi zamburug' va suv o'tlarining simbioz holda yashashi natijasida vujudga kelgan. Lishayniklar autotrof organizmlardir.

Darsning vazifasi:

Zamburug'larning tuzilishi, oziqlanishi, klassifikatsiyasi, ahamiyati. Lishayniklarning tuzilishi, xillari, yashash sharoitini, ahamiyatini o'rganish.

O'quv jarayonining mazmuni.

1. Zamburug'larning tuzilishi, tanasining mitselliidan tuzilganligi
2. Parazit, saprofit hayot kechirish
3. Zamburug'larning ko'payish usullari
4. Zamburug'lar klassifikatsiyasi
 - a) Arximitsetlar – Archimycetes
 - b) Oomitsetlar – Oomycetes
 - v) Zigomitsetlar – Zygomycetes
 - g) Xaltachali yoki askomitsetlar - Ascomycetes
 - d) Bazidiyali zamburug'lar – Basidiomycetes
 - e) Takomillashmagan zamburug'lar - Fungi imperfecti
5. Lishaynik tanasining tuzilishi
 - a) Suv o'tlari va zamburug'larning simbioz hayot kechirishi natijasida yuzaga kelgan organizm
 - b) Lishaynik autotrof organizm
 - v) Lishaynik xilma-xilligi
 - g) Ko'payish usullari
 - d) Lishayniklarning ahamiyati

O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita usul, nazorat, baholash)

- a) Darsning turi – suhbat
- b) Metod: - Bumerang, Vertushka, FSMU.
- v) Forma (shakl) – guruh

- g) Vosita – doska, tarqatma material, tablitsa, tayyor preparat, gerbariy
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko’rish)
- j) Baholash – o‘z-o‘zini va umumiy baholash

Metod – Bumerang, Vertushka, FSMU

Bumerang treningi

Talabalar kichik guruhlarga bo’linadi va vazifa yozilgan material tarqatiladi. Xar 1 ta guruh o‘z fikrlarini bayon qiladi va guruhlar orasida savol – javob ketadi.

1 – guruhga beriladigan vazifa

1. Zamburug’lar tuzilishi
2. Yashash sharoiti
3. Oziqlanishi
4. Ko’payishi
5. Klassifikatsiyasi

2 – guruhga beriladigan vazifa

1. Arximitsetlar sinfi vakillari
2. Sinf va xillari
3. Tuzilishi, yashash sharoiti
4. Ko’payishi, ahamiyati

3 – guruhga beriladigan vazifa

1. Oomitsetlar sinfi vakillari
2. Tuzilishi, yashash sharoiti
3. Ko’payishi, ahamiyati

4 – guruhga beriladigan vazifa

1. Zigomitsetlar sinfi vakillari
2. Tuzilishi, yashash sharoiti
3. Ko’payishi, ahamiyati

5 – guruhga beriladigan vazifa

1. Xaltachali zamburug’lar
2. Uchrash joylari
3. Ko’payishi, ahamiyati

6 – guruhga beriladigan vazifa

1. Bazidiyali zamburug’lar
2. Uchrash joylari
3. Ko’payishi, ahamiyati.

Zamburug’lar

Zamburug'lar plastidalari bo'lmaydigan geterotrof organizmlar, ular parazit va saprofit holda qayot kechiradi. Ularning tanasi gifalardan, gifalar to'planib mitselliidan tuzilgan.

Zamburug' mitselliysi substrat singib, oziq moddalarni butun yuzasi bilan o'rab oladi. Substrat ustida qolgan mitselliidan spora hosil qiluvchi organlar hosil bo'ladi. Ko'payishi vegetativ, jinssiz va jinsli usulda boradi.

Zamburug'lar tanasining tuzilishiga qarab:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1) Arximitsetlar | 4) Xaltachali zamburug'lar |
| 2) Oomitsetlar | 5) Bazidiyali zamburug'lar |
| 3) Zigomitsetlar
bo'linadi. | 6) Takomillashmagan zamburug'larga |

Arximitsetlar – Archimycetes –tanasi yalong'och yoki uncha rivojlanmagan mitselliylardan iborat. Bir xivchinli zoosporalar yordamida jinssiz, jinsiy yo'l bilan ko'payadi. Bunday zamburug'lar karam ko'chatlarida uchraydigan *Olpidium* – *Olpidium brassica* dir. o'simlikning zararlangan joyida yalong'och hujayradan iborat bo'lgan parazit tanalar hosil bo'ladi. Keyinchalik bu tanalar po'st bilan o'ralib, zoosporangiyalarga aylanadi. Zoosporangiyalar o'sib, tashqariga chiqib turadigan uzun bo'yincha hosil qiladi, va shu bo'yinchalardan ko'plab bir xivchinli zoosporalar tashqariga chiqadi. Qulay sharoitga tushgan zoosporalar, yangi karam ko'chatlariga tushib, ularni zararlanishi davom etadi.

Oomitsetlar – mitselliysi shoxlangan alohida hujayralarga bo'lingan vakili – fitoftora sabzavotlarda parazit hayot kechiradi. Kartoshka pishib etilishi oldidan, uning barglarida qo'ng'ir doqlar paydo bo'ladi. Ular bargning xamma qismiga tarqalib, o'simlikni nobud qiladi.

Zigomitsetlarga – eng ko'p tarqalgan, saprofit holda yashovchi vakillaridan oq pupanak – *Mycor mucedo* zamburug'idir. Uning mitselliysi asosan substrat ichida, qisman uning yuzasida joylashib, ularda sporangiy bandleri ko'tarilib turadi. Shar shaklidagi sporangiyalarni hosil qiladi. Ularning asosida to'siq yuzaga keladi va u sporangiy ichiga botib, kichkina ko'rinishdagi ustuncha hosil qiladi. Sporangiy ichidagi ko'p yadroli sitoplazma aloqida – aloqida bir qancha sporalarga aylanadi. Sporangiy po'sti yorilishi bilan sporalar tashqariga chiqadi va tarqaladi. qulay sharoitda yangi mitselliiga aylanadi.

Xaltachali zamburug'lar - bu zamburug'larda sporalar maxsus xaltachalar ichida etiladi. Mitselliysi bir yoki ko'p yadroli hujayralardan tashkil topgan.

Mitselliining ikkita qujarasi bir – biri bilan qo'shilib, hosil bo'lgan zigota xaltachaga aylanadi. Shuning uchun ularni xaltachali zamburug'lar deyiladi. Xaltacha ichida ko'pincha sakkiztadan spora xaltacha, ya'ni askospora etiladi. Xaltachasi bevosita mitselliida hosil bo'ladigan zamburug'larga achituvchi zamburug'lar misol bo'ladi. Uning tanasi aloqida – aloqida hujayralarga ajraladigan, kurtaklanib shoxlangan zanjir hosil qiluvchi hujayralardan iborat. Kurtaklanish paytida, hujayrada o'simta yoki kurtakcha hosil bo'ladi. Bu o'simta asta – sekin kattalashib o'saveradi va ona hujayradan ajralib ketadi. Xuddi shunday yo'l bilan 2 – chi, 3 – chi kurtaklar paydo bo'laveradi, natijada yumoloq yoki ovalsimon hujayralardan tashkil topgan va osongina uzilib ketadigan zanjir hosil bo'ladi. Ayni paytda ularning yadrolari qam qo'shilib, yadro 3 marta bo'lingach, hujayrada 8 – ta askospora vujudga keladi.

Bazidiyali zamburug'lar sinfi – mitselliysi ko'p xujayrali, yaxshi rivojlangan sporalari maxsus bazidiyalarda etiladi. Ularda ona hujayra bazidiya vujudga keladi. Bazidiyaning sirtida bazidiya sporalari ekzogen usul bilan hosil bo'ladi.

Mitselliining ikki hujayrasi o'zaro qo'shilgandan keyin, yadro ikki marta bo'linib, bazidiyada to'rtta o'simta xosil bo'ladi. Bu o'simtalarning uchi sharsimon qavarib, ularga bittadan yadro o'tadi va bazidiya spora deb ataladigan to'rtta spora vujudga keladi. Bu

bazidiyali zamburug'larga parazit holda hayot kechiradigan qorakuya zamburug'i misol bo'ladi. Kasallangan o'simlik organlari zamburug' sporalari yig'indisidan qorayib kuygandek bo'lib qoladi.

Takomillashmagan zamburug'lar – mitselliysi yuksak darajali, ko'p hujayradan tashkil topgan, biroq xaltacha yoki bazidiya hosil qilmaydi. Ular konidiyalar yordamida qamda bevosita mitselliy bilan ko'payadi. Ular tuproqda va o'simliklar qoldiqlarida saprofit, yuksak o'simliklarda parazit holda yashaydi. Masalan o'simliklarning o'tkazuvchi to'qimalarida parazit yashab, vilt yoki vertitselyoz – so'lish kasalliklarini keltirib chiqaradi. o'simlikni poya va ildiz o'zaklarini chiritadi.

Lishayniklar – Lichenes – ikki organizmlarni simbioz qolatida yashashidan vujudga kelgan organizmlar. Lishayniklar ko'k – yashil suv o'tlari va zamburug'lardan; bazidiyali va xaltachalilardan tashkil topgan. Lishayniklar hosil bo'lishida ba'zan azot o'zlashtiruvchi bakteriyalar qam ishtirok etadi. Lishayniklar tashqi ko'rinishidan po'stloqsimon, bargsimon va shoxlangan bo'ladi. Po'stloqsimon lishayniklar tosh qoyalariga va daraxt po'stloqiga yopishib yashaydi.

Mustaqil ishlash tartibi

- 1 – tajriba** Nondagi moqor zamburug'idan vaqtinchalik preparat tayyorlab mikroskopda ko'riladi.
 - 2 – tajriba** Xaltachali zamburug'lar bilan tanishish uchun penitsillin, aspirin, achitqi zamburug'larini tablitsalarda tanishib chiqiladi.
 - 3 – tajriba** Bazidiyali zamburug'lar bilan tanishib chiqish uchun – qora kuya, zang zamburug'lari gerbariy va tayyor preparatlar orqali o'rganiladi.
 - 4 – tajriba** Ko'piksimon yoki bargsimon lishayniklarni mikroskopda ko'rish
 - 5 – tajriba** Shoxlangan, ko'piksimon, bargsimon lishayniklarni tablitsadan, jonli ko'rgazmali qurollardan va gerbariydan o'rganiladi.
- Topshiriq.** Talabalar tajribalarni bajarganlaridan keyin, albomlariga suvo'tlari, zamburug'lar, lishayniklar rasmlarini chizadilar.

Laboratoriya mashg'uloti – 3

Mavzu: Yuqori sporali o'simliklar: Moxsimonlilar, plaunsimonlar, qirqbo'qimlilar

Darsning maqsadi.

Yuqori sporali o'simliklar tanasining tuban o'simliklarga nisbatan murakkab tuzilishi bilan farqlanadi. Yuksak o'simliklarning ko'pchiligida ildiz, poya, barg bo'lib, ular qoplovchi, o'tkazuvchi, assimilyatsion, qamlovchi, mexanik va boshqa to'qimalarga ajralgan. o'simliklarning quruqlikka chiqishida tana tuzilishlari murakkablashgan va bu bilan birga ko'payish organlarining o'zgarishiga qam sababchi bo'ladi. Yuksak o'simliklar uchun ko'p hujayrali jinssiz (sporangiyalar) va jinsli organ (gametangiy) bo'lishi xarakterlidir. Erkak jinsiy organ-anteridiy, urqochi jinsiy organ-arxegoniy deb ataladi. Yuksak o'simliklarning taraqqiyot davrida gametofit (jinsiy) nasl va sporafit (jinssiz) nasllar gallanadi.

Yuksak o'simliklardan: Moxsimonlar, plaunlar, qirqbo'qimli-lar, qirqquloqsimonlar o'rganiladi.

Moxsimonlar – Bryophyta – tanasida poya va barg takomillashgan bo'lib, ko'p xujayrali rizoidga ega. Tuban vakillari tanalari tallomdan iborat. Moxsimonlarning ko'payishida gametofit nasl ustun turadi.

Moxsimonlar:

jigarsimon moxlar

poya bargli moxlarga bo'linadi.

Plaunlar – Lycopodiophyta – qaqiqiy barg poyali o'simliklar bo'lib, ularda qam nasllarning navbatlashib ko'payishi kuzatiladi.

Sporafit nasl ustunlik qiladi. Sporafit poyasining uchki qismida joylashgan boshqochalarda sporangiyli sporofillar rivojlanadi.

Qirqbo'qimsimonlar – Sphenophyta – poyasining ichi kovak bo'lishi, barglari mayda bo'lib, poyaga doira bo'lib joylashgan. qirqbo'qimsimonlar spora etishtirish yo'li bilan ko'payadi. Sporalar sporagiylarda etishib, sporangiylar shakli o'zgargan barg qisoblanadi. Sporofillar qalqon shaklida bo'lib, poya uchidagi xalqalarda joylashadi. Sporofillar ichida sporangiy mavjud. Sporangiy ichida ko'p miqdorda elaterali sporalar pishib etilgandan so'ng, tashqariga chiqib sochiladi. Sporalar tashqi ko'rinishidan bir – biridan farq qilmasa qam, lekin ular fiziologik xususiyati bilan farq qiladi va xar xil bo'ladi. Ba'zi bir sporalar o'sib urqochi gametofit, ikkinchi xillari esa erkak gametofit hosil qiladi. Urqochi o'simta yirik bo'lib, unda arxegoniy etiladi. Arxegoniyda tuxum hujayra rivojlanadi. Erkak o'simta mayda bo'lib, unda anteridiy hosil bo'ladi. Unda esa spermagen hujayralar rivojlanadi. Otalanish suv yordamida shudring tushganda bo'ladi. Otalangan tuxum hujayradan zigota, undan esa yangi qirqbo'qim, ya'ni sporofit nasl rivojlanadi.

Darsning vazifasi:

Yuqori sporali o'simliklar xilma-xilligi, yashash sharoitlari, ularning ko'payishida nasl gallanishi va biologik xususiyatlari o'rganiladi.

o'quv jarayonining mazmuni.

1. Yuqori sporali o'simliklarning tuzilishi, ko'payishidagi nasl gallanishi, klassifikatsiyasi
2. Moxsimonlarning tuban sporali o'simliklardan farqi
3. Moxsimonlarning asosiy belgilari
4. qattanali va poya bargli moxlarga bo'linishi.
5. Ularning ko'payishida nasl gallanishi
6. Jigarsimon moxlar tuzilishi va ko'payishi
7. Poya bargli moxlar tuzilishi va ularning ko'payishi
8. Plaunlarning umumiy xarakteristikasi va xilma – xilligi
9. Bir xil sporali plaunlarning tuzilishi va yashash sharoiti
10. Xar qil sporali plaunlarning tuzilishi va yashash sharoiti
11. Plaunlarning ko'payishi va rivojlanishi
12. Plaunlarning tibbiyotda va qo'jalikdagi ahamiyati.
13. Qirqbo'qimlarning qadimgi va qozirgi tur vakillari
14. Dala qirqbo'qimining tuzilishi va yashash sharoiti
15. Dala qirqbo'qimining ko'payishi va rivojlanishi
16. Dala qirqbo'qimining ahamiyati

O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita usul, nazorat, baqolash)

- a) Darsning turi – suqbat
- b) Metod – blits o'yin, bumerang, vertushka
- v) Forma (shakl) – guruh
- g) Vosita – doska, tarqatma material, tablitsa, gerbariy

- d) Usul – nutqli
- e) Nazarot – kuzatish
- j) Baqolash – o‘z – o‘zini baqolash, umumiy baqolash

Metod - Blitz o‘yin, Bumerang, Vertushka

Blitz – o‘yin

Guruh bahosi	Guruh xatosi	To‘g‘ri javob	Yakka xato	Yakka baho	Guruh ishidan chetlanish	Kakku ziniri o‘simligini morfo-logiyasi, ko‘payishi va rivojlanishi
						1. Zigotadan jinssiz nasl sporo-fit o‘sib chiqadi 2. Rizoid, ildiz va poya bo‘ladi 3. Sporafit sporalaridan o‘simta protonema o‘sib chiqadi 4. Gametofit organlar otalik – onalik o‘simliklarda aloqida – aloqida joylashadi. 5. Uruqlangan tuxum xujayradan zigota o‘sib chiqadi 6. Kakku-ziqiri poyasining balan-ligi 20 – 40 sm bo‘ladi 7. Otalanish xodisasi erta baqor-da suvli muxitda sodir bo‘ladi 8. Protonema o‘simta ingichka shoxlangan xlorofilga boy bo‘ladi 9. Anteridiydan chiqqan sperma-tazoid arxegoniyga kiradi va uni otalantiradi 10. Protonema o‘simtasidan ke-yinroq kakku – ziqiri o‘sadi

Bu metodning o‘tkazilish tartibi. qar bir guruh talabarlari yuqorida ko‘rsatilgan vazifa tarqatiladi. Talabalar to‘g‘ri deb xisoblagan raqamni “yakka baqo” qatoriga yozib chiqishadi. o‘qituvchi to‘g‘ri javob e‘lon qilgandan keyin, xar 1 guruh o‘z qatolarini, “guruh xatosi” qatoriga yozadi. Natijada to‘g‘ri, noto‘g‘ri javoblar solishtirilib, guruh bahosi xisoblab chiqiladi.

Bumerang metodi

Talabalarni kichik guruhlarga bo‘linadi va vazifa yozilgan material tarqatiladi. Xar 1 ta guruh o‘z fikrlarini bayon qiladi va guruhlarda orasida savol – javob ketadi.

1- guruh vazifasi

- Plaunlarning qadimgi vakillari
- Plaunlarda qaysi nasl ustunligi
- Jinssiz nasl tuzilishi
- Jinsiy nasl tuzilishi

2 – guruh vazifasi

Teng sporali plaunlar tuzilishi
 Nasl ustunligi
 Ko'payishi va rivojlanishi
 Ahamiyati

3- guruh vazifasi

Har xil plaunsimonlar tuzilishi
 Yashash sharoiti
 Ko'payishi va rivojlanishi

Blits – o'yin

Guruh bahosi	Guruh xatosi	To'g'ri javob	Yakka baho	Yakka xato	Guruh ishidan chetlanish	Dala qirqbo'g'imining ko'payish va rivojlanish sikli
						1. Sporali boshqoqcha urchuqsimon shaklda bo'lib, ularda qalqonsimon sporafillar joylashadi 2. O'talanish suv yordamida , yomqir yoqqanda yoki shudring tushganda bo'ladi. 3. Qirqbo'qim o'simligida gallanib ko'payish kuzatiladi 4. Olti burchakli plastinka shakldagi sporofillar ichki qis-mida 8-10 sporangiy mavjud. 5. Erta bahorda ildizpoyadan qo'n-qir rangli poya o'sib chiqib, sporali boshqoq xosil qiladi. 6. O'talangan tuxum xujayralari-dan zigota, undan esa yangi qirqbo'-qim o'simligi rivojlanadi 7. Sporangiy ichida elaterali spo-ralar pishib etilgandan so'ng tash-qariga chiqib sochiladi 8. Ba'zi bir sporalar urqochi ga-metofit (arxegoniy), ikkinchi xillarida erkak gametofit (anteridiy) hosil bo'ladi 9. Sporalar tashqi tomondan farq qilmasada, fiziologik xususiyati xar – qil

Bumerang metodi

Talabalar kichik guruhlarga bo'linadi va vazifa yozilgan material tarqatiladi. Xar bitta guruh o'z fikrlarini bayon qiladi va guruhlar orasida savol – javob ketadi.

1- guruh vazifasi

Qirqbo'qimsimonlarning umumiy belgi xususiyatlari
 Yashash sharoitiga qarab xilma – xilligi.

2 – guruh vazifasi

Dala qirqbo'g'imining yashash sharoiti
Dala qirqbo'g'imining 2 xil novdasining tuzilishi

3 – guruh vazifasi

Boshqochalardagi sporangiylarning tuzilishi
Jinsiy naslning tuzilishi va otalanish protsessi

Yuqori sporali o'simliklarning ko'payishi va rivojlanish sikli

	Moxsimonlar, plaunlar, qirq-bo'qimlar, qirqquloqlar	vegetativ	sporafit	gametofit
1	Erkak paporotnik			
2	Cho'qmoqli plaun			
3	Sfagnum			
4	Dala qirqbo'qimi			
5	Salviniya			
6	Marshantsiya			
7	Selaginella			
8	Kakku ziqiri			
9	Funariya moxi			

Mustaqil bajarish uchun vazifalar.

Ob'ektlarni o'rganish: Moxsimonlar, plaunlar, qirqbo'qimlilar, qirqquloqsimonlar.

1 – tajriba. Moxsimonlar. Gerbariy va tablitsadan foydalangan holda moxsimonlarni morfologiyasini o'rganib quyidagi belgilarga e'tibor berish:

- a) o'simlik organlari (rizoid, poya, barglari)
- b) barglarning joylanishi
- v) jinsiy organlarning joylanishi

2 – tajriba. Plaunlar. Gerbariy va tablitsadan foydalangan holda apteka plauni morfologiyasini o'rganish:

- a) o'simlik organlari (ildiz, ildizpoya, bargi)
- b) poyasining shoxlanishi va shakli
- v) barglarining shoxlanishi va shakli
- g) sporali boshqoqi
- d) sporalarni mikroskop ostida ko'rish

3 – tajriba. Qirqbo'qimlilar. Gerbariy va tablitsadan foydalangan holda qirqbo'qimning tashqi tuzilishini o'rganish.

- a) o'simlikning ildizpoyasi va undagi tugunak
- b) baqorgi va yozgi poyalarini rangi va tuzilishi
- v) bargining tuzilishi
- g) sporalari

Topshiriq: Dars davomida gerbariy va tablitsadan foydalanib yuqori o'simliklarga oid rasmlarni chizib, rasmlarning qismlarini yozib qo'yadilar. qirqquloqsimonlilarda jinsli va jinssiz ko'payish (nasl gallanish) ga oid rasmlarni chizing.

Mavzu: Uruqli o'simliklar. Ochiq uruqlilar – Pinophyta - Gymnospermae

1. Darsning maqsadi:

Ochiq uruqli o'simliklar toshko'mir davrining oxirlarida qirqquloqsimonlardan keyin paydo bo'lgan. Ochiq uruqlilarda birinchi bo'lib, uruq hosil bo'lgan. Ularning uruqlari yopiq uruqlilar singari mevaning ichida emas, balki megasporofillarda ochiq xolda joylashgan. Shuning uchun ularni ochiq uruqlilar deyiladi. qozirgi ochiq uruqlilarning vakillari, ninabarglilarda poyaning po'stloqi yupqa bo'lib, yoqochlik qismi rivojlangan. Mego va mikrosporofillari maxsus qubbalarga birlashgan va bir jinsli bo'ladi. Ochiq uruqlilar 3 – sinfga bo'linadi: Sagovniklar, qubbalilar, qobiqli uruqlilarga

2. Darsning vazifasi:

Ninabarglilarning xarakterli belgilari, yashash sharoiti, ko'payishi va rivojlanishi, ahamiyati va xilma – qilligi. Efedra o'simligining tuzilishi va ahamiyati.

3. O'quv jarayonining mazmuni

- 1) Ochiq uruqli o'simliklarni yuqori sporali o'simliklardan farqi
- 2) Ochiq uruqli o'simliklar klassifikatsiyasi
- 3) Ninabarglilar sinfiga kiradigan o'simliklar tuzilishi
 - a) otalik va onalik quddalarining shakli va tuzilishi
 - b) changning tuzilishi
 - v) uruqkurtakning tuzilishi
 - g) changlanish va otalanish
 - d) uruqning taraqqiy etishi
- 4) Ochiq uruqli o'simliklar deb atalishi
- 5) Ninabargli o'simliklarning ahamiyati
- 6) qobiqli uruqlilar tuzilishi va xillari
- 7) Zoqoza (efedra) o'simligining tuzilishi va yashash sharoiti

4. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita usul, nazorat, baqolash)

- a) Darsning turi – suqbat
- b) Metod – F S M U texnologiyasi
- v) Forma (shakl) – guruh
- g) vosita – doska, tarqatma material, tablitsa, tayyor preparat, gerbariy
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish, ko'rish
- j) Baqolash – o'z – o'zini va umumiy baqolash

5. Metod – F. S. M. U. treningi

F S M U – texnologiyasi

Ninabarglilar yoki qaraqaydoshlar oilasi

O'qituvchi tomonidan umumiy vazifa beriladi.

Masalan: “qaraqay o'simligining morfologik belgilari, changlanishi va otalanishi”. Talabalarni kichik guruhlariga bo'lamiz va xar bitta guruh fikr va dalillarini 4 ta bosqich bilan yozishadi. Kichik guruhlar yozgan fikrlarini qimoya qiladi va o'qituvchi tomonidan fikrlar umumlashtiriladi.

F – qaraqay – ochiq uruqli o'simlik

S – Uruqlari megosporofillarda ochiq holda joylashadi

M – quddalarda joylashgan chang va uruqkurtak orqali changlanish va otalanish qodisasi sodir bo'ladi

U – qaraqay o'simligida ketadigan protsesslar umumlashtiriladi

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar

Ob'ektlarni o'rganish: Ninabarglilar. qobiq uruqlilar.

Ob'ektlar bo'yicha ma'lumotlar

Ninabarglilar doimiy yashil o'simliklar. Ular 5 ta oilaga: qaraqay-doshlar – (Pinaceae), Sarvidoshlar – (Cupressaceae), Taksodiyadoshlar-Taxodiaceae), araukariyadoshlar – (Araucariaceae), zarnabdoshlar – (Taxaceae) ga bo'linadi. qaraqaydoshlar oilasiga qaraqaylar avlodi kirib – bir uyli doimiy yashil daraxtlar bo'lib, 100 dan ortiq turi mavjud. Shulardan o'rmon qaraqayi – *Pinus silvestris* 1 uyli, ayrim jinsli, poyasining diametri 1m, buyi 50 m, poyasi monopodial shoxlanadi. Ular ko'payishi uchun xar xil tuzilgan erkak va urqochi qubbalar hosil qiladi. Erkak qubbalar cho'ziq sariq rangda baqorda o'sib chiqqan yosh novdalar uchida joylashadi. Xar bir qubbada 1 ta o'q bo'lib, ularga tangacha shaklidagi mikrosporofillar joylashadi. Mikrosporofillarda mikrosporangiyalar bo'lib, uning ichida mikrospora yoki chang etiladi. Chang 2 qavat: tashqi “ekzina”, ichki “intina” po'st bilan o'ralgan. Tashqi po'stining 2 tomonida ichiga qavo to'lgan bo'rtma qavo pufakchasi bor. Chang mikrosporangiyada o'sib, yadrosi bo'linib, 2 ta hujayra anteridial va vegetativ hujayra hosil bo'ladi. Anteridial hujayradan spermli vegetativ xujayradan chang yo'li hosil bo'ladi. Urqochi qubbalar yosh novdaning ichida hosil bo'ladi. qisqa o'qdan iborat urqochi qubba 2 xil, tashqi va ichki tangacha barglar bilan qoplangan. Bu tangachalar qo'ltiqida mikrosporofillar joylashib qaraqay gullaganda qubba tangachalari bir – biriga zich taqalib turmay, tirqish hosil bo'lib, shamol uchirib keltirgan chang ana shu tirqish orqali qubba ichiga kiradi. Uruq tangachasining o'qqa birikib turgan joyida 2 ta uruq kurtak hosil bo'ladi. Uruq kurtak ko'p xujayrali nutsellus va uni o'rab olgan 2 qavat intugumentdan iborat. Intugumentning yuqori tomonida kanalcha bo'lib, mikropile deb ataladi. Nutsellusning mikropilega yaqin turgan joyidagi hujayralarining biri meyoza bo'linib, 4 ta hujayra paydo bo'ladi. Ulardan bittasi kengayib, endospermani hosil qiladi. qolgan 3 tasi nobud bo'ladi. Endospermaning yuqori qismida, mikropile tomonida 2 ta arxegoniy hosil bo'lib, ularning ichida bittadan tuxum hujayra etiladi.

Uruq kurtakka tushgan chang rivojlanib, mikropile orqali endospermdagi arxegoniyga borgach yoriladi. Ichidan chiqqan spermliylardan biri arxegoniydagi tuxum xujayra bilan qo'shiladi va uruqlanish sodir bo'ladi.

Qobiqli uruqlilar – Chlamydasptaphyta ga kiradigan o‘simliklarga Efedradoshlar oilasi bilan tanishamiz. Zoqoza o‘simligi Osiyo, Xindiston, Xitoy, Janubiy Amerikada keng tarqalgan. Uncha katta bo‘lmagan yashil buta yoki o‘simlikning bo‘yi 90 sm ga etadi.

Zoqozaning 1 xil poyasida juftlashib joylashgan mayda barglarining qo‘ltiqida shar shaklidagi kichik changchi quddalar bor. Ularda mikrosporangiy mavjud. Ikkinchi xil poyasida kichik quddacha bo‘lib, unda bitta bola qopchiqi rivojlanadi. Bu bola qopchiqining atrofini qshtdor qobiq o‘rab olgan.

Bola qopchiqining tashqi qavati intugument cho‘zilib, trubkani hosil qiladi va mikrosporalarni ushlab olishga moslashgan. Intugumentning ichki tomonidagi nutsellusda uruqchi maysa rivojlanadi. Uruqchi maysa gaploid xromosomal endosperm va uni ichida joylashgan arxegoniyadan iborat. Intugument trubkasining ichida mikrospordan spermiya hosil bo‘ladi va 1 ta arxegoniya bilan uruqlanib uruq hosil qiladi. Uruqning atrofini qshtdor qobiq bilan o‘ralgan bargchalar qizarib suvli bo‘ladi va tashqi ko‘rinishidan rezavor mevaga o‘xshab ketadi. Zoqozadan efedrin alkaloidi olinib, tibbiyotda markaziy nerv sistemasi kasalliklarida foydalaniladi.

7. Mustaqil ishlash tartibi.

1 – tajriba: Oddiy qaraqay Gerbariy va tablitsadan foydalanib, oddiy qaraqayni umumiy ko‘rinishini (bargning shakli, joylanishi, otalik, onalik quddalari) o‘rganish.

a) otalik quddasi: umumiy ko‘rinishi, tangachalar, changdon,

changdon tuzilishi – ekzina, intina, vegetativ, generativ hujayra

b) onalik quddasi: umumiy ko‘rinishi, qoplaqich tangacha, uruq beruvchi tangacha, uruq kurtak

uruq kurtak tuzilishi: intugument, nutsellus, mikropile, embrion, arxegoniya

2 – tajriba. Zoqoza. Gerbariy va tablitsadan foydalanib, zoqoza o‘simligining morfologik belgilarini o‘rganish

Topshiriq. Dars davomida talabalar gerbariy, tablitsalardan foydalangan holda albomlarga o‘rganilgan o‘simliklarning barcha belgilari ko‘rsatilgan holda rasmlarini chizib olish.

Laboratoriya mashg‘uloti – 5

Mavzu: «Yopiq urug‘li o‘simliklarda gulning tuzilishi»

1. Darsning maqsadi:

Yopiq urug‘lilar jinsiy ko‘payishi jihatidan boshqa o‘simliklarga qaraganda yuqori bosqichda turadi. Ularda jinsiy ko‘payish uchun maxsus reproduktiv (hosil) organlari – gul hosil bo‘ladi.

Gul juda murakkab va unda muhim rivojlanish sodir bo‘ladi: mikro va makrosporangenez, changlanish, urug‘lanish va mevaning hosil bo‘lish jarayonlarini kuzatish mumkin.

Gul novdaning o‘sish nuqtasidan paydo bo‘ladi. Gulqo‘rg‘on, bargchasi, changchi va urug‘chi ichki meristemadan hosil bo‘ladi. Gul qismlari dastlab gul kurtagi ichida shakllanadi.

Changlanish changdonda etilgan chang donachasini urug‘chi tumshuqchasiga kelib tushishidan iborat bo‘lib, ikki xil turi bo‘ladi: o‘z – o‘zidan changlanish va chetdan changlanish.

Urug‘lanish – erkak va urg‘ochi jinsiy gametalarning o‘zaro qo‘yilish jarayoni hisoblanadi. Erkak gameta spermiya, urg‘ochi gameta tuxum hujayra deyilib, bu jarayon urug‘chida ketadi. Ya'ni chang naychasi murtak xaltachaga o‘tganda, uning uchi yorilib, ichida

ikki spermiya murtak xaltachaga to'kiladi. Bu spermiyalardan bittasi tuxum hujayra bilan, ikkinchi spermiya markaziy yadro bilan qo'shiladi. Bu jarayon qo'sh urug'lanish deyiladi.

2. Darsning vazifasi:

Evolyutsion taraqqiyot natijasida gulning hosil bo'lishi, gulning tuzilishi (qismlari), formulasi, diagrammasi, gul qismlarining gul o'rnida joylanishiga qarab xillari, changchi, urug'chining tuzilishi, gulda ketadigan changlanish, urug'lanish jarayonlarini o'rganish.

3. O'quv jarayonining mazmuni:

1. Yopiq urug'li o'simliklar bo'limiga tasnif
2. Yopiq urug'li o'simliklar qanday sinflarga bo'linadi
3. Gul deb nimaga aytiladi va u qanday funktsiyalarni bajaradi
4. Gulning kelib chiqishi, to'liq va to'liq bo'lmagan gullar
5. Gul qismlari. Ularning lotincha nomlari
6. Oddiy va murakkab gul qo'rg'on
7. To'g'ri gul bilan qiyshiq gulni farqi
8. Qanday gullar yalong'och gullar
9. Changchi qanday vazifani bajaradi va qanday organlardan tuzilgan
10. Chang donachalarining shakli, tuzilishi qanday?
11. Urug'chi qanday vazifani bajaradi va u qanday tuzilgan?
12. Gul tugunining gul qo'rg'oniga nisbatan joylanishi va tuzilishi
13. Urug' kurtakning va murtak xaltachaning tuzilishi
14. Gul formulasi
15. Gul diagrammasi
16. Changlanish va uning xillari
17. Qo'shaloq otalanish
18. Yopiq urug'li o'simliklarni otalanishi, ochiq urug'li o'simliklarni otalanishidan farqi.

4. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita, usul, nazorat, baholash)

- a) Darsning turi – suhbat
- b) Metod – Blits – o'yin, Bumerang, Vertushka
- v) Forma (shakl) – guruh
- g) Vosita – doska, tarqatma material, tablitsa, gerbariy, mulyaj
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko'rish)
- j) Baholash – o'z-o'zini va umumiy baholash

5. Metod – Blits – o'yin, Bumerang, Vertushka

Blits – o'yin “Urug'lanish jarayoni”

Guruh bahosi	Guruh xatosi	To'g'ri javob	Yakka xato	Yakka baho	Guruh ishidan chetlatish	Harakatlar mazmuni
						1. Murtak xaltachaning yadrosi ketma-ket 3 marta mitoz bo'linib, 8 ta yadroni

					<p>hosil qiladi</p> <p>2. Chang naychasi onalik tugunchasiga etib borgach, mikropile orqali urug'chi haltachasi ichiga kiradi va uchki qismi yorilib, hamma moddasi xaltacha ichiga to'kiladi</p> <p>3. Murtak xaltachaning xa-laza qismida qolgan 3 ta yadro - antipodalar deyiladi, mikropile tomondagi 3 ta yadroni bittasi tuxum hujayra, qolgan 2-si sinergidalar deyiladi</p> <p>4. Urug' kurtakdagi nutsellus ichida murtak xaltacha bo'lib, bu erda urug'lanish sodir bo'ladi</p> <p>5. Ikkinchi sperma esa markaziy hujayraning yadrosi bilan qo'shilib, triploid xromosomal hujayrani hosil qiladi</p> <p>6. Urug'kurtak qopchasida chang donachasining sper-malari bilan tuxum hujayra va markaziy yadrola-rining o'zaro qo'shilishi urug'lanish deyiladi</p> <p>7. So'ngra har qaysi tomondan bittadan yadro murtak xaltachaning markazi tomon harakatlanib, o'zaro qo'shiladi va diplo-id xromosomal markaziy yadro hosil qiladi</p> <p>8. Spermalardan biri tuxum hujayraning yadrosi bilan birikadi va diploid xromosomal urug' murtagini vujudga keltiradi</p> <p>9. Bu hujayradan keyin-chalik urug'ning oziq moddalar to'plovchi to'qimasi – urug' endospermi rivojlanadi</p>
--	--	--	--	--	---

Bu treningda – talabalarni guruhlariga bo'lib, material tarqatiladi. Guruh talabalari ketma-ket yozilgan, chalkashtirilgan jummalarni to'g'ri holatda joylashtirishlari kerak. Avvalo “to'g'ri” deb hisoblagan jumla raqamini, tablitsadagi “yakka baho” grafasiga yozib chiqadi. So'ngra o'qituvchi tomonidan to'g'ri javob aytilgandan so'ng, noto'g'ri raqamlarini “yakka xato” grafasiga yoziladi. hisoblangandan keyin “guruh bahosi” grafasi o'qituvchi tomonidan belgilanadi.

Bumerang metodi

Bu metodda – talabalar kichik guruhlariga bo'linadi. O'qituvchi har bir guruhga vazifa yozilgan material tarqatadi. har bir guruh talabalari berilgan vazifa bo'yicha o'z fikrlarini bayon qiladi va undan so'ng guruhlar orasida savol - javob ketadi.

1 – guruhga beriladigan vazifa

1. Yopiq urug'li o'simliklarga tasnif
2. Gulning kelib chiqishi haqidagi nazariyalar

2 - guruhga beriladigan vazifa

1. Gul deb nimaga aytiladi va u qanday vazifani bajaradi
2. Gul qismlari. (lotincha nomlari bilan)
3. Oddiy va murakkab gul qo'rg'on

3 - guruhga beriladigan vazifa

1. Chang, vazifasi, ichki va tashqi tuzilishi
2. Urug'chi, vazifasi, tashqi va ichki tuzilishi
3. Tugunchaning gul o'rnida joylashishi

4 - guruhga beriladigan vazifa

1. Changlanish, uning xillari
2. Urug'lanish jarayoni

Vertushka metodi

Bu treningda guruhlariga material tarqatiladi va har bir guruh yakka holda to'g'ri javobni belgilaydi. Keyin bu materiallar guruhlariga aralashtirib beriladi, yana belgilanadi. Guruhlar soniga qarab aylangandan keyin, o'qituvchi talabalar bilan umumiy to'g'ri javobni belgilaydilar.

Gulning kelib chiqish nazariyalari						
№	Gulning kelib chiqishi haqida ma'lumot	Stro-bilyar nazariyasi	Evant nazariyasi	Melvillning gonofill nazariyasi	Telom nazariyasi	Pseudantiv nazariyasi
1	Gul – ninabargli o'simliklar qubbasini o'zgarishi natijasida vujudga kelgan					
2	Gul – metamorfozlashgan (shakli o'zgargan) novda va barg					
3	Gulning hamma qismlari tellomlardan, ya'ni renofitlarga xos bo'lgan silindrik tuzilishlardan vujudga kelgan					
4	Gul – shakli o'zgargan to'pgul hisoblanadi					

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar

- 1 – tajriba: - Tablitsa, gerbariy va jonli o'simlik gullaridan foydalanib, gul qismlarini aniqlang:
 - a) gul bandi
 - b) gul o'rni
 - v) gul kosacha bargi
 - g) gul toj bargi
 - d) otalıkları
 - e) onaligi va gul tuguni joylanishi
- 2 – tajriba: - Toj bargining xillari, to'g'ri va qiyshiqiligini o'rganib rasmini albomga chizib, nomlarini yozish
- 3 – tajriba: - Ko'ndalang va uzunasiga kesilgan gul diagrammasini o'rganib, rasmini chizib nomlarini yozish

- Topshiriqlar:-**
1. Gul qismlarini rasmini chizib lotincha nomlarini yozing
 2. Turli xildagi gullarni gul formulasini yozish, diagrammasini chizish
 3. Tablitsadan qo'shaloq otalanishni o'rganib, ochiq urug'lilardagi otalanishdan farqini ajratib, rasmini chizib, qismlarini nomini yozish

Laboratoriya mashg'uloti – 6

Mavzu: “To'pgullar va ularning xillari”

1. Darsning maqsadi:

O'simliklarning guli yakka – yakka joylashishidan tashhari to'p – to'p bo'lib ham joylashgan bo'ladi. To'pgul deb mayda gullarning yig'indisiga aytiladi. Tabiatda yakka gullarga haraganda to'pgullarning ahamiyati katta.

To'p bo'lib birikkan mayda gullar aniq ko'rinib turadi va hashorotlarni o'ziga ko'proq jalb qiladi. Ular chetdan changlanadi, natijada hosildorlik yanada oshadi. Bundan tashhari to'pguldagi gullar, odatda bir tekis ochilmaydi va sharoit noqulay bo'lib qolsa, ularning bir qismigina nobud bo'ladi. Gul o'qida gullarning joylanishiga qarab, to'pgullar ikki guruhga bo'linadi.

Botrioid – aniq bo'lmagan, to'pgullarda shoxlanish monopodial tipda

Tsimoz – aniq, to'pgullarda shoxlanish simpodial tipda

2. Darsning vazifasi:

To'pgul va ularning xillari. Oddiy to'pgullar, murakkab to'pgullar, shoxlanishiga qarab, monopodial va simpodial to'pgullar, tabiatda uchrashi, biologik va tibbiyotdagi ahamiyatini o'rganish.

3. O'quv jarayonining mazmuni:

1. To'pgul deb nimaga aytiladi
2. To'pgulning biologik ahamiyati
3. To'pgullar necha guruhga bo'linadi
4. Oddiy monopodial to'pgul deb qanday to'pgullarga aytiladi
5. Murakkab monopodial yoki botrik to'pgullar deb qanday to'pgullarga aytiladi?
6. Simpodial yoki simoz (aniq) to'pgul deb qanday to'pgullarga aytiladi?
7. Botrik to'pgullar simoz to'pgullardan qanday farq qiladi
8. Simoz va botrik to'pgullar qanday o'simliklarda uchraydi
9. To'pgullarning tibbiyotda va xo'jalikdagi ahamiyati

4. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl) vosita, usul, nazorat, baholash)

1. Darsning turi – suhbat
2. Metod – Vertushka
3. Forma (shakl) – guruh
4. Vosita – doska, tarqatma material, tablitsa, gerbariy

5. Usul – nutqli
6. Nazorat – kuzatish (ko'rish)
7. Baholash – o'z-o'zini va umumiy baholash

5. Metod - Vertushka

Vertushka metodi

№	To'pgul haqida ma'lumotlar	Shingil	Qal-qon	Bo-shoq	Soya-bon	Bosh-cha	Savat-cha	So'ta
1	To'pgulning o'qida gullari bandsiz joylashgan							
2	Gul o'rni juda qa-linlashgan va kengaygan bo'lib, likopchani eslatadi, unda bandsiz gullar g'uj joylashib turadi							
3	Gul o'qi qisqarib yo'g'onlashgan bo'-lib, gullar bandsiz joylashgan, shakli boshchaga o'xshash							
4	Sirg'asimon to'pgulning o'qi osilib turadigan shingilga o'xshash							
5	To'pgulning asosiy o'qi, qiqhargan gulbandi bir xil uzunlikda bo'lib, gullari bir nuqtada o'rnashgan							
6	Ostki gullarining gulbandi ustki gullariga haraganda uzun bo'ladi va teng sathni egallaydi							
7	To'pgulning o'qida gullari gulbandi bilan joylashgan, gullari pastdan yuqoriga qarab birin – ketin ochiladi							

Bu treningda guruhlarga material tarqatiladi va har bir guruh yakka holda to'g'ri javobni belgilaydi. Keyin bu materiallar guruhlarga aralashtirib beriladi, yana belgilanadi. Guruhlar soniga qarab aylangan-dan keyin o'qituvchi va talabalar bilan umumiy to'g'ri javob belgilaniladi.

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar

Ishlash tartibi

- 1 – tajriba: - Oddiy monopodial to'pgullar:
1. Boshqoq - zubtutum o'simligida
 2. Kuchala, sirg'asimon – yong'oqning erkak gulida
 3. So'ta – makkajo'xori gulida
 4. Shingil – karamgullilar oilasi vakillarida
 5. Qalqon – olma, nok gullarida

6. Soyabon – selderguldoshlar oilasi vakillarida
7. Boshcha – sebarga o'simligida
8. Savatcha – kungabochar, bo'tako'z o'simligida
O'simliklarni gerbariy va tablitsadan o'rganiladi

2 – tajriba: - Murakkab monopodial to'pgullar:

1. Murakkab boshqoq- bug'doy, arpa o'simligida
2. Murakkab soyabon - seldergullilarning oilasi vakillarida
3. Ro'vak – murakkab shingil - sholi, qo'ng'ir bosh o'simligida
O'simliklarni gerbariy va tablitsadan o'rganiladi.

3 – tajriba: - Simpodial to'pgullar:

- a) monoxaziy – gajak, ilonizi – mingdevona, kampirchopono o'simligida
- b) dixaziy – chinnigullilar oilasi vakillarida
- v) pleyoxaziy – sutlamadoshlar oilasi vakillarida
O'simliklarni gerbariy va tablitsadan o'rganiladi

Laboratoriya mashg'ulot – 7

Mavzu: “Meva, uning xillari. Urug'ning tuzilishi”.

1. Darsning maqsadi:

Gulda urug'lanish sodir bo'lgach, meva hosil bo'ladi. Meva urug'ning hosil bo'lishida, uni himoya qilish va tarqalishida ahamiyati katta. Mevaning morfologik asosi, dastlab urug'chi tuguni hisoblanadi. Gulning qolgan qismlari, ya'ni gulqo'rg'oni va changlari so'lib qoladi. Ba'zi bir o'simliklar mevasining hosil bo'lishida ular ham ishtirok etadi. Tugunchada kuchli o'zgarish sodir bo'lishi natijasida tuguncha kattalashadi. Tugunchadagi hujayrada har xil plastik va energetik moddalar: oqsil, kraxmal, glyukoza, yoq, vitaminlar hosil bo'ladi. Har xil o'simliklarning mevasi yirik – maydaligi, tashqi ko'rinishi, rangi, qattiq – yumshoqligiga qarab, biri- biridan farq qiladi Kelib chiqishiga ko'ra mevalar: haqiqiy, soxta, oddiy, murakkab, to'pmevaga bo'linadi. Tuzilishiga qarab: quruq va ho'l mevaga bo'linadi Urug' gulli o'simliklarni ko'payishi va tarqalishi uchun xizmat qiladi. U murtak, hamlovchi to'qima va urug'po'stidan tashkil topadi. Urug' tiplari quyidagicha bo'ladi: perispermli, endospermsiz, endospermli

2. Darsning vazifasi:

Meva, uning tuzilishi, mevaning paydo bo'lishicha qarab turlarga quruq va ho'l mevalarga bo'linishi, urug'ning tuzilishi, paydo bo'lishi, urug' qismlari, oziqli moddalarni to'planishiga qarab nomlanishi, unib chiqishi uchun kerak bo'ladigan sharoitlarni o'rganish. Meva, urug'larni tabiatda tarqalishi uchun bo'lgan moslamalarni o'rganish

3. O'quv jarayonining mazmuni:

1. Meva gulning qaysi qismidan hosil bo'ladi?
2. Meva necha qismdan tuzilgan?
3. Oddiy meva murakkab mevadan qanday farq qiladi?
4. Mevalar necha xil bo'ladi?
5. Ho'l va quruq mevalarning bir – biridan farqlari

6. Pishganda ochiladigan va ochilmaydigan quruq mevalar va ularning farqlari
7. Rezavor va danakli ho'l mevalar
8. Dukkak va qo'zoqning farqi nimada qanday meva, soxta meva deyiladi?
9. Murakkab meva bilan to'p mevaning qanday farqi bor?
10. Urug' qanday vujudga keladi?
11. Urug' qanday qismlardan tashkil topgan?
12. Qanday urug'lar endospermli va qanday urug'lar endospermsiz urug'lar deyiladi?
13. Urug' palla qanday vazifani bajaradi?
14. Murtak necha qismdan iborat?
15. Urug'ni unib chiqishi uchun qanday sharoitlar kerak?
16. Urug'lar necha kunda unib chiqadi?
17. Urug' va mevalar tabiatda qanday yo'l bilan tarqaladi?
18. Ularning tarqalishi uchun qanday maxsus moslamalar paydo bo'lgan?

4. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita, usul, nazorat, baholash)

- a) Darsning turi – amaliy mashg'ulot
- b) Metod - Vertushka
- v) Forma (shakl) – guruh
- g) Vosita – doska, tarqatma material, tablitsa, tayyor preparat, gerbariy, mulyaj
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish, ko'rish
- j) Baholash – o'z-o'zini va umumiy baholash

5. Metod - Vertushka

Metod – Vertushka metodi

№	Mevalar klas-sifikatsiyasi	Rezavor meva	Soxta meva	Pishgan-da ochiladi-gan qurug'me-va	Dan-akli meva	To'p meva	Pishganda ochilmay-digan quruq meva	Чин ме-ва
1	Bargak							
2	Olma, behi							
3	Yong'oq							
4	Xakalak							
5	Bodring							
6	Qulupnay							
7	Don							
8	Apelsin							
9	Gilos, o'rik							
10	Pista							
11	Murakkab yon-g'oqcha							
12	Malina							
13	Pomidor							
14	Ko'sak							
15	qo'zoq, qo'zoq							

16	cha							
17	Dukkak							
18	Qanotli meva							
19	Tut, anjir							
	Anor							

Bu treningda guruhlarga material tarqatiladi va har bir guruh yakka holda to'g'ri javobni belgilaydi. Keyin bu materiallar guruhlarga aralashtirib beriladi, yana belgilanadi. Guruhlar soniga qarab aylangan-dan keyin o'qituvchi va talabalar bilan umumiy to'g'ri javob belgilaniladi.

6. Mustaqil bajarish uchun vazifa

Ishlash tartibi

- 1 – tajriba: - Pishganda ochilmaydigan quruq mevalar: yong'oq, yong'oqcha, don, hakalak, qanotli, ikki qanotli pista, murakkab yong'oqcha, pistachani gerbariy, tablitsadan o'rganish
- 2 – tajriba: - Pishganda ochiladigan quruq mevalar: qanotli, murakkab qanotli, dukkak, qo'zoq, qo'zoqcha, quticha, bo'qinli qo'zoqlarni gerbariy, tablitsadan o'rganish
- 3 – tajriba: - Bir urug'li va ko'p urug'li ho'l mevalar: olcha, gilos, rezavor mevalar, pomidor, uzum, malina, qulupnayni gerbariy, mulyaj, tablitsadan o'rganish
- 4 – tajriba: - Endospermlil, perispermlil va pallali urug'larni preparat, tablitsalardan o'rganish

Topshiriq: - Mevalarning klassifikatsiyasiga va urug' tuzilishiga oid rasmlarni albomga chizish

Laboratoriya mashg'uloti – 8

Mavzu: “Magnoliyaguldoshlar, ayiqtovondoshlar”

1. Darsning maqsadi:

Magnoliyaguldoshlar Magnoliaceae oilasiga tropik va subtropik mamlakatlarda o'sadigan daraxt va buta o'simliklar kiradi. Bu oilaga kiradigan o'simliklarning gullari yirik, gemitsiklik, changchi va urug'chilari spiral shaklida joylashgan.

Mevasi to'p meva, bargli yoki to'p yong'oqli O'rta Osiyo respublikalarida manzarali o'simlik sifatida – yirik gulli magnoliya – *Magnolia grandiflora* va lola daraxti - *Liriodendron tulifera* ekib o'stiriladi.

Ayiqtovondoshlar Ranunculaceae oilasi 200 dan ortiq turni o'z ichiga olib, vakillari bir va ko'p yillik o't o'simlik. Barglari oddiy, poyaga ketma-ket, qarama-qarshi yoki hamma barglari ildiz oldida joylashgan. Gullari yakka yoki to'pgul, aktinomorf ba'zan zigomorf, gulqo'rg'oni murakkab. Bu oilaning vakillari alkaloid va glikozidlarga boy bo'lgani uchun zaharli hisoblanadi.

2. Darsning vazifasi:

Magnoliyaguldoshlar, ayiqtovondoshlar oilalarining umumiy xarakterli belgilari, o'simliklarning hayotiy formalari, tarqalish areali, oila vakillari, organlarining tuzilishi, tibbiyotda va xo'jalikdagi ahamiyatini o'rganish.

3. O'quv jarayonining mazmuni:

2. Magnoliyaguldoshlar oilasiga xarakteristika
3. Yirik gulli Magnoliya (*M. grandiflora*) o'simligining tuzilishi, ahamiyati
4. Lola daraxti (*L. tulifera*) o'simligining tuzilishi, ahamiyati
5. Ayiqtovondoshlar oilasining xarakterli belgilari
6. Ayiqtovon avlodiga kiradigan o'simliklar, tuzilishi ahamiyati
7. Akonitlar avlodiga kiradigan o'simliklar tuzilishi, ahamiyati
8. Adonis avlodiga kiradigan o'simliklar

4. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita, usul, nazorat, baholash)

- a) Darsning turi – suhbat
- b) Metod – Bumerang, Vertushka
- v) Forma (shakl) – guruh
- g) Vosita – doska, tablitsa, tarqatma material, gerbariy
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko'rish)
- j) Baholash – o'z – o'zini, va umumiy baholash

5. Metod – Vertushka

№	O'simliklar oilalari	Magnoliyaguldoshlar	Ayiqtovondoshlar	Ko'knoriguldoshlar	Karamguldoshlar	Gulhayridoshlar
1	G'o'za – <i>Gossypium</i>					
2	Qrtena – <i>Sisymbrium</i>					
3	Uxlatuvchi ko'knor - <i>Papaver somniferum</i>					
4	Akonit - <i>Aconitum songariicum</i>					
5	Dala ayiqtovoni - <i>Ranunculus arvensis</i>					
6	Yirik gulli magno-liya - <i>Magnolia grandiflora</i>					
7	Tugmachagul - <i>Malva neglecta</i>					
8	Gorchitsa - <i>Sinapis</i>					
9	Qizg'aldoq - <i>Roemeria refracta</i>					
10	Bahorgi adonis - <i>Adonis vernalis</i>					
11	Jag'-jag' - <i>Capsella bursa pastoris</i>					
	Gulxayri - <i>Altea</i>					

12	officinalis Karam - Brassica					
13	olerasia Lola daraxti -					
14	Liriodendron tulipifera					

Bumerang metodi

Talabalar kichik 1 nechta guruhlariga bo'linadi va vazifa yozilgan material tarqatiladi. har bitta guruh o'z fikrlarini bayon qiladi va guruhlar orasida savol javob ketadi.

I – guruh vazifasi

1. Magnoliyaguldoshlar oilasining umumiy belgilari
2. Yirik gulli magnoliya – (M. grandiflora) tuzilishi, ahamiyati
3. Lola daraxti (L. tulifera) – tuzilishi ahamiyati

II – guruh vazifasi

1. Ayiqtovondoshlar oilasiga xarakteristika
2. Ayiqtovon o'simligi tuzilishi, ahamiyati
3. Bahor adonisi o'simligi tuzilishi, ahamiyati

III – guruh vazifasi

1. Ko'knoriguldoshlar oilasiga xarakteristika
2. Uxlatuvchi ko'knor o'simligi tuzilishi
3. Qizg'oldoq – Roemeria o'simligi tuzilish

IV – guruh vazifasi

1. Karamguldoshlar oilasiga xarakteristika
2. Bu oilaga kiradigan sabzavot va begona o't turlari

V – guruh vazifasi

1. Gulxayridoshlar oilasiga xarakteristika
2. Dorivor gulhayri o'simligi tuzilishi
3. G'o'za o'simligi tuzilishi, ahamiyati

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar

Ob'ektlarni o'rganish.

Lola daraxti o'simligi gerbariyidan foydalanib, gulining tuzili-shini o'rganish.

Ayiqtovondoshlar oilasining o'ziga xos belgilarini

a) Gulining formulasi va diagrammasini, muhim ahamiyatga ega bo'lgan vakillarini o'zbekcha va lotincha nomlarini o'rganish

3) Ayiqtovon o'simligini o'rganish vaqtida quyidagilarga ahamiyat bering:

- a) ildizi sochma ildiz
- b) bargining tomirlanishi – to'rsimon
- v) guli va mevasining tuzilishi

4) Djungar parpisi – Akonit (Akonitum) o'simligining tuzilishini o'rganish

Topshiriq: Yuqoridagi keltirilgan oila o'simliklarini albomga rasmi ishlanib, ildiz, poya, barglari, gul formulasi va qismlari

Mavzu: “Ko'knoriguldoshlar, karamguldoshlar va gulhayri-doshlar oilasi”

Darsning maqsadi:

Ko'knoriguldoshlar Papaveraceae oilasiga - o'tsimon, ba'zan buta o'simliklar kiradi. Barglari poyaga ketma-ket joylashadi. Guli to'g'ri yoki noto'g'ri, gulkosa bargchasi 2 ta, ?uncha ochilishida tushib ketadi. Mevasi ko'sakcha. Bu oilaga 30 turkum, 600 tur kiradi.

Gulxayridoshlar Malvaceae oilasiga o'tsimon, buta va daraxt o'simliklar kiradi. Barglari oddiy panjasimon qirqilgan, barg bandi yonida bargyonligi bor. Gullari barg qo'ltig'ida yakka joylashadi yoki poya uchida to'p gul shaklini oladi. Gul tuzilishi to'g'ri, 2 jinsli, changchi iplari o'zaro qo'shilib, trubkani hosil qiladi. Mevasi ko'sakcha, yong'oqcha.

Karamguldoshlar Brassicaceae oilasiga o'tsimon, ba'zan chala butalar kiradi. Barglari oddiy, navbat bilan joylashadi. Gullari to'g'ri, 2 jinsli shingil yoki ro'vak shaklida. Gulkosachasi to'rtta kosachabargdan, gultojsi qarama – qarshi butsimon joylashgan to'rtta tojburgandan tuzilgan. Changchisi oltita, ikkitasi qisqa, to'rttasi uzun bo'ladi.

2. Darsning vazifasi:

Ko'knoriguldoshlar, karamguldoshlar va ayiqtovondoshlar oilalarining umumiy xarakterli belgilari, o'simliklarning hayotiy formalari, tarqalish areali, oila vakillari, organlarining tuzilishi, tibbiyotda va xo'jalikdagi ahamiyatini o'rganish.

3. O'quv jarayonining mazmuni:

1. Ko'knoriguldoshlar oilasining umumiy xarakterli belgilari
2. Ko'knori va Roemeriya avlodlariga kiradigan o'simliklar va ularning tibbiyotdagi ahamiyati
3. Gulxayridoshlar oilasining umumiy xarakterli belgilari.
4. G'o'za va gulhayri o'simligining tuzilishi, yashash sharoiti
5. Bu oilaga mansub o'simliklarning xo'jalikdagi va tibbiyotdagi ahamiyati
6. Karamguldoshlar oilasining o'ziga xos xarakterli belgilari.
7. Bu oilaga kiradigan avlod va turlar xilma – xilligi.
8. Karam, jag'-jag' o'simliklarining tuzilishi.
9. Bu oilaga kiradigan madaniy, dekorativ, begona o't turlari.

4. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita, usul, nazorat, baholash)

- a) Darsning turi – suhbat
- b) Metod – Bumerang, Vertushka
- v) Forma (shakl) – guruh
- g) Vosita – doska, tablitsa, tarqatma material, gerbariy
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko'rish)
- j) Baholash – o'z – o'zini, va umumiy baholash

5. Metod – Vertushka

№	O'simliklar oilalari	Magno- liyagul- doshlar	Ayiqto- vondosh- lar	Ko'knori- guldosh-lar	Karam- guldosh- lar	Gulhay- ridosh- lar
1	G'o'za – Gossypium					
2	Qrtena –Sisymbrium					
3	Uxlatuvchi ko'knor - Papaver somniferum					
4	Akonit - Aconitum songariicum					
5	Dala ayiqtovoni - Ranunculus arvensis					
6	Yirik gulli magno-liya - Magnolia grandiflora					
7	Tugmachagul - Malva neglecta Gorchitsa - Sinapis					
8	Qizg'aldoq -					
9	Roemeria refracta					
10	Bahorgi adonis- Adonis vernalis					
11	Jag'-jag' - Capsella bursa pastoris					
12	Gulxayri - Altea officinalis					
13	Karam - Brassica oleracea					
14	Lola daraxti - Liriodendron tulipifera					

Bumerang metodi

Talabalar kichik 1 nechta guruhlarga bo'linadi va vazifa yozilgan material tarqatiladi. har bitta guruh o'z fikrlarini bayon qiladi va guruhlar orasida savol javob ketadi.

I – guruh vazifasi

1. Ko'knoriguldoshlar oilasiga xarakteristika
2. Uxlatuvchi ko'knor o'simligi tuzilishi
3. Qizg'aldoq – Roemeria o'simligi tuzilish

II – guruh vazifasi

1. Karamguldoshlar oilasiga xarakteristika
2. Bu oilaga kiradigan sabzavot va begona o't turlari

III – guruh vazifasi

1. Gulxayridoshlar oilasiga xarakteristika
2. Dorivor gulxayri o'simligi tuzilishi
3. G'o'za o'simligi tuzilishi, ahamiyati

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar

Ob'ektlarni o'rganish.

Lola daraxti o'simligi gerbariyidan foydalanib, gulining tuzili-shini o'rganish.

Ayiqtovondoshlar oilasining o'ziga xos belgilarini

a) Gulining formulasi va diagrammasini, muhim ahamiyatga ega bo'lgan vakillarini o'zbekcha va lotincha nomlarini o'rganish

3) Ayiqtovon o'simligini o'rganish vaqtida quyidagilarga ahamiyat bering:

a) ildizi sochma ildiz

b) bargining tomirlanishi – to'rsimon

v) guli va mevasining tuzilishi

4) Djungar parpisi – Akonit (Akonitum) o'simligining tuzilishini o'rganish

5) Ko'knoriguldoshlar oilasiga mansub bo'lgan o'simliklarni

a) uxlatuvchi ko'knor – Papaver somniferum L.

b) Tovus ko'knorisi – Papaver pavonium L.

v) Lolaqizg'aldoq - Roemeria refracta L. belgilarini o'rganish

6) Karamguldoshlar oilasiga mansub o'simliklar

Topshiriq: Yuqoridagi keltirilgan oila o'simliklarini albomga rasmi ishlanib, ildiz, poya, barglari, gul formulasi va qismlari yozib qo'yilsin

Laboratoriya mashg'uloti – 10

Mavzu: “Atirguldoshlar, dukkakdoshlar oilasi”

1. Darsning maqsadi:

Atirguldoshlar (Rosaceae) oilasi daraxt, buta, ko'p yillik o't o'simliklardan iborat. Barglar turli shakllarda oddiy, murakkab, yon bargchali. Gullari to'g'ri, 2 jinsli, murakkab gulqo'rg'onli, guldon-gipantiya ya'ni gul qismlarining gul o'rin to'qimalarini birlashishidan vujudga kelgan. Mevalari, bargmeva, ko'sak meva, yong'oq meva, pista, soxta meva, chin meva, to'p meva. Dukkakdoshlar (Fabaceae) oilasiga – daraxt, buta, o'tsimon o'simliklar kiradi. Ba'zi vakillari tropik va subtropik iqlimli o'lkalarda uchraydi, hayotiy shakllari turlicha bo'ladi. Bu oila o'simliklarining poyasi tik, yotib, ilashib, o'ralib o'suvchi, barglari murakkab, yon bargli, ba'zi vakillarida barglarining bir qismi gajakka aylangan. Barg plastinkasi kichik bo'lgan o'simliklarda bandi kengayib, fillodiyga aylangan.

Atirguldoshlar Bu oila 4 ta kenja oilaga:

a) tubul'gulguldoshlar – spiraeoideae

b) atirgullilar - rosoideae

v) olmagullilar – pomoideae

g) olxo'rigullilar - prunoideae

Dukkakdoshlar 3 ta kenja oilaga:

a) Mimosadoshlar – Mimosoideae

b) Sezalpindoshlar - Caesalpiniodeae

v) Kapalakguldoshlar – Papilionatae

2. Darsning vazifasi:

Yuqorida keltirilgan oilalarning umumiy xarakterli belgilari, hayotiy formalari, tarqalish areali, oila vakillari-ning tuzilishi, o'ziga xos tipik belgilari, tibbiyotda va xo'jalikdagi ahamiyati.

3. O'quv jarayonining mazmuni:

2. Atirgullilar oilasining asosiy xarakterli belgilari
3. Tobul'iguldoshlar kenja oilasining xarakterli belgilari va vakillari
4. Atirguldoshlar kenja oilasi va bu oilaga mansub bo'lgan o'simliklari
5. Olmagullilar kenja oilasi va bu oilaga mansub bo'lgan o'simliklari
6. Olxo'rigullilar kenja oilasi va uning vakillari
7. Dukkakdoshlar oilasining xarakterli belgilari
8. Mimosadoshlar kenja oilasi va bu oilaga mansub o'simliklar
9. Tsezalpindoshlar kenja oilasi va uning vakillari
10. Kapalakguldoshlar kenja oilasi va bu oilaga kiradigan o'simliklar
11. Dukkakdoshlar oilasiga kiradigan o'simliklarning xo'jalikdagi ahamiyati

4. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl) vosita, usul, nazorat, baholash)

- a) Darsning turi-suhbat
- b) Metod – Bumerang, Vertushka
- v) Forma (shakl) – guruh
- g) Vosita – doska, tar?atma material, tablitsa, gerbaryi
- d) Usul – nut?li
- e) Nazorat – kuzatish (ko'rish)
- j) Baholash – o'z-o'zini va umumiy baholash

5. Metod. Bumerang, Vertushka

Bumerang metodi

1 – guruhga beriladigan vazifa

1. Atirguldoshlar oilasiga umumiy xarakteristika
2. Tubul'iguldoshlar kenja oilasi o'simliklari
3. Olmaguldoshlar kenja oilasi o'simliklari
4. Olxo'riguldoshlar kenja oilasi o'simliklari

Vertushka metodi

№	Gul formulasi	Atir-gul-dosh-lar oila-	Olma-gul-dosh-lar oila-si	Olxo'-rigul-dosh-lar oila-si	Tu-bul-qi-gul-dosh-	Duk-kak-dosh-lar oila-	Mi-moza-gul-dosh-lar	Tse-zal-pin-gul-dosh-	Sel-der-gul-dosh-lar	Yasnot-kagul-doshlar oilasi	It-uzum-dosh-lar oila-si	Astra-gul-dosh-lar oilasi
---	---------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------------------

		si			lar oila- si	si	oila- si	lar oila- si	oila- si			
1	$Ca_5Co_5 A_\infty$ G_5											
2	$Ca_5 Co_{1+2+(2)}$											
3	$A_{(9)+1} \underline{G}_1$											
4	$Ca_5 Co_5 A_5$ $G_{(2)}$											
5	$Ca_{(5)} Co_5 A_\infty$											
6	G_1											
7	$Ca_{(5)} Co_5 A_5$ G_1											
8	$Ca_{(5)} Co_{(5)} A_5$											
9	G_2											
10	$Ca_{(5)} Co_{(5)} A$ $_{2+2} G_{(2)}$											
11	$Ca_0 Co_{(5)} A_{(5)}$ $G_{(2)}$											
	$Ca_0 Co_{(3)} G_{(2)}$											
	$Ca_{(5)} Co_{(2/3)}$ $A_4 \underline{G}_{(2)}$											
	$Ca_{(5)} Co_5 A_\infty$ G_∞											

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar

Ob'ektlarni o'rganish.

1. a) Na'matak
b) Maymunjon
v) Beshbarg – o'simliklarining morfologiyasini o'rganish
2. a) Do'lana
b) Olma – o'simliklarining morfologiyasini o'rganish
3. a) Bodom
b) Olcha
v) O'rik - o'simliklarining morfologiyasini o'rganish
4. a) Chuchuk miya
b) Beda

v) Astragal - o'simliklarining poyasi, bargi, gul to'plami, mevasini o'rganish
Topshiriq: - Yuqorida keltirilgan oila vakillarining rasmini chizib, gul
formulasi, ahamiyatini albomga yozish.

Laboratoriya mashg'uloti – 11

Mavzu: Mirtadoshlar, jo'kadoshlar oilasi

Darsning maqsadi: Mirtadoshlar Myrtaseae- oilasi. Bu oilaga kiradigan o'simliklar daraxt vabutalar xolida bo'lib, qarama-qarshi joylashgan yonbargsiz barglar chiqoradi. To'qimalarida doimo efir moy chiqoradigan dumaloq lizigen bezchalari bo'ladi. Gullarida turtta yeki beshta kosacha barglar va shuncha gulbargalaridan keyin bir talay otalıkları keladi. Ular bir-birlariga qo'shib turadi. Tugunchasi bir yeki ko'p uyali bo'lib, qadaqsimon gulo'rniga otib turadi, ko'pincha pastki bo'ladi. Mevalari har xil shirali rezavor, danakli, quruq (ko'sakcha, pista). Avstraliyaning janubida o'rmon bo'lib o'sadigan Eucalyptus amygdalina shu jumladandir. Bu juda balan bo'lyi daraxt. Barglarida mumg'ubor borgligidan kulrang tusda bo'ladi. Yesh daraxtlarda barglar odatda serbarg bo'lib, qarama-qarshi joy oladi. Hamda gorizantal tekislikda keng tortadi., bir muncha qariroq daraxtlarda esa barglar boshqacha shaklga kirib (geterofiliya)xodisasiga yaxshi misob bula oladi. Barg uchi qayrilgan qilichga o'xshab qoladi. Barg plastinkasi esa vertikal joylashadi bu esa suvni ortiqcha bo'g'lanishiga yo'l qo'ymaydi. Evkalipt barglarida efir moylari bo'lib, ular parfyumeriya sanoatida va texnikada ishlatiladi.

Jo'kadoshlar (Tilliaceae) oilasi. Bu oilaga kiradigan o'simliklar daraxtlar, butalar, ba'zan o'tlar xolida o'sadi va oddiy, yaxlit yoki bo'laklarga bo'lingan barglar chiqaradi. Barglarida yon bargchalari bo'ladi. Po'stlog'i bilan o'zagida odatda shilimshiq moddalar turadigan kameralari bor. ularning gulkosachasi va gultoji bor, gul barglari ancha yirik, ochiq rangli va nektardonli bo'ladi. Otalıklarning soni xar – xil. Gullari xidli ko'kimtir – sariq to'g'ri tuzilgan ikki jinsli, ba'zan ayrim jinsli bo'ladi. Kosacha va tojibarglari beshtadan, ba'zan tojibargsiz bo'ladi. Otalıkları ko'p yoki 5 – 10 ta. Changdonlari ikki uyali bo'lmay, xamisha 4 uyali bo'ladi. Onaligi bitta ustki tugunchali, mevasi oddiy ko'sakcha yoki bir urug'li yong'oqcha. Urug'i endospermli va seryog' bo'ladi. MDX davlatlarida yurakbarg jo'ka *Tilia cordata* eng ko'p tarqalgvn. Bu simpodial ravishda shoxlangan katta daraxt bo'lib, bargi qalin shox – shabba chiqaradi. Yuraksimon barglari birin – ketin joy olib turadi va kurtaklari yozilganida pardasimon nozik yonbarglarini tashlaydi. Kurtaklar paydo bo'lganda yuzaga keladigan eng birinchi barglarining yonbargchalari metamorfozga uchrab, pushti kurtak tangachalariga aylanadi. Jo'ka yozning o'rtalarida gullaydi va diametri 3 – 5 sm. keladigan qalqonsimon bir talay yirik to'pgullar bilan qoplanadi. To'pgulning umumiy bandida pardaga o'xshagan oppoq yirik gul yon bargi bo'ladi. Bu barg mevalarda xam saqlanib qoladi va mevalarning shamol bilan tarqalishiga yordam beradi. Gulda besh bargli gulkosacha, beshta oq va sal sariq rang gulbargi va besh bog'lam bo'lib turadigan birtalay otalıklar bor. Tugunchasi besh uyali bo'lib yuqorida joylashgan. Xar qaysi uyasida ikkitadan urug' kurtagi bor. Ustuncha boshchasimon tumshuqcha bilan tugallanadi. Mevasi pishib yetilgan paytda tugunchaning beshta uyasidan to'rttasi yoki uchasi yetilmay qoladi, natijada meva ochilmaydigan va bir yoki ikki urug'li bo'lib qoladi. Jo'ka o'ziga xos xushbo'y xid chiqadi, guollarining shu xidi va chiroyli rangi xashorotlarni, jumladan asalarini jalb etadi. Jo'kalar yaxshi asal beruvchi o'simliklar bo'lib, gullagan davrida ertalab va kunning ikkinchi yarmida ko'p miqdorda nektar chiqaradi. Qurtilgan gullari esa tibbiyotda ter chiqaruvchi dori sifatida ishlatiladi.

2. Darsning vazifasi:

Yuqorida keltirilgan oilalarning umumiy xarakterli belgilari, hayotiy formalari, tarqalish areali, oila vakillari-ning tuzilishi, o'ziga xos tipik belgilari, tibbiyotda va xo'jalikdagi ahamiyati.

3. O'quv jarayonining mazmuni:

1. Mirtadoshlar oilasining xarakterli belgilari
2. Bu oilaga mansub evkalipt o'simligi
3. Jo'kadoshlar oilasi va uning vakillari
4. Mirtadoshlar oilasiga kiradigan o'simliklarning tibbiyotdagi va xo'jalikdagi ahamiyati
5. Jo'kadoshlar oilasiga kiradigan o'simliklarning tibbiyotdagi va xo'jalikdagi ahamiyati

4. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl) vosita, usul, nazorat, baholash)

- a) Darsning turi-suhbat
- b) Metod – Bumerang, Vertushka
- v) Forma (shakl) – guruh
- g) Vosita – doska, tar?atma material, tablitsa, gerbariy
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko'rish)
- j) Baholash – o'z-o'zini va umumiy baholash

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar

Ob'ektlarni o'rganish.

1. Gerbariy va tarqatma materiallari yordamida Mirtadoshlar va jo'kadoshlar oilasiga kiradigan o'simliklarni o'rganadilar

Topshiriq: - Yuqorida keltirilgan oila vakillarining rasmini chizib, gul formulasi, ahamiyatini albomga yozish.

Laboratoriya mashg'uloti – 12

Mavzu: “Selderguldoshlar, ituzumdoshlar, yasnotkaguldoshlar oilasi”

Darsning maqsadi:

Selderguldoshlar – (**Apiaceae**) oilasi o'simliklarining poyalari kovak, bo'g'imli, barglari oddiy, gullari to'g'ri, 2 jinsli. Mevasi qo'shaloq pista.

Yasnotkaguldoshlar (Lamiaceae) oilasi o'simliklari poyasi to'rt qirrali, barglari qarama – qarshi joylashgan, gulining tuzilishi, to'pgullari dixaziy, gulqo'rg'oni murakkab bo'lib, tojbarglari ikkitasi birlashib, yuqorigi, uchtasi birlashib, pastki labni hosil qiladi. Changchilari ikki guruhli, ikkitasi kalta, ikkitasi uzun chang iplariga ega. Poya va barglarida efir moylari bo'lgan bezchalar joylashgan.

Ituzumdoshlar (Solanaceae)-oilasi vakillari turli alkaloid-larga boy bo'lishi bilan xarakterlanadi. hayotiy formalari o'tsimon, buta ko'rinishida bo'ladi. Barglari oddiy, gullari yakka, aktinomorf. Mevasi rezavor va ko'sakcha.

2. Darsning vazifasi:

Yuqorida keltirilgan oilalarning umumiy xarakterli belgilari, hayotiy formalari, tarqalish areali, oila vakillari-ning tuzilishi, o'ziga xos tipik belgilari, tibbiyotda va xo'jalikdagi ahamiyati.

3. O'quv jarayonining mazmuni:

1. Selderguldoshlar oilasining umumiy xarakterli belgilari
2. Selderguldoshlar oilasiga kiradigan o'simliklarning tuzilishi, ahamiyati
3. Ituzumdoshlar oilasining umumiy xarakterli belgilari
4. Alkaloid saqlovchi vakillari.
5. Sabzavot sifatida ishlatiladigan vakillari.
6. Yasnotkaguldoshlar oilasining umumiy xarakterli belgilari
7. Bu oilaga kiradigan dorivor o'simlik vakillari
8. Oila vakillarining tibbiyotda va xo'jalikdagi ahamiyati

4. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl) vosita, usul, nazorat, baholash)

- a) Darsning turi-suhbat
- b) Metod – Bumerang, Vertushka
- v) Forma (shakl) – guruh
- g) Vosita – doska, tarqatma material, tablitsa, gerbariy
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko'rish)
- j) Baholash – o'z-o'zini va umumiy baholash

5. Metod. Bumerang, Vertushka

Bumerang metodi

1 – guruhga beriladigan vazifa

1. Soyabonguldoshlar oilasiga umumiy xarakteristika
2. Bu oila vakillarining tuzilishi, ahamiyati

2 – guruhga beriladigan vazifa

1. Ituzumdoshlar oilasiga umumiy xarakteristika
2. Alkaloid saqlovchi vakillari
3. Sabzavot sifatida ishlatiladigan turlari

3 – guruhga beriladigan vazifa

1. Yasnotkaguldoshlar oilasiga umumiy xarakteristika
2. Bu oilaga kiradigan dorivor vakillari

3. Oila vakillarining tibbiyotda va xo'jalikdagi ahamiyati

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar

Ob'ektlarni o'rganish.

1. a) Dorixona ukropi
2. Kashnich
3. v) Sabzi – o'simliklarining poyasi, bargi, guli, mevasining tuzilishini o'rganish
4. a) Yalpiz
5. b) Mavrak
6. v) Tog'jambili
7. g) Qo'ziquloq - o'simliklarining poyasi, bargi, gulining tuzilishini o'rganish
8. a) Bangidevona
9. b) Belladonna
10. v) Mingdevona – o'simliklarining poyasi, bargi, gulining tuzilishini o'rganish
11. a) Oddiy kungabochar
12. b) Bo'yomodaron
13. v) Qoqio't
14. g) Sachrat'i – o'simliklarining poyasi, bargi, gulining tuzilishini o'rganish

Topshiriq: - Yuqorida keltirilgan oila vakillarining rasmini chizib, gul formulasi, ahamiyatini albomga yozish.

Laboratoriya mashg'uloti – 13

Mavzu: "Astragullilar oilasi"

Darsning maqsadi:

Astragullilar (Acteraceae) oilasi o'simliklari o'tsimon, butasimon ko'rinishda. Barglari oddiy, gullari to'pgul – savatcha. Savatchadagi gullari har xil, 5 xil tipda bo'ladi.

a) naysimon b) voronkasimon v) ikki labli gullar g) tilsimon gullar e) soxta tilsimon gullar.

2. Darsning vazifasi:

Yuqorida keltirilgan oilalarning umumiy xarakterli belgilari, hayotiy formalari, tarqalish areali, oila vakillari-ning tuzilishi, o'ziga xos tipik belgilari, tibbiyotda va xo'jalikdagi ahamiyati.

3. O'quv jarayonining mazmuni:

Astragullilar oilasiga umumiy xarakteristika

- a) Naychasimon gullilar kenja oilasiga tushuncha
- b) Tilsimon gullilar kenja oilasiga xarakteristika
- v) Soxta tilsimongullilar kenja oilasi vakillariga xarakteristika
- g) Voronkasimon gullilar kenja oilasi va uning vakillari

4. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl) vosita, usul, nazorat, baholash)

- a) Darsning turi-suhbat
- b) Metod – Vertushka
- v) Forma (shakl) – guruh
- g) Vosita – doska, tarqatma material, tablitsa, gerbary

- d) Usul – nutʻli
 e) Nazorat – kuzatish (koʻrish)
 j) Baholash – oʻz-oʻzini va umumiy baholash

Vertushka metodi

№	Gul formulasi	Atir-gul-doshlar oilasi	Olma-gul-doshlar oilasi	Olxoʻ-rigul-doshlar oilasi	Tu-bul-qi-gul-doshlar oilasi	Duk-kak-doshlar oilasi	Mi-moza-gul-doshlar oilasi	Tse-zal-pin-gul-doshlar oilasi	Sel-der-gul-doshlar oilasi	Yasnot-kagul-doshlar oilasi	It-uzum-doshlar oilasi	Astra-gul-doshlar oilasi
1	$Ca_5 Co_5 A_{\infty}$ G_5											
2	$Ca_5 Co_{1+2+(2)}$ $A_{(9)+1} \underline{G}_1$											
3	$Ca_5 Co_5 A_5$ $G_{(2)}$											
4	$Ca_{(5)} Co_5 A_{\infty}$ G_1											
5	$Ca_{(5)} Co_5 A_5$ G_1											
6	$Ca_{(5)} Co_{(5)} A_5$ G_2											
7	$Ca_{(5)} Co_{(5)} A_{2+2}$ $G_{(2)}$											
8	$Ca_0 Co_{(5)} A_{(5)}$ $G_{(2)}$											
9	$Ca_0 Co_{(3)} G_{(2)}$											
10	$Ca_{(5)} Co_{(2/3)}$ $A_4 \underline{G}_{(2)}$											
11	$Ca_{(5)} Co_5 A_{\infty}$ G_{∞}											

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar

Ob'ektlarni oʻrganish.

- a) Oddiy kungabochar
- b) Bo'ymodaron
- v) Qoqio't
- g) Sachratqi – o'simliklarining poyasi, bargi, gulining tuzilishini o'rganish

Topshiriq: - Yuqorida keltirilgan oila vakillarining rasmini chizib, gul formulasi, ahamiyatini albomga yozish.

Laboratoriya mashg'uloti – 14

Mavzu: “Bir pallalilar sinfi. Liliyagullilar tartibi”

1. Darsning maqsadi:

Bir pallali o'simliklar o'ziga xos belgilari bilan ikki pallalilardan farq qiladi.

Ichki tuzilishida poya va ildizlari birlamchi tuzilishga ega, ya'ni po'stloq va markaziy silindr qismida ikkilamchi paydo qiluvchi to'qima kambiy bo'lmaydi.

Tashqi morfologik belgilarida ham farq bo'ladi: ildizi popuk ildiz, barg tomirlanishi paralel, yoysimon.

Liliyagullilar (Liliales) tartibi ikkita kenja oilaga bo'linadi.

a) Liliyaguldoshlar (Liliaceae)

b) Piyozdoshlar (Alliaceae)

Liliyaguldoshlar kenja oilasi vakillari ildizpoya yoki piyozboshlarga ega. Barglari oddiy, butun qirrali, gul qo'rg'oni gultojisimon. Mevasi rezavor yoki ko'sak.

Piyozdoshlar kenja oilasi vakillari ko'p yillik, piyozboshli, maxsus hidli o't o'simlikdir. Barglari naychasimon. To'pguli oddiy soyabonsimon. Mevasi ko'sakcha.

2. Darsning vazifasi:

Bir pallalilar sinfi, ularning ikki pallali o'simliklardan farqi, Liliyagullilar, qo'ng'irboshsimonlilar tartibiga mansub o'simliklar tuzilishi, hayotiy shakllari, tibbiyotda va xo'jalikdagi ahamiyatini o'rganish.

3. O'quv jarayonining mazmuni:

1. Bir pallali o'simliklarning xarakterli belgilari
2. Piyozdoshlar kenja oilasiga umumiy xarakteristika
 - a) Bu oilaga kiradigan o'simliklarning ahamiyati
3. Liliyagullilar kenja oilasiga umumiy xarakteristika
 - a) Bu oilaga kiradigan o'simliklarning ahamiyati

4. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi.

- a) Darsning turi – suhbat
- b) Metod – Bumerang
- v) Forma (shakl) – guruh
- g) Vosita – doska, tarqatma material, tablitsa, gerbariy
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish
- j) Baholash – o'z-o'zini va umumiy baholash

Bumerang metodi

1 – guruhga beriladigan vazifa

1. Liliyaguldoshlar kenja oilasiga umumiy xarakteristika
2. Shirach avlodi o'simliklari
3. Lolalar avlodi o'simliklari

2 – guruhga beriladigan vazifa

1. Piyozgullilar oilasiga kenja umumiy xarakteristika
2. Piyozlar avlodi o'simliklari
3. Marvaridgul avlodi o'simliklari

3 – guruhga beriladigan vazifa

1. G'alladoshlar oilasiga umumiy xarakteristika
2. Tariqsimonlar kenja oilasi o'simliklari
3. Qo'ng'irboshsimonlar kenja oilasi o'simliklari

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar

Ob'ektlarni o'rganish.

1. Liliyagullilar tartibiga oid o'simliklarni, aniqlagich yordamida kenja oilalarini aniqlab, morfologik belgilarini o'rganish
2. a) Shirach
b) Boychechak
v) Oq gulli liliya
g) Lolalar avlodi – o'simliklarini morfologik belgilarini o'rganish
3. Piyozlar avlodi
a) Piyoz
b) Chesnok
v) Marvaridgul o'simliklarini o'rganish

Topshiriq: - Tablitsa va gerbariyalardan foydalanib, yuqorida keltirilgan O'simliklarning tashqi tuzilishi, gul formulasini albomga chizish.

Laboratoriya mashg'uloti – 15

Mavzu: “Bir pallalilar sinfi. Qo'ng'irboshlilar tartibi”

1. Darsning maqsadi:

Qo'ng'irboshlilar tartibi – Roales turlaridan poyalarida bo'g'imlarining bo'lishi, bo'g'im oraliqlari va barglarida tilchasi bo'lishi bilan farq qiladi.

2. Darsning vazifasi:

Bir pallalilar sinfi, ularning ikki pallali o'simliklardan farqi, Qo'ng'irboshsimonlilar tartibiga mansub o'simliklar tuzilishi, hayotiy shakllari, tibbiyotda va xo'jalikdagi ahamiyatini o'rganish.

3. O'quv jarayonining mazmuni:

G'alladoshlar oilasiga umumiy xarakteristika
 Bambuksimonlar kenja oilasi vakillari
 Tariqsimonlar kenja oilasi vakillari
 Qo'ng'irboshsimonlar kenja oilasi vakillari

4. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi.

- a) Darsning turi – suhbat
- b) Metod – Vertushka
- v) Forma (shakl) – guruh
- g) Vosita – doska, tarqatma material, tablitsa, gerbariy
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish
- j) Baholash – o'z-o'zini va umumiy baholash

5. Metod - Vertushka, Bumerang

Metod – Vertushka

№	O'simlik oilalari va vakillari	Liliya-gullilar kenja oilasi	Piyoz-doshlar kenja oilasi	Bambuk-simonlar oilasi	Tariqsimonlar oilasi	Qo'ng'irboshsimonlar oilasi
1	Shirach					
2	Makkajo'xori					
3	Qumay					
4	Qo'ng'irbosh					
5	Betaga					
6	Bambuk					
7	Lola					
8	Sparja					
9	Boychechak					
10	Hasmaldoq					
11	Yaltirbosh					

12	Yovvoyiy arpa					
13	Shakarqamish					

Ob'ektlarni o'rganish.

1. a) Makkajo'xori
- b) Shakarhamish
- v) Sholi
- g) Suli
- d) Qo'ng'irbosh
- e) Bug'doy – o'simliklarini morfologik belgilarini o'rganish

Topshiriq: - Tablitsa va gerbariylardan foydalanib, yuqorida keltirilgan O'simliklarning tashqi tuzilishi, gul formulasini albomga chizish.

Laboratoriya mashg'uloti – 16 – 17

“Mustaqil ish. Gerbariydan foydalangan holda o'simliklar oilalarini aniqlash”

1. Darsning maqsadi:

Gerbariy namunalari yordamida oilaning tipik vakillari bilan tanishiladi. Bu o'simlik turlarini morfologik analiz qilinadi. Bunda o'simlik ko'zdan kechirilib, ildizi o'q yoki sochma ildizli ekanligi, hayotiy formasi, novdalarining va shoxlarining rangi, bargining tuzilishi, poyada joylanishi kuzatiladi. O'simlikni tashqi tuzilishiga qarab, bir yoki ikki pallali o'simlik ekanligi aniqlanadi. Bunda quyidagilarga e'tibor beriladi. Urug' tuzilishi, bargning shakli, tomirlanishi, poyada joylanishi, gul tuzilishi, ildiz sistemasiga qarab aniqlanadi.

2. Darsning vazifasi:

Ma'ruza va amaliy mashg'ulotda olgan bilimlarini mustahkamlash. O'simliklar morfologiyasi, anatomiyasi va sistematika fanini bir – biriga bog'liqligi bilan tanishish. Mustaqil adabiyotlardan foydalangan holda o'simlik oilalarini va turini aniqlash

3. O'quv jarayonining mazmuni:

O'rganilayotgan o'simlikni hayotiy formasi: bir yillik, ikki va ko'p yillik.

O'rganilayotgan o'simlikni vegetativ organini morfologik tuzilishini:

- a) ildiz sistemasi
- b) poya: o'sishiga qarab, shoxlanishi, metamorfozi
- v) barg: shakli, qirralari, xili, tomirlanishi, metamorfozi

O'rganilayotgan o'simlikni generativ organini tuzilishini:

- a) yakka yoki to'pgul
- b) gul tuzilishi, formulasi
- v) to'pgul xillari
- 4. O'simlikni sinfini: bir yoki ikki pallaligini
- 5. O'simlikni morfologik belgilariga qarab oilasini
- 6. Oilasidan so'ng avlodini
- 7. Avlodidan so'ng turini
- 8. Oila vakillarining geografik tarqalish xarakteri
- 9. Oila vakillarining ekologiyasi va muhofaza qilinishi
- 10. Oila vakillarining xo'jalikda va tibbiyotdagi ahamiyati

4. O'quv jarayonining amalga oshirish texnologiyasi (metod, forma (shakl), vosita, usul, nazorat, baholash

- a) Darsning turi – suhbat
- b) Metod – Blitz o'yin, Vertushka
- v) Forma (shakl) – guruh
- g) Vosita – doska, tarqatma material, tablitsa, gerbariy, lupa
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish (ko'rish)
- j) Baholash – o'z-o'zini va umumiy baholash

5. Metod – Blitz o'yin, Vertushka

Blitz o'yin

Guruh bahosi	Guruh xatosi	To'g'ri javob	Yakka xato	Yakka baho	Guruh ishidan chetlashish	O'simlikning sistematik nomenklaturasi, tuzilishi, hayotiy formasi, ahamiyati
						1. Gultojisi tuzilishiga ko'ra besh a'zoli. 2. Ituzum avlodining turlari bir yillik, ko'p yillik o't, buta o'simlik 3. Er usti poyasining bo'yi 60-100 sm 4. Avlod turlarining ko'pi xalq xo'jaligida muhim ahamiyatga ega 5. Poya, barg, rezavor mevalar, va tuganak mevalar, solanin moddasini saqlaydi 6. Kartoshka ko'p yillik o't o'simlik, uning tugunagida kraxmal, moy, oqsil, vitaminlar bor 7. Bu avlod o'z ichiga 1300 dan ortiq turni oladi. 8. Bu o'simlikning vatani Janubiy Amerika qisoblanadi 9. Barglari oddiy, patsimon chuqur kesilgan 10. Tugunaklaridan spirt va kraxmal olinadi

Bu treningda – talabalarni guruhlariga bo'lib, material tarqatiladi. Guruhtalabalari ketma-ket yozilgan, chalkashtirilgan jumalarni to'g'ri holatda joylashtirishlari kerak. Avvalo “to'g'ri” deb hisoblagan jumla raqamini, tablitsadagi “yakka baho” grafasiga yozib chiqadi. So'ngra oqituvchi tomonidan to'g'ri javob aytilgandan so'ng, noto'g'ri raqamlarini “yakka xato” grafasiga yoziladi. hisoblagandan keyin “guruhbahosi” grafasi oqituvchi tomonidan belgilanadi.

Vertushka metodi

Bu treningda guruhlariga material tarqatiladi va har bir guruhyakka xolda to'g'ri javobni belgilaydi. Keyin bu materiallar guruhlariga aralashtirib beriladi, yana belgilanadi. Guruhlar soniga qarab aylangandan keyin oqituvchi va talabalar bilan umumiy to'g'ri javob belgilaniladi.

№	Oila, tartib, avlod, tur	Ayiqtovon-doshlar	Ko'knorigul-doshlar	Karamguldoshlar	Gulhayridoshlar	Atirguldoshlar	Dukak-doshlar	Selderguldoshlar	Yasnotkaguldoshlar	Ituzumdoshlar
1	Belladonna									
2	Xushbo'y shivid									
3	Qizilmiya									
4	Olxo'ri									
5	Gulbaxmal									
6	Jag'-jag'									
7	Ko'knori									
8	Adonis									
9	Kurtena									
10	Bo'ritaroq									
11	Beshbarg									
12	Burchoq									
13	Kovrak									
14	Bangdevona									
15	Tog'jambili									

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar

O'simlik oilalarini xarakterlashda o'simlik turlarining yashash sharoitlari, hayotiy formalari, poya, barglarining yashash sharoitiga moslashishi va o'ziga xos xususiyatlari, gul formulasi, tarqalish xususiyatlariga e'tibor beriladi.

O'simlik oilasi, avlodi, turi aniqlangandan so'ng, albomga o'simlik rasmi ishlanadi. Gul formulasini yozib, o'simlikni sistematik nomenklaturasi yoziladi:

I. Tartib. Araliyagullilar (Araliales)

Oila: Selderguldoshlar - Apiaceae

Tur: Yovvoyi sabzi – *Daucus carota*

Xushbo'y shivid - *Anethum graveolens*

II. Tartib: Atirgullilar tartibi - Rosales

Oila: Atirgullilar - Rosaceae
Kenja oila: Olmadoshlar – Pomoideae
Tur: Yovvoyi olma - Malus silvestris
Kenja oila: Olxo'ridoshlar - Prunoideae
Tur: Oddiy bodom - Amygdalis sommunis

Topshiriq : - Aniqlab o'rganilgan o'simlik turlarini rasmlarini albomga chizish.

Laboratoriya mashg'uloti – 18

«Ekologiya, fitotsenologiya va o'simliklar geografiyasi».

1. Darsning maqsadi:

Ekologiya – tirik organizmlarning yashash sharoiti va ularning o'zi yashab turgan muhit bilan o'zaro murakkab munosabatlari hamda shu asosda vujudga keladigan qonuniyatlarni o'rganadi. Populyatsiyalar, turlar, biotsenozlar, biogeotsenozlar va biosfera kabi tushunchalar ekologiya fanining manbai hisoblanadi. Ekologiya to'rtta bo'limga bo'lib o'rganiladi:

- a) autekologiya
- b) populyatsiyalar ekologiyasi
- v) sinekologiya
- g) biosfera

Fitotsenologiya o'simliklar guruhining shu mazkur territoriyaga bog'liq holda tuzilishini va ularning taqsimlanishini o'rgatadi.

O'simlik turlarning er kurrasi bo'ylab tarqalishi ma'lum qonuniyat asosida bo'lib, ular quyidagilardan iborat. Iqlimning o'zgarishi, tog'larda iqlim va tuproq sharoiti xar xil.

Tropik va subtropik iqlim sharoiti qulay, shuning uchun o'simlik dunyosi boy.

O'simliklar geografiyasi ularning er yuzida tarqalish va taqsimlanish qonuniyatlari va sabablarini o'rgatadi. O'simliklar geografiyasi tarixiy geografiya, o'simliklar morfologiyasi, zoogeografiya fanlarining ilmiy ma'lumotlariga asoslanadi.

2. Darsning vazifasi:

O'simliklar ekologiyasi, ekologik faktorlar, o'simliklarning xayotiy formalari, o'simliklar qoplami, va ularning xilma-xilligi, flora, o'simliklar areali, o'simlik qoplaminin xillarini o'rganish.

3. O'quv jarayonining mazmuni:

1. O'simliklar ekologiyasi haqida
2. Ekologik muhit ta'rifi va tasniflanishi
3. Ekologik omillarni organizmga ta'siri
4. Abiotik omillar ta'siri
5. Biotik omillar ta'siri
6. Antropogen omillar ta'siri
7. O'simliklarning tuproq va havo namligiga bo'lgan talabiga ko'ra yashash sharoitlariga qarab xillari:
 - a) kserofitlar
 - b) mezofitlar
 - v) gigrofitlar
 - g) gidrofitlar

8. Raunkler sistemasiga ko'ra, o'simlik guruhlari:

- a) fanerofitlar
- b) xamefitlar
- v) gemikriptofitlar
- g) kriptofitlar
- d) terofitlar

4. O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi

- a) darsning turi-suhbat
- b) metod-Vertushka
- v) Forma (shakl) – guruh
- g) Vosita – doska, tarqatma material, tablitsa, gerbariy
- d) Usul – nutqli
- e) Nazorat – kuzatish
- j) Baholash – o'z-o'zini va umumiy baholash

5. Metod – Vertushka

Vertushka metodi

Bu treningda guruhlariga material tarqatiladi va har bir guruhyakka holda to'g'ri javobni belgilaydi. Keyin bu materiallar guruhlariga aralashtirib beriladi, yana belgilanadi. Guruhlar soniga qarab aylangan-dan keyin oqituvchi va talabalar bilan umumiy to'g'ri javob belgilaniladi.

Omillar to'g'risida ma'umotlar	Biotik omil	Abiotik omil	Antropogen omil
1. Odamlarning o'simlik turlari yoki o'simlik gu-ruhlarining tuzilishiga ko'rsatgan ta'siri 2. Iqlim, geologik, edafik, orografik va gidrologik: yorug'lik, harorat, havo namligi, shamol 3. Yuksak va tuban o'sim-liklarning organizmga ta'siri 4. Er osti suvlar, er asosiy modulining fizikaviy xususiyati va kimyoviy tarkibi 5. Organizmga barcha hay-vonlarning ta'siri			

6. Mustaqil bajarish uchun vazifalar

Ob'ektlarni o'rganish:

Turli ekologik sharoitlarda tog', o'rmon, cho'l sharoitlarida o'suvchi o'simliklarni tablitsa, gerbariydan o'rganish

Tablitsa va gerbariyalardan foydalangan holda o'simlikning morfologik belgilari ildiz, poya, barg, gul tuzilishini o'rganib, yozib olish
Morfologik belgilariga asoslanib, o'simlikning yashash sharoitini (kserofit, mezofit, gidrofit) o'rganish
O'simliklarning hayotiy formalarini (daraxt, buta, chalabuta, bir yillik, ikki yillik, ko'p yillik o'tlar, efemer va efemeroidlar) o'rganish.


Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.
2. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A. Botanika. – T.: O'zbekiston, 2005.- 435 b.
3. Mustafaev S.M., Ahmedov O'.A., Samatova SH. O'simliklar sistematikasidan amaliy mashg'ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
4. Ahmedov O'.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elaktron darslik.-T.: 2008.
5. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –
6. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
7. Hamidov A., Nabiev M.M. “O'zbekiston o'simliklarini aniqlagichi”.-T.: 1987.-235 b.
8. Василев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “ Высшая школа ”, 1988. -435 с.
9. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O'.A. va boshqalar. Dorivor o'simliklarning lotincha-o'zbekcha-ruscha-arabcha va forsha-tojikcha lug'ati.-T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
10. Berezovskaya T.P., Dmitruk S.E., Grishinna e.I., Belousov M.V. Основы farmatsevticheskoy botaniki. – Tomsk: Pechatnaya manifaktura, 2004.-294 s.
11. Xolmatov X.X., Ahmedov O'. A. Farmakognoziya. 1-2 qism. – T.: “Ibn Sino” nashiryoti, 2007.- 806 b.
12. Гилберт С. Биология развития: в 2 т. /пер. с англ. - М., 1994
13. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. Т. 1-2. – М.: «Мир», 1990.
14. Эсау К. Анатомия семенных растений: в 2 кн. /пер. с англ. - М., 1980.



Botanika fani mazmunidagi muammoli masalalarni o‘qitishda Keysdan foydalanish yuqori samara beradi. Fanning mazmunidan kelib chiqqan holda, tirik orgnizmlarda boradigan jarayonlarning tashqi va ichki , ob’ektiv va sub’ektiv omillarn yuzasidan muammoli vaziyatlar yaratilib ularni xal etish uchun o‘quv munozoralarini tashkil etiladi. Botanikani o‘qitishda dastur mazmunidagi evolyutsion tushunchalar, etakchilik qilgan, shuningdek munozorali “O‘simliklarning paydo bo‘lishi, tuzilishi, riojlanishi, ko‘payishi va eklogik muhitga moslanishi” kabi mavzularni o‘qitishda foydalanish mumkin. Fanni o‘qitishda rasmni izohlashda biologik diktantlar muhim o‘rin tutib, talabalarga ob’ektni tanish, ob’ektlarni o‘rtasida farqlarni aniqlashda xam Keys stadidan foydalanish imkoniyati mavjud.

1-Keys . Mavzu: Hujayralarning tuzilishi



<p>Rasmlarga qarab o‘simlik va hayvon hujayralarning uxshash va farq qiluvchi organoidlarni toping. Ularni bajaradigan funksiyalar haqida ma’lumot bering</p>		
<p>uxshash organoidalar</p>	<p>farq qiluvchi organoidlar</p>	<p>organoidlar bajaradigan funksiyalar</p>

2 keys. Bizga ma'lumki gulning urug'chisi biomorfogeneziga ko'ra monokarp, apokarp, senokarp va psevdomonokarp tuzilishga bo'linadi. Monokarp tuzilishi bitta mevachibargdan hosil bo'ladi va gulda bitta bo'lishi bilan xarakterlanadi. Urug'chisi monokarp tuzilishga ega bo'lgan o'simliklarga urik, shaftoli, olxurilarni misol keltirishimiz mumkin. Bu o'simliklar bir danakli bo'lishi bilan farq qiladi. Bundan tashqari dukkardoshlar oilasi vakillarining urug'chisi ham monokarp tuzilishga ega. Ammo ularning ba'zi vakillari ko'p urug'li bo'ladi masalan loviya, mosh, akatsiya. Nima uchun dukkakli o'simliklar urug'chisi bitta bo'lishiga qaramay ko'p urug' hosil qiladi.

Keysni bajarish bo'yicha topshiriqlar:

1. Gulning tuzilishini tavsiflab bering
2. Urug'chi tuzilishini, qanday qismlardan tashkil topganligini tushuntiring
3. Monokarp, apokarp, senokarp, psevdomonokarp urug'chilarni bir biridan farqini izohlang va jadvalni to'ldiring
4. Urug'ni hosil bo'lishi urug' kurtaklar soniga bog'liqligini tushuntiring

monokarp	apokarp	senokarp	psevdomonokarp

3- keys. Suv o'tlarning tarkibida xlorofill pigmenti bo'lganligi sababli avtotrof organizmlar hisoblanadi. Xlorofill pigmentining asosiy funksiyasi fotosintezni amalga oshirish. Ammo ba'zi suv o'tlarda masalan qizil va qo'ng'ir suv o'tlarida xlorofill pigmentidan tashqari fikotsian va fukoksantin pigmentlari mavjud. Aytinchu bu pigmentlar suv utlariga rang berishdan tashqari qanaqa vazifani bajaradi.

Keysni bajarish bo'yicha topshiriqlar:

1. Suv o'tlarning tuzilishi, ko'payishi va rivojlanishi haqida ma'lumot bering
2. Suv o'tlarni pigmentlariga qarab klassifikatsiyasini tushuntiring
3. Dengiz va okeanlarda o'sadigan suv o'tlarda fotosintez jarayoni qanday amalga oshishini tushuntiring.

4- Keys. Yuksak taraqqiy etgan o'simliklarda ya'ni ochiq va yopiq urug'li o'simliklarda gametofit nasli urug'kurtak ichida joylashgan. Urug'kurtaklar tuzilishi jihatidan ham deyarli farq qilmaydi. Ammo urug'lanish jarayonida farqlar mavjud, ushbu farqlarni aytib o'ting. Bunday urug'lanish o'simliklarning yashash muhitining ta'siri bor yo'qligini isbotlang.

Keysni bajarish bo'yicha topshiriqlar:

1. Ochiq va yopiq urug'li o'simliklar haqida ma'lumot bering
2. Urug'kurtakning shakllanishini tushuntiring va changlanish jarayonlari haqida ma'lumot bering
3. urug'lanish jarayoniga tashqi omillarning ta'siri haqida ma'lumotga ega bo'ling.

1. Tirik tabiatning tarixiy jarayonida paydo bo'lishi, simbioz nazariyasi. Avtotrof va geterotrof organizmlarning tabiatdagi modda almashinuvida tutgan o'rni. Yer biosferasi. O'simliklar - dorivor mahsulotlarning manbai.
2. Endoplazmatik to'r. Membranalar. Plazmolemma va tonoplast. Organoidlar. Goldji apparati. Lizosoma, mikronaychalar, ribosoma va boshqalar, kimyoviy tarkibi, Oqsil sintezida ribosomaning vazifasi. Mitoxondriyalarni tuzilishi, vazifasi va energiya manbai ekanligi. Oksidlanish va qaytarilish jarayonlari. Nuklein kislota (RNK va DNK). Xromosoma. DNK ni sintezi. Genetik kod. Matriks va mikro fibrillar. Hujayra po'stini paydo bo'lishida fragmoplast, diktiasomani vazifasi va biologik ahamiyati. Hujayralararo modda almashinuvi, plazmodesma va uning vazifasi.
3. To'qimalarning hosil bo'lishi. Mexanik to'qimalarni o'tli va daraxt o'simliklaridagi xillari, joylashishi. O'tkazuvchi to'qimalarning o'tli va daraxt o'simliklarida joylashishi, ahamiyati. Ajratuvchi to'qimalarning o'simlikda uchrash joylari, ahamiyati. Asosiy to'qimalarda to'planadigan moddalar va ularning vazifasi.
4. Asosiy morfologik qonuniyatlar: simmetriya turlari, metamorfoz. Analogik va gomologik organlar. Ildiz oziqlanish va moddalarni sintez qiladigan qism. O'simliklarda mineral moddalarning miqdori. Makro- va mikro elementlar. Mineral moddalarning o'simlik hayotidagi o'rni. Azotning o'simlik hayotidagi o'rni. Dukkakli va ayrim o'simliklarda azotning o'zlashtirilishi. O'g'it va uning o'simlik rivojlanishidagi ahamiyati. O'simliklarda kerakli moddalarni to'planishida mineral moddalarning ahamiyati. O'simliklarni minerallar bilan oziqlantirish.
5. Qutblanish, yuksak o'simliklarni vegetativ organlari: poya, kurtak tuzilishi va o'sish nuqtasi. Joylanishi bo'yicha kurtak turlari: uchki, yon, qo'shimcha kurtaklar. Vegetativ va aralash kurtaklar. G'uncha.
6. Barglarning paydo bo'lishi. Barglarning o'sishi. Barglarning tibbiyotdagi ahamiyati. Barglarning ichki tuzilishiga ta'sir etadigan omillar.
7. Xlorofill, karotin va boshqa pigmentlarni fotosintezda ishtirok etishi. Fotosintezni ikki fazasi: yorug'lik va qorong'ulikda bo'ladigan jarayonlar. Yorug'lik fazasida elektronlarni o'tish mexanizmi. Tashqi taasurotni fotosintez jarayoniga ta'siri. Suv bug'lantirish va uning biologik ahamiyati. O'simliklarda suvning miqdori va qurg'oqchilikka qarshi kurash. Katta va kichik hayotiy davr, fotoperiodizm. Ontogenez bo'limlari. O'simliklarni rivojlanish davri. Uzun, qisqa kundagi o'simliklar. O'simlik tana qismlarining rivojlanishiga bog'liqligi.
8. O'simliklar sistematikasi. O'simliklar guruhlarining morfologik, anatomik, embriologik belgi, xususiyatlariga asoslanib tasniflash va guruhlarining tabiiy qarindoshligiga qarab, o'simlik oilasining evolyutsion jarayonini ifodalaydigan ma'lum tizimda joylashtirish. har xil o'simliklarni muayyan guruhlarga birlashtirish yoki ular orasidagi farqni aniqlashga yordam beradigan sistematik belgilari.
9. Tuban sporal o'simliklarga tavsif, ularning tasniflash. Suv o'tlarining rivojlanish davri va sinflarga bo'linishi: ulotrikslar, sifonlilar, ularning umumiy xususiyatlari. Suv o'tlarining asosiy vakillari (xlomidomanada, ulotriks, ulva, kaulerpa, vosheriya, spirogira). Yashil suv o'tlarining ahamiyati. Oq qayindagi chaga zamburug'i va uning tibbiyotdagi ahamiyati.
10. Yuksak sporal o'simliklarning kelib chiqishi. Torf hosil qiluvchi moxlar, funariya moxi, tuzilishi, turlari, ahamiyati. Selaginella, tuzilishi, ko'payishi.
11. Suv qirqqulog'i. Urug'li qirqquloqlar va bennetitlar-yo'qolib ketgan ochiq urug'lilar.

- 12.** Yopiq urug'li o'simliklar tasnifi. Bir va ikki pallali o'simliklarni farqlari.
Gulning kelib chiqishidagi asosiy qonuniyatlar: evant, psevdant nazariyalari. Gul evolyutsiyasining asosiy yo'nalishlari. Bir va ikki pallali o'simliklar gullarining farqlari.
- 13.** Meva. Mevalarni aniqlash. Meva xillari. Urug'chini tuzilishiga qarab mevalarni tasniflash. Apokarp, monokarp, senokarp va psevdomonokarp mevalar. O'simliklarni urug' va mevalar orqali tarqalishi. Avtoxoriya va alloxoriya. Turli usullarda mevalarni tarqalishi: anemoxor, zoxoxor, gidroxor va boshqalar. Urug' tuzilishi.
- 14.** Yopiq urug'li o'simliklarni kelib chiqishi, ularning tasnifi. Bir va ikki pallali o'simliklar tavsifi, oilalari. qichitqigullilar tartibi, shu tartibga kiruvchi oilalar, ularning vakillari, tuzilishi va ahamiyati.
- 15.** Kampirchopondoshlar oilasi o'simliklari tuzilishi va ahamiyati. Chinniguldoshlar oilasiga tavsif. Asosiy vakillari.
- 16.** Otquloqdoshlar (torondoshlar) oilasi tavsifi, asosiy vakillari. Valerianadoshlar oilasi va vakillari.
- 17.** Bir pallali o'simliklarni ikki pallali o'simliklardan farqi. O'simliklarni hayotiy shakllari, o'simliklar qoplami, o'simliklar florasi, o'simliklar areali va tarqalishi. O'simliklarni madaniylashtirish, o'simlik qoplami xillari haqida tushuncha.
O'zbekiston florasining eng muhim elementlari. Yer sharining floristik viloyatlari. hayvonlar va insonlar ta'siri-biologik omildir. O'simliklarni introduksiyalash-iqlimlashtirish.
Fitotsenozlar (o'simliklar jamoalari), o'simliklar dunyosi va o'simliklar qoplami haqida tushuncha. O'simliklar qoplami geografiyasi. Yer shari o'simliklar qoplami kenglik zonalari. O'zbekistonning o'simlik mintaqalari (vertikal zonaligi), cho'l, tog' va yaylov. Adir va uning xususiyati. Tog' zonasining belgilari. Vohalar, to'qayzorlar.
- 18.** O'zbekiston o'simliklar qoplami tiplari. Psammofitlar. Gipsofitlar. Gallofitlar. Kserofitlar. Mezofitlar. Gigrofitlar. Efemer va efemeroidlar haqida tushuncha. Subalp va alp (baland tog') o'tloqlari.
-

VII. ГЛОССАРИЙ



Termin	O'zbek tilidagi sharhi	Ingliz tilidagi sharhi	Rus tilidagi sharhi
biomorfofen ez	–(gr.bios-hayot, morphe – shakl, genesis – chiqib kelish) organizmlardagi biologik va morfologik xususiyatlarining ularning fellogenenez yoki ontogenezdagi yashash sharoitlariga qarab o'zgarishi va rivojlanishi.	(gr.bios life, morphing shape, Genesis to come out) and morphological characteristics of their fellogenes or ontogeny of an organism living conditions change and development.	(гр. bios - жизнь, morphe - форма, , genesis происхождение) развитие биологического и морфологического организма и их феллогенетического и онтогенетического жизненность их изменение и развитие
biomorfolo giya	–(gr.bios-hayot, morphe – shakl, logos- ta'limot) tirik organizmlarning tashqi tuzilishini o'rganuvchi fan.	(gr.bios life, morphing shapes, logos-education) science that studies the structure of living organisms.	(гр. bios - жизнь, morphe - форма. logos -наука) наука об изучение внешних структур в живых организмах
vakuola	o'simlik xujayrasida endoplazmatik to'rdan hosil bo'ladigan, hujayra shirasi bilan to'lgan bo'shliq.	tumor cells in tissue endoplasmatic s four cell space filled with juice formed.	Производные эндоплазматической сети, и заполненные водянистым содержимым клеточным соком.
kariologiya	sitologiyaning hujayra yadrosini tuzilishini o'rganuvchi bo'lim.	learning class of structure of the cell nucleus.	Изучение клеточного ядра в цитологии
karioplazma	yadroshirasi	juice of the core.	Ядрочный сок
tsellyuloza	hujayrapo'sti.(kletchatka)	the cell's crust. (Fiber)	Клеточная оболочка (клетчатка)
gemitsellyul	yarimkletchatka,	hemicellulose	Полу

oza	ikkitiptagipolisaxaridgeksozavapentozanlardaniborat	fiber-two class of polysaccharides hexose and pentose.	клетчатка состоящая из двух типов полисахаридов гексозы и пентозы
osmotikbosim	hujayrashirasidaeriganmoddalarma'lumbosimhosilqilishi	osmotic pressure- cell to produce a certain pressure of dissolved substances in the juice.	Растворение в клетчатом соке вещества под определенным давлением
plazmoliz	hujayraningdevorlaridansitoplazmaqochadivanatijadahujayraningbo'shshikuzatiladi	plasmolysis- flee from the walls of the cell cytoplasm and at the cell eroded observed.	Отделение цитоплазмы от клетки и в итоге получается опустения клетки
deaplazmoli z	hujayraning turgor holatiga o'tishi	deplasmolysis- cell mode	Переход клетки в состоянии тургор
turgor	hujayraningtaranglashishi	standing- the tension of the cell	Напряжение клетки
sitoplazma	o'simliklartirikhujayrasiningshilimshiqsimonrangsizsuyuqlik	cytoplasm- of plants living cell to muciform colorless liquid	Бесцветный слиз в живом органическом клетке
tonoplast	sitoplazmaningvakuolagataqaladiganichkiqavati	rooted in the vacuole protoplasm the inner layer	Отделяющая клеточные вакуоли от цитоплазмы в внутренний слой
plazmolemma-	sitoplazmaninghujayradevorigataqaladigantashqiqavati	rooted in the cell wall of the outer layer of protoplasm	наружная поверхностная мембрана цитоплазмы
mezoplazma	protoplazmaningasosiyqismi	themain part of the protoplasm.	Основная часть протоплазмы
xloroplast	yashil plastidalar	green plastids	Зеленые пластиды
xromoplast	qizil yoki sariq plastid	red or yellow plastid	Красные или желтые

			пластиды
leykoplast	rangsizplastida	colourless plastid	Бесцветная пластида
kollenxima	o'simlikning mexanik to'qimalaridan biri. hujayra qobiqining qalinlashuvi tufayli shunday to'qima hosil bo'ladi.	collenchyma - one of the mechanical plant tissue. due to crustal thickening of tissue cells.	Механические ткани в растениях, связано с утолщением клеточной оболочки
stereid	poyaning po'stloq qismida joylashgan yog'ochlik tolasi	stereid- located in the stem bark of wood fiber	древесные волокна расположены в стебле растения
sklarenxema	hujayra qobiqi qalinlashgan va hujayralari bir-biriga zich joylashgan mexanik to'qima	sclerenchyma- crustal thickening of the cell and the cell density, mechanical tissue	Утолщенные клеточные оболочки и тесно расположенные клетки в механическая ткань
libriform	poyaning yog'ochlik qismida joylashgan yog'ochlik tolasi	libriform- zone part of the timber and wood fiber	Расположение древесной части в стебле древесные волокна
sklereid	juda qalin qobiqi yog'ochlashgan po'stli, radial kanalchalar shaklidagi o'lik parenxim hujayralidan tashkil topgan tosh hujayra	sklereid- very thick crust, wood posts, in the form of radial tubules dead cells of parenchyma of the stone cell	Очень утолщенная древесная оболочка, состоящих из каналов радиальных мертвых паренхиматических клеток
ksilema	o'simlikning yog'ochli qismi	xylem-the part of the plant wood	Древесная часть растений
floema	o'simlikning po'stloq qismidagi lub	phloem-the bark of the plant part bast	Луб в коре растения
kollateral	lub va yog'och hujayralari bir-biriga yonma- yon	collaterals-	Расположены

bog'lamlar	yondashgan o'tkazuvchi bog'lamlar	connection bast and the timber holding cells coexist approach each other node	е лубовые и древесные клетки рядом спроводящими тканями
trixoma	epiderma hujayralaridan hosil bo'lib, kutikula ostida efir moylarini to'pladigan tashqi ajratuvchi to'qima	trichome-epidermis cells, tissue collected under cuticule essential oils are separated	Состоявшийся из клеток эпидермы, собирающий в себе эфирные масла находятся в выделительном ткани.
emergentlar	bezchalarning hosil bo'lishida po'stloq parenxima hujayralari ham ishtirok etadi, ular o'smalar ham deb ataladi	emergent-bark of glands parenchyma tissue cells are involved, they are also called tumors	Эмергенты – при появлении идиобластов участвует паренхима корой клетки, они называются
nektardonlar	o'simlikning gulida bo'lib, o'zidan qandsimon suyuqlik ajratadi	nectarine-plants have flowers, which separates the liquid itself sugarly	Они находятся в цветке растений, и выделяет сахарный сок.
gidatodlar	ba'zi o'simliklarda tomchilatib turadigan suv teshiklari	gidatodlar some of the holes in the plant drip water	В некоторых растениях выделяющие капелек воды изособых устицах
idioblastlar	o'z shakli va funktsiyasi bilan to'qimadagi boshqa hujayralardan farq qiluvchi maxsus hujayralar . Tarkibida tuz, oshlovchi moddalar, terpen va shilimshiq moddalar to'playdi	idioblast-the surest form and function of tissues other cells different from specialized cells. Containing salt, chemical substances, terpenes and slimyballs.	Различающийся из остальных клеток со своими различными формами и функциями эти специальные клетки содержащие соли, дубильные вещества, терпены и слиз
skhisogen-	to'qimalarda hujayra oraliq bo'shliqlarning kengayishi natijasida hosil bo'ladi	skhisogen-tissue formed as a result of the expansion of the cell	Появляется в связи с межклеточным расширением клеток.

		cavities	
lizigen	to'qimadagi hujayra qobiqining erib ketishi natijasida hosil bo'ladi	lysigen- tissue cells in the melting of crustal for med as a result of	Происходит при растворении оболочки клетки
aerenxima	shamolatuvcchi asosiy to'qima	aerenchyma-winding tissue	Основная воздухоносная ткан.
vellamen	ko'p qavatli suv shimuvchi ilma-teshik o'lik hujayralarda tashkil topgan, havo ildizlarida uchraydi	vellamen-multi-storey dead in the water absorbent unpatched holes occurs in the cells of the root	Составляет многослойные впитывающие мертвые клетки, встречаются в воздушных корнях.
Morfologiya	o'simliklarning tashqi tuzilishi va shakllanishi haqidagi fan	morphology-the Science of the formation and structure of the external plants	Наука об формировании и внешнего строения растения
simmetrililik	o'simlik organlarining o'qqa nisbatan joylanishidagi bir xillilikka aytiladi	symmetry-plant authorities said uniform shot provisions	Одинаковое расположение органов растений по оси.
radial simmetrililik	silindrsimon poya, sharsimon mevalardan turli darajada tekislik o'tkazilganda teng qismlarga ajraladi	radial symmetry-systems are cylindrical, spherical fruit in a different plane to break up in equal parts	Цилиндровая стебел, при провидении плоскости круглых плод разделяющийс я на одинаковые части.
bilateral simmetrililik -	o'simlik organlarini faqat ikki teng qismga ajratish mumkin	bilateral symmetry-plant can be divided into two equal bodies	Органы растений можно разделит толко на две части.
assimetrik-	o'simlik organlaridan bitta ham ham tekislik ham o'tkazib bo'lmaydi	asymmetry-the bodies of the plant not missed a single plane	Невозможно провести ни одной плоскости в органах растений
gomologik	- kelib chiqishi bir xil, ya'ni bir tipdagi	homology- the	Происхождени

organ	kurtaklardan hosil bo'ladi, vazifasi bir-xil yoki har xil bo'lishi mumkin	same as the origin of the body, which is formed in the body of a type of function may be the same or different	е одинаковые, а именно произошедших из одинаковых почек, выполняет одинаковые или разные функции
anologik organ	– evolyuttsiya jihatidan har xil organ vujudga kelgan doimo o'xshash vazifani bajaradi	analogues- in terms of body evolution like always arise in a variety of body functions	По происхождению и эволюции органы разного типа всегда выполняют одинаковые функции
rizoid	- ildiz o'rnida bir yoki ko'p hujayrali tuklar	rhizoid- hair root instead of a single or multiple cell	Вместо корня одна или несколько многоклеточных ресничек
mikoriza	–ildizda zamburuqlarning simbioz yashashiga aytiladi	mycorrhizae - ildizdazamburuqlarning is said to live in symbiosis	Совместное соседство корня с грибами
ekzoderma	- birlamchi po'stloqning tashqi qavati	exoderm- primary peels outer	Первичная покровная ткан внеснего слоя
mezoderma	- birlamchi po'stloqning o'rta qavati	mesoderm- primary peels middle layer	Первичная средняя покровная ткан
endoderma	- birlamchi po'stloqning ichki qavati	endoderm- primary peels inner layer	Первичная внутренняя покровная ткан
geotropizm	- erning tortishish kuchi, ya'ni o'simlik organlarning erga nisbatan yo'nalishi xususiyati	geotropism- the force of gravity, that is, plant bodies the direction of the earth property	Сила протезении земли, тоист направление органов растений в землю
geliotropizm	– o'simlik organlarning quyoshga nisbatan yo'nalish xususiyati.	heliotropism- plant bodies against the sun direction feature	Свойства роста органов растений к солнцу.
gipokotil	-poyaning ildiz bo'ynidan urug'palla	hypocotyl-	Част от

	bargchasi gacha bo'lgan qismi	zone root neck to the leaf which is part of the cotyledon	схейного корня стебля до двудолного листа
Epikotil	– poyaning urug'palla bargi bilan birinchi chin bargi orasidagi qismi	epicotyl- zone cotyledon leaf maple between the part leaf	Част от двудолного листа до настоящего листа
vegetativ kurtak-	yon novda va barg hosil qiladagan kurtak	vegetative bud-side bar and Kono leaf bud	Почка образующий боковую почку и лист
generativ kurtak-	gul hosil qiluvchi kurtak	generative bud- flower bud	Почка образующий цветок
monopodial shoxlanish	– poya shoxlanishning bir turi, o'simlikning asosiy o'qi o'sishi davom etadi va yon tomonidagi o'suv nuqtasidan pastroqda shoxlar chiqaradi	monopodial branches - the type of stalk branches on the side of the main axis of the plant will continue to grow and horns, which is below the growth point	Одна извид ветвлений стебля, продолжается развития основной оси и с боковой оси продолжает развития ветвей
simpodial shoxlanish	– asosiy poyadagi ichki kurtak o'sishdan to'xtaydi, qurib qoladi yoki o'smay tikanga, jingalakka aylanadi. O'simlikning uchki kurtagi yon kurtaklar o'sib chiqadi	simpodial branches - the main stem bud growth stops, drying up or a tumor behind, curly converted. Plant sparks side shoots grow from the bud	В основной стебле останавливается развития почки, они засыхают или превращаются в щип, завивку. От верхней почки развиваются боковые почки
dixotomik shoxlanish	- o'simlik tanasining o'sish nuqtasi hujayralari bo'linib, bir-biriga teng ikkita yangi novda hosil qiladi	dichotomy-point increase in the body of the plant branches divided into cells, each equal to two new stick will	В точке роста растений клетки делятся на две части и происходит новое побеги.

metamorfoz –	o‘simlikning tarixiy taraqqiyot jarayonida muayyan vazifani bajarishga moslasha borishi natijasida organlarning o‘zgarishi	metamorphosis - the process of historical development of the plant metamorphosis a result of fit in with the specific task changes in organs	в связи с развитием эволюции выполняя определенную функцию изменение органов растений.
radial nurlar	– o‘zak nurlari	radial rays - the rays of the core	Проводящий пучок
yog‘ochlik yadrosi	- daraxtsimon o‘simlik poyasining markazi	stem core-wood tree plant stem center	Центр древесной стебли растения
zabolon	- ochiq rangli yadro atrofida yog‘ochlik	zabolon- light colored wood around the core	Светлая древесина вокруг ядра.
geterofiliya	– bitta o‘simlikda har xil barglarning Uchrashi	heterophily- meeting in one place a variety of plant leaves	В одном растений встречаются разные типы листьев.
barg mozaikasi	– barglarning yorug‘likka nisbatan bir birini soyalab qo‘ymaydigan joylashishi	leaf mosaic - leaves a light do not remain in one location.	Расположение листьев так чтобы не загораживают свет друг другу
fillodiy	– bargbandikengayib, bargplastinkasiga Aylanishi	phyllodes- expanding leaf spot, leaf plate dizziness	Расширения листовидного черешка, превращения в пластинку листа.
mezofill	– bargningo‘rtaqisimiyokibargeti	mesophyl - the middle part of the leaf or leaves the flesh.	Средняя часть листа или оболочка листа
xlorenxima	– xlorofili donachalariga boy to‘qima	chlorenchyma- rich tissue with chlorophyls	Ткань которая полна хлорофиллом
ustunsimon parenxima	– barg satxiga nisbatan perendikulyar joylashgan, cho‘ziq va zich hujayralar	columnar parenchyma- leaf level	Расположение вытянутых клеток по

	yig'indisi	perendikulyar, long and dense cells	перпендикуляр у на поверхности листа
bulutsimon	parenxima – shakli jixatdan birxil hujayralararo bo'shliqqa ega bo'lgan hujayralar yig'indisi	clouder parenchyma - theoretically the same cell the sum of the elongation of the cells	Паренхима-расположение по форме одинаковых межклетных клеток.
dorzoventral	yuqori tomonida ustunsimon, pastki tomonida bulutsimonto'qimalarjoylashgan.	dorsoventral- the upper side columnar of the bottom side of the cloudertissues	Палисадная ткан расположена на верхнем стороне пластинки а губчатая на нижней.
izoloterialbarg	– yuqorivapastkiepidermatomonida ya'ni kitomonlamaustunsimonto'qimalardantashkil topgan	isoloterial- side of the upper and lower epidermis of the leaf that is, double columnar tissues	Расположение палисадных тканей с обеих сторон листа
Radial barg	– bargmezofilli radius bo'ylab, ya'ni aylana bo'lib joylashadi	radial leaf - a circle that leaves the bar mezofilli located	Расположение листа мезофилла по радиусу, по кругу
adaksial	– bargning ustki tomoniepidermaxujayralari	adaxial- the top of the leaf epidermis cells	Расположение клеток эпидермы по поверхности листа
abaksial	– bargning ostki tomoniepidermaxujayralari	abaxial- leaf epidermis cells	Расположение клеток эпидермы снизу листа
assimilyatsiya	– yashil o'simliklar quyosh energiyasidan foydalangan holda ildizlar orqali suvda erigan moddalarni o'zlashtiradi va murakkab organik moddalar hamda erkin kislorodni hosil qiladi.	assimilation- the use of solar energy in green plants absorb substances dissolved in the water through the	Зеленые растения используют энергию солнца высасывает через корень растворимые вещества и

		roots and start to form complex organic compounds and oxygen.	превращает их в сложных органических веществ и кислорода
dissimilyatsiya	- nafasolish	dissimilation-to breath	Дыхание
transpiratsiya	– suvni bug‘latish	transpiration - evaporation of water	Испарение воды
o‘simliklarfi fiziologiyasi	– o‘simlikhujayrasidasodirbo‘ladigan barchajarayonlarnianiqlaydigan va o‘rganadigan fan	physiology of plants - the definition of all the processes that occur in the plant cells and science	Изучение и уточнение всех действий в клетке растений
aerob	– kislorodli nafasolish	aerobic - oxygen breathing	Кислородное дыхание
anaerob	– kislorodsiz nafasolish	anaerobic - unoxxygen breathing	Без кислородное дыхание
fitogormonlar	– o‘simlikning bir qismidan oz miqdorda ishlab chiqarilib, ikkinchi qismiga ta‘sir qilib yaxshiro‘tiradi	phytohormones - the part of the plant response to the second part of the production of small amounts of cultivating	Производство из малого количества частей растения, воздействует на вторую часть и вырастает хорошо.....
filogenez	- tabiatd mavjud bo‘lgan o‘simliklarning uz oqtarixi mobaynida qarortopgan irsiy xususiyatlar	phylogenesis - naturally occurring plant has a long history of hereditary characteristics	Половые свойства растений задолгих лет существования в природе.
ontogenez	o‘simlikning urug‘dan – urug‘gacha bo‘lgan hayoti	ontogeny - plant seeds - the seeds of life	Жизнь растений с семян до семян
gametofit-	jinsiy ko‘payish	gametophyte - sexual reproduction	Половое размножение
sporofit	– jinsisiz ko‘payish	sporophyte - unsexual reproduction	Без половое размножение
gameta	– jinsiy hujayra	gametes - reproductive cell	Половая клетка

taksonamik kategoriya	– fellogenetik sistemani tuzishda ontogenez bilan filogenez har tomonlama to‘la o‘rganilishi va o‘xshash belgilari guruhga bo‘linadi	taxonomy category - making phylogenesis system with symptoms similar to the study of all aspects of the phylogeny and ontogenesis groups.	В составлении феллогенетики необходимо изучение со всех сторон и распределение на группы онтогенеза и филогенеза
binar nomenklatura	- qo‘sh nomlanish, ya’ni ikki so‘zdan iborat bo‘lib, birinchisi o‘simlikning avlodini, ikkinchisi turni nomini bildiradi.	binarnomenclature- known to comment that we have two words , the first of the second generation plant species name	Двуменный, тоист включает в себя 2 слова, первое наследие растения, второе вид растения.
genofond	– o‘simliklarnng xalq xo‘jaligida, tibbiyotda ishlatilishi uchun sifatli navlarini yaratish maqsadida, tabiiy o‘simlik turlari	genofond- o‘simliklarnng in the national economy, medicine to be used in order to create high-quality varieties, native plant species	Генофонд – изобретения новых сортов растения для использования в медицины и а селском хозяйстве.
saprofit organizmlar	– tayyor organik moddalar, ya’ni o‘simlik chirydi yoki o‘lik tana hisobiga yashaydigan organizm	saprophytic organisms - organic matter, plant rot organism living or dead body	Готовые органические вещества, тоистгниение растений или живет за счет мертвых организмов.
izogamiya	– morfologik bir xil, fiziologik har xil gametalarning qo‘shilishi	isogamy- the same morphological, physiological the addition of gametes	Соединение по морфологически одинаковых, по физиологии разных гамет
geterogamiya	– morfologik va fiziologik har xil gametalarni qo‘shilishi	heterogamy morphologically and physiologically different gametes	Соединение по морфологических и физиологических разных гамет

oogamiya	– jinsiy hujayra etiladigan organ, ya'niy tuxum hujayra yirikroq va xarakatsiz, spermatazoid kichikroq va harakatchan	oogamiya the sexual organ of the cell, ie the egg cell is larger and smaller movements spermatazoid and mobility	Орган где созревает половая ткан, яйцевидная клетка не подвижная и больше, сперматозоид меньше и подвижная
kan'yugatsiya	– protoplastning qo'shilish uchun tashqi ko'rinishi jinsiy alomatlari bo'lmagan ikkinchi hujayra protoplastlarning biridan boshqasiga qo'yilishi	conjugation- protoplasts is an appearance with no signs of sexual cell protoplasts from each other	Для соединения протоплазмы нужно чтобы вторая протоплазма не имела половое строение
sporangiyaspora	– spora etiladigan organlar	sporangiyaspora - organs	Част где созревают споры
konidiyaband	- konidiya spora etiladigan organ	konidiyabandkonidiya sports for body	Част где созревает конидионая спора
sklerotsiy	– gifalarning zich qatnashmasi bo'lib, askomitset zamburug'lardan vakillarning vegetativ ko'p organlari	sklerotsiy densely gifalarning nonparticipation, askomitsetofficialsvegetativ yeasts bodies	Туго строение гиф, аксомицетный гриб где расположено много вегетативных органов.
peritetsiy	– askosporalar etiladigan qismi	peritetsiyaskosporalar be part of it	Част где созревают аскоспоры
mitseliy	– zamburug'lar tanasi	mitseliy the body of the fungi	Тела грибов
tallom	– suv o'tlarining tanasi	Tall - algae body	Тела водорослей
mikofita	– zamburug'lar bo'limi	micophyta-classoffungi	Отделение грибов
mikologiya	– zamburug'larni o'rganuvchi fan	micology-the science that studies fungi	Наука об изучении грибов
oidiy	– vegetativ ko'payish usullaridan biri, giflarning uchlari bir qancha alohida qismlarga bo'linadi	oidy - a way of vegetative reproduction, hyphaes nozzles are divided into a number of separate	Одно из вегетативных вида размножения , кончик гифа делятся на несколько

		components	отдельных частичек.
chlamidospora	– oidiyga o'xshash bo'lib, ikki qavat po'st va oziq modda saqlaydi	chlamydo-spor es-like the oidy, two layers of crust and food stores	Похож на оиду, покрыта двухслойной корой и запасными веществами
stroma	– askomitset zamburug' vakillarining sklerotsiyadan so'ng siyoh rangli boshchalarni hosil qiladi	stroma- the representative s of the askomitset fungi color ink heads	Один из видов аскомицета который после склероция появляется головки синего цвета.
peretetsiy	– stroma ichida ichki mevalar u erda 8 askospora yotadi	peretetsiy-story domestic products there lies 8 askospore	Внутри стромы где лежат внутренние плоды и восемь аскоспор
makrogameta	– uruqchi	macrogamete-motherhood	Материнство
mikrogameta	– changchi	microgamete-fatherhood	Пылник
sterigma	– bazidiyamitset zamburug'larda giflarning uchi shishib, uchlarning ichida 4 ta oyoqcha hosil bo'ladi	sterigma-bazidiyamitset fungal hyphaes swollen ends to within 4 feet	Гриб базидиямицет в котором кончик гифа распухает и появляется 4 ножки.
simbioz	– bir biriga foyda keltirib yashaydigan organizmlar	symbiosis - a beneficial organisms living together	Организмы приносящие пользу друг другу
sianobakteriya	– ko'k yashil suv o'tlari	cyanobacteria - blue green algae	Сине-зеленые водоросли
gomeomer	– zamburug'lar bilan suv o'tlar bir xil tartibda joylashgan bo'lsa	homoeomerie s - weeds and fungi with water in the same manner	Грибы и водоросли расположены в одинаковых типах
geteromer	– zamburug'lar giflari lishayniklarining ustki qavatida zich joylashgan bo'lib, po'stloq tagida giflar siyrak joylashib orasida suv o'tlar joylashadi	heteroeomerie s- fungi giflari the top of the herpetic floor areas, under the bark gifs are scarce herbs in place of water in the container	Гифы грибов расположены по поверхности лишайников, под корой гифы расположены рыхло между ними расположены водоросли

fikoeritrin	– qizil suv o‘tlarda qizil rang beradigan pigment	phycoerythrin-gives red color to red algae pigment	Пигмент который дает красный цвет у красных водорослях
karpogen	– qizil suv o‘tlarining jinsiy organi, kolbasimon ko‘rinishga ega qorincha, bo‘yindan iborat	carpogen- red algae sexual organ, flaskly look ventricle, the neck	Половые органы красных водорослей имеет форму колба и включает в себя схейку.
trixogena	– karpogenning bo‘yinch qismi	trichogen-neck of carpogen	Схейная часть карпогена
fikoksantin	– qo‘nqir suv o‘tlarda qo‘nqir rang beruvchi pigment	phycoxanthin-brown color of algae pigment	Пигмент который дает коричневый цвет у коричневых водорослях
fikotsian	– ko‘k rang beruvchi pigment	phycocyanin-blue color pigment	Пигмент который дает синий цвет
sklerotsiy	– zamburug‘larning ko‘payish vositasi (mevasi tanacha va boshcha hosil qiladi)	sclerotia- fungi (fruit the body and form)	Размножение гриба (плод, тело и головка)

VIII.ADABIYOTLAR RO‘YXATI



Maxsus adabiyotlar

15. Яковлев Г. П., Челомбитько В.А. Ботаника. – М.: “Высшая школа”, 2001.-230 с.
16. Mustafaev S.M., Ahmedov O‘.A. Botanika. – T.: O‘zbekiston, 2005.- 435 b.
17. Mustafaev S.M., Ahmedov O‘.A., Samatova SH. O‘simliklar sistematikasidan amaliy mashg‘ulotlar. – T.: “YUNAKS-PRINT” MCHJ bosmaxonasi, 2007.- 127 b.
18. Ahmedov O‘.A., Yulchieva M.T. Botanika fanidan elaktron darslik.-T.: 2008.
19. Pharmaceutikal Botany, a Text-Books for students of pharmacy and science. Published by forgotten books, 2013. –
20. V. Ch. Evans Farmakognoziya. –Xalqaro nashr: Edinburg, London Nyu– York, Filadelfiya, Sidney, Toronto (16 nashr).- Saunders Elsevier Limited, 2009.
21. Hamidov A., Nabiev M.M. “O‘zbekiston o‘simliklarini aniqlagichi”.-T.: 1987.-235 b.
22. Василев А.Е. “Морфология, анатомия растений”. – М.: Изд-во “ Высшая школа ”, 1988. -435 с.
23. Xolmatov X.X., Karimova S.U., Ahmedov O‘.A. va boshqalar. Dorivor o‘simliklarning lotincha-o‘zbekcha-ruscha-arabcha va forscha-tojikcha lug‘ati.-T.: X.F. “Nizim” bosmaxonasi, 2004. – 239 b.
24. Berezovskaya T.P., Dmitruk S.E., Grishinna e.I., Belousov M.V. Основы farmatsevticheskoy botaniki. – Tomsk: Pechatnaya manifaktura, 2004.-294 s.
25. Xolmatov X.X., Ahmedov O‘. A. Farmakognoziya. 1-2 qism. – T.: “Ibn Sino” nashiryoti, 2007.- 806 b.
26. Гилберт С. Биология развития: в 2 т. /пер. с англ. - М., 1994
27. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. Т. 1-2. – М.: «Мир», 1990.
28. Эсау К. Анатомия семенных растений: в 2 кн. /пер. с англ. - М., 1980.

Internet resurslari

Internet ma’lumotlari:

1. <http://redboksam.ru./uz/>
2. <http://www.google.co.uz./>
3. <http://www.ziyo.net./>
4. <http://www.vse.uz/>

