

**УРГАНЧ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ
ДАРАЖА БЕРУВЧИ PhD.03/30.12.2019.FM.55.01 РАҚАМЛИ
ИЛМИЙ КЕНГАШ**

БУХОРО ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

РАҲМОНОВ АСКАР АҲМАДОВИЧ

**ЁПИШҚОҚ-ЭЛАСТИК ҒОВАҚ МУҲИТДА
ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМАЛАР СИСТЕМАСИ
УЧУН ТЕСКАРИ МАСАЛАЛАР**

01.01.02 – Дифференциал тенгламалар ва математик физика

**ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ БҮЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ**

БУХОРО – 2020

**Физика-математика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
диссертацияси автореферати мундарижаси**

**Оглавление автореферата диссертации
доктора философии (PhD) по физико-математическим наукам**

**Contents of dissertation abstract of doctor of philosophy (PhD) on
physical-mathematical sciences**

Рахмонов Аскар Аҳмадович

| | |
|---|---|
| Ёпишқоқ—эластик ғовак муҳитда интегро—дифференциал тенгламалар системаси учун тескари масалалар..... | 3 |
|---|---|

Рахмонов Аскар Аҳмадович

| | |
|--|----|
| Обратные задачи для системы интегро—дифференциальных уравнений в вязкоупругой пористой среде..... | 19 |
|--|----|

Rahmonov Askar Ahmadovich

| | |
|---|----|
| Inverse problems for the system integro—differential equations in a visco—elastic porous medium..... | 35 |
|---|----|

Эълон қилинган ишлар рўйхати

Список опубликованных работ

| | |
|-------------------------------|----|
| List of published works | 38 |
|-------------------------------|----|

**УРГАНЧ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ
ДАРАЖА БЕРУВЧИ PhD.03/30.12.2019.FM.55.01 РАҚАМЛИ
ИЛМИЙ КЕНГАШ**

БУХОРО ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

РАҲМОНОВ АСКАР АҲМАДОВИЧ

**ЁПИШҚОҚ-ЭЛАСТИК ҒОВАҚ МУҲИТДА ИНТЕГРО-
ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМАЛАР СИСТЕМАСИ УЧУН ТЕСКАРИ
МАСАЛАЛАР**

01.01.02–Дифференциал тенгламалар ва математик физика

**ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ**

БУХОРО – 2020

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.2.PhD/FM221 рақам билан рўйхатга олинган.

Докторлик диссертацияси Бухоро давлат университетида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус, инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифасида(www.ik-mat.urdu.uz) ва «Ziyonet» Ахборот таълим порталида (www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:

Дурдиев Дурдимурод Қаландарович
физика-математика фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар:

Зикиров Обиджан Салижанович
физика-математика фанлари доктори, профессор

Яхшимуратов Алишер Бекчанович
физика-математика фанлари доктори

Етакчи ташкилот:

Самарқанд давлат университети

Диссертация ҳимояси Урганч давлат университети ҳузуридаги PhD.03/30.12.2019.FM.55.01 рақамли Илмий кенгашнинг «_____» 2020 йил соат _____ даги онлайн мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 220100, Урганч ш., Ҳ.Олимжон кўчаси, 14-йй. Тел.: (+99862) 224-66-11, факс: (+99862) 224-67-00; e-mail: ik_mat.urdu@umail.uz).

Диссертация билан Урганч давлат университетининг Ахборот-ресурс марказида танишиш мумкин (_____ -раками билан рўйхатга олинган). (Манзил: 220100, Урганч ш., Ҳ. Олимжон кўчаси, 14-йй. Тел.: (+99862) 224-66-11; факс: (99862) 224-67-00).

Диссертация автореферати 2020 йил «_____» _____ куни тарқатилди.
(2020 йил «_____» _____ даги _____ рақамли реестр баённомаси).

Б.И. Абдуллаев
Илмий даражада берувчи Илмий
кенгаш раиси, ф.-м.ф.д.

А.А. Атамуратов
Илмий даражада берувчи Илмий
кенгаш илмий котиби, ф.-м.ф.н.

С.А. И момкулов
Илмий даражада берувчи Илмий
кенгаш қошидаги илмий семинар
раиси, ф.-м.ф.д.

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон миқёсида олиб борилаётган кўплаб илмий-амалий тадқиқотлар аксарият ҳолларда интегро-дифференциал тенглама ёки тенгламалар системаси учун тескари масалаларни тадқиқ қилиш каби масалаларга келтирилади. Табиий фанларда баъзи жараёнларни математик моделлаштириш муҳитнинг хотирасини ҳисобга олувчи интегро-дифференциал тенглама ёки тенгламалар системасига олиб келинади. Бундай системаларнинг айни пайдаги ҳолати унинг олдинги ҳолатларига боғлиқ бўлиб, интегро-дифференциал тенгламалар билан ифодаланади. Гиперболик типдаги интегро-дифференциал тенгламаларнинг интеграл ядросини аниқлаш масалалари йигирманчи асрнинг 80-йиллари сўнгидаги пайдо бўлган тескари масалалар назариясидаги нисбатан янги йўналиш ҳисобланади. Бундай масалаларни ечиш усусларининг зарур даражада шаклланмаганлиги ушбу йўналишдаги баъзи муаммоларни ҳал этишда муҳим вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Ҳозирги кунда жаҳонда илмий тадқиқотлар хотираға эга бўлган жараёнлар учун тескари масалаларни ўрганишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Математик нуқтаи назардан, муҳитнинг хотирасини ҳисобга олиш қаралаётган эластиклик назариясининг математик моделига жараённинг олдинги ҳолатини ифодаловчи ўрама кўринишдаги интеграл ҳадни киритишга олиб келинилади. Шундай қилиб, интегро-дифференциал тенгламалар билан боғлиқ баъзи тескари масалаларни ўрганиш зарурати туғилди. Тадбиқларда тайин нуқта ёки соҳа чегараси атрофида жамланган делтасимон манбаларга эга масалаларни ўрганиш муҳимдир. Айнан шу типдаги долзарб илмий тадқиқотлар ушбу диссертация ишида қаралади.

Мамлакатимизда фундаментал фанларнинг илмий ва амалий тадбиқига эга бўлган интегро-дифференциал тенгламалар ва математик физиканинг долзарб йўналишларига эътибор кучайтирилди. Жумладан, охирги йилларда ёпишқоқ-эластик ғовак муҳитда тўлқин тарқалиш жараёнларини ифодаловчи интегро-дифференциал тенгламалар учун бошланғич-чегаравий масалаларни тадқиқ этиш, улар учун тескари масалаларни ечиш орқали амалий муаммоларни ҳал этиш борасида салмоқли натижаларга эришилди. «Дифференциал тенгламалар, математик физика ва функционал анализ» фанларининг устивор йўналишлари бўйича халқаро стандартлар даражасида илмий тадқиқотлар олиб бориш математика фанининг асосий вазифалар ва фаолият йўналишлари этиб белгиланди¹. Бу қарор ижросини таъминлашда математик физиканинг интегро-дифференциал тенгламалар системаси учун тескари масалаларни ечиш методларини ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга.

¹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар махкамаси 2017 йил 18 майдаги «Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг янгидан ташкил этилган илмий тадқиқот муассасалари фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги 292-сонли қарори.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947 Фармони, 2019 йил 9 июлдаги «Математика таълими ва фанларини янада ривожлантиришни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг В.И.Романовский номидаги Математика институти фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4387 Қарорлари ва 2020 йил 7 майдаги «Математика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий-тадқиқотларни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4708-сонли Қарори хамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа норматив-хукукий хужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қиласди.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва технологиялар ривожланишининг IV. «Математика, механика ва информатика» устувор йўналиши доирасида бажарилган.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Гиперболик тенгламалар ва системалар учун динамик масалалар биринчилардан бўлиб М.М.Лаврентьев, В.Г.Романов, А.С.Благовещенский, А.С.Алексеев, К.В.Винклер ва Д.Л.Джонсонлар томонидан қўйилган ва ўрганилган. Масалаларни тадқиқ қилишнинг турли усуллари В.Г.Романов, А.С.Благовещенский, Я.Янно, А.Лоренци, А.Л.Бухгейм, Д.К.Дурдиев, Х.Х.И момназаровнинг ишларида батафсил баён қилинган. Юқоридаги олимлардан В.Г.Романов, А.С.Благовещенский, А.Лоренци, Д.К.Дурдиев ва Х.Х.И момназаровларнинг ишлари диссертация тадқиқотларига яқин бўлиб, улар томонидан тавсия этилган усуллардан фойдаланилган.

Ғовак мұхитларда стационар бўлмаган жараёнларни ўрганишда кўпинча Био [М.А. Биот] типидаги назариялар қўлланилади. Бироқ, аниқ Био назарияга асосланган назарий тадқиқотларни экспериментал натижалар билан табиий наъмуналарда таққослаш бўйича натижалар нисбатан кам. Эластик тўлқинлар тарқалиш назариясининг амалий масалаларида кўпинча мұхитнинг ғоваклиги, суюқлик билан тўлдирилгани ва гидродинамик хусусиятларни ҳисобга олишга тўғри келади. Био назариясига асосланган ҳолда В.Н. Доровский эластик ғоваксимон деформацияланадиган мұхитда суюқликни филтрлашнинг чизиқли бўлмаган математик моделини курди. Модел учта асосий принципга асосланади: сақланиш қонунларининг бажарилиши, Галилейнинг нисбийлик принципи, ҳаракат тенгламаларининг термодинамик мувозанат шароитларига мослиги.

Эластик ғоваксимон деформацияланадиган мұхитда суюқликни филтрлашнинг математик модели чизиқли бўлган ҳол учун А.Б.Холмуродов томонидан ғовак изотроп мұхитларда SH (кўндаланг) тўлқин тарқалиш жараёнини ифодаловчи дифференциал тенгламалар учун тўғри ва тескари

масалалар ўрганилган, ундан ташқари эластик-ғовак мұхитда SH түлкін тенгламасининг сингуляр ечими, эластик-ғовак мұхитда SH түлкін тарқалиш жараёнининг сонли ечиш усули ва унга мос дастур яратилған. Бугунғи кунда бевосита амалий тадбиқта эга бу соҳа кўплаб математикларнинг илмий қизиқишилари предмети бўлиб хизмат қилмоқда.

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилған олий таълим муассасасининг илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Бухоро давлат университетининг Ф-4-02 «Математик физиканинг ҳолатлар тўплами чексиз бўлган моделлари термодинамикаси» (2017-2020) мавзусидаги илмий тадқиқот лойиҳаси доирасида бажарилған.

Тадқиқотнинг мақсади ёпишқоқ-эластик ғовак мұхитда интегро-дифференциал тенгламалар системаси учун бир ва икки ўлчамли тескари динамик масалаларини ечиш усулларини қуриш, шунингдек бу ечимларнинг мавжудлик ва ягоналик теоремаларини исботлаш, ҳамда турғунлик баҳоларини олишдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари:

вертикал йўналишда бир жинсли бўлмаган ёпишқоқ-эластик ғовак изотроп мұхит учун қўйилған тескари масаланинг ягона ечими мавжудлиги тўғрисидаги глобал ва локал теоремаларни исбот қилиш, ҳамда турғунлик баҳоларини олиш;

ёпишқоқ-эластик тенгламалар системаси учун Ламе параметрини аниқлаш, қўйилған тескари масала ечими етарлича кичик оралиқда мавжудлиги ва ягоналиги, шунингдек масалада берилганларнинг ечимга узлуксиз равиша боғлиқлиги ҳақидаги теоремаларини исбот қилиш;

фазовий ўзгарувчи бўйича аналитик ва вақт бўйича узлуксиз бўлган интеграл ҳадни аниқлаш бўйича тескари масаланинг локал бир қийматли ечилиши ҳақидаги теоремани исбот қилиш;

горизонтал йўналишда кучсиз боғланишли, бир жинсли бўлмаган ёпишқоқ-эластик ғовак мұхитда қўйилған икки ўлчамли ядрони аниқлаш масаласининг ягона ечими мавжудлиги ҳақида глобал теоремани исбот қилиш ва турғунлик баҳоларини олиш.

Тадқиқотнинг обьекти: Ўрама типдаги иккинчи тартибли интегро-дифференциал тенгламалар системаси учун бир ва икки ўлчамли ядрони аниқлаш тўғрисидаги тескари масалалар.

Тадқиқотнинг предмети: Ўрама типдаги иккинчи тартибли интегро-дифференциал тенгламалар системаси учун бир ва икки ўлчамли тескари масалалар, эластик-ёпишқоқлик тенгламалари.

Тадқиқотнинг усуллари: Диссертация ишида хусусий ҳосилали дифференциал тенгламалар ва интеграл тенгламалар назарияси, шунингдек функционал анализ методларидан фойдаланилған. Тўғри ва тескари масалаларнинг бир қийматли ечишувчанлиги улар Вольтерра типидаги иккинчи тур чизиқли бўлмаган ёпик интеграл тенгламалар системаси билан

алмаштирилиб, сўнгра уларга қисқартириб акслантиришлар принципи, кетма-кет яқинлашиш усули қўлланилган.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қўйидагилардан иборат:

вертикал йўналишда бир жинсли бўлмаган ёпишқоқ–эластик ғовак изотроп мухит учун қўйилган тескари масаланинг ягона ечими мавжудлиги тўғрисидаги глобал ва локал теоремалар исбот қилинган, ҳамда турғунлик баҳолари олинган;

ёпишқоқ–эластик тенгламалар системаси учун Ламе параметри аниқланган, қўйилган тескари масала ечимининг етарлича кичик оралиқда мавжудлиги ва ягоналиги, шунингдек масалада берилганларнинг ечимга узлуксиз равишда боғлиқлиги ҳақидаги теоремалар исбот қилинган;

фазовий ўзгарувчи бўйича аналитик ва вақт бўйича узлуксиз бўлган интеграл ҳадни аниқлаш бўйича тескари масаланинг локал бир қийматли ечилиши ҳақидаги теорема исбот қилинган;

горизонтал йўналишда кучсиз боғланишли, бир жинсли бўлмаган ёпишқоқ–эластик ғовак мухитда қўйилган икки ўлчамли ядрони аниқлаш масаласининг ягона ечими мавжудлиги ҳақида глобал теорема исбот қилинган ва турғунлик баҳолари олинган.

Тадқиқот амалий натижалари. Тадқиқот натижалардан сейсмологияда, нефт ва газ конларини қидиришда ва олий таълимда таҳсил олаётган юқори курс бакалавр талабалари ва магистратура талабалари учун математик физика фанидан маҳсус маъruzалар курсларини ўқишида фойдаланиш мумкин.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Функционал анализ, дифференциал тенгламалар назарияси, тескари масалалар назарияси, математик анализ усулларидан ва қўзғалмас нуқталар ҳақидаги теоремалардан фойдаланилган. Олинган натижалар математик жиҳатдан тўғри исботланган.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Диссертация иши асосан назарий жиҳатдан ўрганилган бўлиб, аниқ ҳисоблаш алгоритмларни шакллантириш ва амалий геофизика, хусусан сейсмик қидирув билан боғлиқ долзарб амалий муаммоларни ҳал қилиш учун асосдир.

Олинган натижалардан математик физика тенгламалари учун тескари ва нокоррект масалалар назарияси бўйича кейинги тадқиқотларда ҳам фойдаланиш мумкин.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ёпишқоқ–эластик ғовак мухитда интегро–дифференциал тенгламалар системаси учун тескари масалалар бўйича олинган натижалар асосида:

Ёпишқоқ–эластик ғовак мухитда интегро–дифференциал тенгламалар системаси учун тескари масалалардан ОТ-Ф4-69 рақамли лойиҳасида ёпишқоқ–эластик ғовак мухитлардаги интегро–дифференциал тенгламалар системаси учун қўйилган тескари масалаларни тадқиқ этишда фойдаланилган. (Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта-маҳсус таълим вазирлигининг 2020 йил 8 июлдаги маълумотномаси). Илмий натижаларнинг қўлланилиши сфера устидаги

умумлашган функцияни аниқлаш масаласининг мавжудлиги ва ягоналигини исботлаш имкониятини берган;

Тескари масалаларни тадқиқ этишнинг таклиф этилган усулидан АААА-А19-119032590069-3 рақамли хорижий грантда изотроп ва анизотроп муҳитларда ёпишқоқ-эластиклик бир ўлчами тескари масалаларни тадқиқ этишда фойдаланилган. (Южный Математический Институт филиал ФГНБУ ФНЦ “Владикавказский научный центр РАН”, 2020 йил 7 июлдаги маълумотномаси). Илмий натижаларнинг қўлланилиши ёпишқоқ-эластик ғовак муҳит асосий характеристикаларини аниқлаш, сонли алгоритмини ишлаб чиқиш имконини берган.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 2 та халқаро ва 3 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси бўйича жами 12 та илмий иш чоп этилган, шулардан, 3 таси Scopus рўйхатига киритилган халқаро илмий журналларда, 4 таси Ўзбекистон Республикаси Олий Аттестация комиссиясининг фалсафа доктори диссертацияларини ҳимоя қилишда тавсия этилган миллый журналларда чоп қилинган.

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация кириш, уч боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил топган. Диссертациянинг ҳажми 106 бетни ташкил этган.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Диссертациянинг биринчи боби «**Ёпишқоқ–эластик ғоваксимон мухитда интегро–дифференциал тенгламалар системаси учун бир ўлчамли тескари масалалар**» деб аталади. Бу бобнинг биринчи параграфида диссертация натижаларни исботлашда фойдаланилган асосий тушунчалар, теоремалар келтирилган. Иккинчи параграфда ёпишқоқ–эластик ғовак мухитда SH(кўндаланг)-тўлқинли интегро–дифференциал тенгламалар системаси

$$\rho_s \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial z} \Sigma(z, t) - \chi \rho_l^2 \frac{\partial}{\partial t} (U - V), \quad t \in \mathbb{D}, \quad z > 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} = \chi \rho_l (U - V), \quad t \in \mathbb{D}, \quad z > 0 \quad (2)$$

учун умумлашган $U(z, t)$, $V(z, t)$ ечимни топиш масаласи

$$U|_{t<0} = \frac{\partial U}{\partial t}|_{t<0} \equiv 0, \quad V|_{t<0} \equiv 0, \quad \Sigma(+0, t) = \delta'(t) \quad (3)$$

бошланғич ва чегаравий шартлар билан қаралган. Бу ерда $U(z, t)$, $V(z, t)$ – мос равишида эластик ғовак жисм ва суюқликлардаги тўлқин тезликлари, ρ_s ва ρ_l лар мос равишида эластик ва ғовак (суюқлик билан тўлдирилган) жисмларнинг доимий парциал зичликлари, χ – ишқаланиш коэффициенти, бу ерда ва бундан кейин улар ўзгармас ва мусбат деб фараз қилинади, $\delta'(t)$ Диракнинг дельта-функцияси ҳосиласи. $\Sigma(z, t)$ кучланиш $U(z, t)$ тезлик билан қуидагича боғланган:

$$\Sigma(z, t) = \mu(z) \frac{\partial U}{\partial z} + \int_0^t k(t-\tau) \mu(z) \frac{\partial U}{\partial z}(z, \tau) d\tau, \quad (4)$$

бу ерда $\mu(z)$ – Ламе параметри, $k(t)$ мухитнинг қовушқоқлигини ифодалайди.

Тескари масала тўғри масала (1)-(4) ечими ҳақида

$$U|_{z=0} = f(t) \quad (5)$$

кўшимча маълумот бўйича $k(t)$, $t > 0$ узлуксиз функцияни аниқлашдан иборат, бу ерда $f(t)$ -берилган функция. Бунда $k(t)$ функция (1) тенгламага (4) формула орқали киради.

Янги ўзгарувчи y ни қуидаги формула билан киритамиз:

$$y = \int_0^z \frac{d\xi}{c(\xi)}, \quad c(z) := \sqrt{\frac{\mu(z)}{\rho_s}}. \quad (6)$$

$l(y)$ функция орқали y ва z ўзгарувчилар орасидаги боғланишни ва

$$\frac{\chi \rho_l^2}{\rho_s} = \lambda, \quad \tilde{\mu}(y) = \mu(l(y)). \quad (7)$$

каби белгилашларни киритамиз.

(1)-(5) масалани $D_T = \{(y, t) : 0 \leq y \leq t \leq T - y\}$ соҳада қараймиз.

Теорема 1. Фараз қиласылғык қүйидеги шарттар болжарылсın: 1) $f(t) = -\frac{1}{\sqrt{\rho_s \tilde{\mu}(0)}} \delta(t) + \theta(t) f_{00}(t)$, тенглик ўринли бўлсın, бу ерда

$f_{00}(t) \in C^2[0, T/2]$ – берилган функция ва $\theta(t)$ – Хевисайд функцияси: $\delta(t) = (d/dt)\theta(t)$; 2) $\tilde{\mu}(y) \in C^3[0, T/2]$.

У ҳолда ихтиёрий фиксиранган $T > 0$ учун (1)-(5) тескари масаланинг ягона ечими $k(t) \in C^2[0, T]$ мавжуд.

$M(h_0)$ орқали $t \in [0, T]$ учун $\|k(t)\|_{C^2[0, T]} \leq h_0$ тенгсизликни қаноатлантирувчи $k(t) \in C^2[0, T]$ функциялар тўпламини белгилаймиз, бунда h_0 – тайинланган мусбат сон.

Теорема 2. Фараз қиласылғык $k^{(1)}(t) \in M(h_0)$ ва $k^{(2)}(t) \in M(h_0)$ лар (1)-(5) тескари масаланинг $(\tilde{\mu}^{(1)}, f_{00}^{(1)})$, $(\tilde{\mu}^{(2)}, f_{00}^{(2)})$ қўшимча шартларга мос келувчи ечимлари бўлсın. У ҳолда шундай мусбат $d_1 = d_1(h_0, h_{00}, T)$,

$$h_{00} = \max \left\{ \|\tilde{\mu}^{(1)}(y)\|_{C^3[0, T/2]}, \|f_{00}^{(1)}(t)\|_{C^2[0, T]}, \|\tilde{\mu}^{(2)}(y)\|_{C^3[0, T/2]}, \|f_{00}^{(2)}(t)\|_{C^2[0, T]} \right\},$$

сон топилиб, қўйидеги баҳо ўринли:

$$\|k^{(1)}(t) - k^{(2)}(t)\|_{C^2[0, T]} \leq d_1 \left[\|\tilde{\mu}^{(1)}(y) - \tilde{\mu}^{(2)}(y)\|_{C^3[0, T/2]} + \|f_{00}^{(1)}(t) - f_{00}^{(2)}(t)\|_{C^2[0, T]} \right].$$

Қўйидаги теорема турғунлик хақидаги 2-теореманинг натижаси хисобланади.

Теорема 3. Фараз қиласылғык, $k^{(i)} \in C^2[0, T]$ ва $\tilde{\mu}^{(i)}, f_{00}^{(i)}, i=1, 2$ функциялар 2-теорема шартларини қаноатлантирусın. У ҳолда, агар барча $(y, t) \in D_T$ лар учун $\tilde{\mu}^{(1)}(y) = \tilde{\mu}^{(2)}(y)$, $f_{00}^{(1)}(t) = f_{00}^{(2)}(t)$ бўлса, $k^{(1)}(t) \equiv k^{(2)}(t), t \in [0, T]$ бўлади.

1.3 параграфда қўйидеги тескари масала ўрганилган: қўшимча (5) шарт берилганда (1)-(4) тенгламалардан Ламе коэффициенти $\mu(z)$ ни топиш талаб этилади (бунда $k(t)$ маълум деб қаралади).

Теорема 4. $T > 0$ фиксиранган сон, $f(t)$ эса 1-теоремадаги кўринишда ва $k(t) \in C^2[0, T]$ бўлсın. У ҳолда етарлича кичик $T_0 \in (0, T]$ лар учун (1)-(5) тескари масаланинг $C^3[0, T_0/2]$ синфа тегишли ягона $\tilde{\mu}(y)$ ечими мавжуд.

(1)-(5) тескари масала ечимининг шартли турғунлигини ифодаловчи теоремани келтирамиз. Бундай баҳони олишда берилган функциялар $f_{00}(t), k(t)$ учун $\tilde{Q}_0(M_1, \tilde{\mu}(0), \tilde{\mu}'(0), k(0), f_{00}(0), \lambda, T) := \tilde{Q}(M_1, T)$ синф ва номаълум функция $\tilde{\mu}(y)$ учун эса $Q_0(M, \tilde{\mu}(0), \tilde{\mu}'(0), k(0), f_{00}(0), \lambda, T_0) := Q(M, T_0)$ синфларни киритамиз. Агар $\|f_{00}\|_{C^2[0, T]} \leq M_1$, $\|k\|_{C^2[0, T]} \leq M_1$ ва $\|\tilde{\mu}\|_{C^3[0, T_0/2]} \leq M$ тенгсизликлар бажарилса, $f_{00}(t), k(t)$ ва $\tilde{\mu}(y)$ функцияларни мос равишида $\tilde{Q}(M_1, T)$ ва $Q(M, T_0)$ синфларга тегишли деб хисоблаймиз.

Теорема 5. Фараз қиласынан $\tilde{\mu}^{(1)}(y), \tilde{\mu}^{(2)}(y) \in Q(M, T_0)$ лар (1)-(5) тескари масаланинг $f_{00}^{(1)}, k^{(1)} \in \tilde{Q}(M_1, T)$ ва $f_{00}^{(2)}, k^{(2)} \in \tilde{Q}(M_1, T)$ берилгандарга мос ечимлари бўлсин.

У ҳолда қийидаги турғунлик баҳоси ўринли:

$$\left\| \tilde{\mu}^{(1)}(y) - \tilde{\mu}^{(2)}(y) \right\|_{C^3[0, T_0/2]} \leq d_2 \left[\left\| f_{00}^{(1)}(t) - f_{00}^{(2)}(t) \right\|_{C^2[0, T]} + \left\| k^{(1)}(t) - k^{(2)}(t) \right\|_{C^2[0, T]} \right],$$

бу ерда d_2 ўзгармас фақат $\tilde{Q}(M_1, T), Q(M, T_0)$ синфларнинг танланшиига бозлиқ.

Турғунлик теоремасидан етарлича кичик $T_0 > 0$ ларда ечимнинг ягоналиги келиб чиқади.

Теорема 6. $\tilde{\mu}^{(i)}(y) \in C^3[0, T_0/2]$ ва $f_{00}^{(i)}(t), k^{(i)}(t), i=1, 2$ функциялар 5-теорема шартларини қаноатлантирулар. Агар барча $t \in [0, T]$ лар учун $f_{00}^{(1)}(t) = f_{00}^{(2)}(t), k^{(1)}(t) = k^{(2)}(t)$ бўлса, у ҳолда $y \in [0, T_0/2]$ кесмада $\tilde{\mu}^{(1)}(y) \equiv \tilde{\mu}^{(2)}(y)$ бўлади.

Диссертациянинг иккинчи боби «Ёпишқоқ-эластик ғовак мухитда интегро-дифференциал тенгламалар системаси учун икки ўлчамли ядрони аниқлаш масаласи» деб номланган бўлиб, вақт ўзгарувчиси бўйича чекли силлиқликка эга ва фазовий ўзгарувчисига нисбатан аналитик бўлган функциялар синфида интеграл ҳаднинг ядросини топиш масаласи ўрганилган. Биринчи параграфда тўғри ва тескари масалаларниң қўйилиши келтирилган. Ҳақиқий ўзгарувчили аналитик функциялар Банах фазоларининг шкаласи киритилган.

Қийидаги гиперболик интегро-дифференциал

$$\rho_s \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} \Sigma_1(x, z, t) + \frac{\partial}{\partial z} \Sigma_2(x, z, t) - \chi \rho_l^2 \frac{\partial}{\partial t} (U - V), \quad (9)$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} = \chi \rho_l (U - V), \quad (x, t) \in \mathbb{D}^2, \quad z > 0 \quad (10)$$

тенгламалар системасидан умумлашган $U(x, z, t), V(x, z, t)$ ечимни

$$U|_{t<0} = \frac{\partial U}{\partial t}|_{t<0} \equiv 0, \quad V|_{t<0} \equiv 0, \quad \Sigma_2(x, +0, t) = \varepsilon(x) \delta'(t). \quad (11)$$

бошланғич ва чегаравий шартлар асосида топишдан иборат бўлган тўғри масалани қараймиз.

(9)-(10) тенгламалар системаси тешиклари суюқлик билан тўлдирилган ёпишқоқ-эластик ғовак мухитда товуш тўлқинларининг тарқалишини ифодалайди, бунда $\varepsilon(x)$ берилган силлиқ функция. (9) тенгламадаги $\Sigma_1(x, z, t), \Sigma_2(x, z, t)$ қучланишлар $U(x, z, t)$ билан қийидаги формулалар орқали боғланган:

$$\begin{cases} \Sigma_1(x, z, t) = \mu(z) \frac{\partial U}{\partial x} + \int_0^t k(x, t-\tau) \mu(z) \frac{\partial U}{\partial x}(x, z, \tau) d\tau, \\ \Sigma_2(x, z, t) = \mu(z) \frac{\partial U}{\partial z} + \int_0^t k(x, t-\tau) \mu(z) \frac{\partial U}{\partial z}(x, z, \tau) d\tau, \end{cases} \quad (12)$$

$k(x, t)$ функция $k(x, 0) = k_t(x, 0) = 0$ шартларни қаноатлантиради деб фараз қиласиз, бундан ташқари $\mu(z) \in \Lambda := \{\mu(z) \in C^3[0, \infty) : \mu(z) > 0, \mu'(+0) = 0\}$ бўлсин. Шунингдек, умумийликка зиён етказмаган ҳолда $\rho_s = \rho_t = \chi = 1$ деб ҳисоблаймиз.

$\mu(z), k(x, t), \varepsilon(x)$ лар берилганда (9)-(11) тенгламалардан U ва V ларни топишга ёпишқоқ-эластик ғовак мухит учун тўғри масала деб аталади. Тескари масала тўғри масаланинг ечими ҳақидаги

$$U|_{z=0} = -\frac{\varepsilon(x)}{\sqrt{\mu(0)}} \delta(t) + e^{-t/2} \theta(t) f(x, t), \quad (13)$$

қўшимча маълумот бўйича $k(x, t)$ функцияни топишдан иборат, бунда $f(x, t)$ -берилган регуляр функция.

(9)-(13) тескари масалани ечишда x ўзгарувчи бўйича аналитик бўлган Банаҳ функциялар фазосини қараймиз. $\mathbf{A}_s, s > 0$ орқали ҳақиқий ўзгарувчили аналитик $\psi(x), x \in \mathbb{D}$ функцияларнинг Банаҳ фазосини ва ундаги нормани эса

$$\|\psi\|_s = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{s^j}{j!} \left| \frac{d^j}{dx^j} \psi(x) \right|_{x=0} < \infty \quad (14)$$

тенглик ёрдамида киритамиз.

Қуйидаги теорема ўринли:

Теорема 7. *Фараз қиласиз $\mu \in \Lambda$, $(\varepsilon(x), 1/\varepsilon(x)) \in \mathbf{A}_{s_0}$,*

$$f(x, t) \in C_t^2(\mathbf{A}_{s_0}; [0, T]), \text{ ҳамда } f(x, 0) = \frac{\varepsilon(x)}{2\sqrt{\mu(0)}}, \quad f_t(x, 0) = \frac{\varepsilon(x)}{8\sqrt{\mu(0)}} [\mu''(0) - 9] - \frac{\sqrt{\mu(0)}}{2} \varepsilon''(x),$$

тенгликлар ўринли бўлсин.

У ҳолда шундай $a \in (0, T/2)$, $as_0 < T/2$ сон топилиб, ихтиёрий $s \in (0, s_0)$ учун (9)-(13) тескари масаланинг ягона ечими мавжуд, ва $k(x, t) \in C_t^2(\mathbf{A}_{s_0}; [0, a(s_0 - s)])$ бўлади, бу ерда $C_t^2(\mathbf{A}_{s_0}; [0, T]) - t$ ўзгарувчи бўйича икки марта узлуксиз-дифференциалланувчи, қийматлари \mathbf{A}_{s_0} да бўлган функциялар синфи.

Диссертациянинг «Кучсиз горизонтал бир жинсли бўлмаган ёпишқоқ-эластик ғовак мухитда икки ўлчамли ядрони аниқлаш масаласи» деб номланувчи учинчи бобида, гиперболик интегро-дифференциал тенгламалар системаси учун бошланғич-чегаравий масала қаралган. $\mathbb{D}_+^3 := \{(x, z, t) \in \mathbb{D}^3 | z > 0\}$ соҳада (9), (10) тенгламалар системаси қуйидаги бошланғич ва чегаравий шартлар билан тадқиқ қилинган:

$$U|_{t<0} = \frac{\partial U}{\partial t}|_{t<0} \equiv 0, \quad V|_{t<0} \equiv 0, \quad \Sigma_2|_{z=+0} = \delta(x)\delta'(t). \quad (15)$$

$\Sigma_1(x, z, t)$ ва $\Sigma_2(x, z, t)$ функциялар $U(x, z, t)$ билан (12) тенгликлар орқали боғланган ва $\mu(z) \in \Lambda$.

Тескари масалани қуидагида қўямиз: (9) тенгламага (12) тенгликлар орқали кирган $k(x,t)$, $t > 0$, $x \in \mathbb{D}$ функцияни (9)-(11), (15) тўғри масала ечими учун

$$U|_{z=0} = f(x,t), \quad (16)$$

қўшимча маълумот берилганда топиш талаб этилсин, бу ерда $f(x,t)$ – берилган функция.

Фараз қилайлик номаълум $k(x,t)$ ядро x ўзгарувчига кучсиз боғлиқ бўлсин, яъни:

$$k(x,t) = k_0(t) + txk_1(t) + \dots \quad (17)$$

бу ерда t -кичик параметр. Иккинчи ва учинчи параграфларда k_0 ва k_1 ларни аниқлаш масалалари ўрганилган. Бунинг учун тўғри масала ечими қуидаги қатор кўринишда ёзилади:

$$U(x,z,t) = U_0(x,z,t) + tU_1(x,z,t) + \dots, \quad V(x,z,t) = V_0(x,z,t) + tV_1(x,z,t) + \dots, \quad (18)$$

ҳамда

$$\Sigma_1(x,z,t) = \Sigma_{10}(x,z,t) + t\Sigma_{11}(x,z,t) + \dots, \quad \Sigma_2(x,z,t) = \Sigma_{20}(x,z,t) + t\Sigma_{21}(x,z,t) + \dots,$$

бу ерда

$$\begin{aligned} \Sigma_{1n} &:= \mu(z) \left[U_{nx}(x,z,t) + \sum_{j=0}^n x^j \int_0^t k_j(t-\tau) U_{n-j,x}(x,z,\tau) d\tau \right], \\ \Sigma_{2n} &:= \mu(z) \left[U_{nz}(x,z,t) + \sum_{j=0}^n x^j \int_0^t k_j(t-\tau) U_{n-j,z}(x,z,\tau) d\tau \right], \quad n = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

k ва U, V функцияларнинг т бўйича ёйилмалари (9), (10) тенгламаларга қўйилади ва натижада бир хил даражали т лар олдидаги коэффициентларни тенглаштириш натижасида $U_n(x,z,t)$, $V_n(x,z,t)$ функцияларга нисбатан

$$\begin{aligned} \rho_s \frac{\partial^2 U_n}{\partial t^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\mu(z) \frac{\partial U_n}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\mu(z) \frac{\partial U_n}{\partial z} \right) + \int_0^n k_j(t-\tau) \left[\frac{\partial}{\partial x} (\mu x^j U_{n-j,x}) + \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial}{\partial z} (\mu x^j U_{n-j,z}) \right] d\tau - \chi \rho_l^2 \frac{\partial}{\partial t} (U_n - V_n), \end{aligned} \quad (19)$$

$$\frac{\partial V_n}{\partial t} = \chi \rho_l (U_n - V_n), \quad (20)$$

$$U_n|_{t<0} = \frac{\partial U_n}{\partial t}|_{t<0} \equiv 0, \quad V_n|_{t<0} \equiv 0, \quad \Sigma_{2n}(t,x,+0) = \delta_{n0} \delta(x) \delta'(t), \quad (21)$$

$$U_n|_{z=0} = f_n(x,t), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (22)$$

масалалар олинади, бу ерда δ_{n0} Кронекер символи: $\delta_{ij} = 1$, агар $i = j$, $\delta_{ij} = 0$, аксинча.

(19) ва (20) тенгламаларнинг ҳар иккала томонини x^m га қўпайтириб ва натижани x бўйича минус чексизлиқдан плюс чексизлиқтагача оралиқда интеграллаб, қуидаги тенгликларга эга бўламиш:

$$\begin{aligned} \rho_s u_{n,m,t} = \mu m(m-1)u_{n,m-2} + (\mu u_{n,mz})_z + \int_0^t \sum_{j=0}^n K_j(t-\tau) [\mu m(m+j-1) \times \\ \times u_{n-j,m+j-2} + (\mu u_{(n-j,m+j)z})_z] d\tau - \chi \rho_l^2 \frac{\partial}{\partial t} (u_{n,m} - v_{n,m}), \end{aligned} \quad (23)$$

$$v_{n,m,t} = \chi \rho_l (u_{n,m} - v_{n,m}). \quad (24)$$

(23), (24) ларда $u_{n,m}$, $v_{n,m}$ орқали мос равища U_n , V_n функцияларнинг m -моментлари белгиланган:

$$u_{n,m}(z,t) := \int_{-\infty}^{+\infty} x^m U_n(x,z,t) dx, \quad v_{n,m}(z,t) := \int_{-\infty}^{+\infty} x^m V_n(x,z,t) dx.$$

(23) ва (24) тенгламаларни олишда ихтиёрий чекли t лар учун U_n , V_n , ($n=0,1,2,\dots$) функциялар чекли тартибли сингуляр умумлашган ва регуляр функцияларнинг йифиндиси кўринишда тасвирланиши, ҳамда U_n , V_n ларнинг ташувчиси чегараланганигидан фойдаланилди. $u_{n,m}$, $v_{n,m}$ лар қуидаги бошланғич ва чегаравий шартларни қаноатлантиради:

$$u_{n,m} \Big|_{t<0} = \frac{\partial u_{n,m}}{\partial t} \Big|_{t<0} \equiv 0, \quad v_{n,m} \Big|_{t<0} \equiv 0, \quad (25)$$

$$\left[u_{n,mz} + \int_0^t \sum_{j=0}^n k_j(t-\tau) u_{(n-j,m+j)z} d\tau \right]_{z=+0} = \frac{\delta_{n0}\delta_{m0}}{\mu(0)} \delta'(t). \quad (26)$$

Фараз қиласлини,

$$u_{nn} \Big|_{z=0} = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n f_n(x,t) dx = f_n(t), \quad (27)$$

бўлсин, бу ерда $f_n(t)$, $n=0,1,2,\dots$ – берилган етарлича силлик функциялар.

Иккинчи параграфда $k_0(t)$ ни аниқлаш масаласини ўрганамиз. Бунинг учун $n=m=0$ ҳолни қараймиз. У ҳолда (23)-(27) лар ёрдамида k_0 ва u_{00} , v_{00} ларни аниқлаш учун қуидаги тенгламалар

$$\rho_s \frac{\partial^2 u_{00}}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\mu(z) L \left[k_0, \frac{\partial u_{00}}{\partial z} \right] \right) - \chi \rho_l^2 \frac{\partial}{\partial t} (u_{00} - v_{00}), \quad (28)$$

$$\frac{\partial v_{00}}{\partial t} = \chi \rho_l (u_{00} - v_{00}), \quad (29)$$

бошланғич ва чегаравий

$$u_{00} \Big|_{t<0} = \frac{\partial u_{00}}{\partial t} \Big|_{t<0} \equiv 0, \quad v_{00} \Big|_{t<0} \equiv 0, \quad L \left[k_0, \frac{\partial u_{00}}{\partial z} \right]_{z=+0} = \frac{\delta'(t)}{\mu(0)}, \quad (30)$$

$$u_{00} \Big|_{z=0} = f_0(t) \left[\equiv - \frac{1}{\sqrt{\rho_s \mu(0)}} \delta(t) + \theta(t) f_{00}(t) \right], \quad (31)$$

шартларни қаноатлантирувчи масалани ҳосил қиласиз, бу ерда

$$L[k, u] = u(z, t) + \int_0^t k(t-\tau) u(z, \tau) d\tau.$$

$k_0(0) = k'_0(0) = 0$ шартлар ўринли деб фараз қиласиз. Бунинг учун

$$f_{00}(0) = \frac{\lambda}{2\sqrt{\rho_s \mu(0)}}, \quad f'_{00}(0) = -\frac{1}{2\sqrt{\rho_s \mu(0)}} \left[\lambda \chi \rho_l + \frac{\lambda^2}{4} - \frac{1}{4\rho_s} \right], \quad (32)$$

шартларнинг бажарилишини талаб этиш етарли ҳисобланади.

(28)-(31) масала 1.2 параграфда ўрганилган масаланинг хусусий ҳоли бўлиб, қўйидаги теорема ўринли:

Теорема 8. Агар 1-теорема шартларига қўшимча равшида $\mu \in \Lambda$, $f_{00}(t) \in C^3[0, T]$ ва (32) шартлар бажарилса, у ҳолда (28)-(31) тескари масаланинг ягона ечими мавжуд ва $k_1(t) \in C^3[0, T]$ бўлади.

Учинчи параграфда $k_1(t)$ ни аниқлаш учун (23)-(27) тескари масалада $n=m=1$ деб $u_{11}(y, t)$, $k_1(t)$ функцияларга нисбатан

$$\rho_s \frac{\partial^2 u_{11}}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\mu(z) L[k_0, \frac{\partial u_{11}}{\partial z}] \right) + \int_0^t k_1(t-\tau) [\mu u_{00} + (\mu u_{02z})_z] d\tau - \chi \rho_l^2 \frac{\partial}{\partial t} (u_{11} - v_{11}), \quad (33)$$

$$\frac{\partial v_{11}}{\partial t} = \chi \rho_l (u_{11} - v_{11}), \quad (34)$$

тенгламалар

$$u_{11}|_{t<0} = \frac{\partial u_{11}}{\partial t}|_{t<0} \equiv 0, \quad v_{11}|_{t<0} \equiv 0, \quad (35)$$

$$\left[L[k_0, u_{11z}] + \int_0^t k_1(t-\tau) u_{02z}(\tau, \tau) d\tau \right]_{z=+0} = 0, \quad (36)$$

$$u_{11}|_{z=0} = f_1(t), \quad (37)$$

бошланғич, чегаравий ва қўшимча шартларни ҳосил қиласиз.

Ушбу масаланинг ечимига нисбатан қўйидаги теорема ўринли:

Теорема 9. Фараз қиласлик, $f_1(t) \in C^2[0, T]$ ва $f_1(0) = f'_1(0) = 0$ бўлсин. У ҳолда (33)-(37) масаланинг ихтиёрий фиксиранган $T > 0$ лар учун ягона $k_1(t) \in C[0, T]$ ечими мавжуд.

Масала ечимининг шартли турғунлигини характерловчи теоремани келтирамиз. $M(q_0)$ орқали бирор фиксиранган мусбат q_0 сони учун $\|k_1(t)\|_{C[0,T]} \leq q_0$, $t \in [0, T]$ тенгсизликни қаноатлантирувчи $k_1(t) \in C[0, T]$ функциялар тўпламини белгилаймиз.

Теорема 10. $k_1^{(1)}(t) \in M(q_0)$, $k_1^{(2)}(t) \in M(q_0)$ лар (33)-(37) тескари масаланинг $f_1^{(i)}(t)$, $\tilde{\mu}^{(i)}(y)$, $i=1, 2$ қўшимча шартларга мос ечимлари бўлсин. У ҳолда шундай мусбат $d_3 = d_3(q_0, q_{00}, T)$ сон топилиб, бу ерда

$$q_{00} = \max \left\{ \|\tilde{\mu}^{(1)}(y)\|_{C^3[0,T/2]}, \|f_1^{(1)}(t)\|_{C^2[0,T]}, \|\tilde{\mu}^{(2)}(y)\|_{C^3[0,T/2]}, \|f_1^{(2)}(t)\|_{C^2[0,T]} \right\},$$

қўйидаги тенгсизлик ўринли

$$\|k_1^{(1)}(t) - k_1^{(2)}(t)\|_{C[0,T]} \leq d_3 \left[\|\tilde{\mu}^{(1)}(y) - \tilde{\mu}^{(2)}(y)\|_{C^3[0,T/2]} + \|f_1^{(1)}(t) - f_1^{(2)}(t)\|_{C^2[0,T]} \right].$$

Теорема 11. $k_1^{(i)}(t) \in C[0, T]$ өз $f_1^{(i)}(t)$, $\tilde{\mu}^{(i)}(y)$ функциялар 10-теореманинг шартларини қаноатлантирыс ин. Ү холда, агар барча $(y, t) \in D_T$ лар учун $f_1^{(1)}(t) = f_1^{(2)}(t)$, $\tilde{\mu}^{(1)}(y) = \tilde{\mu}^{(2)}(y)$ бўлса, ихтиёрий $t \in [0, T]$ ларда $k_1^{(1)}(t) \equiv k_1^{(2)}(t)$ бўлади.

ХУЛОСА

Диссертацияда гиперболик интегро–дифференциал тенгламалар системасининг интеграл ҳади бир ва икки ўзгарувчили бўлган ядросини аниқлаш масалаларининг корректлиги тадқиқ этилди. Вертикал йўналишда бир жинсли бўлмаган ғовак муҳитларда ёпишқоқ–эластиклик интегро–дифференциал тенгламалар системаси учун тескари масалани иккинчи тур Вольтерра интеграл тенгламалар системасига келтириш методлари олинди.

Тадқиқотнинг асосий натижалари қўйидагилардан иборат:

1. Вертикал бир жинсли бўлмаган ғовак муҳит учун изотропик ёпишқоқ–эластиклик тенгламалар системасидан бир ўлчамли хотира ядросини бир қийматли аниқлашнинг глобал ечилиш шартлари олинди.
2. Тескари масала иккинчи тур чизиқли бўлмаган Вольтерра интеграл тенгламалар системасига келтирилган. Ноцизиқлилик ўрама характерга эга бўлгани учун қисқартириб акслантириш принципидан фойдаланиб, вазн нормали фазоларда интеграл тенгламаларнинг ягона ечими мавжудлиги исботланди.
3. Тескари масала ечими турғунлик баҳосининг Ламе параметрига ва тўғри масала ечими ҳақида қўшимча шартни ифодаловчи функцияга узлуксиз боғлиқлиги кўрсатилди.
4. Ламе параметри z ўзгарувчининг бирор функцияси бўлган ҳолда ёпишқоқ–эластиклик тенгламаси учун тескари масаланинг узлуксиз функциялар фазосида локал бир қийматли ечилиш теоремаси исботланди, ҳамда турғунлик баҳоси олинди.
5. Фазовий координата бўйича аналитик ва вақт ўзгарувчиси бўйича силлиқ бўлган хотира ядросини аниқлаш бўйича икки ўлчамли тескари масала тадқиқ қилинди. Локал бир қийматли ечилувчанлик теоремаси исботланди.
6. Икки ўлчамли интегро–дифференциал тенгламалар системаси учун бошлангич ва чегаравий масала ўрганилди. Тескари масалада ядро фазовий ўзгарувчисига кучсиз боғлик деб фараз қилиниб, бир ўлчамли масалалар олинди. Глобал бир қийматли ечилувчанлик теоремалари исботланди ва турғунлик баҳолари қурилди.

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ PhD.03/30.12.2019.FM.55.01
ПО ПРИСУЖДЕНИЮ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ПРИ УРГЕНЧСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ**
БУХАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РАХМОНОВ АСКАР АХМАДОВИЧ

**ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ИНТЕГРО –
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ВЯЗКОУПРУГОЙ
ПОРИСТОЙ СРЕДЕ**

01.01.02–Дифференциальные уравнения и математическая физика

**АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD)
ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИМ НАУКАМ**

БУХАРА-2020

Тема диссертации доктора философии (PhD) по физико-математическим наукам зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан за № B2020.2.PhD/FM221.

Диссертация выполнена в Бухарском государственном университете.

Автореферат диссертации на трех языках (узбекский, русский, английский (резюме)) размещен на веб-странице Научного совета (www.ik-mat.urdu.uz) и на Информационно-образовательном портале «Ziyonet» (www.ziyonet.uz).

Научный руководитель:

Дурдиев Дурдимурод Каландарович
доктор физико-математических наук, профессор

Официальные оппоненты:

Зикиров Обиджан Салижанович
доктор физико-математических наук, профессор

Яхшимуратов Алишер Бекчанович
доктор физико-математических наук

Ведущая организация:

Самаркандский государственный университет

Защита диссертации состоится «____» _____ 2020 года в ____ часов на онлайн заседании Научного совета PhD.03/30.12.2019.FM.55.01 при Ургенчском государственном университете (Адрес: 220100, г. Ургенч, ул. Х. Алимджана, дом 14. Тел.: (+99862) 224-66-11, факс: (+99862) 224-67-00, e-mail: ik_mat.urdu@umail.uz).

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Ургенчского государственного университета (зарегистрирована за №______). (Адрес: 220100, г. Ургенч, ул. Х.Алимджана, дом 14. Тел.: (+99862) 224-66-11, факс: (99862) 224-67-00).

Автореферат диссертации разослан «____» _____ 2020 года.
(протокол рассылки № 2 от «4» мая 2020 года).

Б.И. Абдуллаев

Председатель Научного совета по
присуждению ученой степени, д.ф.-м.н.

А.А. Атамуратов

Ученый секретарь Научного совета по
присуждению ученой степени, к.ф.-м.н.

С.А. Имомкулов

Председатель научного семинара
при Научном совете по присуждению
ученой степени, д.ф.-м.н.

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))

Актуальность и востребованность темы диссертации. Многие научно-прикладные исследования, проводимые в мировом масштабе, показывают актуальность исследования обратных задач для интегро-дифференциальных уравнений или систем уравнений. Математическое моделирование некоторых процессов в естественных науках для так называемых систем с памятью, поведения которых зависят от всей предыстории процесса, описывается интегро-дифференциальными уравнениями. Среда, в которой происходят такие процессы, называется средой с "последействием" или с "памятью". Задачи определения ядер интегрального члена интегро-дифференциальных уравнений гиперболического типа – относительно новое направление в теории обратных задач, возникшее в конце 80-х годов двадцатого века. Так как методы решения таких задач не сформированы в нужной степени, развитие исследований в данном направлении является актуальным.

В мировых научных исследованных на данный момент особое внимание уделяется вопросам изучения обратных задач для процессов с памятью. В математическом плане учет предыстории приводит к необходимости введения в рассматриваемую математическую модель упругости дополнительного интегрального слагаемого типа оператора свертки с ядром, отвечающим за предысторию или память среды. Таким образом, мы приходим к необходимости рассмотрения некоторых обратных задач, связанных с интегро-дифференциальными уравнениями. В приложениях важны задачи с дельтаобразными источниками, сосредоточенными в окрестности фиксированной точки или на границе области. Именно такие актуальные научные проблемы и исследуются в этой диссертационной работе.

В нашей стране особое внимание было уделено актуальным направлениям математической физики, которые имеют научное и практическое применение в фундаментальных науках. Изучение начально-краевых задач для интегро-дифференциальных уравнений, описывающих распространение волн в вязкоупругой пористой среде и исследование обратных задач для них являются актуальной задачей. Проведение научных исследований на уровне международных стандартов в области дифференциальных уравнений и математической физики выделено как основная задача фундаментальных исследований¹. Построение методов решения обратных задач для интегро-дифференциальных уравнений математической физики имеет важное значение в обеспечении исполнения данного постановления.

¹ Постановление №292 Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 мая 2017 года “Об организации деятельности научно-исследовательских заведений Академии наук”.

В частности, сегодняшний день большое внимание руководством нашего государства уделяется развитию математики, как основе всех точных наук. Исследования данной диссертации в определенной степени служат осуществлению задач, указанных в Постановлениях Президента Республики Узбекистан № УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», № ПП-4387 «О мерах государственной поддержки дальнейшего развития математического образования и науки, а также коренного совершенствования деятельности института математики имени В.И. Романовского академии наук республики Узбекистан», а также № ПП-4708 от 7 мая 2020 года «О мерах по повышению качества образования и развитию научных исследований в области математики», а также в других нормативно - правовых актах по данной деятельности.

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий в республике. Данное исследование выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий в Республике Узбекистан IV. «Математика, механика и информатика».

Степень изученности проблемы. Обратные задачи для гиперболических уравнений относятся к некорректным задачам математической физики. Первые постановки динамических обратных задач для гиперболических уравнений и систем были сформулированы и исследованы М.М.Лаврентьевым, В.Г.Романовым, А.С.Благовещенским, А.С.Алексеевым, К.В.Винклером и Д.Л.Джонсоном. Различные подходы и методы исследования обратных динамических задач для гиперболических уравнений и систем предложены и развиты в работах В.Г.Романова, А.С.Благовещенского, Я.Янно, А.Лоренци, А.Л.Бухгейма, Д.К.Дурдиева, Х.Х.Имомназарова и др. Из перечисленных выше работ отметим работы В.Г.Романова, А.С.Благовещенского, А.Лоренци, Д.К.Дурдиева и Х.Х.Имомназарова, которые в своей постановке наиболее близки к диссертационной работе.

При исследовании нестационарных процессов в пористых средах с учетом структуры пористой среды часто используются теории типа Био [М.А. Биот]. Впрочем, корректно проведенных сравнений теоретических исследований, основанных на теории Био, с экспериментальными результатами на природных образцах относительно мало. В прикладных задачах теории распространения упругих волн часто возникает потребность учесть пористость, флюид насыщенность среды и гидродинамический фон. В основываясь на теорию Био, В.Н.Доровский построил нелинейную математическую модель фильтрации жидкости в пористой упругой деформируемой среде. В основу модели положены три основных принципа: выполнение законов сохранения, принцип относительности Галилея, согласованность уравнений движения с термодинамическими условиями равновесия.

В работах А.Э.Холмуродова изучены прямые и обратные задачи для вышеописанной линеаризованной модели Доровского динамических процессов распространения SH (поперечных) волн в упругой пористой среде, а также построены сингулярные решения уравнения SH волн в упруго-пористой средах, получена система нелинейных вольтерровых интегральных уравнений второго рода для динамических обратных задач для уравнения SH волн в упруго-пористых средах, разработан численный метод и создана программа для численного решения прямой и обратных задач для распространения SH волн в упруго-пористых средах. В настоящее время эта тематика является предметом научных интересов многих математиков.

Связь темы докторской диссертации с научно-исследовательскими работами института, в котором выполняется докторская диссертация. Докторская диссертационная работа выполнена в соответствии с плановой темой научно-исследовательских работ Ф-4-02 «Термодинамика моделей математической физики с бесконечным множеством состояний» (2017-2020) Бухарского государственного университета.

Цель исследования. Основной целью настоящей докторской диссертационной работы является построение методов решений одномерных и двумерных обратных динамических задач для системы интегро-дифференциальных уравнений в вязкоупругой пористой среде, а также исследование единственности, устойчивости и существования решений этих обратных задач.

Задачи исследования:

исследование глобальной однозначной разрешимости и устойчивости задачи определения одномерного ядра для системы уравнений изотропной вязкоупругости в вертикально-неоднородной пористой среде;

доказательство теоремы единственности и в «малом» теоремы существования решения рассмотренных обратных задач, а также непрерывной зависимости решений обратных динамических задач от входных данных;

исследование локальной однозначной разрешимости задачи определения двумерного ядра, аналитического по пространственной переменной и гладкого по временной переменной, для системы уравнений изотропной вязкоупругости в пористой среде;

исследование динамической обратной задачи для уравнения вязкоупругости в пористой среде со слабо горизонтальной неоднородностью в полупространстве $z > 0$.

Объектом исследования: являются одномерные и двумерные обратные задачи для системы интегро-дифференциальных уравнений гиперболического типа второго порядка.

Предметом исследования: являются одномерные и двумерные прямые и обратные задачи для системы гиперболических интегро-дифференциальных уравнений второго порядка типа свёртки и система уравнений вязкоупругости.

Методы исследования: в диссертации использованы методы теории дифференциальных уравнений с частными производными и теории интегральных уравнений, а также методы функционального анализа. Однозначная разрешимость прямых и обратных задач доказана заменой задач замкнутой системой нелинейных интегральных уравнений второго рода Вольтеровского типа и дальнейшим применением метода последовательных приближений и принципа сжимающих отображений. Доказательство теорем однозначной разрешимости в классе функций аналитических по пространственным и гладких по временной переменной проведено на основе метода шкал Банаховых пространств аналитических функций.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

доказаны, что существует единственное глобальное решение обратной задачи, и получены оценки его устойчивости;

поставлена и решена одномерная обратная задача об определении параметров Ламе для системы уравнений вязкоупругости. Доказана теорема единственности и существования в «малом» решений рассмотренных обратных задач, а также непрерывной зависимости решений обратных динамических задач от входных данных;

методом шкал банаховых пространств аналитических функций доказана теорема локальной разрешимости обратной задачи в классе функций, аналитических по пространственной переменной и непрерывных по временной;

исследована обратная задача определения двумерного ядра в вязкоупругой пористой среде со слабо горизонтальной неоднородностью. Доказаны теоремы глобальной и локальной разрешимости этих задач.

Практические результаты исследования. Результаты исследований могут быть использованы в сейсмологии, при разработке нефтяных и газовых месторождений и при чтении специальных курсов лекций по предмету математической физики для старших курсов бакалавриатуры и магистратуры.

Достоверность результатов исследования обоснована использованием методов математического анализа, дифференциальных уравнений, математической физики, функционального анализа, а также строгостью математических рассуждений.

Научная и практическая значимость результатов исследования.

Результаты, полученные в диссертации, носят теоретический характер. Материал диссертационной работы, будучи в первую очередь теоретическим исследованием, является основой для формулировки конкретных вычислительных алгоритмов и решения актуальных практических задач, связанных с прикладной геофизикой, в частности, с сейсмической разведкой.

Полученные результаты могут быть также использованы в дальнейших исследованиях по теории обратных и некорректных задач для уравнений математической физики.

Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов по обратным задачам в вязкоупругой пористой среде для системы интегро-дифференциальных уравнений:

исследование разрешимости обратных задач в вязкоупругости в проекте ОТ-Ф4-69 «Гармонический анализ, степеней геометрии и его приложения к задачам математической физики» используется при исследовании обратных задач, поставленных для системы интегро-дифференциальных уравнений. (Справка Министерства высшего и среднего-специального образования Республики Узбекистан от 8 июля 2020 года). Применение научных результатов позволило доказать существование и единственность задачи определения обобщенной функции на сфере.

-исследование разрешимости обратных задач вязкоупругости для пористой среды в проекте «Математическое моделирование и численное решение задач механики сплошной среды и тепломассообмена в геофизических и инженерных задачах» регистрационный номер АААА-А19-119032590069-3 (Справка Южного Математического Института филиала ФГНБУ ФНЦ “Владикавказский научный центр РАН, от 27.07.2020 г.). Фундаментальные результаты исследований дали возможность разработать численный алгоритм по определению основных характеристик вязкоупругой пористой среды.

Апробации результатов исследования. Результаты данного исследования обсуждены на 5 научно-практических конференциях, в том числе на 2 международных и 3 республиканских.

Опубликование результатов. По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, из них 7 статей входят в перечень научных изданий, предложенных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для защиты докторской диссертации философии, в том числе 3 опубликованы в зарубежных журналах входящих в базу SCOPUS и 4 в республиканских научных изданиях.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения трёх глав, заключения и списка использованной литературы. Объем диссертации 106 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Первая глава диссертации называется «**Одномерные обратные задачи для системы интегро–дифференциальных уравнений в вязкоупругой пористой среде**». В первом параграфе этой главы, приводятся основные понятия, а также известные теоремы, которые используются при доказательствах результатов диссертации. Во втором параграфе рассматривается начально-краевая задача для системы интегро–дифференциальных уравнений SH (поперечной)-волн в вязкоупругой пористой среде, состоящая в нахождении общего решения $U(z, t)$, $V(z, t)$ из следующих уравнений

$$\rho_s \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial z} \Sigma(z, t) - \chi \rho_l^2 \frac{\partial}{\partial t} (U - V), \quad t \in \mathbb{D}, \quad z > 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} = \chi \rho_l (U - V), \quad t \in \mathbb{D}, \quad z > 0 \quad (2)$$

с начальным и граничным условиями

$$U|_{t=0} = \frac{\partial U}{\partial t}|_{t=0} \equiv 0, \quad V|_{t=0} \equiv 0, \quad \Sigma(+0, t) = \delta'(t). \quad (3)$$

Здесь $U(z, t)$ скорость упругого пористого тела с постоянной парциальной плотностью ρ_s и $V(z, t)$ скорость жидкости с постоянной плотностью ρ_l , χ – коэффициент трения между компонентами, которые всюду в настоящей диссертации полагаются постоянными и положительными, $\delta'(t)$ – производная дельта-функции Дирака. Напряжение $\Sigma(z, t)$ связано с $U(z, t)$ формулой

$$\Sigma(z, t) = \mu(z) \frac{\partial U}{\partial z} + \int_0^t k(t-\tau) \mu(z) \frac{\partial U}{\partial z}(z, \tau) d\tau, \quad (4)$$

где $\mu(z)$ есть параметр Ламе, $k(t)$ – функция, характеризующая вязкость среды. В обратной задаче требуется найти ядро $k(t)$, $t > 0$, входящее в уравнение (1) посредством формулы (4), если о решении прямой задачи известно следующее

$$U|_{z=0} = f(t), \quad (5)$$

где $f(t)$ – заданная функция.

Пусть

$$y = \int_0^z \frac{d\xi}{c(\xi)}, \quad c(z) := \sqrt{\frac{\mu(z)}{\rho_s}}. \quad (6)$$

Обозначим через $l(y)$ функцию, определяющую соответствие между y и z , т.е. $z = l(y)$. Введем также обозначения

$$\frac{\chi \rho_l^2}{\rho_s} = \lambda, \quad \tilde{\mu}(y) = \mu(l(y)). \quad (7)$$

Рассмотрим задачу (1)-(5) в области $D_T = \{(y, t) : 0 \leq y \leq t \leq T - y\}$.

Теорема 1. Пусть выполнены следующие условия:

1) функция $f(t)$ представима в виде: $f(t) = -\frac{1}{\sqrt{\rho_s \tilde{\mu}(0)}} \delta(t) + \theta(t) f_{00}(t)$, где $f_{00}(t) \in C^2[0, T]$ – заданная функция и $\theta(t)$ – функция Хэвисайда: $\delta(t) = (d/dt)\theta(t)$; 2) $\tilde{\mu}(y) \in C^3[0, T/2]$.

Тогда существует единственное решение $k(t) \in C^2[0, T]$ обратной задачи (1)-(5) для любого фиксированного $T > 0$.

Обозначим через $M(h_0)$ множество функций $k(t) \in C^2[0, T]$, удовлетворяющих для $t \in [0, T]$ неравенству $\|k(t)\|_{C^2[0, T]} \leq h_0$ с фиксированной положительной постоянной h_0 .

Теорема 2. Пусть $k^{(1)}(t) \in M(h_0)$ и $k^{(2)}(t) \in M(h_0)$ два решения обратной задачи (1)-(5) с данными $(\tilde{\mu}^{(1)}, f_{00}^{(1)})$ и $(\tilde{\mu}^{(2)}, f_{00}^{(2)})$, соответственно. Тогда найдется такое положительное число $d_1 = d_1(h_0, h_{00}, T)$,

$$h_{00} = \max \left\{ \|\tilde{\mu}^{(1)}(y)\|_{C^3[0, T/2]}, \|f_{00}^{(1)}(t)\|_{C^2[0, T]}, \|\tilde{\mu}^{(2)}(y)\|_{C^3[0, T/2]}, \|f_{00}^{(2)}(t)\|_{C^2[0, T]} \right\},$$

что имеет место оценка

$$\|k^{(1)}(t) - k^{(2)}(t)\|_{C^2[0, T]} \leq d_1 \left[\|\tilde{\mu}^{(1)}(y) - \tilde{\mu}^{(2)}(y)\|_{C^3[0, T/2]} + \|f_{00}^{(1)}(t) - f_{00}^{(2)}(t)\|_{C^2[0, T]} \right].$$

Следующая теорема единственности является следствием теоремы устойчивости.

Теорема 3. Пусть функции $k^{(i)}(t) \in C^2[0, T]$ и $\tilde{\mu}^{(i)}(t)$, $f_{00}^{(i)}(t)$, $i=1, 2$ имеют тот же смысл, что и в теореме 2. Если при этом $\tilde{\mu}^{(1)}(y) = \tilde{\mu}^{(2)}(y)$, $f_{00}^{(1)}(t) = f_{00}^{(2)}(t)$ для $(y, t) \in D_T$, то $k^{(1)}(t) \equiv k^{(2)}(t)$ на отрезке $[0, T]$.

В параграфе 1.3 изучена следующая обратная задача: требуется по дополнительной информации (5), найти $\mu(z)$ из (1)-(4) (при этом $k(t)$ считается известной).

Теорема 4. Пусть $T > 0$ фиксированное число, а функция $f(t)$ представима как в теореме 1 и $k(t) \in C^2[0, T]$. Тогда при достаточно малых $T_0 \in (0, T]$ существует единственное решение обратной задачи определения $\tilde{\mu}(y)$ из соотношений (1)-(5), такое, что $\tilde{\mu}(y) \in C^3[0, T_0/2]$.

Приведем еще теорему, характеризующую оценку условной устойчивости решения (1)-(5) обратной задачи. Такую оценку можно получить, задавшись, определенным классом данных $\tilde{Q}_0(M_1, \tilde{\mu}(0), \tilde{\mu}'(0), k(0), f_{00}(0), \lambda, T) := \tilde{Q}(M_1, T)$ для функций $f_{00}(t)$, $k(t)$ и классом $Q_0(M, \tilde{\mu}(0), \tilde{\mu}'(0), k(0), f_{00}(0), \lambda, T_0) := Q(M, T_0)$ для функций $\tilde{\mu}(y)$. Будем говорить, $f_{00}(t)$, $k(t)$ принадлежат классу $\tilde{Q}(M_1, T)$ и $\tilde{\mu} \in Q(M, T_0)$, если они удовлетворяют неравенствам $\|f_{00}\|_{C^2[0, T]} \leq M_1$, $\|k\|_{C^2[0, T]} \leq M_1$, $\|\tilde{\mu}\|_{C^3[0, T_0/2]} \leq M$.

Теорема 5. Пусть $\tilde{\mu}^{(1)}(y), \tilde{\mu}^{(2)}(y) \in Q(M, T_0)$ два решения обратной задачи (1)-(5) с наборами данных $f_{00}^{(1)}, k^{(1)} \in \tilde{Q}(M_1, T)$ и $f_{00}^{(2)}, k^{(2)} \in \tilde{Q}(M_1, T)$ соответственно.

Тогда имеет место оценка устойчивости

$$\|\tilde{\mu}^{(1)}(y) - \tilde{\mu}^{(2)}(y)\|_{C^3[0, T_0/2]} \leq d_2 \left[\|f_{00}^{(1)}(t) - f_{00}^{(2)}(t)\|_{C^2[0, T]} + \|k^{(1)}(t) - k^{(2)}(t)\|_{C^2[0, T]}\right],$$

причем константа d_2 зависит только от выбора классов $\tilde{Q}(M_1, T), Q(M, T)$.

Из теоремы устойчивости следует справедливость теоремы единственности для достаточно малого фиксированного положительного T_0 .

Теорема 6. Пусть функции $\tilde{\mu}^{(i)}(y) \in C^3[0, T_0/2]$ и $f_{00}^{(i)}, k^{(i)}, i=1,2$ имеют тот же смысл, что и в теореме 5. Если при этом $f_{00}^{(1)}(t) = f_{00}^{(2)}(t), k^{(1)}(t) = k^{(2)}(t)$ для $t \in [0, T]$, то $\tilde{\mu}^{(1)}(y) \equiv \tilde{\mu}^{(2)}(y)$ на отрезке $\left[0, \frac{T_0}{2}\right]$.

Во второй главе диссертации, названной «Задача об определении двухмерного ядра в вязкоупругой пористой среде, аналитического по пространственной переменной», изучена задача определения двумерного ядра в классе функций, обладающих конечной гладкостью по временной переменной и аналитических по пространственной переменной. В первом параграфе приводится постановка прямой и обратной задачи. Вводится шкала банаховых пространств аналитических функций вещественного переменного.

Рассматривается система интегро–дифференциальных гиперболических уравнений

$$\rho_s \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} \Sigma_1(x, z, t) + \frac{\partial}{\partial z} \Sigma_2(x, z, t) - \chi \rho_l^2 \frac{\partial}{\partial t} (U - V), \quad (9)$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} = \chi \rho_l (U - V), \quad (x, t) \in \square^2, \quad z > 0 \quad (10)$$

при следующих начальных и граничных условиях

$$U|_{t<0} = \frac{\partial U}{\partial t}|_{t<0} \equiv 0, \quad V|_{t<0} \equiv 0, \quad \Sigma_2(x, +0, t) = \varepsilon(x) \delta'(t). \quad (11)$$

Система уравнений (9), (10) описывает распространение звуковых волн в вязкоупругой пористой среде, состоящей из упругого пористого тела, поры которого заполнены жидкостью. Здесь функция $U(x, z, t)$ имеет физический смысл u – компонента вектора смещений частиц упругого пористого тела с постоянной парциальной плотностью ρ_s , а $V(x, z, t)$ – такой компонент вектора смещений частиц жидкости с постоянной плотностью ρ_l , $\varepsilon(x)$ – заданная гладкая функция. В равенствах (9) и (10) напряжения $\Sigma_1(x, z, t)$ и $\Sigma_2(x, z, t)$ связаны с $U(x, z, t)$ формулами

$$\begin{cases} \Sigma_1(x, z, t) = \mu(z) \frac{\partial U}{\partial x} + \int_0^t k(x, t-\tau) \mu(z) \frac{\partial U}{\partial x}(x, z, \tau) d\tau, \\ \Sigma_2(x, z, t) = \mu(z) \frac{\partial U}{\partial z} + \int_0^t k(x, t-\tau) \mu(z) \frac{\partial U}{\partial z}(x, z, \tau) d\tau, \end{cases} \quad (12)$$

где $k(x,t)$ – функция, характеризующая вязкость среды, а $\mu(z)$ – параметр Ламе. Предполагается, что функция $k(x,t)$ удовлетворяет условиям, которые не влияют на суть исследования и облегчают громоздкие выкладки: $k(x,0) = k_t(x,0) = 0$, и $\mu(z) \in \Lambda := \{\mu(z) \in C^3[0,\infty) : \mu(z) > 0; \mu'(+0) = 0\}$. Кроме того, всюду в этой главе для простоты положены $\rho_s = \rho_t = \chi = 1$.

Задача определения U и V из уравнений (9), (10) при известных функциях $\mu(z), k(x,t), \varepsilon(x)$ называется прямой задачей для вязкоупругой пористой среды. В обратной задаче требуется определить ядро $k(x,t)$, $t > 0$, $x \in \mathbb{D}$, входящее в уравнение (9) посредством формул (12), если относительно решения прямой задачи известна информация:

$$U|_{z=0} = -\frac{\varepsilon(x)}{\sqrt{\mu(0)}} \delta(t) + e^{-t/2} \theta(t) f(x,t), \quad (13)$$

где $f(x,t)$ – заданная регулярная функция.

Для решения обратной задачи (9)-(13) используется метод шкал банаховых пространств аналитических по переменной x функций. Пространством \mathbf{A}_s , $s > 0$ (s – параметром шкалы) аналитических функций действительного переменного называется множество функций $\psi(x)$, $x \in \mathbb{D}$, аналитических в окрестности начала координат, для которых конечна норма

$$\|\psi\|_s = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{s^j}{j!} \left| \frac{d^j}{dx^j} \psi(x) \right|_{x=0} < \infty. \quad (14)$$

Доказывается теорема однозначной разрешимости обратной задачи.

Теорема 7. Пусть $f(x,0) = \frac{\varepsilon(x)}{2\sqrt{\mu(0)}}$, $f_t(x,0) = \frac{\varepsilon(x)}{8\sqrt{\mu(0)}} [\mu''(0) - 9] - \frac{\sqrt{\mu(0)}}{2} \varepsilon''(x)$,

$\mu \in \Lambda$, функции $\varepsilon(x)$, $1/\varepsilon(x)$ принадлежат \mathbf{A}_{s_0} . Кроме того, $f(x,t) \in C_t^2(\mathbf{A}_{s_0}; [0,T])$.

Тогда найдётся такое $a \in (0, T/2)$, $as_0 < T/2$, что для любого $s \in (0, s_0)$ существует единственное решение обратной задачи (9)-(13) такое, что

$$k(x,t) \in C_t^2(\mathbf{A}_{s_0}; [0, a(s_0 - s)]),$$

где $C_t^2(\mathbf{A}_{s_0}; [0,T])$ обозначим класс функций, непрерывно – дифференцируемых 2 раз по переменной t , со значениями в \mathbf{A}_{s_0} .

Третья глава диссертации называется «**Задача об определении двумерного ядра в вязкоупругой пористой среде со слабо горизонтальной неоднородностью**». В этой главе рассматривается начально-краевая задача для системы интегро–дифференциальных уравнений гиперболического типа (9), (10). В первом параграфе выполняются предварительные построения. Рассматриваем систему уравнений (9) и (10) в области $\mathbb{D}_+^3 := \{(x,z,t) \in \mathbb{D}^3 \mid z > 0\}$ с начальным и граничным условиями

$$U \Big|_{t<0} = \frac{\partial U}{\partial t} \Big|_{t<0} \equiv 0, \quad V \Big|_{t<0} \equiv 0, \quad \Sigma_2 \Big|_{z=+0} = \delta(x)\delta'(t). \quad (15)$$

Напряжения $\Sigma_1(x, z, t)$ и $\Sigma_2(x, z, t)$ связано с $U(x, z, t)$ формулой (12), $\mu(z) \in \Lambda$.

Требуется определить ядро $k(x, t)$, $t > 0$, $x \in \square$, входящее в уравнение (9) посредством формулы (12), если относительно решения прямой задачи известна информация

$$U \Big|_{z=0} = f(x, t), \quad (16)$$

$f(x, t)$ – заданная функция.

Пусть ядро $k(x, t)$, входящее в уравнение (9), слабо зависит от горизонтальной переменной x :

$$k(x, t) = k_0(t) + tx k_1(t) + \dots \quad (17)$$

где t – малый параметр. Во втором и третьем параграфах построен метод отыскания k_0 и k_1 . Решение прямой задачи (9), (10), (15) ищем в виде ряда по степеням t :

$$U(x, z, t) = U_0(x, z, t) + tU_1(x, z, t) + \dots, \quad V(x, z, t) = V_0(x, z, t) + tV_1(x, z, t) + \dots, \quad (18)$$

кроме того

$$\Sigma_1(x, z, t) = \Sigma_{10}(x, z, t) + t\Sigma_{11}(x, z, t) + \dots, \quad \Sigma_2(x, z, t) = \Sigma_{20}(x, z, t) + t\Sigma_{21}(x, z, t) + \dots,$$

где

$$\begin{aligned} \Sigma_{1n} &:= \mu(z) \left[U_{nx}(x, z, t) + \sum_{j=0}^n x^j \int_0^t k_j(\tau) U_{n-j,x}(\tau) d\tau \right], \\ \Sigma_{2n} &:= \mu(z) \left[U_{nz}(x, z, t) + \sum_{j=0}^n x^j \int_0^t k_j(\tau) U_{n-j,z}(\tau) d\tau \right], \quad n = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

Подставляя в (9), (10) разложения для U , V , k по степеням t и приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях t , с помощью стандартных вычислений, вводятся дифференциальные уравнения для функций $U_n(x, z, t)$, $V_n(x, z, t)$:

$$\begin{aligned} \rho_s \frac{\partial^2 U_n}{\partial t^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\mu(z) \frac{\partial U_n}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\mu(z) \frac{\partial U_n}{\partial z} \right) + \int_0^t \sum_{j=0}^n k_j(\tau) \left[\frac{\partial}{\partial x} (\mu x^j U_{n-j,x}) + \right. \\ &\quad \left. + \frac{\partial}{\partial z} (\mu x^j U_{n-j,z}) \right] d\tau - \chi \rho_l^2 \frac{\partial}{\partial t} (U_n - V_n), \end{aligned} \quad (19)$$

$$\frac{\partial V_n}{\partial t} = \chi \rho_l (U_n - V_n), \quad (20)$$

$$U_n \Big|_{t<0} = \frac{\partial U_n}{\partial t} \Big|_{t<0} \equiv 0, \quad V_n \Big|_{t<0} \equiv 0, \quad \Sigma_{2n}(t, x, +0) = \delta_{n0} \delta(x) \delta'(t), \quad (21)$$

$$U_n \Big|_{z=0} = f_n(x, t), \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad (22)$$

где δ_{n0} – символ Кронекера: $\delta_{ij} = 1$, если $i = j$, $\delta_{ij} = 0$, если $i \neq j$. Умножая обе части уравнений (19), (20) на x^m и интегрируя по x в пределах от минус до плюс бесконечности, получаем

$$\rho_s u_{n,m,t} = \mu m(m-1)u_{n,m-2} + (\mu u_{n,mz})_z + \int_0^t \sum_{j=0}^n K_j(t-\tau) [\mu m(m+j-1) \times \\ \times u_{n-j,m+j-2} + (\mu u_{(n-j,m+j)z})_z] d\tau - \chi \rho_l^2 (u_{(n,m)t} - v_{(n,m)t}), \quad (23)$$

$$v_{n,m,t} = \chi \rho_l (u_{n,m} - v_{n,m}). \quad (24)$$

В уравнениях (23), (24) через $u_{n,m}, v_{n,m}$ обозначены m -й моменты функций U_n, V_n :

$$u_{n,m}(z,t) := \int_{-\infty}^{+\infty} x^n U_n(x,z,t) dx, \quad v_{n,m}(z,t) := \int_{-\infty}^{+\infty} x^m V_n(x,z,t) dx.$$

При получении (23), (24) использован тот факт, что при любом конечном t , каждая функция U_n, V_n , ($n=0,1,2,\dots$) представляет собой сумму некоторой сингулярной обобщенной функции конечного порядка и регулярной функции, причем носители U_n, V_n ограничены. $u_{n,m}, v_{n,m}$ удовлетворяют условиям

$$u_{n,m} \Big|_{t<0} = \frac{\partial u_{n,m}}{\partial t} \Big|_{t<0} \equiv 0, \quad v_{n,m} \Big|_{t<0} \equiv 0, \quad (25)$$

$$\left[u_{n,mz} + \int_0^t \sum_{j=0}^n k_j(t-\tau) u_{(n-j,m+j)z} d\tau \right]_{z=+0} = \frac{\delta_{n0}\delta_{m0}}{\mu(0)} \delta'(t). \quad (26)$$

Пусть

$$u_{nn} \Big|_{z=0} = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n f_n(x,t) dx = f_n(t), \quad (27)$$

где $f_n(t)$, $n=0,1$ – заданные достаточно гладкие функции.

Во втором параграфе решается обратная задача определения функции k_0 . Положим $n=m=0$. Тогда (23)-(27) приводят к задаче определения функций k_0 и u_{00}, v_{00} из следующих равенств:

$$\rho_s \frac{\partial^2 u_{00}}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\mu(z) L \left[k_0, \frac{\partial u_{00}}{\partial z} \right] \right) - \chi \rho_l^2 \frac{\partial}{\partial t} (u_{00} - v_{00}), \quad (28)$$

$$\frac{\partial v_{00}}{\partial t} = \chi \rho_l (u_{00} - v_{00}), \quad (29)$$

с начальным и граничным условиями

$$u_{00} \Big|_{t<0} = \frac{\partial u_{00}}{\partial t} \Big|_{t<0} \equiv 0, \quad v_{00} \Big|_{t<0} \equiv 0, \quad L \left[k_0, \frac{\partial u_{00}}{\partial z} \right]_{z=+0} = \frac{\delta'(t)}{\mu(0)}, \quad (30)$$

$$u_{00} \Big|_{z=0} = f_0(t) \left[\equiv - \frac{1}{\sqrt{\rho_s \mu(0)}} \delta(t) + \theta(t) f_{00}(t) \right], \quad (31)$$

где

$$L[k, u] = u(z,t) + \int_0^t k(t-\tau) u(z, \tau) d\tau.$$

В дальнейшем, будем считать $k_0(0) = k'_0(0) = 0$. Эти ограничения не являются существенными, но намного упрощают громоздкие формулы и для этого достаточно положить

$$f_{00}(0) = \frac{\lambda}{2\sqrt{\rho_s \mu(0)}}, \quad f'_{00}(0) = -\frac{1}{2\sqrt{\rho_s \mu(0)}} \left[\lambda \chi \rho_l + \frac{\lambda^2}{4} - \frac{1}{4\rho_s} \right]. \quad (32)$$

Эта задача является частным случаем задачи, рассмотренной в главе I, и для нее справедлива следующая теорема.

Теорема 8. *Если в условиях теоремы 1 дополнительно требовать $\mu \in \Lambda$, $f_{00}(t) \in C^3[0, T]$ и (32), то решение обратной задачи (28)-(31) принадлежит следующему классу: $k_0(t) \in C^3[0, T]$.*

В третьем параграфе определяется k_1 . В целом, учитывая дополнительное условие (27) при $n=1$ и прямую задачу (23)-(26) при $n=m=1$, сформулируем основную задачу определения пару функций $u_{11}(y, t)$, $k_1(t)$ из следующих равенств:

$$\rho_s \frac{\partial^2 u_{11}}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\mu(z) L[k_0, \frac{\partial u_{11}}{\partial z}] \right) + \int_0^t k_1(t-\tau) [\mu u_{00} + (\mu u_{02z})_z] d\tau - \chi \rho_l^2 \frac{\partial}{\partial t} (u_{11} - v_{11}), \quad (33)$$

$$\frac{\partial v_{11}}{\partial t} = \chi \rho_l (u_{11} - v_{11}), \quad (34)$$

с начальным и граничным условиями

$$u_{11}|_{t<0} = \frac{\partial u_{11}}{\partial t}|_{t<0} \equiv 0, \quad v_{11}|_{t<0} \equiv 0, \quad (35)$$

$$\left[L[k_0, u_{11z}] + \int_0^t k_1(t-\tau) u_{02z}(z, \tau) d\tau \right]_{z=+0} = 0, \quad (36)$$

$$u_{11}|_{z=0} = f_1(t). \quad (37)$$

Относительно решения этой задачи справедлива следующая теорема.

Теорема 9. *Пусть $f_1(t) \in C^2[0, T]$ и $f_1(0) = f'_1(0) = 0$. Тогда для любого фиксированного $T > 0$ обратная задача (33)-(37) имеет единственное решение $k_1(t) \in C[0, T]$.*

Приведем еще теорему, характеризующую оценку условной устойчивости решения обратной задачи. Рассмотрим множество $M(q_0)$ функций $k_1(t) \in C[0, T]$, удовлетворяющих для $t \in [0, T]$ неравенству $\|k_1(t)\|_{C[0,T]} \leq q_0$ с фиксированной положительной постоянной q_0 .

Теорема 10. *Пусть $k_1^{(1)}(t) \in M(q_0)$, $k_1^{(2)}(t) \in M(q_0)$ решения обратной задачи (33)-(37) с набором данных $f_1^{(i)}(t)$, $\tilde{\mu}^{(i)}(y)$, $i=1, 2$ соответственно. Тогда найдётся такое положительное число $d_3 = d_3(q_0, q_{00}, T)$,*

$$q_{00} = \max \left\{ \|\tilde{\mu}^{(1)}(y)\|_{C^3[0,T/2]}, \|f_1^{(1)}(t)\|_{C^2[0,T]}, \|\tilde{\mu}^{(2)}(y)\|_{C^3[0,T/2]}, \|f_1^{(2)}(t)\|_{C^2[0,T]} \right\},$$

что справедлива оценка устойчивости

$$\|k_1^{(1)}(t) - k_1^{(2)}(t)\|_{C[0,T]} \leq d_3 \left[\|\tilde{\mu}^{(1)}(y) - \tilde{\mu}^{(2)}(y)\|_{C^3[0,T/2]} + \|f_1^{(1)}(t) - f_1^{(2)}(t)\|_{C^2[0,T]} \right].$$

Теорема 12. Пусть функции $k_1^{(i)} \in C[0,T]$ и $f_1^{(i)}, \tilde{\mu}^{(i)}, i=1,2$, имеют тот же смысл, что и в теорема 10. Если при этом $f_1^{(1)}(t) = f_1^{(2)}(t)$, $\tilde{\mu}^{(1)}(y) = \tilde{\mu}^{(2)}(y)$ для $(y,t) \in D_T$, то $k_1^{(1)}(t) \equiv k_1^{(2)}(t)$ на отрезке $[0,T]$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации исследованы вопросы корректности одномерных и двумерных динамических обратных задач определения ядра интегрального члена в системе интегро–дифференциальных уравнений гиперболического типа. Получены методы, с помощью которых обратная задача для интегро–дифференциальных уравнений сводится к решению системы интегральных уравнений второго порядка вольтерровского типа. Рассмотрены обратные задачи для широкого класса гиперболических интегро–дифференциальных уравнений с интегральным оператором в правой части типа свертки.

1. Получены условия однозначной глобальной разрешимости одномерной задачи определения ядра памяти для системы уравнений изотропной вязкоупругости для вертикально–неоднородной пористой среды.
2. В процессе решения обратной задачи выводится система нелинейных интегральных уравнений Вольтерра второго рода. Нелинейность носит сверточный характер, поэтому в пространстве с экспоненциальным весом получены единственное решение системы интегральных уравнений, используя принцип сжатых отображений.
3. Оценки устойчивости показывают непрерывную зависимость решения обратной задачи от упругих параметров Ламе и дополнительной информации о решении прямой задачи.
4. Доказана локальная однозначная разрешимость обратной задачи для системы интегро–дифференциального уравнения вязкоупругости, когда параметр Ламе в рассматриваемой среде является некоторой функцией от z , получена оценка устойчивости.
5. Доказана теорема локальной однозначной разрешимости двумерной задачи определения ядра памяти, аналитического по части пространственных координат и гладкого по временной переменной, для системы уравнений изотропной вязкоупругости для вертикально–неоднородной пористой среды.
6. Исследуется начально–краевая задача для системы двумерных интегро–дифференциальных уравнений. Обратная задача сведена к серии одномерных обратных задач. Получены теоремы глобальной однозначной разрешимости и оценки устойчивости обратных задач.

**SCIENTIFIC COUNCIL AWARDING SCIENTIFIC DEGREE
PhD.03/30.12.2019.FM.55.01 URGENCH STATE UNIVERSITY**

BUKHARA STATE UNIVERSITY

RAHMONOV ASKAR AHMADOVICH

**INVERSE PROBLEMS FOR THE SYSTEM INTEGRO–
DEFFERENTIAL EQUATION IN A VISCO–ELASTIC POROUS MEDIUM**

01.01.02–Differential Equations and Mathematical Physics

**ABSTRACT OF DISSERTATION OF THE DOCTOR OF
PHILOSOPHY (PhD) ON PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES**

BUKHARA - 2020

The theme of dissertation of doctor of philosophy (PhD) on physical and mathematical sciences was registered at the Supreme Attestation Commission at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan under number B2020.2.PhD/FM221.

Dissertation has been prepared at Buhara State University

The abstract of the dissertation is posted in three languages (uzbek, russian, english (resume)) on the website (www.ik-mat.urdu.uz) and the «Ziyonet» Information and educational portal (www.ziyonet.uz).

Scientific supervisor:

Durdiev Durdimurod Kalandarovich

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor

Official opponents:

Zikirov Obidjan Salijanovich

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor

Yakhshimuratov Alisher Bekchanovich

Doctor of Physical and Mathematical Sciences

Leading organization:

Samarkand State University

Defense will take place «____» _____ 2020 at ____ at the online meeting of Scientific Council number PhD.03/30.12.2019.FM.55.02 at Urgench State University. (Address: 14 Kh. Olimjan str., Urgench city, 220100, Uzbekistan, Ph.: (+99862) 224-66-11, fax: (+99862)224-67-00, e-mail: ik_mat.urdu@umail.uz).

Dissertation is possible to review in Information-resource centre at Urgench State University (is registered №_____) (Address: 14 Kh. Olimjan str., Urgench city, 220100, Uzbekistan, Ph.: (99862) 224-66-11, fax: (99862) 224-67-00), ursubox@gmail.com).

Abstract of dissertation sent out on «____» _____ 2020 year
(Mailing report №____ on «____» may 2020 year)

B.I. Abdullaev

Chairman of scientific council on award of scientific degree, Dr.ph.m.s.

A.A. Atamuratov

Scientific secretary of scientific council on award of scientific degree, C.ph.m.s.

S.A. Imomkulov

Chairman of scientific Seminar under Scientific Council on award of scientific degree, Dr.ph.m.s.

INTRODUCTION (abstract of doctoral dissertation)

The importance and relevance of the dissertation topic. Inverse problems for integro-differential equations of hyperbolic type are a relatively new direction in the theory of inverse problems, which arose in the late 1980s of the twentieth century. At present, many specialists from all over the world are engaged in solving inverse problems for integro-differential equations of hyperbolic and parabolic type, which should be specially emphasized, all of these problems have a physical basis. The study of inverse problems of determining the kernel of integral operators in these equations from some information on the wave field plays an important role in the study of the structure and properties of the medium. In applications, problems with delta-shaped sources concentrated in a neighborhood of a fixed point or on the boundary of a region are important. It is precisely such tasks that are considered in this thesis.

The aim of the research work is to construct methods for solving one- and two-dimensional inverse dynamic problems for the system of integro-differential equations in a visco-elastic porous medium, as well as the study of the uniqueness, stability and existence of a solution to these inverse problems.

The tasks of the research work:

study of unique solvability, generalized initial-boundary value problems for the system of hyperbolic integro-differential equation with variable coefficients at the main part and with constant at lower derivatives with respect to t ;

study of the global unique solvability and stability of the problem of determining a one-dimensional core for a system of equations of isotropic visco-elasticity in a vertically inhomogeneous porous medium;

proof of the uniqueness theorem in the “small” theorem on the existence of solutions to the inverse problems considered, as well as the continuous dependence of the solutions of inverse dynamic problems on the input data;

study dynamic inverse problem for the equation of visco-elasticity in a porous medium with a weakly horizontal inhomogeneity in half-space $z > 0$.

The object of the research work is one- and two-dimensional inverse problems for a system of integro-differential equations of second-order hyperbolic type.

The scientific novelty of the research work is as follows:

studied one- and two-dimensional inverse problem related to the determination of the displacement function in a system of integro-differential equations with memory for a vertically inhomogeneous isotropic medium in half-space. On the boundary of the half-space, a special Neumann condition is specified. The memory function is included in the system as the core of a convolution-type integral operator. It is proved that there is a unique global solution to the inverse problem, and estimates of its stability are obtained;

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
LIST OF PUBLISHED WORKS

I бўлим (Часть I; Part I)

1. Durdiev D.K., Rahmonov A.A. A 2D kernel determination problem in a visco-elastic porous medium with a weakly horizontally inhomogeneity. // Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2020, Vol. 43, pp. 8776-8796. SCOPUS, Impact Factor: 1.533.
2. Дурдиев Д.К., Раҳмонов А.А. Обратная задача для системы интегро-дифференциальных уравнений SH-волн в вязкоупругой пористой среде: глобальная разрешимость. // Теоретическая и математическая физика, 2018, Т. 195, № 3, стр. 491-506. SCOPUS, Impact Factor: 0.901.
3. Дурдиев Д.К., Раҳмонов А.А. Задача об определении двумерного ядра в системе интегро-дифференциальных уравнений вязкоупругой пористой среды. // Сибирский Журнал Индустриальной математики, 2020, Т. 23, № 2. С. 63-80. SCOPUS, Impact Factor: 0.680.
English translation is published in Journal of Applied and Industrial Mathematics, 2020, Vol. 14, №2, pp. 281-295.
4. Ikromov I.A., Rahmonov A.A. On reconstruction of distributions by spherical means. // Uzbek Mathematical Journal, 2019, № 3, pp. 49-60. (01.00.00, №6)
5. Rahmonov A.A. Coefficient determination problem in the system of integro-differential equation for visco-elastic porous medium // Uzbek Mathematical Journal, 2020, №1, p. 102-115. (01.00.00, №6)
6. Раҳмонов А.А. Обратная задача для интегро-дифференциального уравнения волны SH в упруго-пористой среде. // Научный вестник Бухарского государственного университета. 2017/3 (67), С. 41-45. (01.00.00, №3)
7. Rahmonov A.A. Recovering stationary external force by distributions. // Scientific reports of Bukhara State University, 2019/4 (76), pp. 98-101. (01.00.00, №3)

II бўлим (Часть II; Part II)

8. Дурдиев Д.К., Раҳмонов А.А. Обратная задача для интегро-дифференциального уравнения волны SH в упруго-пористой среде // Тезисы докладов научной конференции с участием зарубежных ученых Проблемы современной топологии и её приложения. Ташкент, 11-12 мая 2017, стр. 180-182.
9. Ikromov I.A., Rahmonov A.A. On reconstruction of distributions by spherical means // «Порядковый анализ и смежные вопросы математического моделирования» тезисы докладов XV Международной научной

конференции: - Владикавказ: ЮМИ ВНЦ РАН, 15-20 июля, 2019, стр. 125-126.

10. Rahmonov A.A. Coefficient determination problem in the system of integro-differential equation for visco-elastic porous medium // «Inverse and ill-posed problems» The international conference, Samarkand, Uzbekistan, October 2-4, 2019, p. 25.
11. Rahmonov A.A. Recovering stationary external force by distributions // «Actual problems and applications of analysis» Materials of the republican scientific conference, Karshi, Uzbekistan, October 4-5, 2019, pp. 115-116.
12. Дурдиев Д.К., Раҳмонов А.А. Задача об определении двумерного ядра в вязкоупругой пористой среде со слабо горизонтальной неоднородностью // «Современные проблемы математики и прикладной математики» тезисы докладов, посвященной 100 летию академика С.Х.Сиражидинова. Ташкент, 21 мая, 2020, стр. 35-36.

Автореферат “Дурдона” нашриётида таҳрирдан ўтказилди ва ўзбек, рус ва инглиз тилларидаги матнларнинг мослиги текширилди.

Босишга рухсат этилди: 02.11.2020.

Бичими 60x84 1/16. Рақамли босма усулида босилди. Times New Roman гарнитураси. Шартли босма тобоги: 2.5. Адади 100 нусха. Буюртма №164.

Гувоҳнома АI № 178. 08.12.2010.
«Sadriddin Salim Buxoriy» МЧЖ босмахонасида чоп этилди.
Бухоро шаҳри, М.Иқбол кўчаси, 11-уй. Тел.: 0(365) 221-26-45

