

Д.А.Зулфиқориева, З.А.Юлдашев

ЎСИМЛИКЛАР БИЛАН ЗАҲАРЛАНИШЛАРНИНГ КИМЁ-ТОКСИКОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРИ



Д.А.Зулфиқориева, З.А.Юлдашев

**ЎСИМЛИКЛАР БИЛАН ЗАҲАРЛАНИШЛАРНИ КИМЁ-
ТОКСИКОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРИ**



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ФАРМАЦЕВТИКА ИНСТИТУТИ

“КЕЛИШИЛДИ”

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Фанни ривожлантириш бошқармаси таълим Баш бошқармаси
бошлиғи т.ф.д.,

 Сидиков А.А. «16» 06 2020 й.



Исмаилов У.С.
«16» 06 2020 й.

ЎСИМЛИКЛАР БИЛАН ЗАҲАРЛАНИШЛАРНИ КИМЁ-
ТОКСИКОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРИ
МОНОГРАФИЯ

«Тасдиқланди»

ЎзР Соғлиқни сақлаш
вазирлиги илмий фаолиятини
мувофиқлаштириш Бўлими

«18» 06 2020 й.
№ 84-1/168.

Тошкент - 2020

Муаллифлар: Д.А.Зулфиқориева, фармацевтика фанлари номзоди, доцент;
З.А.Юлдашев, фармацевтика фанлари доктори, профессор

Тақризчилар: **А.И. Исқандаров**, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Суд-тиббий экспертиза илмий-амалий маркази директори, тиббиёт фанлари доктори, профессор
Ф.Ф. Урманова, Тошкент фармацевтика институти Фармакогнозия кафедраси мудири, фармацевтика фанлари доктори, профессор

А.Ф. Дусматов, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги фармацевтика тармоғини ривожлантириш Агентлиги Фан ва таълимни ривожлантириш бошқармаси бошлиғи, фармацевтика фанлари доктори, доцент.

Мазкур монография Тошкент фармацевтика институти муаммолар ҳайъатининг 2020 йил даги -сон ва институт Кенгашининг 2020 йил даги -сон йиғилишларида муҳокама қилинган ва чоп этишга тавсия этилган.

Зулфиқориева Д.А., Юлдашев З.А.
“Ўсимликлар билан заҳарланишларни кимё-токсикологик тадқиқотлари” – Т.: ТошФарми, 2020. – 125 б.

Ушбу монографияда Ўзбекистонда ўсуви баязи алкалоид сақловчи ўсимликлар, улар таъсирида вужудга келадиган заҳарланиш ҳолатлари ва заҳарланиш белгилари ҳақида батафсил маълумотлар берилган. Алкалоид сақловчи ўсимликлар билан заҳарланганда одамлардан олинган турли объектларда уларнинг асосий таъсири этувчи моддаларини ажратиб олиш, аниқлаш ва таҳлил қилиш усуллари ёритилган. Монография фармакогнозия, токсикологик кимё соҳаларидаги мутахассислар ҳамда суд-кимё экспертлари, ушбу соҳада илмий изланишлар олиб бораётган изланувчилар, талабалар ва бошқа мутахассисларга мўлжалланган.

**УЎК 573.6: 615.9
КБК 28.087**

ISBN: 978-9943-6620-6-3

«Тафаккур томчилари» нашриёти, 2020

Шартли белги ва қисқартмалар

ЮКХ – юпқа қатlam хроматографияси

ГСХ – газ суюқлик хроматографияси

ЮССХ – юқори самарали суюқлик хроматографияси

ГХ-МС – газ-хромато-масс-спектрометрия

ЮССХ-МС – юқори самарали суюқлик хроматография-масс спектрометрия

ФЭК – фотоэлектроколориметрия

УБ-СФ – ультрабинафша спектрофотометрия

ИК – инфракизил спектрометрия

ТДСИС – термодесорбцион сирт ионлашув спектрометрияси

МДХ – мустакил давлатлар ҳамдўстлиги

Мундарижа

	Сўз боши	6
I	Заҳарли ўсимликларнинг таъсири бўйича таснифи.....	7
1.1.	Ўсимликларнинг заҳарлилиги бўйича таснифи.....	7
1.2.	Алкалоид сақловчи баъзи ўсимликларнинг токсикологияси.....	11
II.	Ўзбекистон ҳудудида ўсуви баъзи алкалоид сақловчи ўсимликлар токсикологияси ва улар билан учрайдиган заҳарланиш ҳолатлари.....	14
2.1.	Қора мингдевона.....	15
2.2.	Доривор белладонна.....	17
2.3.	Сассик алаф.....	19
2.4.	Катта қончўп.....	20
2.5.	Яшил шамшод.....	22
2.6.	Кампирчопон.....	25
	Хулоса.....	28
III.	Алкалоидларни турли объектлар таркибидан ажратиб олиш.....	29
3.1.	Ўсимликлардан алкалоидларни ажратиб олишда қўлланиладиган усул ва услублар.....	29
3.2.	Биосуюқликлардан алкалоидларни ажратиб олишнинг ишлаб чиқилган услублари	31
3.3.	Биологик объектдан алкалоидларни ажратиб олишнинг ўзига хос томонлари.....	32
	Хулоса.....	33
IV	Алкалоид сақлаган ўсимликлар билан заҳарланишларни аниқлашда қўлланиладиган таҳлил усуллари.....	33
4.1.	Ўсимликларни турли объектлардаги фармакогностик таҳлили	33
4.2.	ЮҚҲ-скрининг усулида алкалоидларни аниқлаш.....	41
4.3.	УБ – спектрофотометрия усулининг алкалоидлар таҳлилида қўлланилиши.....	54
4.4.	ГХ-МС усулида алкалоидларни аниқлашнинг замонавий усули	59
4.5.	Алкалоидлар таҳлилида ЮССХ усулининг ўрни.....	67
4.6.	ТДСИС усули алкалоидларни таҳлил қилишнинг янги усули..	86
	Хулоса.....	99
V	Ўсимликлар билан заҳарланиш ҳолатларида тез тиббий ёрдам кўрсатиш чоралари.....	99

5.1.	Антидотлар турлари ва уларни танлаш.....	99
5.2.	Хулосалар.....	102
VI	Фойдаланилган адабиётлар.....	103
VII	Иловалар.....	107

Сўз боши

Бугунги кунда дунё флорасининг 10 000 дан ортиқ заҳарли ўсимлик турлари фанга маълум. Бу ер шарида мавжуд ўсимликларнинг 2% ни ташкил қилади. Доривор ўсимликларни безараб деб ҳисоблаган ҳолда уни сустеъмол қилиш, маълум меъёрларга риоя қилмаган ҳолда, билиб-билмай қўллаш оқибатида инсон ва ҳайвонларнинг турли даражада заҳарланиш ҳолатлари кўплаб учраб туради.

Заҳарланишга сабаб бўлган ўсимликни аниқлашда дастлабки таҳлилларни амалга ошириш одамларга биринчи тез тиббий ёрдамни кўрсатишда муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Бунинг учун доривор ўсимлик таркибидаги кучли таъсир этувчи модданинг хоссаси ва хусусияти, заҳарланиш ҳолатларидаги клиник белгилар, бундай ҳолатларда кўрсатилиши мумкин бўлган тиббий ёрдам ҳақида аниқ маълумотлар тўпланган бир монографиянинг бўлиши мутахассислар учун жуда зарурлигини вақтнинг ўзи кўрсатмоқда.

Доривор ўсимликлар билан заҳарланиш ҳолатлари, уларни ўрганишга доир маълумотлар адабиётларда жуда тарқоқ ҳолда бўлиб, мавжудлари ҳам давр талабларига умуман жавоб бермайди. Шундан келиб чиқиб, адабиётлардаги мавжуд маълумотларни жамлаб, уларни таҳлил қилиб, қатор тажрибалар ўтказилиб, назарий ва амалий аҳамиятга эга монография яратишни муаллифлар ўз олдига мақсад қилиб олганлар.

Ушбу монографияда заҳарли ўсимликлар билан заҳарланиш ҳолатлари, заҳарланишнинг клиник кўринишлари ва белгилари ёритилган. Шунингдек, заҳарланиш ҳолатларини кимёвий ва физик-кимёвий услублар ёрдамида тадқиқ қилиш борасида олиб борилган тадқиқотлар натижалари қиёсий ўрганилган, таҳлил қилинган ва уларга шарҳ берилган. Монографиядан доривор ўсимликларнинг токсикологиясига оид маълумотларни олиш ва улар билан содир бўлган заҳарланишларни кимё-токсикологик жиҳатдан ўрганиш жараёнида фойдаланиш мумкин.

Мазкур монография бу соҳада яратилган биринчи тизимга келтирилган илмий изланиш натижаси бўлиб, шубҳасиз, у айрим камчиликлардан ҳоли эмас. Муаллифлар мазкур монография бўйича билдирилган барча фикр-мулоҳаза ва эътиrozларни мамнуният билан қабул қиласидилар ҳамда уларни монографияни қайта нашр этишда албатта инобатга оладилар.

I. Захарли ўсимликларнинг таъсири бўйича таснифи

1.1. Ўсимликларнинг заҳарлилиги бўйича таснифи

Доривор ўсимликларни бир вақтнинг ўзида заҳарли ва аксинча, заҳарлиларини доривор ўсимлик деб хисоблаш мумкин. Бу уларнинг таркибидаги асосий таъсир этувчи биологик фаол моддалар ва уларни қандай ҳолатда ҳамда қанча миқдорда қўллашга боғлиқ. Аксарият доривор ўсимликлар таркибида кучли таъсир этувчи моддаларни сақлайди. Баъзи ҳолатларда атроф-муҳитнинг экологик вазияти таъсирида доривор ўсимлик заҳарли ўсимликка айланади (турли маҳсулот ишлаб чиқарувчи корхоналарга яқин ҳудудларда ҳавонинг радиоактив элементлар, оғир металлар ёки бошқа токсик моддалар билан ифлосланиши оқибатида). Ўсимликларнинг заҳарлилиги эса қўйидаги омилларга боғлиқ:

- заҳарли моддаларнинг ўсимлик қисмларида турлича тақсимланиши;
- ўсимликнинг вегетация жараёнига боғлиқ равишда заҳарли моддаларнинг тўпланиши;
- ёш ўсимликлар кўпроқ миқдорда заҳарли моддалар сақлаши мумкинлиги;
- тупроқ ва иқлим шароитининг ўсимлик таркибидаги моддалар синтезига таъсири;
- кучли заҳарли таъсир этувчи моддалар фақат бир-бирига яқин тур ўсимликларда учраши (мингдевона, бангидевона, белладонна).

Ўсимликлар билан заҳарланиш – инсон организмига ўсимлик таркибидаги кимёвий моддаларнинг токсик миқдорда тушиши ва ҳаётий зарур ички аъзолар фаолиятини издан чиқариши ҳамда шу билан инсон ҳаётига хавф солиш ҳолатидир. Доривор ўсимликлар таркибидаги биологик фаол моддалар муайян дозада дори, кўп миқдорда бўлса токсин, яъни заҳарли таъсирини намоён қилиши мумкин. Бу ҳолат инсоният таракқиётида кўп бора кузатилган ва уни чуқур ўрганишга ҳаракат қилинган. Токсинлар организмда кечадиган моддалар алмашинуви жараёнларига таъсир қиласи, одамнинг ҳаётий фаолиятини, жумладан асаб ва юрак-қон томирлари тизимининг ишини издан чиқаради. Бунинг натижасида инсоннинг ҳолсизланиши ва хатто уни ўлим ҳолатларига олиб келиши мумкин. Маълумки, аксарият заҳарли ўсимлик билан заҳарланишда яширин давр кузатилади. Унинг давомийлиги кимёвий модданинг хавфлилик даражасига қараб бир неча дақиқадан бир неча кунгача давом этиши мумкин. Ўсимликнинг заҳарли моддаларини кичик дозаларда, тўғри қўлланилганда оғриқ қолдирувчи,

тинчлантирувчи, жароҳатларни тузатувчи ва бошқа бир қатор хусусиятларни намоён қилиб, турли инфекциялар, юрак, буйрак ва жигар касалликлариға даво бўлади.

Ўзбекистонда ўсадиган 4000 турдан ортиқ ўсимликлардан 577 турдан зиёди ноанъанавий тиббиётда ва халқ табобатида қўлланилади. Улар орасида асосий таъсир этувчи моддаси заҳарли хусусиятга эга қатор ўсимликлар мавжуд бўлиб, уларнинг хом ашёларини нотўғри ва назоратсиз қўллаш турли даражадаги ноҳуш ҳолатларга олиб келиши мумкин. Шунингдек, ўсимлик хом ашёларини тайёрлаш жараёнида бошқа заҳарли ўсимлик қисмлари қўшилиб қолиши эҳтимолдан ҳоли эмас. Бу ҳам доривор ўсимликнинг сифатига ва унинг фармакологик фаоллигига жиддий таъсир қиласи.

Кейинги йилларда фитотерапия тиббиёт амалиётида салмоқли ўрин эгаллаб бормоқда. Бунинг сабабларидан бири сифатида беморлар тасаввурида ўсимликлардан олинган дори воситалари безарар деган тушунча шаклланишини қўрсатиш мумкин. Бу эса беморларни доривор ўсимликлар хом ашёларини назоратсиз қўллашларига олиб келмоқда. Халқ табобатида ҳам ўсимлик хом ашёларидан кенг қўлланилади. Аммо баъзи “табиблар” ўсимликларнинг хусусиятларини яхши ўрганмаган ҳолда, билиб-билмай қўллаши оқибатида одамларнинг турли даражадаги заҳарланиш ҳолатлари вужудга келмоқда. Ўсимлик билан заҳарланиш асосан улардан нотўғри фойдаланиш ёки кучли таъсир этувчи моддаси бор ўсимликни қўллашда дозасини ошириб юбориш натижасида юзага келиши мумкин.

Заҳарли ўсимликларни шартли равишда қўйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

- алкалоид сақловчи ўсимликлар,
- юрак гликозидларини сақловчи ўсимликлар,
- органик кислоталар ва бошқа куйдирувчи моддаларни сақловчи ўсимликлар ва ҳакозолар [3,6].

Ўзбекистон ҳудудида дориворлик хусусиятига эга заҳарли ўсимликлар кўп учрайди. Булар ичида алкалоид сақловчи ўсимликлар салмоқли ўрин эгаллайди. Улар ёввойи ҳолда ариқ бўйларида, йўл четларида ва боғ, далаларда экинлар ичида ўсади. Бу ўсимликлар кўриниши жиҳатдан биз доим истеъмол қиласидан оддий кўкатларга ўхшаб кетиши ҳам мумкин. Шу туфайли одамлар адашиб уларни безарар деб ўйлаган ҳолда истеъмол қилишлари эҳтимолдан ҳоли эмас.

Алкалоидлар табиий азот сақловчи мураккаб органик бирикмалар бўлиб, уларнинг баъзилари ўз тузилишида кислород сақламайди. Кислород сақловчи алкалоидлар кристалл ёки аморф ҳолатда бўлади (морфин, кокаин,

атропин, скополамин). Тузилишида кислород сақламайдынлари эса мойсимон суюқлик бўлиб, улар учувчи алкалоидлардир (конин, никотин, анабазин). Алкалоидлар аксарият ишқорий мухитга эга ва бунда улар асос ҳолатида бўладилар ёки кислоталар билан тузлар ҳосил қиласидар. Асос ҳолатда алкалоидлар органик эритувчиларда осон, сув ва спиртда қийин эрийди. Уларнинг тузлари эса, аксинча, сув ва спиртда яхши эрийди. Ўсимликлар таркибида алкалоидлар асосан турли органик кислоталар (олма, лимон, оксалат, қаҳрабо кислоталари)нинг тузлари ҳолатида учрайди. Баъзи алкалоидлар кремневольфрам, фосфорвольфрам кислоталари, шунингдек, танин билан қийин эрувчан ва шунинг учун ҳам қийин сўрилувчи чўқмаларни беради. Уларнинг бу хусусиятидан алкалоидлар билан заҳарланишни даволашда фойдаланиш мумкин.

Алкалодлар ўсимликларда глюкоалколоид ҳолатида бўлиши ҳам мумкин. Агликон сифатида алкалоид, қанд қисмида бирор бир углевод бўлади. Алоҳида эътиборга соланин глюкоалколоидлари эга. Улар таркибида агликон сифатида соланидин алкалоиди ва углеводларни сақлайди.

Масалан, картошка таркибидаги соланинни парчаланиши натижасида соланидин алкалоиди ва уч қисм қанд: глюкоза, рамноза ва галактозанни ҳосил қиласиди. Соланинлар асосан Solanaceae (картошка) ва Lycopersicum (помидор) оиласига мансуб ўсимликлар таркибида учрайди. Бу алкалоидлар ҳам одамларни заҳарланишларига сабаб бўлган.

Алкалоид сақловчи ўсимликлар одам ва ҳайвон марказий асад тизимини заарлаб, қўзғалувчанликни оширади, сўнгра сусайтиради, силлиқ мушакларга спазмолитик таъсир кўрсатиб, юрак, ошқозон, буйраклар ва жигар ишига салбий таъсир қиласиди. Бундай ўсимликлар юрак фаолиятининг бузилишига олиб келиб, нафас олишни қийинлаштиради, галлюцинациялар чақиради ва ҳатто ўлимга олиб келиши мумкин.

Захарли ўсимликларнинг таъсир этувчи моддаларидан яна бири юрак гликозидларидир. Юрак гликозидлари сақловчи ўсимликлар юрак-қон томир тизимида фалажловчи таъсир кўрсатиш билан бирга ошқозон-ичак ва марказий асад тизимининг фаолиятига таъсир қиласиди. Глюкозидларнинг структурасининг ўзига хослиги шундаки, улар осонлик билан таркибий қисмларга: углевод (қанд) қисми ва бир ёки бир неча қисм бошқа моддалар аглюконларга парчаланади. Углевод қисмини асосан глюкоза, рамноза, галактоза ташкил қиласиди. Аглюкон қисми эса таркиби ва хусусияти бўйича турли бўлиши мумкин. Глюкозидларнинг заҳарлилиги ана шу аглюкон қисмига боғлиқ. Кимёвий таркиби бўйича аглюконларни қуидаги гурухларга тақсимлаш мумкин:

- таркибида азот сақламайдын аглюконлар. Бу гурух глюкозидлари билан заңарланиш, асосан, ангишвонагул, марваридгул, эризимум, олеандр каби ўсимликлар билан юз беради;

- таркибида азот сақловчи аглюконлар (нитрилглюкозидлар, цианглюкозидлар). Бу гурух глюкозидлари мұхым токсикологик аҳамияттаға эга, чунки парчаланиши натижасыда цианид кислотасини ҳосил қиласы;

- таркибида азот ва олтингутурт сақловчи аглюконлар (тиоглюкозидлар, хантал глюкозидлар, парчаланиши натижасыда хантал мойи ҳосил бўлади (горчичные масла);

- глюкозидларнинг алоҳида гурушини сапонинлар ташкил қиласы (сапонин-глюкозидлар). Уларнинг кўпчилиги азот сақламайды ва аморф ҳоссага эга. Сапонинлар парчаланганда қанд ва қанд бўлмаган қисм – сапогенин ҳосил қиласы. Заңарли ҳусусияттаға эга сапонинлар сапотоксинлар дейилади.

Бундан ташқари заңарли ўсимликларда одатда органик кислоталар сақланади. Булардан токсикологик аҳамияттаға эга бўлганлари:

- *цианид кислотаси* – баъзи бир ёввойи ҳолда ўсуви ўсимликлар таркибида цианоген глюкозидларнинг ферментатив парчаланиши натижасыда ҳосил бўлади (оқбош себарга, йўнгичқа беда, маккажўхори, каноп);

- *оксалат кислотаси* – шовул турларида кўп учрайди;

- *эвфорбин кислота ангидриди* – Эуфорбиянинг (*Euphorbia*) сут шираси асосини ташкил қиласы. Терига куйдирувчи таъсир қўрсатади;

- *лактонлар* – гамма-оксикислоталарнинг ангидриди бўлган органик бирикмалар (аччиқ шувоқ);

- *токсальбуминлар* – оқсил ҳусусиятли кучли физиологик таъсирга эга бўлган фитотоксинлар (канакунжут таркибидаги рицин алкалоиди).

Шунингдек, кўпчилик ўсимликлар эфир мойлари сақлайди. Шу сабабли улар тери ёки оғиз бўшлигига тушганда куйдирувчи таъсир қўрсатиши, баъзи ҳолларда аллергия чақириши мумкин.

Ҳар қандай заңарли ўсимлики шартли равишда заңарли дейиши мумкин. Ўсимликларнинг ишлаб чиқарадиган заңарли биологик фаол моддалари турлар ўртасыда содир бўладиган аллеокимёвий жараёнларда иштирок этувчи кимёвий омиллар қаторига киради. Бу ўсимлик учун ўзига яраша химоя воситаси сифатида хизмат қиласы. Аллеокимёвий жараёнларда иштирок этувчи ва шу организм учун қайсиdir маънода фойда келтирувчи моддалар алломонлар дейилади. Алломонларга қуйидагилар киради: 1) қўрқитувчи моддалар; 2) ниқобловчи моддалар; 3) антибиотиклар; 4)

захарлар; 5) индукторлар; 6) зиддизахарлар; 7) қопқонлар. Булар қаторига ўсимликлар ишлаб чиқарадиган захарлар – фитотоксинлар ҳам киради [19,29].

1.2. Алкалоид сақловчи баъзи ўсимликларнинг токсикологияси

Бу бўлимда кенг тарқалган алкалоид сақловчи айрим ўсимликлар ҳақида маълумотлар келтирилади.

Захарли цикута – *Cicuta virosa* L. барча қисмлари захарли таъсир кўрсатади. Таркибида цикутотоксин алкалоидини сақлайди (1.1-расм). Организмга тушгач, 15-20 дақиқадан сўнг ошқозон соҳасида кучли оғриқлар, кўнгил айниши, бош айланиши, тутқаноқ тутиш ҳолатлари кузатилади. Кўз қорачиғи бироз кенгайиб, нафас олиш қийинлашади. Цианоз юз беради ва юрак етишмовчилиги оқибатида нафас фалажланиши туфайли 2-3 соат ичида ўлим ҳолати юз беради [29,31].



1.1-расм. Захарли цикута (*Cicuta virosa* L.)

Аконит – *Aconitum napellus* L. барча қисмлари, айниқса гуллаш даврида захарли. Бу ўсимликнинг турлари кўп бўлиб, барчаси таркибида захарли таъсир этувчи аконитин алкалоидини сақлайди (1.2-расм). Ўсимлик қисмларидан алкоголизмга қарши йиғма тайёрлашда фойдаланилганлиги сабабли улар билан захарланиш ҳолатлари учраган. Одам захарланганда кўп микдорда сўлак ажралиши, ошқозон соҳасида деворларининг қирилишига ўхшаш кучли оғриқ, нафас олишнинг қийинлашуви, титроқ кузатилади. Тахикардия ва брадикардиянинг тез-тез алмашинуви оқибатида юрак уриши бирдан тўхтаб қолиши ва бу ўлимга олиб келиши мумкин [23].



1.2-расм. Аконит (*Aconitum napellus* L.)

Исфарак – *Delphinium* L. бир йиллик ўсимлиқ бўлиб, таркибида дитерпен алкалоидлар сақлайди (1.3-расм). Таъсири аконит ўсимлигига ўхшаш. Кучли қўзғалувчанлик, чанқоқ ҳолати, нафас олишнинг тезлашиши, кўп миқдорда сўлак ажралиши, рефлексларнинг йўқолиши, титроқ каби белгилар кузатилади. Нафас етишмовчилиги оқибатида ўлим юз беради [44].



1.3-расм. Исфарак (*Delphinium* L.)

Кузги Савринжон – *Colchicum autumnale* L.) кўп йиллик ўсимлиқ (1.4-расм).


Уруғларида колхицин, пиёзчасида колхимин алкалоидларини сақлайди. Колхицин колхиминга нисбатан 9 марта қучлироқ заҳарли таъсирга эга бўлиб, уни “капилляр заҳар” деб аташади. Заҳарланганда юрак пульсининг

тезлашуви, нафас олишнинг қийинлашуви, умумий ҳолсизланиш, ичаклар перистальтикасининг кучайиши кузатилади [44,49].



1.4-расм. Кузги Савринжон (*Colchicum autumnale* L.)


Маралқулоқ – *Veratrum lobelianum* L. кўп йиллик ўт ўсимлик (1.5-расм). Таркибида вератрин алкалоидини сақлайди. Заҳарланиш юз берганда кўз қорачигининг кенгайиши, диарея, ичак перистальтикасининг тезлашуви, тўхтовсиз қайт қилиш, тана ҳароратининг тушиши, юрак уришининг секинлашуви кузатилади. Нафас етишмовчилиги оқибатида ўлим юз беради [44,49].



1.5-расм. Маралқулоқ (*Veratrum lobelianum* L.)

Туяқорин – *Heliotropium lasiocarpum* L. бир йиллик ўсимлик. Гелиотрин ва лазиокарпин алкалоидларини сақлайди (1.6-расм). Бугдойзорларда ёввойи

ўт сифатида ўсиб, уруғи буғдой ўримида аралашиб қолиши оқибатида заҳарланиш юзага келиши мумкин. Заҳарланиши белгилари сариқ касалига ўхшаш кечади. Дармонсизлик, иштаха йўқолиши, ўт пуфагида ўзгаришлар кузатилади [29,32].



1.6-расм. Туяқорин (*Heliotropium lasiocarpum* L.)

II. Ўзбекистон ҳудудида ўсувчи баъзи алкалоид сақловчи ўсимликлар токсикологияси ва улар билан учрайдиган заҳарланиш ҳолатлари

Доривор ўсимликлар қадимдан инсониятни ўзига жалб қилиб келган. Одамлар улардан аввал озиқ-овқат сифатида, кейинчалик таъсирини билга, баъзиларидан турли касалликларни даволаш мақсадида фойдаланганлар. Натижада аста-секин ўсимликларнинг хусусиятлари ўрганила бошланган. Буюк аллома Абу Али Ибн Сино Марказий Осиё ҳудудида ўсувчи деярли барча ўсимликларни ўрганиб, уларнинг фойдали ва заарли томонларини аниқлаган. Бу ҳақда “Тиб қонунлари” асарида батафсил баён этган. Асарда бугунги кунда ҳам тиббиётда қўлланилиб келаётган заҳарли таъсир этувчи модда сақлаган доривор ўсимликларнинг инсон организмига қандай таъсир этиши ҳамда бундай ҳолларда қандай ёрдам кўрсатиш мумкинлиги ҳақида маълумотлар келтирилган.

Энг кўп заҳарланишга сабаб бўладиган ўсимликлар – таркибида алкалоид ва гликозидлар сақлайдиганларидир. Улар билан заҳарланиш ҳолатларидаги умумийлик инкубацион даврнинг қисқалигида намоён бўлади (0,5-1 соат). Заҳарланиш даражаси эса организмнинг умумий ҳолати ва унга тушган заҳарли модданинг миқдорига боғлиқ. Баъзи ҳолларда эса ўсимликтин ўсаётган иқлим шароити ва қўлланиш даврига ҳам боғлиқ.

Қуйида Ўзбекистонда ўсадиган ва заҳарланишга сабаб бўладиган алкалоид сақловчи баъзи ўсимликларнинг токсикологияси келтирилган. Заҳарланиш ҳолатлари юз берганда алоҳида патолого-анатомик белгилари бўлмаган ҳолларда баъзи заҳарланиш аломатлари ва ўсимликнинг ташқи кўриниши, фармакогностик таҳлил, унинг таркибидаги асосий таъсир этувчи моддаларини тезкор усусларда аниқлаш каби маълумотлар дастлабки шошилинч тиббий ёрдам бериш учун аҳамиятли бўлиши мумкин. Ушбу ўсимликлар билан заҳарланиш ҳолатлари кўп учрайди. Бироқ уларнинг белгиларини ва таҳлил усуслари ҳақида маълумотлар адабиётларда тарқоқ ҳолда бўлгани туфайли улардан фойдаланишда қийинчилик туғдиради.


2.1. ҚОРА МИНГДЕВОНА

Қора мингдевона (*Hyoscyamus niger L.*) икки йиллик сертук, бадбўй ўт ўсимлик бўлиб, итузумдошлар (*Solanaceae*) оиласига мансуб (2.1-расм). Доривор хом ашё сифатида гуллаш даврида йигилган барглари (*Folia Hyoscyami*) ва мева туғиш даврида ер устки қисми (*Herba Hyoscyami*) ишлатилади. Илдизолди барглари бандли, чўзиқ – тухумсимон, чуқур патсимон бўлакли бўлади. Иккинчи йили поя ўсиб чиқади. Пояси шохланган, бўйи 50-150 см га етади. Поядаги барглари илдизолди баргларига нисбатан юмалоқроқ ва майдароқ, умумий кўриниши тухумсимон, поянинг пастки қисмдагилари 5-7 бўлакли, ўрта қисмдагилари 3 бўлакли, юқори қисмдагилари эса 1-2 та бўлакли қирқилган бўлиб, йирик безли туклар билан қопланган, шу сабабли улар юмшоқ, ёпишқоқ бўлади, поя учидаги барг қўлтиқларига жойлашган гуллари қийшиқроқ бўлиб, бурма тўпгулни ташкил этади. Гуллари очилгандан сўнг, гул ўқи чўзилиб кетади. Гулкосачаси кўзачасимон, бирлашган 5 тишли (тиши тўғри ва ўтқир учли) ва сертук бўлиб, мева билан бирга қолади. Гултожиси кенг воронкасимон, 5 бўлакли, бирлашган, хира сарик, томирлари ва гултожилари бирлашган ери тўқ бинафша рангга бўялган. Оталиги 5 та, оналик тугуни юқорига жойлашган. Меваси – кўзачасимон, икки хонали, кўп уруғли, қопқоғи билан очиладиган кўсакча. Уруғи майда, юмалоқ ёки буйраксимон, яssi, устки томонида жуда кўп майда чуқурчалари бўлади [6,11].




2.1-расм. Қора мингевона (*Hyoscyamus niger L.*)

Кимёвий таркиби. Ўсимликнинг илдизида 0,15-0,18% микдорда, баргидаги 0,1 % гача, поясида 0,02 %, уруғида 0,06-0,1 % алкалоидлар сақланади. Асосий алкалоидлари атропин, гиосциамин, скополамин.



Атропин (Гиосциамин)



Скополамин

Ишлатилиши. Барги, “астматол” ва “астматин” каби дори воситалари таркибига киради. Мингевона мойи – *Oleum Hyoscyami* оғриқ қолдирувчи сифатида қўлланилади.

Захарланиши аломатлари атропин учун жуда характерлидир, чунончи аввал асаб тизими қўзғалиши кузатилиб, бемор талласаланади, ҳаракатчанлик, беихтиёр гапириш ва қўп кулиш рўй беради. Бундан кейин парасимпатик асаб толалари охирлари фалажланиб, кўз қорачиги кенгаяди, бурунда қуриш, ухлаганда хуррак отиш, терини қуриши ва қизиши

кузатилади. Мингдевона алкалоидлари силлик мушакларга спазмолитик таъсир кўрсатади, кўз ички босимини оширади, марказий асаб тизимида турлича таъсир кўрсатади, гиосциамин қўзғалувчанликни ошиrsa, скополамин сусайтиради.

Ўсимлик гуллаш даврида, айниқса, жуда заҳарли ҳисобланади. Унинг юмалоқ шаклдаги қора уруғлари болалар эътиборини жалб қиласди. Мингдевона билан енгил заҳарланиш ҳолатларида оғиз бўшлиғининг қуриши, нутқнинг бузилиши, ютишнинг қийинлашуви, кўз қорачиғининг кенгайиши, терининг қизариши ва қуриши, қўзғалувчанлик ва галлюцинация, юракнинг аввал тез уриб, кейин секинлашиши кузатилади. Кучли заҳарланиш ҳолатида эса бола ҳароратининг сезиларли даражада кўтарилиши, ҳаракат (ориентация)нинг бузилиши, хатто ҳушидан кетиши мумкин. Тери кўкариб, тиришиш (тутқаноқ) содир бўлади. Бош мияда жойлашган нафас олиш марказининг фалажланиши натижасида ўлим ҳолати юз бериши мумкин.

Атропинни ҳалок қилувчи миқдори 0,1-0,15 г ташкил қиласди. Ўлим содир бўлганда патолого-анатомик текшириш характерли эмас [33].

2.2. ДОРИВОР БЕЛЛАДОННА

Доривор белладонна - *Atropa belladonna* L. итузумдошлар - Solanaceae оиласига киради. Белладонна кўп йиллик ўт ўсимлик бўлиб, бўйи 2 м га етади (2.2-расм). Илдизпояси кўп бошли, илдизи эса йўғон ва сершох бўлади. Пояси тик ўсувчи битта, бальзан бир нечта, йўғон, яшил рангли, пастки қисми шохланмаган, юқори қисмида эса 3 та шох ҳосил бўлиб, улар ўз навбатида айрисимон жойлашган тўп шохчалар чиқаради. Барги оддий, тўқ яшил, пояди баргларнинг биттаси доим йирик бўлади. Йирик барглари эллипссимон, майдалари эса тухумсимон. Гуллари барг қўлтиғида осилган ҳолда якка ёки жуфт бўлиб жойлашган. Гул косачаси беш тишли, цилиндриксимон-қўнғироқсимон, мева билан бирга қолади, гултожиси беш бўлакли, бирлашган, қўнғироқсимон, учки қисми бинафша рангга, асос қисми эса сариқ-қўнғир рангга бўялган. Оталиги 5 та, оналик тугуни юқорига жойлашган. Меваси – бинафша-кора рангли, ялтироқ, икки хонали, бир оз яssi, кўп уруғли, нордон ширин мазали хўл мева. Уруғи буйраксимон, қўнғир рангли бўлиб, устки томонида чукурчалари бор.

Доривор белладонна ўсимлиги поясининг юқори қисми безли туклар билан қопланган, тожбарги тўқрок рангда бўлади [11,29].



2-2-расм. Доривор белладонна - *Atropa belladonna* L.

Кимёвий таркиби. Алкалоидлар (тропан гурухига оид) белладонна баргода 0,7%, илдизида эса 1,3% бўлади. Асосий алкалоиди гиосциамин бўлиб, ундан ташқари скополамин ва бошқа алкалоидлар, ҳамда кумарин гликозид – метилэскулетин учрайди.

Ишлатилиши. Белладонна препаратлари ошқозон-ичак касалликларида оғриқ қолдирувчи сифатида ишлатилади. Барги антиасматик препаратлар (астматол, астматин) таркибига кириб, бронхиал астма касаллигига ишлатилади.

Илдизи эса “карбелла” таблеткаси таркибига кириб, Паркинсон касаллигига қўлланилади.


Скополамин алкалоиди “аэрон” таблеткаси таркибига кириб денгиз касаллигига ишлатилади.

Захарланиш аломатлари. Ушбу ўсимликнинг асосий хавфли қисми қора-бинафша рангдаги ялтироқ мевалари. Болалар уни итузум ёки қора олча деб ўйлаб, қўп миқдорда еб қўйишади ва заҳарланишади. Баъзи катта ёшдаги токсикоманлар эса унинг галлюцинация чақириувчи хусусиятини билиб, атайлаб “осмонда учувчи хиссиётни” ҳосил қилиш учун истеъмол қилишади. Ушбу ўсимлик ҳам атропин, гиосциамин ва скополамин алкалоидларини сақлайди ва юқорида келтирилган мингдевонадаги каби заҳарланиш ҳолатларини юзага келтиради. Кучли бош айланиши, кўнгил айниши ва оғиздан кўпик келиш ҳолатлари кузатилади. Кучли заҳарланиш ҳолатида тана ҳароратининг сезиларли даражада кўтарилиши, ҳаракатнинг бузилиши,

хатто хушидан кетиши мумкин. Тери кўкариб, тиришиш (тутқаноқ) содир бўлади. Бош мияда жойлашган нафас олиш марказининг тормозланиши натижасида ўлим ҳолати юз бериши мумкин [43].

2.3. САССИҚ АЛАФ


Сассиқ алаф – *Conium maculatum L.* сельдердошлар оиласига мансуб икки йиллик ўт ўсимлик. Пояси тикка ўсиб, шохланади, поясининг ичи ғовак бўлиб, пастки қисмида қизил-қўнғир доғлари бор (2.3-расм). Барглари патсимон, гуллари сарғиш-оқ рангда бўлиб, қалқонсимон тўпгулларни ҳосил қиласиди. Июнь-июль ойларида гуллайди. Ташландик жойларда, ариқ бўйларида, йўлларнинг четида ўсади. Гуллаш даврида ер устки қисми йифиб олинади ва оғриқ қолдирувчи, қон тўхтатувчи, тутқаноқقا қарши восита сифатида қўлланилади. Табиблар ўсимликнинг тиндирмасидан сут безлари саратони ва бачадон миомасини даволашда фойдаланишади. Шунингдек, унинг настойкаси спастик йўтални тўхтатишда, ошқозон-ичак тизимидағи кучли оғриқлар, қабзият ҳамда камқонликда қўлланилади. Қадимги греклар ушбу ўсимликни кўринишидан беозор, лекин аслида кобра каби хавфли ўсимлик деб таърифлашган. Адабиётларда келтирилишича, Сукрот айнан шу ўсимликдан заҳарланган. Ўсимликдан эҳтиётсизлик билан фойдаланиш оқибатида, шунингдек ғовак поясидан ҳуштак ясайман деб болаларнинг заҳарланиши кўп учрайди [25].




2.3-расм. Сассиқ алаф – (*Conium maculatum L.*)

Кимёвий таркиби: Сассик алаф ўсимлигининг меваси таркибида 2% гача алкалоидлар сақлайди, улардан асосийлари конииин, метилконииин, конгидрин, псевдоконгидрин ҳисобланади. Бундан ташқари мойлар, петрозелин глицериди ва петрозелидин кислота; баргида эса 0,1% гача алкалоидлар, 0,08% гача эфир мойи ва кофей кислотаси ҳам учрайди. Ўсимлик гулидан кверцетин ва кемпферол ҳам ажратиб олинган. Ўсимлик такибидаги алкалоидларнинг 50% ни конииин ташкил этади [19,25].

Конииин



Колхицин



Захарланиш аломатлари. Заҳарланиш юз берганда марказий асаб тизимининг қўзғалувчанлиги ошади, М-холинорецепторлар блокадаси юз беради. 1,5-2 соат ичида заҳарланиш аломатлари юзага келади. Бунда кўп микдорда сўлак ажралиши, кўнгил айниши, қайт қилиш, қорин соҳасида кучли оғриқ, кўз қорачигининг кенгайиши, тахикардия, ютишнинг қийинлашуви, оёқ ва қўлларнинг фалажланиши кузатилади [22].

Заҳарланиш белгилари баъзида никотин билан заҳарланиш каби кечади. Дастребки аломатлари фикрлаш қобилиятининг сустлашуви, уйқучанлик, қайт қилиш, нафас олишнинг қийинлашуви билан намоён бўлади. Ўлим ҳолати жуда тез (2-3 соат ичида) содир бўлади. Бу асосан конииин таъсирида бўлиб, унинг учун LD₅₀=100-300 мг/кг ташкил этади [43,44,54].


2.4. КАТТА ҚОНЧЎП

Катта кончўп – Chelidonium majus L. Papaveraceae – кўкноридошлар оиласига мансуб. Чистотель номи билан барчага таниш яна бир алкалоид сақловчи ўсимлик – катта қончўп бўлиб, халқ табобатида сўгал ва қадоқларни йўқотишда қўлланилади. Бу ўсимлик ҳамма қисмида тўқ сариқ сут – шира сақлайди. Унинг асосида тайёрланган паста тери силини даволашда, ўсимлик дамламаси эса жигар ва ўт пуфаги касалликларида ишлатилади. Қончўпнинг алкалоидлари ўз таъсирига кўра кўкнорига ўхшайди [11].




2.4-расм. Катта қончүп (*Chelidonium majus* L.)

Кимёвий таркиби: Ўсимликнинг ҳамма қисмлари алкалоид сақлайди; ер устки қисмида 0,97-1,87%, илдизида эса 1,9-4,14% миқдорда алкалоидлар аниқланган. Ўсимлик таркибида алкалоидлардан хелидонин $C_{20}H_{19}O_5N$ гомохелидонин $C_{21}H_{23}O_5N$, хелеритрин $C_{21}H_{19}O_5N$, метоксихелидонин $C_{21}H_{21}O_6N$, оксихелидонин $C_{20}H_{17}O_6N$, сангвинарин $C_{20}H_{15}O_5N$ ва бошқалар учрайди.



Хелидонин $C_{20}H_{19}O_5N$



Сангвинарин $C_{20}H_{15}O_5N$ ва Хелеритрин $C_{21}H_{19}O_5N$

Бундан ташқари эфир мойлари, аскорбин кислотаси (171 мг/%), витамин А (14,9 мг/%), органик кислоталар (хелидон, олма, лимон ва қахрабо кислоталар), флавоноидлар ва сапонинлар; уруғида эса 40-68% гача мой бўлади [10,20].

Захарланиш аломатлари. Ўсимлик таркибидаги хелидонин ва а-гомохелидонин алкалоидлари марказий асаб тизими ва силлиқ мушакларни фалажлайди. β-гомохелидонин сезги асаб толалари охирини фалажловчи таъсир кўрсатади. Хелиритрин марказий асаб, юрак, нафас олиш тизимларини фалажлаш билан бирга, маҳаллий яллигланишни чақиради. Сангвинарин таянч аъзоларига таъсир этиб, тетаник тиришишни келтириб чиқаради. Захарланиш натижасида кучли ич кетиш, умумий ҳолсизлик, нафас олиш ва пульснинг секинлашуви, ҳаракатнинг бузилиши кузатилади. Ўлим ҳоллари юз берганда мурдани ёриб кўрилса, ошқозон ва ичаклар шиллик қаватининг кучли яллигланиши ҳолатларини кўриш мумкин [20,27].

2.5. Яшил шамшод

Яшил шамшод – *Buxus sempervirens* ўсимлиги шамшоддошлар (Вихасеае) оиласига мансуб бўлиб, бу оиласига 5 туркум ва 80 га яқин турлар киради (2.5-расм). Бу оиласинг шамшод (*Buxus*) туркумини халқ хўжалигида аҳамияти катта бўлиб, 50 га яқин турни ўз ичига олади. Шамшодлар ўзларининг ташки кўриниши билан бир-биридан ажralиб турадилар. Кўпчилик шамшодлар унча баланд бўлмаган доим яшил дараҳтлар ва буталардан иборат. Барглари оддий, четлари текис ёки тиҳсимон, ялтироқ, тўқ яшил майда қарама-қарши ёки кетма-кет жойлашган. Меваси кутичасимон бўлиб, пишиб етилган мевалари ёрилади ва ичидан қора ялтироқ уруғлар отилиб чиқади. Шамшод туркумининг кўкаламзорлаштириш учун энг қимматли тури оддий ёки доим яшил шамшод (*Buxus sempervirens*) бўлиб, худудларни кўкаламзорлаштиришда кенг фойдаланилади. Шамшод секин ўсиши билан ажralиб туради, 100 ёшида бор йўғи 10 м гача ўсиши мумкин. Шоҳ-шаббаси зич бўлиб, 800 йилгacha яшashi мумкин. Танасининг эни 50 смдан ошмайди. Оҳакли тупроқларда яхши ўсади, -20-22°C совуқларга бемалол чидайди. Шамшод турлари сояга чидамли бўлиши билан бир қаторда ёруғлик кўп тушадиган ерларда ҳам яхши ўсади. Тупроққа талабчан эмас, қоялар орасида, қурук тупроқларда ҳам ўsavеради. Шамшод ҳаво намлигига талабчан. Шамшод баргларида алкалоидлардан кумаринлар, флавоноидлар ва ошловчи моддалар борлиги аниқланган. Шамшод дараҳти пўстлоғи, барглари халқ табобатида ошқозон-ичак тизимининг ишини

яхшиловчи, турли заарли патоген микроорганизмларни ўсишини тўхтатувчи восита сифатида ишлатилади. Лекин шамшоднинг хўл новдалари заҳарли ҳисобланади. Шамшод дараҳтининг ёғочлари юқори баҳоланади, ҳар хил тўқимачилик асблолари ва қутичалар тайёрланади. Ёғоч қипиқлари тошларни, шишаларни силлиқлашда ишлатилади. Бу ўсимликни Марказий Осиёга кириб келганига 100 йилдан ошди. Шамшод Тошкент шаҳрини кўкаламзорлаштиришда кенг қўлланилмоқда. Уни турли композицияларда – гурух-гурух, жонли девор шаклида, катта гул тувакларда экилса, уларнинг манзарали хусусиятлари кескин ортади. Шамшоднинг асосий манзарали хусусияти – унинг доим яшил барглари ҳисобланади. МДҲда бу турдан ташқари колхидаги шамшод дараҳти (*Buxus colchica*) ва гиркан шамшод дараҳти (*Buxus hyrcana*) турлари ҳам тарқалган. Шамшод турлари ушбу ҳудудларда қорақайин аралаш ўрмонларда кўпроқ учрайди [3,6].



2.5-расм. Яшил шамшод (*Buxus sempervirens*)

Яшил шамшод март-апрель ойларида гуллайди. Гуллари бир уйли бир жинсли сарғиши-яшил рангда бўлиб, барглар орасига тўп бўлиб жойлашган.

Шамшоднинг барча қисмида алкалоидлар мавжудлиги аниқланган. Булар циклокореанин В, буксин, парабуксин, буksипиин ва циклобуксин. Бундан ташқари ўсимлик смолалар, биофлаваноидлар ва ошловчи моддалар сақлайди.

Ўсимликнинг заҳарлилиги туфайли расмий тиббиётда ишлатилмайди, бироқ табобатда унинг баргларидан тайёрланган дамламалар ҳарорат юқори

бўлганда, ўт пуфаги ва пешоб йўллари яллиғланишида иситма туширувчи, гипотензив, антибактериал, ўт ва пешоб ҳайдовчи сифатида кўлланилади. Хитой табиблари шамшоддан тайёрланган препаратларни юрак ишемияси ва артритда кучли оғриқ қолдирувчи сифатида фойдаланишади. Гомеопатлар ўсимлик дамламасини гижжа касалликларида кўллашади. Шунингдек, ревматизмда бўғимларга ўсимлик дамламасидан компресс қилишади. Лекин эҳтиётсизлик оқибатида заҳарланиш вужудга келади.

Заҳарланиши белгилари: қайт қилиш, диарея, тери гиперемияси, қўл ва оёқ учларининг увишиб, бўшашиш ҳолати, аввал енгил титроқ, сўнгра тутқаноқ тутиши ва нафас олишнинг қийинлашуви кузатилади. Агар 12-24 соат ичида зудлик билан тиббий ёрдам кўрсатилмаса, нафас олиш марказининг фалажланиши оқибатида ўлим ҳолати қайд этилади. Бунда симпатик асад тизимининг қўзғалувчанлиги ортади. Кон босими одатда заҳарланишнинг бошланғич даврида кўтарилади, сўнгра эса коллапс ҳолатигача тушади. Тахикардия вужудга келади ва баъзи ҳолларда галлюцинация ҳолати содир бўлади.

Ўтган асрнинг 70-80 йилларида Ўзбекистон Республикаси Ўсимлик моддалари кимёси институтининг бир гурӯҳ олимлар (Ходжаев Б.В., Юнусов С.Ю., Шакиров Р., Арипов Х.Н.) томонидан яшил шамшод ўсимлиги таркибидаги алкалоидлар ўрганилиб, уларнинг стероид алкалоидлар гурӯхига мансуб эканлиги аниқланган. Ўсимликдан бускун, циклобускун каби алкалоидлар ажратиб олинниб, уларнинг структура тузилиши ўрганилган [3,6].

Шамшод таркибидаги стероид алкалоидларни икки гурӯхга бўлиш мумкин:

- 1) циклобускунлар
- 2) бускунмаринлар.

Ҳар бир гурӯхга киравчи алкалоидларнинг структура тузилиши ва ўсимликда уларнинг сақланиши бўйича қатор илмий изланишлар олиб борилган.

Яшил шамшод ўсимлиги таркибидаги стероид алкалоидларни идентификациялаш жараёнида ИК-спектрометрия, масс-спектрометрия, УБ-спектрофотометрия, ЮҚҲ усуллари кўлланилган. Ушбу таҳлил усуллари ўсимликдан тоза кристалл ҳолида ажратиб олинган намуналар учун кўлланилган бўлиб, бунда стероид алкалоидлар учун мавжуд бўлган умумий таҳлил усулларидан фойдаланилган.

Ўсимликдан ажратиб олинган бускуннинг спиртдаги эритмаси 227 нм тўлқин узунлигига максимум нур ютади.

Канаданинг Манитоба шаҳридаги бир гурух олимлар ўсимлик таркибидаги алкалоидларни алоҳида ажратиб олиш учун колонкали хроматография усулини қўллашган. Бунда силикагел билан тўлдирилган колонка орқали ўсимлик экстракти ўтказилиб, аввал гексан-этилацетат, сўнгра этилацетат-метанол аралашмаси билан ювилган. Бунда 180 та фракция ажратиб олинган. Ҳар бир фракция ЮҚХ усулида текширилган. Гексан-этилацетат (90:10) аралашмаси ёрдамида элюация қилинганда 65% алкалоидларни тозалаб олишга эришилган. Бундан ташқари улар билан бир қаторда Эрон олимлари томонидан шамшоднинг гиркан шамшод (*Buxus hyrcana*) тури ўрганилган бўлиб, унинг таҳлилида суюқлик хроматографияси масс-спектрометрия усули қўлланилган. Лекин улар асосан циклобуксин қатори алкалоидларини ўрганишган [60].

2.6. Кампирчопон


Кампирчопон – *Trixodesma inkanum* L. – гавзабонгулдошлар (Boraginaceae) оиласига мансуб кўп йиллик заҳарли ўсимлик бўлиб, донли ва бошқа маданий экинлар орасида ўсади (2.6-расм). Ўрта Осиё ва Қозоғистон ҳудудида кенг тарқалган, асосан тоғли туманларда ўсади. Илдизи бақувват, пояси бироз юқорига қўтарилиб ёки ёйилиб ўсади. Пастки қисми ёғочланиб кетади, шохланган, тук билан қалин қопланган. Кейинроқ туки тўкилиб кетади, тупининг юқори қисми жуда сертуқ, бўйи 30-60, баъзан 100 см га етади. Сербарг бўлиб, барглари бандсиз, четлари текис, шакли узунчоқ тухумсимон, узунчоқ ланцетсимон. Учи ўткир, олди ва орқа томони тук билан қопланган. Тўпгули рўвақ, гулёнбаргчалари тук билан қопланган. Тожбаргларнинг диаметри 2-2,5 см, гуллаш даврида найчаси оқ, пояси ҳаворанг бўлиб, кейинроқ гул найчаси пушти рангга киради. Меваси бирбирига ёпишган 4 та ёнғоқчага ўхшайди, пишганда ажралиб кетади. Апрель ойларида униб чиқади, май ойида гуллайди, июндан то кузгача мева тугади. Профессор X.З.Ибрагимовнинг маълумотларига кўра дон маҳсулотлари 3 % гача кампирчапон дони билан ифлосланиши мумкин. Яъни 1 га экин майдонида ўртacha 450 - 4000 дона кампирчопон ўсимлигининг ўсиши аникланган [3,6].

Кампирчопон уругининг таркибida триходесмин, инканин, инканин N-оксиди алкалоидлари бўлади ва бу алкалоидлар қуруқ модданинг 3 % гачасини ташкил этади. Вегетатив қисмлари эса 1 % гача алкалоидлар сақлайди. Бу алкалоидлар асаб ва қон томирларга таъсир этувчи ва кумулятив хусусиятга эга.




2.6-расм. Кампирчопон (*Trixodesma inkанum L.*)

Захарланиш ҳайвонларнинг 0,01 дан 0,05 % гача кампирчопон уруғлари билан ифлосланган донли озуқаларни ёки 1 % гача ва ундан юқори даражада унинг вегетатив қисмлари билан ифлосланганда ғалла хашакларни 1-3 ой давомида истеъмол қилиши оқибатида пайдо бўлади [11].



$\text{C}_{18}\text{H}_{27}\text{NO}_6$
Триходесмин



$\text{C}_{18}\text{H}_{27}\text{NO}_5$
Инканин

Захарланиш белгилари. Кампирчопон алкалоидлари ҳазм йўли шиллик пардасига маҳаллий таъсир кўрсатиб катарал-геморрагик гастроэнтерит чақиради. Конга сўрилгач умумрезорбтив таъсир этади, яъни жигарга тушиб, дистрофик ва яллиғланиш жараёнларини чақиради ёки гепатоциррозни келтириб чиқаради. Ўпкада шиш, гиперемия, яллиғланиш (бронхопневмония), эмфизема ва карнификация ривожланади. Захарларнинг бош мияга таъсири натижасида токсик энцефалит ва мия моддасининг шиши ривожланади. Юракдаги дистрофик ва яллиғланиш жараёнлари тахикардияга

олиб келади. Алкалоидларнинг буйракларда кумуляция бўлиши оқибатида ўткир ва сурункали нефрозо-нефрит пайдо бўлади [29].

Триходесмотоксикоз - ҳайвонларнинг кампирчопон ўсимлигининг уруги ва вегетатив қисмларини узлуксиз равишда истеъмол қилиш оқибатида келиб чиқадиган ҳамда ошқозон ва ичакларнинг яллиғланиши, ўпка, жигар ва бош миянинг дистрофик ўзгаришлари билан намоён бўладиган касаллик. Бу касаллик 1954 йилгача отларда «Суйлуқ» номи билан аталган ва С.Г.Юдин, Х.З.Ибрагимов тадқиқотларидан кейин триходесмотоксикоз номи билан аталган. Касал ҳайвон ҳалок бўлади, соғайган ҳолларда эса ўсиш ва ривожланишдан қолиб, пуштдорлик кўрсаткичлари ёмонлашади.

Касаллик отларда икки шаклда намоён бўлади [27,29].

A. Ўпка шакли нафаснинг тезлашиши, очбиқин ариқчасининг пайдо бўлиши ва иккинчи тоннинг кучайиши билан тавсифланади. Касаллик кучайган пайтда экспиратор ҳансираш, «бурун қанотларининг титраши», «жағ оралиғи билан титраш» каби ўзига хос белгилар пайдо бўлади. Нафас ва пульс тезлашади. Отда олазарак бўлиб безовталаниш ва ҳар нафас чиқарган пайтда бутун гавдаси билан тебраниш қузатилади. Иштаҳа сақлансада ҳайвон ориқлаб кетади. Тана ҳарорати ўзгармасдан қолади. Ўпка чегараси 1-2 қовурға ҳажмига катталашади. Перкуссияда ўпкада тимпаник товуш эшитилади.

B. Асаф-жигар шакли депрессия, шиллиқ пардаларнинг сарғайиши ва жигарнинг охирги қовурғагача катталашиши билан намоён бўлади. Брадикардия (ўт кислоталари таъсирида), нафаснинг сийраклашиши ва чуқурлашиши (Куссмаул типидаги нафас) қузатилади. Касаллик охирига бориб иштаҳа сусаяди ёки бутунлай йўқолади. Чўчқаларда касаллик ўткир кечади ва 2-3 кун давом этади. Кучсиз безовталаниш, ҳароратнинг 1-1,5 °C га кўтарилиши, нафаснинг тезлашиши, ҳансираш, қусиши, иштаҳанинг йўқолиши, ич кетиши, тезакнинг шилимшиқ ва қон аралаш бўлиши каби белгилари қузатилади. Конъюнктивит ва гиперемияга учрайди, шишади, бурундан кўпик аралаш қон кетади. Ўпка шиши оқибатида ҳайвон ҳалок бўлади. Сурункали кечган пайтда ориқлаш ва бола ташлаш ҳолатлари қузатилади [57].

Гематологик кўрсаткичлари. Ўткир триходесматоксикоз пайтида эритропения, олигохромения, нейтрофилли лейкоцитоз (ядронинг чапга силжиши), эозинофилия, қанд микдорининг 120 мг% гача ошиши, билирубин микдорининг 12 мг% гача кўтарилиши ва бевосита ўлими олдидан лейкопения қузатилади.

Патолого-анатомик ўзгаришилари. Отларда (ўпка шаклида) ўпка 1,5 бараваргача катталашади, эмфизема, карнификация, резинасимон консистенция (сут безига ўхшайди) кузатилади. Асаб-жигар шаклида – жигар 1,5 мартагача катталашади, қотади, ранги қораяди ва мармар рангини олади, кесганда овоз беради (цирроз), мия қон томирларининг гиперемияси ва мия шиши кузатилади. Сурункали кечганда сурункали катарал гастроэнтерит, оралиқ ва бронхиал лимфа тугунларининг катталашиши, нефрозо-нефрит ва ўпка карнификацияси кузатилади [57].

Ташҳиси. Анамнез маълумотлари, касаллик белгилари, патолого-анатомик ўзгаришилари, озуқани ботаник ва токсикологик текшириш натижалари эътиборга олинади. Касаллик куйдирги (чўчқа), устилаготоксикоз (чўчқа), гелиотроптоксикоз (чўчқа ва қўй) ва юкумли менингоэнцефалит (от) касалликларидан фарқланади. Триходесматоксикозга эрта ташҳис қўйишда қуйидаги уч белги (профессор Х.З.Ибрагимов «триада»си) эътиборга олинади: 1) 5-10 минутлик югуртиришдан кейин отда ҳансираш ва «очбиқин ариқчаси»нинг пайдо бўлиши; 2) юракда 2-тоннинг кучайиши; 3) қон зардобидаги билирубин миқдорининг 12 мг% гача кўпайиши эътиборга олинади ва анамнез маълумотлари билан таққосланади [57].

Хулоса

Юқорида келтирилган ўсимликлар Ўзбекистон худудида кенг тарқалганлиги билан бошқа алкалоид сақловчи ўсимликлардан ажralиб туради. Мазкур ўсимликлар билан одамлар айrim ҳолатларда дуч келишлари ва бундай ҳолатларда турли даражада заҳарланишлари илмий – оммабоп адабиётларда қайд қилинган. Шу вақтгача уларнинг тузилиши, кимёвий таркиби, аҳамияти, одам ва ҳайвон организмига таъсирини ўрганиш борасида кўплаб тадқиқотлар олиб борилган. Уларнинг айримлари халқ табобатида турли касалликларни даволашда қўлланилиши ҳам маълум. Манзарали бута ва гуллар шаклида ўстириладиганлари ҳам мавжуд. Бу эса бу ўсимликлар билан одамлар, айниқса, болаларнинг бехосдан заҳарланишлари мумкинлигининг эҳтимоли катталигини билдиради.

Адабиётларда келтирилган маълумотлар шуни кўрсатдики, бундай ўсимликлар билан заҳарланишларининг клинико-симптоматик белгилари жуда кам ҳолатда аниқ бир кўринишга эга эканлиги, аксариятда, улар умумий заҳарланиш белгиларини намоён қилишлари аниқланди. Бу ҳолат касалликнинг, жумладан заҳарланишнинг умумий ташҳисини мураккаблаштириши ва нотўғри хуласаларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатади. Беморга ташҳис қўйиш вақтида таҳлил объектларининг (қон,

пешоб ва б.) сон кўрсаткичлари аниқланади. Жуда кам ҳолатларда бундай ҳолатнинг сабабчиси бўлган токсик модда таҳлил қилинади. Шунингдек, таъкидлаш жоизки, ҳозирги кунда барча заҳарланишлар чақирган моддаларни таҳлил услублари ҳам ишлаб чиқилган эмас.

Одамларнинг заҳарланишларида уларга тез тиббий ёрдамни сифатли ва ўз вақтида кўрсатишда уларни нимадан заҳарланганликларини билиш жуда муҳим. Бунинг учун заҳарланишга сабаб бўлган моддаларни ишончли усуllар ёрдамида идентификация қилиш лозим бўлади. Адабиётларнинг таҳлили бундай усуllар етарли ишлаб чиқилмаганлиги, мавжудлари ҳам чукур ўрганилмаган ва асосланмаганлиги кўрсатди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб изланишларнинг кейинги босқичида алкалоидларни турли обьектлардан ажратиб олиш ва таҳлил қилиш усуllари келтирилган адабиётларни ўрганиш мақсад қилиб олинди.

III. Алкалоидларни турли обьектлар таркибидан ажратиб олиш

3.1. Ўсимликлардан алкалоидларни ажратиб олишда қўлланиладиган усул ва услублар

Ўсимликлар билан заҳарланиш, асосан улар таркибидаги асосий таъсир этувчи моддаларга боғлиқ бўлгани ва заҳарланишга сабабчи бўлган модданинг кам миқдорда бўлиши, уларни заҳарланган организмдан ажратиб олиб аниқлашда сезгир ва хусусий усуllарни қўллашни тақозо этади.

Шунингдек, турли обьектлардан, жумладан ўсимликлардан алкалоидларни ажратиб олишда модданинг физик-кимёвий хоссалари ва хусусиятларини, обьектнинг ўзини агрегат ҳолати ва таркибини инобатга олган усул ва услубларни қўллаш мақсадга мувофиқдир. Акс ҳолда бу обьектлардаги алкалоидларни тўлиқ ажратиб олишнинг имконияти камаяди.

Юқоридаги ўсимликлар таркибидаги алкалоидларни ажратиб олишнинг учта усули ишлаб чиқилди.

I-усул. Майдаланган ва тешиклари диаметри 1 мм бўлган элакдан ўтказилган ўсимлик маҳсулотидан 10 г миқдорда ўлчаб олинди. Маҳсулот ҳажми 250 мл бўлган шиша идишга солинди. Хом ашё устига 150 мл диэтил эфири ва аммиакнинг концентранган эритмасидан 7 мл қўшиб, усти қопқоқ билан беркитилди. Арапашма 1 соат давомида маҳсус чайқатгич асбобида вақти-вақти билан чайқатиб турилди. Белгиланган муддат тугагач органик эритувчи ва ўсимлик хом ашёсидан ташкил топган арапашма 250 мл ҳажмли колбага қоғоз фильтр орқали фильтрланди. Фильтратга 5 мл тозаланган сув қўшиб 3-5 дақиқа чайқатилди ва бир оз вакт тиниши учун қолдирилди.

Тинган эфирли ажратмадан 90 мл олиб, 200 мл ҳажмдаги ажратгич воронкага ўтказилди. Воронкадаги экстрактга хлорид кислотасининг 1% эритмасидан 20 мл қўшиб, 3 дақиқа чайқатилди. Кислотали сувли қисм фильтр қоғози ёрдамида фильтрланди. Воронкада қолган эфирли қисмга хлорид кислотасининг 1% эритмасидан 15 мл қўшиб, 3 дақиқа давомида чайқатилди ва юқорида келтирилган тартибда кислотали сувли қисм ажратиб олинди. Бу жараён шу тарзда яна бир марта қайтарили. Олинган кислотали ажратмалар бирлаштирилиб, уларнинг pH муҳити (универсал индикатор ёрдамида назорат қилинган ҳолда) аммиакнинг 25% эритмаси билан ишқорий шароитга келтирилди. Мазкур аралашмадан алкалоидлар 20 мл хлороформ билан 5 дақиқа мобайнида экстракцияланди. Хлороформ қатлами ажратгич воронка ёрдамида ажратиб олинди. Сувли қатламнинг pH муҳити яна бир бор текширилган ҳолда юқорида келтирилган тартибда яна икки марта 15 ва 10 мл хлороформ билан экстракцияланди. Ажратиб олинган хлороформли экстрактлар бирлаштирилди. Умумлаштирилган экстракт 3-5 г сувсизлантирилган натрий сульфат тузи солинган фильтр қоғози орқали фильтрланди. Фильтратдан органик эритувчи оз ҳажм қолгунича ҳайдаб олинди. Қолган экстракт қуруқ қолдиқ қолгунча хона ҳароратида қуритилди. Қуруқ қолдиқ 5 мл этил спиртида эритилен ва таҳлил учун олиб қўйилди.

2-усул. Майдалангандан тешиклари диаметри 1 мм бўлган элақдан ўтказилган ўсимлик маҳсулотидан 10 г микдорда аниқ тортма олинди. Маҳсулот ҳажми 250 мл бўлган шиша идишга солинди. Хом ашё устига оксалат кислотасининг 2% эритмасидан 150 мл, аммиакнинг концентрланган эритмасидан 7 мл қўшиб, усти қопқоқ билан беркитилди ва 1 соат давомида чайқатиб турилди. Кислотали ажратма ҳажми 200 мл конуссимон колбага тезда фильтр қоғоз орқали фильтрлаб олинди. Фильтратга 5 мл этил спирти ва натрий хлориднинг тўйинган эритмасидан 5 мл қўшилди. Сўнгра аммиакнинг 25 % эритмаси билан pH муҳити 9 га етказилди. Ушбу аралашмадан алкалоидларни диэтил эфири ёрдамида 20, 15, 10 млдан 3 қайта экстракцияланди. Экстракт 3-5 г сувсизлантирилган натрий сульфат тузи солинган ва диэтил эфири билан намланган фильтр қоғоз орқали фильтрлаб ажратиб олинди ва хона ҳароратида қуруқ қолдиқ қолгунча буғлатилди. Қуруқ қолдиқ 1 мл этил спиртида эритилиб, ЮҚҲ усулида тозаланди ва таҳлил қилинди.

3-усул. Майдалангандан тешиклари диаметри 1 мм бўлган элақдан ўтказилган ўсимлик маҳсулотидан 10 г микдорда тортиб олинди. Олинган хом ашё 250 мл ҳажмли конуссимон колбага ўтказилди. Колбадаги хом ашё устига 15 мл оксалат кислотасининг 5% эритмасидан ва 75 мл диэтил

эфиридан солиб, чайқатиб турган ҳолда 1 соатга қолдирилди. Бунда ўсимлик таркибидаги алкалоидлар асос ҳолидан оксалат кислота тузларига ўтади. Бу тузлар сувда эрийди ва сув-кислотали қатламга ўтади. Эфир қатламида эса бошқа ёт моддалар, шунингдек, ўсимликнинг хлорофилл қолдиклари қолади. Бу бирмунча тоза ажратма олиш имконини беради. Ажратмани қоғоз фильтр ёрдамида фильтрлаб олиниб, кислотали катлам органик эритувчи қатламидан ажраткич воронка билан ажратиб олинди. Бу жараён уч марта қайтарили. Олинган кислотали ажратмалар бирлаштирилиб, pH мухити универсал индикатор ёрдамида назорат қилинган ҳолда аммиакнинг концентрангандан эритмаси ёрдамида ишқорий шароитга келтирилди. Бунда алкалоидлар асос ҳолига ўтади ва улар 20 мл хлороформ билан 5 дақиқа давомида экстракцияланди. Арапашмадан органик эритувчи қатлами ажраткич воронка ёрдамида ажратиб олинди. Сувли қатлам эса яна икки марта (15 ва 10 мл) хлороформ билан 5 дақиқадан экстракцияланди. Учта хлороформли экстрактлар бирлаштирилди. Хлороформли экстракт таркибидаги намликтин бартараф этиш учун 3-5 г сувсизлантирилган натрий сульфат солинган фильтр қоғози орқали фильтрланди. Хлороформли фильтрат қуруқ қолдиқ қолгунча хона ҳароратида қуритилди. Қуруқ қолдиқ таҳлил учун олиб қўйилди.

Юқорида келтирилган тартибда ажратиб олинган алкалоидларни замонавий таҳлил усуллари ёрдамида аниқлаш учун мўътадил шароитлар танлаб олинди.

3.2. Биосуюқликлардан алкалоидларни ажратиб олишининг ишилаб чиқилган услублари

Ўткир заҳарланиш ҳолатларида асосий объект сифатида пешоб, баъзида ошқозон чайнинди сувлари муҳим аҳамият касб этади. Заҳарли моддани биологик суюқлик таркибидан имкон даражасида тўлиқ ажратиб олиш ва таҳлилга тайёрлаш муҳим вазифа ҳисобланади. Бу вазифани бажариш учун қатор тажрибалар ўтказилиши ва уларнинг натижалари ўрганилиши лозим. Изланишларнинг кейинги босқичида шундай тажрибаларни ўтказишни мақсад қилиб қўйилди.

Бунинг учун модел объектлар тайёрлаб олинди. 5 та 5 мл қон сақлаган намунага 10 млдан ўсимлик (этил спирти ёрдамида олинган) экстрактидан қўшиб, арапаштирилди, 6-намунага этил спирти қўшилди ва 24 соатга қолдирилди. Кўрсатилган вақт ўтгач, қуйида келтирилган усулда экстракция олиб борилди.

Қон намуналаридан алкалоидларни ажратиб олиш учун уларга 5 млдан оксалат кислотаси, 2 млдан этил спирти ва 5 млдан диэтил эфири қўшиб, 1 соатга қолдирилди. Вақти-вақти билан чайқатиб турилди. Кислотали сув қатлами фильтрлаб ажратиб олинди ва унга 10 мл 1 М натрий ишқорининг эритмаси ($\text{pH}=9$) ва 5 мл хлороформ қўшилди. Ушбу аралашма механик чайқатгичга 10 дақиқага қўйилди. Сўнгра 3000 айл/дақ. тезликда 5 дақиқа центрифуга қилинди. Хлороформли қават ажратиб олиниб, 1-3 г сувсиз натрий сульфат сақлаган фильтр қофози орқали ўтказилди. Фильтрат қуруқ қолдиқ қолгунча қуритилди. Қуруқ қолдиқ 1 мл этанолда эритилиб, ЮҚҲ усулида тозаланди.

Пешоб модел эритмасини тайёрлаш учун унинг 25 мл ҳажмли 6 та намунаси олиниб, ундан 5 та намунасига 10 млдан ўсимлик (этил спирти ёрдамида олинган) экстрактидан қўшиб, аралаштирилди ва 24 соатга қолдирилди. Кўрсатилган вақт ўтгач, қуида келтирилган усулда экстракция олиб борилди.

Пешобдан алкалоидларни ажратиб олиш учун модел эритмаларга 5 млдан оксалат кислотаси, 2 млдан этил спирти ва 5 млдан диэтил эфири қўшиб, 1 соатга қолдирилди. Вақти-вақти билан чайқатиб турилди. Кислотали муҳитдан сув қатлами фильтрлаб ажратиб олинди ва 10 мл 1 М натрий ишқорининг эритмаси ва 5 мл хлороформ қўшилди. Ушбу аралашма механик чайқатгичга 10 дақиқага қўйилди. Хлороформли қават ажратиб олиниб, 1-3 г сувсиз натрий сульфат сақлаган фильтр қофоз орқали ўтказилди. Фильтрат қуруқ қолдиқ қолгунча қуритилди. Қуруқ қолдиқ 1 мл этил спиртида эритилиб, ЮҚҲ усулида тозаланди.

3.3. Биологик объектдан алкалоидларни ажратиб олишининг ўзига хос томонлари

Биологик объект моделини тайёрлаш учун йўл транспорт ходисасида вафот этган одам жигаридан 100,0 г 5 та намуна олиниб майдаланди, 5 та намунага 10 мл ўсимликдан олинган экстракт солинди ва аралашмалар 24 соатга қолдирилди. Сўнгра устига 15 млдан оксалат кислотасининг 5% эритмаси ва 75 млдан диэтил эфиридан солиб, чайқатиб турган ҳолда 1 соатга қолдирилди. Сўнгра 3000 айл/дақ. тезликда 5 дақиқа центрифуга қилинди. Ажратмани фильтрлаб олиб, кислотали қатлам органик эритувчи қатламидан ажраткич воронка ёрдамида ажратиб олинди ва фильтрланди. Бу жараён уч марта қайтарилди. Олинган кислотали ажратмалар бирлаштирилиб, рН муҳити универсал индикатор ёрдамида назорат қилинган ҳолда аммиакнинг

концентрланган эритмаси ёрдамида ишқорий шароитга ($\text{pH}=8-9$) келтирилди. Бунда алкалоидлар асос ҳолига ўтади ва улар 20 мл хлороформ билан 5 дақиқа давомида экстракцияланди. Арапашмадан органик эритувчи қатлами ажраткич воронка ёрдамида ажратиб олинди. Сувли қатlam эса яна икки марта (15 ва 10 мл) хлороформ билан 5 дақиқадан экстракцияланди. Учта хлороформли экстрактлар бирлаштирилди. Хлороформли экстракт таркибидаги намликни бартараф этиш учун 3-5 г сувсизлантирилган натрий сульфат солинган фильтр қоғози орқали фильтрланди. Хлороформли фильтрат қуруқ қолдик қолгунча хона ҳароратида қуритилди. Қуруқ қолдик таҳлил учун олиб қўйилди.

Хуроса

Ўсимлик таркибидан алкалоидларни ажратиб олишнинг адабиётларда келтирилган усуллари, асосан, алкалоидлар йифиндисини ажратиб олишга қаратилган. Шунингдек, улар ёрдамида тоза алкалоидларни ажратиб олиш ва дори воситаси сифатида қўллаш мумкин. Бироқ суд-кимё таҳлилларида биологик объектлар таркибида жуда кам миқдорда бўладиган асосий заҳарли таъсир этган алкалоидни аниқлаш учун қўлланилиши доим ҳам кутилган натижаларга олиб келмайди. Юқорида келтирилган ўсимлик таркибидан алкалоидларни ажратиб олишнинг 2- ва 3-усуллари биологик суюқликлар ҳамда биологик объект таркибидан алкалоидларни ажратиб олишга тадбиқ этилди. Изланишлар натижасида қон, пешоб ва жигар таркибидан ўрганилаётган ўсимликлар алкалоидларини ажратиб олишнинг мўътадил шароитлари ишлаб чиқилди.

IV. Алкалоид сақлаган ўсимликлар билан заҳарланишларни аниқлашда қўлланиладиган таҳлил усуллари

4.1. Ўсимликларни турли объектлардаги фармакогностик таҳлили

Ўсимликлар билан заҳарланишда биринчи тез тиббий ёрдам кўрсатиш учун аниқ ташҳис қўйиш муҳим аҳамиятга эга. Бунда ташҳиснинг тўғри қўйилиши дастлабки текшириш усуллари, жумладан, қуйидаги ҳолатлар ёрдамида олиб борилади:

- заҳарланган одамда кузатилаётган клиник белгиларни таҳлил қилиш;
- заҳарланган одамнинг ошқозони ҳамда қусук массаларида ўсимлик қолдиқларини фармакогностик ўрганиш;


- биологик объектларда (қон, пешоб, ошқозон чайнди сувлари) заҳарли ўсимлик биологик фаол моддасининг таҳлили.

Заҳарланишнинг клиник белгилари юқорида ҳар бир ўсимлик учун алоҳида-алоҳида келтирилди.

Ошқозонда ўсимлик қисмларининг қолдиқларини фармакогностик ўрганиш айнан қайси ўсимлик билан заҳарланиш юз бергани хақида дастлабки тахминларни келтиришга ёрдам беради.

Заҳарланган инсоннинг ошқозон чайнди сувлари ва қайт қилиш массалари фармакогностик текширилганда асосан барг, мева қолдиқларининг микроскопик таҳлили ўтказилади. Қора мингевона, белладонна ва катта қончўп ўсимликлари микроскопик тузилиши адабиётларда келтирилган бўлиб, уларнинг заҳарланган инсон ошқозонидан олинган масса таркибида аниқлаш мақсадида солиштирма таҳлиллар олиб борилди. Қуйида ўрганилаётган ўсимликларнинг айрим қисмларининг микроскопик таҳлили натижалари келтирилган.

Қора мингевона. Ишқор эритмаси билан ёритилган баргнинг ташки кўриниши микроскоп остида кўрилади (4.1-расм). Махсулотда ҳар хил ёшдаги барглар бўлади. Шу сабабли улардаги туклар ва кристаллар миқдори турлича. Эпидермис ҳужайралари девори эгри-буғри, устъицалар баргнинг ҳар икки томонига жойлашган. Туклар юпқа деворли, узун, кўп ҳужайрали, оддий ёки безли, бошчаси бўлиб, ёш баргларда жуда кўп.



4.1-расм. Мингевона барги микроскопияси

1, 2 - барг эпидермиси қолдиқлари; 3 - тукчалар; 4 - барг томири қолдиқлари; 5 - друзлар; 6 - баргнинг бўлинган фрагментлари.


Барг четида мингевона ўсимлигига хос кўп ҳужайрали, чўзинчоқ ёки юмалоқ бошли ва узун, кўп ҳужайрали оёқли тукларни кўриш мумкин. Барг

ўсган сари туклар қуриб, йўқола боради. Кристаллари призма ва куб шаклида бўлиб, якка ҳолда учрайди. Жуда йирик ва қари барглардан эса 2-3 таси бирлашган кристалларни, друзларни (баъзан томирида турли шаклдаги кристалл қумларни) учратиш мумкин.

Махсулотнинг кукунида юқорида кўрсатилган элементлардан (баргдаги туклар ва кальций оксалат кристалларидан) ташқари доимо рангиз, йирик қум ёки турли шаклдаги сариқ кристалларнинг йирик бўлакчалари бўлади.

Доривор белладонна. Баргни ишқор эритмаси билан ёритиб, сўнгра ташқи тузилиши микроскоп остида кўрилади (4.2-расм). Барг эпидермисининг ён деворлари эгри-буғри бўлиб, ундаги кутикула қатламлари билиниб туради. Баргларда томирлари бўйлаб, уч-тўрт ҳужайрали оддий, бир ҳужайрали бошчали ва узун оёқчали ҳамда бошчаси кўп ҳужайрали ва калта (бир ҳужайрали) оёқчали туклар кўринади. Баргда кальций оксалат тузининг қумсимон кристаллари жойлашган халта ҳужайралар бўлиши унинг энг характерли белгиларидан биридир. Бу халта ҳужайралар баргининг мезофилл қисмида тарқоқ ҳолда жойлашган бўлиб, микроскопнинг кичик объективида кичкина қора доғ шаклида, катта объективида эса аниқ кўринади.

Баъзан халта ҳужайрадаги кристаллар баргда кукун ҳолида сочилиб кетган бўлади.



4.2-расм. Белладонна барги микроскопияси

1, 2 - барг эпидермиси қолдиқлари; 3 - тукчалар; 4 - барг томири қолдиқлари; 5 - кальций оксалат кристаллари; 6 - баргининг бўлинган фрагментлари.

Сассиқ алаф. Ўзбекистонда ўсувчи сассиқ алаф ўсимлиги биринчи марта ўрганилаётган бўлиб, ҳозир вақтгача унинг фақат анатомик тузилиши бўйича фармакогностик таҳлил олиб борилган. Мазкур манбаада ўсимлик

қисмларининг анатомик тузилиши ҳақида маълумотлар келтирилади. Жумладан, барг ва мевасининг микроскопияси ўрганилган бўлиб, маълумотлар қуида келтирилган.


Барг микроскопияси

Баргнинг икки томонидаги эпидермис ҳужайралари юпқа деворли эгри-бугри бўлиб, ҳар икки томонда устьицалар жойлашган (4.3-расм). Улар баргнинг пастки томонида кўпроқ. Кутикула юпқа қат-қат жойлашган бўлиб, бу устьица атрофида яққол кўриниб туради. Туклар бўлмайди.

Барг кўндаланг кесимда долзовентрал тузилишга эга бўлиб, баргнинг юқори томонига бир қатор қозиқсимон ҳужайралар, баргнинг пастки томонига 4-6 қатор паренхима ҳужайраларидан ташкил топган булутсимон тўқима жойлашган.

Баргнинг асосий томирида йирик ўтказувчи тўқима боғламлари жойлашган бўлиб, унинг юқори ва пастки қисмидаги эпидермис тагида колленхима жойлашган.

Барг кўндаланг кесимида айлана бўйича бир неча ўтказувчи тўқима боғламлар жойлашган бўлиб, унинг ўртасида бўшлиқ бўлади. Ўтказувчи тўқима боғламларидаги ксилема, флоэма ва паренхима ҳужайралар оралиғида секретор каналчалар жойлашган бўлади.



4.3-расм. Сассиқ алаф ўсимлиги баргининг микроскопияси

А - юқори эпидермис; Б - пастки эпидермис; В - барг пластинкасининг кўндаланг кесими; Г - барг асосий томирининг кўндаланг кесими; Д- барг асосий томирининг кўндаланг кесимини бир фрагменти.


1 - барг эпидермиси; 2 - устьица; 3 - қат-қат кутикула; 4 - қозиқсимон тўқима; 5 - булутсимон тўқима; 6 - ўтказувчи тўқима боғлами; 7 - колленхима; 8 - ксилема; 9 - флоэма; 10 - секретор канал; 11 - ҳаволи бўшлиқ.

Мева микроскопияси

Мева кўндаланг кесимида икки қўшалоқ беш қобирғали пистадончадан иборат (4.4-расм). Эндосперм эгилган буйраксимон шаклда. Мева эпидермиси – экзокарп усти кўриниши майда кўримсиз бўлиб, узунаси қатқат кутикула ва сийрак сўрғичсимон эпидермис ҳужайра ўスマлар билан қопланган. Қобирғаларда ўтказувчи тўқима жойлашган. Эфир мойли каналчалар бўлмайди. Меванинг ташқи девори – мезокарпда майда юпқа деворли ҳужайралар жойлашган, ички деворида эса икки қатор узунасига чўзилган йирик ҳужайралар бўлади. Бу ҳужайраларнинг ташқи томони U-симон қалинлашган.

Эндокарп – мева ички қавати текис юпқа қаватли ҳужайралардан иборат.

Эндосперм бир қават майда ҳужайралардан иборат бўлиб, уларда алейрон доначалари ва друзлар, ёғ томчилари бўлади.




4.4-расм. Сассиқ алаф ўсимлиги мевасининг микроскопияси

1 - меванинг умумий кўриниши; 2 - меванинг кўндаланг кесими (схема); 3 - мева пўстлоғининг кўндаланг кесими;

а – мева пўстлоғи; в – ўтказувчи тўқима боғламлари; г – уруғ палласи.

Катта қончўп. Катта қончўп ўсимлиги билан заҳарланиш ҳолатлари юз берганда дастлабки тезкор таҳлил қилиш усувларини ишлаб чиқиши мақсадида ўсимлик билан заҳарланган қуённинг ошқозонидан чайнди сувлар олиниб, фармакогностик жиҳатдан ўрганилган. Ошқозон чайнди сувлари таркибидаги ўсимлик қолдиқларини микроскопик ўрганилганда катта қончўп ўсимлигига хос диагностик белгилар қўрилган (4.5-расм). Бунда баргнинг ҳар иккала томонидаги эпидермис ҳужайралари эгри-буғри деворли бўлиб, устьицалар баргнинг фақат пастки томонидаги эпидермисида 4-7 та эпидермис ҳужайралари билан ўралган. Кончўп учун ўзига хос белгилардан


бири баргода сарғиши-қўнғир рангли сут-шира найларининг мавжудлиги. Баргининг ҳар бир тишчаси устида гитадода ва сув устьицалари учрайди.



4.5-расм. Катта қончўп ўсимлиги баргининг микроскопияси

1 – баргининг устки эпидермиси; 2 – баргининг пастки эпидермиси; 3 – устьицалар; 4 – тукчалар; 5 – гидатодалар; 6 – йирик сувли устьицалар; 7 – паренхима ғовак тўқималарининг сувли устьицалари; 8 – сут найчалари.


Яшил шамшод. Ўсимликнинг баргларини диагностик белгиларини аниқлаш мақсадида глицерин-спирт-сув (1:1:1) аралашмасида микропрепарат тайёрлаб, микроскоп остида кўрилганда баргининг ҳар иккала томонидаги эпидермис хужайралари эгри-бугри деворли бўлиб, устьицалар баргининг фақат пастки томонидаги эпидермисида 3-5 та эпидермис хужайралари билан ўралган. Баргининг четларида калта бир хужайрали бошчали ва узун оёқчали туклар жойлашган (4.6-расм).



4.6-расм. Яшил шамшод ўсимлиги баргининг микроскопияси

1 – баргининг устки эпидермиси; 2 – устьицалар; 3 – тукчалар

Кампирчопон. Кампирчопон ўсимлигининг ер устки қисмидан хлоралгидрат ёрдамида микропрепарат тайёрланди ва микроскоп остида кўрилганда баргнинг устки ва остки эпидермиси ҳужайралари эгри-буғри деворли бўлиб, устьицалар баргнинг иккала томонида жойлашган. Улар 4-5 ҳужайра билан ўралган. Баргнинг иккала томонида ҳам кўплаб узун кўп ҳужайрали туклар мавжуд. Барг томири бўйлаб шохланган кўп ҳужайрали, бошчали бир ҳужайрали, узун туклар мавжуд (4.7-расм).




4.7-расм. Кампирчопон ўсимлиги баргининг микроскопияси

1 – баргнинг устки эпидермиси ва устьицалар; 2 – тукчалар; 3-кўп тармоқли тукчалар.


Ушбу микроскопик кўрсаткичлар ўрганилган ўсимликлар билан заҳарланишларни аниқлашда дастлабки диагностик белгилар сифатида фойдаланиш мумкин. Ошқозон чайнинди сувларидан ажратиб олинган ўсимлик қисмларини фармакогностик таҳлилини ўтказиш мақсадида тажриба ҳайвонларида изланишлар олиб борилди.

Тажриба учун мос равища алоҳида-алоҳида лаборатория күёнларининг овқатига мингевона, белладонна, қончўп, сассиқ алаф, яшил шамшод ва кампирчопон ўсимликларидан аралаштириб, енгил заҳарланиш ҳолатини юзага келтирилди. 0,5-1 соатдан сўнг қуённинг ошқозонини ювиб, ювинди сувлар алоҳида идишга йифилди. Ўсимлик қисмлари пинцет ёрдамида ажратиб олиниб, аввал глицерин-спирт-сув (1:1:1) аралашмаси билан, сўнгра хлоралгидрат эритмаси билан ювилди. Тайёрланган намуналар микроскоп остида кўрилганда юқорида келтирилгандек белгилар кузатилди (4.8-4.13 расмлар).




4.8-расм. Ошқозон қайт массасидан ажратиб олинган мингдевона қисмлари

1, 2 - барг эпидермиси қолдиқлари; 3 - тукчалар; 4 - барг томири қолдиқлари; 5 - друзлар; 6 - баргнинг бўлинган фрагментлари.



4.9-расм. Ошқозон қайт массасидан ажратиб олинган белладонна қисмлари

1, 2 - барг эпидермиси қолдиқлари; 3 - тукчалар; 4 - барг томири қолдиқлари; 5 - кальций оксалат кристаллари; 6 - баргнинг бўлинган фрагментлари.




4.10-расм. Ошқозон қайт массасидан ажратиб олинган қончўп қисмлари

1 – баргнинг устки эпидермиси; 2 – баргнинг пастки эпидермиси; 3 – устьицалар; 4 – тукчалар; 5 – гидатодалар; 6 – йирик сувли устьицалар; 7 – паренхима ғовак тўқималарининг сувли устьицалари; 8 – сут найчалари.


4.11-расм. Ошқозон қайт массасидан ажратиб олинган сассик алаф қисмлари

1 - барг эпидермиси; 2 - устьица; 3 - қат-қат кутикула; 4 - булутсимон түкима



4.13-расм. Ошқозон қайт массасидан ажратиб олинган кампирчопон қисмлари

1 - баргнинг устки эпидермиси ва устьицалар; 2 - тукчалар; 3- кўп тармоқли тукчалар.



4.2. ЮҚХ-скрининг усулида алкалоидларни аниқлаши

Алкалоид сақловчи ўсимликлар ва алкалоидларни таҳлил қилишда хроматографик усулларининг ҳамма турлари (адсорбцион, ион алмасиши, тақсимланиш (бўлиниш) ва бошқалар) кенг миқёсда қўлланилади. Бу усуллардан алкалоидли ажратмада қанча ва қандай бирикмалар (чинлигини аниқлашда, яъни идентификация қилишда) борлиги, алкалоидлар йиғиндисидан айримларини ажратиб олиш ҳамда уларнинг микдорини аниқлашда фойдаланилади. Ўсимликлар таркибида неча хил алкалоидлар

борлиги ва уларнинг дастлабки – *такминий* чинлигини аниқлашда (идентификация қилишда) хроматографик таҳлил усуларидан қоғоз ва юпқа қаватда ўтказиладиган тақсимланиш хроматографик усуллари жуда ҳам қулай ҳисобланади.

ЮҚХ усули оддийлиги, қўллаш соҳасининг кенглиги, сезгирилиги туфайли ҳозирги кунгача ўз амалий аҳамиятини йўқотган эмас. Аксинча, усул суд-кимё, экология ва кимё-токсикологик таҳлилларда бир томондан модда сифатини аниқловчи услуб, иккинчи томондан биологик объектлардан олинган ажратмаларни тозалаш усули сифатида қўлланилиши маълум. Бу эса мазкур таҳлилларда муҳим аҳамият касб этади.

Юпқа қатlam хроматографиясида моддаларни тақсимлаш ва бир-биридан ажратишда эритувчилар системасини тўғри танлаш муҳим роль ўйнайди. Зоро, тўғри танланган органик эритувчилар аралашмаси наинки ушбу модда учун сифат кўрсаткичи (*Rf* қиймати бўйича) бўлиб, балки ёт моддалардан тозалашда ҳам муҳим ўрин тутади. Шунингдек, ЮҚХ усулида моддалар таҳлил қилинганда уларнинг *Rf* қийматлари 0,4-0,8 оралиқда бўлиши тақозо этилади ва бунга органик эритувчиларни турли нисбатларда қўллаш орқали эришилади.

Тажрибаларда «Силуфол» пластинкаси (*Silpearl* сорбенти), лабораторияда тайёрланган пластинка (*LS 5/40* μ силикагель сорбент) фойдаланилди.

Лаборатория хроматографик пластинкалар қўйидагида тайёрланди.

Ўлчамлари 8x12 см бўлган сирт юзаси тозаланган шиша пластинкаларга таркибида 13% гипс сақлаган нейтрал силикагель суспензияси қуюлиб текисланди. Тайёрлаган пластинкалар хона ҳароратида қутилиб, сўнgra қутииш шкафида 130 °C ҳароратда 30-40 дақиқа қолдирилди. Қутилган пластинкаларни эксикаторга жойлаштирилиб совутилди. “Силуфол” пластинкалар қўллаш учун тайёр бўлганлиги сабабли уларни факат қутишиб олинди. Таҳлилларда хатоликларни камайтириш мақсадида ҳар иккала пластинкаларни ишлатишдан аввал мос эритувчилар системасида ювиб олинди.

Мингевона ва белладонна ўсимликларининг ЮҚХ-скрининг таҳлили

Хлороформли экстрактдан қолган қуруқ қолдиқ 5 мл этил спиртида эритилгандан сўнг ундан оз миқдорда (2 мл) олиб реакциялар олиб борилди.

1-3 томчи спиртли эритма буюм ойначасига ўтказилди ва қутилди. Қуруқ қолдиқ устига 1-2 томчи 0,01 М хлорид кислотаси томизилди ва қолдиқ эритилди. Ушбу эритма ёнига керакли реактивдан 1-2 томчи

томизилиб, шиша таёқча билан эритмалар аста-секин аралаштирилди. Бунда икки эритма аралашган жойда характерли лойқаланиш ёки чўкма тушиши кузатилди.

Қора мингдевона ва белладонна ўсимликларидан олинган экстрактлар куйидаги реактивлар билан чўқмалар ҳосил қилди:

Вагнер (йоднинг калий йодиддаги эритмаси), Драгендорф (висмут йодиднинг калий йодиддаги эритмаси), Майер (симоб йодиднинг калий йодиддаги эритмаси), Зонненшейн (фосфор-молибден кислотаси), Шейблер (фосфор-вольфрам кислотаси) реактивлари. Ушбу реакциялар натижалар 4.1-жадвалда келтирилган.

4.1-жадвал

Қора мингдевона ва белладонна ўсимликлари экстрактининг умумий чўқтирувчи реактивлар билан реакциялари натижалари

Реактивлар Экстракт	Вагнер	Драгендорф	Майер	Зонненшейн	Шейблер
Мингдевона экстракти	қўнғир чўкма	қизил- қўнғир чўкма	қўнғир чўкма	қўкимтири чўкма	қўнғир чўкма
Белладонна экстракти	қизил- қўнғир чўкма	зарғалдоқ- қўнғир чўкма	қўнғир чўкма	корамтири чўкма	қўнғир чўкма

Олинган экстракт таркибидаги алкалоидларни балласт моддалардан тозалаш ҳамда бир-биридан ажратиш мақсадида адабиётлардан олинган маълумотлар ҳамда юқорида келтирилган натижалардан фойдаланган ҳолда ЮҚҲ-скрининг таҳлили олиб борилди. Бунинг учун LS 5/40 маркали силикагелдан (13% гипс сақлаган) пластинкалар қуйидаги тартибда тайёрланди []:

Чинни идишга 35 г силикагель, 2 г гипс ва 90 мл тозаланган сув солиб, яхшилаб аралаштирилди. Ҳосил бўлган суспензияни 9x12 см ўлчамдаги 10 та шиша пластинкаларга teng микдорда, бир текисда қуйиб чиқилди. Хроматографик пластинкалар хона ҳароратида қуритилди ва 105°C 30 дақиқа давомида қутиши жавонида фаоллаштирилди. Тайёр бўлган силикагель пластинкалар таҳлилгача махсус идишларда – эксикаторларда сакланди. Қора мингдевона ўсимлигидан юқорида кўрсатилган тартибда ажратиб олинган экстрактнинг қуруқ қолдигини 1 мл этил спиртида эритиб олиб, тайёрланган хроматографик пластинканинг старт чизигига тўғри чизик шаклида томизилди. Ёнига гувоҳ эритма сифатида атропин ҳамда скополаминнинг стандарт намуналари эритмаларидан нуқта кўринишида томизилди. Сўнгра

олдиндан эритувчилар системасини солиб тўйинтирилган хроматографик колонкага пластинкани тушириб, хроматографик жараён олиб борилди. Эритувчилар системаси сифатида хлороформ-ацетон-диэтиламин 50:30:2 нисбатдаги аралашмаси қўлланилди. Эритувчилар системаси пластинка бўйлаб кўтарилиб, 10 см га етгач, пластинкани камерадан олиб, хона ҳароратида қуритилди. Сўнгра ўсимлик экстракти томизилган қисми шиша пластинка ёрдамида ёпиб турилиб, гувоҳ эритмалар томизилган қисмини Драгендорф реактиви билан пуркалди. Бунда атропин ва скополамин бир-биридан фарқли равишда пластинканинг турли қисмларида доғ ҳосил қилди. Атропин зарғалдоқ фонда қизғиши-қўнғир доғ ($Rf=0,25$), скополамин эса сариқ-қўнғир доғ ҳосил қилди ($Rf=0,64$). Табиийки, ўсимликдан олинган экстракт таркибидаги алкалоидлар (атропин ва скополамин) ҳам ушбу зоналарда ажралиб чиқади. Балласт моддалар эса пластинканинг пастки қисмida қолади. Пластинкадаги ҳар бир гувоҳ модда доғ ҳосил қилган зона қаршисидаги ўсимлик экстрактига тегишли қисми ажратиб олиниб, элюация қилинди. Бунда атропин учун метанол-диэтиламин (9:1), скополамин учун метанол-аммиакнинг 25% эритмаси (9:1) аралашмасидан фойдаланилди. Олинган элюатлар қофоз фильтр орқали чинни товоқчага фильтрланиб, қуруқ қолдиқ қолгунча хона ҳароратида қуритилди. Ушбу хроматографик жараён белладонна ўсимлигидан ажратиб олинган экстракт учун ҳам олиб борилди. Элюатлардан кейинги таҳлил усулларида фойдаланиш мумкин. Бу жараён алкалоидларни аниқлаш билан балласт моддалардан тозалаш усули сифатида ҳам қўлланилиши мумкин.

Сассиқ алаф ўсимлигининг ЮҚХ-скрининг таҳлили

Сассиқ алаф ўсимлигининг биологик фаол моддаларини таҳлил қилиш ҳақидаги маълумотлар жуда тарқоқ ва кам сонлидир. Улар асосан Ўзбекистондан бошқа турли ҳудудларда ўсуви ўсимликларнинг кимёвий таркибини ўрганишга бағищланган.

Сассиқ алаф ўсимлигининг кимёвий таркиби Ахутина А.В. томонидан ўрганилган бўлиб, унда асосан ўсимлик таркибидаги конин ЮҚХ, УБ-СФ ва микрокристаллоскопик реакциялар ёрдамида аниқланган [4]. Биологик объектдан конин ишқорий муҳитда эфир билан экстракциялаб олинади. Эфир учирилиб, қолдиққа реакциялар олиб борилади. Қолдиқ сарғиш мойсимон суюқликдан иборат бўлади.

Конин Драгендорф реактиви билан ромб шаклидаги қизил кристаллар, хлорид кислотаси билан буралган нинасимон кристаллар йиғиндисини ҳосил қиласади.

Кониин учун ЮҚХ усулида қўзғалувчи фаза сифатида метанол-концентрангандан аммоний гидроксид (100:1,5), очувчи реагент сифатида кислотали шароитдаги йодплатинат реактиви ($R_f=0,26$) таклиф этилган.

Ўсимликдан юқорида кўрсатилган тартибда ажратиб олинган экстрактнинг қуруқ қолдигини 1 мл этил спиртида эритиб, тайёрланган хроматографик пластинканинг старт чизигига тўғри чизиқ шаклида томизилди. Ёнига гувоҳ эритма сифатида кониин ҳамда конгидриннинг стандарт намуналари эритмаларидан нуқта кўринишида томизилди. Сўнгра олдиндан эритувчилар системасини солиб тўйинтирилган хроматографик колонкага пластинкани тушириб, хроматографик жараён олиб борилди. Эритувчилар системаси сифатида хлороформ-ацетон-диэтиламиннинг 50:30:2 нисбатдаги аралашмаси қўлланилди. Эритувчилар системаси пластинка бўйлаб кўтарилиб, 10 см га етгач, пластинкани камерадан олиб, хона ҳароратида қуритилди. Сўнгра ўсимлик экстракти томизилган қисми шиша пластинка ёрдамида ёпиб турилиб, гувоҳ эритмалар томизилган қисмiga йод кристаллари буғлари билан ишлов берилди. Бунда пластинканинг турли қисмларида кониин ва конгидринга хос доғ ҳосил қилди. Кониин зарғалдоқ фонда қизғиш-қўнғир доғ ($R_f=0,26$), конгидрин эса зарғалдоқ фонда сариқ-қўнғир доғ ($R_f=0,68$) ҳосил қилди. Табиийки, ўсимликдан олинган экстракт таркибидаги алкалоидлар (кониин ва конгидрин) ҳам ушбу зоналарда ажралиб чиқади. Балласт моддалар эса пластинканинг пастки қисмида қолади. Пластинкадаги ҳар бир гувоҳ модда доғ ҳосил қилган зона қаршисидаги ўсимлик экстрактига тегишли қисми ажратиб олиниб, элюация қилинди. Бунда кониин учун метанол-диэтиламин (9:1), конгидрин учун метанол-аммиакнинг 25% эритмаси (9:1) эритувчилар аралашмасидан фойдаланилди. Олинган элюатлар фильтрланиб, қуруқ қолдиқ қолгунча хона ҳароратида қуритилди. Ушбу хроматографик жараён ўсимликдан ажратиб олинган экстракт учун ҳам олиб борилди. ЮҚХ-скрининг усулида олиб борилган алкалоидларнинг ажралиш жараёнини балласт моддалардан тозалаш мақсадида биологик суюқликлар ҳамда биологик объект таркибидан ажратиб олинган ажратмалар учун ҳам қўлланди ва ижобий натижалар олинди.

Катта қончўп ўсимлигининг ЮҚХ-скрининг таҳлили

Катта қончўп ўсимлигидан олинган хлороформли экстракт таркибида алкалоидлар борлигини дастворида текшириш учун суд-кимё экспертизаси ва кимё-токсикологик таҳлилларда қўлланиладиган алкалоидларни умумий чўқтирувчи реактивларга муносабати ўрганилди. Мазкур реактивлар алкалоидлар ва тузилишида учламчи азот сақлаган органик бирикмалар

билан чўқмалар ҳосил қиласди. Бу реакциялар хусусий эмас, аммо улар алкалоидларни мавжудлигини аниқлашга ёрдам беради. Уларнинг сезгирлиги жуда юқори бўлиб, кам миқдордаги моддалар билан ҳам чўқмалар ҳосил қиласди. Ижобий натижалар экстрактни бошқа сезгир ва селектив усуллар ёрдамида текширишга асос бўлади. Ўтказилган реакциялар салбий натижалар берганда алкалоидларни бошқа усулларда текшириш тўхтатилади. Шунингдек, ижобий натижа ҳам алкалоидлар мавжуд деган хulosани беришга асос бўлмайди. Чунки экстрактлар таркибидаги тузилишида азот сақлаган бошқа органик бирикмалар ҳам алкалоидларни чўқтирувчи умумий реактивлар билан чўқмалар ҳосил қилиш мумкин. Шунинг учун ҳам алкалоидларни чўқтирувчи умумий реактивлар дастлабки текширишларда қўлланилди ва улардан кейин бошқа усуллар ёрдамида тасдиқловчи текширувлар ўтказилмоғи лозим.

Катта қончўп ўсимлигидан юқорида кўрсатилган тартибда ажратиб олинган экстрактнинг қуруқ қолдигини 1 мл этил спиртида эритиб, тайёрланган хроматографик пластинканинг старт чизигига тўғри чизик шаклида томизилди. Ёнига гувоҳ эритма сифатида хелидонин ҳамда сангвинариннинг стандарт эритмаларидан нуқта кўринишида томизилди. Сўнгра олдиндан эритувчилар системасини солиб тўйинтирилган хроматографик колонкага пластинкани тушириб, хроматографик жараён олиб борилди. Эритувчилар системаси сифатида н-бутанол, концентранган сирка кислотаси ва сувнинг 40:10:10 нисбатдаги аралашмаси қўлланилди. Эритувчилар системаси пластинка бўйлаб кўтарилиб, 10 см га етгач, пластинкани камерадан олиб, хона ҳароратида қуритилди. Пластинкани 365 нм тўлқин узунлигига нурланувчи УБ-лампа остида кўрилганда бир нечта доғларни кўриш мумкин: сариқ-яшил рангда берберин ($Rf = 0,3$), ҳаво рангдаги хелиритрин ($Rf = 0,83$), қизғиш рангдаги хелидонин ($Rf = 0,53$), оч зарғалдоқ рангдаги сангвинаринга хос ($Rf = 0,79$). Керакли доғларга тегишли зоналар белгилаб олингач, ўсимлик экстракти томизилган қисми шиша пластинка ёрдамида ёпиб турилиб, гувоҳ эритмалар томизилган қисмiga Драгендорф реактиви пуркалди. Бунда хелидонин ва сангвинаринга тегишли зоналарда ($Rf=0,53$ ва $Rf=0,79$) зарғалдоқ-қўнғир доғлар кўринди. Хелидонин ва сангвинарин бир-биридан фарқли равища пластинканинг турли қисмларида доғ ҳосил қилди. Пластинкадаги ҳар бир гувоҳ модда доғ ҳосил қилган зона қаршисидаги ўсимлик экстрактига тегишли қисми ажратиб олиниб, хлороформ-метанол (95:5) эритувчилар аралашмасида элюация қилинди. Олинган элюатлар қоғоз фильтр орқали чинни тавоқчага фильтраниб, қуруқ қолдиқ қолгунча хона ҳароратида қуритилди.

Яшил шамшод ўсимлигининг ЮҚХ-скрининг таҳлили

Яшил шамшод ўсимлиги алкалоидларини мазкур усулда таҳлил этиш шароитларини ишлаб чиқиш учун ўсимликдан олинган экстрактнинг қуруқ қолдиги 5 мл этил спиртида эритиб олинди.

Хроматографик пластинкада жойлашган алкалоидларни аниқлаш мақсадида қуйидаги реактивлардан фойдаланилди: Мунье бўйича модификацияланган Драгендорф, Фреде, Марки, Либерман, Зонненшнейн, Майер реактивлари, концентрангансу сульфат кислота, темир (III) хлорид. Спиртли ажратмадан алоҳида хроматографик пластинкаларга томизиб, ҳар бир реактив пуркалди. Шунингдек 254 нм тўлқин узунлигидаги ультрабинафша нурлари остида ҳам кўрилди. Реакция натижалари 4.2-жадвалда келтирилган.

4.2-жадвал

Яшил шамшод ўсимлиги экстрактини аниқлашда қўлланилган реактивлар билан реакциялари натижалари

T/p	Реактивлар	Реакциялар натижалари
1	Либерман	сарик ранг
2	Марки	қора-қўнғир ранг
3	Мунье бўйича модификацияланган Драгендорф	қизғиши-қўнғир
4	Майер	қора қизғиши
5	Конц сульфат кислота	қорамтири
6	Темир (III) хлорид	қора-қўнғир ранг
7	Фреде	ранг бермади
8	Зонненшнейн	ранг бермади
9	УБ нурлари	қизғиши-қўнғир товланиш

Олиб борилган тажрибалар ва уларнинг жадвалда келтирилган натижалари шуни кўрсатдики, қўлланилган реагентлар ва уларнинг аралашмалари орасида яшил шамшод алкалоидларини аниқлашда УБ нурлари ва Мунье бўйича модификацияланган Драгендорф реактиви яхши натижа берди. Мазкур реактив хроматографик пластинкаларга пуркалганда доғларнинг чегаралари аниқ бўлиб, турғун ранг ҳосил қилди. УБ нурлари остида товланиш бериши ишни бирмунча енгиллаштириди. Бу алкалоидларни бир-биридан ажратиш мақсадида ЮҚХ-скрининг усулини қўллаш ва пластинкани реактив билан ифлослантиrmай туриб, доғни аниқлаш, ҳамда тегишли зонани элюация қилиб олиш имконини беради.

Яшил шамшод ўсимлиги таркибидаги алкалоидлар кимёвий тузилишида бирламчи ароматик амино гурухни сақлагани сабаб азобўёқ

реакциясини олиб бориши мақсадга мувофик деб топилди. Бунинг учун ўсимликдан олинган экстракт 5 мл этил спиртида эритилиб, эритмадан 1 мл пробиркага солинди ва унга 1 мл концентрантланган хлорид кислотаси қўшиб, аралашма ҳажми ярмига камайгунга қадар буғлатилди. Сўнгра аралашма совутилиб, унга натрий нитритнинг 1% эритмаси қўшилди ва β-нафтолнинг ишқорий эритмаси томчилатиб солингандада аралашма қизил рангга кирди. Ушбу азобўёқ реакциясини ҳам бускин алкалоидини юпқа қатлам хроматографияси усулида очувчи реактив сифатида тавсия этиш мақсадида хроматографик пластинкага спиртли ажратма томизилиб, сўнгра азобўёқ реактивларини кетма-кетликда томчи ҳолида томизилди ва ижобий натижада олинди.

Маълумки, хроматографик система сифатида амалиётда кўплаб қуйидаги эритувчилардан фойдаланилади: хлороформ, этанол, этилацетат, ацетон, диэтилэфир ва уларнинг аралашмалари: хлороформ-ацетон (7:3), хлороформ-этанол (8:2), хлороформ-ацетон-диэтиламин (50:30:2). Ушбу хроматографик системалар ва адабиётларда келтирилган эритувчилардан ташкил топган турли аралашмаларни қўллаган ҳолда тажриба олиб борилди.

Хроматографик системалар тайёрлашдан аввал барча органик эритувчилар ҳайдаш йўли билан тозаланди.

Бир қатор хроматографик камераларга органик эритувчилар ва уларнинг турли нисбатлардаги аралашмаларидан қўйилди. Хроматографик камераларни органик эритувчилар ва аралашмаларнинг парлари билан яхши тўйинишини таъминлаш мақсадида унинг деворларига тўрт томондан фильтр қоғоз тасмалар мустаҳкамлаб қўйилди. Бунда тасманинг бир учи органик эритувчилар аралашмасига тегиб туриши таъминланди. 20-25 дақиқадан сўнг хроматографик пластинкаларни камерага тезда туширилиб қопқоқлари зич ёпилди.

Хроматографик пластинкадаги органик эритувчилар аралашмаси 10 см га кўтарилиганда пластинкалар камерадан олиниб, хона ҳароратида органик эритувчилар аралашмасининг ҳиди кетгунча қолдирилди. Шундай қилиб, эритувчилар фронтининг масофаси 10 см ташкил қилди.

Мазкур тартибда яна икки маротаба хроматографияланди. Ушбу пластинкалар кейинги босқичда таҳлил қилиш учун қуритилди.

Қуритилган хроматографик пластинкаларга турли реактивлар таъсир эттирилди.

Алкалоидларни ҳар иккала пластинка ва хроматографик системаларда ҳосил қилган доғларининг Rf қийматлари учта пластинкада ўлчаниб, уларнинг ўртача қийматлари ва чекланишлар олинди.

Таъкидлаш жоизки, фойдаланилган ҳар бир хроматографик системада ҳар иккала пластинкада ҳам айнан қайтариувчан натижалар олиниб, доғларнинг ранг ёрқинлиги ва ўлчамларида кескин фарқ кузатилмади.

Алкалоидларнинг турли хроматографик системалардаги Rf қийматлари 4.3-жадвалда келтирилган.

4.3-жадвал

Алкалоидларни турли хроматографик системалардаги Rf қийматлари

Т/п	Хроматографик система	Rf қийматлар	
		Силуфол	Силикагель
1	Ацетон	0,82±0,03	0,85±0,04
2	Этил ацетат	0,23±0,03	0,26±0,04
3	Этанол	0,12±0,03	0,15±0,04
4	Диэтил эфир	0,11±0,03	0,13±0,04
5	Этанол-диэтил эфир (8:2)	0,72±0,03	0,74±0,04
6	Хлороформ-ацетон (7:3)	0,35±0,02	0,38±0,04
7	Хлороформ-этанол (8:2)	0,90±0,03	0,95±0,02
8	хлороформ-ацетон-диэтиламин (50:30:2)	0,25±0,02	0,27±0,03
9	гексан-этилацетат (9:1)	0,71±0,02	0,69±0,02
10	этилацетат-метанол (9:1)	0,82±0,02	0,85±0,02

Ўтказилган тажрибалар яшил шамшод экстракти таркибидаги алкалоидлар юпқа қатlam хроматографияси усулида аниқлашда этанол ва диэтил эфирининг 8:2 нисбатдаги ҳамда гексан ва этилацетатнинг 9:1 нисбатдаги аралашмалари энг мўътадил эритувчилар системалари эканлигини кўрсатди.

Услубнинг сезирлигини аниқлаш мақсадида пластинкаларга таркибида аниқ миқдорда алкалоидларни ишончли намунаси сақлайдиган эритмалардан томизилди ва юқорида келтирилган шароитларда хроматография қилинди. Бунда ҳосил бўлган фон ва доғларнинг ранги кузатилди ва Rf қийматлари аниқланди.

Иzlанишларнинг кейинги босқичида яшил шамшод ўсимлигидан олинган экстрактни юпқа қатlam хромтографияси усулида таҳлил қилинди. Бунинг учун этил спиртида эритилган экстрактнинг 1 мл миқдори хроматографик пластинканинг старт чизигига тўғри чизик шаклида томизилди. Сўнгра олдиндан эритувчилар системасини солиб, тўйинтирилган хроматографик колонкага пластинкани тушириб, хроматографик жараён олиб борилди. Эритувчилар системаси сифатида этанол ва диэтил эфирининг

8:2 нисбатдаги ҳамда гексан ва этилацетатнинг 9:1 нисбатдаги аралашмалари кўлланилди. Эритувчилар системаси пластинка бўйлаб кўтарилиб, 10 см га етгач, пластинкани камерадан олиб, хона ҳароратида қуритилди. Сўнгра ўсимлик экстракти томизилган пластинка УБ нурлари остида кўрилди ва Мунье бўйича модификацияланган Драгендорф реактиви пуркалди. Бунда бускин ва циклобускин бир-биридан фарқли равишда пластинканинг турли қисмларида доғ ҳосил қилди. Бускин зарғалдоқ фонда қизғиш-қўнғир доғ ($R_f=0,72$), циклобускин УБ нур остида сарик доғ сифатида кўринди ($R_f=0,32$). Балласт моддалар эса пластинканинг пастки қисмида қолди.

Ўсимликдан олинган ажратмаларни тозалаб олиш мақсадида қуруқ қолдиқ 1 мл этил спиртида эритилиб, олдиндан лаборатория шароитида тайёрланган ва фаоллаштирилган силикагелли пластинкага тўғри чизик кўринишида томизилди. Унинг ёнига таркибида аниқ микдорда бускин алкалоидини ишончли намунаси сақлайдиган эритмадан томизилди. Юқорида танлаб олинган шароитларда хроматография ўтказилиб, тўғри чизик ҳолатида томизилган қисмини шиша пластинка ёрдамида ёпиб турган ҳолда очувчи реактив – Мунье бўйича модификацияланган Драгендорф реактиви пуркалди. Доғ ҳосил бўлган зона қаршисидаги силикагель қатлами қириб олиниб, хлороформ-метанол (95:5) эритувчилар аралашмасида элюация қилинди. Олинган элюатни хона ҳароратида қуруқ қолдиқ қолгунча буғлатилди.

Кампирчопон ўсимлигининг ЮҚХ-скрининг таҳлили

Алкалоидларнинг N-оксид формаси соғ (асос) ва туз ҳолидагидек реакцияга киришмайди. Шунинг учун алкалоидларнинг N-оксид формаси аввал водород ёрдамида қайтарилиб, сўнгра таҳлил қилинади. Кампирчопон ўсимлиги таркибида алкалоидларнинг айнан шундай шаклда мавжудлиги инобатга олиниши лозим.

Кампирчопон ўсимлиги алкалоидларининг қоғоз хроматография таҳлили

Хроматографик қоғознинг (узунлиги 30-40 см, эни 12 см) «старт» чизигига (пастки четидан 2-3 см баландлигига) капилляр найча ёки маҳсус томизғич ёрдамида ажратмадан 0,1 мл ҳамда алкалоидларнинг «гувоҳ» эритмаларидан бир-биридан 2 см масофада томизилди (томизилган доғнинг диаметри 5 мм дан катта бўлмаслиги керак). Томизилган ажратма ва гувоҳ эритмалар доғлари куригандан сўнг хроматографик қоғоз бир сутка олдин и-бутанол-сирка кислота-сувнинг 5:1:4 нисбатдаги аралашмаси қўйиб қўйилган хроматографик камерага жойлаштириб (қоғозни пастки чети 5 мм суюқликка тушиб туриши керак) қўйилди.

Кўрсатилган вақт ўтгандан сўнг, хроматограмма камерадан олинди, қуритилди ва унга Драгендорф реактиви пуркалди. Натижада пластинкадан алкалоидлар сариқ фонда зарғалдоқ (тўқ сариқ) доғлар ҳолида кўринди. Доғларнинг Rf қиймати аниқланди ва ажратмадаги ҳамда гувоҳ алкалоидларнинг Rf қийматларини солиштириб кўриб, ўсимлик ажратмасида қандай алкалоидлар борлиги тўғрисида хулоса чиқарилди.

Алкалоидларнинг юпқа қатлам хроматография таҳлили

КСК маркали сликагель маҳкамланган 12x9 см шиша пластинкаси ёки “Силуфол” пластинкасининг «старт» чизигига капиллар найча ёки маҳсус томизгич ёрдамида ўсимликдан тайёрланган ажратмадан ҳамда гувоҳ алкалоидлар эритмасидан бир-биридан 2 см масофада 0,1 мл дан томизилди (томизилган доғларнинг диаметри 5 мм дан катта бўлмаслиги керак). Доғлар қуриганидан сўнг пластинка олдиндан хлороформ-ацетон-диэтиламин (5:4:1) эритувчилар аралашмаси (кўзғалувчи система) қуиб қўйилган хроматографик камерага жойлаштирилди. Хроматография қилиш вақти (30-40 дақиқа) ўтгандан сўнг пластинка камерадан олинди, қуритилди ва унга Драгендорф реактиви пуркалди. Натижада ўсимликдан ажратиб олинган ва «гувоҳ» алкалоидлар сариқ фонда зарғалдоқ (тўқ сариқ) доғлар ҳолида кўринди. Доғларнинг Rf қийматлари ҳисобланди. Сўнгра ўсимлик ажралмасидаги ва гувоҳ алкалоидларнинг Rf қийматлари солиштириб кўриб, ўсимликда қандай алкалоид борлиги аниқланди.

Эрлих реакцияси ёрдамида алкалоидларни аниқлаш

Эрлих реакцияси пирролизидиннинг тўйинмаган алкалоидлари учун хос реакция бўлиб, бошқа алкалоидлар у билан реакцияга киришмайди. Гепатотоксик таъсирга эга бўлган пирролизидин бирикмаларини аниқлаш учун энг самарали усул колориметрия ҳисобланади. Жараён давомида алкалоид водород пероксид ёрдамида унинг N-оксидига айлантирилади. Маҳсулот сирка ангидриди билан реакцияга киришади ва пиррол унумларини (дегидро-алкалоид) ҳосил қиласи, улар эса маҳсус модификацияланган Эрлих реактиви билан қизил бинафша ранг ҳосил қиласи. Реактив таркибида бор трифторид мавжуд бўлиб, у максимал сезгирикни таъминлайди. Реакция сезгирилиги 5 мкг ташкил қиласи. Агар оксидланиш босқичлари инобатга олинмаган бўлса, факат тўйинмаган пирролизидинларнинг N-оксидларини аниқлаш мумкин.

Ушбу усулнинг соддалаштирилган шакли ишлаб чиқилган бўлиб, у ўсимликнинг ҳохлаган қисми: барглари, поялари, гуллари, уруғлари ёки илдизлари учун тўғри келиши мумкин [54].

Ўсимлик маҳсулотининг сувли ажратмасидан намуна олинади. Эритма фильтранади. Натрий нитропруссиднинг 5% сувли эритмасидан 0,2 мл таҳлил учун олинган намунага солинади. Сўнгра 1 дақиқа давомида 70-80 °C гача иситилади ва Эрлих реактиви қўшилади, сўнг яна 1 дақиқа давомида иситилади. Эрлих реагенти таркиби 5 г 4-диметиламинобензальдегид, 60 мл сирка кислотасининг 10% эритмаси, 30 мл тозаланган сув ва 10 мл хлорид кислотанинг 60% эритмасидан ташкил топган. Таҳлил учун бўлган намунадаги қизил бинафша ранг пирролизидин алкалоидларининг N-оксидлари борлигини тасдиқлайди. Тажриба учун олинган намуна индол ёки пиррол унумларини сақласа, рангни ўзгартириши мумкин.

Индикатор бўёқлари ёрдамида аниқлаш

Алкалоиднинг хлороформли ажратмаси нордонлаштирилган метил оранжнинг сувли эритмаси билан чайқатиб олинди. Алкалоид сариқ ранга бўялди ва сульфат кислотанинг 20% эритмаси билан хлороформ қаватидан ажратиб олинди ва спектрофотометр ёрдамида оптик зичлиги аниқланди.

Юқорида келтирилган таҳлил усуллари тоза моддалар учун мўлжалланган бўлиб, биологик объектлар таркибидан алкалоидларни аниқлашда зарур шарт-шароитлар, таҳлилга таъсир этувчи омиллар ўрганилмаган. Шунинг учун арzon ва тез бажарилувчи замонавий таҳлил усулларида алкалоидларни аниқлашнинг услублари ишлаб чиқилиб, уларни биологик объект таркибидан ажратиб олинган алкалоидларни аниқлашда қўллаш зарур.

Кампирчопон ўсимлигидан ажратиб олинган экстрактни таркибидаги балласт моддалардан тозалаш ҳамда алкалоидларни бир-биридан ажратиб олиш мақсадида юпқа қатlam хроматография усулидан фойдаланилди.

Суд-кимё экспертизаси ва кимё-токсикология тадқиқотлари объектлари бўлмиш биологик ашёлардан олинган ажратмаларнинг ёт моддаларга бойлиги, унинг таркибida бошқа моддаларнинг мавжудлиги ва текширилувчи модданинг кам миқдорларда бўлиши таҳлил учун сезгир, юқори самарали ва хусусий услубларни ишлаб чиқишни талаб этади. Айни талабларга жавоб берадиган усуллар орасида хроматографиянинг ўрни бекиёс.

Кампирчопон ўсимлигидан юқорида кўрсатилган тартибда ажратиб олинган экстрактнинг қуруқ қолдигини 1 мл этил спиртида эритиб олиб,

тайёрланган хроматографик пластинканинг старт чизигига тўғри чизиқ шаклида томизилди. Ёнига гувоҳ эритма сифатида триходесмин ҳамда инканиннинг стандарт намуналари эритмаларидан нуқта кўринишида томизилди. Сўнгра олдиндан эритувчилар системасини солиб, тўйинтирилган хроматографик колонкага пластинкани тушириб, хроматографик жараён олиб борилди. Эритувчилар системаси сифатида хлороформ-ацетон-диэтиламин 5:4:1 нисбатдаги аралашмаси қўлланилди. Эритувчилар системаси пластинка бўйлаб кўтарилиб, 10 см га етгач, пластинкани камерадан олиб, хона ҳароратида қуритилди. Сўнгра ўсимлик экстракти томизилган қисми шиша пластинка ёрдамида ёпиб турилиб, гувоҳ эритмалар томизилган қисмини Драгендорф реактиви билан пуркалди. Бунда триходесмин ва инканинга тегишли зоналарда ($Rf=0,53$ ва $Rf=0,61$) зарғалдоқ-қўнғир доғлар кўринди. Триходесмин ва инканин бир-биридан фарқли равишда пластинканинг турли қисмларида доғ ҳосил қилди. Табиийки, ўсимликдан олинган экстракт таркибидаги алкалоидлар (триходесмин ва инканин) ҳам ушбу зоналарда ажралиб чиқади. Балласт моддалар эса пластинканинг пастки қисмида қолади. Пластинкадаги ҳар бир гувоҳ модда доғ ҳосил қилган зона қаршисидаги ўсимлик экстрактига тегишли қисми ажратиб олинниб, хлороформ-метанол (95:5) эритувчилар аралашмасида элюация қилинди. Олинган элюатлар қоғоз фильтр орқали чинни тавоқчага фильтрланиб, қуруқ қолдиқ қолгунча хона ҳароратида қуритилди.

Ўтказилган тажрибаларга асосланиб, турли обьектлардан, шу жумладан ўсимликлардан ажратиб олинган алкалоидларни дастлабки скрининги ва идентификацияси учун қўлланиладиган таҳлил услублари ишлаб чиқилди. Мазкур услубларни қўллаш орқали алкалоидларни таҳлил қилиш мумкин. Ишлаб чиқилган усуллар умумлаштирилган ҳолда 4-жадвалда келтирилди.

4.4-жадвал

Ўрганилаётган ўсимликларнинг алкалоидлари учун тавсия этилаётган ЮҚХ-скрининг таҳлили шароитлари


Алкалоидлар	Эритувчилар системаси	Очувчи реактив	Rf кўрсатгич	Элюант
Атропин	Хлороформ-ацетон-диэтиламин (50:30:2)	Мунье бўйича модификацияланган Драгендорф реактиви	0,25	Метанол-диэтиламин (9:1)
Скополамин			0,64	Метанол-аммиакнинг 25% эритмаси (9:1)

Конин	Хлороформ-ацетон-диэтиламин (50:30:2)	Мунье бўйича модификацияланган Драгендорф реактиви ёки йод буғлари	0,26	Метанол-диэтиламин (9:1)
Конгидрин			0,68	Метанол-аммиакнинг 25% эритмаси (9:1)
Хелидонин	Н-бутанол-сирка кислота-сув (40:10:10)	264 нм УБ нурлари ёки Мунье бўйича модификацияланган Драгендорф реактиви	0,53	Хлороформ-метанол (95:5)
Сангвинарин			0,79	
Буксин	Этанол-диэтил эфир (8:2) Гексан-этилацетат (9:1)	264 нм УБ нурлари ёки Мунье бўйича модификацияланган Драгендорф реактиви	0,72	Хлороформ-метанол (95:5)
Циклобуксин			0,32	
Триходесмин	хлороформ-ацетон-диэтиламин	Мунье бўйича модификацияланган Драгендорф реактиви	0,53	
Инканин	(5:4:1)		0,61	


4.3. УБ-спектрофотометрия усулининг алкалоидлар таҳлилида қўлланилиши

Мингевона ва белладонна ўсимликлари алкалоидларини УБ-спектрофотометрия усулида таҳлили

УБ-спектрофотометрия усули нисбатан сезгирилиги паст бўлса ҳам кимё-токсикологик таҳлилларда кенг қўлланилади. Ушбу усул осон, тез бажариладиган, мураккаб жиҳоз ва тайёргарликни талаб этмайдиган усул, шунингдек барча суд-кимё лабораториялари УБ-спектрофотометр билан тўлиқ таъминланган. УБ-спектрофотометрия усулида мингевона ва белладонна ўсимликлари билан заҳарланиш холатларни аниқлаш учун тегишли ажратмалар олиниб, хроматографик тозаланди ва элюатлардан олинган қуруқ қолдиқлар 25 мл спиртда эритилиб, 200-400 нм тўлқин узунликларида оптик зичликлар ўлчанди. Бунда атропиннинг спиртдаги эритмаси 252, 254 нм тўлқин узунликлар, скополаминнинг спиртдаги эритмаси 251, 253, 263 нм тўлқин узунликларида максимал нур ютади (4.14-4.15-расм).



4.14-расм. Ўсимлиқдан ажратиб олинган атропин алкалоидининг УБ-спектри




4.15-расм. Ўсимлиқдан ажратиб олинган скополамин алкалоидининг УБ-спектри

Иzlaniшларимиз давомида юқорида ишлаб чиқилған услуб ёрдамида қон ва пешоб таркибидан мингdevона ва белладонна ўсимликлари алкалоидларини аниқланди. Бунинг учун модель объектлар қуидаги тайёрлаб олинди: 5 мл қон ва 25 мл пешоб намуналариға ўсимлик экстрактидан 10 мл құшиб, аралаштирилди ва 24 соатга қолдирилди. Күрсатылған вақт ўтгач, юқорида келтирилған усулда экстракция олиб борилди.


Олинган натижалар сассиқ алаф ўсимлиги билан ўткир заҳарланишлар содир бўлганда унинг таркибидаги алкалоидларни хлороформ билан экстракциялаб ажратиб олиб, УБ-спектрофотометрия усулида аниқлаш мумкинлигини кўрсатди.

Катта қончўп ўсимлиги алкалоидларини УБ-спектрофотометрия усулида таҳлили

З-усул ёрдамида катта қончўп ўсимлигидан ажратиб олинган ва хроматографик усуlda элюациялаб олинган хелидонин ва сангвинарин алкалоидларининг қуруқ қолдиқлари 25 мл спиртда эритилиб, УБ-спектрофотометрик усулда таҳлили ўтказилди. Ушбу шароитда ажратиб олинган хелидонин ажратмаси 272 нм, сангвинарин ажратмаси 321 нм тўлқин узунликларида юқори нур ютиш кўтсаткичига эга эканлиги аниқланди (4.16-ва 4.17-расмлар).



4.16-расм. Ўсимлиқдан ажратиб олинган хелидонин алкалоидининг УБ-спектри




4.17-расм. Ўсимлиқдан ажратиб олинган сангвинарин алкалоидининг УБ-спектри

Қон ва пешобдан тайёрланган модель намуналардан ажратиб олинган алкалоидларни УБ-спектрофотометрик таҳлили ўтказилди ва ўсимлик ажратмаларидан олинган УБ-спектрларга мос натижалар олинди.

Сассиқ алаф ўсимлиги алкалоидини УБ-спектрофотометрия усулида таҳлили

Сассиқ алаф ўсимлигидан 2-усул бўйича ажратиб олинган экстрактнинг қуруқ қолдиги 5 мл этил спиртида эритилиб, спектрофотометрда 200-400 нм тўлқин узунликларида оптик зичлиги ўлчанди. Бунда ўсимликдан ажратиб олинган конин алкалоиди 266 нм тўлқин узунлигига максимум нур ютиш кўрсаткичига эга эканлиги аниқланди (4.18-расм).



4.18-расм. Ўсимликдан ажратиб олинган конин алкалоидининг УБ-спектри


Иzlанишларимиз давомида юқорида ишлаб чиқилган услуб ёрдамида қон ва пешоб таркибидан сассиқ алаф ўсимлиги алкалоидларини аниқланди. Бунинг учун модель объектлар қўйидагича тайёрлаб олинди: 5 мл қон ва 25 мл пешоб намуналарига ўсимлик экстрактидан 10 мл қўшиб, аралаштирилди ва 24 соатга қолдирилди. Кўрсатилган вақт ўтгач, юқорида келтирилган усулда экстракция олиб борилди.

Олинган натижалар сассиқ алаф ўсимлиги билан ўтқир заҳарланишлар содир бўлганда унинг таркибидаги алкалоидларни хлороформ билан экстракция ёрдамида ажратиб олиб, УБ-спектрофотометрия усулида аниқлаш мумкинлигини кўрсатди.

Яшил шамшод ўсимлиги алкалоидини УБ-спектрофотометрия усулида таҳлили

УБ-спектрофотометрия усулида таҳлил шароитларини ишлаб чиқиш мақсадида яшил шамшод ўсимлигидан 2-усул бўйича ажратиб олинган экстрактнинг қуруқ қолдиги 5 мл этил спиртида эритилиб, спектрофотометрда 200-400 нм тўлқин узунликларида оптик зичлиги ўлчанди. Бунда ўсимликдан ажратиб олинган буксин алкалоиди 268 нм

тўлқин узунлигига максимум нур ютиш кўрсаткичига эга эканлиги аниқланди (4.19-расм).



4.19-расм. Ўсимликдан ажратиб олинган буксин алкалоидининг УБ-спектри

Иzlанишларимиз давомида юқорида ишлаб чиқилган услубнинг қон ва пешоб таркибидан яшил шамшод ўсимлиги алкалоидларини аниқлаш учун тажрибалар олиб борилди. Бунинг учун модель объектлар тайёрлаб олинди: 5 мл қонга ажратиб олинган ўсимлик экстрактидан 10 мл қўшиб, аралаштирилди ва 24 соатга қолдирилди. Кўрсатилган вақт ўтгач, юқорида келтирилган усулда экстракция олиб борилди.

Қуруқ қолдик 1 мл этанолда эритилиб, юқорида келтирилган ЮҚҲ усулида хроматографияланиб, элюат олинди. Олинган элюат хона ҳароратида қуритилиб, 5 мл этил спиртида эритилди ва 268 нм тўлқин узунлигига оптик кўрсаткичи аниқланди.


Пешоб модель намунасини тайёрлаш учун унинг 25 мл ҳажмига ажратиб олинган ўсимлик экстрактидан 10 мл қўшиб, аралаштирилди ва 24 соатга қолдирилди. Кўрсатилган вақт ўтгач, 3.2-бўлимда келтирилган усулда экстракция олиб борилди.

Қуруқ қолдик 1 мл этанолда эритилиб, 4.2-бўлимда келтирилган юпқа қатлам хроматография усулида тозаланди. Олинган элюат хона ҳароратида қуритилиб, 5 мл этил спиртида эритилди ва 268 нм тўлқин узунлигига оптик зичлиги аниқланди.

Олинган натижалар яшил шамшод ўсимлиги билан ўткир заҳарланишлар содир бўлганда унинг таркибидаги алкалоидларни хлороформ билан экстракция ёрдамида ажратиб олиб, хроматоспектрофотометрия усулида аниқлаш мумкинлигини кўрсатди.

Кампирчопон ўсимлиги алкалоидини УБ-спектрофотометрия усулида таҳлили

УБ-спектрофотометрия усулида таҳлил шароитларини ишлаб чиқиши мақсадида кампирчопон ўсимлигидан ажратиб олинган экстрактнинг қуруқ қолдиги 5 мл этил спиртида эритилиб, спектрофотометрнинг 200-400 нм тўлқин узунликларида оптик зичлиги ўлчанди. Бунда ўсимликдан ажратиб олинган триходесмин алкалоиди 223 нм тўлқин узунлигига максимум нур ютиш кўрсаткичига эга эканлиги маълум бўлди (4.20-расм).



4.20-расм. Кампирчопон ўсимлиги экстрактининг УБ-спектри

Иzlанишларимиз давомида юқорида ишлаб чиқилган услуб ёрдамида қон ва пешоб таркибидан кампирчопон ўсимлиги алкалоидларини аниқланди. Бунинг учун модель объектлар қуйидагича тайёрлаб олинди: 5 мл қон ва 25 мл пешоб намуналарига ўсимлик экстрактидан 10 мл қўшиб, аралаштирилди ва 24 соатга қолдирилди. Кўрсатилган вақт ўтгач, 3.2-бўлимда келтирилган усуlda экстракция олиб борилди.

Олинган натижалар кампирчопон ўсимлиги билан ўткир заҳарланишлар содир бўлганда унинг таркибидаги алкалоидларни хлороформ билан экстракция усулида ажратиб олиб, УБ-спектрофотометрия усулида аниқлаш мумкинлигини кўрсатди.

4.4. ГХ-МС усули алкалоидларни аниқлашнинг замонавий усули

Замонавий таҳлил усулларида кимё-токсикологик таҳлилларни олиб борища кўп ҳолларда стандарт моддаларнинг лабораторияларда мавжуд бўлмаслиги тиҳлилларни ўз вақтида ўтказилишида қийинчилик туғдиради. Кейинги босқичдаги таҳлил усулларини қўллаш мақсадида ўсимликлардан


олинган ажратмалар 4.2 бўлимда кўрсатилган шароитларда ЮҚХ усулида тозаланди ва ҳар бир элюатнинг ГХ-МС усулида таҳлили ўтказилди. Бунда элюация қилиб олинган ажратмалар айнан қайси алкалоидга тегишли эканлиги аниқлаб олинди. Олинган натижалар ЮССХ ва ТДСИС усуллари учун ўсимликлар ажратмаларидан олинган элюатларини ташқи стандарт сифатида қўллаш имконини беради.

Сассиқ алаф ўсимлиги экстракти таҳлили


Сассиқ алафдан олинган экстракт газ-хромато-масс-спектрофотометрия усулида таҳлил қилинди.

Бунинг учун масс-селектив детекторли GC-MS/HP 6890 (Hewlett-Packard, АҚШ) асбобидан фойдаланилди. Асбоб узунлиги 30 м ва ички диаметри 0,25 мм бўлган капилляр колонка (Agilent Technologies, США) билан таъминланган. Таҳлиллар куйидаги шароитларда олиб борилди: инжектор ва детектор ҳарорати - 280°C, колонка термостатининг бошланғич ҳарорати - 120°C дан 310°C гача 10°C/дақиқа тезлиқда қиздириб борилди. Таҳлил учун инжекторга сассиқ алаф экстрактининг спиртли эритмаси 1 мкл ҳажмда киритилди ва хроматографияланди.

Олинган хроматограмма ва масс-спектрларда қатор хроматографик чўққилар ҳамда массани зарядларга нисбат қийматларининг спектрлари ҳосил бўлди. Ушбу хроматографик чўққилар ва масс-спектрларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, 13.95 дақиқа ушланиш вақтида ҳосил бўлган чўққи ва унга мос масс-спектрларнинг 98, 84, 82, 80, 56, 43, 41 m/z масса зарядларига эга бўлган ион бўлаклари кониинга хос эканлигини кўрсатди (4.21,4.22-расмлар).




4.21-расм. Сассиқ алаф ўсимлиги экстрактининг хроматограммаси



4.22-расм. Конин алкалоидининг масс-спектрлари

Қолган хроматографик чўққилар ва мос келган масс-спектрларининг интерпретация қилиш натижасида уларнинг конгидрин ва колхицин моддалари эканлигини аниқланди (4.23-расм). Конин, конгидрин ва колхицинларнинг хроматографик чўққиларининг юзаси ва мос келувчи масс-спектрларнинг интенсивликларининг қийматлари уларнинг ўсимлиқдаги микдорларига мос келишини кўрсатди.




4.23-расм. Конгидрин алкалоидининг масс-спектрлари

Катта қончўп ўсимлиги таҳлили


Изланишларнинг кейинги босқичида катта қончўп ўсимлиги экстракти газ-хромато-масс-спектрометрия усули ёрдамида таҳлиллари амалга оширилди.

Бунинг учун масс-селектив детекторли GC-MS/HP 6890 (Hewlett-Packard, АҚШ) асбобидан фойдаланилди. Асбоб узунлиги 30 м ва ички диаметри 0,25 мм бўлган капилляр колонка (Agilent Technologies, США) билан таъминланган. Таҳлиллар қуидаги шароитларда олиб борилди: инжектор ва детектор ҳарорати - 280°C, колонка термостатининг бошланғич ҳарорати - 120°C дан 310°C гача 10°C/дақиқа тезликда қиздириб борилди. Таҳлил учун инжекторга катта қон чўп ўсимлиги экстрактининг спиртли эритмаси 1 мкл ҳажмда киритилди ва хроматографияланди.

Олинган хроматограмма ва масс-спектрларда қатор хроматографик чўққилар ҳамда массани зарядларга нисбат қийматларининг спектрлари ҳосил бўлди. Ушбу хроматографик чўққилар ва масс-спектрларнинг таҳлили шуни кўрсатди, 19,62 дақиқа ушланиш вақтида ҳосил бўлган чўқки ва унга мос масс-спектрларнинг 57, 104, 149, 150, 162, 176 m/z масса зарядларига эга бўлган ион бўлаклари хелидонинга хос эканлигини кўрсатди (4.24,4.25-расмлар).



4.24-расм. Катта қончўп ўсимлиги экстрактининг хроматограммаси



4.25-расм. Хелидонин алкалоидининг масс-спектрлари

Қолган хроматографик чўққилар ва мос келган масс-спектрларининг интерпретация қилиш натижасида уларнинг сангвинарин ва бошқа моддалари эканлигини кўрсатди. Хелидониннинг хроматографик чўққиларининг юзаси ва мос келувчи масс-спектрларнинг интенсивликларининг қийматлари уларнинг ўсимликдаги миқдорларига мос келишини кўрсатди.

Юқорида келтирилган хроматограмма ва масс-спектрлар катта қончўп ўсимлигидан олинган экстракт таркибидаги алкалоидларни газ-хромато-масс-спектрометрия усулида таҳлил қилиш мумкинлигини кўрсатди. Ўзбекистонда ўсуви катта қончўп ўсимлигининг таркибидаги алкалоидларни экстракция қилиб олинди.

Ажратиб олинган экстрактни ГХ-МС усулида таҳлил шароитлари ишлаб чиқилди.

Олинган натижалар интерпретация қилиниб, асосий чўққи хелидонин алкалоидига хослиги аниқланди.

Яшил шамшод ва кампирчопон ўсимликлари экстрактлари таҳлили

Яшил шамшод ва кампирчопон ўсимликлари экстрактларининг ГХ-МС таҳлиллари X.Сулаймонова номидаги Республика Суд экспертиза Маркази


лабораториясида олиб борилди. Намуналарни «Agilent Technology» GC 6890 газ-хромато-масс-спектрометрида таҳлили ўтказилди. Ушбу хромато-масс-спектрометр 5973N масс-селектив детектор билан таъминланган бўлиб, 30мх0,25ммх0,5мкм ўлчамдаги капилляр колонкага эга. Колонка фенилметилсилоксаннинг диметилсилоксандаги 5% эритмаси шимдирилган қўзғалмас фаза билан тўлдирилган.

Таҳлил шароитлари: инжектор ҳарорати - 280°C, масс-спектр манбаининг ҳарорати - 230 °C, MS квадроуполь - 180 °C, колонка термостатининг ҳароратини дастурлашда бошланғич ҳарорат 80 °C, 2 дақиқа дан сўнг 270 °C гача ҳарорат 10 °C /мин тезлиги кўтарилади, қўзғалувчи фаза - гелий, оқим тезлиги 1 мл/мин, намуна миқдори 5 мкл, намунани юбориш тартиби оқимни бўлмаган ҳолда олиб борилади.


Олинган хроматограммаларнинг таҳлили NIST11.L, W10N11_Full.L, Wiley275.L. маълумотлар базасидаги чўққиларга солиштириш орқали амалга оширилди. Ҳар бир хроматографик чўққи интерпретацияси амалга оширилганда триходесмин ва инканинга хос фрагментлар аниқланди.

Ҳар иккала усулда олинган ажратмалар таркибидаги алкалоидлар хроматограммалар алоҳида-алоҳида олинганда хлороформли ажратма яхши натижаларни кўрсатди (1-усул). Унда ўсимлик таркибидаги ҳар бир моддаларга хос хроматографик чўққилар аниқ ва бир биридан ажralган ҳолда кўринган (4.26, 4.27-расмлар).

Спиртли ажратмада эса (2-усул) ноаниқ чўққилар қўп ҳосил бўлган. Шундан келиб чиққан ҳолда изланишларнинг кейинги босқичида 1-усул ёрдамида ажратма олиш мақсадга мувофиқ деб ҳисобланди.




4.26-расм. Яшил шамшод ўсимлигидан олинган хлороформли экстрактнинг хроматограммаси




4.27-расм. Кампирчопон ўсимлигидан олинган хлороформли экстрактнинг хроматограммаси

Биологик суюқликлар таркибидан ажратиб олинган буссин алкалоиди учун ҳам ушбу шароитда таҳлиллар олиб борилди ва мос равишда натижалар олинди (4.28-4.29-расмлар).



4.28-расм. Қондан ажратиб олинган буссин хроматограммаси


Anode




4.29-расм. Пешобдан ажратиб олинган буксин хроматограммаси

Ушбу шароитда биологик суюқликлардан 3.2-бўлимда келтирилган шароитларда ажратиб олинган триходесмин элюатларининг спектрлари олинди.

Anode



4.30-расм. Қондан ажратиб олинган триходесмин хроматограммаси



4.31-расм. Пешобдан ажратиб олинган триходесмин хроматограммаси

Олиб борилган таҳлиллар натижасида ўсимликлардан ажратиб олинган элюатлардаги моддалар алкалоидларга тегишли экани аниқланди. Кимё-токсикологик текширувларда стандарт моддалар бўлмаган ҳолларда юқоридаги ўсимлик элюатларини ишончли ишчи стандарт намунаси сифатида фойдаланишга тавсия этилди.

4.5. Алкалоидлар таҳлилида ЮССХ усулиниң ўрни

ЮССХ таҳлил усули бир қанча афзалликларга эга усул бўлиб, ҳозирги кунда барча назорат анализик лабораторияларнинг асосий таҳлил усусларидан ҳисобланади. Масалан, усул мураккаб таркибли аралашмалар таркибидаги юқори ҳарорат таъсирида парчаланадиган моддаларни хона ва унга яқин бўлган ҳароратларда аниқлаш имконини беради. ЮССХ усулида таҳлил қилиш тезкор ҳисобланади, чунки мураккаб аралашмаларни бир-биридан ажратиш учун бир неча дақиқа етарли. Бунда бир вақтнинг ўзида аралашма ҳолидаги моддаларни бир-биридан ажратиш, уларнинг чинлигини аниқлаш ва миқдорий таҳлил ўtkазиш мумкин. Услубнинг афзалликларини инобатга олган ҳолда изланишларимиз давомида ЮССХ усулида ўрганилаётган ўсимликларни таҳлил қилиш шароитлари ишлаб чиқилди.

Мингдевона ва белладонна ўсимликлари алкалоидларининг ЮССХ таҳлил усули

Тажрибалар Американинг “Agilent Technologies” корхонасида ишлаб чиқарилган “Agilent 1100 series” русумли юқори самарали суюқлик хроматографида олиб борилди. Асбоб юқори босимда ишлашга мўлжалланган тўрт каналли градиент типидаги насос, 190-600 нм тўлқин узунликларида таҳлил ўтказувчи спектрофотометрик детектор, қўзғалувчи фаза таркибидаги газларни йўқотувчи курилма, 20 мкл ҳажмли ўлчов ускуна – “Rheodyne” инжектори ва хроматографик колонкадан ташкил топган. Асбоб тўлалигича “Chemstation A.09.03” дастури ёрдамида компьютер орқали бошқарилади.

ЮССХда қўзғалувчи фаза таркибини танлашда одатда иккита эритувчилардан фойдаланган ҳолда иш олиб борилади. Бунда биринчи эритма сифатида сув ёки pH кўрсаткичи маълум қийматга келтирилган буфер эритмалар олиниб, иккинчи эритувчи сифатида сув билан аралашадиган органик эритувчи танланади. Кўп ҳолларда органик эритувчи сифатида метанол, ацетонитрил ёки этанол қўлланилади. Қўзғалувчи фаза pH кўрсаткичининг кислотали бўлиши таркибида гидроксил, карбоксил каби кутбли гуруҳлар сакловчи моддаларни хроматографик колонкада узоқ ушланиб қолишининг олдини олиши билан бирга, ҳосил бўлаётган хроматографик чўққи кенглигининг торайишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида мураккаб аралашмалар таркибидаги моддаларни бир-биридан яхшироқ ажратиш имконини беради.


Юқорида келтирилганлардан келиб чиқиб, қўзғалувчи фаза компонентлари сифатида ацетонитрил ва pH кўрсаткичи 3,5 га келтирилган 10 ммоль/л фосфатли буфердан фойдаланилди. Фосфатли буфер эритмаси қуйидагича тайёрланди: 0,680 г калий дигидрофосфат тузи 500 мл ҳажмли колбага солинди ва тозаланган сувда эритилди ҳамда белгисигача тозаланган сув билан етказилди. Эритманинг pH муҳити фосфат кислотанинг 25% эритмаси билан 3,5 га етказилди. Ўсимликларнинг таркибидаги изланаётган алкалоидларнинг хусусиятидан келиб чиқсан ҳолда изократик ёки градиент режимда иш олиб борилди.

Иzlанишлар натижасида мўътадил шароит сифатида қуйидагилар танланди.


- хроматографик шиша колонка заррачалар йириклиги 3,5 мкм бўлган Zorbax Eclipse XDB C-18 сорбент билан тўлдирилган, ўлчами 4,6x75 мм;
- қўзғалувчи фаза: ацетонитрил (А) – KH_2PO_4 10 мМ эритмаси ва 1% изопропанол 50:50 нисбатдаги аралашмаси (Б) ($\text{pH}=3,5$);

- градиент: 0 дақ: А-10%, Б-90%;
- 0-20 дақ: А-60%, Б-40%;
- 25 дақ: А-90%, Б-10%
- күзгалувчи фаза сарфи 0,5 мл/дақ;
- детектор УБ-спектрофотометр;
- детекторлаш түлкүн узунлиги 254 нм.

Таҳлил давомийлиги 15 дақиқа. Ушбу шароитларда атропин ва скополамин стандарт намуналари эритмаларининг таҳлили олиб борилганда атропиннинг ушланиш вақти 4,5 дақиқани, скополаминыни эса 2,5 дақиқани ташкил қилди (4.32-4.33-расмлар).




4.32-расм. Атропин стандарт намунаси эритмасининг хроматограммаси




4.33-расм. Скополамин стандарт намунаси эритмасининг хроматограммаси

Ишлаб чиқилған таҳлил шароитларида қора мингдевона ва оддий белладонна ўсимликларидан ажратиб олинган экстрактлар таҳлил қилинди. Бунда ҳар бир элюат текширилганда тегишли равишда стандарт намуналар эритмаларига үхаш хроматограммалар олинди (4.34- ва 4.35-расмлар).



4.34-расм. Қора мингдевона ва белладонна ўсимликлари экстрактларидан олинган атропин элюатининг хроматограммаси



4.35-расм. Қора мингдевона ва белладонна ўсимликлари экстрактларидан олинган скополамин элюатининг хроматограммаси

Расмда келтирилган хроматограммалардан кўриниб турибдики, тавсия этилаётган шароитларда ўсимликлар таркибидағи алкалоидлар бир-биридан ажратган ҳолда аниқлаш мумкин. Шунингдек балласт моддалар уларни таҳлил қилишга ҳалақит бермайди.


Кимё-токсиологик текширишлар олиб бориш учун асосий ашёвий далил сифатида биологик суюқликлар (қон, пешоб ва ошқозон чайнинди сувлари) ва биологик объектлар (мурда ички аъзолари) олинади. Ўрганилаётган

ўсимликлар билан заҳарланиш ҳолатлари юз берганда беморга тез тиббий ёрдам кўрсатиш учун экспресс таҳлиллар олиб бориш зарур.


Биологик суюқликлар таркибидан заҳарли моддани ажратиб олиш учун модел объектлар тайёрлаб олинди.

Қон моделларини тайёрлаш учун 5 мл қон намуналариға 100 мкг/мл атропин сақлаган эритмадан 1 мл қўшиб, аралаштирилди ва 24 соатга қолдирилди. Шунингдек, скополамин учун ҳам шундай модел эритмалар тайёрланди. Кўрсатилган вақт ўтгач, экстракция олиб борилди. Олинган экстрактлардан органик эритувчилар парлатиб юборилди.

Куруқ қолдиқлар 1 мл этанолда эритилиб, хроматографик усулда тозаланди. ЮҚХ усулда тозалаш натижасида ажратиб олинган элюатлар қоғоз фильтр ёрдамида фильтрланиб, фильтратлар куруқ қолдиқ қолгунча хона ҳароратида қуритилди. Куруқ қолдиқлар 100 мкл юқорида келтирилган мобил фазада эритилиб, ЮОСХ усулида таҳлили олиб борилди (4.36-,4.37-расм).




4.36-расм. Қондан ажратиб олинган атропин хроматограммаси




4.37-расм. Қондан ажратиб олинган скополамин хроматограммаси

Пешоб модельларини тайёрлаш учун 25 мл пешоб намуналариға 100 мкг/мл атропин сақлаган эритмадан 1 мл күшиб, аралаштирилди ва 24 соатга қолдирилди. Шунингдек, скополамин учун ҳам шундай модель эритмалар тайёрланди. Кўрсатилган вақт ўтгач, экстракция олиб борилди. Экстрактлардан эритувчилар тўлиқ учириб юборилди.

Қуруқ қолдиқлар 1 мл этанолда эритилиб, хроматографик тозалаш олиб борилди. ЮҚҲ тозалаш натижасида ажратиб олинган элюатлар қоғоз фильтр ёрдамида фильтрланиб, фильтратлар қуруқ қолдиқ қолгунча хона ҳароратида куритилди. Қуруқ қолдиқлар 100 мкл мобил фазада эритилиб, ЮССХ усулида таҳлили олиб борилди (4.38-,4.39-расм). Кон ва пешоб таркибидаги алкалоидларнинг миқдори аввал ишлаб чиқилган калибрлаш графиги ёрдамида аниқланди ва олинган натижалар статистик қайта ишланди (4.5-,4.6-жадвал).



4.38-расм. Пешобдан ажратиб олинган атропин хроматограммаси



4.39-расм. Пешобдан ажратиб олинган скополамин хроматограммаси

4.5-жадвал

Атропинни қон ва пешобдан экстракциялаб олиш натижалари

Аниқланган миқдор		Олинган натижаларни статистик қайта ишлаш
МКГ	%	
ҚОН		
60,3	60,3	$f=4; T(95\%,4)=2,78$
59,4	59,4	$X_{\bar{y}p}=59,50; S^2=0,4250;$
58,7	58,7	$S=0,6519; S_x=0,2915;$
60,0	60,0	$\Delta X=0,0248; \Delta X_{\bar{y}p}=0,011$
59,1	59,1	$E=3,045\%; \varepsilon=1,36\%$
ПЕШОБ		
74,8	74,8	$f=4; T(95\%,4)=2,78$
75,7	75,7	$X_{\bar{y}p}=75,06; S^2=1,4930;$
76,3	76,3	$S=1,2218; S_x=1,5464;$
74,1	74,1	$\Delta X=3,3968; \Delta X_{\bar{y}p}=1,5191$
75,4	75,4	$E=4,525\%; \varepsilon=2,023\%$

4.6-жадвал

Скополаминни қон ва пешобдан экстракциялаб олиш натижалари

Аниқланган миқдор		Олинган натижаларни статистик қайта ишлаш
МКГ	%	
ҚОН		
50,3	50,3	$f=4; T(95\%,4)=2,78$
49,4	49,4	$X_{\bar{y}p}=49,56; S^2=2,025;$
48,4	48,4	$S=0,5530; S_x=0,3325;$
50,2	50,2	$\Delta X=1,6515; \Delta X_{\bar{y}p}=0,7386$
49,6	49,6	$E=4,17\%; \varepsilon=1,86\%$
ПЕШОБ		
73,8	73,8	$f=4; T(95\%,4)=2,78$
74,7	74,7	$X_{\bar{y}p}=72,86; S^2=0,4230;$
73,3	73,3	$S=0,6504; S_x=0,2908;$
72,1	72,1	$\Delta X=1,6515; \Delta X_{\bar{y}p}=0,7386$
72,4	72,4	$E=2,48\%; \varepsilon=1,11\%$

Жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, ушбу таҳлил шароитларида қон таркибидаги атропинни 59,50%, скополаминни эса 49,56% миқдорда ажратиб олиб, уни 1,02% ва 1,86% нисбий хатолик билан аниқлаш мумкин. Келтирилган шароитларда пешоб таркибидан атропинни 75,06%, скополаминни эса 72,86% миқдорда ажратиб олиб, уни 0,97% ва 1,11% нисбий хатолик билан аниқлаш мумкин.

Ушбу олинган натижалар тавсия этилаётган услубнинг қора мингдевона ва оддий белладонна алкалоидлари билан ўткир заҳарланиш ҳолатлари юз берган вақтда уни биологик суюқликлар таркибидан ажратиб олишга қўллаш мумкинлигини кўрсатди.

Үрганилаётган алкалоидларни биологик ашё намуналаридан ажратиб олиш ва таҳлилга тайёрлаш учун ҳайвон ички аъзоларидан олинган намуналарни (майдаланган жигар) 100 г тортиб олиб, конуссимон колбаларга солинди. Уларга 100 мкг/мл алкалоид сақлаган спиртли эритмадан 1 млдан солиниб, яхшилаб аралаштирилди ва спирти учиб кетгунча хона шароратида қолдирилди. Сўнгра идишларнинг оғзи ёпилиб, 24 соатга хона ҳароратида қолдирилди. Биологик объектлардан алкалоидларни ажратиб олиш учун келтирилган тартибда тажриба олиб борилди. Куруқ қолдиқлар 1 мл этанолда эритилиб, хроматографик тозалаш олиб борилди. ЮҚҲ тозалаш натижасида ажратиб олинган элюатлар фильтрланиб, куруқ қолдиқлар қолгунча хона ҳароратида қуритилди. Куруқ қолдиқларни 100 мкл мобил фазада эритилиб, ЮССХ усулида таҳлили олиб борилди.

Биологик объектлар таркибидағи үрганилаётган алкалоидлар миқдори калибрлаш графиги асосида аниқланди. Олинган натижалар таҳлил қилиниб, статистик қайта ишлаб чиқилди (4.7-жадвал).

4.7-жадвал

Атропинни ва скополаминни биологик объект таркибида аниқлаш натижалари

Аниқланган миқдор		Олинган натижаларни статистик қайта ишлаш
МКГ	%	
АТРОПИН		
49,5	49,5	f=4; T (95%, 4)=2,78; X _ӯ _р =50,54; S ² =1,2527;
49,25	49,25	S=1,1193; S _x =0,5005;
51,51	51,51	ΔX=3,1115; X _ӯ _р =1,3915;
50,75	50,75	E=6,15%; ε=2,75%
51,68	51,68	
СКОПОЛАМИН		
47,50	47,50	f=4; T (95%, 4)=2,78;
47,25	47,25	X _ӯ _р =47,14; S ² =0,2455;
46,51	46,51	S=0,4955; S _x =0,2216;
46,75	46,75	ΔX=3,1115; X _ӯ _р =1,3915;
47,68	47,68	E=2,92%; ε=1,31%


Жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, ушбу таҳлил шароитларида биологик ашё таркибидағи атропинни 50,54%, скополаминни эса 47,14% миқдорда ажратиб олиб, уни 2,75% ва 1,31% нисбий хатолик билан аниқлаш мумкин.

Катта қончўп ўсимлиги алкалоидларининг ЮССХ таҳлил усули


Катта қончўп ўсимлиги алкалоидлари таҳлили учун ЮССХ усулида таҳлилнинг мўътадил шароити сифатида қуйидагилар танланди.

- хроматографик шиша колонка заррачалар йириклиги 3,5 мкм бўлган Zorbax Eclipse XDB C – 18 сорбент билан тўлдирилган, ўлчами 3x150 мм;
- қўзғалувчи фаза: ацетонитрил– KH_2PO_4 ($\text{pH}=7,4$) 10 mM эритмаси 50:50 нисбатдаги аралашмаси; изократик элюент;
- қўзғалувчи фаза сарфи 0,4 мл/дақ;
- ҳарорат 30°C
- детектор УБ-спектрофотометр;
- детекторлаш тўлқин узунлиги 280 нм.

Таҳлил давомийлиги 50 дақиқа. Ушбу шароитларда ўсимлиқдан олинган ажратма таҳлили олиб борилганда хелидонин учун ушланиш вақти 43,4 сангвинарин учун эса 27,5 ни ташкил қилди.




4.40-расм. Катта қончўп ўсимлигидан олинган ажратма хроматограммаси (сангвинарин элюати)




4.41-расм. Катта қончўп ўсимлигидан олинган ажратма хроматограммаси (хелидонин элюати)


Таҳлил шароитларини биосуюқликлар таркибидан ажратиб олинган катта қончўп алкалоидларини аниқлашда қўллаш мақсадида қон ва пешобдан модел намуналар тайёрланиб, юқорида келтирилган шароитда экстракция қилинди. Экстрактлар ЮҚХ усулида тозаланди. Олинган элюатлар алоҳида алоҳида 1 г сувсизлантирилган натрий сульфат тузи сақлаган қофоз фильтрлар ёрдамида фильтрланди. Фильтратлар қуруқ қолдиқ қолгунча хона ҳароратида куритилди. Қуруқ қолдиқлар 100 мкл юқорида келтирилган мобил фазада эритилиб, ЮССХ усулида таҳлили олиб борилди. Шунингдек ушбу жараён биологик объект учун ҳам қўлланилди. Натижалар қуйидаги 4.42-4.45-расмлар ва 4.8-4.10-жадвалларда келтирилган.




4.42-расм. Қондан ажратиб олинган сангвинарин хроматограммаси



4.43-расм. Қондан ажратиб олинган хелидонин хроматограммаси



4.44-расм. Пешобдан ажратиб олинган сангвинарин хроматограммаси



4.45-расм. Пешобдан ажратиб олинган хелидонин хроматограммаси

4.8-жадвал
Хелидонинни қон ва пешобдан экстракциялаб олиш натижалари

Аниқланган миқдор		Олинган натижаларни статистик қайта ишилаш
МКГ	%	
ҚОН		
43,9	43,9	
46,8	46,8	$f=4, T(95\%,4)=2,78, X_{cp}=45,12$
46,2	46,2	$S^2=2,0250 S=1,423, S_x =0,6364,$
45,1	45,1	$\Delta X=3,9560, \Delta X_{cp}=1,7692 E=8,77\%,$
43,5	43,5	$\varepsilon= 3,92\%$
ПЕШОБ		
64,3	64,3	$f=4, T(95\%,4)=2,78, X_{cp}=67,23,$
66,9	66,9	$S^2=4,600 S=2,1448, S_x =0,9592,$
68,2	68,2	$\Delta X=5,9624, \Delta X_{cp}=2,6665 E=8,87\%,$
70,1	70,1	$\varepsilon= 3,97\%$
66,5	66,5	

4.9-жадвал

Сангвинаринни қон ва пешобдан экстракциялаб олиш натижалари

Аниқланган миқдор		Олинган натижаларни статистик қайта ишилаш
МКГ	%	
ҚОН		
58,05	58,05	$f=4; T(95\%,4)=2,78$
58,89	58,89	$X_{\bar{y}p}=58,78; S^2=2,1006$
59,85	59,85	$S=1,4493; S_x=0,6481;$
56,75	56,75	$\Delta X=0,3571; \Delta X_{\bar{y}p}=0,1483$
60,39	60,39	$E=6,85\%; \varepsilon=3,06\%$
ПЕШОБ		
71,08	71,08	$f=4; T(95\%,4)=2,78$
73,94	73,94	$X_{\bar{y}p}=72,03; S^2=5,0521;$
74,80	74,80	$S=2,2476; S_x=1,0051;$
70,90	70,90	$\Delta X=0,2723; \Delta X_{\bar{y}p}=0,1604$
69,44	69,44	$E=8,67\%; \varepsilon=3,88\%$

Жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, ушбу таҳлил шароитларида қон таркибидаги хелидонинни 45,12%, сангвинаринни эса 58,78% миқдорда ажратиб олиб, уни 3,92% ва 3,06% нисбий хатолик билан аниқлаш мумкин. Келтирилган шароитларда пешоб таркибидан хелидонинни 67,23%, сангвинаринни эса 72,03% миқдорда ажратиб олиб, уни 3,97% ва 3,88% нисбий хатолик билан аниқлаш мумкин.

4.10-жадвал

Хелидонин ва сангвинаринни биологик объектдан экстракциялаб олиш натижалари

Аниқланган миқдор		Олинган натижаларни статистик қайта ишилаш
МКГ	%	
Хелидонин		
49,12	49,12	$f=4; T(95\%,4)=2,78$
48,94	48,94	$X_{\bar{y}p}=47,92; S^2=2,0152;$
48,81	48,81	$S=1,4195; S_x=0,6348;$
46,29	46,29	$\Delta X=0,0600; \Delta X_{\bar{y}p}=0,0636$
46,46	46,46	$E=8,23\%; \varepsilon=3,68\%$
Сангвинарин		
46,04	46,04	$f=4; T(95\%,4)=2,78$
46,88	46,88	$X_{\bar{y}p}=48,17; S^2=4,0546;$
49,84	49,84	$S=2,0136; S_x=0,9005;$
49,74	49,74	$\Delta X=0,1787; \Delta X_{\bar{y}p}=0,1914$
47,38	47,38	$E=11,62\%; \varepsilon=5,19\%$

Жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, ушбу таҳлил шароитларида биологик объект таркибидаги хелидонинни 47,92% миқдорда,

сангвинаринни эса 48,17% миқдорда ажратиб олиб, уни 3,68% ва 5,19% нисбий хатолик билан аниқлаш мумкин.

Сассиқ алаф ўсимлиги алкалоидларининг ЮССХ таҳлил усули

Сассиқ алаф ўсимлигининг заҳарланишга сабабчи бўладиган асосий алкалоиди бўлган конииинни ЮССХ усулида таҳлил қилиш учун мўътадил шароит сифатида қуидагилар танланди:

-хроматографик шиша колонка заррачалар йириклиги 3,5 мкм бўлган Zorbax Eclipse XDB C-18 сорбент билан тўлдирилган, ўлчами 4,6x75 мм;

- қўзғалувчи фаза: ацетонитрил (А) – KH_2PO_4 10 мМ эритмаси ва изопропанол 1% эритмасининг 50:50 нисбатдаги аралашмаси (Б) ($\text{pH}=3,5$);

- градиент: 0 дақ: А-10%, Б-90%;

0-20 дақ: А-60%, Б-40%;

25 дақ: А-90%, Б-10%


- қўзғалувчи фаза сарфи 0,5 мл/дақ;

- детектор УБ-спектрофотометр;

- детекторлаш тўлқин узунлиги 266 нм.

Таҳлил давомийлиги 25 дақиқа.

Ушбу шароитларда ўсимликдан ажратиб олинган элюат таҳлили олиб борилганда конииин учун ушланиш вақти 10,1 дақиқани ташкил қилди (4.46-расм).




4.46-расм. Сассиқ алаф ўсимлигидан олинган экстрактнинг хроматограммаси

Расмда келтирилган хроматограммадан кўриниб турибдики, тавсия этилаётган шароитларда ўсимлик таркибидаги ажратиб олинган алкалоидни

элюация қилиб олган ҳолда аниқлаш мүмкін. Шунингдек балласт моддалар уларни хроматографик ажралишига ҳалақит бермайди.

Иzlанишларимиз давомида юқорида ишлаб чиқилған усул ёрдамида қон ва пешоб таркибидан ажратиб олинган сассик алаф үсимлиги алкалоидларини аникланди. Бунинг учун 5 та модель объектлар тайёрлаб олинди. Ҳар 5 мл қонға 100 мкг/мл кониин сақлаган эритмадан 1 мл қўшиб, аралаштирилди ва 24 соатга қолдирилди. Кўрсатилган вақт ўтгач, юқорида келтирилган усулда экстракция олиб борилди.


Экстрактларни ЮҚХ усулида тозалаш натижасида ажратиб олинган элюатлар 1 г сувсизлантирилган натрий сульфат тузи сақлаган қоғоз фильтрлар ёрдамида фильтранди. Фильтратлар қуруқ қолдиқ қолгунча хона ҳароратида қуритилди. Қуруқ қолдиқлар 100 мкл юқорида келтирилган мобил фазада эритилиб, ЮССХ усулида таҳлили олиб борилди (4.47-расм).



4.47-расм. Қондан ажратиб олинган кониин хроматограммаси

Иzlанишларимиз давомида модель намуналар тайёрлаш учун ҳар 25 мл пешобга 100 мкг/мл кониин сақлаган эритмадан 1 мл қўшиб, аралаштирилди ва 24 соатга қолдирилди. Кўрсатилган вақт ўтгач юқорида келтирилган усулда экстракция олиб борилди.

Экстрактларни ЮҚХ тозалаш натижасида ажратиб олинган элюатлар 1 г сувсизлантирилган натрий сульфат тузи сақлаган қоғоз фильтрлар ёрдамида фильтранди. Фильтратлар қуруқ қолдиқ қолгунча хона ҳароратида қуритилди. Қуруқ қолдиқлар 100 мкл мобил фазада эритилиб, ЮССХ усулида таҳлили олиб борилди (4.48-расм).



4.48-расм. Пешобдан ажратиб олинган конинн хроматограммаси

4.11-жадвал

Конинни қон, пешоб ва биологик объектдан экстракциялаб олиш натижалари

Аниқланган мөкдор		Олинган натижаларни статистик кайта ишлаш
МКГ	%	
ҚОН		
56,12	56,12	$f=4; T(95\%,4)=2,78$
56,25	56,25	$X_{\bar{y}p}=55,12; S^2=1,7942;$
54,74	54,74	$S=1,3395; S_x=0,5990;$
55,54	55,54	$\Delta X=0,5382; \Delta X_{\bar{y}p}=0,0397$
52,98	52,98	$E=6,75\%; \varepsilon=3,02\%$
ПЕШОБ		
77,24	77,24	$f=4; T(95\%,4)=2,78$
76,35	76,35	$X_{\bar{y}p}=76,31; S^2=0,3103;$
75,97	75,97	$S=0,5570; S_x=0,2491;$
75,83	75,83	$\Delta X=0,0992; \Delta X_{\bar{y}p}=0,6312$
76,14	76,14	$E=2,03\%; \varepsilon=0,91\%$
ЖИГАР		
45,23	45,23	$f=4; T(95\%,4)=2,78$
45,36	45,36	$X_{\bar{y}p}=43,97; S^2=1,5226;$
42,89	42,89	$S=1,2339; S_x=0,5518;$
42,91	42,91	$\Delta X=0,2145; \Delta X_{\bar{y}p}=0,7246$
43,44	43,44	$E=7,80\%; \varepsilon=3,49\%$

Жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, ушбу тахлил шароитларида қон таркибидаги конинни 55,12%, пешоб таркибидан 76,31%, биологик объект таркибидан 43,97% мөкдорда ажратиб олиб, уни мос равища 3,02%, 0,91 ва 3,49% нисбий хатолик билан аниқлаш мумкин.


Яшил шамшод ўсимлиги алкалоидларининг ЮССХ таҳлил усули

Буксин алкалоиди таҳлили учун мўътадил шароит сифатида куйидагилар танланди:

- хроматографик шиша колонка заррачалар йириклиги 5 мкм бўлган Zorbax Eclipse XDB C-18 сорбент билан тўлдирилган, ўлчами 4,6x250 мм;
- қўзғалувчи фаза: метанол– KH_2PO_4 10 мМ эритмасининг 50:50 нисбатдаги аралашмаси ($\text{pH}=3,5$);
- қўзғалувчи фаза сарфи 1,0 мл/дақ;
- детектор УБ-спектрофотометр;
- детекторлаш тўлқин узунлиги 268 нм.


Таҳлил давомийлиги 40 дақиқа.

Ушбу шароитларда яшил шамшод ўсимлигидан ажратиб олинган ва хроматографик тозаланган ажратма таҳлили олиб борилганда буксин учун ушланиш вақти 28,5 дақиқани ташкил қилди (4.49-расм).




4.49-расм. Яшил шамшод ўсимлигидан олинган экстракт хроматограммаси

Усулнинг биообъектларга тадбиқини ўрганиш мақсадида биологик суюқликлар (қон ва пешоб)дан модел объектлар тайёрлаб, 3.2-бўлимда келтирилган тартибда алкалоид ажратиб олинди ва 4.2-бўлимда келтирилган услубда тегишли равишда тозалаб олинди. Биологик объект сифатида жигардан фойдаланилди. Ундан алкалоидни 3.3-бўлимда келтирилган тартибда ажратиб олинди ва ЮҚҲ усулида тозаланди. Биосуюқликлар ва биологик объектдан ажратиб олинган ажратмалар ушбу шароитда таҳлил қилинганда буксин алкалоидининг ушланиш вақти 28,5 ни ташкил этди. Натижалар 4.50-4.51-расм ва 4.12-жадвалда келтирилган.



4.50-расм. Кондан ажратиб олинган буссин хроматограммаси



4.51-расм. Пешобдан ажратиб олинган буссин хроматограммаси

4.12-жадвал

Буссинни қон, пешоб ва биологик объектдан экстракциялаб олиш натижалари

Аниқланган миқдор		Олинган натижаларни статистик қайта ишлаш
МКГ	%	
ҚОН		
58,28	58,28	$f=4; T(95\%,4)=2,78$
58,71	58,71	$X_{\bar{y}p}=58,57; S^2=1,1583;$
59,32	59,32	$S=1,0762; S_x=0,4813;$
59,64	59,64	$\Delta X=0,5054; \Delta X_{\bar{y}p}=0,1163$
56,89	56,89	$E=5,11\%; \varepsilon=2,28\%$
ПЕШОБ		
78,34	78,34	$f=4; T(95\%,4)=2,78$
77,45	77,45	$X_{\bar{y}p}=77,39; S^2=0,3284;$
76,97	76,97	$S=0,5730; S_x=0,2562;$
76,93	76,93	$\Delta X=0,0283; \Delta X_{\bar{y}p}=0,6312$
77,25	77,25	$E=2,06\%; \varepsilon=0,92\%$

ЖИГАР		
44,32	44,32	$f=4; T(95\%,4)=2,78$
44,63	44,63	$X_{\bar{y}p}=43,07; S^2=1,7143;$
41,98	41,98	$S=1,3093; S_x=0,5855;$
41,89	41,89	$\Delta X=0,2043; \Delta X_{\bar{y}p}=0,6496$
42,54	42,54	$E=8,45\%; \varepsilon=3,78\%$

Ушбу таҳлил шароитларида қон таркибидаги бүксинни 58,57% микдорда ажратиб олиб уни 2,28% нисбий хатолик билан аниқлаш мумкин. Келтирилган шароитларда пешоб таркибидан бүксинни 77,39% микдорда ажратиб олиб уни 0,92% нисбий хатолик билан аниқлаш мумкин. Биологик ашё таркибидаги бүксинни 43,07% микдорда ажратиб олиб, уни 3,78% нисбий хатолик билан аниқлаш мумкин.

Кампирчопон ўсимлиги алкалоидларининг ЮССХ таҳлил усули

Триходесмин алкалоиди таҳлили учун мўътадил шароит сифатида қўйидагилар танланди:


-хроматографик шиша колонка заррачалар йириклиги 5 мкм бўлган Zorbax Eclipse XDB C-18 сорбент билан тўлдирилган, ўлчами 4,6x150 мм;

-қўзғалувчи фаза: ацетонитрил— сув 70:30 нисбатдаги аралашмаси ($pH=2,8$); элюент изократик тизимда юборилади.

- қўзғалувчи фаза сарфи 0,45 мл/дақ;
- детектор УБ-спектрофотометр;
- детекторлаш тўлқин узунлиги 223 нм.


Таҳлил давомийлиги 30 дақиқа.

Ушбу шароитларда кампирчопон ўсимлигидан ажратиб олинган ва хроматографик тозаланган ажратма таҳлили олиб борилганда триходесмин алкалоиди учун ушланиш вақти 17,5 дақиқани ташкил қилди (4.52-расм).




4.52-расм. Кампирчопон ўсимлигидан олинган экстрактнинг хроматограммаси

Қон ва пешоб таркибидан 3.2-бўлимда келтирилган тартибда алкалоид ажратиб олинди ва 4.2-бўлимда келтирилган ЮҚХ усулини қўллаб тозалаб олинди. Биологик объект сифатида жигар олинди ва улардан модел объектлар тайёрланди. Модел намуналардан алкалоидни 3.3-бўлимда келтирилган тартибда ажратиб олинди ҳамда ЮҚХ усулида тозаланди. Биосуюқликлар ва биологик объектдан ажратиб олинган ажратмалар ушбу шароитда таҳлил қилинганда триходесмин алкалоидининг ушланиш вақти 17,5 ни ташкил этди (4.53-4.54-расм). Биологик объект ва суюқликлардан ажратиб олинган триходесминнинг миқдорий таҳлил ва уларни статистик қайта ишлаш натижалари 4.13-жадвалда келтирилган.



4.53-расм. Қондан ажратиб олинган триходесмин хроматограммаси



4.54-расм. Пешобдан ажратиб олинган триходесмин хроматограммаси

4.13-жадвал

Триходесминни қон, пешоб ва биологик объектдан экстракциялаб олиш натижалари

Аниқланган миқдор		Олинган натижаларни статистик қайта ишлаш
МКГ	%	
ҚОН		
55,62	55,62	$f=4; T(95\%,4)=2,78$
54,14	54,14	$X_{\bar{y}p}=55,38; S^2=0,5384;$
55,78	55,78	$S=0,7337; S_x=0,3281;$
55,34	55,34	$\Delta X=0,6417; \Delta X_{\bar{y}p}=0,1229$
56,01	56,01	$E=3,68\%; \varepsilon=1,65\%$
ПЕШОБ		
75,21	75,21	$f=4; T(95\%,4)=2,78$
74,92	74,92	$X_{\bar{y}p}=74,55; S^2=0,4393;$
73,56	73,56	$S=0,6628; S_x=0,2964;$
74,22	74,22	$\Delta X=0,400; \Delta X_{\bar{y}p}=0,1757$
74,86	74,86	$E=2,47\%; \varepsilon=1,11\%$
ЖИГАР		
43,27	43,27	$f=4; T(95\%,4)=2,78$
42,42	42,42	$X_{\bar{y}p}=43,61; S^2=1,0563;$
43,78	43,78	$S=1,0278; S_x=0,4596;$
43,34	43,34	$\Delta X=0,3035; \Delta X_{\bar{y}p}=0,5142$
45,22	45,22	$E=6,55\%; \varepsilon=2,93\%$

Юқорида келтирилган жадвалдаги маълумотларга асосланиб таъкидлаш жоизки, ушбу таҳлил шароитларида қон таркибидаги буксинни 55,38% миқдорда ажратиб олиб уни 1,65% нисбий хатолик билан аниқлаш мумкин. Пешоб таркибидан буксинни 74,55% миқдорда ажратиб олиб, уни 1,11% нисбий хатолик билан аниқлаш мумкин. Биологик ашё таркибидаги буксинни 43,61% миқдорда ажратиб олиб, уни 2,93% нисбий хатолик билан аниқлаш мумкинлиги кўрсатилди.

4.6. ТДСИС усулида алкалоидларни таҳлил қилиш

Термодесорбцион сирт ионлашув спектроскопия (ТДСИС) усулида таҳлилни амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг У.А.Орифов номидаги Электроника институти томонидан гиёхванд ва бошқа гангитувчи таъсирга эга бўлган доривор моддаларни тезкор аниқлаш учун тавсия этилган сирт ионлашув индикатори ПИИ-Н-С “Искович-1” дан фойдаланилди. Усулнинг моҳияти модда молекулаларини маълум ҳароратда дастурлаштирилган йўсингда буғлатиш ва уларни сирт ионлашув детекторида термодесорбцион спектрлар кўринишида қайд

қилишдан иборатdir. Сирт ионлашув детекторининг ишлаш тизими қайд қилиш асосини ташкил қилади. Детекторнинг аноди қиздирилганда эмиттер бўлиб, катоди эса мусбат ионлар коллекторидир. Таҳлил қилинаётган аралашманинг эритмаси диод орқали ўтказилганда, эмиттер сиртига келиб тушаётган молекулалар ионлар кўринишида десорбцияланади. Десорбцияланган ионлар эса электр майдони ёрдамида коллекторга ёзib олиш учун йўналтирилади [34].

Ушбу усулнинг афзаллиги қуидагилардан иборат:


Юқори сезгирикка эга бўлгани сабаб бу асбоб ёрдамида биологик объектлар таркибидаги жуда ҳам кам микдорда бўлган заҳарли моддаларни аниқлаш имконини беради.

Ўсимликлар таркибидан ажратиб олинган алкалоидларнинг термодесорбцион сирт ионлашув спектроскопик таҳлили қуидаги шароитда олиб борилди:

- эмиттер – иридий қоришмали оксидланган молибден,
- эмиттер кучланиши – 405 В,
- эмиттер ҳарорати – 100-300°C,
- буғлатиш ҳарорати – 20- 505°C,
- ҳаво оқими – 50 л/соат (компрессор кучланиши 12 В)
- таҳлил учун олинган текширилувчи намуна ҳажми - 1,0 мкл;
- таҳлил давомийлиги -3 дақика.
- спектрларни ёзib олиш бевосита компьютер дастури ёрдамида амалга оширилди.

Минглевона ва белладонна ўсимликлари таҳлили

Ўсимликлардан 3.1- бўлимда келтирилган тартибда ажратма олинди ва 4.2- бўлимда келтирилган услубда тозалаб олинди. Олинган элюатларни хона ҳароратида қуруқ қолдиқ қолгунча қуритилди. Қуруқ қолдиқ 5 мл этил спиртида эритилди. Ундан микрошиприц ёрдамида 1 мкл микдорда ПИИ-Н-С “Искович-1” аппаратининг буғлатгич қисмидаги цилиндрик чукурчага солинди ва алкалоидларнинг термодесорбцион сирт ионлашув спектрлари олинди. Бунда $\sim 200 \pm 15^\circ\text{C}$ атропин ва $\sim 250 \pm 10^\circ\text{C}$ скополаминга хос чизиқли чўққилар пайдо бўлиши кузатилди (4.55-расм).



4.55-расм. Атропин(1) ва скополаминнинг(2) ТДСИ спектрлари

Моддаларнинг микдорий таҳлилини ўтказиш мақсадида концентрацияси ошиб борувчи тартибда алкалоидларнинг эритмалари тайёрланди. Ҳар бир концентрациядаги эритмаларнинг ТДСИ спектрлари олинди (4.14-4.15-жадваллар).

4.14-жадвал

ТДСИ ток кучининг эритма таркибидаги атропиннинг микдорига боғлиқлиги


№	Атропин микдори, нг	Ток кучи I, А
1.	10	401
2.	15	573
3.	20	903
4.	25	1038
5.	30	1549

4.15-жадвал

ТДСИ ток кучининг эритма таркибидаги скополаминнинг микдорига боғлиқлиги

№	Скополамин микдори, нг	Ток кучи I, А
1.	20	352
2.	30	703
3.	40	1029
4.	45	1337
5.	50	1582

14- ва 15-жадвалларда келтирилган натижалар асосида атропин ва скополамин учун ТДСИ спектрлари ток кучининг уларнинг эритмадаги концентрациясига боғлиқлик графиги – калибрлаш чизмаси тузилди (4.56-расм).



4.56-расм. Атропин (1) ва скополаминнинг (2) микдорий таҳлили учун калибрлаш чизмаси

Расмда келтирилган маълумотларга кўра атропин учун аниқлашлар диапазони 1-25 нг, скополамин учун 1-50 нг ташкил қилди. Ишлаб чиқилган усулни биологик суюқликлар таркибидаги алкалоидларни аниқлаш учун қўллаш мақсадида 3.2-бўлимда келтирилган тартибда қон ва пешобдан ажратиб олинган алкалоидлар 4.2-бўлимда келтирилган ЮҚҲ таҳлил шароитларда тозаланди. Элюатлар ТДСИС усулида таҳлил қилинди. Натижалар ва уларнинг статистик қайта ишлаш маълумотлари 4.16- ва 4.17-жадвалларда келтирилган.

4.16-жадвал

Биосуюқликлардан ажратиб олинган атропинни микдорий таҳлил натижалари

Атропин микдори		Олинган натижаларни статистик қайта ишлаш
нг	%	
қон		
29,03	58,06	$f=4$; $T (95\%, 4)=2,78$;
29,45	58,90	$X_{\bar{y}p}=61,99$; $S^2=6,3032$;
29,93	59,86	$S=2,513$; $S_x=1,112$;
31,38	62,76	$\Delta X=6,979$; $\Delta X_{\bar{y}p}=1,959$
35,20	70,40	$E=12,88\%$; $\varepsilon=5,76\%$
пешоб		
40,05	80,10	$f=4$; $T (95\%, 4)=2,78$;
40,48	80,96	$X_{\bar{y}p}=81,45$; $S^2=4,8070$;
42,41	84,82	$S=2,1924$; $S_x=0,9851$;
40,96	81,92	$\Delta X=6,0951$; $\Delta X_{\bar{y}p}=2,7258$
35,23	79,46	$E=7,48\%$; $\varepsilon=3,34\%$

4.17-жадвал


Биосуюқликлардан ажратиб олинган скополаминни миқдорий таҳлил натижалари

Скополамин миқдори		Олинган натижаларни статистик қайта ишлаш
нг	%	
қон		
25,12	50,24	$f=4$; $T(95\%, 4)=2,78$;
24,41	48,82	$X_{\bar{y}p}=50,34$; $S^2=2,5076$;
24,39	48,78	$S=1,5835$; $S_x=0,7081$;
25,83	51,66	$\Delta X=0,4127$; $\Delta X_{\bar{y}p}=0,4127$
26,11	52,22	$E=8,74\%$; $\varepsilon=3,91\%$
пешоб		
35,19	70,38	$f=4$; $T(95\%, 4)=2,78$;
35,98	71,96	$X_{\bar{y}p}=70,04$; $S^2=1,5884$;
32,14	64,28	$S=1,2603$; $S_x=0,5636$;
34,96	69,92	$\Delta X=0,1927$; $\Delta X_{\bar{y}p}=0,4759$
34,32	68,64	$E=5,00\%$; $\varepsilon=2,24\%$

Жадвалда келтирилган маълумотларга асосланиб таъкидлаш жоизки, таҳлиллар натижасида қон таркибидан 61,99% атропин, 50,34% миқдорда скополамин, пешоб таркибидан 81,45% атропин, 70,04% скополамин ажратиб олинди.

Катта қончўп ўсимлиги алкалоидлари таҳлили

Таҳлил аввалида хелидонин ва сангвинарин алкалоидларининг стандарт намуналари асосида турли концентрациялардаги эритмалари тайёрлаб олинди ва термодесорбцион сирт ионлашув спектрлари олинди. Бунда 189-200°C хелидонин ва 193-208°C сангвинаринга хос чизиқли чўққилар пайдо бўлиши кузатилди (4.57-расм).



4.57-расм. Катта қончўпдан ажратиб олинган хелидонин (а) ва сангвинарин (б) спектрлари

Миқдорий таҳлил ўтказиш учун ажратиб олинган алкалоидларнинг ўсиб борувчи концентрациядаги (10,15,25,50,100 нг) эритмалари тайёрланди ва ҳар бирининг спектрлари олинди. Алкалоидларнинг термодесорбцион сирт ионлашув спектрлари ва спектрларга мос келувчи ток кучининг кўрсаткичлари 4.18- ва 4.19-жадвалларда келтирилган.

4.18-жадвал

ТДСИ ток кучининг эритма таркибидаги хелидониннинг миқдорига боғлиқлиги

№	Хелидонин миқдори,нг	Ток кучи I, А
1.	10	400
2.	15	575
3.	25	900
4.	50	1049
5.	100	2500

4.19-жадвал

ТДСИ ток кучининг эритма таркибидаги сангвинариннинг миқдорига боғлиқлиги

№	Сангвинарин миқдори,нг	Ток кучи I, А
1.	10	365
2.	20	603
3.	30	1029
4.	50	1320
5.	100	1529


Олинган натижалар асосида хелидонин ва сангвинарин учун ТДСИ спектрлари ток кучининг уларнинг эритмадаги концентрациясига боғлиқлик графиги – калибрлаш чизмаси тузилди (4.58-расм).

Расмда келтирилган маълумотларга кўра хелидонин ва сангвинарин учун аниқлашларнинг чизиқли диапазони 10-100 нг ташкил қиласди.

Иzlанишларнинг кейинги босқичида ишлаб чиқилган таҳлил услубини ўсимлик ва биологик суюқликлардан (қон, пешоб) ажратиб олинган хелидонин ва сангвинариннинг таҳлилини олиб бориш учун тадбиқ этилди ва ижобий натижалар олинди. Қон ва пешоб таркибидан алкалоидлар 3.2-бўлимда келтирилган тартибда ажратиб олинди ва 4.2-бўлимда келтирилган тартибда тозалаб, элюатлар олинди. Ажратиб олинган алкалоидларнинг

Сассиқ алаф ўсимлиги алкалоиди таҳлили

Ўсимликдан алкалоидларни ажратиб олишнинг З-усули бўйича сассиқ алафдан ажратиб олинган ва хроматографик тозаланган конин алкалоидининг термодесорбцион сирт ионлашув спектрлари олинди. Алкалоиднинг термодесорбцион сирт ионлашув спектри ва мос келувчи ток кучининг кўрсаткичлари 4.60-расм ва 4.21-жадвалда келтирилган. Бунда 130-140°C конининг хос чизиқли чўққилар пайдо бўлиши кузатилди.



4.59-расм. Ўсимликдан ажратиб олинган конин спектри

Алкалоидларни миқдорий таҳлил учун калибрлаш графигини тузиш мақсадида 20,40,60,80,100 нг конин сақлаган эритмалар тайёрланиб, ТДСИ спектрлар олинди (4.21-жадвал).

4.21-жадвал

ТДСИ ток кучининг эритма таркибидаги кониннинг миқдорига боғлиқлиги


№	Конин миқдори, нг	Ток кучи I, А
1.	20	212
2.	40	400
3.	60	550
4.	80	772
5.	100	926

4.21-жадвалда келтирилган натижалар асосида конин учун ТДСИ спектрлари ток кучининг уларнинг эритмадаги концентрациясига боғлиқлик графиги – калибрлаш чизмаси тузилди (4.60-расм).

Жадвалда келтирилган маълумотлардан қўйидагиларни хulosса қилиш мумкин. Таҳлиллар натижасида қон таркибидан 45,62%, пешоб таркибидан 69,56% конин ажратиб олинди.

Яшил шамшод ўсимлиги алкалоиди таҳлили

Ўсимликдан алкалоидларни ажратиб олишнинг 2-усули бўйича яшил шамшод ўсимлигидан ажратиб олинган ва хроматографик тозаланган буссин алкалоидининг термодесорбцион сирт ионлашув спектрлари олинди. Алкалоиддинг термодесорбцион сирт ионлашув спектри ва мос келувчи ток кучининг кўрсаткичлари 4.61-расм ва 4.23-жадвалда келтирилган. Бунда 250-255°C буссинга хос чизиқли чўққилар пайдо бўлиши кузатилди.



4.61-расм. Ўсимликдан ажратиб олинган буссин спектри


Миқдорий таҳлил учун калибрлаш графигини тузиш мақсадида 20,40,60,80,100 нг алкалоид сақлаган эритмалар тайёрланиб, ТДСИ спектрлар олинди (4.23-жадвал).

4.23-жадвал

ТДСИ ток кучининг эритма таркибидаги буссингининг миқдорига боғлиқлиги

№	Буссин миқдори, нг	Ток кучи I, А
1.	20	104
2.	40	301
3.	60	475
4.	80	698
5.	100	886

Жадвалда келтирилган натижалар асосида бұксин учун ТДСИ спектрлари ток күчининг уни эритмадаги концентрациясига боғлиқлик графиги – калибрлаш чизмаси тузилди (4.62-расм).



4.62-расм. Бұксинни мікдорий таҳлили учун калибрлаш чизмаси

Расмдаги маълумотлар бұксиннинг мазкур услугуда аниқлаш диапазони 20-120 нг оралиғида түғри чизиққа эга эканлигини күрсатди.

Иzlанишларнинг кейинги босқичида ишлаб чиқилған таҳлил услубини биологик суюқликлардан (қон, пешоб) ажратиб олинган бұксинни таҳлилини олиб бориш учун тадбиқ этилди. Қон ва пешоб таркибидан алкалоидни 3.2-бўлимда келтирилган тартибда ажратиб олинди ва 4.2-бўлимда келтирилган тартибда тозалаб, элюатлар олинди. Биологик суюқликлар таркибидан ажратиб олинган бұксин мікдори калибрлаш графиги ёрдамида аниқланди ва унинг натижалари 4.24-жадвалда келтирилган.

4.24-жадвал


Биосуюқликлардан ажратиб олинган бұксинни мікдорий таҳлил натижалари

Бұксин мікдори		Олинган натижаларни статистик қайта ишлаш
нг	%	
қон		
26,33	52,66	$f=4; T(95\%, 4)=2,78;$
26,99	53,98	$X_{\bar{y}p}=53,81; S^2=0,5019;$
27,25	54,50	$S=0,7084; S_x=0,3168;$
26,87	53,74	$\Delta X=0,5869; \Delta X_{\bar{y}p}=0,1413$
27,12	54,24	$E=3,66\%; \varepsilon=1,64\%$
пешоб		
42,56	85,12	$f=4; T(95\%, 4)=2,78;$
42,23	84,46	$X_{\bar{y}p}=85,13; S^2=0,5081;$
42,88	85,76	$S=0,7128; S_x=0,3187;$
42,19	84,38	$\Delta X=0,4285; \Delta X_{\bar{y}p}=0,4155$
42,96	85,92	$E=2,33\%; \varepsilon=1,04\%$

Юқорида келтирилган жадвалдаги маълумотлардан маълум бўлдики, таҳлиллар натижасида қон таркибидан 53,81%, пешоб таркибидан 85,13% буksин ажратиб олинди.

Кампирчопон ўсимлиги алкалоидининг таҳлили

Ўсимликдан триходесмин алкалоиди 3.1 бўлимда келтирилган 2-усул бўйича ажратиб олинди ва 4.2-бўлимда келтирилган шароитларда ЮҚҲ усулида хроматографик тозаланди. Элюация қилиб олинган триходесмин алкалоидининг термодесорбцион сирт ионлашув спектрлари олинди. Алкалоиддинг термодесорбцион сирт ионлашув спектри ва мос келувчи ток кучининг кўрсаткичлари 4.60-расм ва 4.25-жадвалда келтирилган. Бунда 183-190°C триходесминга хос чизиқли чўққилар пайдо бўлиши кузатилди (4.63-расм).



4.63-расм. Ўсимликдан ажратиб олинган триходесмин спектри


Миқдорий таҳлил учун калибрлаш графигини тузиш мақсадида 20,40,60,80,100 нг алкалоид сақлаган эритмалар тайёрланиб, ТДСИ спектрлар олинди (4.25-жадвал).

4.25-жадвал

ТДСИ ток кучининг эритма таркибидаги триходесминнинг миқдорига боғлиқлиги

№	Триходесмин миқдори, нг	Ток кучи I, А
1.	20	300
2.	40	502
3.	60	668
4.	80	872
5.	100	1050

Жадвалда келтирилган натижалар асосида триходесмин учун ТДСИ спектрлари ток кучининг уларнинг эритмадаги концентрациясига боғлиқлик графиги – калибрлаш чизмаси тузилди (4.64-расм).



4.64-расм. Триходесминни микдорий таҳлили учун калибрлаш чизмаси

Расмда келтирилган маълумотлар таҳлил услубининг триходесмин учун аниқлашлар диапазони 20-100 нг оралиғида түғри чизиқли эканлигини кўрсатди.

Иzlанишларнинг кейинги босқичида ишлаб чиқилган таҳлил услубини биологик суюқликлардан (қон, пешоб) ажратиб олинган триходесминни таҳлилини олиб бориш учун тадбиқ этилди. Қон ва пешоб таркибидан алкалоидни 3.2-бўлимда келтирилган тартибда ажратиб олинди ва 4.2-бўлимда келтирилган тартибда тозалаб, элюатлар олинди. Қон ва пешобдан ажратиб олинган триходесмин микдорини калибрлаш графиги ёрдамида аниқланди. Ажратиб олинган алкалоид микдори ва уни статистик қайта ишлаш натижалари 4.26-жадвалда келтирилган.

4.26-жадвал

Биосуюқликлардан ажратиб олинган триходесминни микдорий таҳлил натижалари

Триходесмин микдори		Олинган натижаларни статистик қайта ишлаш
нг	%	
қон		
22,86	45,72	$f=4; T(95\%, 4)=2,78;$ $X_{\bar{y}p}=45,46; S^2=0,5116;$ $S=0,7152; S_x=0,3198;$ $\Delta X=0,6741; \Delta X_{\bar{y}p}=0,0786$ $E=4,37\%; \varepsilon=1,95\%$
22,12	44,24	
22,94	45,88	
22,72	45,44	
23,01	46,02	
пешоб		
37,06	74,12	$f=4; T(95\%, 4)=2,78;$ $X_{\bar{y}p}=73,45; S^2=0,4426;$ $S=0,6653; S_x=0,2975;$ $\Delta X=0,3975; \Delta X_{\bar{y}p}=0,1807$ $E=2,52\%; \varepsilon=1,13\%$
36,91	73,82	
36,23	72,46	
36,56	73,12	
36,88	73,76	

Юқорида келтирилган маълумотлар асосида хулоса қилиш мумкинки, тавсия этилган услуг ёрдамида триходесмин қон таркибидан 45,46%, пешоб таркибидан 73,45% ажратиб олинади.

Хулосалар

Иzlанишлар объектлари бўлган қора мингевона, оддий белладонна, катта қончўп, сассиқ алаф, яшил шамшод, кампирчопон ўсимликлари билан заҳарланиш ҳолатлари юз берганда тезкор тиббий ёрдам бериш мақсадида дастлабки таҳлил усувларидан фармакогностик таҳлил шароитлари ўрганилди. Ҳар бир ўсимликнинг оўқозон ювинди сувларини таҳлил қилганда аниқлашга ёрдам берувчи дастлабки диагностик белгилари аниқланди. Юқорида келтирилган ўсимликларни ЮҚҲ-скрининг таҳлил шароитлари ишлаб чиқилди ва ушбу таҳлил услубини турли объектлардан ажратиб олинган ўсимлик алкалоидларини балласт моддалардан тозалаш учун тавсия этилди. Ўсимликлардан ажратиб олинган ва ЮҚҲ-скрининг усулида тозаланган алкалоидларнинг УБ-спектрофотометрия усулида спектрал характеристикалари ўрганилди, аниқлашларда қўллаш учун максимал нур ютиш соҳалари аниқланди. Ўрганилаётган ўсимликлардан ажратиб олинган элюатларни кейинги таҳлил усувларида ташқи стандарт сифатида қўллаш мақсадида ГХ-МС усулида чинлиги аниқланди ва алкалоидлар тури тасдиқланди. Қора мингевона, оддий белладонна, катта қончўп, сассиқ алаф, яшил шамшод, кампирчопон ўсимликлари таркибидан ажратиб олинган ва ЮҚҲ-скрининг усулида тозаланган алкалоидларнинг ЮССҲ таҳлил шароитлари ишлаб чиқилди ҳамда улар алкалоидларни биологик суюқлик, ҳамда объектлар таркибидан аниқлашга тадбиқ этилди ва ижобий натижалар олинди. Изланишлар обьекти бўлмиш ўсимликлар таркибидан ажратиб олинган ва ЮҚҲ-скрининг усулида тозаланган алкалоидларнинг ТДСИС усулида таҳлил қилишнинг мўътадил шароитлари ишлаб чиқилди ва улар алкалоидларни биологик суюқлик ҳамда обьектлар таркибидан аниқлашга тадбиқ этиш мумкинлиги кўрсатилди.

V. Ўсимликлар билан заҳарланиш ҳолатларида тез тиббий ёрдам кўрсатиш чоралари

5.1. Антидотлар турлари ва уларни танлаш

Ҳар қандай заҳарланиш ҳолларида биринчи тез тиббий ёрдам кўрсатиш чора-тадбирлари муҳим ҳисобланади.

Антидотлар – (грекчадан *antidoton* – қаршилик кўрсатувчи) зиддизаҳарлар, яъни заҳарланиш ҳолатларида қўлланиувчи дори воситалариdir. Антидотлар заҳарли моддаларга қарши таъсир кўрсатиб, улар таъсирида юзага келувчи заҳарланиш ҳолатларининг олдини олади ёки заҳарларни организмдан чиқарилишини таъминлайди. Уларни икки гурухга ажратиш мумкин: маҳаллий таъсир кўрсатувчи антидотлар – заҳарли модда сўрилгунга қадар қўлланилади ва резорбтив таъсирга эга антидотлар – заҳарли модда қон айланиш тизимиға тушгандан сўнг қўлланилади. Биринчи гурухга ошқозон, тери ва шиллик қаватларга тушган заҳарли моддаларни аъзо ва тўқималарга сўрилгунга қадар заарсизлантирувчи моддалар (фаоллаштирилган кўмир, кислоталар билан заҳарланишда қўлланиладиган ишқорлар ва бошқ.) киради. Бунда зиддизаҳар таъсирининг самараси (антидотный эффект) антидотларнинг заҳарли моддалар билан физик-кимёвий (адсорбция) ҳамда кимёвий (оксидланиш, нейтраллаш, эрувchan бўлмаган тузларни ҳосил қилиш) таъсиrlари натижасида юзага келади. Иккинчи гурух антидотларини эса қон ва аъзоларда заҳарли моддаларни заарсизлантирувчи бирикмалар ҳосил қилади. Бунда антидотларнинг таъсир натижаси қон таркибиغا сўрилган заҳарли моддалар билан ўзаро таъсиrlашиб билан бирга уларни бевосита рақобатбардош алоқалар тамойили асосида организм тўқималаридан сиқиб чиқаришга асосланган. Бундай антидотларга бальзи металларни заарсизлантирувчи унитиол, британия антилюизити (БАЛ), дикаптол (Венгрия), димекаптол (Чехия), дитиоглицерин (Германия) мисол бўлади. Уларнинг таъсири молекуласида сульфидрил гурухининг (SH) мавжудлигига асосланган. Бундан ташқари бу гурухга фосфорорганик заҳарлар билан заҳарланишда блокланувчи холинэстераза ферментини қайта фаоллаштирувчи оксимлар; этилендиаминтетрасирка кислота (ЭДТА) препаратлари, қайсики, оғир метал тузлари билан нисбатан тезроқ пешоб орқали чиқиб кетувчи комплекслар ҳосил қилади ва бошқалар киради.

Функционал жиҳатдан тегишли равишда заҳарли моддаларга қарама-қарши таъсир кўрсатувчи антидотлар муҳим роль ўйнайди. Масалан, организмнинг холинэргик тизимини қўзгатувчи мускарин, физиостигмин каби моддаларнинг антидоти ушбу тизимни сусайтирувчи атропин ҳисобланади.

Бугунги кундаги антидот терапияси асосан заҳарланиш ҳолатларини симптоматик даволашга қаратилган. Заҳарли модданинг организм тўқималарида қандай кимёвий ўзгаришларга учраб, асосан қайси тўқималарни зарарлаши ва шунга кўра йўналтирилган даволаш чораларини

кўриш, яъни аниқ натижага кўрсатувчи антидотни қўллаш орқали самарали натижага эришиш мумкин. Клиник токсикологияда тўпланган тажриба шуни кўрсатадики, баъзи преператлар, жумладан витаминлар ва гормонларни универсал антидотлар қаторига киритиш мумкин. Бу уларнинг турли заҳарланиш ҳолатларида кўрсатадиган ижобий профилактик ва терапевтик таъсири билан тушунтирилади. Антидотлар заҳарланишлар фармакотерапиясида хусусий воситалар ҳисобланади. Антидот терапиясининг роли, айниқса, тез ривожланувчи оғир клиник белгилар билан борадиган заҳарланиш ҳолатларида муҳим аҳамият касб этади. Бунда чегараланган қисқа вақт ичидаги кўп сонли жабрланувчиларга ёрдам бериш зарур бўлганда антидотларга бўлган эҳтиёж ортади. Бироқ бугунги кунда даволаш профилактика муассасаларида, фавқулотда ҳолатлар юз берганда аҳолига тез тиббий ёрдам кўрсатиш лозим бўлган объектларда антидотлар билан таъминланиш даражаси, уларни қўллашга бўлган эътибор суст даражада. Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан шу масалалар кўриб чиқилиб, асосан маҳаллий ишлаб чиқарилган ва четдан келтириладиган антидотлар қаторида янгиларини ишлаб чиқиш чора-тадбирлари белгилаб берилган. Бу борада шуни таъкидлаш жоизки, жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти эксперталари томонидан мунтазам равища чоп этиб бориладиган “Асосий дори воситаларининг рўйхати”нинг 8-сонида антидотларга бағишланган махсус бўлим киритилди. Унда таъсир доираси турли типдаги антидотларнинг қисқа рўйхати келтирилган. Женевада ЮНЕП томонидан чоп этилган заҳарларнинг назорати бўйича қўлланмада антидотларга бағишланган алоҳида боб мавжуд бўлиб, унда заҳарли моддалар ҳамда уларга қарши қўлланиладиган воситалар кенгроқ ёритилган. Бироқ Республикаизда антидотларга халқаро классификацияларда келтирилгани каби алоҳида урғу берилемаган. Айниқса, ўсимликлар билан заҳарланиш ҳолларида асосан умумий қўлланиладиган препаратлардан фойдаланилади. Ибн Сино ўзининг “Тиб қонунлари”да ўсимликлар ва уларнинг хусусиятларини таърифлашда заҳарлар ҳақида ва уларга қарши қўллаш мумкин бўлган даво чоралари, қайси заҳарли ўсимликка қарши қайси ўсимлик қисмлари даво бўла олиши ҳақида алоҳида тўхталиб ўтган. Шуларни ўрганиш ва изланишлар олиб бориш орқали маҳаллий ўсимлик моддалари асосида антидотларни ишлаб чиқиш ва қўллаш мумкин. Бу заҳарланиш ҳолатларида, кимёвий хавфсиз жойлар (завод, кимёвий моддалар билан ишловчи корхоналар) атрофида яшовчи аҳоли саломатлигини сақлашда муҳим чора-тадбирлардан бири бўлиши мумкин.

5.2. Хулосалар.

1. Ўзбекистонда заҳарланиш ҳолатлари учрайдиган алкалоид сақловчи ўсимликларнинг мавжуд маълумотлари тизимлаширилди. Қора мингдевона, оддий белладонна, катта қончўп, сассиқ алаф, яшил шамшод, кампирчопон ўсимликлари изланишлар обьекти сифатида танлаб олинди, улар таркибидаги алкалоидларни ажратиб олиш усуллари ишлаб чиқилди ва мўтаъдил услублар тавсия этилди.
2. Изланишлар обьекти бўлмиш қора мингдевона, оддий белладонна, катта қончўп, сассиқ алаф, яшил шамшод, кампирчопон ўсимликлари алкалоидларини биологик суюқликлар ва биологик обьект таркибидан ажратиб олиш усуллари ишлаб чиқилди ва мўтаъдил услуб тавсия этилди.
3. Изланишлар обьектлари билан заҳарланиш ҳолатлари юз берганда тезкор тиббий ёрдам бериш мақсадида дастлабки таҳлил усулларидан фармакогностик таҳлил шароитлари ўрганилди.
4. Юқорида келтирилган ўсимликларни ЮҚҲ-скрининг таҳлил шароитлари ишлаб чиқилди ва ушбу таҳлил услубини турли обьектлардан ажратиб олинган ўсимлик алкалоидларини балласт моддалардан тозалаш учун тавсия этилди.
5. Ўсимликлардан ажратиб олинган ва ЮҚҲ-скрининг усулида тозаланган алкалоидларнинг УБ-спектрофотометрия усулида спектрал характеристикалари ўрганилди, аниқлашларда қўллаш учун максимал нур ютиш соҳалари аниқланди.
6. Ўрганилаётган ўсимликлардан ажратиб олинган элюатларни кейинги таҳлил усулларида ташқи стандарт сифатида қўллаш мақсадида ГХ-МС усулида чинлиги аниқланди ва алкалоидлар тури тасдиқланди.
7. Қора мингдевона, оддий белладонна, катта қончўп, сассиқ алаф, яшил шамшод, кампирчопон ўсимликлари таркибидан ажратиб олинган ва ЮҚҲ-скрининг усулида тозаланган алкалоидларнинг ЮССХ таҳлил шароитлари ишлаб чиқилди ҳамда улар алкалоидларни биологик суюқлик, ҳамда обьектлар таркибидан аниқлашга тадбиқ этилди ва ижобий натижалар олинди.
8. Изланишлар обьекти бўлмиш ўсимликлар таркибидан ажратиб олинган ва ЮҚҲ-скрининг усулида тозаланган алкалоидларнинг ТДСИС усулида таҳлил қилишининг мўътадил шароитлари ишлаб чиқилди ва улар алкалоидларни биологик суюқлик, ҳамда обьектлар таркибидан аниқлашга тадбиқ этиш мумкинлиги кўрсатилди.

VI Фойдаланилган адабиётлар

1. Аллаева М.Ж. Ўсимликлар йиғмасининг ўткир ва сурункали заҳарлигини ўрганиш / Аллаева М.Ж., Турсунов Б.Ш. // Фармацевтика журнали. -2005. -№2. -Б. 51-54.
2. Артамова Е.С. Разработка методов качественного и количественного анализа травы чистотела большого / Артамова Е.С., Куркин В.А. // Химико-фармацевтический журнал. -2008. - №11. -С. 30-33.
3. Астахова В.Г. Загадки ядовитых растений / Астахова В.Г. –М. Изд-во «Лесная промышленность», 2007. -120 с.
4. Ахутина А.В. Изолирование, открытие и определение конина при судебно-химических исследованиях: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. фарм. наук / А.В. Ахутина -М, 1953. -14 с.
5. Балицкий К.П. Лекарственные растения и рак./ К.П. Балицкий., А.Л. Воронцова. –Киев: Наукова думка, 1982. -376 с.
6. Большой энциклопедический словарь лекарственных растений: учебное пособие / Под ред. Г.П. Яковлева. -3-е изд., исп. и доп. – СПб: СпецЛит, 2015. -759 с.
7. Вагнадзе В.Ю. Количественное определение алкалоидов в корнях барвинка травянистого методом спектрофотометрии / Вагнадзе В.Ю., Джакели Э.З. // Химико-фармацевтический журнал. -2010.-№4. -С. 35-37.
8. Вичканова С.А. Клинические исследования антимикробного растительного препарата сангвиритрин / Вичканова С.А. // Фармация. -2003. -Т. 52, №2. -С. 31-34.
9. Вичканова С.А. Применение сангвиритрина для профилактики раневой инфекции у кардиохирургических больных / Вичканова С.А., Габриэлян Н.И. // Человек и лекарство: Тез. докл. VIII Российского национального конгресса. –М., 2001. –С.221.
10. Грау Ю. Дикорастущие лекарственные растения / Ю. Грау, Р. Юнг, Б. Мюнкер. – М., 2003.
11. Гаврилин М.В., Экстракционно-фотометрическое определение алкалоидов в семенах люпина / Гаврилин М.В., Сенченко С.П., //Химико-фармацевтический журнал –2006.–№5. –С. 37-40.
12. Глазев А. А. Взаимодействие восстановленного глутатиона с тиофосфорными производными алкалоидов *Chelidonium majus* L. *in vitro* / А.А. Глазев, Л.И. Нефёдов // Биомед. химия. - 2009. - Т. 55, № 1. - С. 114-120.
13. Глазев, А.А. Влияние тиофосфорных производных алкалоидов *Chelidonium majus* L. на аминокислотный фонд форменных элементов крови у больных при различных локализациях опухолевого процесса / А.А. Глазев //Вестн ГрДУ. Сер. 2. - 2008. - № 3. - С. 186-190.
14. Глазев А.А. ВЭЖХ метод определения алкалоидов *Chelidonium majus* L. и их тиофосфорных производных (использование для диагностики рака и изучения механизмов канцерогенеза) / А.А. Глазев // Актуальные проблемы научных исследований - 2007: материалы III междунар. науч.-

практ. конф., Днепропетровск, 15-30 июня 2007 г. / Днепропетровск: Наука и образование, 2007. - Т. 8. - С. 24-26.

15. Гузев К.С., Луферов А.Н., Сапожников Д.В. Элементный анализ и оценка экологической чистоты березового дегтя / Гузев К.С., Луферов А.Н. //Фармация. –2008. –№8. –С. 18-20.

16. Злобин В.А. Использование ВЭЖХ в анализе опиатов с применением косвенного спектрофотометрического детектирования / Злобин В.А., Букреева Л.П. // Химико-фармацевтический журнал. –2000.–№5.–С. 55-57.

17. Зулфиқариева Д. А. Разработка методики ТСХ-скрининга алкалоидов *hyoscyamus niger* L. “Состояние и пути совершенствования судебно-медицинской службы Узбекистана” Материалы международной научно-практической конференции. Центр судебной экспертизы им Х. Сулаймановой Ташкент, 2012 й.11-12 декабрь. –С. 128-131.

18. Зулфиқариева Д. А. Алкалоиды в химико-токсикологическом отношении (обзор) / Зулфиқариева Д. А., Юлдашев З.А. // Фармацевтический журнал. –2012. –№4. –С. 39-44.

19. Зулфиқариева Д. А., Юлдашев З.А. Разработка методики тсх-скрининга алкалоидов *chelidonium mayus*. “Современное состояние судебно-экспертной деятельности в Узбекистане и перспективы её развития” Материалы международной научно-практической конференции. Центр судебной экспертизы им Х. Сулаймановой Ташкент, 2013й.19-20 ноябрь.

20. Зулфиқариева Д. А. Сассиқ алаф ва катта қончўп ўсимликларининг алкалоидларини ГХ-МС усулида таҳлил қилиш / Зулфиқариева Д. А., Юлдашев З.А. // Фармацевтика журнали. –2013. –№2. –Б.38-41.

21. Зулфиқариева Д. А. *Conium maculatum* L. ўсимлигини анатомик тузилишини ўрганиш / Зулфиқариева Д. А., Пўлатова Т.П. // Фармацевтика журнали. –2011. –№4. –Б. 38-41.

22. Ильичев А.В. Токсичность и противоопухолевое действие настоек аконита / Ильичев А.В., Мальдов Д.Г. //Фармация. –2009. –№2.–С. 33-35.

23. Истрanova Е.В. Сангвикол – новая лекарственная форма сангвиритрина / Истрanova Е.В., Чернова С.В. //Фармация. –2002. –Т. 51, №4. –С. 27-29.

24. Кедрова М. Болиголов против 100 болезней / Мария Кедрова. — СПб.: Питер, 2005. —96 с.: ил.

25. Куркин В.А. Иллюстрированный словарь терминов и понятий народной медицины. / В.А. Куркин В.А., В.Ф. Новодранова, Т.В. Куркина. – Самара: Перспектива, 2002.

26. Куркин В.А. Фармакогнозия: Учебник для студентов фармацевтических вузов / Куркин В.А. –Самара, 2004. 1180 с.

27. Куркин В.А. Определение flavonoидов в траве чистотела большого / Куркин В.А., Артамонова Е.С. //Фармация –2007. –№5.–С.10-12.

28. Къосев П.А. Русский травник. Описание и применение лекарственных растений / Къосев П.А. – М.: Эксмо, 2015. – 896 с.

29. Лавренов В.К. Современная энциклопедия лекарственных растений / Лавренов В.К. –М., 2006.
30. Лекарственные растения Государственной фармакопеи / Под ред. И.А.Самылиной, В.А.Северцева. – М.: «АНМИ», 2001.
31. Мазнев Н.И. Энциклопедия лекарственных растений / Мазнев Н.И. – М.: Мартин, 2003. – 496 с.
32. Муталипов М. Судебно-медицинская токсикология при острых отравлениях / Муталипов М. – Алматы. 2002.
33. Об анализе опиатов в крови, моче и в трупных материалах методом термодесорбционной поверхностно-ионизационной спектроскопии / Гиясов З.А., Шахитов М.М. и др.;– Ташкент, 2003. – 12 с.
34. Онтогенетический атлас лекарственных растений. – Том. 2. – Йошкар-Ола: МарГУ, 2000. – 268 с.
35. Палов М. Энциклопедия лекарственных растений / Палов М.; пер. с немец. [предисл. И.А. Губанова]. — М: Мир, 1998. — 478 с., ил.
36. Погоцкая, А. А. Чистотел большой (*Chelidonium majus*): взаимосвязь морфологических параметров листа и его фрагментов // А. А. Погоцкая, Г. Н. Бузук // Актуальные вопросы современ. медицины и фармации, посв . 65-летию Великой Победы : материалы 62-й итоговой науч. практ. конф. студ. и молодых ученых университета, Витебск, 22-23 апр. 2010 г. / ВГМУ, редкол.: В. П . Дейкало (и др.) . - Витебск, 2010. - С.229 -230.
37. Погоцкая, А. А. Влияние возрастающих концентраций уксусной кислоты на извлечение алкалоидов из травы чистотела большого-*Chelidonium majus* / А. А. Погоцкая, Г. Н . Бузук, Н . А. Алексеев //Вестник фармации . - 2009. - № 3. - С. 21-27.
38. Погоцкая, А.А. Анализ и способы повышения качества сырья чистотела большого / А.А. Погоцкая, Г.Н. Бузук // 45 лет фармацевтическому факультету : сборник научных трудов, Витебск, 2004 г. // ВГМУ, редкол.: А.Н . Косинец [11 др.]. - Витебск, 2004. -С.72 - 76.
39. Рудаков О.Б., Востров И.А., Федоров С.В., Филиппов А.А., Селеменев В.Ф., Приданцев А.А. Спутник хроматографиста. Методы жидкостной хроматографии. Воронеж: Водолей. 2004. 528с.
40. Рухадзе М.Д. Определение кофеина в плазме крови кролика методом неинной мицелярной хроматографии / Рухадзе М.Д., Гонашвили М.В. // Химико-фармацевтический журнал –2004. –№5.–С. 53-55.
41. Рычков Ю. В. Аптека на огороде: Лекарственные растения на вашей грядке. / Ю.В. Рычков. – М.: РИПОЛ Классик, 2005.
42. Самылина И.А. Проблемы безопасности лекарственных растений, содержащих эндогенные токсичные вещества / Самылина И.А., Булаев В.М. //Фармация –№3, –2009. –С. 6-8.
43. Стогова Н. Осторожно! Растения целители: противопоказания к применению. Монография. / Стогова Н. –М.: Питер. 2007. -81 с.
44. Устенова Г.О. Сверхкритическая углекислотная экстракция как перспективный метод извлечения биологически активных веществ из

растительного сырья / Устенова Г.О. //Фармацевтический журнал—2009. —№2. —С. 65-69.

45. Фармакогнозия. Лекарственное сырье растительного и животного происхождения: учебное пособие / Под ред. Г.П. Яковлева. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб: СпецЛит, 2013. – 847 с.

46. Фармакогнозия. Лекарственное сырье растительного и животного происхождения: учебное пособие. под ред. Г.П. Яковлева. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: СпецЛит. 2010. 863с.

47. Хроматограф «Милихром А-02». Определение веществ с применением баз данных «ВЭЖХ-УФ» / Сост.: Г.И. Барам. — Новосибирск: Ин-т хромат. «Эконова», 2005 —64 с.

48. Щербак С.Г. Диагностика острых отравлений. Учебное пособие. / Щербак С.Г., Першин А.В., Терешин А.Е. —М. 2004.

49. Янчишин В.М. Екстракційно-фотоелектроколориметричне визначення коніїну /В.М. Янчишин // Фарм. журнал. — 1974. —№ 6. — С. 76–78.

50. Binev R. Intoxication with poison hemlock (*Conium maculatum* L.) in calves / Binev R., Mitev J., Miteva T.// Trakia Journal of Sciences. — 2007. — Vol. 5, № 3–4. — P. 40–50.

51. Clarke's isolation and identification of drugs /[second edition]. — London, The Pharmaceutical Press: 1986. — 1200 p.

52. Corsi G. Secretory structures and localization of alkaloids in *Conium maculatum* L. (Apiaceae) / Corsi Gabriella, Biasci David // Annals of Botany — 1998. — № 81 — P. 157–162.

53. Forsyth C.S. Evaluation of developmental toxicity of coniine to rats and rabbits / Forsyth C.S., Frank A.A. //Teratology. — 1993. —Vol.48, № 1. — P. 59–64.

54. Ingestion of poison hemlock (*Conium maculatum*) / Frank B.S., Michelson W.B.,

55. Lopez T.A. Biochemistry of hemlock (*Conium maculatum* L.) alkaloids and their acute and chronic toxicity in livestock / Lopez T.A., Cid M.S., Bianchini M.L. // Toxicon. — 1999. —Vol.37, № 6. — P. 841–865.

56. Mitsutoshi Aoyagi. Studies on poison hemlock, *Conium maculatum* (Part II). Determaination of Coniine and γ — Coniceine / Mitsutoshi Aoyagi, Masaki Anetai // Rep. Hokkaido Inst. Pub. Health. — 2002. — Vol.52. — P. 93–95.

57. Mohana Priya. R, Senthilkumar. P. Pharmacological Study of *Trichodesma Indicum*/ International Journal of Biotech Trends and Technology (IJBTT) – Volume 4 Issue 2 April to June 2014

58. Panter K.E., Gardner D.R. // West J Med. —1995. — Vol.163, № 3. — P. 573–574.

59. Vetter J. Poison hemlock (*Conium maculatum* L.) / Vetter J. // Food and Chemical Toxicology. — 2004. — Vol.42. — P. 1373–1382.

60. Watts Jo. Clarke's Analysis of Drugs and Poisons in pharmaceuticals, body fluids and postmortem material Fourth Edition. Pharmaceutical press, London. 2011. 2473p.

VII ИЛОВАЛАР

from Data File:		Search Libraries:C:\DATABASE\wiley275 Minimum Quality: 0 Unknown Spectrum: Apex Integration Events: RTE Integrator - rteint.p
Pk#	RT	Area%
	Library/ID	Ref# CAS#
Vial Number:	Qual	
1	2.18 1.66 C:\DATABASE\wiley275.L	
	Ethanol (CAS) \$\$ Ethyl alcohol \$\$	271 000064-17-5 86
	Ethanol (CAS) \$\$ Ethyl alcohol \$\$	270 000064-17-5 86
	Ethanol (CAS) \$\$ Ethyl alcohol \$\$	278 000064-17-5 86
2	2.52 46.85 C:\DATABASE\wiley275.L	
	Ethanol (CAS) \$\$ Ethyl alcohol \$\$	278 000064-17-5 80
	Ethanol (CAS) \$\$ Ethyl alcohol \$\$	270 000064-17-5 80
	Ethanol (CAS) \$\$ Ethyl alcohol \$\$	271 000064-17-5 80
5	13.95 0.91 C:\DATABASE\wiley275.L	
	Monotrimethylsilyl derivative of M 182627 000000-00-0 78	
	Mepivacaine metabolite 146139 000000-00-0 78	
	Piperidine, 1-butyl- (CAS) \$\$ N-N 28857 004945-48-6 64	

Сассиқ алаф ўсимлиги учун ГХМС таҳлил натижалари интерпретацияси

Pk#	RT	Area%	Library/ID	Ref#	CAS#	Qual
1	2.73	1.20	D:\Library from MVD\W10N11_Full.L 1H-Pyrrole, 2-ethyl-3,4,5-trimethyl-1H-pyrrole # 1H-Pyrrole, 2-ethyl-3,4,5-trimethyl-1H-pyrrole (CAS) \$\$ 2-Ethyl-3,4,5-trimethyl-1H-pyrrole (computer-generated name) \$\$ 2-ETHYL-3,4,5-TRIMETHYL-1H-PYRROLE # 1H-Pyrrole, 3-ethyl-2,4,5-trimethyl-2,3,5-TRIMETHYL-4-ETHYL PYRRO	49584 49583 49667	069687-79-2 069687-79-2 000520-69-4	83 83 80

			LE \$\$ 3-ETHYL-2,4,5-TRIMETHYL-1H-P YRROLE \$\$ PHYLLOPYRROLE \$\$ PYRROLE , 3-ETHYL-2,4,5-TRIMETHYL-		
2	2.83	1.76	D:\Library from MVD\W10N11_Full.L 2-Methyl[1,3,4]oxadiazole 1,4,5,6-TETRAHYDROPYRIDAZINE \$\$ 2, 3,4,5-TETRAHYDROPYRIDAZINE 1H-1,2,4-Triazole-5-d, 1-methyl- \$ \$ 1-METHYL-5-D1-1,2,4-TRIAZOLE	4227 003451-51-2 53 4301 000694-06-4 53 4033 039787-03-6 50	
3	3.01	1.59	D:\Library from MVD\W10N11_Full.L Pyridine, 2,4,6-trimethyl- \$\$ \$g-c ollidine \$\$.alpha.,.gamma.,.alpha .'-COLLIDINE \$\$.gamma.-COLLIDINE \$\$ 2,4,6-COLLIDINE \$\$ 2,4,6-KOLLID IN \$\$ 2,4,6-TRIMETHYL PYRIDINE \$\$ A,G,A'-COLLIDINE \$\$ ALPHA,GAMMA,AL PHA'-COLLIDINE \$\$ COLLIDINE \$\$ G-C OLLIDINE Pyridine, 2,4,6-trimethyl- \$\$.alp ha.,.gamma.,.alpha.'-Collidine \$\$.gamma.-Collidine \$\$ s-Collidine \$ \$ 2,4,6-Collidine \$\$ 2,4,6-Trimeth ylpyridine \$\$ sym-Collidine \$\$ 2,4 ,6-Kollidin \$\$ gamma-Collidine \$\$ 2,4,6-Trimethyl-pyridine \$\$ NSC 46 Pyridine, 2,4,6-trimethyl- \$\$ \$g-c ollidine \$\$.alpha.,.gamma.,.alpha .'-COLLIDINE \$\$.gamma.-COLLIDINE \$\$ 2,4,6-COLLIDINE \$\$ 2,4,6-KOLLID IN \$\$ 2,4,6-TRIMETHYL PYRIDINE \$\$ A,G,A'-COLLIDINE \$\$ ALPHA,GAMMA,AL PHA'-COLLIDINE \$\$ COLLIDINE \$\$ G-C OLLIDINE	28102 000108-75-8 95 28106 000108-75-8 95	
4	3.99	3.26	D:\Library from MVD\W10N11_Full.L Methyl (Z)-3,5-Hexadienoate \$\$ met hyl (3Z)-3,5-hexadienoate 2-Piperidinecarboxylic acid, 1-ace tyl-, ethyl ester \$\$ Ethyl 1-acetyl 1-2-piperidinecarboxylate # 2-Piperidinecarboxylic acid, 1-ace tyl-, ethyl ester (CAS) \$\$ Ethyl 1 -acetyl-2-piperidinecarboxylate \$\$ Ethyl 1-acetyl-2-piperidinecarbox ylate (computer-generated name) \$\$ Pipelicolic acid, 1-acetyl-, ethyl ester (CAS)	33134 2000033-13-4 64 196173 052195-94-5 53 196172 052195-94-5 53	
5	4.58	4.70	D:\Library from MVD\W10N11_Full.L 4-Piperidinone, 2,2,6,6-tetramethy l- \$\$ 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperi done \$\$ Triacetonamin \$\$ Triaceton amine \$\$ Triacetone amine \$\$ Vincu bina \$\$ Vincubine \$\$ 2,2,6,6-Tetra methyl-4-oxopiperidine \$\$ 2,2,6,6- Tetramethyl-4-piperidinone \$\$ Ikh 196 4-Piperidinone, 2,2,6,6-tetramethy l- \$\$ 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperi done \$\$ Triacetonamin \$\$ Triaceton amine \$\$ Triacetone amine \$\$ Vincu bina \$\$ Vincubine \$\$ 2,2,6,6-Tetra	84521 000826-36-8 97 84519 000826-36-8 95	

			methyl-4-oxopiperidine \$\$ 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinone \$\$ Ikh 196	
			4-Piperidinone, 2,2,6,6-tetramethyl 1- \$\$ 4-Piperidone, 2,2,6,6-tetramethyl- ethyl- \$\$ 2,2,6,6-TETRAMETHYL-4-OXO- PIPERIDINE \$\$ 2,2,6,6-TETRAMETHYL- 4-PIPERIDINONE \$\$ 2,2,6,6-TETRAMETHYL- 4-PIPERIDONE \$\$ 2,2,6,6-TETRAMETHYL- AMETHYLPIPERIDIN-4-ONE \$\$ IKH 196 \$\$ TEMPIDON	84518 000826-36-8 87
6	4.88	3.19	D:\Library from MVD\W10N11_Full.L 1H-Imidazol-2-amine \$\$ 2-Aminoimidazole 1,5-Heptadien-4-one, 3,3,6-trimethyl- yl- \$\$ 3,3,6-TRIMETHYL-1,5-HEPTADIEN-4- ONE \$\$ 1,5-HEPTADIEN-4-ON, 3, 3,6-TRIMETHYL- (ARTEMISIAKETON) \$\$ 2,5,5-TRIMETHYL-2,6-HEPTADIEN-4-O NE \$\$ 2,5,5-TRIMETHYLHEPTA-2,6-DIE N-4-ONE \$\$ ARTEMESIA \$\$ ARTEMESIA KETONE Cyclobutanone, 2,2,4,4-tetramethyl- - \$\$ 2,2,4,4-tetramethyl-1-cyclobutanone \$\$ 2,2,4,4-tetramethylcyclobutan-1-one \$\$ 2,2,4,4-TETRAMETHYL CYCLOBUTANONE	4016 007720-39-0 53 77648 000546-49-6 53 33844 004298-75-3 52
7	5.15	0.39	D:\Library from MVD\W10N11_Full.L 5-Ethoxy-1,4-dioxacycloheptane \$\$ 1,4-dioxepan-5-yl ethyl ether \$\$ 5 -ethoxy-1,4-dioxepane 2-Hexanone \$\$ 2-HEXANONE METHYL N-BUTYL KETONE \$\$ 2-OXOHEXANE \$\$ BUTYL METHYL KETONE \$\$ HEXAN-2-ONE \$\$ HEXANONE-2 \$\$ KETONE, BUTYL METHYL \$\$ MBK \$\$ METHYL BUTYL KETONE \$\$ METHYL-N-BUTYL KETONE \$\$ MNBK \$\$ N-BUTYL METHYL KETONE \$\$ N-C4H9COCH3 Piperazine, 1-methyl- \$\$ N-Methyl <p>iperazine \$\$ 1-Methylpiperazine</p>	64630 2000064-63-0 49 11727 000591-78-6 38 11289 000109-01-3 38
8	5.21	0.91	D:\Library from MVD\W10N11_Full.L Butanal, 2-methyl- \$\$ Butyraldehyde, 2-methyl- \$\$.alpha.-2-METHYL-N-BUTANAL \$\$.alpha.-methylbutanal \$\$.alpha.-METHYL-N-BUTANAL \$\$.alpha.-METHYLBUTYRALDEHYDE \$\$.alpha.-METHYLBUTYRIC ALDEHYDE \$\$ 2-ETHYLPROPANAL \$\$ 2-FORMYLBUTANE \$\$ SE C-C4H9CHO Propanenitrile, 3-(dimethylamino)- (CAS) \$\$ 3-Dimethylaminopropionitrile \$\$ 3-(Dimethylamino)propionitrile Propionitrile, 3-(dimethylamino)- N,N-Dimethylamino-3-propionitrile \$\$ 3-(N,N-Dimethylamino)propionitrile \$\$ Dimethylaminopropionitrile Propanenitrile, 3-(dimethylamino)- \$\$ Propionitrile, 3-(dimethylamino)	5347 000096-17-3 46 9517 001738-25-6 43 9520 001738-25-6 43

			o)- \$\$.beta.- (Dimethylamino)propi onitrile \$\$.beta.- (N-Dimethylamin o)propionitrile \$\$ N,N-(Dimethylam ino)-3-propionitrile \$\$ 3-(Dimethy l amino)propionitrile \$\$ DMAPN \$\$ N SC 232	
9	5.25	0.69	D:\Library from MVD\W10N11_Full.L Cyclohexanone, 3,3,5-trimethyl- \$\$ Dihydroisophorone \$\$ 3,3,5-Trimet hylcyclohexanone \$\$ 3,3,5-Trimethyl cyclohexan-1-one Cyclohexanone, 3,3,5-trimethyl- \$\$ 3,3,5-Trimethyl-1-cyclohexanone \$ \$ 3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXAN-1-ONE \$\$ 3,3,5-Trimethylcyclohexanone \$\$ 3,5,5-Triethylcyclohexanone \$\$ 3, 5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANONE \$\$ CYCL OHEXANON, 3,3,5-TRIMETHYL- \$\$ AI3- 33978 Cyclohexanone, 3,3,5-trimethyl- \$\$ 3,3,5-Trimethyl-1-cyclohexanone \$ \$ 3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXAN-1-ONE \$\$ 3,3,5-Trimethylcyclohexanone \$\$ 3,5,5-Triethylcyclohexanone \$\$ 3, 5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANONE \$\$ CYCL OHEXANON, 3,3,5-TRIMETHYL- \$\$ AI3- 33978	55048 000873-94-9 52 55049 000873-94-9 47 55051 000873-94-9 47
10	6.10	1.02	D:\Library from MVD\W10N11_Full.L 2,5-Diacetylfuran \$\$ 1-(5-acetyl-2 -furyl)ethanone \$\$ 1-(5-acetyl-2 -furyl)ethanone \$\$ 1-(5-acetylfur an-2-yl)ethanone \$\$ 1-(5-ethanoylfu ran-2-yl)ethanone 2-Hydroxyl-2-methyl-5-isopropenyl- 1-methylenecyclo-pentane \$\$ 1-meth yl-2-methylene-3-(1-methylethenyl) -1-cyclopentanol \$\$ 1-methyl-2-met hylidene-3-prop-1-en-2-yl-cyclopen tan-1-ol \$\$ 3-isopropenyl-1-methyl -2-methylene-cyclopentanol Benzeneethanol, 2-methoxy- \$\$ Phen ethyl alcohol, o-methoxy- \$\$ 2-(2- METHOXYPHENYL)ETHANOL \$\$ 2'-Methox yphenethyl Alcohol \$\$ 2-METHOXYPHEN ETHYL ALCOHOL \$\$ EINECS 231-029-9 \$\$ NSC 101847	75426 2000075-42-6 83 78146 2000078-14-6 64 76526 007417-18-7 64
11	6.35	0.73	D:\Library from MVD\W10N11_Full.L Betaine Hydrochloride \$\$ Methanami nium, 1-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride \$\$ (Carboxymethyl)trimeth ylammonium chloride \$\$ Achylin \$\$ Acidin \$\$ Acidine \$\$ Acidogeno \$\$ Acidol \$\$ Acinorm \$\$ Acipepsol \$\$ Aciventral forte \$\$ Betaine chlori de Ethene, methoxy- \$\$ 1-Methoxyethyl ene \$\$ AGRISYNTH MVE \$\$ CH2=CHOCH3 \$\$ ETHER, ETHENYL METHYL \$\$ Ether , methyl vinyl \$\$ Methoxyethene \$\$ Methoxyethylene \$\$ Methyl vinyl e	78499 000590-46-5 38 798 000107-25-5 38

			ther \$\$ Vinyl methyl ether \$\$ CCRI S 8972 \$\$ EINECS 203-475-4 \$\$ HSDB 1033		
			2-Nonanone, 9-methoxy \$\$ 9-Methoxy 124115 2000124-11-5 38 -2-nonanone #		
12	6.92	0.52	D:\Library from MVD\W10N11_Full.L 4-Piperidinone, 2,2,6,6-tetramethy 118470 004168-79-0 96 1-, oxime \$\$ 4-Piperidone, 2,2,6,6 -tetramethyl-, oxime \$\$ EX 4826 \$\$ 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone oxime \$\$ Triacetonamine oxime \$\$ 2 ,2,6,6-Tetramethyl-4-oxyiminopiper idine 5H-1,4-Diazepin-5-one, hexahydro-2 118506 034392-00-2 90 ,2,7,7-tetramethyl- \$\$ Cycloheptan one, 2,5-diaza-4,4,6,6-tetramethyl - \$\$ 2,2,7,7-Tetramethyl-1,4-diae pan-5-one # 2,2,7,7-TETRAMETHYL-1,4-DIAZEPAN-5 118505 034392-00-2 90 -ONE \$\$ 2,2,7,7-tetramethylhexahyd ro-5H-1,4-diazepin-5-one \$\$ 5H-1,4 -DIAZEPIN-5-ONE, HEXAHYDRO-2,2,7,7 -TETRAMETHYL- \$\$ CYCLOHEPTANONE, 2 ,5-DIAZA-4,4,6,6-TETRAMETHYL-		
13	7.52	1.10	D:\Library from MVD\W10N11_Full.L Ethene, methoxy- \$\$ Ether, methyl vinyl \$\$ Methoxyethylene \$\$ Methyl vinyl ether \$\$ Vinyl methyl ether \$\$ 1-Methoxyethylene \$\$ CH ₂ =CHOCH 3 \$\$ Methoxyethene \$\$ UN 1087 Ethene, methoxy- \$\$ 1-Methoxyethyl ene \$\$ AGRISYNTH MVE \$\$ CH ₂ =CHOCH ₃ \$\$ ETHER, ETHENYL METHYL \$\$ Ether , methyl vinyl \$\$ Methoxyethene \$\$ Methoxyethylene \$\$ Methyl vinyl e ther \$\$ Vinyl methyl ether \$\$ CCRI S 8972 \$\$ EINECS 203-475-4 \$\$ HSDB 1033 Spiro[2.3]hexan-4-one, 5,5-dichlor 136248 142428-07-7 9 o-6-methyl- \$\$ 5,5-Dichloro-6-meth ylspiro[2.3]hexan-4-one #	801 000107-25-5 9 796 000107-25-5 9	
14	8.26	3.16	D:\Library from MVD\W10N11_Full.L Naphthalene, 1-isocyano- \$\$.alpha .Isocyanonaphthalene \$\$ 1-ISOCYAN ONAPHTHALENE \$\$ 1-NAPHTHYL ISOCYAN IDE 1-Methyl-yl-3-(prop-2'-en-1'-yl)pi peridin-2-one \$\$ 3-allyl-1-methyl- 2-piperidinone Allyl 3,5-dihydroxybenzoate \$\$ 3,5 180475 2000180-47-5 27 -dihydroxybenzoic acid allyl ester \$\$ 3,5-dihydroxybenzoic acid prop -2-enyl ester \$\$ prop-2-enyl 3,5-b is(oxidanyl)benzoate \$\$ prop-2-eny l 3,5-dihydroxybenzoate	79652 001984-04-9 38 79474 2000079-47-4 38	
15	9.28	0.35	D:\Library from MVD\W10N11_Full.L Morpholine, 4-methyl- \$\$ 1-Methylm orpholine \$\$ 4-METHYL-1-OXA-4-AZAC YCLOHEXANE \$\$ 4-Methylmorpholin \$\$ 4-Methylmorpholine \$\$ DABCO NCM, N	12335 000109-02-4 80	

			EM, NMM \$\$ METHYLMORPHOLINE \$\$ MOR PHOLINE, N-METHYL- \$\$ N-Methylmorpholine \$\$ NMM \$\$ P-METHYL MORPHOLINE	
			Formamide, N,N-diethyl- \$\$ Diethyl amid kyseliny mravenci \$\$ Diethylformamide \$\$ FORMAMIDE, DIETHYL \$\$ N,N-Diethylformamide \$\$ N,N-diethylmethanamide \$\$ N-Formyldiethylamine \$\$ AI3-11534 \$\$ BRN 1209392 \$\$ EINECS 210-533-2 \$\$ NSC 6242	12343 000617-84-5 46
			Formamide, N,N-diethyl- \$\$ Diethyl amid kyseliny mravenci \$\$ Diethylformamide \$\$ FORMAMIDE, DIETHYL \$\$ N,N-Diethylformamide \$\$ N,N-diethylmethanamide \$\$ N-Formyldiethylamine \$\$ AI3-11534 \$\$ BRN 1209392 \$\$ EINECS 210-533-2 \$\$ NSC 6242	12344 000617-84-5 46
16	10.29	0.57	D:\Library from MVD\W10N11_Full.L 2(4H)-Benzofuranone, 5,6,7,7a-tetr ahydro-4,4,7a-trimethyl-, (R)- \$\$ 2(4H)-Benzofuranone, 5,6,7,7a-tetr ahydro-4,4,7a-trimethyl- \$\$ Actinidiolide, dihydro- \$\$ NSC 357087 \$\$ Dihydroactinidiolide 2(4H)-Benzofuranone, 5,6,7,7a-tetr ahydro-4,4,7a-trimethyl- \$\$ 4,4,7A -TRIMETHYL-5,6,7,7A-TETRAHYDRO-1-B ENZOFURAN-2(4H)-ONE \$\$ (2,6,6-TRIM ETHYL-2-HYDROXYCYCLOHEXYLIDENE)ACE TIC ACID LACTONE \$\$ 2,2,6-TRIMETHYL-7-OXA-8-KETO-BICYCLO(4,3,0)NON-9 -ENE 2(4H)-Benzofuranone, 5,6,7,7a-tetr ahydro-4,4,7a-trimethyl- \$\$ 2(4H)- Benzofuranone, 5,6,7,7a-tetrahydro -4,4,7a-trimethyl-, (R)- \$\$ 4,4,7A -TRIMETHYL-5,6,7,7A-TETRAHYDRO-1-B ENZOFURAN-2(4H)-ONE \$\$ 2,2,6-TRIMETHYL-7-OXA-8-KETO-BICYCLO(4,3,0)NO N-9-ENE	143678 017092-92-1 90 143676 015356-74-8 87 143677 017092-92-1 87
17	11.53	0.94	D:\Library from MVD\W10N11_Full.L 2,3,4-Trimethyl-5-(1'-methylallyl) cyclopentadiene \$\$ 1,2,3-Trimethyl -4-(1'-methylallyl)cyclopentadiene \$\$ 1,2,3-trimethyl-5-(1-methyl-2- propenyl)-1,3-cyclopentadiene 1,2-Butadiene, 1-methoxy- \$\$ 1,2-b utadienyl methyl ether \$\$ 1-METHOX Y-1,2-BUTADIENE 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-, (E) - \$\$ (2E)-3,7-DIMETHYL-2,6-OCTADIE NAL \$\$ (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-d ienal \$\$ (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octa dienal \$\$ (E)-3,7-DIMETHYLOCTA-2,6 -DIENAL \$\$ (E)-Citral \$\$ (E)-GERAN IAL \$\$ (E)-NERAL \$\$.alpha.-Citral \$\$ CITRAL	99422 2000099-42-2 60 4521 073399-99-2 49 78040 000141-27-5 46
18	12.38	0.26	D:\Library from MVD\W10N11_Full.L Ether, 1-propenyl propyl \$\$ (1E)-1	11628 003424-89-3 50

-Propenyl propyl ether #

 2-METHYL-1,3-THIAZOLE \$\$ 2-METHYLT 10438 003581-87-1 43

 HIAZOLE \$\$ THIAZOLE, 2-METHYL- \$\$ EINECS 222-702-8

 1-Propanamine, N,N-dimethyl-3-(tri 219601 002530-86-1 43
 methoxysilyl)- \$\$ dimethyl(3-trime thoxysilylpropyl)amine \$\$ N,N-dime thyl-3-(trimethoxysilyl)-1-propana mine \$\$ N,N-DIMETHYL-3-(TRIMETHOXY SILYL) PROPYLAMINE \$\$ N,N-dimethyl-3-trimethoxysilyl-propan-1-amine

 19 13.43 2.44 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L

 Neophytadiene \$\$ 2,6,10-TRIMETHYL, 448962 000504-96-1 99

 14-ETHYLENE-14-PENTADECENE \$\$ 2,6,

 10-TRIMETHYL,14-ETHYLENE-14-PENTAD ECNE \$\$ 2-(4,8,12-trimethyltridecy l)-1,3-butadiene \$\$ 2-(4,8,12-trim ethyltridecyl)buta-1,3-diene \$\$ 7,

 11,15-trimethyl-3-methylene-1-hexa decene

 2-Hexadecen-1-ol, 3,7,11,15-tetram 505485 000150-86-7 90
 ethyl-, [R-[R*,R*-(E)]]- \$\$ Phytol

 \$\$ (2E)-3,7,11,15-TETRAMETHYL-2-H EXADECEN-1-OL \$\$ (2E)(7R,11R)-3,7,

 11,15-TETRAMETHYLHEXADEC-2-EN-1-OL

 \$\$ (E)-(7R,11R)-3,7,11,15-tetrame thyl-2-hexadecen-1-ol \$\$ (E)-phyto

 2-Hexadecen-1-ol, 3,7,11,15-tetram 505499 000150-86-7 87
 ethyl-, [R-[R*,R*-(E)]]- \$\$ Phytol

 \$\$ (2E)-3,7,11,15-TETRAMETHYL-2-H EXADECEN-1-OL \$\$ (2E)(7R,11R)-3,7,

 11,15-TETRAMETHYLHEXADEC-2-EN-1-OL

 \$\$ (E)-(7R,11R)-3,7,11,15-tetrame thyl-2-hexadecen-1-ol \$\$ (E)-phyto

 20 13.50 3.25 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L

 2-Tridecanone \$\$ Mathyl undecyl ke 194921 000593-08-8 64

 poje \$\$ Methyl undecyl ketone \$\$ T ridecan-2-one \$\$ 2-Tridecankje \$\$ Methyl n-undecyl ketone \$\$ Trideca none-2

 2-Undecanone, 6,10-dimethyl- \$\$ 6, 194975 001604-34-8 49
 10-dimethyl-2 -undecanone \$\$ " 6,1

 0-dimethyl-undeca-2-one 6,10-dimet hyl-undecan-2-one \$\$ (1)-6,10-DIME THYLUNDECAN-2-ONE \$\$ (CAS) 6,10-di methyl-2 -undecanone \$\$ 6,10-dimet hyl-undecan-2-one \$\$ hexahydro-pse udo-ionone

 2-Pentadecanone, 6,10,14-trimethyl 417084 000502-69-2 49
 - \$\$ Hexahydrofarnesyl acetone \$\$ 6,10,14-Trimethyl-2-pentadecanone

 \$\$ 6,10,14-Trimethylpentadecan-2-o ne \$\$ Perhydrofarnesyl acetone

 21 13.78 0.47 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L

 2-(Octyloxycarbonyl)benzoic acid \$ 447390 2000447-39-0 89
 \$ Phthalic acid, monoocetyl ester \$

 \$ Octyl hydrogen phthalate \$\$ Mono octyl phthalate

 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dibu 447158 000084-74-2 87
 tyl ester \$\$ ARALDITE 502 \$\$ benze

ne-1,2-dicarboxylic acid dibutyl ester \$\$ BENZENE-O-DICARBOXYLIC ACID, DI-N- \$\$ BENZENE-O-DICARBOXYLIC ACID, DI-N-BUTYL ESTER \$\$ BENZENE DICARBOXYLIC ACID, DIBUTYL ESTER \$ \$ BUFA
 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(447319 000084-69-5 86
 2-methylpropyl) ester \$\$ Phthalic acid, diisobutyl ester \$\$ Diisobutyl phthalate \$\$ Hexaplas M/1B \$\$ I
 sobutyl phthalate \$\$ Palatinol IC
 \$\$ DIBP \$\$ Diisobutylester kyselin
 y ftalove \$\$ Kodaflex DIBP \$\$ NSC
 15316

22 13.88 0.99 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 9-Octadecyne \$\$ Octadec-9-yne 358999 035365-59-4 58
 Bicyclo[3.1.1]heptane, 2,6,6-trimethyl-, (1.alpha.,2.beta.,5.alpha.)- \$\$ Pinane, stereoisomer \$\$ 2,6,6-TRIMETHYLBICYCLO[3.1.1]HEPTANE \$\$ (-)-CIS-PINAN \$\$ (-)-E-PINANE \$\$ (-)-TRANS-PINAN \$\$ (-)-TRANS-PINANE \$\$ 2,6,6-trimethylnorpinane \$\$ C IS-PINANE
 Neophytadiene \$\$ 2,6,10-TRIMETHYL, 448962 000504-96-1 45
 14-ETHYLENE-14-PENTADEcene \$\$ 2,6,
 10-TRIMETHYL,14-ETHYLENE-14-PENTAD ECNE \$\$ 2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-1,3-butadiene \$\$ 2-(4,8,12-trimethyltridecyl)buta-1,3-diene \$\$ 7,11,15-trimethyl-3-methylene-1-hexadecene

23 14.43 2.03 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 4H-1,6,7,8,9,9A-HEXAHYDROQUINOLIZINE-4,9A-D2 49641 021606-82-6 38
 1,3-Cyclopentanedione, 2-acetyl-4-methyl- \$\$ 2-ACETYL-4-METHYL-1,3-CYCLOPENTANEDIONE \$\$ 1,3-CYCLOPENTANEDIONE, 2-ACETYL-4-METHYL- \$\$ 2-acetyl-4-methyl-cyclopentane-1,3-dione \$\$ 2-acetyl-4-methyl-cyclopentane-1,3-quinone
 1-(3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropyl 190066 2000190-06-6 25
)piperidine \$\$ 1,1,1-Trifluoro-3-(1-piperidinyl)-2-propanol #

24 14.69 9.41 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 4,4'-Azinodi(2,2,6,6-tetramethylpiperidine) \$\$ 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinone (2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinylidene)hydrazone #
 2,2,6,6-TETRAMETHYL-4-PIPERIDINONE 535219 018528-42-2 91
 (2,2,6,6-TETRAMETHYL-4-PIPERIDINY LIDENE) HYDRAZONE \$\$ (2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidylidene)-[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidylidene)amin o]amine \$\$ 4,4'-AZINODI(2,2,6,6-TE TRAMETHYLPiperidine)
 4,4'-Azinodi(2,2,6,6-tetramethylpiperidine) \$\$ 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinone (2,2,6,6-tetramethyl-

-4-piperidinylidene)hydrazone #

25 14.75 1.29 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 Dibutyl phthalate \$\$ 1,2-Benzenedi carboxylic acid, dibutyl ester \$\$
 Phthalic acid, dibutyl ester \$\$ n-Butyl phthalate \$\$ Butyl phthalate
 \$\$ Celluflex DPB \$\$ Elao1 \$\$ Genoplast B \$\$ Hexaplas M/B \$\$ Palatin
 ol C \$\$ Polycizer DBP \$\$ PX 104 \$\$ Unimoll DB
 1,2-Benzenedicarboxylic acid, butyl octyl ester \$\$ Phthalic acid, butyl octyl ester \$\$ Butyl octyl phthalate \$\$ Plasticizer BOP \$\$ Plasticizer OB P \$\$ PX 914 \$\$ Staflex BOP \$\$ Truflex OBP \$\$ 1-Butyl 2-octyl phthalate # \$\$ BOP
 Phthalic acid, butyl hexyl ester 534978 2000534-97-8 87

26 17.77 4.05 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 Tricosane \$\$ n-tricosane \$\$ AI3-35 588761 000638-67-5 96
 917 \$\$ EINECS 211-347-4 \$\$ NSC 784
 87
 Heptadecane \$\$ HEPTADECAN n-hep 327255 000629-78-7 95
 tadecane \$\$ NORMAL-HEPTADECANE \$\$ trace component of sherd of cooking dish EUM 524 from Chrysokamino, Crete, Greece, EM III, at RT = 19.
 92n-heptadecanen-ALKANE \$\$ AI3-368
 98 \$\$ BRN 1738898 \$\$ EINECS 211-10
 8-4
 Eicosane \$\$ ICOSANE \$\$ EICOSAN \$\$ 461677 000112-95-8 95
 n-eicosane \$\$ n-eicosanen-icosane
 \$\$ n-icosane \$\$ AI3-28404 \$\$ CCRIS
 663 \$\$ EINECS 204-018-1 \$\$ NSC 62
 789

27 18.56 1.88 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester \$\$ Adipic acid, bis(2-ethylhexyl) ester \$\$ Adipol 2EH \$\$ Bis(2-ethylhexyl) adipate \$\$ Bisoflex DOA \$\$ Di(2-ethylhexyl) adipate \$ \$ DOA \$\$ Effomoll DOA \$\$ Flexol A
 26 \$\$ Kodaflex DOA \$\$ Monoplex DOA
 \$\$ BEHA
 Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester \$\$ ADIMOLL DO \$ \$ ADIPIC AC ID DI(2-ETHYLHEXYL) ESTER \$\$ ADIPI C ACID, BIS (2-ETHYLHEXYL) ESTER \$ \$ ADIPOL 2EH \$\$ ADO (LUBRICATING OIL) \$\$ ARlamol DOA \$\$ BEHA \$\$ BIS(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE \$\$ BISOFLEX
 DOA \$\$ DEHA
 Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester \$\$ Adipic acid, bis(2-ethylhexyl) ester \$\$ Adipol 2EH \$\$ Bis(2-ethylhexyl) adipate \$\$ Bisoflex
 DOA \$\$ Di(2-ethylhexyl) adipate \$ \$ DOA \$\$ Effomoll DOA \$\$ Flexol A
 26 \$\$ Kodaflex DOA \$\$ Monoplex DOA

\$\$ BEHA
 28 18.60 0.54 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 (cis) methyl 3-bromo-2-butenoate \$\$ 135878 2000135-87-8 47
 \$ (Z)-3-bromo-2-butenoic acid methyl ester \$\$ (Z)-3-bromobut-2-enoic acid methyl ester \$\$ methyl (2Z)-3-bromo-2-butenoate \$\$ methyl (Z)-3-bromanylbut-2-enoate \$\$ methyl (Z)-3-bromobut-2-enoate
 Benzene, [(3-methoxy-2-methyl-1-butyl)thio]-, (E)- \$\$ (2E)-1,2-dimethyl-3-(phenylsulfanyl)-2-propenyl methyl ether \$\$ 3-METHOXY-2-METHYL-1-PHENYLTHIOPROPENE \$\$ {[(1E)-3-methoxy-2-methyl-1-butenyl]sulfonyl}benzene
 endo-7-methoxy-8,8-dimethyl-cis-bicyclo[4.3.0]nonan-2-one-ethyleneacetals \$\$ (3'aR,7'aR)-1'-methoxy-2',2'-dimethyl-octahydrospiro[1,3-dioxolane-2,4'-indene]
 29 19.41 3.58 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 Pentacosane \$\$ n-pentacosane \$\$ n-pentacosanene 661799 000629-99-2 98
 AI3-36478 \$\$ EINECS 211-123-6 \$\$ NSC 158663
 Hexadecane \$\$ n-Cetane \$\$ n-Hexadecane 282672 000544-76-3 95
 cane \$\$ Cetane
 2-Bromo dodecane \$\$ Dodecane, 2-br 349450 013187-99-0 95
 omo-
 30 19.77 19.74 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 Bis(2-ethylhexyl) phthalate \$\$ Phthalic acid, bis(2-ethylhexyl) ester \$\$ Bis(2-ethylhexyl) 1,2-benzene dicarboxylate \$\$ Bisoflex 81 \$\$ Compound 889 \$\$ Di(ethylhexyl) phthalate \$\$ Di(2-ethylhexyl) phthalate \$\$ DEHP \$\$ DOP \$\$ Ethylhexyl phthalate
 Phthalic acid, di(2-propylpentyl) 741050 2000741-05-0 91
 ester
 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 3-nitro- \$\$ 3-NITROPHthalic ACID \$\$ M-NITROPHthalic ACID \$\$ PHTHALIC ACID, 3-NITRO- AI3-02074 \$\$ AIDS-0 19415 \$\$ EINECS 210-030-8 \$\$ NSC 3 120
 31 20.18 0.67 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 Ethyl 1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-2-methylpyrrole-3-carboxylate \$\$ 1-homoveratryl-2-methyl-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester \$\$ 1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-2-methyl-3-pyrrolecarboxylic acid ethyl ester
 ETHYNE, 1-DEUTERO-2-ETHOXY- \$\$ 1-EETHOXYACETYLENE \$\$ ETHYL ETHYNYL ETHER \$\$ ETHYNE-D, ETHOXY-beta.-Propiethioacetone \$\$ 2-thietanone \$\$ thietan-2-one
 32 21.01 6.66 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L

Docosane \$\$ C22H46 STANDARD \$\$ n-d 548187 000629-97-0 98
 ocosane \$\$ n-docosane n-ALKANE \$\$
 n-docosanene - \$\$ NORMAL-DOCOSANE
 \$\$ EINECS 211-121-5 \$\$ NSC 77139
 ICOSANE \$\$ EICOSAN \$\$ EICOSANE \$\$ 461663 000112-95-8 97
 n-eicosane \$\$ n-eicosanen-icosane
 \$\$ n-icosane \$\$ AI3-28404 \$\$ CCRIS
 663 \$\$ EINECS 204-018-1 \$\$ NSC 62
 789
 HENICOSANE \$\$ hen-eicosane \$\$ n-he 505645 000629-94-7 97
 n-eicosane \$\$ n-heneicosanene \$\$ n
 -Henicosane \$\$ AI3-36479 \$\$ EINECS
 211-118-9
 33 21.96 1.25 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 Octadecane \$\$ n-octadecane \$\$ OCTA 371972 000593-45-3 95
 DECAN \$\$ AI3-06523 \$\$ CCRIS 681 \$\$
 EINECS 209-790-3 \$\$ NSC 4201
 Docosane \$\$ C22H46 STANDARD \$\$ n-d 548187 000629-97-0 95
 ocosane \$\$ n-docosane n-ALKANE \$\$
 n-docosanene - \$\$ NORMAL-DOCOSANE
 \$\$ EINECS 211-121-5 \$\$ NSC 77139
 3-METHYLHENICOSANE \$\$ 3-METHYLHENE 548212 006418-47-9 93
 ICOSANE \$\$ HENEICOSANE, 3-METHYL-
 34 23.13 8.97 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 Docosane \$\$ C22H46 STANDARD \$\$ n-d 548195 000629-97-0 97
 ocosane \$\$ n-docosane n-ALKANE \$\$
 n-docosanene - \$\$ NORMAL-DOCOSANE
 \$\$ EINECS 211-121-5 \$\$ NSC 77139
 Tetracosane \$\$ n-Tetracosane 626858 000646-31-1 96
 Eicosane \$\$ n-Eicosane \$\$ Icosane 461668 000112-95-8 96
 # \$\$ n-Icosane
 35 26.22 6.47 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 Hentriacontane \$\$ n-Hentriacontane 808878 000630-04-6 98
 \$\$ Untriacontane
 Docosane \$\$ C22H46 STANDARD \$\$ n-d 548196 000629-97-0 97
 ocosane \$\$ n-docosane n-ALKANE \$\$
 n-docosanene - \$\$ NORMAL-DOCOSANE
 \$\$ EINECS 211-121-5 \$\$ NSC 77139
 Docosane \$\$ n-Docosane \$\$ Normal-d 548192 000629-97-0 97
 ocosane

Кампирчопон ўсимлиги учун ГХМС таҳлил натижалари интерпретацияси

Pk#	RT	Area%	Library/ID	Ref#	CAS#	Qual
1	18.18	0.53	D:\Library from MVD\W10N11_Full.L Acetamide, N-[3-(2-oxoazacyclotrid 504140 067171-81-7 25 ec-1-yl)propyl]- \$\$ 13-(3-Acetamid opropyl)-12-dodecanolactam \$\$ N-[3 -(2-Oxoazacyclotridecan-1-yl)propy l]acetamide # Benzeneacetic acid, 3,4-dimethoxy- 414353 027750-60-3 25 , trimethylsilyl ester \$\$ TRIMETHY			

LSILYL (3,4-DIMETHOXYPHENYL)ACETAT
 E \$\$ 1-TRIMETHYLSILYL-OXY-1-OXO-2-(
 3',4'-DIMETHOXYPHENYL)ETHANE \$\$ 2-
 (3,4-dimethoxyphenyl)acetic acid t
 rimethylsilyl ester
 n-Propyl 9-tetradecenoate 416466 2000416-46-6 25
 2 18.56 13.86 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester \$\$ Adipic acid, bis(2-ethylhexyl) ester \$\$ Adipol 2EH \$\$ Bis(2-ethylhexyl) adipate \$\$ Bisoflex DOA \$\$ Di(2-ethylhexyl) adipate \$ \$ DOA \$\$ Effomoll DOA \$\$ Flexol A 26 \$\$ Kodaflex DOA \$\$ Monoplex DOA \$\$ BEHA
 Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester \$\$ ADIMOLL DO \$\$ ADIPIC AC ID DI(2-ETHYLHEXYL) ESTER \$\$ ADIPI C ACID, BIS (2-ETHYLHEXYL) ESTER \$ \$ ADIPOL 2EH \$\$ ADO (LUBRICATING OIL) \$\$ ARALAMOL DOA \$\$ BEHA \$\$ BIS(2-ETHYLHEXYL) ADIPATE \$\$ BISOFLEX DOA \$\$ DEHA
 Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester \$\$ Adipic acid, bis(2-ethylhexyl) ester \$\$ Adipol 2EH \$\$ Bis(2-ethylhexyl) adipate \$\$ Bisoflex DOA \$\$ Di(2-ethylhexyl) adipate \$ \$ DOA \$\$ Effomoll DOA \$\$ Flexol A 26 \$\$ Kodaflex DOA \$\$ Monoplex DOA \$\$ BEHA
 3 18.65 0.19 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 Acetamide, 2-fluoro- \$\$ AFL-1081 \$ \$ Compound 1081 \$\$ Fluorakil 100 \$ \$ Fluoroacetamide \$\$ Fluoroacetic acid amide \$\$ Fussol \$\$ Megatox \$ \$ Monofluoroacetamide \$\$ 2-Fluoroacetamide \$\$ Fluoracetamide \$\$ Fluor kill \$\$ Fluoroakil 100 \$\$ Yanock \$ \$ FAA
 8,9,9,10,10,11-Hexafluoro-4,4-dimethyl-3,5-dioxatetracyclo[5.4.1.0(2,6).0(8,11)]dodecane 521096 2000521-09-6 37
 8,9,9,10,10,11-Hexafluoro-4,4-dimethyl-3,5-dioxatetracyclo[5.4.1.0(2,6).0(8,11)]dodecane \$\$ 8,9,9,10,10,11-HEXAFLUORO-4,4-DIMETHYL-3,5-DIOXATETRACYCLO[5.4.1.0(2,6).0(8,11)]dodecane
 4 19.19 0.68 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 (3R,5R)-3-(4-tert-butylphenyl)-5-ethyl-1,2-oxathiolane 2,2-dioxide \$ \$ (3R,5R)-3-[4'-(t-Butyl)phenyl]-5-ethyl-1,2-oxathiolane-2,2-Dioxide \$\$ 3-[4'-(t-Butyl)phenyl]-5-ethyl-1,2-oxathiolane-2,2-Dioxide
 Cyclopentanone, 3-(2-ethenyl-1,3-dithian-2-yl)-2-methyl-2-(2-propenyl) 459367 073798-30-8 46

1)- §§ 1,3-DITHIANE, CYCLOPENTANONE DERIV. §§ 2-isopropenyl-2-methyl-3-(2-vinyl-1,3-dithian-2-yl)cyclopentanone §§ 3-(2-VINYL-1,3-DITHIAN-2-YL)-2-METHYL-2-ISOPROPENYL CYCLOPENTANONE
 1-Oxa-3-azaspiro[4.5]decan-2-one, 3-[3-(1H-1,3-benzimidazol-1-yl)propyl]-4-hydroxy-4-methyl- 638606 2000638-60-6 41

5 19.42 1.97 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L Decanal §§ 1-DECANAL §§ 1-DECANAL (MIXED ISOMERS) §§ 1-DECYL ALDEHYDE §§ 3,4-DIHYDRO-5,7-DIHYDROXY-2H-1-BENZOPYRAN-3-YL 3,4-DIHYDROXYBENZOATE §§ ALDEHYDE C10 §§ C-10 ALDEHYDE §§ CAPRALDEHYDE §§ CAPRIC ALDEHYDE §§ CAPRINALDEHYDE §§ CAPRINI C ALDEHYDE
 Acetic acid, mercapto-, octyl ester 209311 007664-80-4 40
 r §§ 2-mercaptopropionic acid octyl ester §§ octyl 2-sulfanylacetate §§ octyl 2-sulfanylethanoate §§ Octyl mercaptoacetate §§ Octyl sulfanylacetate §§ Octyl thioglycolate Quinoline-5,8-dione-6-ol, 7-[(4-cyclohexylbutyl)amino]methyl- §§ 7-([(4-Cyclohexylbutyl)amino]methyl)-6-hydroxy-5,8-quinolinedione #

6 19.76 19.97 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L Bis(2-ethylhexyl) phthalate §§ Pht 740941 000117-81-7 91
 halic acid, bis(2-ethylhexyl) ester §§ Bis(2-ethylhexyl) 1,2-benzene dicarboxylate §§ Bisoflex 81 §§ Compound 889 §§ Di(ethylhexyl) phthalate §§ Di(2-ethylhexyl) phthalate §§ DEHP §§ DOP §§ Ethylhexyl phthalate
 Bis(2-ethylhexyl) phthalate §§ Pht 740936 000117-81-7 90
 halic acid, bis(2-ethylhexyl) ester §§ Bis(2-ethylhexyl) 1,2-benzene dicarboxylate §§ Bisoflex 81 §§ Compound 889 §§ Di(ethylhexyl) phthalate §§ Di(2-ethylhexyl) phthalate §§ DEHP §§ DOP §§ Ethylhexyl phthalate
 Phthalic acid, di(oct-3-yl) ester 741040 2000741-04-0 86

7 19.86 0.10 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L .pi.-Cyclopentadienyl-dicarbonyl-e 880328 2000880-32-8 11
 thylisonitril-trichlorgermyl-tungsten
 1-Propanone, 1,3-diphenyl-3-(triethylsilyl)- §§ 1,3-Diphenyl-3-(trimethylsilyl)-1-propanone #
 o-2-Pentylhydroxylamine 13820 2000013-82-0 10

8 20.18 1.32 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L (+)-12-Methyl-18-nor-16-azaequile 457179 2000457-17-9 80
 nin methyl ether ethyl (E)-1-methyl-2-phenylethenyl 457141 2000457-14-1 50
 (phenyl) carbamate §§ Ethyl N-(1-methyl-2-phenylethenyl)-N-phenylcarb

amate \$\$ Ethyl N-(1-methyl-2-phenyl-
 ethyl)-N-phenylcarbamate
 Morphinan, 7,8-didehydro-3-methoxy 457458 001816-06-4 22
 -17-methyl-6-methylene-, (-) - \$\$ 3
 -METHOXY-17-METHYL-6-METHYLENE-7,8
 -DIDEHYDROMORPHINAN \$\$ 14.alpha.-M
 orphinan, 7,8-didehydro-3-methoxy-
 17-methyl-6-methylene-

9 21.00 0.21 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 4,6-Bis(diethylamino)-1,3,5-triazi 455704 2000455-70-4 64
 ne-2-carbonylhydrazide
 6,7,8,11-tetrahydro-9-methyl-6-oxo 456933 114907-06-1 47
 -7,11-methano-5H-cyclooct[b]indole
 -12-carboxylic acid \$\$ 14-methyl-1
 1-oxo-9-azatetracyclo[10.3.1.0(2,1
 0).0(3,8)]hexadeca-2(10),3,5,7,14-
 pentaene-16-carboxylic acid
 1,2-Dihydroanthra[1,2-d]thiazole-2 456262 2000456-26-2 45
 ,6,11-trione \$\$ Anthra[2,1-d][1,3]
 thiazole-2,6,11(3H)-trione #

10 21.53 0.68 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 1(4H)-Pyridineacetic acid, 4-ethyl 314843 105597-84-0 38
 -3,5-diformyl-, methyl ester \$\$ 4-
 ETHYL-1,4-DIHYDROPYRIDINE-3,5-DICA
 RBOXALDEHYDE \$\$ methyl (4-ethyl-3,
 5-diformyl-1(4H)-pyridinyl)acetate
 Ethyl 4'chloro-10-oxospiro[anthrac 667431 2000667-43-1 38
 ene-(10H)9,5'-(4'H)-isoxazole]-3-c
 arboxylate \$\$ Ethyl 4'(R)chloro-10
 -oxospiro[anthracene-(10H)9,5'-(4'
 H)-isoxazole]-3'-carboxylate
 Ethanone, 1,1'-(2,6-pyridinediy)b 270607 105729-07-5 25
 is[2-methoxy- \$\$ 2,6-BIS[(METHOXYM
 ETHYL)CARBONYL]PYRIDINE \$\$ 2-metho
 xy-1-[6-(methoxyacetyl)-2-pyridiny
 l]ethanone

11 21.94 0.84 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 bis[3,3,5-Trimethylcyclohexyl]-ami 406203 2000406-20-3 46
 ne \$\$ 3,3,5-trimethyl-N-(3,3,5-tri
 methylcyclohexyl)-1-cyclohexanamin
 e \$\$ 3,3,5-trimethyl-N-(3,3,5-trim
 ethylcyclohexyl)cyclohexan-1-amine
 \$\$ 3,3,5-trimethyl-N-(3,3,5-trime
 thylcyclohexyl)cyclohexanamine
 2-Iodohistidine \$\$ 2-Iodohistidin 455285 006996-15-2 23
 (trans)-1,2-Dihydroxy-1,2-dihydro- 667738 2000667-73-8 16
 acronycine

12 23.94 1.43 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 Acetamide, 2-(adamantan-1-yl)-N-(1 668352 2000668-35-2 42
 -adamantan-1-ylethyl)-
 3,5-diphenyl-4H-1,2,6-thiadiazin-4 459209 2000459-20-9 38
 -thione
 Silane, trimethyl[4-[1-[(trimethyl 452667 126210-57-9 30
 silyl)oxy]ethenyl]phenoxy-2,6-d2]-
 \$\$ 1-[(2-TRIMETHYLSILOXY)VINYLY]-4
 -TRIMETHYLSILOXY-2,6-DIDEUTERIOBEN
 ZENE

13 24.10 4.50 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 Allyl 2-(4-methylthiophenylamino)b 412508 000000-00-0 50

enzoate
 2-[(2'-Amino-3'-methoxyphenyl]-4H- 412316 2000412-31-6 27
 [1]-benzopyran-4-one
 7,8-Dihydro-6(9H)-(methylene)pyrro 281438 2000281-43-8 14
 lo[1,2-a]indole-10-carbaldoxime \$\$
 9-methylene-6,7,8,9-tetrahydropyr
 ido[1,2-a]indole-10-carbaldehyde o
 xime
 14 24.45 7.64 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 E-Buxenone \$\$ (1E)-1-ethylidene-3a 699466 2000699-46-6 12
 ,6,6,12a-tetramethyl-7-(methylamin
 o)tetradecahydro-2H-cyclopenta[a]c
 yclopropa[e]phenanthren-2-one
 Z-Buxenone \$\$ (1Z)-1-ethylidene-3a 699465 2000699-46-5 10
 ,6,6,12a-tetramethyl-7-(methylamin
 o)tetradecahydro-2H-cyclopenta[a]c
 yclopropa[e]phenanthren-2-one
 9,19-Cyclopregn-17(20)-en-16-one, 699463 001053-21-0 10
 4,4,14-trimethyl-3-(methylamino)-,
 (3.beta.,5.alpha.,17E)- \$\$ (1E,3b
 S,5aR,7S,9aR,10aS,12aS)-1-ethylide
 ne-3a,6,6,12a-tetramethyl-7-(methyl
 amino)tetradecahydro-2H-cyclopent
 a[a]cyclopropa[e]phenanthren-2-one
 15 24.58 0.33 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 (1SR,3SR,3aRS,6aRS,10aRS,10bSR)-1- 671159 2000671-15-9 50
 Hydroxy-3a,7,7,10a-tetramethyl-3-p
 henyl-dodecahydro-4-oxabenza[e]azu
 len-5-one
 exo-1,3a,4,5-Tetrahydro-7-chloro-4 628113 2000628-11-3 47
 -methyl-5-(4-methoxyphenyl)pyrrolo
 [1,2-a]quinolin-1-one \$\$ 7-chloro-
 5-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-4,5-d
 ihydropyrrolo[1,2-a]quinolin-1(3aH
)-one
 1H-Indole, 1-methyl-2-phenyl- \$\$ I 221271 003558-24-5 35
 ndole, 1-methyl-2-phenyl- \$\$ 1-Met
 hyl-2-phenylindole \$\$ 2-Phenyl-N-m
 ethylindole \$\$ N-Methyl-2-phenylin
 dole \$\$ 1-Methyl-2-phenyl-1H-indol
 e #

16 24.85 0.78 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 3,5-Dihydroxycyclohexanamine \$\$ 5- 40786 2000040-78-6 52
 Amino-1,3-cyclohexanediol #
 ACETYL-GLYCINE-ALANINE-HYDROXYL \$\$ 163275 2000163-27-5 52
 2-(2-acetamidoethanoylamino)propa
 noic acid \$\$ 2-[(2-acetamido-1-oxo
 ethyl)amino]propanoic acid \$\$ 2-[(2-acetamidoacetyl)amino]propanoic
 acid \$\$ 2-[(2-acetamidoacetyl)amin
 o]propionic acid
 1-Pyrazolidinecarboxamide, N-pheny 172343 139193-02-5 46
 l- \$\$ N-Phenyl-1-pyrazolidinecarbo
 xamide #

17 25.07 0.83 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 1,2-Benzenediol, 3-[[(3,5-dichloro 455731 303759-64-0 44
 phenyl)imino)methyl]- \$\$ 3-((E)-[(
 3,5-Dichlorophenyl)imino)methyl)-1
 ,2-benzenediol #
 6-Azaestra-1,3,5(10),6,8-pentaen-1 457264 005144-20-7 38

7-one, 3-methoxy- §§ 7-Methoxy-11a
 -methyl-2,3,3a,10,11,11a-hexahydro
 -1H-cyclopenta[i]phenanthridin-1-o
 ne #

1,2-Dihydroanthra[1,2-d]thiazole-2 456262 2000456-26-2 38
 ,6,11-trione §§ Anthra[2,1-d][1,3]
 thiazole-2,6,11(3H)-trione #

18 25.62 0.47 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 10-Hydroxydesmethylimipramine §§ 5 461067 004014-82-8 38
 -[3-(Methylamino)propyl]-10,11-dih
 ydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-10-ol #

Metanephrine §§ Benzenemethanol, 4 190511 005001-33-2 30
 -hydroxy-3-methoxy-.alpha.-[(methy
 lamino)methyl]- §§ Vanillyl alcoho
 l,.alpha.-[(methylamino)methyl]-
 §§ m-O-Methyladrenaline §§ Adrenalin
 ine, 3-methoxy- §§ Adrenaline, 3-O
 -methyl- §§ Metadrenaline

1,8-Octanediamine, N,N'-dimethyl- 124664 033563-54-1 25
 (CAS) §§ 4A-METHYL-1,2,4A,5,8,8A-H
 EXAHYDRO-NAPHTHALENE §§ N,N'-Dimet
 hyl-1,8-diaminoctane §§ N,N'-Dime
 thyl-1,8-octanediamine §§ N~1~,N~8
 ~~DIMETHYL-1,8-OCTANEDIAMINE

19 25.66 0.30 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 5H-Naphtho[2,3-c]carbazole, 5-meth 457561 100025-44-3 70
 yl- §§ 5-Methyl-5H-naphtho[2,3-c]c
 arbazole #
 4-Bromo-3,5-di-t-butylbenzamide §§ 548921 2000548-92-1 52
 4-bromo-3,5-ditert-butylbenzamide
 9H-Imidazo[1,2-a]benzimidazole, 2- 456630 2000456-63-0 49
 (4-chlorophenyl)-9-methyl- §§ 2-(4
 -Chlorophenyl)-9-methyl-9H-imidazo
 [1,2-a]benzimidazole #

20 25.75 3.21 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 Fumaric acid, heptadecyl tetrahydr 810767 2000810-76-7 43
 ofurfuryl ester
 Con-5-enin-3-amine, N-methyl-, (3. 637399 000468-36-0 32
 beta.)- §§ Con-5-enine, 3.beta.-(m
 ethylamino)- §§ Isoconessimine §§
 Kurchine §§ Norconessine §§ N-Meth
 ylcon-5-enin-3-amine #
 Con-5-enin-3-amine, N-methyl-, (3. 637398 000468-36-0 32
 beta.)- §§ N-METHYLC CON-5-ENIN-3-AM
 INE §§ C D HOMO-ISOCONESSIMINE §§
 CON-5-ENIN-3-AMINE, N-METHYL-, (3B
 ETA)- §§ CON-5-ENINE, 3.beta.-(MET
 HYLAMINO)- §§ ISOCONESSIMINE §§ KU
 RCHINE §§ N-con-5-enin-3-yl-N-meth
 ylamine

21 25.77 2.81 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 2,4-Di(1-tert-butylthio)-1-hydroxy 617796 2000617-79-6 53
 aminonaphthalene
 2-Methyl-5H-dibenz[b,f]azepine §§ 221245 2000221-24-5 50
 2-methyl-5H-dibenzo[b,f]azepine §§
 3-methyl-11H-benzo[b][1]benzazepi
 ne
 2,3-dimethyl-4-azaphenanthrene §§ 221203 2000221-20-3 49
 2,3-dimethylbenzo[h]quinoline

22 25.91 2.28 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L

4-Chloro-2-trifluoromethylbenzo[h] quinoline 455982 001700-98-7 46
 2',4'-Dihydroxyacetophenone, bis(t rimethylsilyl) ether 502665 2000502-66-5 38
 5H-Naphtho[2,3-c]carbazole, 5-meth yl- §§ 5-Methyl-5H-naphtho[2,3-c]carbazole #
 23 26.31 34.20 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 (R)-N-Isopropyl-2-phenylpropan-1-a 135785 2000135-78-5 52
 mine
 trans-1-Methylcyclohexan-1,4-diol 39779 2000039-77-9 50
 §§ 1-methyl-1,4-cyclohexanediol
 (3R,5S)-3-(N-Allyl-N-methylamino)- 214737 2000214-73-7 50
 5-isopropenyl-2-methylcyclohexene
 §§ (1R,5S)-N,2-dimethyl-5-(1-methyl-2-enamino §§ (1R,5S)-N,2-dimethyl-5-prop-1-en-2-yl-N-prop-2-enyl-cyclohex-2-en-1-amine
 24 29.17 0.88 D:\Library from MVD\W10N11_Full.L
 (+)-12-Methyl-18-nor-16-azaequile 457179 2000457-17-9 49
 nin methyl ether
 Ethyl 3-amino-4-cyano-5-(4-morpholinyl)-2-thiophenecarboxylate 455660 2000455-66-0 49
 2,4(3H,8H)-Pteridinedione, 8-(3,5-dimethylphenyl)-3-methyl- §§ 8-(3',5'-DIMETHYLPHENYL)-3-METHYLLPTERIDINE-2,4(3H,8H)-DIONE §§ 8-(3,5-dimethylphenyl)-3-methyl-2,4(3H,8H)-pteridinedione

**Яшил шамшод ўсимлиги учун ГХМС таҳлил натижалари
интерпретацияси**