

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
ГУЛИСТОН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

“Умумий биология” кафедраси

5420100 биология таълим йўналиши бўйича бакалавр даражасини олиш учун
Қорабеков Зокирнинг “Бугдойни қорақуя замбуруғли касалликларига қарши
ДКМ-1 препаратини таъсирини ўрганиш” мавзусидаги

БИТИРУВ МАЛАКАВИЙ ИШИ

Илмий раҳбар: б.ф.н. ,доцент Х.Қўшиев

Гулистон- 2012 й.

МУНДАРИЖА

	БЕТ
КИРИШ	7
I. Адабиётлар таҳлили	11
1.1. Буғдойнинг ташқи омиллар таъсирига чидамлилиқ хусусиятлари	11
1.2. Қорақуя замбуруғи билан касалланган ўсимликда кечадиган биокимёвий жараёнлар	14
1.2.1. Қорақуя касаллиги ҳақида умумий маълумот	15
1.2.2. Қорақуя замбуруғи касаллигининг буғдой ҳосилдорлигига таъсири	17
1.2.3. Қорақуя замбуруғига қарши кураш воситалари	18
1.2.4. Глицирризин кислотаси ҳақида маълумот	21
1.3.1. Глицирризин кислотасининг физик-кимёвий хоссалари	
1.3.2. Глицирризин кислотасининг физик-кимёвий хоссалари	22
1.3.3. Глицирризин кислотанинг ўсимликларга таъсир этишининг биологик эффекти.	23
1.3.4. Мис микроэлементининг ўсимликлардаги регуляторлик роли.	24
II. Тадқиқот объекти ва усуллари	26
2.1. Тадқиқот объекти.	
2.2. Тадқиқот усуллари.	
2.2.1. Буғдой касалликларини ўрганиш.	
2.2.2. ДКМ-1 препаратини буғдойнинг замбуруғли касалликларига қарши таъсирини ўрганиш.	
2.2.3. Кузги буғдойнинг биологик белгиларига ТГК, МК, ва унинг компонентларини таъсирини ўрганиш.	
III. Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили.	
3.1. Буғдойда кузатилган замбуруғли касалликлар.	
3.2. ДКМ-1 препаратини буғдойнинг ўсиш-ривожланиш ва замбуруғли касалликларига қарши таъсири.	
Кузги буғдойнинг биологик белгиларига ТГК, МК, ва унинг компо- арини таъсирини ўрганиш.	

ХУЛОСА

Адабиётлар

Иловалар

КИРИШ

Қишлоқ хўжалиги ўсимликларининг ташқи таъсир этувчи омилларга нисбатан чидамли формаларини яратиш ёки чидамлилик даражасини ошириш халқ хўжалигини ривожлантиришда алоҳида ўрин эгаллайди.

Ўзбекистон шароитида энг муҳим стратегик аҳамиятга эга бўлган донли экинлардан бири буғдой бўлиб, буғдой бошқа қишлоқ хўжалиги ўсимликларига нисбатан кўпгина ташқи омиллар таъсирига нисбатан чидамлилиги билан тавсифланади. Лекин айрим биотик ва абиотик омиллар буғдойни ўсиш ривожланиш босқичларида салбий оқибатларни юзага келтиради. Жумладан, ҳароратнинг кескин ўзгариши билан намликни ортиб кетиши туфайли замбуруғли касалликларнинг ривожланиши ёки зараркунанда ҳашаротлар популяцияларининг кенгайиши оқибатида буғдой ниҳоллари ва унинг ҳосил сифатида салбий ҳолатларнинг юзага келиши ва шунингдек, ҳавонинг иссиқ ҳарорати ёки тупроқнинг шўрланиш даражаси ортиши билан эса ниҳолларнинг нобуд бўлиш ҳолатларини ҳам кузатиш мумкин. Бундай ҳолатларда буғдой ниҳолларининг ўсиш ва ривожланишини фитогормонал идора этиш усулларида кенг фойдаланилмоқдаки, бу ўсимликлардан потенциал маҳсулот олишдаги стратегик аҳамият касб этади. Биорегуляторлардан фойдаланиш имкониятлари ўсимликларни парваришдаги агротехник қоидаларга ҳамда биорегуляторлардан фойдаланиш регламентларига кўп жиҳатдан боғлиқдир.

Шунинг учун бошоқли дон экинларини турли хил касалликлардан жумладан, қоракуя, сариқ ва кўнғир қоракуя, барг доғланиши (гельментаспориоз, физиологик ва сариқ доғланиш) каби замбуруғли касалликлардан сақлаш ёки касалланишининг олдини олиш муҳим аҳамиятга эгадир.

Замбуруғли касалликларга қарши курашда чидамли навлар яратиш билан бирга кимёвий воситалардан ҳам фойдаланилади. Бу ўринда шуни қайд этиш лозимки, қишлоқ хўжалигида экиладиган юқори сифатли дон берувчи буғдой навлари орасида замбуруғли касалликларга чидамлилари жуда камдир.

Бугунги кунда қишлоқ хўжалигида қўлланиладиган ёки синалаётган кимёвий препаратларнинг жуда катта миқдори (стимуляторлар, гербицидлар, ретардантлар ва бошқалар) мавжудки, уларни ўсимликлар организмига таъсир даражасини генотипига, ташқи омилларга ва ўсимликларни етиштириш технологияси билан боғлиқ ҳолдаги хусусиятларини ўрганиш талаб этилади.

Ушбу битирув малакавий иш асосида қўйилган мақсадга эришиш учун куйидаги вазифаларни бажариш режалаштирилган эди.

1. Ширинмия ўсимлиги илдизидан тайёрланган техник глицирризин кислотанинг буғдойни ўсиш ва ривожланишига таъсирини ўрганиш.
2. Таркибида мис микроэлементли компонентнинг буғдойни ўсиш ва ривожланишига таъсирини ўрганиш.
3. Техник глицирризин кислотасининг буғдойнинг қоракуя замбуруғига қарши таъсирини лаборатория ва дала шароитида ўрганиш.
4. Мис микроэлементли компонентнинг буғдойнинг қоракуя замбуруғига қарши таъсирини ўрганиш.
5. Техник глицирризин кислотаси ва мис микроэлементли компоненти асосида яратилган ДКМ-1 препаратини буғдойнинг қоракуя замбуруғи касаллигига қарши таъсирини ўрганиш.

I. Адабиётлар таҳлили

1.1. Буғдойнинг ташқи омиллар таъсирига чидамлилиқ хусусиятлари

Буғдой деҳқончиликдаги қадимий ўсимлик бўлиб, Ўрта Осиё шароитида эрамиздан аввалги V-VI асрларда, археологик топилмаларга кўра эса Ўзбекистоннинг Фарғона водийсида эрамиздан аввалги I асрда, яъни бронза давридан бошлаб етиштирила бошланган [12].

Бугунги кунда буғдой жаҳондаги кўпгина мамлакатларнинг асосий кишлоқ хўжалиги экинларидан бири бўлиб, турли хил тупроқ-иқлим шароитларда етиштириб келинмоқда. Ўсимликларнинг турли тупроқ ва иқлим шароитга мослашган ёки тарқалган турлари мавжуд бўлгани сингари буғдойнинг ҳам ҳар хил иқлим шароитида мослашган турлари фарқ қилинади. Н.В.Покровский [13] ер юзида жуда кенг майдонларда етиштириладиган юмшоқ буғдойнинг 44 та тур хилини аниқлаган. Булардан *граеСим*, *еритхроспермум*, *еритролеусон*, *ферругинеум*, *меридионале*, *псевдомеридионале*, *ҳостианум*, *псевдо-ҳостианум*, *барбаросса*, *псевдо-барбаросса*, *турсиСим*, *псевдо-турсиСим* каби турлари энг кўп учрайди.

Ҳозирги вақтда буғдойнинг маданийлаштирилган турларидан Тр.аестивум Л. ва Тр.дурум Дест турлари ишлаб чиқаришда катта майдонларда экилмоқда.

Республикаимиз мустақиликка эришгандан сўнг суғориладиган ерларда ғалла майдонларининг 1 млн. гектардан ошиши буғдой навларига бўлган талабнинг ошишига ҳам сабаб бўлди. Шунингдек, республикаимиз олимлари томонидан юмшоқ буғдойнинг юқори сифатли Санзар-8, Санзар-4, Ёнбош, Маржон, Кўкбулоқ, Жаҳонгир, Ғайрат, Дўстлик ва Бўзқалъа навлари яратилган бўлиб, ҳозирги кунда ишлаб чиқаришда кенг майдонларда экилмоқда.

Қишлоқ хўжалик экинларида ҳосилдорлик муҳим кўрсаткич бўлиб, уни фақатгина ўрим-йиғим мавсумидан кейингина баҳолаш мумкин. Бу муқобил ва юқори ҳосил олишда муҳим ҳисобланади. Буғдой мақбул муддатларда пишганда юқори ҳосил олиш мумкин. Ётиб қолишга, қурғоқчиликка, касалликларга чидамли навлар об-ҳаво шароити турлича бўлган йилларда ҳам юқори ҳосил беради.

Пингали ва бошқа [17] олимларнинг таъкидлашича тажриба майдонларида юқори маҳсулдорликка эга бўлган буғдой навлари ишлаб-чиқаришга етгандан сўнг касалланиб, ҳосилдорлиги пасайиб бормоқда, яъни чидамли бўлган навда иммунитет йўқолиб, ҳар хил турдаги касалликларга чалиниш аломатлари кузатилмоқда. Шунингдек, бу ҳолатлар буғдой дони сифатига ҳам салбий таъсир этиш ҳолатлари кузатилмоқда.

1.2. Қорақуя замбуруғи билан касалланган ўсимликда кечадиган биологик жараёнлар

Паразит билан зарарланган ўсимликнинг ўсиш ривожланишида кечадиган биокимёвий жараёнларни ўрганиш асосида уни соғлом ўсимлик билан солиштириш паразитнинг таъсир этиш механизми ва унга қарши усулларни яратиш имконини беради. Шунга асосан ўрганилган кўпгина мақола ва рисоаларда [26-31] берилган маълумотлар айнан ушбу масалага бағишланган.

Ўсимликларда кечадиган углеводлар, азотли бирикмалар алмашинуви, ферментлар фаоллиги метаболизм каби энг муҳим биокимёвий жараёнлар замбуруғлар таъсирида салбий жиҳатдан ўзгаради.

Тадқиқотчилар замбуруғлар билан касалланган ўсимликлар миқдорининг камайиб боришини уларнинг баргида ҳосил бўладиган крахмал [32], шакар [33-35] шунингдек, сахароза [27,29]нинг миқдори соғлом ўсимлик билан солиштирилганда кам бўлишини аниқлаган.

1.2.1. Қорақуя касаллиги ҳақида умумий маълумот

Охириги йилларда Марказий Осиё ва шунингдек Республикамиз шароитида замбуруғли касалликлар (кўнгир, сариқ қоракуя), барг доғланиши (гельментоспориоз, физиологик ва сариқ доғланиш) касалликлари кузги буғдой ҳосилдорлиги ва дон маҳсулотлари сифатини пасайтириб иқтисодий жихатдан зарар келтирмоқда.

Қоракуя ва барг доғланиш (барг куйиши) касалликлари Ўзбекистон ғаллачилигидаги асосий касалликлардан бўлиб, буғдойнинг вегетатив жараёнида салбий таъсир кўрсатади. Яъни бу касалликлар ниҳолларнинг бошланғич ўсиш ва дон тўлиш фазаларидан бошланса, нобуд бўладиган ҳосил миқдори энг юқори бўлади.

Қоракуя замбурги касаллиги Ўзбекистоннинг суғориладиган экин майдонларида кенг тарқалган. Уни Пуссина стрииформис замбуриги келтириб чикаради. Ушбу замбуруғ билан касалланган буғдой баргларида сариқ тусдаги шарча шаклдаги буртикчалар (урединиопустулалар) бир текис, яъни қатор-қатор бўлиб жойлашади. Сариқ қоракуя одатда баҳорнинг намли ва паст ҳароратли даврларида кўпроқ кузатилиб, касаллик ривожланиши учун оптимал ҳарорат 8-15 градусни ташкил этади [36]. Сариқ қоракуя замбуруғини ривожланиши учун Марказий Осиё шароити ноқулай, яъни ҳарорат кўрсаткичи юқори бўлиб, замбуруғни ривожланиши учун шароит туғдирмасида, лекин бу охириги пайтларда жуда кенг тарқалиб бормоқда. Ўтган 2001-2002 йилларда бу касалликнинг жуда кенг тарқалиши туфайли кўпчилик буғдой навларининг ҳосилдорлиги 20-60%гача йўқотилди [36].

Қоракуяни ривожланиши учун буғдой барги юзасида сув томчилари ва намлик етарли бўлиши зарур. Қоракуяни ривожланиши учун оптимал ҳарорат бўлганда 3 соат ичида буғдой ниҳоллари баргида қоракуя ривожланиб, ниҳолни зарарлай бошлайди [37]. Ҳарорат 12-22 градусни ташкил этганда буғдойни бу қоракуя касаллиги билан касалланиши ёки зарарлаш даражаси Ўртача кўрсаткичда бўлиб ривожланиш даражаси Ўртача 2,5-2,9 мм ни ташкил этади [36]. Ҳаво ҳарорати паст бўлганда уредоспораларнинг ўсиши ва ривожланиши 50 кун давомида амалга ошади

ва айрим ҳолатларда ана шу ривожланиш босқичида ниҳолларда қишлаши мумкин [36].

Замбуруғнинг уредоспоралари кучли совуққа чидамсиз бўлиб, лекин унинг мицеллалари жуда паст ҳароратда ҳам яшовчанлик хусусиятини йўқотмайди [36].

Касалликни қўзғатувчи Пуссина стрииформис замбуруғи ҳарорат ва ёруғликка жуда таъсирчан бўлиб, тезда ҳимояланиш имкониятларини ҳосил қилади [38].

Замбуруғ суст ривожланиш даражасига эга бўлган уредомицелий босқичида буғдой ниҳолларида ёки буғдойнинг ёввойи авлодларида қишлайди [31].

Бу замбуруғ Аегилопс сйлиндриса, Агропйрум сристотум, А. Репенс, Бромус жапониСим каби 16 тур бошоқдошларни зарарлаши мумкин [39]. Баҳорда инфекцияни келтириб чиқарувчи уредоспоралардир. Улар ўсимлик ниҳолларида қишлаган уредомицелалардан ҳосил бўлади [18-21].

Ўзбекистон шароитида Сарик қорақуя замбуруғи кўпроқ суғориладиган буғдой майдонларида ва баъзан баҳорнинг сернам ва совуқроқ келган йиллари лалми экин майдонларида ҳам учрайди [36] ва баъзан табиий ҳолда инфекция тарқатувчи ўсимликлар манбаларида ҳам кенг тарқалади [36]. Замбуруғни критик ривожланиш даври киш фасли бўлиб, кузда етарли нам бўлганда улар бошланғич ривожланиш фазасини бошлаб беради [37].

Марказий Осиё, Олтой, Кавказ орти ва Шимолий Кавказ мамлакатлари экин майдонларида ушбу касаллик икки йилда бир марта кенг тарқалиши кузатилади [16,17].

1.2.2. Қорақуя замбуруғи касаллигининг буғдой ҳосилдорлигига таъсири

Суғориладиган экин майдонларида экилган буғдой ниҳолларида қорақуя замбуруғини кенг тарқалишига асосий сабаб, суғориладиган майдонларда буғдойнинг яшил массаси кўп бўлиб, ниҳолларнинг барг

оғизчалари намликни етарли бўлганлиги сабабли катта-катта очик бўлади ва бу замбуруғ гифаларини ўсиб барг тўқималарига томон ривожланиши ва жойлашиб олишига имконият яратади. Зарарланган буғдой ниҳолларида эса ассимилицион жараённинг пасайиши, нафас олишнинг кучайиб. Транспирация жараёнини ортиши ва шу каби катор физиологик жараёнларнинг бузилишига олиб келиши мумкин. Шунингдек, барглarda крахмалнинг ҳосил бўлиши ва захира сифатида тўпланиши кескин камаяди ва етиляётган дон эпидермисида озуканинг пасайиб, дон сифати ва унинг массасини пасайишига сабаб бўлади [18-20]. Бу даврда ўсимлик тўқималарида ўсиш ва ривожланишини идора этилиш хусусияти йўқолади ва хужайраларда индолсирка кислотаси тўпланиб, ферментатив жараёнларни сусайтиради [21,22]. Бу ҳосилдорликни кескин камайишига сабаб бўлади.

1960 ва 1961 йилларда сариқ қоракуяни кенг тарқалиши туфайли Шимолий Америкада буғдой ҳосилдорлиги 30-40% гача йўқотилган [16], Англияда эса бу кўрсаткич 8-20% ни ташкил этган. Замбуруғни ниҳолларни зарарлаш хусусияти фақатгина баргда бўлмай бошоқни, гул қобиқларини ва шунингдек, дон қобиқларини ҳам зарарлаши кузатилган. Бундай ҳолат ҳосилдорликни кескин камайишига ҳам сабаб бўлган [18].

В.Ф. Пересўпкиа [40] маълумотларида собик СССР даврида касалликни кенг тарқалиши туфайли жойларда ҳосилдорлик умуман йўқотилган, П.П.Лукьяненко [41] маълумотларида эса бундай кўрсаткич 15-20%ни ташкил этган.

Сариқ қоракуя замбурги билан касалланган буғдойда нафақат ҳосилдорликни пасайиши, балки оқсил миқдорини 1,3-1,5%гача, 1000 дон оғирлигини эса 23%гача [36] пасайишини кузатиш мумкин.

Марказий Осиё шароитида сариқ қоракуя касаллиги тарқалган йиллари Г.К. Байгуловой и А.А. Питонии маълумотлари бўйича [42] ҳосилдорлик 30%гача, З.А.Шаварина [43] маълумотлари бўйича эса 20%гача йўқотилганлиги маълум.

1.2.3. Қорақуя замбуруғига қарши қураш воситалари

Қорақуя касаллиги билан зарарланган ниҳолларни физиологик ва биокимёвий ҳамда физикавий таҳлиллари асосида олиб борилган тадқиқотлар ўсимликни замбуруғдан ҳимоя қилиш ёки қўлланиладиган воситаларни ўсимликни иммун системасини оширишга йуналтиришга қаратилгандир. Албатта замбуруғни ривожланиш жараёнлари биологияси ва унда кечадиган биокимёвий, физиологик ва физик кимёвий хусусиятларини билиш, Ушбу касалликни олдини олиш чораларини ишлаб чиқиш имкониятини келтириб чиқаришга шароит яратади ва ўсимликни иммун системасини ҳосил қилиш учун таъсир этувчи воситаларнинг яратилишига замин яратади.

Қишлоқ хўжалигида ўсимликларни ҳимоя қилиш ва айниқса, касалликлардан сақлаш ёки касалланишини олдини олиш энг муҳим масалани ташкил этадики, ҳозирги кунда олиб борилаётган тадқиқотларни кўпи айнан ўсимликларни ташқи таъсир этувчи омиллардан ҳимоя қилиш асосида ҳосилдорлигини сақлаб қолиш ёки ҳосилдорлик ва унинг сифатини оширишга қаратилагандир.

Ўсимликларни ташқи таъсир этувчи салбий факторлардан ҳимоя қилиш ва унинг ҳосили ҳамда ҳосил сифатини оширишда агротехник ва селекцион тадбирлар билан бир қаторда турли хил кимёвий препаратлардан ҳам фойдаланилмоқда.

Охириги йилларда буғдойнинг замбуруғли касалликларига қарши турли хил кимёвий препаратларни ишлатиш асосида ҳар хил антибиотикларни қўллаш муҳим аҳамиятга эга эканлиги аниқландики [31], бу экологик жиҳатдан безарар ва танлаб таъсир этувчи воситаларни қўллаш имкониятини яратилишига сабаб бўлмоқда. Ўтган давр ичида Дэвис ўзининг шогирдлари билан [44] *Стрептомйсет* сн.дан Р-9 антибиотикини яратиш асосида қўнғир ва поя қорақуяи замбуруғларини ривожланишини тўхтатиш

имкониятини аниқлашди. Яратилган препарат жуда тез таъсир этувчи бўлиб, узоқ сақланиш имкониятига эга ва ўеч қанақа фитотоксик хусусиятга эга эмаслиги билан бошқа кимёвий препаратлардан фарқ қилди. Бу препарат бўғдойда қунғир қорақуя касаллигини ривожланиш даражасини 30 марта камайтириш имкониятини ҳосил қилади..

Адабиётларда ўсимликларни турли микроорганизмлар билан зарарланишини олдини олишда бир неча микроэлементларнинг таъсири ва бу элементларни ўсимликни чидамлик даражасини ошириш хусусиятлари ҳақида маълумотлар мавжуд [44]. Бу маълумотлар шуни кўрсатадики, ўсимлик танасида микроэлементларнинг етишмаслиги туфайли микроорганизмларга ёки турли хил замбуруғли касалликларга нисбатан чидамлик даражаси камайди, яъни касалликларга нисбатан таъсир этувчи воситалар, метаболитлар ўсимлик танасида ҳосил бўлмай қолади. Бу ҳолат ўсимлик танасида турли микроорганизмлар, замбуруғларнинг жой олиши ёки ривожланишига имконият яратилиши мумкин бўлади.

Олиб борилган кўпгина тадқиқотлардан маълумки, ўсимликларда учровчи турли замбуруғлар, микроорганизмлар ва шу каби бошқа касалликларга қарши қўлланиладиган кимёвий препаратлар нафақат касаллик симптомларини пасайтириши мумкин бўлади, балки ўсимликни келгуси авлодларида ҳам шаклланган белгиларни ўтиши ва сақланиши имкониятини ҳам беради. Кимёвий препаратларни таъсир этиш натижасида ўсимлик тўқимасида ҳосил бўлган физиологик фаол моддалар айрим ҳолларда кўзгатувчанлик хусуситиёга эга бўлиб, хужайра ва тўқималарда шаклланмай қолган бирикмаларни шаклланишига ҳам имконият берадики, бу ўсимликни келгуси босқичларида ҳам бу ҳолатни такрорланишига имконият яратади. Бу ўсимликни фақат шу йилдагина эмас келгуси йилларда ҳам микроорганизм ёки касалликлардан ҳимоялаш имкониятини яратади. Бунда ўсимликни ўсиш ва ривожланиши ортиши билан бирга ҳосилдорлик кўрсаткичлари ва унинг сифат даражаси ҳам ортиши мумкин бўлади.

Ушбу ишда кузги буғдойнинг сариқ қорақуя замбуруғига қарши ширинмия ўсимлигининг илдизидан ажратиб олинган глицирризин кислотаси ва мис металини азотли ўғит муҳиtida гидролиз асосида эритилган компонентини таъсири ўрганилди. Бу келгусида ушбу йўналишда экологик зарарсиз бўлган воситалар яратиш имкониятини бериши мумкин

Кўпгина адабиётлардан маълумки, ўсимликларнинг ўсиш-ривожланиш босқичларида ташқи омиллар таъсирини идора этиш бўйича қатор ишлар амалга оширилган. Айниқса, табиий бирикмалардан фойдаланиш асосида ўзига хос натижалар олингани маълум. Шулардан бири *Глицирриза Глабра Л.* ўсимлигидан ажратиб олинган глицирризин кислотасидир (ГК). ГК тутган ушбу ўсимлик илдизидан тайёрланган ичимлик ва малҳамлар узок даврдан буён инсон саломатлигини тиклаш ҳамда ундаги қатор хасталикларни олдини олишда ишлатиб келинган. Бугунги кунда ҳам ГК ва унинг тузлари фармакологияда бронхиал астма, дерматит, экзема, ошқазон яраси, аллергия, гепатит каби қатор хасталикларни даволашда ишлатилиб келинмоқда.

Кўпгина сапонинларнинг ўсимликларнинг ўсиш ва ривожланишига таъсир этиш механизми билан боғлиқ кўпгина маълумотлар аниқланилган бўлсада, лекин ГКнинг таъсир этиш механизми ҳақида аниқ бир маълумотга эга бўлинмади [45]. Лекин ГКнинг ҳайвонлар тўқималари ва хужайраларига таъсир эффекти ҳамда ўсимликларнинг ўсиш ривожланишини стимулловчи физиологик фаол модда сифатида айрим тасаввурларни илгари суриш мумкин. ГКнинг жуда паст концентрацияда (10^{-8} – 10^{-7} М) айрим ўсимликлар уруғини унувчанлик даражасини тезлаштириш ва ўсиш жараёнини стимуллаш хусусияти бизнинг дастлабки тажрибаларимиздан ҳам маълум бўлди. ГКнинг ўсимликларни ўсиш-ривожланишига гормонга хос таъсир этиш хусусияти мавжудлиги бир томондан ҳайвонлар хужараси ёки тўқимасига таъсир этиш механизмини ўрганиш асос бўлса, иккинчи томондан ўсимликларнинг ўсиш-ривожланиши ва унга таъсир этувчи омиллар таъсирини идора этувчи препаратлар яратиш ҳамда унинг таъсир этиш механизмини ўрганишга ҳам асос бўлиши мумкин.

1.2. Глицирризин кислотаси тўғрисида умумий маълумот.

Глицирризин сўзи грекча сўздан олинган бўлиб, “glycus”- ширин, “rhiza”-илдиз деган маънони англатади. Илмий номи - Glycyrrhiza Ҳалқаро номи - Глицирризин кислотаси. Кимёвий номи - 20 В – карболсил -11 оксо-30 порамен 12 ен -3В ил 2-0-В-0-глюкопирануронозил- алфа-Д глюкопиранозидуруновая кислота.

Сотувдаги номи –эриген интим. Глицирризин кислотаси ширинмия илдизидан олинади. Ширинмия Вавилонда доривор ўсимликлар боғида 25 00 йил аввал мавжуд эди. Илдизда йўталга қарши хусусият борлигини билганлар.

Хитойда 2800 йил олдин тиббиётда қўллаганлар. Қизилмия илдизининг хусусияти ҳақида Гипократ ва Теофрат ҳам маълумотга эга бўлган. Ибн Сино қўлёмаларида қизилмия илдизи ҳақида фикр юритилган. Иб-ул Байтар ва бошқа араб шифокорлари қизилмияни даволаш восита сифатида кенг қўлланилган.

Араб тиббиётидан XII - асрда ширинмия Европага кириб келди. Узок йиллар давомида қизилмия илдизи тиббиётда доривор ўтлар тўплами ва эликсир сифатида қўлланган. Глицирризин кислотаси фармокологик хусусияти жуда яхши ўрганилган. У вирусга қарши, шамоллашга қарши, бўқоқ касаллигига қарши таъсир этиб, иммун тизимининг фаолиятини яхшилайдди.

Вируснинг ДНК ва РНК типига *in vitro* ва *in vivo* шароитида таъсир этади. Бошланғич босқичида вируслар репликациясини бузади. Вирус структураси билан боғланиб, вирус циклини ҳар хил фазаларини ўзгартиради.

Ҳужайра ичида вирус қисмларининг фаоллигини чеклайди. Кейинги йилларда глицирризин кислотанинг ўсимликларга таъсир этишининг биологик эффекти юзасидан тадқиқотлар олиб борилдмоқда. Адабиётларда глицирризин кислотанинг 10-6 М концентрацияда пахта чигитининг униш ва ривожланишини тезлаштириши қайд этилган.


Амеранта ўсимлигида ўтказилган физиологик тестлар асосида маълум бўлдики, глицирризин кислотанинг 10-6 М концентрацияда ушбу ўсимликда цитокинин сингари амарантин пигментини ҳосил бўлишини оширар экан. Глицирризин кислотасининг стимуляторлик ва гормонал хусусиятлари ҳақидаги маълумотлар юқори шўрланган майдонларда ширинмия ўсимлиги экилганидан сўнг ўрнига кузги буғдой ва ғўзанинг ўсиш ва ривожланиши, ҳосилдорлиги ва ҳосил сифатини ўрганиш бўйича олиб борилган тажриба натижалари ушбу ўсимлик илдизидан ажратиб олинган глицирризин кислота ўсимлик ўсишини тезлаштирувчи физиологик фаол модда сифатида фойдаланиш учун асос бўлади.

Глицирризин кислотасининг физик-кимёвий хоссалари

Стероидлар юксак ўсимликларда кенг тарқалган. Улар гликозид-сапонинлар шаклида [5] илдиз системасида калий-кальций-магний тузлари кўринишида учраб (илдиз қуруқ массасининг 23%игача), ширинмия илдизига

ширин таъм беради. ГК (18(3-Н-ГК) табиий сапонинга кириб, глициррат кислотанинг гидрофоб стероидли сапогенинидан ташкил топган, кайсиким улар ГКнинг тритерпинли агликони (ёки ГК агликони) деб номланади ва улар 2 та глюкоурон кислота молекулаларининг гликозид боғланишига эга [4] (расм).

ГК ўзига хос тарзда муҳим физик-кимёвий хоссаларни намоён этади. ГКнинг сирт фаоллик, солюблизацияланиш, гел ҳосил қилиши хусусиятлари шулар жумласидандир. ГКнинг ушбу хусусиятлари асосида кўпгина сувда эримайдиган бирикмалар (гидрокортизон, преднизолон, урацил, нистатин ва ҳ.к.)ни сувда эритиш мумкин [6]. ГКнинг бундай хусусиятларни намаён қилишига агликоннинг карбоксил гуруҳи ва глюкоурон кислотасининг ўзаро таъсир этиши натижасида циклик конформацион тузилманинг ҳосил қилишидир (расм). Бунинг натижасида эса ГКнинг ички сферасида комплекс ҳосил қилувчи бўшлиқ ҳосил бўлади [7].



Расм. 1.1. Глицирризин кислотасининг очик (А), циклик (Б) конформацион ва (В) унинг агликон - глициррет кислота шакли

1.3.2. Глицирризин кислотанинг ўсимликларга таъсир этишининг биологик эффекти.

Айрим адабиётларда сапонинларнинг ўсимликларга таъсир эффекти ҳақида маълумотлар келтирилган [45]. Ушбу маълумотларда сапонинлар кичик концентрацияда уруғларнинг ўсиш ривожланишини тезлаштириши, юқори концентрацияда эса ингибирлаши келтирилган. *Бегониа* ўсимлиги барглариغا сапонинларнинг эритмалари сепилганда ўсимлик поясининг ўсишини тезлашишини, ўсимликнинг изоляцион муҳитда ривожланаётган эмбрионига таъсир эттирилганда ривожланишини тезлашганлиги кузатилган. Шунингдек, *Ҳедера ҳелих* ўсимлиги баргига сепилганда эса

поясида шишлар пайдо бўлганлиги, помидорда ўсимлик илдизининг ўсиш-ривожланишини ингибирланганлиги қайд этилган.

ГКнинг 10^{-8} – 10^{-6} М концентрацияда пахта чигитини униш ва ривожланишини тезлаштириши қайд этилган [54-56]. Бунда шулар қайд этиладики, ГК 10^{-7} — 10^{-8} М концентрацияда гибберлин сингари чигит уруғпаллалари массасини ошириши аниқланган.

Амаранта ўсимлигида ўтказилган физиологик тестлар асосида маълум бўлдики, ГК 10^{-6} М концентрацияда ушбу ўсимликда цитокинин сингари амарантин пигментини ҳосил бўлишини оширар экан.

Олиб борилган тажрибалар асосида ГК 10^{-6} М концентрацияда ауксин сингари ауксин боғловчи мураккаб оқсиллар ҳосил бўлишида РНК таркибидаги нуклеотидларнинг фаоллигини оширади. Шунингдек, ГК 10^{-8} – 10^{-5} М концентрацияда Ca^{2+} нинг цитоплазматик мембранага боғланиш миқдорини оширади.

Ауксинда ўтказилган физиологик тестларда эса ГКнинг $x \cdot 10^{-7}$ – 10^{-6} Мли концентрацияда бугдой колеоптилейини ўсиш ва ривожланишини ва шунингдек, 10^{-8} – 10^{-7} Мли концентрацияда эса фасолнинг каламчалари кучатларида илдиз ҳосил бўлишини тезлаштириши ҳам аниқланган.

Гибберлин асосида ўтказилган тестда эса ГКнинг 10^{-7} — 10^{-8} Мли концентрациясида уруг ва барг пластинкалари массасини ошириши ўрганилган.

1.4. Мис микроэлементининг ўсимликлардаги регуляторлик роли.


Мис ўсимликларнинг ривожланиши учун зарур микроэлементлардан биридир. Унинг зарурлиги озуқавий эритмадагина эмас, балки шароитида ҳам аниқ кўринади. Ўсимликларда ўртача 0,0002 фоиз ёки 0,2 мг/кг атрофида. Бу миқдор ўсимлик ва тупроқ турига боғлиқ. Мис тупроқда сульфидлар, сульфатлар, карбонатлар шаклида учрайди. Муҳитнинг ишқорийлиги қанча юқори бўлса, ўсимликларда шунча кам ўтади. Ўсимликлар мисни тупроқдан катион (Cu^+) шаклида ўзлаштиради. Ўсимликнинг ёш ўсувчи қисмларида ва

уруғларида кўп бўлади. Масалан, ғўза органларида: баргларида мис 2,5 мг/кг, поясида 1,0 мг/кг, чаноғида 4,8 мг/кг, чигитида 4,2 мг/кг ва толасида 0,2 мг/кг бўлади.

Кейинги йиллардаги изланишлар ўсимликларнинг курғоқчиликка, совуққа ва иссиққа чидамлилигини оширишда ҳам миснинг аҳамияти борлигини кўрсатди.

Мис етишмаслигидан ўсимликларнинг ўсиши, гуллаши тўхтайди. Баргларида хлороз бошланади. Ғалласимонларда бошоқлар ривожланмай қолади. Мевали дарахтларнинг учлари қуриydi. Мис ўғитлари, айниқса ботқоқ тупроқларда яхши натижа беради. Чунки бундай тупроқларда унинг миқдори жуда оз. Ўғитлар сифатида мис сульфат тузи, мис эритиш заводларининг чиқиндиларини ишлатиши мумкин.

Ўсимлик баргларидаги умумий миснинг 70 фоизи хлоропластларда ва ярми пластоционин ферменти таркибида учрайди. Пластоционин ферменти фотосинтез жараёнида электронларни ташиш вазифасини бажаради. Таркибида мис ёки мисни фаоллантирувчи ферментлар жуда кўп бўлиб, улардан полифенолоксидаза (ПФО) ва аскорбатоксидаза (АО) муҳим аҳамиятга эга. Бу ферментлар оксидаза ферментлар гуруҳига кириб, органик моддаларни молекуляр кислород билан оксидланишида иштирок этади:



Уларнинг кўпчилиги ўсимликлар тўқималарида аниқланган.

Фенолоксидаза ёки фенолаза ферментлар комплекси моно- ва о-дифенолларни оксидловчи биокатализаторларни (тирозиназа, полифенеолоксидаза, катехолоксидаза, монофенолоксидаза ва бошқалар) уз ичига олади. Халигача фенолаза ферментлар комплексидан биронта фермент аниқ ўрганилмаган. Монофенолазалар (монофенолоксидазалар, крезолазалар) ва полифенолазалар (полифенолоксидазалар, катехолазалар) ҳамда уларнинг ўзаро таъсирлашиш даражалари кўпгина тортишувларга сабаб булмоқда.

Картошка туганакларида мавжуд полифенолоксидазалар таркибида мис мавжудлиги биринчи марта Кубовиц [72] томонидан аниқланилган. Унда 0,2-0,3% мис борлиги аниқланилган. Ушбу ферментнинг физик хусусиятлари эса тулик ўрганилмаган. Фенолазалар комплексига кирувчи ферментларнинг барчаси нисбатан специфик бўлиб, бу ферментларнинг субстрати сифатида монофеноллар, полифеноллар, ароматик аминокислоталар ва аминлар хизмат қилади. Катехол- ёки полифенолоксидаза гидроксил гурухи орто- ҳолатда бўлган пирокатехин (катехол) ёки пирагаллолни оксидланиши жараёнини катализлашда иштирок этади. Фермент иштирокида катехолнинг маълум бир қисми оксидланиб гваякол, бензидин, аскарбин кислота пирагаллолга айланади, қайсиқим улар фермент иштирокида оксидланмайди.

Шундай қилиб, ўсимликлар тўқимасида катехол ёки о-хинон полифенолоксидаза билан биргаликда кўпгина бирикмаларни оксидланишига имконият яратади.

Ҳозирги вақтда фенолаза комплексига кирувчи ферментларнинг таъсир этиш механизми бўйича кўпгина маълумотлар олинган, лекин кислород ташувчи оқсиллар хақида маълумотлар жуда кам. Шундай маълумотлар мавжудки, кислород ташувчи оқсил молекулалари иккита (Cu^+) атомига эга бўлиб, мис ионининг гемоцианин билан ионланиш константасининг Cu^+ - цистеин комплекси константасига яқинлиги миснинг оқсил билан боғланиши СХ-гурухи (цистеин ёки гистидин) асосида амалга ошиши мумкин.

Бунда ферментларнинг таъсир этиш механизми миснинг кислород билан комплекс ҳосил қилишига имконият яратади [73]. Миснинг кислород билан комплекси қуйидаги қуринишда бўлиши мумкин:

$Cu^+-O_2-Cu^+$, $Cu^{2+}-O_2-Cu^+$, $Cu^+-O_2-Cu^{2+}$, $Cu^{2+}-O_2-Cu^{2+}$. Бунда комплекс бир структуравий тузилишдан иккинчисига ўтиши ва мис ҳар валентликка эга бўлиши ҳам мумкин.

Шуни айтиш лозимки, оддий Cu^{2+} ли бирикмаларнинг экстинкцион моляр коэффициенти 200 дан кўп булмайди, гемоцианин (таркибида мис тутувчи оқсил)нинг экстинкцион коэффициенти эса тахминан 750 атрофида.

Бунда коэффициент кўрсаткичининг катта миқдори икки валентли мис Cu^{2+} ионли зарядга эга бўлган оксилли комплексга хосдир. Cu^{2+} ионининг коэффициент кўрсаткичи эса нсибатан кичик. Бу кўрсаткич кислород ташувчи комплексларни аниқлашда муҳим тест бўлиб хизмат қилади.

Шундай тахминлар мавжудки, полифенолаза таркибидаги Cu^{2+} билан специфик боғ ҳосил қилсада, лекин Cu^{2+} иони миқдорининг жуда чегараланганлиги кислород билан узоқ муддатли боғ ҳосил қила олмайди.

II. Тадқиқот объекти ва усуллари.

2.1. Тадқиқот объекти

Тажрибалар учун кузги бугдойнинг Ўзбекистон шароитида яратилган Боёвут-1, Ёнбош, Сайхун ва ГулДУ навлари танлаб олинди. Бу навлар қоракуя замбурги касалликларига чидамли (Боёвут-1), Ярим чидамли (Ёнбош ва Сайхун) ҳам чидамсиз (ГулДУ) булиб, тажрибалардан аниқ маълумотлар олиш учун танланди.

Ёнбош – кузги юмшоқ бугдой. “Ғалла” илмий ишлаб чиқариш бирлашмасида А.О.Омонов, В.А. Киряш ва И.Г. Одинцовалар тамонидан маҳаллий “Сангзор – 85” навини Суриядан келтирилган нав намунаси (К-1746) билан чатиштириб, яқка танлаш йўли билан олинган.

Тур хили – Ферригинеум. Бошоғи қизғиш рангда, қилтиқли, қилтиғи ён томонларга тарвақайлаган. Бошоқчалар бошоқда ўртача зичликда жойлашган. Дони қизғиш, ўртача катталиқда бўлиб, 1000 донасининг оғирлиги 40- 42 граммни ташкил қилади, пояси ётиб қолишга чидамли. Нав ўртапишар “Интенсив” навидан 2-3 кун кейин пишиб етилади. Совуқ ва

касалликларга чидамли. Экиш мѐри 1 гектар ерга 3.5 – 4.0 млн. унувчан уруғ. Нав 1994 йилда суғориладиган ерларга экишга тавсия этилган.

Боявут-1- кузги юмшоқ буғдой. Сирдарѐ вилояти шароитида Х.Холиқов, Ҳ. Кушиев, Т.Кулиев тамонидан яратилган. Бошоқ ранги ва дони буғдойранг – оқ, бошоғи қилтиқсиз. 1000 дон оғирлиги 40 -43 граммни ташкил этади. Пояси бақувват ётиб қолишга чидамли. Совуқ, касалликларга ва шўрга чидамли. Экиш меъѐри шўр ерга 3,5 – 4,0 млн, шўрланмаган ерга 2.8-3 млн унувчан уруғни ташкил этади.

Сайхун - Х.Холиқов, Ҳ. Кушиев, Т.Кулиев тамонидан Сирдарѐ вилояти шароитида яратилган. Пояси ётиб қолишга чидамли. Юқори шўрланган тупроқ шароитида ҳам яхши ривожланади. Шўрланган тупроқ шароитида экиш меъѐри 3,5- 4,0 млн, шўрланмаган шароитда эса 3,0 – 3,5 млн ташкил этади. Шўрланган шароитда сентябр ойининг биринчи ярмигача бўлган муддатда экилса ҳосилдорлиги шўрланмаган тупроқ шароитдагидек кўрсаткични ташкил қилади.

Тажрибаларга танланган бугдой навларининг уруглик донларини ишлов бериш учун ширинмия усимлиги илдизидан Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Биоорганик Киме институти томонидан тайёрланган техник глицирризин кислотаси ва Гулистон давлат универсиететида мис микроэлементининг азотли минерал ўғити эритмаси муҳитида тайёрланган компонентлардан фойдаланилди

Бугдой донини сунъий зарарлантириш учун қорақуянинг табиий популяциялари спораларидан фойдаланилди. Бунинг учун қорақуя билан касалланган бугдой нихолларидан қорақуя споралари йигиб олиниб, герметик кавшарланган идишларда музлатгичларда сакланиб, улардан тажрибалар давомида фойдаланилди.

2.2.Тадқиқот усуллари.

Техник глицирризин кислотасининг эритмасини тайёрлаш. Техник глицирризин кислотасининг эритмаларини тайёрлашда дистилланган сув ва препаратнинг аналитик тарозида керакли микдордаги массалари тортиб олинди. Техник глицирризин кислотасининг тортиб олинган микдори тулик эригунча магнитли аралаштиргичда айлантирилди.

Мис микроэлементли азотли компонентининг 0,1, 0,05, 0,01, 0,001%ли эритмаларини тайёрлаш. Бунинг учун компонентнинг керакли микдори аналитик тарозида тортиб олиниб дистилланган сувда суюлтирилди. Тайрланган эритмалардан лаборатория ва дала шароитларида фойдаланилди.

ДКМ-1 препаратини тайёрлаш. Техник глицирризин кислотаси 0,5%ли ва Мис микроэлементли азотли компонентининг 0,01%ли эритмаларининг 1:1 нисбатдаги композицияларидан тайёрланади. Бунинг учун техник глицирризин кислотасининг 1%ли эритмасидан, мисли компонентининг 0,02%ли эритмасидан бир хил микдордан олиб аралаштирдик. Аралашма 70 градусли ароратда 60 минут мешалкада айлантирилди ва 30 минут тинч холда сакланиб ва яна 60 минут 70 градусли хароратда мешалкада аралаштирилди. Тайёрланган композициядан лаборатория ва дала тажриба майдонларида фойдаланилди.

Тажрибалардан композициялардан фойдаланишдан 20 литр эритмани 1 тонна уруглик донга ишлатиш микдорига амал килинди.

Бугдой нихолларини қоракуя билан сунъий зарарлантириш. Бугдой нихолларини қоракуя споралари билан сунъий тарзда зарарлаб препараталарнинг таъсирини урганиш учун қоракуя спораларини талк билан 1:50 нисбатда аралаштирдик. Сунгра бугдой нихолларини оддий сув билан намладик. Сунгра талк ва қоракуя аралашмалрини намланган бугдойга сепдик. Лаборатория шароитида тувакларда устирилган бугдой нихолларини полиэтиленга ураб музлатгични пастки кисмида 5 кун сакладик ва 5 кундан сунг хона 25 градусли лаборатория шароитида кузатдик. Дала шароитида эса кечки пайт қоракуя спорали талк сепилган нихоллар полиэтилен билан 5 кун давомида ёпиб куйилди. (Полиэтелен билан уралиши ёки ёпилишига сабаб, нихоллар баргида қоракуя спораларини усиши учун намликни тутиб туриш эди). 15 кундан сунг хам лаборатория ва хам дала шароитида нихолларни қоракуя билан зарарланиш даражалари урганилиб, натижалар кайд килинди.

2.3 . Бугдой касалликларини ўрганиш

Охириги йилларда Марказий Осиё шароитида бугдой нихолларини замбуруғли касалликлар (Барг доғланиши, септориоз, занг, қоракуя ва бошқалар) билан касалланиш ҳолатлари ҳосилдорлик ва ҳосил сифатини пасайишига сабаб бўлиши билан, мамлакатларнинг иқтисодиётига салбий таъсир кўрсатмоқда. Бунинг олдини олиш имкониятларини аниқлаш ёки қарши курашиш усулларини ишлаб чиқиш учун энг аввало касалликларни ривожланиш босқичлари ва биологиясини тўлиқ билиш муҳим аҳамиятга эга. Шунга асосан Мирзачўл воҳаси шароитида бугдойда учрайдиган касалликларни аниқлаш мақсадида “Экспериментал биология” лабораторияси қошидаги “Шўрга чидамли ўсимликлар генбанки”да мавжуд

коллекцион тўпладан касалликлар тутқичлари сифатида белгиланган буғдойнинг дастлабки авлодлари ва юмшоқ буғдой навларида касалликларни ривожланишини аниқладик (2.1-2.2 жадвал).

2.4.ДКМ-1 препаратини буғдойнинг қорақуя замбуруғли касалликларига таъсирини ўрганиш.

Маълумки, мис ва унинг бирикмалари ўсимликларни ўсиш ва ривожланишида, яъни, нафас олиш, азот алмашиниш, хлорофилнинг ҳосил бўлишида ва шунингдек, замбуруғли касалликларга қарши таъсир этиш хусусиятлари билан тавсифланади.

Замбуруғли касалликларга қарши кўрашда чидамли навлар яратиш билан бирга кимёвий воситалардан ҳам фойдаланилади. Бу ўринда шуни қайд этиш лозимки, қишлоқ хўжалигида экиладиган юқори сифатли дон берувчи буғдой навлари орасида замбуруғли касалликларга чидамлилари жуда камдир.

Шунга асосан биз ушбу ишда ТГК ва мис асосли компонент (МК) дан кузги буғдойнинг ўсиши ва ривожланиши ҳамда уларни қорақуя касаллигига қарши таъсирини ўргандик. Бунинг учун ТГК ва мис асосли компонентлар эритмаларини ҳар хил процент концентрацияларда тайёрлаб, уларни алоҳида-алоҳида ва биргаликдаги композициялари билан буғдой донига экишдан олдин ишлов бериб ва вегетатив ривожланиш жараёнида қўллаш асосида таъсир эффектини кузатдик.

2.5.Кузги буғдойнинг биологик белгиларига ТГК,Мква уларнинг композицияларини таъсирини ўрганиш

Кузги буғдойнинг Сайхун ва Боёвут-1 навларининг уруғлик донлари дала тажриба майдонларига экишдан олдин қаттиқ қорақуя споралари билан зарарлантирилди, ТГКнинг 3%, 1% ва 0,5%ли эритмалари билан ҳамда мис асосли компонент(МК)нинг 0,5%, 0,1%, 0,01 ва 0,001%ли эритмалари билан алоҳида ва улардан 1:1 нисбат ҳажмда тайёрланган ТГК:МК (3%:0,5%, 1%:0,1%, 0,5%:0,01%, 0,5%:0,001%) композициялар билан ишлов берилди. Препаратлар ва уларнинг композициялари билан ишлов берилган буғдой

навларининг онтогенетик ўсиш ва ривожланиш босқичларида фенологик кузатувлар олиб борилди (1-жадвал).

III. Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили.

3.1. Буғдойда кузатилган замбуруғли касалликлар.

Қорақуя касаллиги ва барг доғланиши Ўзбекистон шароитида буғдой ниҳолларида учрайдиган ва кенг тарқалган замбуруғли касалликлардандир. Биз кузатган буғдойнинг ёввойи авлодларининг Тритисум монососиум субсп. боеотисум (300129), Тритисум монососиум субсп. боеотисум (300131), Тритисум монососиум субсп. боеотисум (500144), Тритисум тимопҳеевисубсп. Арарати Сим (500252), Тритисум урарту (500254), Тритисум тимопҳеевисубсп. Арарати Сим (500257), Тритисум тимопҳеевисубсп. Арарати Сим (500258), Тритисум урарту (500260), Тритисум тимопҳеевисубсп. Арарати Сим (500336), Тритисум монососиум субсп. боеотисум (500337), Тритисум монососиум субсп. боеотисум (500337), Тритисум монососиум субсп. боеотисум (601128), Тритисум тимопҳеевисубсп. Арарати Сим (601133), Ҳаурани, Себоу, Чам 1 каби намуналарида қорақуя касаллиги, Ҳаурани, Тритисум монососиум субсп. боеотисум (601129), Тритисум тимопҳеевисубсп. Арарати Сим (601133), Тритисум монососиум субсп. боеотисум (601128), Тритисум тимопҳеевисубсп. Арарати Сим (500336), Тритисум урарту (500254), Тритисум тимопҳеевисубсп. Арарати Сим (500255), Тритисум монососиум субсп. боеотисум (300132), Тритисум монососиум субсп. боеотисум (300101), Тритисум монососиум субсп. боеотисум (300129) намуналарида барг доғланиш касаллиги, Тритисум монососиум субсп. боеотисум (300130), Тритисум монососиум субсп. боеотисум (50014), Тритисум тимопҳеевисубсп. арарати Сим (500252), Тритисум урарту (500254), Тритисум тимопҳеевисубсп. арарати Сим (500255), Тритисум тимопҳеевисубсп. арарати Сим (500257), Тритисум тимопҳеевисубсп. арарати Сим (500258), Тритисум урарту (500260), Тритисум тимопҳеевисубсп. арарати Сим (601141), Тритисум монососиум субсп. боеотисум (601135) намуналарида

септориоз касаллиги, Тритисум тимопхеевисубсп. Арарати Сим (601141), Тритисум урарту (500254), Тритисум тимопхеевисубсп. Арарати Сим (500255), Тритисум монососиум субсп. боеотисум (500144) намуналарида эса қорақуя касаллиги аломатлари мавжудлиги аниқланди. Ушбу ўрганилган намуналарда асосан қорақуя касаллиги 30-60%, барг доғланиши касаллиги 15-20%ни, септориоз касаллиги эса 45-50%ни ташкил этди.

Касаллик аломатлари тутқичлари сифатида жалб қилинган юмшоқ буғдойнинг айрим намуналарида ҳам асосан худди буғдойнинг ёввойи авлодларида кузатилган касалликлар кузатилди (2 жадвал).

Ушбу кузатув натижалари асосида қайд этиш мумкинки, буғдой Ўзбекистон шароитида занг, септориоз, барг доғланиши касаллиги билан бирга қорақуя касаллиги билан ҳам касалланиш ҳолати учрайди. Бу ғаллачиликка энг хавфли касаллик бўлиб, унинг таъсирида ҳосилдорлик бутунлай йўқолиши билан бирга инсон саломатлиги учун зарарли оқибатларни ҳам юзага келтириши мумкин. Гарчи, ушбу касалликка нисбатан қарши кўраш чоралари ишлаб чиқилган ва у самарали натижа бераётган бўлсада, ушбу касалликка қарши ишлатилаётган фунгицидлар асосан четдан олиб келинаётгани ва айрим ҳолатларда бу фунгицидларнинг таъсир самараси камлиги ёки замбуруғнинг ушбу препаратларга нисбатан мослашиш ҳолатлари кузатилмоқда.

Юқорида қайд этилган маълумотлар асосида шуни қайд этиш мумкинки, буғдойнинг замбуруғли касалликларига қарши кураш воситалари ва чоралари топиш ва улардан ўринли тарзда фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун бугунги кунда фан олдида юқори самарали ва экологик хавфсиз препаратлар яратиш йўналишларида муҳим вазифалар мавжуд. Айнан шунга асосан ушбу ишда буғдойда учровчи замбуруғли касалликларга, жумладан, қорақуя касаллигига қарши табиий хом ашёлардан фойдаланган ҳолда экологик хавфсиз препарат яратиш ва ундан фойдаланишни йўлга қўйиш вазифаси қўйилган.

2.1.жадвал. Буғдойнинг ёввойи авлодлари

<i>№</i>	Коллекц ион	Латинча номи	Келиб чиқиш	Қорақуя е	Септор иоз	Барг доғлани	Қорак уя
----------	----------------	--------------	-------------	--------------	---------------	-----------------	---------------------

	рақами					ши	
1	300101	Triticum monococium cubsp.boeoticum	Азәрбайжон			X	
2	300129	Triticum monococium cubsp.boeoticum	Арманистон			X	X
3	300130	Triticum monococium cubsp.boeoticum	Арманистон		X		
4	300131	Triticum monococium cubsp.boeoticum	Арманистон				X
5	300132	Triticum monococium cubsp.boeoticum	Арманистон			X	P
6	500144	Triticum monococium cubsp.boeoticum	Арманистон	X	X	0	X
7	500252	Triticum timopheevicubsp. ararati Cim	Азорбойжон		X	0	X
8	500254	Triticum urartu	Арманистон	X	X	X	X
9	500255	Triticum timopheevicubsp. ararati Cim	Арманистон	X	X	X	P
10	500257	Triticum timopheevicubsp. ararati Cim	Азорбойжон		X	0	X
11	500258	Triticum timopheevicubsp. ararati Cim	Азорбойжон		X	0	X
12	500260	Triticum urartu	Арманистон		X	0	X
13	500336	Triticum timopheevicubsp. ararati Cim	Арманистон			X	X
14	500337	Triticum monococium cubsp.boeoticum	Арманистон				X
15	500338	Triticum timopheevicubsp. ararati Cim	Арманистон				P
16	601128	Triticum monococium cubsp.boeoticum	Арманистон				X
17	601129	Triticum monococium cubsp.boeoticum	Арманистон			X	X
18	601133	Triticum timopheevi cubsp. ararati Cim	Арманистон			X	
19	601134	Triticum monococium cubsp.boeoticum	Арманистон				P
20	601135	Triticum monococium cubsp.boeoticum	Арманистон		X		P
21	601137	Triticum monococium cubsp.boeoticum	Арманистон				P
22	601141	Triticum	Арманистон	X	X		P

		timopheevicubsp. ararati Cim					
23	601142	Triticum monococium cubsp.boeoticum	Арманистон				<i>P</i>
24	601143	Triticum monococium cubsp.boeoticum	Арманистон				<i>P</i>

3.2.ДКМ-1 препаратини буғдойнинг ўсиш-ривожланиш ва замбуруғли касалликларига қарши таъсири

Тажрибалар давомида кузги буғдойнинг Сайхун, Боёвут-1 навлари донларини экишдан олдин ТГКнинг 3%, 1% ва 0,5%ли эритмалари билан ҳамда мис асосли компонент(МК)нинг 0,5%, 0,1%, 0,01 ва 0,001%ли эритмалари билан алоҳида ва улардан 1:1 нисбат ҳажмда тайёрланган ТГК:МК (3%:0,5%, 1%:0,1%, 0,5%:0,01%, 0,5%:0,001%) композициялар билан ишлов бердик. Бунинг учун уруғлик донни экишдан олдин 1 тонна дон учун 20 литр ҳажмий кўрсаткичда ҳар бир эритма ва уларнинг композициялари билан алоҳида-алоҳида аралаштирган ҳолда ишлов бериб экишга тайёрладик. Ушбу концентрацион кўрсаткичларни лаборатория шароитида буғдой навларини петри идиши ва тупроқли тувакда унувчанлиги ва ривожланиши босқичларини ўрганиш асосида танлаб олдик. Яъни петри идишида барча ҳолларда эритмаларнинг концентрацияси ортиши билан буғдойнинг унувчанлик даражаси камайиб, ривожланиш даражаси сўсайиб борди. Юқорида қайд этилган концентрацияларда эса назоратдагига кўра яхши ёки бир хил кўрсаткичларни намаён этди.

ТГКнинг 3, 1 ва 0,5%ли, МКнинг 0,5, 0,1, 0,01% ва 0,001%ли концентрациялари билан буғдой дони ишлов берилиб лаборатория шароитида унувчанлиги ҳамда ўсиш ва ривожланишида ўзига хос натижалар олишга эга бўлдик. Бунда буғдойнинг эритмалар ва уларнинг композициялари билан ишлов берилган буғдой донлари тупроқли тувакларга экилганда кўпгина белгилари ижобий кўрсаткичларни берди ва шунинг учун

биз дала тажриба тадқиқотлари учун ушбу кўрсаткичга эга бўлган концентрацияларни танлаб олдик.

Лаборатория шароитида олиб борилган тадқиқотлар асосида биз буғдойнинг замбуруғли касалликларига (қорқуя, барг доғланиши, қорақуя) қарши таъсир этиш хусусиятига эга бўлган ТГК ва МК комплексли бирикманинг (0,001%ли МК ва 1%ли ТГК) самарали таъсир этиш хусусиятилари асосида танлаб олдик.

0,001%ли МК ва 1%ли ТГК таркибли комплекс бирикманинг Ўзбекистон Республикаси ФАнинг академик О.С.Содиқов номидаги биоорганик кимё институти фармакология лабораториясида ўтказилган таҳлиллар асосида атроф муҳитга, инсон соғлигига, иссиқ қонли ҳайвонларга нисбатан заҳарсиз ва ўсимлик маҳсулотлари таркибида заҳарлилик хусусиятларини намаён этмасилиги бўйича хулосага келдик ва бу комплекс бирикмани кам заҳарлилик хусусиятига эга бўлган моддалар синфига киритдик.

3.3. Кузги буғдойнинг биологик белгиларига ТГК,Мква уларнинг композицияларини таъсири.

Кузги буғдойнинг биологик белгиларига ТГК,Мква уларнинг композицияларини таъсирини ўрганиш қуйидаги натижаларни берди:

2-жадвал. ТГК ва МК препаратлари ҳамда уларнинг композицияларини буғдойнинг ўсиш ва ривожланишига таъсири

	Ўсимлик бўйи	Тупланиш сони	1 та бошоқ оғирлиги	1 та бошоқдаги дон сони	1000 та дон оғирлиги	Замбуруғли касаллик (%)	
						қорақуя	қорақуя
Боёвут-1							
Назорат	106	5	3	46	43,3	5	20
3% ли ТГК эритмаси	95,6	4,5	2,4	44	43	5	10
1% ли ТГК	96	5	2,8	46	43,5	5	10

эритмасы							
0,5% ли ТГК эритмасы	98,7	5,2	3	48	51	5	10
МКнинг 0,5% ли эритмасы	75	3,5	2,8	46	45	0	0
МКнинг 0,1% ли эритмасы	81	4	3,2	48,5	51	0	0
МКнинг 0,01% ли эритмасы	85	5,2	3,1	49	52	0	0
МКнинг 0,001% ли эритмасы	85	5,4	3,1	50	52,1	0	0
ТГК:МК (3%:0,5%)	84,2	3,2	2,3	43	41,3	0	0
ТГК:МК (1%:0,1%)	86	4	2,5	43	43,5	0	0
ТГК:МК (0,5%:0,01 %)	92	5,9	3,3	52,3	53,8	0	0
ТГК:МК (0,5%:0,01 %)	93,2	5,9	3,4	53	53,9	0	0

Сайхун

Назорат	89	3,8	2,3	45,7	43,5	10	30
3% ли ТГК эритмасы	80,2	3,3	2,3	42,1	42,2	10	10
1% ли ТГК эритмасы	82,8	3,8	2,8	45,5	44	10	10
0,5% ли ТГК эритмасы	83,5	4,1	3	45,7	44,6	10	20
МКнинг 0,5% ли эритмасы	75,6	3,2	2,2	44	43	0	0
МКнинг 0,1% ли эритмасы	78,3	4	2,8	46	44	0	0
МКнинг	80	4,9	3	47,1	48	0	0

0,01% ли эритмаси							
МКнинг 0,001% ли эритмаси	83	5,1	3,2	47,8	48,2	0	0
ТГК:МК (3%:0,5%)	74	3,2	2,1	42,2	41,3	0	0
ТГК:МК (1%:0,1%)	78	4	2,8	44	45	0	0
ТГК:МК (0,5%:0,01%)	82	5,2	3,1	51	49,5	0	0
ТГК:МК (0,5%:0,01%)	83,1	5,2	3,2	47,9	48,2	0	0

Олинган натижалардан маълум бўлдики, барча ҳолларда препаратлар юқори концентрацияда буғдойнинг ўсиш ва ривожланишига салбий таъсир этади. Яъни тажриба давомида ТГК ҳам ва МК ҳам олинган юқори концентрацияларда (3% ва 0,5%) ҳамда уларнинг композицияларида (3%:0,5%) буғдойнинг ўсиш ва ривожланишида назоратга нисбатан паст кўрсаткичлар кузатилди. Олинган концентрацияларнинг пасайиши билан эса буғдойнинг биологик ривожланишида ижобий ўзгаришлар юзага келишига сабаб бўлди. Бунда ТГК эритмасининг 0,5%ли, МК эритмасининг 0,01%ли концентрацияси ҳамда уларнинг 1:1 нисбатда олинган композицияларида буғдойнинг ўсиш ва ривожланиши ҳамда ҳосилдорлик кўрсаткичи назоратга нисбатан устунликка эга бўлди.

Кузатилган натижаларнинг энг диққатга сазаворлиси шундаки, буғдойда кузатиладиган замбуруғли касалликлар, айниқса, қоракуя касаллиги ҳосилдорлик ва ҳосилнинг сифат кўрсаткичини пасайишига сабаб бўлади. Ушбу ўтказилган тажрибада эса МК билан ишлов берилган барча ҳолларда қоракуя белгилари кузатилмади. Лекин бу ўринда шуни қайд этиш лозимки, қоракуя касаллиги назорат билан солиштирилганда фақат ТГК билан ишлов берилганда касалланиш ҳолатларининг камаймаганлиги кузатилди. Таркибидан мис микроэлементли бирикма ҳамда мис микроэлементли бирикма билан бирга ТГК бўлган композициялардан қоракуя белгилари кузатилмади. Демак, МК ва ТГКнинг композицион аралашмалари буғдойни замбуруғли касалликлардан ҳимоя қилишда самарали таъсир этувчи препарат сифатида қўлланилиши мумкин экан.

Биз ушбу ишда ўрганилаётган препаратлар ва уларнинг композициялари таъсири буғдойнинг ўсиш ва ривожланиши билан бирга энг муҳим бўлган қоракуя касаллигига бўлган таъсирини ўрганиш ҳам асосий мақсадлардан бири эди. Шунинг учун биз буғдойнинг ўсиш ва ривожланиш босқичларида ТГК ва МК ҳамда уларнинг композицияларининг таъсирини бошқа навларда ҳам кузатдик.

ХУЛОСА

1. Ҳисобот йили давомида дала шароитида экилган буғдой навлари ҳамда замбуруғли касалликлар тутқичлари сифатида танланган буғдойнинг ёввойи авлодлари ва юмшоқ буғдой намуналарини ўсиш-ривожланиш босқичларини кузатиш асосида минтақада буғдой ниҳоллари септориоз, барг доғланиши, қоракуя, сариқ ва кўнғир қоракуя касалликлари билан касалланишлари аниқланди.
2. Буғдойнинг ривожланишига қарши таъсир этувчи стресс омиллар таъсири шароитида буғдойни ривожланишини авжлантирувчи глицирризин кислотасининг хусусиятлари аниқланди.
3. Ширинмия ўсимлиги илдизидан таркибида буғдойни ўсиш ривожланишини авжлантирувчи глицирризин кислотаси бўлган техник глицирризин кислотаси (ТГК) олиш технологиясини ишлаб чиқилди.
4. Қоракуя, септориоз, барг доғланиши ва қоракуя касалликларига қарши таъсир хусусиятига эга бўлган, таркибида мис микроэлемент тутувчи компонент ўрганилиб, уни олиш технологияси ишлаб чиқилди.
5. Буғдойни ўсиш-ривожланишини авжлантириш хусусиятига эга бўлган таркибидан глицирризин тутган ТГК ва замбуруғли касалликларга қарши таъсир хусусиятига эга бўлган таркибида мис микроэлементи тутган МК асосида қоракуя, септориоз касалликларига қарши самарали таъсир этувчи ТГК:МК комплексининг оптимал концентрациялари аниқланди.
6. Буғдойни ўсиш-ривожланишини авжлантириш хусусиятига эга бўлган ва ўзида замбуруғли касалликларга қарши таъсир хусусиятларини мужассамлаштирган ДКМ-1 препаратини олиш технологияси стандартлаштирилди.

Адабиётлар

1. КИНТЯ, П.К., ЛАЗУРЬЕВСКИЙ, Г.В., БАЛАШОВА, Н.Н. и др.
Строение и биологическая активность стероидных гликозидов ряда спиростана и фуростана. *Кишинев: «Штиинца», 1987, 144с.*
2. КИНТЯ, П.К. Природные биорегуляторы стероидного типа в сельском хозяйстве. // *2-я Международная конф.: «Регуляторы роста и развития растений». Тез. докл. Москва, 1993, Ч. 1, С. 97.*
3. ЖАКОТЭ, А.Г., ШВЕЦ, С.А., КИНТЯ, П.К. Индуцирование обшей неспецифической устойчивости сельскохозяйственных растений к неблагоприятным факторам среды природными стероидными биорегуляторами. // *2-я Международная конф.: «Регуляторы роста и развития растений». Тез. докл. Москва, 1993, Ч. 1, С. 92.*
4. ЛУПАШКУ, КИНТЯ, П.К. Регуляторный эффект Павстима в повышении адаптивных свойств растений. // *2-я Международная конф.: «Регуляторы роста и развития растений». Тез. докл. Москва, 1993, Ч. 1, С. 102.*
5. Удовенко Г.В. Устойчивость растений к абиотическим стрессам // Физиологические основы селекции. Теоретические основы селекции, Т. II, ч. II. С-Пб.: ВИР. –1995. –С.293-352.
6. Шевелуха В.С. Рост растений и его регуляция в онтогенезе. М.: Колос.– 1992. –594 с.

7. ЖАКОТЭ, А.Г., ЕССАМ, А.Е., ЕНАКИ, Р.М. и др. Антимутагенная активность стероидных гликозидов. // *4-я Международная конф: «Регулятор роста и развития растений». Тез. докл., Москва, 1997, С.278.*
8. КИРИЛОВ, А.Ф., ТОМА, С.И., КИНТЯ, П.К., КОЗМИК, Р.А. и др. Физиологическое действие биорегулятора стероидной природы Молдстим на виноградные растения // *Известия Академии наук Молдовы. Биологические, химические, и сельскохозяйственные науки. Физиология și биохимия plantelor, Chișinău, 2002, Nr.4(289), p. 18-24.*
9. Шакирова Ф.М. Неспецифическая устойчивость растений к стрессовым факторам и ее регуляция. Уфа: Гилем, 2001. 160 с.
10. Третьяков Н.Н., Карнаухова Т.В., Гаркавенкова А.Ф. Физиологические реакции двух сортов люцерны на затопление // *Генетика, физиология и селекция зерновых культур. М.: -1986. –С. 218-219.*
11. Третьяков Н.Н., Кузнецов В.В., Холодова В.П. и др. Устойчивость сортов яровой пшеницы к абиотическим стрессам. *Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Вуп. 4. Москва: Изд-во МСХА, -2003. –С. 71-88.*
12. Лавронов Г.А. Пшеница в Узбекистане. Ташкент. 1969 г. С.34.
13. ПОКРОВСКИЙ Н.В., КАТКОВА П.О., КИСЛЮК А.З. Итоги селекционных работ по введению новых сортов пшеницы, устойчивых к желтой ржавчине // *В кн.: Возделывание зерновых и кормовых культур на богаре Узбекистана.- Ташкент: Фан. 1970.- СД09-114.*

14. Удачин Р.А., Шахмедов И.Ш.. Пшеницў в средней Азии. Ташкент издательство «ФАН» 1984. С.134.
15. Якубцинер М.М. Оценка засухоустойчивости мировой коллекции яровой пшеницў. «Колос», М., 1970, С. 44-55.
16. Вареница Е.Т., Кочетўгов Г.В. О закономерностях формообразования в гибридных популяциях рецпрокўх и возрастнўх внутривидовўх скрещиваниях яровой мягкой пшеницў. ВАСХНИИЛ. 1978. №1, С. 4-6.
17. Пингали П., анд П.В.Хеисей. Сereal crop productivity and development countries: Past trends and future prospects. In Global Agricultural Science Policy for the Twenty-First Century. Melbourne, Australia: Natural Resources and Environment. 1996. p/51-94.
18. Френч Р.С., Галлимер М.Д. Эффект оф претреатмент витх стимулятед анд вапер вапорс он субсекуент герминатион анд инфестивитї оф уредоспорес оф Пуссина граминис вар. тритиси //Пхїтопатхологї. 1972. Вол.62. П.116-119.
19. Френч Р.С. Стимулятион оф уредоспор герминатион ин вхеат стем руст бї терпенс анд релатед сомпоундс //Бот. Газ. 1961. Вол.122. П.194-198.
20. Ван Сумере С.Ф., Ван Сумере-Де Претер С., Ледингхам Г.А. Селл валл сплиттинг ензїмес оф Пуссина граминис вар. тритиси //Санад. Ж. Мисробиол. 1957. Вол.3. П.761-768.
21. Реисенер Х.Ж., МсСоннелл В.Б., Ледингхам Г.А. Эффект оф шортчаин фаттї асидс он респиратион оф вхеат стем руст уредоспорс //Санад. Ж. Мисробиол. 1957. Вол.7. П.865-868.
22. Шу П., Таннер К.Г., Ледингхам Г.А. Студїес он тхе респиратион оф рестинг анд герминатинг уредоспорес оф вхеат стем руст //Санад. Бот. 1954. Вол.32, П.16-23.
23. Шу П., Ледингхам Г.А., Неиш А.С. Утилизатион оф аддед субстратес уредоспорес оф вхеат стем руст //Ибид. 1956. Вол.2. П.559.

24. Зарубайло Т.Я., Таврин Э.В. Новѳе аллогексаплоидѳ, их плоидность и устойчивость к болезням // Бюл. ВИР. 1972. Вѳп.25. С.30-35.
25. Хоуген Ф.В., Граиг Т.Б., Ледингхам Г.А. Тхе оил оф вхеат стем руст уредоспорес. И. Тхе стерол анд саротенес оф тхе унсапониѳиабле маттер // Санад Ж. Мисробиол. 1958. Вол.4. П.521.
26. Купревич В.Ф. Физиология больного растения. М.: Изд-во АН СССР, 1947ю 300 с.
27. Кокин А.Я. Физиологические обоснования вредоносности ржавчинѳ // Ржавчина зерновѳх культур: Работѳ Первой Всесоюз. Конф. По борьбе с ржавчиной зерновѳх культур. М.: Сельхозгиз, 1939. С.329-347.
28. Кокин А.Я. Физиологические и анатомические исследования больного растения. Петрозаводск: Каргосиздат, 1948. 212 с.
29. Воронкова А.А. Генетико-иммунологические основѳ селекции пшеницѳ на устойчивость к ржавчине. М. Колос, 1980. С.182.
30. Крупнов В.А. Проблемѳ подбора доноров для беккросной селекции пшеницѳ на устойчивость к вредителям и болезням. В кн: Генетические ресурсѳ и селекция растений на устойчивость. Тез.докл. 9-конгресс ЕУКАРПИА. Л.1980, С.56.
31. Мозгова А.Ф. Создание устойчивѳх к болезням сортов озимой пшеницѳ. В кн: УП Всесоюзное совехание по иммунитету с/х-нѳх растений к болезням и вредителям: Тез.докл. Новосибирск, 1981, С.156.
32. Мустаѳаев И.Д., Ибрагимов А.И. Изѳскание новѳх источников устойчивости пшеницѳ к грибноѳм болезням в Азербайджане. Труд.по прикл, бот ген и сель. Л. ВИР 1977, т.58, вѳп.3, С.37-40.
33. Мешкова Л.В. Популяционно-генетическая характеристика возбудителя бурой ржавчинѳ пшеницѳ и генофонд устойчивости к нему в Западной Сибири. Автореф. дисс.к.биол.наук Л 1979, С.17.
34. Пежемская Т.А., Мочалева Л.И. Метод создания иммунного к ржавчине исходного материала яровой пшеницѳ. Селекция и семеноводство. М. 1980, №8, С.23-24.

35. McVey D.V. «Genes for rust resistance in International W.W.Nur.12 тхроугх 17. Сроп Сси 32: 1992. р/891-899.
36. Аманов А, Хюфлер Ф, Гафурова Л.А, Нурбеков А.И. Состояния и перспективў производства пшеницў в Узбекистане. Вес. 2004. №2, С.56.
37. Сингх Р.П., С.Ражарам, А.Миранда, Ж.Хуерта-Еспино анд Е.Аутрискуе, «Сомпарисон оф тво сроссинг анд фоур селестион счемес фор йиелд, йиелд траиц, анд слон рустиг ресистансе то леаф руст ин вхеат» Wхеат проспесц фор глобал импровемент. Анкара Туркей 1996.
38. Аманов А.А, Сиддиқов Р.Э. Буғдойнинг сарик, кўнғир ва қорақуя касалликлари ҳамда уларга қарши кураш омиллари. Пахтачилик ва дончилик. Журнал. 2000. 33-34 бетлар.
39. Полевой В.В. Физиология растений. –М.: Вўсшая школа, 1989.-464с
40. Пересўпкин Ф. Болезни зерновўх культур. М.Колос1979 С.279
41. Лукьяненко П.П. «Итоги селекции озимой пшеницў на Кубани» Ж., «Селекция и семеноводства» 1975 №5. С.18-21.
42. Байгулова Г.К., Питоня А.А. «Оценка сортов и гибридов пшеницў на устойчивость к ржавчине» В книге. «Материалў науч. мет. Совета Ср. Аз.го селекцентра по зерновўм, зернобобовўм и кормовўм культурам». Т. 1978. С. 56-59.
43. ШАВАРИНА З.А. Желтая ржавчина пшеницў Пуссиниа стриформис Вест, в республиках Средней Азии и Южном Казахстане : Автореф. дисс..Канд. Биол. Наук.- Тошкент, 1979.- С.23.
44. Хохлачева В., Моргунов А.И., Колбаева Н., Мавжудова А.У. «Желтая ржавчина пшеницў в Узбекистане и мерў борьбў». Вестник №1 Алматы. 2002. С.46-49.
45. Хефтманн Э. Стероидў в книге «Биохимия растений» под ред. В.Л.Кретовича.- Москва: Мир. 1968. - С.421-436.
46. Муравьева Д.А. Фармакогнозия. - Москва: Медицина, 1976. - 295с.

47. Фармакогнозия. Атлас под ред. Гринкевич Н.И., Ладѳгиной Е.Я.
- 48.И.Видаль. Справочник. -Москва: Астрафармасервис.2004. — 1536с.
- 49.Красова Т.Г., Башура П.С., Муравьев И.А. // Фармация.- 1978.- Т. 27.- С. 32-35.
- 50.Волотовски И.Д., Соколовски С.Г., Никифоров Л.М., Зинченко В.П. Ca^{2+} анд интраселлулар сигналимг ин плант селл. // Ж.Пхоточем. анд Пхотобиол. Б: Биол. 1993.-В.20.-П. 95-100.
- 51.Толстиков Г.А., Балтина Л.А., Шульц Э.Э. и др. Глицирризиновая кислота. // Биоорганическая химия. 1997.1.23. - 9. - С.691 - 709.
- 52.Красова Т.Г., Башура П.С., Муравьев И.А. // Фармация.- 1978.- Т. 27.- С. 32-35.
- 53.Кондо М., Минамино Х., Окияма Г. ет.ал. Чемисал модифисатион оф глїсїррхетинис асид ин релатион то тхе биологисал астивитиес. // Ж.Сос.Сосмет.Чем. 1996. -В.37.-П.177-189.
- 54.Лукиянова С.В., Тойчиев А.А. ,Далимов Д.Н., Гагельганс А.И., Тонких А.К. Действие глицирризиновой кислотѳ на растения. //Химия природнѳх соединений.2001. Спец вѳпуск.с.14-15 (19)
- 55.Лукиянова С.В., Тойчиев А.А.,Джураев А.Д., ,Далимов Д.Н., Тонких А.К. Действие глицирризиновой кислотѳ на рецепторѳ для фитогормонов. //Химия природнѳх соединений.2002. Спец вѳпуск.с.14-15(20)
- 56.Тойчиев А.А., Лукьянова С.В., ,Далимов Д.Н., Тонких А.К. О регулировании кальцевого гомеостаза растительнѳх клеток глицирризиновой кислотой. //Химия природнѳх соединений.2002. Спец вѳпуск.с.66-67.(21))
- 57.Мондер С.В., Стewart П.М., Лакшми В.Р. ет.ал. Лисорисе инхибиц сортесостероид дехїдрогенасе оф роот кидней анд ливер: ин виво анд ин витро. //Ендосринологї. 1999. - В.И25. - П. 1046-1053.

58. Ишикава С., Саито Т. Тхе еффест оф глйсйррхетинис асид он тхе астион оф алдос-тероне ин стимулатинг содиум транспорт ин фрог кидней. // Ендосринол. Жпн.-2003.-В.27. -П.697-701.
59. Мори Т., Кобаояши К., Сакамаки С., Сугия Й. Чемисал модифисатион оф глйсйррхетинис асид ин релатион то тхе биологисал ативитиес. // Оё Якури. 1987. -В.34. -П.293-301.(С.А.В. 108.49307)
60. Ожима М, Шибата С. Инхибиторй еффест оф глйсйррхетинис асид деривативес он тхе стероид метаболизм. // Жпн. Ж. Пхармасол. 1990.- В. 71. - П 281-289.
61. Насўров Х.М., Лазарева Д.Н. Противоязвенная активность глицирризиновой кислотў. // Фармакология и токсикология. 1980.- Т.43.-2.-С.399-404.
62. Окичи К., Камада Г., Левине Л., Цурафуижи С. Глйсйррхетинис асид, леусосйтес анд простагландинс . //Простагландинс Мед. 1981. - В. 7. - П.457 - 463.
63. Иноуе Х., Нагата Н., Шибата С., Кошихара Й. Инхибиторй еффест оф глйсйррхетинис асид деривативес он сапсаисин-индусед еар едема ин мисе. // Жпн. Ж.Пхармасол. 1996. - В 71. - П 281-289.
64. Акамацу Х., Комура Ж., Асада Й. Фрее радисалс анд инфламатсион. // Планта Мед. 1998.-В.57.-П. 119-121.
65. Кимура М., Кимура В. Иноситол триспхоспхате анд салсиум сигналлинг. // Жпн. Ж. Пхармасол. 1995. - В.39. - П. 387-390.
66. Итох К, Нага Т., Шираиши Т. ет.ал. Еффесц оф глйсйррхизин анд глйсйррхетинис асид он (На+ К+)-АТПасе оф ренал басолатерал мембранес ин витро. // Биочем Инт. 2002.-В.И 8.- 1.-П. 81-89.
67. Бастфом Х., Берустен К., Вхитехоусе М.В. Простагландин Е анд рат ливер регенератион. // Биочем.Пхармасол. 1964. - В.13. - П. 413-416.
68. Ерофеева Л.Н., Краменко Х.Д., Семенова Н.Д., Оверлингиене И.Ф., Пискунов С.З. Новўе перспективў лечения аллергических заболеваний. // Научн.Тр. ВНИИ фармации. -1990. -Т.28. - С. 167-171.

69. Жошиока Х., Фужита Т., Жото Ш. Еффест оф натураллй осСурринг тритерпеноидс глйсьррхизис асид, олеанолис асид анд номилини он тхе иммуне сйстем. // Интернационал Ж. оф Пхйототхерапй & Пхйотопхармасологй. 2003. - В.7. - П.442-457.
70. Китагава К., Нишино Х., Ивашима А. Еффесц оф глйсьррхизае анд глйсьррхизис асид он селлулар иммуносоппетенсе ин лон-досе гамма-рай иррадиатед мисе // Онсологй. 1996. - В.43. - П.127-130.
71. Като Ж., Като Н., Морияма М. ет.ал. Интерферонс спесифисаллй суппресс тхетранслатион фром тхе интернал рибосоме енрй сите оф хепатитис С вирус тхроугх а доубле-страндед РНА-астиватед протеин кинасе-индепендент патхвай. // Ж.Инфест. Дис. 2002 - В.186. -2. - П. 155-163.
72. Кубобитз А. Супрум анд фенол сомпоундс 1978. 98 п.
73. Оргел С. Супрум анд Биохемистрий оф пхенолис сомпоундс. /Пхисиологй 1981. Пп.87-91.