

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI
VAZIRLIGI**

SAMARQAND QISHLOQ XO'JALIK INSTITUTI

Veterinariya, zootexniya va qorako'lchilik fakulteti

5620600 – Zootexniya (tarmoqlar buyicha) ta'lim yo'nalishi talabasi

Bo'riyev Jamshid Bobokulovich ning

BITIRUV MALAKAVIY ISHI

**Mavzu: « Sigirlarning sut mahsuldorligiga ta'sir
qiluvchi omillarni o'rganish »**

**Ilmiy rahbar,
q.x.f.nomzodi, dotsent**

Amirov. Sh.Q.

**Veterinariya, zootexniya va
qorakulchilik fakulteti
dekani, dotsent _____
N.O.Farmonov**

**Zootexniya, hayvonlar genetikasi va
urchitish kafedrası mudiri, dotsent
_____ Shaptakov E.S.**

« _____ » _____ 2012

« 05 » 06 _____ 2012

№ 13 sonli yig'ilish bayoni

SAMARQAND – 2012

Mundarija

	bet
Kirish	4
II. Mavzuga taaluqli adabiyotlarning tahlili va mavzuni	
o'rganilganlik darajasi	7
III. Bitiruv malakaviy ishining mavzusida qo'yilgan	
masalalar va unibajarish uslubi	11
IV. Asosiy qism.	13
4.1. Sigirlarning sut mahsuldorligiga zotining ta'siri	13
4.2. Sigirlarning sut mahsuldorligiga oziqlantirish	
omilining ta'siri	27
4.3. Sigirlarning sut mahsuldorligiga boshqa omillarning	
ta'siri.	55
4.4. Tadqiqotning iqtisodiy samaradorligi	61
4.5. Xulosa va takliflar	62
IV. Hayot faoliyati xavfsizligi va ekologik masalalar	65
VI. Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati	68

Ilovalar -----72

Kirish

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti I.A.Karimovning qator asarlari, oliy majlis qarorlari va vazirlar mahkamasining qator hujjatlarida respublikamizda olib borilayotgan siyosatni shu jumladan, chorvachilikni rivojlantirish istiqbollari o'z aksini topmoqda.

Mamlakatimiz iqtisodiy rivojlanish yo'lida adashmasdan qadamma-qadam ilgari lab bormoqda, buni boshqa davlatlarda ro'y bergan iqtisodiy inqiroz voqyealaridan xam bilsa bo'ladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, jaxon moliyaviy inqirozi bizning Mamlakatimizni chetlab o'tgan. Bu malasaga Prezidentimizning "Joxon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari" nomli asarida batafsil to'xtalib o'tgan. Jumladan, asarda davlatimiz raxbari moliyaviy- iqtisodiy inqirozning O'zbekiston iqtisodiga ta'sirini chetlab o'tishga muvofiq bo'lgan omillar xususida shunday deydi: O'zbekistonda qabul qilingan o'ziga xos islohat va modernizasiya modeli orqali biz o'z oldimizga uzoq va davomli milliy manfaatlarimizni amalga oshirish vazifasini qo'yar ekanmiz, eng avvalo "shok terapiyasi" deb atalgan usullarni bizga chetdan turib joriy etishga qaratilgan urinishlardan, bozor iqtisodiyoti o'zini o'zi tartibga soladi, degan o'ta jo'n va aldanchi tasavvurlardan voz kechdik" deb ta'kidlagan.

Chorvachilik xalq ho'jaligining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, aholining istemol qiladigan sut, go'sht, yog', tuhum, asal kabi oziq ovqat maxsulotlari bilan yengil sanoatni yesa jun, teri, mo'yna, par, pilla va boshqa maxsulotlar bilan taminlaydi.

Aholining sut va sut maxsulotlariga bo'lgan talabini qondirish chorvachilikning asosiy vazifalaridan hisoblanadi.

I.A.Karimovning 2003 yil 23 oktayabrda "2004-2006 yillarda fermer xo'jaliklarini rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida" gi farmon qabul qilindi.

Prezidentimizning 2006 yil 23 martdagi PQ -308 sonli "Shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo'jaliklarida chorva mollarini ko'paytirishni rag'barlantirishni

chora-tadbirlari to'g'risida" gi, 2008 yil 21 apreldagi PQ - 842 sonli "Shaxsiy yordmchi, dehqon va fermer xo'jaliklarida chorva mollarini ko'paytirishni rag'barlantirishni kuchaytirish hamda chorvachilik maxsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarorlari asosida chorvachilikni rivojlantirishga katta miqdorda valyuta mablag'lari ajratilib, Respublikaga xorijiy davlatlardan ko'plab nasldor tana va g'unojinlar olib kelindi. Buning natijasida o'laroq Respublikaning naslchilik bazasi kengaytirilmoqda. Chorvachilik fermer xo'jaliklari asosida naslchilik bazasini shakllantirish, naslchilik xo'jaliklari va naslchilik zavodlarini tashkil yetishda davlatning naslchilik "Oltin" fondi yaratiladi. Bundan tashqari ushbu qarorlar asosida chorvachilik fermer xo'jaliklarining ozuqa bazasidan foydalanish xuquqlari yanada mustahkamlanadi. Bu asosida yesa chorva mollarning maxsuldorligini oshirish, iqtisodiy isloxlarni yanada chuqurlashtirish, go'sht, sut, tuxum maxsulotlari hajmini ko'paytirish sohani rivojlantirishda asosiy maqsad qilib qo'yilgan. Respublikamizda 2001 -2011 yillar ichida qoramollar soni 18 % ga, jumladan sigirlar soni 27, 6 % ga, sut ishlab chiqarish 21 % ga, go'sht ishlab chiqarish 7,2 % ga ko'paydi. Chorvachilik sohasidagi ijobiy natijalar asosan shaxsiy xo'jaliklar xissasiga to'g'ri kelmoqda. Ishlab chiqarish yaxshi tashkil yetilganda yangi progressiv texnologiyalardan foydalanilganda chorva mollarning maxsuldorligini ko'tarilishi ko'pgina xo'jaliklarda o'z isbotini topgan.

Yer sharida jumladan, Vatanimizda ham aholi yildan – yilga oshib bormoqda. Hozirgi kunda olingan malumotlarga ko'ra mamlakatimizda 28 milliondan oshiq aholi yashamoqda. Aholi sonini yildan –yilga oshib borishi o'z navbatida ularning ozuqa maxsulotlariga bo'lgan talabining tobora oshib borishiga olib keladi. Bu talablarni qondirishda arzon, sifatli chorva maxsulotlarini ko'paytirish muhim ahamiyatga yega. Bulardan tashqari chorva hayvonlari go'ng kabi organik o'g'it yetkazib berish bilan birgalikda ko'pgina chorva hayvonlari turlaridan qishloq xo'jalik va transport vositasida ham foydalanilmoqda.

Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida ham katta iqtisodiy islohatlar o'tkazilmoqda. Mulkchilikning yangi shakllari tashkil yetilmoqda. Shirkat

xo'jaliklari o'rnida dehqon –fermer xo'jaliklari tashkil yetilib, kelgusida bu fermer xo'jaliklarini davr talablari asosda takomillashtirib boriladi. Keyingi yillarda chorvachilik bilan shug'ullanadigan fermer xo'jaliklariga raqobatlashib ishlash uchun bir qator xuquqiy shart sharoitlar yaratib berildi. Keyingi yillarda butun dunyo bo'ylab moliyaviy iqtisodiy inqiroz muammosini qanday yechish to'g'risida bosh qotirmoqda. Bu to'g'risida bir necha halqaro anjumanlar bo'lib o'tdi. Mamlakatimiz prezidentining tashabbusi bilan bir qator ishlar tashkil yetildi. Tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha Muhtaram Prezidentimiz I.A.Karimovning qator farmonlari va Vazirlar Maxkamasi ning qarorlari chiqdi. Prezidentimiz tomonidan 2012 yil "Mustahkam oila" yili deb yelon qilindi.

Hozirgi kunda qishloq xo'jaligining ishlab chiqarishning samaradorligini yanada oshirish muhim ahamiyatga yega yekanligini inobatga olib chorvachilik bo'yicha ishlayotgan fermer xo'jaliklariga ajratilgan yer maydonlari yanada optimallashtirish borasida katta ishlar amalga oshirilmoqdi.

Prezidentimiz I.A.Karimovning O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining majlisidagi (21 yanvar 2011yil) maruzasida ham Respublikamizda qishloq xo'jaligi, aynan chorvachilik sohasida qilingan ishlar va kelgusida qilinishi kerak bo'lgan ishlar to'g'risida to'xtalib o'tdilar. Bu o'z navbatida chorvachilikni rivojlantirish zootexniya xizmati faoliyatini yaxshilashda ijobiy o'zgarishlarga olib keladi.

Hozir Respublikamiz bo'yicha 89000 dan ortiq fermer xo'jaliklari bo'lib, shundan 13000 gi chorvachilikka ixtisoslashgandir.

Respublikamizda sut ishlab chiqarishni ko'paytirish sigirlarning maxsuldorligini oshirish bilan uzviy bog'liqdir. Mintaqamizda urchitilayotgan qoramollarning sut maxsuldorligini oshirishda, qoramollardan samarali foydalanishda unga sigirlarning sut mahsuldorligiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish, bitiruv malakaviy ishi mavzusining dolzarbligini belgilaydi. Malakaviy ishni bajarish referativ tarzda olib borildi.

2. Mavzuga taaluqli adabiyotlarning tahlili va mavzuni o'rganilganlik darajasi

Sigirlarning sut mahsuldorlik ko'rsatkichlariga ; sigirlarning zoti, individual xususiyatlari, oziqlantirish darajasi va tipi, yilning fasli, ob-havo, soig'ib olish bilan bog'liq bo'lgan xamda boshqa omillar ta'sir ko'rsatadi.

P.Sobirov va M.Norboyevalarning (2003) olib borgan ilmiy izlanishlarida, F.Qosimova nomli naslchilik xo'jaligida qizil eston zotli sigirlarni ayrim xo'jalik belgilarini tahlil qilganlar. Podadagi sigirlar ikki guruhga: past va yuqori mahsuldorlikka ajratib o'rganilgan. Past mahsuldor sigirlar tirik vazni 370 kg, sut mahsuldorligi 2630 kg, sutdagi yog' 3,7 %, oqsil 3,3 % ni, yuqori mahsuldor sigirlarniki shunga mos ravishda 450 kg, 3570 kg, 3,8 % va sof yog' chiqimi 135,7 kg ni tashkil etgan.

A.Soldatov va boshqalarning (1991) olib borgan tajribalarida, jersey zotli buqalar bilan shvis zotli sigirlarni chatishtirishdan olingan duragay sigirlar sut sog'imi nafaqat miqdori, balki barcha ko'rsatkichlari va hatto texnologik xususiyatlari bilan ham shvis zotli sigirlardan ustun bo'lgan.

M.Grin, N.Kazaroves, O.Maslyaklarning (1998) ta'kidlashicha, sut tarkibidagi moddalar bir-biri bilan korrelyativ bog'lanishda bo'ladi. Sutining tarkibidagi yog' miqdori 3,4 % bo'lganda, oqsil 3,03 %, yog' 4,39 % bo'lganda oqsil 3,45 % ni tashkil etgan. Sigirlarning sut sog'imi 2500-2999 kg bo'lganda oqsil miqdori 3,2% bo'lib, sutning miqdori oshishi bilan oqsil kam miqdorda, (0,12 % ga) ko'tarilgan. Sut sog'imi 6000 kg yetganda oqsil miqdori pasaygan. Sut sog'imi 2500-2999 kg bo'lganda sut yog'i 3,8 %, 7000 kg bo'lganda esa 4 % bo'lgan. Sut tarkibidagi moddalarni o'zaro korrelyativ bog'lanishini o'rganish kelgusida naslchilik ishlarini va ishlab chiqariladigan sut sifatini yaxshilash yo'llarini ochib beradi.

V.Blednov va boshqalarning (1996) ilmiy ishlarida, Xakasiya viloyati sharoitida qizil-ola tusli golshtin zotli buqalaridan chatishtirishda foydalanishning

maqsadga muvofiqligi aniqlangan. Simmental zotli sigirlarni golshtin buqalari bilan chatishtirishdan olingan duragay sigirlar, sut mahsuldorligi, sut berish tezligi, yelinning shakli bo'yicha simmental zotli sigirlardan ustun kelgan.

Sh.A.Akmalxonov (1993), respublikamizda sut ishlab chiqarishni ko'paytirish va sifatini yaxshilash uchun qora-ola zotli sigirlarni golshtin buqalari bilan chatishtirish lozimligini uqtiradi. Ilmiy izlanishlarda duragay sigirlarning sut sog'imi, sutning yog'lilik va oqsil darajasi oshgan. Yaxshi oziqlantirish sharoitida duragay sigirlar, sut sog'imini 298-1013 kg ortishi aniqlangan.

S.Bo'riyev (1993) tadqiqotiga ko'ra, Polsha qora-ola zotli sigirlarni golshtin buqalari bilan chatishtirish ularning sut mahsuldorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Duragay sigirlarning sut sog'imi, sof qora - ola zotli sigirlarga nisbatan 509 kg (15,39 %) ga, yog' chiqimi 20,1 kg (15,56 %) ga va sut oqsili chiqimi 18,1 kg (15,47 %) ga yuqori bo'lgan.

P.Ye.Polyakovning (1984) ta'kidlashicha, golshtino-friz zotli sigirlar yuqori mahsuldorlik ko'rsatkichlariga ega bo'lib, I laktasiyasida 6000-7000 kg, yog'liligi 3,5-3,6 % ega bo'lgan sut beradi. Bu o'z navbatida uning iydirilish xususiyati yaxshi ekanligidan darak beradi.

E.Yu.Karchevskiyning (1984) ta'kidlashicha, sutning tarkibidagi yog' asosiy seleksiya belgilaridan hisoblanadi. o'zbekistonda qora-ola zotli sigirlar sutning yog' miqdori 3,68 % bo'lib, shvis va qizil cho'l zotli sigirlarnikiga nisbatan 0,12-0,16 % ga, bushuyev zotidan esa 0,25- 0,29 % ga kam.

R.B.Davidovning (1952) fikricha, sut yo'nalishidagi sigirlar sutning tarkibidagi yog' miqdori 6-7 tug'ish yoshigacha oshib borib, so'ngra pasayib boradi.

Sh.Akmalxonov, M.Mirxidoyatov va A.Boltayevlarning (2002) ta'kidlashicha, sutning tarkibiga sigirlarning zoti, sut berish davrining davomiyligi, to'la qiymatli ratsionda boqish va asrash sharoitlari, bug'ozlik davrida tug'ishga tayyorlash va semizlik holati, yoshi, sog'lomligi, yilning fasllari, sog'imning oralig'i, to'la

sog'ilishi, kuyikish davri, tashqi muhitning harorat darajasi va boshqa qator omillar ta'sir qiladi.

Yu.Simarevning (1993) ma'lumotiga ko'ra, sutdor qoramolchilikning iqtisodiy samarador bo'lishi, sutning miqdori va sifatiga bog'liq bo'ladi. Naslchilik ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yish, sut tarkibidagi yog'lilikni 0,05 – 0,1 % ga oshirishi mumkin. Shuningdek, sutning sifatini yaxshilashda sigirlarni to'g'ri oziqlantirish muhim ahamiyatga ega. Senajli tipda oziqlantirilgan sigirlardan sog'ib olingan sutdan pishloq va saryog' tayyorlanganda, mahsulotning sifati yaxshi bo'lgan. Fermada kun tartibiga rioya qilish ham sigirlarning mahsuldorligiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilgan.

V.P.Shidlovskaya, T.I. Bezenkolarning (1992) ta'kidlashicha, sutning tarkibidagi oqsil miqdorining o'zgarishiga 50 % sigirning genotipi, qolgan 40 % oziqlantirish, sigirni fiziologik holati, saqlash tizimi, iqlim sharoiti va geografik o'rniga bog'liqdir.

P.Marchenko (1996) va A.Kathore larning (1970) fikricha, sigirlarni saqlash usullari uning sut mahsuldorligiga katta ta'sir qiladi. Sigirlar bog'lab asralganda ulardan sog'ib olingan kunlik sut miqdori, bog'lanmasdan asralgan sigirlarni sutiga nisbatan 8 kg ga yuqori bo'lgan.

V.Ulitko va boshqalarning (1997) ta'kidlashicha, karotinning beta fraksiyasi sigirlar sut mahsuldorligiga ijobiy ta'sir qiladi. Sigirlar ratsioniga mikrobiologik ozuqaviy karotin qo'shib berilishi natijasida, 100 kunlik sog'im davrida tajriba guruhidagi sigirlar, nazorat guruhidagi sigirlarga nisbatan 205 - 329 kg ko'p sut bergan. Beta karotinni ratsionga qo'shib berish, sog'ib olinayotgan sut tarkibidagi oqsil miqdoriga ham ijobiy ta'sir qilgan.

G.S.Sharafutdinov (2000), yuqori me'yorda oziqlantirish darajasining yosh mollarni o'sishi, yetilishi va tuqqanidan keyin sersut bo'lishiga ijobiy ta'sir qilishini o'z tajribasida aniqlagan. Mollarni ratsioniga 20 % omuxta yemlarni qo'shimcha berish natijasida I tug'ishdagi sigirlar, tengdoshlariga nisbatan sut sog'imini 208, 3 kg, sut yog'dorligini 0,01 % ga oshirgan. Olingan sut texnologik xususiyatlari

bo'yicha farq qilmasada, tajriba guruhidagi sigirlar sutida quruq modda 0,08 % ga, Yo.q.S.M 0,04 % ga ko'p bo'lgan.

D.Adushinov, A.Muhammadiyeva (2003) ma'lumotlariga ko'ra, Irkutsk oblastida, golshtin buqalari bilan qora-ola zotli sigirlarni chatishtirish natijasida olingan duragaylar sof qora-ola zotli tengdoshlaridan eksterer va tirik vazni, balandlik o'lchamlari, gavidani qiya uzunligi, yelin shakli, hajmi va sut mahsuldorlik ko'rsatkichlari bo'yicha ustunlikka ega bo'lgan.

A.A.Barishev va boshqalarning (1991) tajribalarida, kostroma zotli sigirlarning sut mahsuldorligi I laktasiyadan V laktasiyagacha 5942 kg dan 6725 kg gacha oshib borgan, yoki 13 % ga ko'tarilgan. Sut tarkibida yog' miqdori 3,86 % dan, 3,93 % gacha o'zgargan. Sut tarkibidagi yog' va oqsil nisbati 1 : 0,93 teng bo'lib, pishloq tayyorlash xususiyati yuqori. 1 kg 45-50 % yog'li pishloq tayyorlash uchun 8,5-9,5 kg sut sarflangan.

S.D.Do'stqulov, A.A.Rahimovlar (2004) o'z tajribalarida, qora-ola zotli sigirlarni golshtin zotli buqalar bilan chatishtirib, olingan I bug'in duragay sigirlarning I laktasiyasida sut mahsuldorligini o'rgangan. Unda sigirlarning o'rtacha tirik vazni 408 kg, laktasiyada sut mahsuldorligi 2605 kg, sut yog'i o'rtacha 3,92 %, yog' chiqimi 103 kg, sutdorlik koeffitsiyenti 680 ga teng bo'lgan.

Sutdor qoramolchilik sohasida golshtin zotli buqalardan foydalanish, sigirlarning ekstererini yaxshilab, yelinini texnologik xususiyatlari va sut mahsuldorligini oshishiga olib keladi. (V.Vilson, L.Kallas 1990, A.I.Prudov, A.G.Kozankov 1991, V.I.Vlasov, A.N.Togushov 1991, A.V.Vorobyov, P.A.Zubarev, A.V. Igonkin, G.Ye.Kossov 1990, T.G.Djaparidze, A.K.Milyukov 1992, V.B.Bliznichenko va boshqalar 1989).

Shunday qilib, sigirlarning sut mahsuldorligiga ko'p omillar ta'sir etib, ularni mutaxassislar bilishi va salbiy ta'sir etuvchi omillarni o'z vaqtida bartaraf etishi zarur.

3. Bitiruv malakaviy ishining mavzusida qo'yilgan masalalar va uni bajarish uslubi

Bitiruv malakaviy ishining mavzusi, odatda institutning o'quv bo'limi, markaziy uslubiy kengashi, dekanat va tegishli kafedralarda qabul qilingan tartibga binoan, talaba tomonidan ixtiyoriy ravishda tanlanadi. Keyin ushbu mavzu tegishli kafedra, ilmiy raxbar va dekanat tomonidan rasmiylashtiriladi.

Shuni ta'kidlash lozimki, topshiriq bitiruv malakaviy ishni referativ yoki tajriba asosida bajarilishiga qarab beriladi. Biz tanlagan “ Sigirlarning sut mahsuldorligiga ta'sir etuvchi omillar” mavzusi referativ tarzda bajarilishi belgilab olindi. Ishni bajarish quyidagi tartibda olib borilishi rejalashtirildi:

-bitiruv malakaviy ish mavzusi va unga tayinlangan ilmiy raxbarning dekanat orqali xujjatlashtirilganligi, yoki rektorning buyrug'i bilan rasmiylashtirilganligini aniqlash;

- mavzu bo'yicha ilmiy izlanishlar natijasida olingan ma'lumotlar bilan tanishish va ularni tahlil qilish;

- chorvachilik va uning asosiy tarmog'i xisoblangan qoramolchilikni bozor iqtisodiyoti sharoitida barqaror rivojlantirishga oid Davlat qonunlari, Respublika Prezidentining qaror va farmonlari Davlat dasturlari hamda Respublika Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan tanishish va to'liq taxlil qilib o'zlashtirib olish;

- sut va qoramol go'shti ishlab chiqarishni dunyo, MDH va Respublikamizdagi xolati va uning rivojlanish istiqbollari bilan tanishish. Bu borada bajarilgan ilmiy - tadqiqotlar ishlarini taxlil qilish va mavjud bo'lgan ilmiy, uslubiy, xuquqiy va statistik ma'lumotlar bilan umumlashtirish maqsadida Samarqand qishloq xo'jalik, O'zbekiston chorvachilik va O'zbekiston qorako'lchilik va cho'l ekalogiyasi institutlarining hamda Toshkent Agrar Universitetining chorvachilik borasidagi ilmiy to'plamlari, “Zootexniya”, “Molochnoye i myasnoye skotovodstvo”, “Agrarnaya nauka”, “Biologiya selskoxozyaystvennix jivotnix”, “O'zbekiston qishloq xo'jaligi”, “Zooveterinariya”, “Agro ilm” va boshqa jurnallarning oxirgi 10-

- 15 yillardagi mavzuga oid ilmiy –uslubiy manbalari bilan tanishish va taxlil qilish;
- chorva mollari, shu jumladan qoramollarning sut mahsuldorligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va zootexnikaviy tadbirlarni tashkil qilish masalalari bo'yicha xulosa qilish;
 - qoramollarning sut mahsuldorligi bo'yicha baholanganda, e'tibor berilishi lozim bo'lgan: zoti, zotdorligi, yoshi, tirik vazni, semizlik darajasi, 1 kg sut uchun sarflagan ozuqa miqdori, sutning sifati ya'ni uning tarkibidagi yog' va oqsil ko'rsatkich, sutdorlik koeffitsiyenti, kabi ko'rsatkichlar to'g'risida tushunchaga ega bo'lish;
 - sut ishlab chiqarishni iqtisodiy samaradorligini hisoblashni o'ziga xos tomonlarini bilish;
 - olingan ma'lumotlar asosida ishlab chiqarishga amaliy tavsiyalar ishlab chiqish dan iborat .

4. Asosiy qism.

4. 1. Sigirlarning sut mahsuldorligiga zotining ta'siri

Sigirlarning sut mahsuldorligiga juda ko'p omillar ta'sir etsada, ular ichida zotini ta'siri alohida ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda va chet ellarda turli zotga mansub sigirlarning sut mahsuldorligi ko'p olim va olimalar tomonidan o'rganilgan.

G. Basiladze va N.Gosiridze (2004) larning olib borgan ilmiy izlanishlarida, turli zotga mansub sigirlardan sog'ilgan sutdan, pishloq tayyorlashda turlicha miqdorda sut sarflanishini ta'kidlangan. Ularning tajribasida 1 – guruhga 14 bosh qora –ola zotli va 2 guruhga 14 bosh kavkaz qung'ir zotli sigirlar berkitilgan, 305 kun davomida tajriba olib borganlar. Molxonada qora –ola zotli sigirlar tajriba guruhidagi (2 guruh) sigirlarga nisbatan 10-12 % ko'p oziqa berib boqilgan. Rasionlar to'yimliliigi bo'yicha muvozanatlashtirilgan bo'lib; 18,5 % pichan, senaj 27,7; silos 31,4; ildizmevalilar -5; omuxta yem – 17,5 % ni tashkil etgan. Yaylovda (kavkaz tog'larida) boqilganda qora – ola zotli sigirlar kuniga 44 kg, 2 guruhdagi sigirlar esa 40 kg ko'k o't iste'mol qilganligi kuzatilgan.

1-jadval

Tajribadagi sigirlarning sut mahsuldorligi

	Sog'im, kg	Yog',%	Oqsil, %	Shundan %	
				Kazein	Zardob oqsili
Kavkaz qo'ng'ir	11,05	3,83	3,43	2,83	0,60
Qora – ola	12,50	3,60	3,17	2,52	0,65
Farq, ±	-1,45	+0,23	+ 0,26	+0,31	-0,05

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, qora –ola zotli sigirlar, 2 – guruhga nisbatan 13,1 % sut ko'p bergan. Aksincha, 4 % yog'li sut miqdori bo'yicha, 2 – guruhdagi sigirlardan sog'ilgan sut ustunlik qilgan.

2-guruhda sigirlar sutini tarkibida kazein oqsili zardob oqsiliga nisbatan 4,7 nisbatda bo'lsa, 1- guruhda bu ko'rsatkich atigi 3,9 nisbatda bo'lgan.

Shirdon ferment ta'sirida uyush xususiyati 2 - guruhda 21 min. kup bo'lib, 1- guruhdan 15 min. kam vaqt sarflangan. 1 kg gruziya 45 % yog'li tarkibga ega bo'lgan pishloq tayyorlash uchun 2- guruh 8,2 kg; 1 guruhda 9,3 kg sut sarflangan.

Shunday qilib, Janubiy Gruziya mintaqasida kavkaz qung'ir zotli sigirlar sutidan, qora – ola zotli sigirlar sutiga nisbatan pishloq tayyorlash uchun ustunlikka ega ekan.

K.Urolov (2003) va boshqalarning olib borgan tajribalarida, bir xil oziqlantirish va asrash sharoitida boqilgan sof zotli qora-ola, Litva qizil zotli sigirlar va ularning Golshtin zotini naslli buqalari bilan chatishtirish natijasida olingan birinchi bug'in duragay sigirlarning sut mahsuldorligini o'rganganlar.

2-jadal

Tajribadagi turli genotipli sigirlarning sut mahsuldorligi

(K.Urolov va boshqalar) (p =15)

Ko'rsatkichlar	I guruh qora-ola	II guruh G' ₁ (qora – ola golshtin)	III guruh Litva qizil	IVguruh G' ₁ (Litva qizil Golshtin)
Sigirlarning o'rtacha tirik vazni, kg	411,2 _± 5	423,6 _± 4,9	405,3 _± 3,6	414,3 _± 4,5
Sog'imi, kg	2719,3 _± 30,1	3039 _± 34,2	2634 _± 24,5	2906,9 _± 31,8
Sut yog'i, %	3,68 _± 0,02	3,63 _± 0,03	3,75 _± 0,03	3,71 _± 0,02
Sutning yog' chiqimi, kg	100,07 _± 1,21	112,2 _± 1,29	98,78 _± 0,81	107,8 _± 1,33
4 % yog'li	2501,7 _± 22,6	2807,3 _± 29,5	2469 _± 21,9	2696,1 _± 30,2

sut, kg				
Sutdorlik koeffitsiyenti	661,3±4,6	731,3±5,1	649,0±3,7	701±4,8

Shunday qilib, G₁ (qora-ola x Golshtin) duragay sigirlar sof qora-ola zotli tengdoshlarga nisbatan sut maxsuldorligi bo'yicha 13,7 % ga, G₁ (Litva qizil x Golshtin) duragaylar esa sof zotli Litva qizil tengqurlaridan 10,3 % ga yuqori natija ko'rsatgan. Bunday chatishtirish ularning tirik vazniga ham ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Annenkova N.V. (1999) ning ta'kidlashicha, Kursk viloyatida qora-ola zotini Golshtin zotlari bilan chatishishda ularning qon miqdori qanchalik darajada singdirilishi maqsadga muvofiq savoli muammo bo'lib qolmoqda. Olim o'z tajribalarida turli genotipdagi sigirlarning sut mahsuldorligini urgangan. Bunda 5 ta guruh ajratib olingan va 1 guruh nazorat (qora-ola zot) qolgan 4 guruh turli ravishda Golshtin buqalarini qoni singdirilgan duragay sigirlardan iborat bo'lgan.

3-jadval

Turli genotipdagi birinchi tug'im sigirlarning sut mahsuldorligi

(Annenkova N.V. ma'lumoti)

Genotipi	305 kunlik laktasiyada bergan sut (kg)			Yog'i, %			Yog' chiqimi, kg		
	Lim	M ± m	C r	Lim	M ± m	C r	Lim	M ± m	C r
Qora – ola	2243-	2812±	12,2	3,52-	3,6±	2,22	79,0-	101,5±	12,8
q/o	3517	74,5		3,89	0,02		123,8	2,82	
½ q/o +	2012-	3148±	15,9	3,42-	3,55±	2,0	70,6-	11,8±	16,2
½ G	4253	116,6		3,75	0,017		151,4	4,28	
¼ q/o +	2243-	3259±	15,3	3,36-	3,57±	2,77	80,1-	117,9±	15,8
¾ G	4288	111,1		3,71	0,02		157,8	4,13	
1/8 q/o +	2138-	3243±	19,3	3,33-	3,53±	3,73	71,2-	113,8±	20,02
7/8 G	4272	142,6		3,80	0,03		158,3	5,10	

1/16 q/o	2622	3012±		3,32	3,53±		93,1-	106,2±	
15/16 G	3623	83,0	10,7	368	0,02	2,6	123,8	2,6	9,5

Demak, $\frac{3}{4}$ qon ulushidagi Golshtinlashgan sigirlar, sof qora-ola zotli sigirlar sut mahsuldorligidan 447 kg ya'ni, 15,9 % ga ko'p bo'lgan. Sutini yog'liligi 0,03 % ga kam bo'lsada, yog' chiqimi 16,4 kg yuqori natija ko'rsatgan.

A. Alekeyev (2004) ning ta'kidlashicha, Chimkent viloyatida Avliyoota zotli sigirlarni golshtin zotli buqalar bilan chatishtirib, yangi tip yaratishga harakat qilinmoqda. Bunday ishlar natijasida, kelajakda naslchilik xo'jaliklaridagi sigirlarni sut mahsuldorligini 5500-6000 kg ga, tovar xo'jaliklarida esa 4000-4500 kg ga yetkazishni maqsad qilib qo'ygan.

Sigirlar bunda nafaqat sut mahsuldorligini oshiradilar, balkim ularni elining sog'im mashinasiga yaroqliligi ham yaxshilanadi. Olim o'z tajribasida, Avliyoota zotli sigirlarni, golland va golshtin zotli buqalar bilan chatishtirish natijasida olingan duragay sigirlarning yelinini morfologik va funksional belgilarini o'rgangan.

4-jadval

Turli genotipga mansub sigirlarning yelinini morfologik va funksional belgilari

Ko'rsatkichlar	Avliyoota	Avliyoota x Golland	Avliyoota x Golshtin
Sigirlar bosh soni	41	22	52
Yuqori kunlik sog'im, kg	16,2	17,8	19,8
Sut berish tezligi kg/minut	1,38	1,51	1,63
Yelin indeksi, %	39,8	41,3	43,3

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, sut berish tezligi ko'rsatkichi bo'yicha, avliyoota x golland va Avliyoota x golshtin duragaylari, avliyoota zotli sigirlardan 10 va 18 % ga ustunlik qilgan. Duragay sigirlar yelinining indeks

tuzilishi ko'rsatkichi bo'yicha ham tengdoshlaridan ustunlik qilgan. Yelin indeksi bo'yicha ham ko'rsatkichlarda farq aniq ifodalangan. Shunday qilib, Golshtin zotli buqalar bilan chatishtirish natijasida olingan duragay sigirlar, yelinini morfologik ko'rsatkichlari bo'yicha va mashina sog'imiga yaroqliligi bo'yicha yaxshi natijaga erishgan. Sut berish tezligi ham yuqori bo'lgan.

Sh.Akmalxonov, M.Ashirov (1990) larning ta'kidlashicha, qora-ola zotli sigirlarni "Golshtin" zotli buqalar bilan chatishtirish natijasida olingan duragaylarning sut mahsuldorligi yaxshilangan.

5-jadval

Turli genotipli sigirlarning sut mahsuldorligi

Yaxshilanuvchi zot qonini darajasi	Sigirlarni mahsuldorligi											
	1-laktasiya				2-laktasiya				3-laktasiya			
	Bosh	Sog'im, kg	Yog'i, %	Tirik vazni, kg	Bosh	Sog'im, kg	Yog'i, %	Tirik vazni, kg	Bosh	Sog'im, kg	Yog'i, %	Tirik vazni, kg
50 % (1 bug'in)	96	3299	3,64	441	76	3867	3,54	453	140	3978	3,53	493
50 % ko'p	97	3335	3,61	456	44	3671	3,55	446	21	3005	3,51	485
50 % kam	31	2817	3,63	410	14	3631	3,52	449	14	4038	3,54	487
Yaxshilanuvchi zot tenglash	29	3281	3,66	438	22	3684	3,60	449	109	3964	3,61	486

Jadval ma'lumotidan ko'rinib turibdiki, birinchi to'g'imdagi barcha guruh sigirlar sutini miqdori bir-biriga yaqin bo'lgan, faqat qoni 50 % kam bo'lgan guruhlarda boshqacharoq manzara, yarim qonli tarkibli sigirlar, o'zini sof qonli tengdoshlarini sut mahsuldorligiga nisbatan 183 kg ko'p sut bergan.

Shunday qilib Respublikamiz mintaqaviy sharoitida qora-ola zotli sigirlarni golshtin zotli buqalar bilan chatishtirish ijobiy natija beradi. Olingan duragaylarning sut mahsuldorligini yaxshilaydi.

Sh.Akmalxanov va M. Ashirovlar (1991) lar tamonidan turli genotipga mansub sigirlarning sut mahsuldorligi o'rganilgan. Tajribada golshtin zotli buqalarning qizlari (50 % qoni tarkibi) sof qora – ola zotli tengdoshlaridan 150-206 kg ko'p sut bergan. Sut yog'i chiqimi esa 1,1 -7,2 kg yuqori bo'lgan. Golshtin zotini qoni 50 % dan ko'p bo'lgan sigirlarda esa shunga mos raqamda 54-83 va 0,2 -14,9 kg 265-650 va 9,2-20,8 kg to'la voyaga yetgan sigirlarda esa; 60-126 va 0,9-44 kg; 8-674 va 21,2 kg ni tashkil etgan. Tirik vazni esa yarim qonlilarda 1 chi to'g'im sigirlar 9-15 kg voyaga yetganlar 5-8 kg ga sof zotli qora-olalardan ustunlik qilgan.

6-jadval

Turli genotipga va yoshga ega bo'lgan sigirlarning sut mahsuldorligi

Qonni tarkibida golshtin zotining qon ulushi	L a k t a t s i y a														
	I					II					III				
	p	Sog'im, kg	Yog'i %	Yog' chiqimi	Tirik vazni kg	p	Sog'im, kg	Yog'i %	Yog' chiqimi	Tirik vazni kg	p	Sog'im, kg	Yog'i %	Yog' chiqimi	Tirik vazni kg
50%	33	3902	3, 73	145,5	478	49	3799	3,53	134,1	458	13 9	4001	3,52	140,8	457
50 % kam	64	3848	3, 67	141,2	481	48	3796	3,56	135,1	463	37	3944	3,54	139,6	447
50 % ko'p	93	3939	3, 67	144,6	489	74	3589	3,58	128,5	466	89	3949	3,54	139,8	461
Sof qora – ola zot	18	3834	3, 67	144,4	482	18	3324	3,59	119,3	465	51	3941	3,55	139,9	467

Jadval ma'lumotlari golshtin zotini nasllik qiymati yuqori ekanligini ko'rsatib turibdi.

Sh.Akmalxanov, M.Ashirov (1991) lar olib borgan tajribalarda turli genotipga ega bo'lgan sigirlarning o'sish va rivojlanishini o'rganganlar (qizil sholala naslchilik xo'jaligi).

7-jadval

Turli genotipdagi va yoshdagi sigirlarning ekstereri va indeks o'lchamlari

O'lchamlar	Laktasiya					
	I			II		
	Golshtin zoti qonini ulushlari					
	50	75	Qor-ola	50	75	Qora-ola
Bosh soni	35	33	30	14	16	22
Yag'rin balandligi	122,6±0,6	122,5±0,5	132,6±1,2	137,7±1,5	130,4±1,3	130,5±0,9
Ko'krak chuqurligi	65,3±0,4	65,0±0,4	64,9±0,3	69,9±1,1	72,0±0,5	68,4±0,4
Ko'krak kengligi	42,7±0,3	2,5±0,3	43,8±0,4	45,5±0,7	46,6±0,5	44,4±0,5
Ko'krak aylanasi	185,8±0,9	186,4±0,7	186,0±1,3	216,0±3,0	213,8±2,3	202,0±1,2
Gavdani qiya uzunligi	48,8±0,3	139,5±0,7	140,2±0,9	148,2±1,0	147,9±0,9	148,3±1,0
Makloklar oralig'i kengligi	18,8±0,1	49,6±0,3	48,8±0,4	48,2±1,0	49,2±0,3	48,3±0,4
Kaft aylanasi	18,8±0,1	19,2±0,1	19,0±0,1	18,9±0,2	19,1±0,2	19,0±0,2
Tana indekslari						
Uzunoyoqlik	46,7	46,9	47,1	49,2	44,8	47,6
Chiziqlik	114,3	113,8	114,3	108,1	113,4	113,6

Chuqurlik	53,3	53,1	52,9	50,8	55,2	52,4
Ko'krak	65,4	65,3	67,5	65,1	64,7	64,9
Zichlik	132,9	133,6	132,7	145,2	144,5	136,2
Suyakdorlik	15,3	15,7	15,5	13,7	14,6	14,5

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, voyaga yetgan sigirlar (50% golshtin qonli), qora-ola zotli tengdoshlaridan, kukrak chuqurligi ko'rsatkichi bo'yicha 1,5 sm, kukrak kengligi 1,1 sm, ko'krak aylanasi 14,0 sm ustunlik qilgan. Zichlik indeksi esa 8,3-9,0 % ga yuqori natija ko'rsatgan.

Shunday qilib, qora-ola zotli qoramollarni golshtinlashtirganda ulardan olingan avlodlarining tirik vazni ortib, ekstereri yaxshilanadi.

Sh.Akmalxanov, M.Ashirov. (1991) tajribadalarida, golshtinlashgan sigirlarning yelini morfofunktsional xususiyatlari ham o'rganilgan (turli qon tarkibli).

8-jadval

Turli genotipli sigirlar yelinning morfofunktsional xususiyatlari

Xo'jaliklar	Yelin shakli	Genotipi			
		Duragaylar		Qora-ola	
		p	sut berish tezligi, kg/min	p	sut berish tezligi, kg/min
Qizil shalola	Vannasimon	10	1,5±1 0,05	6	1,48±0,07
	Kosasimon	15	1,39±0,06	10	1,31±0,06
	Aylanasimon	7	1,21±0,07	5	1,16±0,04

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, golshtinlashgan qora-ola duragaylarning mashina sog'imiga yaroqliligi ortib borib, shuningdek, ularni yelinini morfologik belgilari ham yaxshilangan.

Demak, qora-ola zotli sigirlarni golshtin zotli buqalar bilan juftlashdan olingan duragaylar, yelin shakli, morfologik belgilari, funksional xususiyatlari bo'yicha ham sof qora-ola zotli tengdoshlaridan ustunlik qilgan.

M.M. Nikitina (2001) olib borgan tajribasida, Simmental va golshtin zotlarini chatishtirib, olingan duragaylarning sut mahsuldorligi, yelinini rivojlanishi va oziqalardan foydalanish xususiyatlarini simmental zotli tengdoshlari bilan taqqoslab urangan. Tajribada 3 ta guruh tuzilgan bulib: nazorat guruhiga – sof simmental zotli, 2-guruh 50 % golshtin zoti qonli, 3 guruh $\frac{3}{4}$ golshtinlashgan duragaylar berkitilgan. Ularni asrash va oziqlantirish bir xil sharoitda olib borilgan.

9-jadval

Sigirlarning sut mahsuldorligi

Ko'rsatkichlar	Guruhlar		
	Nazorat	1 tajriba	2 tajriba
Laktasiya davomiyligi, kun	278 \pm 6,0	286 \pm 12	297 \pm 6,0
305 kundagi sog'im miqdori, kg	2562 \pm 194	2956 \pm 283	3140 \pm 237
Sut tarkibida yog', %	3,79 \pm 0,05	3,76 \pm 0,05	3,73 \pm 0,05
Oqsil, %	2,91 \pm 0,04	2,81 \pm 0,04	2,76 \pm 0,03
4 % yog'li sut miqdori, kg	2481 \pm 192	2850 \pm 267	3013 \pm 215
Yog' chiqimi, kg	97,39 \pm 8,24	111,45 \pm 10,61	117,30 \pm 8,20
Oqsil chiqimi,kg	74,04 \pm 6,02	83,28 \pm 7,38	86,36 \pm 5,64

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, golshtinlashgan har ikkala guruhdagi sigirlar, sof simmental zotli tengdoshlaridan sut yog'ini chiqimi bo'yicha ustun bo'lgan. Sutini miqdori bo'yicha 394-578 kg (15,4-22,6 %) ga yoki, 4 % yog'li sut miqdori bo'yicha 369-532 kg ustunlikka erishgan. $\frac{3}{4}$ qonli sigirlar, $\frac{1}{2}$ qonli sigirlardan esa 184 kg ko'p sut bergan. Bu laktasiyaning o'zayishi bilan (11 kun) bog'liq bo'lgan. Golshtin zotining qonini ortib borishi bilan, duragaylarning sutini tarkibida yog' va oqsil miqdorini pasayishiga olib kelgan. Duragay sigirlarning yelinini morfologik belgilari va funksional xususiyatlari bo'yicha sof simmental zotli tengdoshlaridan ustunlik qilgan.

Shunday qilib, Xakasiya sharoitida golshtin zoti bilan yaxshilangan simmmental sigirlar sut mahsuldorligi bo'yicha yuqori natijaga erishgan. Ularning sut mahsuldorligi, yelinini morfofunktsional xususiyatlari yaxshilanib, oziqalarni tarkibidagi to'yimli moddalarni yaxshi uzlashtirish qobiliyatiga ega bo'lgan. Ammo, golshtin zotining qonini 75 % yetkazish, ularni podani tuldirish qobiliyatini chuzilishiga, eksterer va konstitusiyasi ko'rsatkichlarini pasayishiga va oziqalarga bo'lgan talabini oshishiga olib kelgan.

D.Adushinov (2006) tajribasida, golshtin zotli buqalardan foydalanishning samaradorligini o'rganish maqsadida kelib chiqishi turlicha bo'lgan, qora-ola zotli sigirlardan 3 ta guruh shakllantirgan. 1 guruhga sof qora-ola zotli, 2 guruhga yarim qonli darajaga ega bo'lgan duragaylar (1/2 g), 3 guruhga – 3/4 qon tarkibli golshtinlashgan (3/4g) duragaylar birlashtirilgan. Kelib chiqishi bo'yicha turlicha genotipga ega bo'lgan sigirlar guruhida, 1 laktasiyalardan 473 kg, 2 guruhdagi tenghurlaridan 210 kg, 2 laktasiyasida esa mos ravishda 534 va 250 kg, 3 laktasiyasida tegishlicha 1032 va 130 kg sut mahsuldorlikni yuqori namoyon qiladi. Tajribadagi sigirlarning yeliniga baho berilganda qo'yidagicha izoh topdi.

10-jadval

Tajribadagi sigirlarning yelin shakllari

Guruhlar	Tossimon		Kosasimon		Aylanasimon	
	%	Sog'im, kg	%	Sog'im, kg	%	Sog'im, kg
I	13	4428	60,5	4208	26,5	3378
II	27,2	4580	57,3	4478	15,5	3527
III	34,5	4708	57,0	4542	8,5	3695

Tajriba davomida turli kelib chiqishiga ega bo'lgan sigirlar ichida eng yaxshi yelin shakliga 3/4 qonli golshtinlashgan duragaylar ega bo'lgan. Ko'plab olimlar olib borgan ilmiy tadqiqotlarda sutni miqdori yelinning shakli bilan uzviy bog'lanishda bo'ladi.

Jadval ma'lumotlarida ham o'z tasdig'ini topgan. Bunda tossimon shaklga ega bo'lgan sigirlar, kosasimon shakli yelina ega bo'lgan tengqurlaridan 102-220 kg, aylanasimon yelinli sigirlardan esa 1013-1053 kg ko' sut bergan. Bu ko'rsatkichl kosasimon va aylanasimon shakldagi yelinni sigirlar o'rtasida 830-951 kg ni tashkil etdi.

11-jadval

Tajribadagi duragaylarning yelin o'lchamlari,sm

O'lchamlar, sm	Guruhlar		
	I	II	III
Yelin uzunligi	31,4	36,4	37,8
Yelin kengligi	28,4	30,5	32,0
Yelin aylanasi	113,3	118,9	121,7
Oldingi bo'lma chuqurligi	22,9	26,2	26,8
Orqa bo'lma chuqurligi	29,2	30,5	31,3
Yelinning erdan balandligi	57,2	61,0	61,2

Bunda golshtinlashgan birinchi to'g'imdagi duragaylarning yelinning o'lchamlaridan sof qora-ola zotli tengqurlariniki past ko'rsatkichlarda bo'lib, yelin uzunligi bo'yicha 5,0 - 6,4 sm, eni 2,1-3,6; aylanasi 5,6-8,4 sm. Oldingi bo'lma chuqurligi 3,3-3,9 sm, orqa bo'lma chuqurligi 1,3-2,1 sm kam bo'lgan.

12-jadval

Surg'ichlar o'lchamlari

O'lchamlar, sm	Guruhlar		
	I	II	III
Oldingi so'rgichlar uzunligi	6,4	6,5	6,6

Orqa so'rgichlar uzunligi	5,4	5,6	5,6
Oldingi so'rgichlar diametri	2,7	2,6	2,5
Orqa so'rgichlar diametri	2,7	2,55	2,5
So'rgichlar oralig'idagi masofa:			
Oldingi	15,1	17,8	17,6
Orqangi	6,3	10,4	10,5
Yonbosh	7,5	8,0	9,0

Sof qora-ola zotli sigirlarning elin so'rg'ichlari biroz kalta bo'lib, diametri 0,1-0,2 sm qalinroq bo'ldi. Surg'ichlar orasidagi masofasi esa yaqinroq bo'lishi bilan farqlanib, ayniqsa orqa so'rgichlarda yaqqol namoyon bo'lgan.

Golshtin duragaylarida yelin so'rgichlarining shakli silindr va konussimon bo'lib, pastga to'g'ri yo'nalgan, so'rg'ichlar oralig'idagi masofalarning uzoqligi bilan ajralib turdi.

Shunday qilib, qora-ola zotni takomillashtirishda golshtin buqalaridan foydalanish, podaning sut mahsuldorligiga samarali ta'sir qiladi, duragay sigirlar yelinning texnologik xususiyatlarini yaxshilaydi, elinni turtta qismining teng rivojlanishini ta'minlaydi.

V.A.Zaxarov va V.G. Turfanov (2004) lar o'z tajribalarida, sof xolmogor va qora-ola zotli sigirlarni sut mahsuldorligini, turli qon tarkibli golshtin zoti bilan ushbu zotlarni golshtinlashtirishdagi olingan duragaylarning sut mahsuldorligini taqqoslab urganganlar. Bunda golshtin zotini qoni duragaylarda turli darajada bo'lgan 37,5 % (3/8), 50,0 (1/2), 62,5 (5/8) va 75,0 % (3/4). Tajribalarda xolmogor x golshtin zotli duragaylarning sut mahsuldorligi ham ortib borgan. 305 kunlik laktasiyasida sog'im miqdori 389-756 kg oshgan. Sut tarkibida yog' miqdoroi esa sof xolmogor zotli

tengdoshlaridan 0,05-0,10 % kam bo'lsada, yog' chiqimi bo'yicha 7-18 kg ustun bo'lgan.

Xuddi shu kabi, sut mahsuldorlik ko'rsatkichlari bo'yicha qora-ola zotli tengdoshlaridan, qora ola x golshtin duragaylari ham ustunlikka erishgan. Duragaylar, sof qora-ola zotli tengdoshlaridan laktasiyasi davomida 2,9-6,0 % ko'p sut bergan.

50 % golshtin qon tarkibli, qora - ola zotli duragaylar 3 laktasiyasida ham sut berish tezligi yuqori bo'lib, sut mahsuldorligini yuqori bo'lishini saqlab qolgan. Yog' chiqimi esa duragaylarda 5,0-8,1 % ustun bo'lgan.

13-jadval

Sof zotli xolmogor va duragay sigirlarning laktasiyasidagi sog'im miqdori, kg

Laktasiya	Sof zotli xolmagar		Golshtin zotini qon darajasi							
			37,5%		50 %		62,5 %		75,0%	
	P	M _{±t}	P	M _{±t}	P	M _{±t}	P	M _{±t}	P	M _{±t}
I	172	3959 _{±56}	12	3944 _{±148}	105	3970 _{±73}	15	4031 _{±190}	15	4165 _{±101}
II	163	4224 _{±61}	10	4553 _{±205}	85	4263 _{±106}	13	4696 _{±186}	13	4599 _{±137}
III	134	4426 _{±69}	8	4818 _{±262}	62	4693 _{±126}	10	5009 _{±194}	10	5198 _{±191}
IV	92	4407 _{±87}	6	4954 _{±266}	42	4795 _{±139}	8	4887 _{±212}	8	5307 _{±185}
V	64	4438 _{±114}	5	4929 _{±289}	27	4957 _{±193}	6	4954 _{±206}	6	5209 _{±266}
VI	39	4638 _{±151}	4	4759 _{±281}	21	4887 _{±236}	4	4713 _{±231}	4	5141 _{±129}
VII	24	4486 _{±221}			8	4907 _{±278}				
VIII	12	4536 _{±300}								
O'rtacha	700	4279 _{±84}	45	4551 _{±224}	350	4421 _{±122}	56	4630 _{±198}	170	4696 _{±147}
Eng qori	134	5051 _{±63}	8	5489 _{±333}	62	5440 _{±121}	10	5807 _{±215}	34	5594 _{±174}

Olimlar utkazgan tajribalari asosida yaxshi oziqlantirish sharoitida asralgan xolmogor va qora-ola zotli sigirlarning sut mahsuldorlik ko'rsatkichlari qariyb bir xil bo'ladi, golshtin zoti bilan, ushbu zotlarni chatishtirish natijasida olingan duragaylarning sut mahsuldorligi esa, yaxshilanuvchi zotlardan 2,9-9,8 % yuqori

bo'ladi degan xulosaga kelishganlar. 62,5% golshtin qonli duragaylar, boshqalariga nisbatan 260-351 kg ko'p sut bergan.

L.V. Yefimovning (2002) ta'kidlashicha, 25 yil davomida simmental zotini sut mahsuldorligini va texnologik sifatlarini yaxshildash maqsadida golshtin zoti bilan chatishtirishlar olib borish yangi qizil-ola zotini yaratilishiga sabab bo'lgan.

Yaratilgan zotni takomillashtirish maqsadida Krasnoyarsk ulkasida 13 ta reproduktor naslchilik zavodlari ish olib bormoqda. Krasnoyarsk ulkasi sharoitida, duragay $\frac{3}{4}$ qonli golshtilashgan Reflekshn Sovering liniyasidagi Egon laqabli va Montvik Chifteyna liniyasidagi Xoper laqabli buqalarning qizlari, onasini sut mahsuldorligidan 57,0 va 44,2 % yuqori natija ko'rsatgan.

4. 2. Sigirlarning sut mahsuldorligiga oziqlantirish omilining ta'siri

Sigirlarning mahsuldorligiga tashqi omillar ichida kuchli ravishda ta'sir ko'rsatadigan omil bu oziqlantirish darajasidir.

M.Magomedov, G.Simonov, A.Golubev (1993) larning ta'kidlashlaricha, sigirlarni ratsiondagi mineral moddalar Na va K ning me'yoriy darajasi mavjud bo'lsada, ularning chegarasi aniqlanmagan. Olimlar o'z tajribalarida III – guruh sigirlarida, ratsiondagi turlicha miqdorda Na va K moddalar nisbatini qo'shib berib sut mahsuldorligiga ta'sirini o'rganganlar. Bunda I-guruhdagi (nazorat) sigirlar me'yor asosida Na va K ning nisbati 0,35 : 0,25, II – guruhdagilarga qish faslida me'yorga nisbatan 20 % , yoz faslida 40 % osh tuzi miqdori ko'p beriladi. Na va K ning nisbati 0,45 : 0,30 bo'lgan, III –guruhdagi sigirlar osh tuzini me'yordan, qish faslida 40 % , yozda 100 % bunda Na va K ning nisbati 0,5 : 0,4 bo'lgan.

14-jadval

Tajribadagi sigirlarning sut mahsuldorligi (M.Magomedov va boshqalarning ma'lumoti)

Ko'rsatkichlar	Guruhlar		
	I	II	III
Sog'im miqdori, kg	5160	5415	5542
Sutni yog'liligi, %	3,78	3,86	3,87

Sut tarkibidagi oqsil, %	3,25	3,38	3,87
4 % sut miqdori, kg	4990	5301	5433
Nazorat guruhiga nisbatan, %	100	106,2	108,8

Sigirlar ratsionida tuz miqdorini, turli miqdorlarda istemol qilishi natijasida ular dag'al va shirali ozuqalarni nazorat guruhlariga nisbatan ko'p istemol qilishgan. II va III guruh sigirlarida 1.ozuqa birligi -1,4 da 3 g dan Na moddasi nazorat guruhiga nisbatan ko'p to'g'ri kelgan.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki II va III guruh sigirlardan, nazorat guruhidagilarga nisbatan, 4 % sut miqdori 311 va 443 kg yoki 6,2 da 8,8 % ko'p tashkil qilingan. Bunda 1 kg sut ishlab chiqarish uchun tajriba guruhida 5,1 % ozuqa birligi, nazorat guruhiga nisbatan kam sarflangan.

I.Tmenov, R.Sosiyev, Z. Bosoyev (2002 - 2003) larning olib borgan tajribalarida, ananaviy ravishda sigirlar ratsionida qo'llanilmaydigan mineral qo'shimcha ya'ni tereklitni sut mahsuldorligiga ta'siri o'rganilgan. Tereklit bu tabiiy tersk toshi bo'lib, mineral moddalarni o'z tarkibiga birlashtirgan.

Olimlar tajribalarda sigirlar analog usulida 3 guruhga birlashtirganlar. Nazorat guruhi, I va II guruhlar esa tajriba guruhi qilib belgilangan. Sigirlarni saqlash va oziqlantirish bir xil tartibda olib borilgan. 1 kg quruq moddaga nisbatan I tajriba guruhida asosiy ratsionga 5 g, II guruhga esa 10 g tereklit qo'shib berilgan.

Tajribani 3 oyida sigirlarning kunlik sut miqdori, I guruhda 4,9 %, II guruhda 8,79 % oshganligi ko'zatilgan. Bu ko'rsatkich 10 chi oyda 11,3 va 20,3 % tashkil qilgan. To'liq tajriba yakunida esa 9,9 % ko'p sut sog'ib olingan.

15-jadval

Tajribadagi sigirlar sutining tarkibi.

Ko'rsatkichlar	Guruhlar		
	Nazorat	I	II
305 kunlik sog'im miqdori, kg	3249,0	3455,4	3509,5
O'rtacha yog', %	3,67	3,71	3,78
Umumiy oqsil, %	3,05	3,10	3,11
Zichlik,	28,4	28,5	29,1
Quruq modda, %	12,10	12,17	12,38

Ushbu jadval ma'lumotlari sigirlarning sut mahsuldorligi va sutini tarkibiga tereklit moddasining ijobiy ta'sir ko'rsatganligiga guvohlik beradi.

Ularni fikricha tereklit, organizmdagi zaharli moddalar va mikroorganizmlarning zaharlarini surilishi va organizmdan chiqarishini tezlashtiradi.

Shunday qilib, ratsionni 1 kg quruq moddasining miqdoriga nisbatan, 10 g tereklit moddasini qo'shib berish, organizmdagi zaharli metabolitlar va mikroorganizmlar zaharini tez surilib, organizmdan chiqarishini ta'minlash bilan birga sigirlar uchun mineral ozuqa zahira ham hisoblanadi.

Ganushenko. O (1997 - 2003) va boshqalarning olib borgan tajribalarida, Vikorpal aralash ekin maydonlaridan donli silos tayyorlash uchun tayyorlangan siloslar sifatli bo'lishi ta'kidlangan.

Vika doni va arpani ekin maydonlariga 40-30 va 60-70 % nisbatda ekish, ishlab chiqarishga tavsiya qilingan. Tajribada ushbu maydonlardan o'rilgan Vika – arpa ko'k o'ti (sut – vaska davrida) silos uchun bostirilgan. Bu davrda 1 kg ko'k tarkibida 20-25 mg karotin bo'lgan. Keyingi fazalarda bu ko'rsatkich atigi, 1-3 mg ni tashkil etgan. Bostirilgan silos tayyor bo'lgandan so'ng tarkibi bo'yicha kimyoviy tekshirish o'tkazilganda: 1 kg donli silos tarkibida 0,23-0,25 ozuqa birligi, 0,25-0,30 kg quruq modda, 30-35 g xom va 23-25 g hazmlanuvchi protiyen, 9,5 – 10 g xom yog', 45-55 g xom kletchatka, 3 g kalsiy, 2 g fosfor, 20-25 mg karotin moddalari borligi aniqlangan.

Sog'in sigirlar ushbu oziqalarni yaxshi istemol qilishi ko'zatilgan. 22 kg donli silos ratsionga qo'shib berilganda, sut sog'im miqdori 18,3 dan 19,5 kg ga ko'tarilgan. Oziqalar harajati 7,5 % ga tejalgan. Sut –vaska davrida o'rib tayyorlangan Vika-arpa silosini 1 kg da, 100-110 g hazmlanuvchivchi protein bo'lgan. Bunday silosdan sog'in sigirlar ratsioniga, 1 s tirik vazniga -4-4,5 kg dan qo'shib berishni olimlar o'z tajribalari yakunida tavsiya qilganlar.

Abuzarov R. (2004) ning ma'lumotlariga ko'ra, Tatariston Respublikasida har yili qoramollarni oziqlantirish uchun 2 mln tonna silos sarflandi.

Ammo, bu oziqa tarkibida protein, fosfor oltingugurt kabi moddalar kam. Shu sababli silos tarkibida ushbu moddalarni ko'paytirish usullarini izlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu maqsadda o'z tajribasida amoranit qo'shimchasini (2:1 nisbatda) mahalliy seolit qo'shimchasi 30 kg/t ga, azot mineral kompleks qo'shimchasidan (KAMD) 8 kg/t silos tayyorlashda foydalangan va bunday oziqalarni sigirlarni fiziologik holati va sut mahsuldorligiga ta'sirini o'rgangan. Bunda, 1 guruhdagi sigirlar (nazorat) xo'jalik ratsionida, 2-guruh – makkajo'xori silosini amoranitli qo'shimchasini, 3-guruh – makkajo'xori silosini seolit qo'shimchasi bilan, 4-guruh – makkajo'xori silosini azotli mineral kompleks qo'shimchasi bilan oziqlantirilgan. Oddiy silosga qaraganda, amoranitli silos tarkibida protein moddasi 13 %, KAMD qo'shimchasi silosda esa 9 % yuqori ekanligi kuzatilgan. Tajriba natijalari, sigilarning sut mahsuldorligiga ijobiy ta'sir qilganligini ko'rsatgan; nazorat guruhiga nisbatan kunlik sog'im miqdori 2 guruhda (makkajo'xori amoranitli silosda) 14,6 %; 3-guruh makkajo'xorini seolitli silosi) 6 %; 4-guruh (makkajo'xori KAMD qo'shimchali silosi) 7,3 %; shunga mos ravishda sut yog'liligi 5,5; 2,8 va 5,5 % yuqori natija ko'rsatgan. 1 kg 4 % yog'li sut ishlab chiqarish uchun nazorat guruhiga nisbatan 2 guruhda 13,0 %; 3 va 4 guruhlarda 6,5 % oziqa harajati kam sarflangan. Shunday qilib, silosni tarkibida proteinning energetik qiymatini yaxshilash va mineral to'yimlilikini oshirish maqsadida silos tayyorlash jarayonida amoranitdan 2:1 nisbatda; seolitdan 30 kg/t; kompleks azot mineralidan (KAMD) 8 kg/t qo'shish maqsadga muvofiq, bunday tayyorlangan silos

oziqalar tarkibidagi to'yimli moddalarning hazmlanishini yaxshilaydi, sigirlarning sut mahsuldorligini 6,0-14,6 % oshiradi.

Shundullayev R. va N. Savenko (2004) lar o'z tajribalarida turli muvozanatlangan ratsionlarda sigirlarni oziqlantirishni, ularni usish va rivojlanishi, organizmda modda almashinuvi, sut mahsuldorligi va podani tuldirish xususiyatlariga ta'sirini o'rganganlar.

O'z tajribalarida 3 ta guruhga; 18 boshdan o'rg'ochi buzoqlarni berkitib, bir hil asrash sharoitida o'stirgan.

Nazorat guruhi (1 guruh) ratsionida - 30 % omuxta em va 70 % hajmli oziqalardan; 2-guruhda – 15 va 85 %, 3-guruhda 100 % hajmli oziqalardan foydalanilgan.

16-jadval

1 boshga sarflangan oziqalar va to'yimli moddalar miqdori (1 bosh/kg)

Ko'rsatkichlar	Guruhlar		
	I	II	III
Sut	350	350	350
Yog'siz sut	600	600	600
Omuxta yem	1170	585	-
Beda pichani	1672	2309	3205
O't uni	90	180	270
Somon	117	135	170
Senaj	1845	1820	1946
Silos	3195	4177	4658
Xashaki lavlagi	135	405	630
Ko'k o't (yung'uchqa)	1325	1456	1438
Ko'k o't (makkajo'xori)	1470	1625	1710
Hashaki (patoka)	481	481	500
Ozuqalar tarkibida, %			
Ozuqa birligi, oz/kg	5131	5050	5050

Almashinuvchi energiya MDJ	56197	58145	61430
Quruq modda, kg	5864	6352	7016
Hazmlanuvchi protein, kg	484	500	530

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, ratsionda omuxta yemlarning miqdori turlicha bo'lishidan qat'iy nazar, to'yimlik qiymatida qariyb farq bo'lmagan. Shu bilan birga omuxta yemning o'rnini ratsionda, qisman va to'liq hajmli oziqalar bilan almashtirish, sigirlarni ustirish davrida omuxta yemlar sarfi miqdorini 585 kg (2 guruhda), 1170 kg (3 guruhda) kam harajat qilishini ta'minlagan.

17-jadval

Tajribadagi sigirlarni sut mahsuldorligi (Shundullayev R. va N. Savenko)

Ko'rsatkichlar	Guruhlar		
	I	II	III
Laktasiyada sog'im miqdori, kg (305 kunlik)	3304	3664	3765
± nazorat guruhiga nisbatan, %	-	+ 360	+ 461
Sutdagi yog' miqdori, %	3,70	3,77	3,80
Yog' chiqimi, kg	119,0	132,0	136,0

Omuxta yemni o'rnini hajmli oziqalar bilan to'ldirib oziqlantirish, sigirlarni sut mahsuldorligiga ham ijobiy ta'sir etganligi, jadval ma'lumotlarida berilgan.

Sut ishlab chiqarish uchun 1 guruhdagi sigirlar 1,1 oziqa birligi, 2-guruh 1,0 oziqa birligi, 3-guruhda 0,98 oziqa birligi sarflagan. 1 kg tirik vazn uchun sarflangan xarajatlar, kam omuxta yemli va omuxta yemsiz ratsionda o'stirilganlarda 3,2-5,9 % kam ko'rsatkichni tashkil etgan. Shunga mos ravishda 1 kg sut ishlab chiqarish uchun ham 6,5 – 8 % kam xarajat qilingan.

Tug'ilgandan, tuqqan davrgacha sigirlarni kam miqdordagi omuxta yemli va omuxta yemsiz ratsionlarda o'stirish, ularni o'sish jadalligiga salbiy ta'sir qilmaydi, aksincha sut mahsuldorligiga ijobiy ta'sir etib, boshqali oziqalarni kam sarflanishiga, iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilanishiga olib keladi.

Akmalxanov Sh.A. B va M.Ashirovlar (1990) turli darajada oziqlantirishning har xil genotipga mansub sigirlarni, sut mahsuldorligiga ta'sirini o'rganishlar. Turli darajada oziqlantirish, sigirlarning nafaqat sut mahsuldorligiga balkim ularni tirik vazniga ham ijobiy ta'sir etadi.

Jadal oziqlantirilgan sigirlar xo'jalik ratsionida oziqlangan tengdoshlariga nisbatan, 50 % qon ustun genotiplarda 440 kg, qora-ola zotlarda bu ko'rsatkich tengdoshlariga nisbatan 330 kg ko'p sut bergan.

18-jadval

Sigirlarning sut mahsuldorligiga, jadal su'ratda oziqlantirishning ta'siri

Genotip	p	Oziqlantirish sharoiti	Sog'im. kg	yog', %	Yog' chiqimi, kg	Tirik vazn, kg
50 % va yuqori golshtinlashgan	80	Xo'jalik	4390,0+89,9	3,61+0,022	158,4	451+2,5
	22	jadal	4830+112,3	3,53+0,03	170,5	570+5,4
50 % va past golshtinlashgan	95	Ho'jalik	3817+62,1	3,61+0,01	137,9	445,2+2,1
	23	jadal	4245+87,9	3,64+0,02	154,5	6 533+4,8
Qora-ola	396	Xo'jalik	4202+37,6	3,58+0,008	150,4	468+0,77
	15	jadal	4532+ 89,3	3,57+0,024	161,8	555+3,1

O'zbekistonda urchitilayotgan sudor qoramol zotlarini sut mahsuldorligi va boshqa ko'rsatkichlarini o'rganishda, ko'plab olimlarimiz ilmiy izlanishlar olib borishgan. Hozirgi kunda O'zbekistonda 800 ming boshdan ortiq, qora-ola zotga mansub qoramollar urchitilmoqda. Bu zotga mansub sigirlar sut mahsuldorligining

yuqori bo'lishi, turli sharoitga moslashish qobiliyati va mashina sog'imiga yaroqliligi bilan ajralib turadi.

19-jadval

Respublika xo'jaliklarida qora-ola zotga mansub qoramollarining o'sish dinamikasi(E.Yu.Karchevskiy ma'lumoti, 1984)

K.Q.M.J.	-	-	1,0	12,0	10,2	15,8
viloyatlar	1959	1964	1969	1974	1980	1989
O'zbekiston bo'yicha	53,9	82,2	167,2	212,3	403,9	497,3
Toshkent	38,9	43,1	70,5	103,0	131,3	155,4
Samarqand	2,2	1,9	1,7	4,1	94,3	108,7
Farg'ona	5,5	12,0	39,4	60,2	90,7	98,4
Surxondaryo	1,5	-	7,0	11,5	28,1	48,6
Namangan	-	7,2	8,4	11,5	19,9	26,6
Sirdaryo	-	16,3	25,6	11,7	17,1	25,9
Jizzax	-	-	-	2,7	7,6	11,5
Xorazm	0,2	0,7	0,8	1,0	1,3	-
Qashqadaryo-	-	-	0,7	1,1	1,2	-
Buxoro	2,1	7,0	8,9	3,4	1,1	-
Andijon	3,5	-	3,2	1,0	0,9	6,4

E.Yu. Karchevskiy (1984) ning Chinoz naslchilik xo'jaligida, qora-ola zotli qoramollarda olib borgan naslchilik ishlari natijasi, zot ichida 2 ta tipga mansub qoramollar uchrashini ko'rsatgan. Bu sut va sut-go'sht mahsuldorlikga oid tiplardir.

20-jadval

Ikkita ishlab chiqarish tipiga mansub, sigirlarning sut mahsuldorligi

(E.Yu.Karcheskiy ma'lumoti, 1984)

ko'rsatkichlar	Sut tipidagi (p-80)			Sut-go'sht tipli (p-89)		
	M+ m	S,%	Lim	M+m	S,%	Lim
Sog'im miqdori, kg	5416 +80	13,9	3999+ 73	4010+ 75	17,6	2029+ 53
Yog'liligi	3,59+0,01	4,0	3,36+3,89	3,62+0,01	5,1	3,28-4,2
Tirik vazni,kg	602 6,0	9,2	450-740	623 8,0	12,2	410-800
Sutdorlik koeffitsiyenti,kg	901+ 10	10,6	787-1215	638 +9,0	13,6	317-767

Jadval ma'lumotlari, 2 tip o'rtasida sut miqdori va sutdorlik koeffitsiyenti o'rtasida farq borligini bildiradi. Sut miqdori bo'yicha tiplar orasidagi farq katta bo'lgan. Tirik varznlari katta farq bo'lmasada ishonchlilik darajasi yuqori bo'lgan.

L.G.Belyayeva, L.N. Demidovalarning (2005) fikricha, sigirlarning oziqalar bilan ta'minlanish darajasi 4000-4500 oziqa birligiga teng bo'lganda, yuqori mahsuldorlikni namoyon etadilar, bu me'yorga nisbatan 130-150 % oziqalar bilan ta'minlanishi demakdir.

Yuqori darajada sarflangan oziqalar miqdori qo'shimcha olingan mahsulotlar tomonidan qoplanadi. Oziqalarning 50 % ortiqcha xarajat qilinishi, sigirlarning mahsuldorligini 60 % oshiradi. Bunda 1 sentner sutning tannarxi 7 % kamayadi. Shunga qaramasdan hazmlanuvchi proteinni manbai bo'lgan omuxta yemni miqdorini ratsionda oshirib yuborish maqsadga muvofiq emas. Bu 1 sentner ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxini oshiradi.

L.F.Androsova (2005) ning olib borgan tajribasida, mineral modda hisoblangan kobalt, 1 tug'im sigirlarning sut mahsuldorligiga ta'sirini urgangan. Hayvonlar organizmida kobalt, qon haydovchi vazifasini bajaradi. U organizmda temir moddasini o'zlashtirishida gemoglobinni va qator fermentlarni sintezlanishida ishtirok etadi.

Saxalinda tuproq va o'simliklar tarkibidagi kobalt moddasini miqdori tekshirilganda, profilaktika miqdoriga nisbatan 60 % tanqisligi aniqlangan.

Olima o'z tajribasida golshtin zotli g'unoinlar ratsioniga profilaktika miqdoridan 25 % kam (1 guruhga), profilaktik miqdori darajasida (2 guruh) va 25 % ortiq (3 guruhga) kobalt moddasini xlorli tuzini (toza metal miqdori nisbatida) ratsionga kiritib oziqlantirgan.

21-jadval

I tug'im sigirlarning 90 kunlik laktasiyasidagi sut mahsuldorligi

Ko'rsatkichlar	Guruhlar			
	Nazorat	Tajriba		
		I	II	III
Tabiiy yog'lilikga ega bo'lgan sog'im miqdori,kg	1260 + 7848	1395 + 53,23	1451 + 19,02	1404 + 28,87
Tabiiy yog'lilik	14,0	15,5	16,1	15,6
Kunlik 4% yog'li sut miqdori,kg	13,0	14,4	14,7	13,8
Sut tarkibida:				
Yog',%	3,51+0,16	3,54+0,15	3,40+0,14	3,29+0,24
Oqsil,%	3,0+0,04	2,94+0,08	2,90+0,05	2,93+0,05
Qand, g%	3,09+0,055	3,14+0,05	3,11+0,072	3,01+0,07
Kobalt, mg/l	0,0091	0,0099	0,0095	0,0095

Jadval ma'lumotidan ko'rinib turibdiki, xlorli kobalt moddasini ta'siri, sigirlarni sut mahsuldorligiga ijobiy qilgan. Nazorat guruhidagi sigirlarga nisbatan, 1 guruhda 135 kg, 2 guruhda 191 kg va 3 guruhda 144 kg ko'p sut sog'ib olingan. Sut yog'i shunga mos ravishda 0,03 % va 0,25 % ortiq bo'lgan.

Shunday qilib, g'unojinlar ratsionida kobalt moddasini boyitish, ularni fiziologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi, sut mahsuldorligiga esa ijobiy ta'sir etadi.

A.N.Gasanov, N.G. Grigoryevlar (2005) o'z tajribalarini Moskva viloyatining, Moskva naslchilik stansiyasida olib borganlar. Ular tajribasida karbamidli oziqa ko'shimchasini 3 guruh sigirlar ratsionida qo'llaganlar. Asosiy ratsionni makkajuxori va viko-ovsyanoq silos tashkil etgan. Kam komponentli oziqa qo'shimchasini tarkibi: zerno yachmen (83,8 %), raps urug'idan (15 %) va karbamid (1,2 %) lardan iborat bo'lgan. 1 guruhdagi sigirlar hajmli oziqalar qo'shimcha ratsionida 8,7 kg oziqa ko'shimchasi va 0,7 kg kungaboqar jmixidan, 2 guruh' mos ravishda 4,8 kg oziqa qo'shimchasi, 4,3 kg omuxta yem va 0,5 kg kungaboqar jmixidan, 3 guruh esa faqat 9,6 kg omuxta yem berib oziqlantirilgan.

22-jadval

Rasionni sigirlar sut mahsuldorligiga ta'siri

(A.N.Gasanov, N.G. Grigoryev)

Ko'rsatkichlar	Guruhlar		
	I	II	III
Tajriba davomida sog'ib olingan sut miqdori, kg	2196	1983	1900
Kunlik o'rtacha tabiiy sog'ilgan sut miqdori, kg	24,7	22,3	21,3
O'rtacha yog'lilik, %	3,60	3,67	3,60
O'rtacha kunlik sog'imdagi 4 % yog'li sut miqdori, kg	22,2	20,5	19,2

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, turli ratsion sigirlarning sut mahsuldorligiga turlicha ta'sir qilgan. 1 guruh'dagi ratsionda oziqlantirilgan sigirlar, eng yuqori sut mahsuldorlikni namoyon etgan. Kamkomponentli qo'shimchani o'rmini omuxta yem bilan almashtirish, sut mahsuldorligini kamayishiga olib kelgan, 1 guruhga nisbatan 2 guruhda bu ko'rsatkich 9,7 % va 3 guruhda 13,8 % salbiy natija ko'rsatgan. Yoki bu

ko'rsatkich 4 % yog'li sut miqdoriga aylantirilganda, mos ravishda 8,2 va 13,5 tashkil etgan. 1 kg sut ishlab chiqarish uchun eng ko'p xarajat 3 guruhga tug'ri kelgan. Bu ko'rsatkich 1 guruhda aksincha eng kam miqdorni tashkil etgan.

A.N. Korobokov va boshqalar (2005) o'z tajribalarida turli texnologik usullarda tayyorlangan siloslarning ozuqaviylik ustunligini tekshirish maqsad qilib qo'yilgan.

To'yimliliği bo'yicha ratsionlar har xil bo'lgan, shunday ekan ularni oziqalar tarkibidagi to'yimli moddalardan samarali foydalanishi qanday darajada kechishi kuzatilgan.

23-jadval

Tajriba sxemasi

Sigirlar guruhleri	Oziqlantirish sharoitlari
I - nazorat	Makkajo'xori silosi, Viko-ovsyany senaji traisheyadan (shirali oziqalar to'yimliliğiga nisbatan 50 %), omuxta yem.
II – tajriba	Makkajo'xori silosi Viko-arpa sinaji transheyadan (shirali oziqalar to'yimliliğiga nisbatan 75 %), omuxta yem.
III – tajriba	Makkajo'xori silosi Viko-arpa plenkada qadoqlangan (shirali oziqalar to'yimliliğiga nisbatan 75 %), omuxta yem.

Oziqalar bilan oziqlantirishning samarasi, sudor qoramolchilikda 1 kg sut ishlab chiqarish uchun sarflanadigan ozuqa miqdori va mahsuldorligini namoyon etish bilan belgilanadi.

24-jadval

Sog'in sigirlar ratsionidagi turli texnologik uslubda tayyorlangan senajning o'zlashtirish samaradorligi.

Ko'rsatkichlar	Guruhlar		
	I	II	III
Tajriba davomidagi (kun)	122	122	122
Ishlab chiqarilgan sut (kg)	55251	56573	57314
Kunlik o'rtacha sog'im miqdori (kg)	13,5	13,8	14,0
1 kg sut ishlab chiqarishga sarflangan oziqa (oz/bir)	0,96	0,95	0,93

Jadval ma'lumotlari yumshoq qadoqlangan senaj bilan oziqlangan sigirlar kunlik sog'imi bo'yicha 0,5 kg ya'ni (3,7 %), 1-guruhda, shu miqdordagi transheya senaji bilan oziqlantirilgan sigirlarga nisbatan yuqori potentsiya ko'rsatganidan dalolat berib turibdi. 2-guruhda bu ko'rsatkich 0,3 kg tashkil etgan. 3 guruhdagi sigirlar, 1 guruhga nisbatan, 1 kg sut ishlab chiqarish uchun 0,33 oziqa birligi kam sarflagan. Bu sigirlarning ratsionida yuqori mahsuldorligi va yumshoq boshqli senajli oziqalar tuyimlilikidan samarali foydalanganligini bildiradi. Ratsiondagi hashaki oziqalar o'rnini silos bilan emas, balki senaj tomonidan to'ldirish to'yimli moddalarni hazmlanishini ta'minlaydi. Bunday tartib, sut ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan umumiy harajatlarga ham o'z ta'sirini o'tkazgan. Oziqa harajatlari: 1 – guruhda 72,31 ming rub, 2 – guruhda 74,27 ming rub va 3 – guruhda 75,01 ming rub ni tashkil etgan. Shunday bo'lsada 1-guruhda ishlab chiqarilgan sutni sotishdan foyda 84,57 ming rub, 2 – guruhda bu ko'rsatkich 1590 rub ko'pini tashkil etgan. Eng ko'p foyda 3 – guruhga to'g'ri kelgan va 1 – guruhdan 3160 rub ustunlik qilgan.

Shunday qilib, qadoqlangan senajning ratsionda qullanilishi quruq moddani va uni tarkibidagi alohida moddalarni ham hazmlashini yaxshilaydi. Sut hosil bo'lish jarayonini tezlashtiradi, natijada ko'p sut sog'ib olinishini ta'minlaydi.

A.S. Belikova va boshqalar (2003) o'z tajribalarida, oqsilvitamin – mineralli qo'shimchani mahsuldor sigirlar ratsionida qo'llanishini, ratsionda A vitamini yuqori

darajada ta'minlanishini sigirlarning sut mahsuldorligi, sutning fizik –ximyaviy va texnologik xususiyatlari xususan issiqlikga bardoshligiga ta'sirini o'rganganlar. Bunda ular qora-ola zotli sigirlardan 2- ta guruh tuzib, 1- guruhdagi nazorat sigirlar ko'pchilik ratsionlarda, 2 – guruh (tajriba) sigirlar ratsioniga qo'shimcha ravishda "Provimi" firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan. BVD (belkovovitaminny dobavki) dan qo'shib berilgan. Tajriba guruhidagi sigirlar, ratsionida BVD qo'shimchasi hisobiga, 20 % A vitamin bilan me'yordan yuqori ta'minlangan.

25-jadval

Sigirlar sutini tarkibi va sifati

Ko'rsatkichlar	Guruhlar	
	1	2
Kunlik o'rtacha sog'im miqdori (kg)	24,0	25,1
Sut tarkibida:		
Quruq modda (%)	11,8	12,5
shundan: yog' (%)	3,90	3,98
Umumiy oqsil (%)	3,19	3,17
Shundan kazein (%)	2,49	2,54
Zardob oqsili (%)	0,65	0,68
Laktoza (%)	4,25	4,46
Kalsiy (mg/l)	1350	1250
Fosfor (mg/l)	900	950
Zichligi ⁰ A	28,38	29,20
Nordonligi ⁰ T	17,0	17,3
Somatik xujayralar soni (ming /ml)	95	95
Mochevina miqdori (mg/l)	273	244

Jadval ma'lumotlari tajriba guruhidagi sigirlardan kuniga 0,9 kg ko'p sut sog'ib olinganligini ko'rsatib turibdi. Sigirlar sutini tarkibida, yog' va umumiy oqsil miqdorida

farq bo'lmagan, kazein oqsilida katta farq bilan tajriba guruhidagi sigirlar suti ustunlik qilgan. Aynan shu ko'rsatkich sutni texnologik xususiyatlarini yaxshilaydi.

26-jadval

Sigirlardan sog'ib olingan sutni texnologik xususiyatlari (yoz faslida pishloq ishlab chiqarishda)

Ko'rsatkichlar	Guruhlar	
	1	2
Sut tarkibida: yog' (%)	3,95	3,98
Oksil (%)	3,17	3,18
Shundan kazein (%)	2,49	2,84
Aralashmaga ko'shilgan:		
CaCl ₂ (40 % er.ml)	6	6
Ivitqi (ml)	100	100
Shirdon fermentining quvvati (sek)	50	40
Shirdon fermentini miqdori (ml)	14,0	11,0
Sutning uyush davomiyligi (min.)	35	30
Pishloq og'irligi (kg)	0,814	0,862
1 kg pishloq uchun sut sarfi (kg)	6,52	6,13

Yoz faslida sog'ib olingan sutlarni issiqlikga bardoshlik ko'rsatkichi, qish faslidagidagiga nisbatan yuqori bo'lgan. Yoz faslida oziqlar tarkibida A-vitaminni bo'lishi bunga sabab bo'lgan. Bundan tashqari sutni issiqlikga bardoshlik ko'rsatkichiga, sutni tarkibidagi kazeinni aralashmasi ham ta'sir qiladi.

Sut tarkibidagi tuzlar, kazein oqsilini doimiy ravishda bir xil saqlanishida asosiy omil hisoblanadi. Sutni issiqlikka bardoshligiga esa sutdagi kazein oqsili miqdori ta'sir etadi. Shunday qilib, sutni tarkibidagi oqsil va tuzlar tarkibini uzgarishi natijasida, sutni issiqlikga bardoshlik ko'rsatkichi pasayadi. Sigirlardan sog'ilgan sutni texnologik xususiyatlarini taqqoslash maqsadida, pishloq va brinza mahsulotlari tayyorlangan. Tajriba guruhidagi sigirlardan sog'ib olingan sutdan tayyorlangan pishloq nazorat

guruhidagilarga nisbatan qattiqroq bo'lgani kuzatilgan. 6 kg sutdan pishloq tayyorlash uchun yoz faslida shirdon fermentidan, tajriba guruhlarida 11 g sarflangan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 14 g, qish faslida esa shunga mos ravishda 15 va 18 g tashkil etgan. Shuningdek, tajriba guruhidagi sigirlardan sog'ib olingan xomashyo sutlarning texnologik xususiyati, nazorat guruhidan sezilarli darajada ustunlik qilgan. A-vitaminini yuqori darajada sut tarkibida bo'lishi, oqsilni tarkibidagi xususan alfa va betta fraksiyalariga ijobiy ta'sir etgan. Natijada sutni uyush xususiyati yaxshi natija bergan.

Shunday qilib, mahsuldor sigirlar ratsionida oqsil – vitamin- mineralli birikmalarning qo'llanilishi (A vitamin hisobiga) nafaqat sigirlarning sut mahsuldorligi, balkim sutning texnologik xususiyatlariga, jumladan issiqlikga bardoshlik xususiyatiga ham ijobiy ta'sir qiladi.

S.Savchenko va boshqalarning (2002) ta'kidlashicha "Olltek" kompaniyasi ishlab chiqaradigan I-Sak¹⁰²⁶ mahsuloti, (tarkibi achitqi xujayralaridan iborat) katta qorindagi mikroflorani tartibga solib turadi. Bu achitqi hayoti uchun katta qorindagi kislorodni yutadi, natijada katta korinda anaerob mikroblarni rivojlanishiga imkon yaratadi.

Anaerob mikroblar, sellyulozani kraxmalga aylantirish xususiyatiga ega. I-Sak¹⁰²⁶, YeS tomonidan sudor va go'shtdor qoramollar ratsioniga shuningdek buzoqlarni oziqlantirishda qullashga tavsiya etilgan yagona achitqi kultura hisoblanadi.

Olimlar, o'z tajribasida 2 guruh (8 boshdan) qora-ola zotli sigirlarni birlashtirgan (analoglar usulida) tajriba guruhlardagi har bir bosh sigir ratsioniga kuniga 10 g I-Sak¹⁰²⁶ preparatidan qo'shib oziqlantirilgan.

27- jadval

I-Sak¹⁰²⁶ preparatini qullanilishini natijasi

Ko'rsatkichlar	Guruhlar		Nazorat guruhiga nisbatan tajriba guruhi,%
	Nazorat	Tajriba	
Sigirlar soni, bosh	8	8	-

Tajriba davomiyligi, kun	90	90	-
Guruhda jami sog' ilgan sut miqdori, kg	20160,0	22608,0	112,1
Sigirdan jami sog' ilgan sut miqdori, kg	2520,0	2826,0	112,1
Kunlik o'rtacha sog' im miqdori, kg	28,0	31,4	112,1
Sutdagi yog' miqdori, %	3,3	3,2	97,0
Bazis yog' lilikdagi kunlik sut miqdori, kg	25,7	28,0	108,8
Jami sog' ilgan sut miqdori, kg 1 bosh sigirdan sog' ilgan 4 % yog' li sut miqdori, kg	2088,0	2268,0	108,6
Kunlik 4 % yog' li sut sog' im miqdori, kg	23,2	25,2	108,6
1 kg sut uchun oziqa xarajati, oziqa birligi	1,05	0,97	92,9

Shunday qilib, I-Sak¹⁰²⁶ preparati sigirlarni fizologik holatini yaxshilaydi, asidoz, ketozga qarshi profilaktik xizmat qiladi, veterinariya tadbirlarini arzonlashtiradi. Sigirlarning sut mahsuldorligini 12,1 % oshiradi, shu bilan birga sut ishlab chiqarishda oziqa harajatlarini 7,1 % kamaytiradi. Sohani iqtisodiy samarali bo'lishini ta'minlaydi.

V.Shipilov ning (2002) ta'kidlashicha, "Kanital PROK" OAO tamonidan ishlab chiqilgan "Felusen" dasturi rossiyaning 43 regionini, 300 dan ortiq xo'jaliklarda amalga oshirmoqda.

"Felusin" dasturi bo'yicha axborot ko'rsatuvchi ilmiy – texnologiya bo'limi mutaxassislari, xo'jaliklarda mahsuldorlikni nasliy bo'lish sabablarini, oziqalar tarkibida yetishmaydigan moddalarni aniqlaydilar.

Felusin oziqa qo'shimchasini ishlab – chiqadi, oziqlantirish, mollarni asrash, yosh qoramollarni o'stirish va sigirlarni to'g'ishga tayyorlash haqida bevosita maslahatlar

beradilar. “Felusin” dasturi qo’llanilgandan 3-4 hafta keyin mahsuldorlik rejadagi ko’rsatkichga yetadi.

Felusin qo’shimchasi tannarxi sudor qoramollarda 1:3 nisbatda qoplashi muqarrar.

“Felusin” dasturi qo’llanilgan haftalarda sigirlardan sut sog’ib olish 5,9-33,9 %, yog’liligi 0,01-0,5 %, oqsil miqdori 0,12-0,9 % ga yuqori bo’lgani kuzatilgan.

1 kg sut ishlab – chiqarish uchun oзуqalar sarfi 4,2-36 % ga qisqardi. Shunday qilib iqtisodiy samarador bo’lishi istagi bor xo’jaliklarni “Felusin” dasturiga a’zo bo’lishini taklif etamiz.

V.Kalinixin va Ye.K Kalinixin lar (1998-2003) olib borgan besh yillik ilmiy izlanishlari natijasida, pensilen ishlab – chiqarishda tashlandiq sifatida chiqindi hisoblangan, oqsil – uglevodli miselliylarni qo’shimcha movzanatlovchi oziqa sifatida qayta ishlash maqsadida muvofaq degan xulosaga kelgan.

Ular tajribada MAVKD qo’shimchasini (miselliy – artilitto – vitaminyu kormovoy dobavki) sigirlar ratsioniga qo’shib berganda, Zootexnikaviy – Ekologik maqsadli mahsulot yetishtirishni kuzda tutganlar.

Pensillinni qo’ritilgan misellisi tarkibida protein – 21,5, 17-7, kletchatka – 07, ko’l – 30, natriylar 6 % ni tashkil etgan. Mineral moddalardan kalsiy 9,5 %, fosfor 0f.5 f5f. kobalt – 0,1 %, temir – 2198 mg/kg, simob 280 mg/kg, marganis -473 mg/kg bo’lgan. Toksikologik tekshirish natijasida oziqa zararsiz deb topilgan.

MAVKD dan sigirlar ratsioniga donli aralashmalar o’rnini 20 % ga qo’shib berilgan. Natijada kunlik sog’im 1-guruhda 7,2 %, 2 – guruhda 14,0 %, 3 –guruhda 8,2 % oshgan. Bu qo’shimchaga keletchatkani hazmlanishiga ijobiy ta’sir qilgan.

Ushbu sigirlardan sog’ib olingan sutdan mahsulotlar tayyorlashda: suzma, sariyog’, qaymoq, kabilar yaxshi texnologik xususiyatlarni namoyon qilgan.

Ekspert tamonidan ekologik toza va yuqori darajali oziqa qo’shimchasi deb topilgan, sigirlarni oziqlantirish uchun tavsiya etilgan.

Olimlar o’z tajribalarida “Xatfid” kompaniyasining tavsiyanomasi asosida ushbu qo’shimchani qo’shishga 4 marta; 1 bosh sigir ratsioniga 200 g dan, sigirlar tuqqangacha 10 kun va to’qqandan sung 30 kun davomida berib borganlar.

Natijada laktasiyaning birinchi oyida 1 bosh sigirdan 96 l ko'p sut sog'ib olingan. Sog'ishdan olingan daromad 786 rub ni tashkil etgan. Preparat uchun esa 638 rub sarflangan. Kunlik sog'im miqdori 3,2 l ko'paygan. Sigirlardan sog'lom buzoq olinib, to'g'ishdan keyin yomon asoratlar kuzatilmagan.

I.Tyurkin (2004) ning ma'lumotiga ko'ra, chumoli kislotasi yordamida konservalangan silos bilan oziqlantirilgan sigirlar sog'lomligiga zarar yetkazmaydi. Aksincha ulardan sog'lom buzoq olinib, sut mahsuldorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi (tajribada 0,5-0,7 l oshgan).

Konservantlardan foydalanilganda sut mahsulotlari sifatiga salbiy ta'sir etmasligiga chumoli kislotasi bilan konservalashning ta'sirini urgangan. Chumoli kislotasi bilan konservalangan silosda, sut kislotasi 73,5 % , rN 4,0 bo'lganligi kuzatilgan. Oddiy silosda bu ko'rsatkichlar 38,40 va rN 3,9 tashkil etgan. Karotin va qand miqdori 37,5% ga oshgan 1 oziqa birligiga, xazmlanuvchi protein miqdori 100 g, 107 g qand to'g'ri kelgan.

28-jadval

Tajriba davomida sigirlarning sut mahsuldorligi

Tajriba	Guruhlar	Davr			
		Dastlabki		Tajriba	
		Sog'im, kg	1 guruhga nisbatan, %	Sog'im, kg	1 guruhga nisbatan, %
I	I	26,40	100,00	21,42	100,00
	II	26,90	101,89	22,37	104,43
II	I	27,80	100,00	22,80	100,00
	II	27,67	99,53	23,72	104,03
O'rtacha 2 yil davomida	I	27,10	100,00	22,11	100,00
	II	27,28	100,66	23,04	104,20

Sigirlar sutini tarkibida (II guruhda) leysin, valin aminokislotalar hisobiga neytral aminokislotalar, glutamin kislotasini hisobiga ega nordon aminokislotalar ortgan. Shunday qilib, chumoli kislotasi bilan konservalangan silosda oziqlantirilgan sigirlardan, sifatli aminokislotalarga boy tarkibi sut sog'ib olinadi.

Boyarskiyning L. (2004) ta'kidlashicha, qoramollarni to'la qiymatli oziqlantirishda, ratsionni protein bilan ta'minlanishi muhim ahamiyatga ega. Rossiyada qoramollarning oziqa balansida 4,5 mln. T. Yoki 25-30 % miqdorda protein tanqisligi mavjud. Olim o'z tajribasida, makkajuxoridan tayyorlangan silos urniga 35 % (yachmen-lyuserna) yung'uchqa – bedali silos bilan almashtirib sigirlar ratsioniga kiritgan.

29- jadval

Tajribadagi sigirlar ratsioni

Oziqalar	Guruhlar	
	nazorat	tajriba
Makkajuxori silosi, %	44,3	14,0
Aralash silos, %	-	35,0
Dag'al oziqalar, %	13,7	13,1
Shundan:		
Seno kostrovoye	7,8	7,5
Beda pichani	5,9	5,6
Omuxta yem, %	42,0	37,0

Rasion energetik qiymati bo'yicha tenglashtirilgan holda tuzilgan. Shunga qaramasdan tajriba guruhidagi sigirlar ratsionida proteinga bo'lgan to'yimlilikga 28,3 % yuqori bo'lgan.

30-jadval

Tajriba sxemasi

Sigirlar guruhi	Bosh soni	Rasion tarkibi	To'yimliliği bo'yicha ratsion tizimi. %
Nazorat	12	Makkajo'xori silosi	50
		Dag'al oziqalar	10
		Shundan:	
		Seno kostrovoye	6
		Seno lyusernoye	4
		Omuxta yem	40
Tajriba	12	Makkajo'xori silosi	15
		Aralashma silos	35
		Dag'al oziqalar	10
		Shundan:	
		Seno kostroye	6
		Seno lyusernoye	4
		Omuxta yem	40

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, bu yerda faqat 35 % makkajo'xori silosi o'rniga, 35 % aralash silos ratsionga kiritilgan.

31-jadval

Tajribani iqtisodiy ko'rsatkichlari

Guruhlar	1 bosh sigirda n sog'ib olingan sut	1 kg sut sog'ib olish uchun sarflan	100 oziqa birligi olingan		1 s sutning tannarxi, rub.	1s sutning xarid narxi, rub.	1 s sutni sotishdan Olingan sof foyda, rub.	Sut ishlab chiqarishning samarador
			Sut, kg	Sut yog'i kg				

	miqdori	gan oziqa birligi						lik darajasi, %
Nazorat	2031,3	0,81	123,4	4,27	179,9	320,0	140,1	178,1
tajriba	2264,4	0,77	129,9	4,69	139,8	320,0	180,2	228,9

Tajribadagi sigirlar guruhlarida ratsionida kletchatka miqdori turlicha bo'lgan.

Sigirlar ratsioniga aralash silosdan 35 % miqdorda kiritilganda, ularning proteinga, kalsiy va fosforgia bo'lgan talabi tularoq qondiriladi. Shu bilan birga ratsionda omuxta yem miqdorini sarflanishi 42 dan 37,9 % ga, makkajo'xori silosini 44,3 dan 14 % ga tushirib, ratsiondagi quruq moddada protein miqdorini 8,1 dan 10,3, qandni 5,3 dan 5,8; kletchatkani 23,1 dan 30,5 % ga yuqori bo'lishini ta'minlaydi.

Sigirlar sut mahsuldorligi, tajriba guruhida 11,5 % ga oziqaga haq to'lash 5,2 % oshgan. Sof foyda esa 28,6 % samaradorlik darajasi 50,8 % ga yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan.

Shunday qilib, yuqori mahsuldor sigirlar ratsionini to'yimlilik bo'yicha yachmen-lyusernoyeiy silos aralash silos – makkajo'xori silosidan 15 %, seno kostorovoye – 7,5 %, beda pichanidan – 5,5 % va donli omuxta yemdan 37,0 % tashkil etilishi maqsadga muvofiq.

Nikitina N. va boshqalarning (2003) fikricha, Gollandiyaning “Xayfid” kompaniyasi ishlab chiqargan maxsus mahsuloti sigirlarning sut mahsuldorligiga ijobiy ta'sir qiladi. Bu 10 % konsentrat (formulasi 1945.00) bo'lib sog'in sigirlar ratsionida qullaniladi. Bu mahsulot tarkibi bo'yicha ratsionni muvozanatlaydi. Bu konsentrat katta qorindagi foydali mikroblar sonini oshirish xususiyatiga ega. Natijada bu mikroblar propion kislotasi va mikroblar oqsilini sintez qiladi. Bu mahsulot omuxta yemga 1:10 kislota qo'shib, kuniga 3-4 marta beriladi. Berish davri sigirlar tuqquncha 10 kun oldin va tuqqandan so'ng 90 kunni o'z ichiga oladi.

Boyarskiy L., Yu. Titovlarning (2003) fikricha, sigirlarni yoz faslida oziqlantirishda ratsionda omuxta yemni qullamaslik ham ularni sut mahsuldorligiga katta salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.

Olimlar o'z tajribalarida 3 ta guruh tuzganlar: 1 guruh sigirlar ratsionida umumiy to'yimlilikni ko'k oziqalar bilan tenglashtirganlar (omuxta yem o'rniga), 2 guruhda dukkakli oziqalar miqdori nazorat guruhiga nisbatan ratsionida 60 % dan 40,1 % ga tushirilgan. Shunga mos ravishda boshoqli o'tlar miqdori 39,9 % dan 59,9 % ga oshirilgan. Bunday oziqlantirish natijasida ratsionni umumiy to'yimliliği nazorat guruhi bilan qariyb bir xil bo'lgan.

Nazorat guruhiga nisbatan 1 guruhdagi sigirlar sut mahsuldorligi 6 % ga, 2 guruhga esa bu kursatkich 2,6 % ga kam bo'lgan. Sutni tarkibidagi yog' miqdori o'zgarmagan. Bunday oziqlantirish sohani iqtisodiy samarali bo'lishini ta'minlaydi. Chunki 1 kg sut ishlab chiqarish uchun 0,5 kg, 1 kg sut yog'i uchun esa 111,7 kg omuxta yem sarflanadi. Tajriba yakuni shuni ko'rsatadiki. Sigirlarni yoz faslida ratsionida omuxta yemni o'rnini boshoqli va dukkakli o'tlar bilan to'ldirish maqsadga muvofiq ekan.

32- jadval

Sigirlarni oziqalarga haq to'lashi

guruhlar	1 kg sut uchun sarflangan		1 kg sut yog'i uchun sarflangan		100 oz. b. ishlab chiqarilgan sut miqdori, kg	1 oz.b. to'g'ri kelgan hazmlanuvchi protein,g
	Oz.birligi	Hazmlanuvchi protein,g	Oz.birligi	Hazmlanuvchi protein,g		
nazorat	1,02	143,1	26,2	3,68	98,0	140,6
1 tajriba	1,02	157,7	26,6	4,26	98,3	160,4
2 tajriba	1,03	140,4	26,4	3,59	97,1	136,5

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, 1 guruhdagi sigirlar, nazorat va 2 guruhdagilarga nisbatan 1 kg sut va sut yog'i ishlab chiqarish uchun 9,3 va 11 %, 13,6 va 15,7 % hazm buluvchi proteinni ko'p sarflangan.

Rasion tarkibida to'yimlilik bo'yicha boshqli o'tlarning miqdorini 40 % dan 60 % oshirish maqsadga muvofiq. Bu ratsionda hazm buluvchi proteinni o'rnini to'ldirishni arzon usuli hisoblanadi deb ta'kidlaganlar.

A.Shuvarikov, V.Belikova, O.Pastuxlarning (2003) fikricha, A vitamini sigirlar ratsionida meyordan 10-25 % ortiqcha berish, sutning issiqlikka bardoshlik ko'rsatkichini yaxshilaydi. Tajribada 3 ta guruh tuzilgan va 2 va 3 guruhlar tajriba guruhi deb belgilangan. 2 guruh sigirlar ratsionida A vitamini me'yordan 10 % ortiq, 3 guruhda esa 25 % ortiqcha qullanilgan.

Sutkalik sog'in miqdori 2 va 3 guruhda 1,7 va 2,4 kg ko'p bo'lgan. Bu sigirlar oziqalarni ko'p iste'mol qilganligi va to'yimli moddalarni yaxshi o'zlashtirganligi bilan izohlanadi.

33-jadval

Tajribadagi sigirlar sutining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Guruhlar		
	I	II	III
Qo'ruq modda,%	10,29	11,35	12,58
Yog', %	3,71	3,94	4,18
Umumiy oqsil,%	2,86	2,98	3,02
Kazein,%	2,22	2,32	2,35
Zardob oqsili,%	0,66	0,68	0,68
Kalsiy, mg/g	126	124	121
Fosfor, mg/g	89	91	92

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, nazorat guruhiga nisbatan 3 va 2 guruhlarda, quruq modda 1,06 va 2,29, yog' 0,47 va 0,24 % yuqori natija ko'rsatgan.

Umumiy oqsil ko'rsatkichida nazorat va tajriba guruhleri o'rtasida katta farq bo'lmagan. Lekin pishloqning sifati va chiqimida asosiy o'rinni egallovchi kazein oqsili tajriba guruhi sigirlari sutida yuqori natija ko'rsatgan.

Tajriba guruhidagi sigirlar qonini tarkibida A vitamini nazorat guruhidagilardan ortiqcha bo'lgan (23 va 25 mkg % qarshi 15 mkg %).

34-jadval

Tajribadagi sigirlar sutini issiqlikga bardoshlik ko'rsatkichlari.

Tajriba davomidagi kun	Guruhlar bo'yicha sutning issiqlikga bardoshligi, %		
	I	II	III
0	72	72	72
15	75	75	80
30	75	80	80
45	72	80	80
60	75	80	80
75	75	80	80
90	75	80	80

Sutning issiqlikga bardoshlik ko'rsatkichi alkohol namunasi orqali aniqlangan. Tajribani boshlang'ich davrida issiqlikga bardoshlik 72 % spirtli konsentrasiyada bo'lgan, keyinchalik bu ko'rsatkich 80 % ni tashkil etgan.

Rasionda A vitamin miqdorini me'yordan 10-25 % oshirish, kazein oqsilini fraksiyali tarkibini mutadillashtirgan. Bu o'z navbatida sutning issiqlikga bardoshlik ko'rsatkichini yaxshilagan.

90 kun davom etgan tajribada sutni sotishdan olingan foyda 1-guruhda – 7,087 ming rub, 2 – guruhda - 7,321 va 3-guruhda – 7, 503 ming rubni tashkil etgan. Bu foyda juda ko'pni tashkil etish mumkin.

Sh.Amirov (2003) va boshqalar olib borgan tajribalarida sog'in sigirlarni oziqlantirish darajasining sutini texnologik xususiyatlariga ta'sirini o'rganganlar.

Tajriba guruhiga qizil Eston va Litva qizil zotiga mansub sigirlar, Do'stlik va F.Qosimova nomli shirkat xo'jaligining podasi nazorat guruhi qilib olingan. Tajriba

guruhidagi sigirlar alohida ratsionda boqilib, nazorat guruhidagi sigirlar esa xo'jalik sharoitida oziqlantirilgan. Laktasiya davomida tajriba guruhidagi sigirlar 3135,5, nazorat guruhidagilar esa 2750,4-3217,5 oz. birligi istemol qilgan.

F.Qosimova nomli va do'stlik xo'jaliklari sigirlarning suti tarkibidagi yog' va oqsili tajriba guruhidagi sigirlariga nisbatan 0,10-0,11 % va 0,12-0,13 % kamligi kuzatilgan. Shunday qilib, sigirlarni zootexnika me'yorida oziqlantirish, nafaqat sutining miqdori, tarkibi ,balkim texnologik xususiyatlariga ham ijobiy ta'sir qiladi.

Sh.Amirov va Karimovlar (1993) o'z tajribalarigda podani tuldiradigan turli genotipli urg'ochi tanalarni turli darajada o'stirishni sut mahsuldorligiga ta'sirini o'rganganlar.

35-jadval

Podani to'ldiradigan urg'ochi tanalarni, turli darajada o'stirishning 1 laktasiyasidagi sut mahsuldorligiga ta'siri.

Gepotini	p	O'stirish sharoiti	Sog'im, kg	Yog', %	Sut yog'i chiqimi, kg	Tirik vazni, kg
50 % yuqori qonli	31	Jadal	4125 \pm 159,7	3,66 \pm 0,024	150,9	484,6 \pm 2,76
Golshtinlashtirilgan	5	Xo'jalik	3620 \pm 111,7	3,69 \pm 0,03	133,5	411,1 \pm 3,01
50 % kam qonli	16	Jadal	3839 \pm 73,5	3,69 \pm 0,021	141,6	474,0 \pm 3,03
Golshtinlashtirilgan	32	Xo'jalik	3690 \pm 90,8	3,7 \pm 0,0016	136,5	408,3 \pm 1,99
Qora-ola	94	Jadal	3855 \pm 71,7	3,67 \pm 0,12	141,4	408,4 \pm 1,92
	17	Xo'jalik	3505 \pm 121,5	3,63 \pm 0,13	127,2	408,0 \pm 296

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, qon tarkibi 50 % dan ko'p genotipli (golshtinlashagn) urg'ochi tanalar iptensiv ustirilganda, xo'jalik ratsionida o'stirilgan tengdoshlaridan 305 kunlik laktasiyada 505 kg sut, 17,4 sut yog'i chiqimi ko'p qatlama ko'rsatilgan.

Bu ko'rsatkich qora-ola sigirlarning antepsiz o'stirilganlariga nisbatan 270 va xo'jalik sharoitidagilarga nisbatan 620 kg ni tashkil etgan.

X.I.Hayrutdinov (1964) o'z tajribasida sigirlarni doimiy oziqlantirib, ularga beriladigan suv miqdorini berish me'yorini, sigirlarda shirdon fermentini va sut ajralishi miqdoriga ta'sirini o'rgangan. Kunlik suv ichish 25 % kamaytirilganda, shirdon fermenti va sut ajralishida o'zgarishlar kuzatilgan. Kunlik suv berish miqdorini 3 qisimi qisqarganda, shirdon fermenti miqdori 20 %, sut miqdori esa 33,4 % kamaygan.

N.N.Gorbachyova va A.F.Krisanovlar (2004) ning ta'qidlashicha, sigirlarning sut mahsuldorligini namoyon qilishi, oziqalarning iste'mol qilinishi va to'yimli moddalarning o'zlashtirilishiga bog'liqdir.

Oziqalarni iste'mol qilinishi va to'yimli moddalaridan to'laroq foydalanish qoramollarning zotdorligiga ham bog'liqligini ko'plab olimlar urgangan. Xuddi shunday tajribalardan birini ushbu olimlar ham o'z tajribalarida o'rganishganlar. Bunda ular to'qqizta genotipga mansub sigirlarning, oziqalarni iste'mol qilishi va to'yimli moddalardan to'laroq unumli foydalanishini kuzatgan.

Bu zotlar simmental, qora-ola, qizil-ola zotlari va 1,2,3 bug'in duragaylar (simmental x ayrshir va qora-ola x golshtin). Ushbu sigirlarning sut mahsuldorligi, iydirish davrida ya'ni 100 kunlik sutini miqdori urganilgan. Ma'lumki sigir birinchi 100 kunligida laktasiyasida beradigan sutini 45 % beradi. Sof zotli qoramollarga nisbatan, duragaylar ko'proq oziqalar iste'mol qilgan va to'yimli moddalarni yaxshi uzlashtirilganlari tajribada tasdiqlangan. Sut mahsuldorligi bo'yicha 7/8 qon tarkibli, qora-ola x golshtin duragaylari, sof zotli qora-ola tengdoshlaridan 512,5 kg ko'p sut bergan. Qora-ola x golshtin barcha bug'in duragaylari boshqa guruhdagi tengdoshlaridan sut mahsuldorligi bo'yicha ustunlik qilgan. Faqat simmental x ayrshir duragaylarini suti tarkibida yog' va oqsil miqdori golshtinlashgan, qora-ola lar sutini tarkibidagidan yuqori bo'lgan. Shunday bo'lsada, qora-ola x golshtin duragaylari sut yog'i chiqimi bo'yicha ustunlik qilgan.

Shunday qilib, bir xil sharoitda asralgan va oziqlantirildgan sigirlarni taqqoslaganda, qizilola zoti va qora-ola x golshtin (7/8) duragaylari, 100 kunlik sog'imida yuqori mahsuldorlikni namoyon qiladi. Bu ularning oziqalarni va oziqa tarkibidagi to'yimli moddalarni yaxshi o'zlashtirganligi bilan asosalanadi.

S.A.Loginov va S.F.Pogodayev (2004) larning ta'kidlashicha, dunyoda zootexniya fani sigirlarning nasl belgilarini ikkiga bo'lishni: birinchi mahsuldorlik (sog'im miqdori va tirik vazniga), ikkinchi texnologik belgilari, bunda yelinni morfo-funksional ko'rsatkichlari, sigirlar yelinini mashina sog'imiga yaroqliligi, mastitga, stressga chidamliligi va urug'lanish qobiliyatiga bo'lishni taqoza etadi. Olimlar o'z tajribalarida, sigirlarning tashqi ta'surotlarga chidamliligini sut mahsuldorligiga bog'liqligini o'rganganlar. Tashqi ta'surotlar sifatida, sigirlarni boshqa sog'uvchi, sog'ishga tayyorlash va sog'ish ishini amalsha oshirish kuzatilgan. Tajribada 1 guruh birinchi tug'im sigirlar: 2 guruhga berkitilgan, 1 guruh – sof simmental zotli (25 bosh), 2 guruh qizil – ola golshtinlashgan (25 bosh) simmentallar berkitilgan.

36-jadal

Tashqi ta'surotlarga chidamliligi bo'yicha turli tipdagi sigirlarning sut mahsuldorligi

Tashqi ta'surotlarga chidamlilik tiplari	Yaxshilanuvchi simmentallar			Sof simmental zotli		
	I laktasiyadagi sog'imi,kg	Sut tarkibida yog',%	Sut yog'i chiqimi,kg	I laktasiyadagi sog'imi,kg	Sut tarkibida yog',%	Sut yog'i chiqimi,kg
I	4285,00 ±224,06	3,61± 0,33	154,56± 7,41	4024,75± 224,31	3,77± 0,40	151,75 ±9,01
II	3886,27± 185,62	3,71± 0,37	144,20± 7,00	3843,71± 319,00	3,72± 0,35	143,00± 11,30
III	2899,50 ±152,03	3,69± 0,32	107,00± 4,88	3143,43± 211,97	3,74 ±0,37	117,71 ±7,97
IY	2140,00	3,71	79,30	2270,00	3,67	83,30

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, turli tipdagi sigirlarning sut mahsuldorligi turlicha bo'lgan. Tashqi ta'surotlarga chidamliligi bo'yicha birinchi tipdagi sigirlar sut miqdori bo'yicha boshqa tipdagilardan ustunlik qilgan. Yaxshilanuvchi simmentallarning 1 tipi, sof zotli simmentallar ga nisbatan 261 kg ko'p

sut bergan. Sutini tarkibida yog' miqdori 0,16 % kam bo'lsada, yog' chiqimi bo'yicha 2,81 kg ustun bo'lgan. Demak, golshtinlashgan simmentallar sof simmental zotiga nisbatan tashqi ta'surotlarga chidlamli bo'ladi.

4.3. Sigirlarning sut mahsuldorligiga boshqa omillarning ta'siri.

Sigirlarning sut mahsuldorligiga ta'sir etuvchi omillar juda xilma-xildir. Shunday omillardan dastlabkisi bu sigirlarning yelini hisoblanadi.

Yelin. To'rtta bo'lmadan iborat. Yelin sig'imi bo'yicha 30 kg sutni sig'dirishi va undan ortiq bo'lishi mumkin. Qon tomirlari, limfa turlari va nevrge boy hisoblanadi.

Yelinni tarkibini, bez, yog' va biriktiruvchi to'qmalar tashkil etadi

Bez to'qimasi, tana va sutdan chiqan sigirlar yelinida yog' to'qmasi bilan o'rin almashadi (ma'lum maqsadda). Biriktiruvchi to'qima yelinda tayanch vazifasini bajaradi.

Laktasiyadan turli davrlarda bu to'qimalarning nisbatiturlicha harakterda o'zgaradi.

Sigirni turli vazinga nisbatan qancha ko'p sut sog'ilsa, u shuncha mahsuldor sanaladi (sutdorlik koeffisenti). Mahsuldor sigirlar 1 kg tirik vazinga 9-10 kg sut beradi. Qo'shmahsuldor sigirlarda bu ko'rsatgich 7-8 kg tashkil qiladi. Agar sutdorlik koeffesenti 1000 kg va yuqori bo'lsa sut tipidagi 700-800 kg bo'lsa sut – go'sht va go'sht – sut tipidagi sigirlar deb baholanadi.

Laktasiyaning birinchi yuz kunligida, jami sut miqdorini 40-45 %. Ikkinchisida 30-35 % uchunchisida 20-25 % sog'ib olinadi. Sigirlarning sut sog'imi va yelimini hajmi o'rtasida ijobiy normativ bog'lanish mavjud. Tirik vazinga nisbatan, yelin og'irligi 0,5 % ni tashkil etsa, bu sigirlar 2000 kg, 1 % ni bo'lgandan 2-3 ming kg, 5 % ni tashkil qilganda, bunday sigirlar 15-20 ming kg sut berishi aniqlangan.

Sigirlarning sut mahsuldorligiga ta'sir etuvchi omillarni qo'yidagicha guruhlash mumkin.

1. Irsiyat
2. Zoti
3. Fizologik holati

4. Saqlash sharoiti va ulardan foydalanish

Irsiyatni ta'siri.

Ota-onasini avlodlarga sifat ko'rsatgichini o'tkazish qobiliyatiga – irsiyat deyiladi.

Ushbu sifat ko'rsatgichlarini turg'un o'tkazishga – prepotentlik deb ataladi. Sut mahsuldiligini harakatchan o'zgaruvchanlik qo'yidagi ko'rinishda kechadi. Sut sog'imi 20-30 %, sut tarkibidagi yog'i 4-10 %, sut oqsili -3-9 % . belgilarining naslga o'tish hususiyatiga esa, sut sog'imi bo'yicha 10-30 %, sut yog'i 50-80 %, oqsil 40-70 % tirik vazni 30-50 %. Bu farqlar naslga o'tish hususiyati bilan asoslanadi. Shuni yodda saqlash kerakki, mahsuldorlikni o'zgarishiga oziqlantirish omili, tashqi sharoit podani genologik tuzilishi va hokozolar ham ma'lum muddatda ta'sir etadi.

Zotini ta'siri.

O'zini kelib chiqishi va shakillanishi, takomillashishi davrida qoramollar bir qator biologik va xo'jalik foydali belgilarga ega bo'lgan. Shulardan asosiysi sut mahsuldorligi hisoblanadi. Turli zotga mansub sigirlar turiga sut mahsuldorligini namoyon qiladi. Ular ichida sut yo'nalishidagi – qora-ola, golshtin, ositfru, golland, xolmagar, chizil cho'l zotilarimuhim o'rin tutadi. Ushbu zotlarnig laktasiyasidagi sog'imi 4000 – 7000 kg ni tashkil ettib sutning tarkibida yog'i 3,5-3,8 %, oqsil 3,12-3,54 % ga teng.

Sut yo'nalishidagi qoramol zotilari ichida shunday zotlar borki ular o'rtacha sut mahsuldorlik ko'rsatgichini namoyon etib, sutni tarkibida yog' va oqsil miqdorini ko'pligi bilan ajratib turadi.

Ularga., jersey, gernzey zotlari kiradi. Ushbu zotga mansub sigirlarning sut sog'imi, o'rtacha 3000-3500 kg, sutni tarkibida yog'i 5-6,5 %, oqsil esa 3,9-4,3 % ga bo'linadi.

Sut yo'nalishidagi qoramol zotlarida oziqani mahsulot bilan qoplash hususiyati yuqori, hayoti davomida yuqori sut mahsuldorligini namoyon etadi. Ta'kidlanayotgan zotlarning sutdorlik koeffesenti 900-1000 kg tashkil qiladi.

Qo'shmahsuldor zotlarda sutdorlik koeffesenti nisbati past 700-800 kg. Bu holat ularni nafaqat sut ishlab chiqarishi balkim, ulardan sutli go'sht olish bilan shakillanadi. Ammo ba'zi zotlar yazxshigina sut mahsuldorlikni namoyon qiladi, ularga Shvisiya, Kostroma, lebedin, simmental, Sichev kabi zotlar kiradi. Ularni o'rtacha sut

mahsuldorligi 4000-5000 kg bo'lib, sutni tarkibida yog'i 3,7 -3,9 %, oqsil 3,3-3,5 % ga teng. Oziqani sut bilan qoplash hususiyati ularda yuqori bo'lib, 1 l sutga 0,81 oz.birligi sarflanadi.

Sut mahsuldroligi bo'yicha so'nggi o'rinni, go'sht yo'nalishidagi qoramol zotlari, qorako'l oq bosh shartgorn, gereford, aberdin-anguss, qolmoqi zotlari egallaydi.

Sigirlarning sut mahsuldorligiga fizologik omillardan laktasiyasining davomiyligi, bo'g'ozligi, jinsiy sekil serves – davri, quruqlik davri, sut berish tezligi, yelinini shakli kabilar ta'sir etadi.

Yelinini ta'siri.

Sigirlarning sut mahsuldorligiga birinchi tizimdagi yoshi ta'sir etadi. Tanalarni erta qochirish, ularni o'sish va rivojlanishiga sa'lbiy ta'sir etib, kelajakda bunday sigirlar tmahsuldor bo'lib shakillanmaydi.

Shuningdek, ulardan to'g'ilgan buzoqlar ham kichik jussali bo'lib to'g'iladi. Sigirlarni iydirish pasayadi. Tanalarni muddatidan kech urug'lanishi ham xo'jalikga iqdisodiy samara keltirmaydi. Ularga ko'p oziqa sarflanadi shuningdeku boshqa sigirlardan hayoti davomida kam sut va buzoq olinadi.

Tanalarni dastlabki marta 16-19 oyligida, tirik vazni kamida 320 kg bo'lganda urug'lantirish maqsadga muvofiq. Eng yuqori sut mahsuldorligikni sigirlar 4-6 to'g'im yoshida namoyon qilishi tajribalarda aniqlashgan sigirlarni yoshini ortib borishi bilan, sut miqdori kamayadi. Sigirlar sutini tarkibidagi yog' va oqsil miqdorlari ularni yoshini ortib borishi bilan ko'p o'zgarmaydi (0,1-0,2%).

Laktasiya davomiyligini ta'siri.

Laktasiya sigirlarda 305 kund davom etadi. Agar sigirlarda servis davri uzoq davrni tashkil etsa, laktasiya davri ham cho'zilib ketadi. Sigirlarni to'g'ish oralig'i 12 oydan ortiq bo'lmasligi kerak. Sigirlarni sutdan chiqqan davrida me'yorda parvarishlash, ularni sut mahsuldorligiga ijobiy ta'sir etadi.

Servis, bo'g'ozlik va sutdan chiqqan davrini sut mahsuldorligiga ta'siri.

Sigirlarga servis davri 40-80 kunni tashkil etishi lozim. Servis davrini uzayishi sigirlarning sut mahsuldorligiga salbiy ta'sir qilar ekan. Laktasiya davri 305 kundan 450 kunga cho'zilganda, sigirlarni laktasiya davomida 15% sut kam sog'ib olinadi.

Sigirlarni bo'g'ozligini dastlabki besh oyligida, shu bois sut mahsuldorlik yuqori bo'ladi. 6 oylikdan boshlab esa ratsionga to'yimli moddalar ko'p talab etiladi, natijada sut mahsuldorlik pasaya boshlaydi. Shuningdek. Sigirlarning sut mahsuldorligiga sutdan chiqqan davrini davomiyligi ham ta'sir etib, bu davr 30 kunni tashkil etganda, sut mahsuldorlikni sigirlar kelgusi laktasiyada 20% ga kam namoyon etadi. Jinsiy sikl namoyon bo'lganda sigirlarning sut mahsuldorligi 20% ga pasayadi.

Tirik vaznini ta'siri.

Tirik vazni katta bo'lgan sigirlar, to'la qiymatli ratsionlarda oziqlantirilganda, ko'p sut beradi, chunki bunday sigirlar ko'p oziqa istemol qilib, uni sutga aylantirish xususiyatiga ega ko'p bo'ladi. Ammo, shuni ta'qidlash joizki, sigirlarning tirik vazni ma'lum og'irlikka yetguncha sut mahsuldorligi bilan musbat korrelyativ bog'lanishda bo'ladi. Bu ko'rsatkich, uni tana tuzilishini sutdorlik tipiga javob berishgacha davom etishi mumkin. Laktasiyada bergan sut miqdori, tirik vaznga nisbatan 8-10 marta yuqori bo'lishi maqsadga muvofiq.

Asrash sharoitini ta'siri.

Sigirlarning sut mahsuldorligiga molxonadagi havo-harorati, nisbiy namlik va gazlarning miqdori to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etadi. Molxonada mikroiklim ko'rsatkichlar qo'yidagi me'yorda bo'lishi maqsadga muvofiq:

- havo harorati – 5-15 ° C
- nisbiy namlik – 70-75 %
- 1 s tirik vaznga havo almashish – 17 m³/soat
- Havoni harakat tezligi – 0,5 m/sekund
- Karbonat angidrid gazi – 0,25 %
- Ammiak konsentrasiyasi – 20 mg/m³
- Vodorod sulfid gazini izlari bo'lishi mumkin.

Sigirlarni me'yorda oziqlantirish, asrash va foydalanish, ulardan 8-10 laktasiya davrigacha foydalanish imkoniyatini beradi.

To'g'ish faslini ta'siri. Sigirlarni to'g'ishini kuz va qish fasllariga mavsumiyashtirish maqsadga muvofiq. Bu vaqtlarda sigirlarni sersut bo'lishi kuzatilib, aholini bu vaqtlarda sut va sut mahsulotlariga talabi yuqori bo'ladi. Ilmiy izlanishlarda

bu fasllarda to'qqan sigirlarni, boshqa fasllardagiga nisbatan 10-20% ko'p sog'ib olingani isbotlangan. Laktasiya egriligni ikki cho'qqish bo'ladi. Yozgi mavsumda yashil oziqalar bilan mollarning ta'minlanishi bunga sabab bo'ladi. Shuningdek, bu faslda to'g'ilgan bo'zoqlar kasalliklarga ko'p chalinmaydi, natijada durkun o'sadi.

Sigirlarni jadal o'stirishning sut mahsuldorligiga ta'siri.

Yuqori mahsuldor sigirlar, yoshligida to'la qiymatli ratsionlarda boqilgan tanalardan shakllanadi. Ammo, ba'zi olimlar buni inkor ham qilinadi (Xansson, Reyds-hved olimlari).

Agar tanalar, yaxshi o'stirish sharoitida asralsa, tug'ishga me'yor tayyorlansa ularni birinchi to'qqanidanoq mahsuldor sigirlar shakllanadi.

Kunni vaqtniti ta'siri.

Sigir ertalab soat 5.00 da sog'ilganda, sutini tarkibida yog' miqdori 3,07 %, ikkinchi soat 9.00 da sog'ilganda 5,21 %, 3 marta soat 13.00 da sog'ilganda 4,59 %, kech 19.00 dasog'ilganda sutidagi yog' miqdori 3,8 % ni tashkil etgan. Sut miqdori ertalabki sog'imda yuqori bo'ladi.

Yelinni massaj qilishni ta'siri.

Yelinni uqalash, unda qon aylanishini yaxshilaydi natijada to'yimli moddadar yelenga ko'proq kelib, sutni tarkibini boyitadi. Sog'ishda yelin 2 marta dastlab va sog'ish oxirida yakuniy o'qalanadi. Yelinni uqalash sut mahsuldorlikni 5-15% ga sut yog'ini 0,1-0,2% ga oshirishga imkon beradi.

Iydirishning ta'siri.

Sigirlarni sut mahsuldorligini maksimal darajaga ko'tarish uchun bajariladigan kompleks tadbiriy choralarga iydirish deb aytiladi.

Iydirishning elementlari bo'lib: avans ozuqa berib boqish, mosion, yelinni uqalash va boshqalar hisoblanadi. Tirik vazni katta eksteryer va konstitusiyasi pishiq va mustahkam bo'lgan sigirlar iydirishga moyil bo'lib, yuqori mahsuldorlikni namoyonning malakasiga ham bog'liq bo'ladi.

Sog'ish texnikasi. Sigirlarni sog'ishni ikkita: qo'lda va mashinada usuli bor. Mashinada sog'ish maqsadga muvofiq, Qo'lda sog'ish, sog'im vaqtini cho'zilishiga olib

keladi. Sog'ishda barcha tartibga va qoidalarga rioya qilinganda, sigirlardan ko'p va sifatli sut sog'ib olish mumkin.

V. Kulakov (2000) va boshqalarning fikricha, ko'k ozuqalar bilan oziqlantirish to'la qiymatli va to'yimli bo'lishi bilan birga iqtisodiy samarali hisoblanadi. Shuning uchun sigirlarni yozda, yaylovlarda erkin xolda boqish va qish faslida pichan, senaj, silos kabi ozuqalar bilan oziqlantirish maqsadlidir.

Rasionda bunday ozuqalarning ko'p bo'lishi, arzon mahsulot ishlab chiqarishning garovidir. Yoz faslida ratsionni arzon bo'lishini, va mahsulotlarni arzon ishlab chiqarish maqsadida sigirlarni yaylovlarda erkin boqish usuli ma'quldir.

Sigirlar bunday vaqtda molxonada boqilganda, ko'k o'tlarni transport vositalarida tashish va tarqatishga to'g'ri keladi, natijada tannarxni oshishiga olib keladi.

37- jadval

Turli botanik tarkibdagi madaniy yaylovlarda asralgan sigirlarning sutining sifati (o'rtacha 3 yilda) (Kulakov ma'lumoti).

Ko'rsatkichlar	Boshoqli o'tlar		Dukak boshoqli o'tlar	
	Mavsum boshi (may)	Mavsum oxiri (sentyabr)	Mavsum boshi (may)	Mavsum oxiri (sentyabr)
Quruq moddalar, %	11,93	12,08	11,82	11,93
Yog', %	3,28	3,43	3,22	3,41
Oqsil, %	2,96	3,28	3,01	3,14
Sut qandi, %	4,90	4,66	4,82	4,68
Mineral moddalar, %	0,70	0,70	0,69	0,70

Shunday qilib, yaylovda asralgan sigirlarning sog'lomligi yaxshi bo'ladi, buni ularning qonini tarkibiy ko'rsatkichlari tasdiqlaydi. Bunda ularning qonini tarkibida; gemoglobin – 10, 3 dan 10,8-11,2; kalsiy 9,8 dan 10,3-11 mg % ga ko'payganligi isbotlaydi.

4.4. Tadqiqotning iqtisodiy samaradorligi

Xo'jalikda mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflanadigan harajatlarda doimiy ravishda hisob – kitob qilib boriladi. Ilmiy izlanishlar natijasida xulosalar chiqarishdan so'ng, tavsiyalar va xo'jalik uchun takliflar beriladi.

Har bir olib borilgan tajribalar yakunida uning iqtisodiy samaradorlik ko'rsatgichlari chiqariladi. Buni bitiruv malakaviy ishida bu ko'rsatgichlar qo'yidagicha bo'lgan.

Sh.Akmalxonov (1993)ning tajribalarida golishtinlashgan 1 bug'in duragay sigirlar sof qora-ola zotli sigirlarga nisbatan 298-1013 kg ko'p sut bergan.

S.Bo'riyev (1993) tadqiqotlarida ham golishtinlashgan duragay sigirlar, qora-ola zotli tengdoshlariga nisbatan 509 kg ko'p sut berib, sut yog'i chiqimi bo'yicha 20,1 kg oqsili esa 18,1 kg ustunlik qilgan.

Shunga o'xshash ma'lumotlar Ye.Karchevskiy, Yu.Simarev, V.Shidlovskaya, P.Marchenko, T. Sharafutdinov, D.Aduminov, A.Baishev, S.Dusqulov, V.Vilson, A.Vorobev, A.Prudov, A.Igonkin, V.Blushchenko va boshqa olimlarning ilmiy ishlarida aniqlangan.

G.Batsiladze va N.Gosiridze (2004) larning tajribalarida qora-ola va kavkaz qung'ir zotli sigirlar tog' sharoitida asralgan. Qora –ola zotli sigirlar 12 % ko'p to'yimlilikga ega bo'lgan ratsionda boqilishiga qaramasdan, ular ko'p miqdorda (V_2 1 %) sut bersada, 4 % yog'li sut miqdori ikkinchi guruhda yuqori natijaga erishilgan 1 kg pishloq ishlab chiqarish uchun kavkaz qung'ir zotli sigirlardan sog'ilgan sutdan 8,2 kg sarflangan bo'lsa, bu ko'rsatgich qora-ola zotli sigirlarda 9,3 kg ga teng bo'lgan.

A.Alekayev (2004) ning tajribalarida golishtinlashgan duragay sigirlar, avliyoota zotli sigirlardan sut mahsuldorligi bo'yicha 18 % ustunlik qilib, unda sigirlarning yelinini funksional hususiyatlari ham yaxshilanishi natijasida, mehnat unimdorligi yuqori bo'lgan.

Nikitina (2001) tajribalarida, turli darajada golishtinlashtirilgan va sof simintal zotli sigirlarning sut mahsuldorligini o'rgangan. Unda turli daromadi golishtinlilari

duragay sigirlar sof pigminal zotli sigirlardan 15,4-22,6 % yuqori sut mahsuldorlikni namoyon qilgan.

V.Zaxarov (2004) va boshqalarning tajribasida golishtinlashgan duragay sigirlarning sutini tarkibidagi yog' miqdori, sof xolmogor zotli sigirlardan 0,05 -0,1 % ga kam bo'lsada sutning yog' chiqimi 7-18 kg yuqori ko'rsatgichlarga erishgan.

A.Yeyerimova (2002) ning ta'kidlashicha, qora – ola golishtinlashgan sigirlarning sut mahsuldorligi o'rni tanalardan sut mahsuldorligi bo'yicha 44,2 – 57,0 % yuqori bo'lgan.

M.Magomedov, G.Simonov (1993) larning ta'kidlashicha sigirlar ratsioniga mineral moddalarni kiritish, sut mahsuldorligiga ijobiy ta'sir qilib, xo'jalik ratsionda oziqlantirilgan sigirlarga nisbatan, 4 % yog'li sutni 311-443 kg ko'p bergan. 1 kg sut ishlab chiqarish uchun 5,1 % kam ozuqa sarflangan.

Ana shunga o'xshash ma'lumotlar, O.Ganushinko (2003) R.Abduzarov (2004) R.Shundulayev, N.Saviko (2004) L.Demidovlar (2005), L.Akdrosova (2005) va boshqa bir qator olimlarning ilmiy izlanishlarda isbotlangan.

V.Shilovning tajribalarida ratsionga oqsilni vitamin qo'shimchalaridan qo'shib berish, 1 kg sut ishlab chiqarishsarflanadigan ozuqa birligini 4,2 % ga qisqartirishni ta'minlagan.

Shunday qilib, sigirlarning sut mahsuldorligiga ko'plab omillar ta'sir etadi, ularning eng asosiylari bo'lib, sutdorligiga zoti va sigirlarni mahsuldorligiga oziqlantirishning ta'siri hisoblanadi.

Sigirlarning zotlarini yaxshilash va ularni ratsional oziqlantirish, xo'jaliklarning iqtisodiy samarador bo'lishini ta'minlovchi asosiy omillardan sanaladi.

4.5. Xulosa va takliflar

Sigirlarning sut mahsuldorligiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish borasida mavjud bo'lgan ilmiy, uslubiy, rasmiy, statistik va xuquqiy xujjatlarni, ma'lumotlarni umumlashtirgan holda quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

1. Sigirlarning sut mahsuldorligiga ta'sir etuvchi omillarni quyidagi asosiy uchta guruhga ajratish mumkin: sigirlarning irsiy xususiyatini ta'siri, zotini ta'siri va tashqi omillarning ta'siri.

2. Sigirlarning sut mahsuldorlik ko'rsatkichlari irsiy belgi bo'lib, uni to'liq namoyon bo'lishida tashqi sharoit muhim rol o'ynaydi.
3. Qora – ola zoti sutbop qoramol zotlarining, butun dunyoda keng tarqalgan zotlaridan bo'lib, o'zining bosh soni bilan deyarli birinchi o'rinda turadi. Xuddi shuningdek, Mamlakatimizning barcha toifadagi xo'jaliklarida urchitilib kelayotgan 10,0 mln boshga yaqin (2012 yil 1 yanvar xolati bo'yicha) qoramollarni 41 foizdan ortig'i yoki 4 mln boshdan ortig'rog'ini aynan ana shu zotga mansub bo'lgan hayvonlar tashkil qilar ekan.
4. Qora – ola zotga mansub qoramollar urchitiladigan xo'jaliklarda sigirlarni sut mahsuldorligini yaxshilashda, golshtin zotini buqalarining urug'idan foydalanish maqsadga muvofiq.
5. Qora – ola zotiga mansub sigirlarning sut mahsuldorligi bo'yicha genetik potentsiali to'liq yuzaga chiqarilgan mamlakatlarda, ulardan o'rtacha 7,0-8,5 tonna sut olinmoqda, bizda esa bu ko'rsatkich ilg'or xo'jaliklarda 3,5-4,0 tonna, o'rtacha esa 2,5-3,0 tonnadan oshmagan. Bu esa sut mahsuldorligini oshirish imkonichtlari mavjud ekanligidan dalolat beradi.
6. Qora – ola zotiga mansub hayvonlar, o'zining iste'mol qilgan oziqasini mahsulot bilan, jumladan sut mahsuloti va qo'shimcha rik vazn bilan qoplash xususiyati yuqori. Ko'pgina ilmiy ishlab chiqarish tajribalarida 1 kg sut uchun 0,9-1,2 xamda 1kg qo'shimcha tirik vazn uchun 7,5 – 8,5 kg oziqa birligi sarflangan . Xo'jalik sharoitlarida bu ko'rsatkich shunga mos ravishda, 1,5-2,0 va 10- 14 kg oziqa birligini tashkil qilgan.
7. Golshtinlashgan (golshtin x qora-ola) duragay sigirlar sof qora-ola zotli tengdoshlariga nisbatan yuqori sut mahsuldorlikni namoyon qiladi.
8. Sigirlarni to'la qiymatli ratsionlarda oziqlantirish nafaqat ularni sut mahsuldorligiga balkim xo'jalikning iqtisodiy samaradorligiga xam bevosita ijobiy ta'sir etadi.
9. Sigirlarning sut mahsuldorligiga ; sigirni yelini, tirik vazni, servis- kuyga kelish-dam olish-laktasiya davrlari xam ta'sir qiladi.
10. Sigirlarni yaylovda boqish ularni sut mahsuldoligiga, xo'jalikning iqtisodiy samaradorligiga va sigirlarni podani takror ishlab chiqarish xususiyatiga ijobiy ta'sir qiladi.

11. Sigirlarni iydishni xo'jaliklarda tashkil etish dastlabki to'qqan sigirlarni birinchi laktasiyasi bo'yicha baxolashga imkon berib, podani jadal almashishini ta'minlaydi.

Takliflar

1. Fermer xo'jaliklarida faoliyat ko'rsatayotgan barcha ishchi va xizmatchilarda sigirlarning sut mahsuldorligiga ta'sir etuvchi omillar haqida bilim va ko'nikma hosil qilish.
2. Xo'jaliklarda naslchilik ishlarini to'g'ri tashkil etish asosida, sigirlarning nasl xususiyatini yaxshilash.
3. Sigirlarning irsiy imkoniyatini yuzaga chiqarishini ta'minlash maqsadida xo'jaliklarda mustahkam oziqa bazasini yaratish.

5. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI VA EKOLOGIK MASALALAR.

Prezidentimiz I.A.Karimov “O‘zbekiston XXI-asr bo‘lag‘asida xavfsizlikka tahdid barqarorlik sharoitlari va taraqqiyot kafolatlari” kitobida ekologik muammolar to‘g‘risida shunday degan edi,

- Milliy xavfsizlikda qarshi yashirin maqsadlarni ko‘rib chiqar ekanmiz, ekologik xavfsizlik va atrof muhitni muhofoza qilish muammosi alohida e‘tiborga loyiqdir. Asrlar tutash kelgan holda butun insoniyat mamlakatimiz aholisi juda katta ekologik muammoga duch keladi buni sezmaslik qo‘l qovushtirib o‘tirish bilan barobardir.

Afsuski ko‘plab muammolarga befarqlik va ma’sulyatsizlik bilan munosabatda bo‘lmoqdalar, ekologik xavfsizlik muammolari alla qachonlar milliy va mintaqaviy doiradan chiqib butun insoniyatni umumiy muammosiga aylangan. Inson tabiatni xo‘jayini degan soxta socialistik mafkuraviy davo ayniqsa, markaziy osiyo mintaqasida ko‘plab odamlar bir qancha xalqlar va millatlarning hayoti uchun fojeasiga aylangan.

Afsuski bu jarayon O‘zbekistonni ham chetlab o‘tmadi. Bu yerda mutaxasislarni baholashda juda murakkab aytish mumkin. Bunday vaziyat nimalardan iborat.

- Birinchidan: yerning hosildorligi va uning sifati pastligi bilan bog‘liq nazoratning to‘xtovsiz ortib borganligi.
- Ikkinchidan: O‘zbekistonning ekologik xavfsizligi nuqtai nazaridan qaraganda suv zahiralari shu jumladan, yer osti va yer usti suvlarning kelishi to‘xtatiladi.
- Uchinchidan : orol dengizining qurib borishi g‘oyat keskin muammo. Orol dengizi muammosi muammolarning uzoq o‘tmishdan beri muammo bo‘lib kelmoqda.

Mutaxasislarning ma‘lumotlariga qaraganda har yili respublikamiz atmosfera havosiga 4 ming tonnaga yaqin zararli moddalar ko‘tarilmoqda. Hozirgi kunda respublikda istiqbolligi ya‘ni atrof muhitni muhofoza qilish

tabiat qonuniyatlarini buzulishini aniqlab bo'lmaz ekologik falokatlarga olib keladi.

Beto'xtov davom etayotgan qurollanish poygasi qaysiki, atom kimyoviy qirg'in qurollar va ommaviy qirg'in qurollarning va boshqa qurollarning ishlab chiqarilish, saqlash va sinash insoniyat yashayotgan muhit uchun juda katta xavf tug'diradi.

Tabiatni muhofaza qilish tabiatni insoniyat manfaatlarini ko'zlab saqlashga va ongli ravishda o'zgartirishga, uning mahsuldorligini saqlab qolishga, hamda resurslaridan tabiat qonuniyatlarini hisobga olgan holda oqilona foydalanishga qaratilgan barcha tadbirlar tizimi. Tabiatni muhofaza qilish tizimiga davlatlar xalqaro va jamiyat, ilmiy, texnik ishlab chiqarish, iqtisodiy, hamda ma'muriy tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlar kiradi.

O'zbekiston Respublikasi «tabiatni muhofaza qilish to'g'risida»gi qonuning 1-moddasida qayd qilinganidek bu muhim xujjat asosida mamlakatning yer, suv, o'rmon, yer osti boyliklari to'g'risidagi, atmosfera havosini, o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish, hamda ulardan foydalanishni yo'llari ko'rsatilgan. Ushbu qonunning 21-moddasi «Jonli tabiat obyektlaridan foydalanish shartlarida» tabiatdagi hayvonlar, organizmlarning qayta tiklanish qobiliyatini saqlash, ularning xilma-xil turlarining barqarorligini saqlash uchun atrof tabiiy muhitning biologik jihatdan ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik sharti bilan foydalanish ta'kidlanadi.

Hozirgi vaqtda tabiatni muhofaza qilishni ta'minlash masalalarini nazariy jihatidan ishlab chiqilgan, lekin bu masalani ijobiy amalga oshirilishi katta mablag' sarflashni talab etadi. Sanoatning rivojlanishi bilan atrof-muhitning ifloslanishi kuchaydi. Sintetik materiallar, neft, gazni qayta ishlab mahsulot chiqarish avtomobil, suv havo transportining rivojlanib ketishi atrof-muhitni juda ifloslanishiga olib keldi. Ishlab chiqarishdan chiqindi sifatida chiqarish tashlanadigan, qishloq xo'jaligida o'g'it, gerbisid, insektisid sifatida foydalaniladigan moddalar atrof-muhitni zararladi. Bugungi kunda insoniyat dunyosida 80 dan ziyod kimyoviy elementlardan foydalanadi.

O'zbekistonda olib borilayotgan demokratik jamiyat tabiat bilan to'g'ri munosabatda bo'lish uchun asos yaratdi. Mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan

tabiatni muhofaza etish davlat qo'mitasi «Ekosan» tabiatni muhofaza qilish xalqaro tashkiloti bilan hamkorlikda ish olib bormoqda. O'rmon xo'jaliklari ko'paytirilmoqda. O'zbekistonda o'rmon bilan qoplangan maydon 8578,3 ming gektar bo'lib, shundan 3,3 ming gektari sug'oriladigan yerlardir.

Qishloq xo'jaligida zaxarli ximikatlarni ishlatish kamaytirilmoqda, ayrimlari butunlay taqiqlangan (DDT), zararkunandalarga qarshi kurashning biologik usullaridan foydalanilmoqda.

Tabiatni muhofaza qilishda alohida ajratib qo'yilgan daxalar muhim rol o'ynaydi. Bunday joylarda tabiat majmuasi tabiiy holda saqlanadi, noyob o'simlik va hayvonlar ko'paytiriladi (milliy bog'lar, qo'riqxonalar). Mamlakatimizda Davlat sanitariya-ekologiya ekspertizasi tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi va xuquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan birgalikda hayvonot dunyosining tabiatni ifloslanishiga qarshi choralarni oldini oladi. Zootexniya fanida o'rganilganidek bo'rdoqilanayotgan hayvon bir kecha-kunduzda 15-20 kg go'ng ajratsa, jami 90-120 kun davomida barcha mollardan aratiladigan go'ngni saqlab, ferma atrofini ifloslanishini oldini olish ferma uun muhim masala ekanini anglashimiz darkor. Ferma atrofini ko'kalamlashtirilishi xodimlar uchun mehnat sharoitini yaratilishi hayvonlarni turli xil kasalliklarga qarshi emlanishi ham uning yaratuvchisi insonning sog'ligini asrashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, aholi o'rtasida ham tabiatni muhofaza qilish bo'yicha targ'ibot ishlarini olib borishni yo'lga qo'yish masalalari ham inson va hayvon organiziga ijobiy ta'sir ko'rsatishini inobatga olish zarur.

6. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov I.A. «2004-2006 yillarda Fermer xo'jaliklarini rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida» farmoni. Fermer gazetasi. 20.03.2004.
2. Karimov I.A. «Shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo'jaliklarida chorva mollarni ko'paytirishni rag'batlantirish chora tadbirlari to'g'risida» gi qarori. Xalq so'zi gazetasi. 24. 03. 2006.
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining «Fermer xo'jaligi to'g'risida» gi o'zbekiston Respublikasi qonunini amalga kiritish haqida qarori № 663-11. T. 26 – avgust 2004. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. Sentyabr. T. 2004.
4. “Shaxsiy yordmchi, dehqon va fermer xo'jaliklarida chorva mollarini ko'paytirishni rag'barlantirishni kuchaytirish hamda chorvachilik maxsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida” gi O'zbekiston Respublisi Prizidentining PQ-842 sonli qarori. Toshkent 2008 yil, 21 aprel.
5. Karimov I.A. Jaxon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi. O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari. Toshkent. “O'zbekiston”, 2009.
6. Abuzarov R. Effektivnost kukuruznogo silosa s dobavkami. J. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo № 6. 2004 g. S 21-22
7. Adushinov D, Muxammadiyeva A. Sozdaniye cherno-pestrogo skota molochnoga tipa. // J. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo- 2003. -№ 2. B. 25-26.
8. Adushinov D. Effektivnost golshtinizasii cherno-pestrogo skota v Vostochnoy Sibiri. J. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo № 3, 2006 g. str. 17-19.
9. Akmalxanov Sh. Biologicheskiye i zootexnicheskiye osnovi vedeniya molochnogo skotovodstva v Uzbekistane. Toshkent: Mexnat, -1993.- 38-40. b.
10. Alekayev A. Morfofunktsionalniye svoystva vimeni Aueliatinskix korov pri skreщivanii. J. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo, № 8, 2004. s. 25-26
11. Amirov Sh., Narzullayev N., Abdurasulov, A. Vafuqulov O. Ozuqa, sut va sifat. O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali № 7, 2003 y. 25-26 betlar.

12. Annenkova N.V. Rezultativnost skreščivaniya cherno-pestrogo skota s golshtinskim. J.Zootexniya. № 1, 1999 g. s. 9-10.
13. Barishev A.A, Seifkov V.A, Grishin A.M. Izmeneniye sostava moloka visokoproduktivnix korov s vozrastom. //J. Zootexniya -1991.-№ 2.-B. 17-18.
14. Basiladze.G, Gosiridze. N. Vliyaniye porodi na kachestvo sira v usloviyax yujnogo nagorya Gruzii. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo, № 3 ,2004 g. s.31-32
15. Blednov V. Golshtini v Xakasii. // J. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo. - 1996.- № 5.- B. 13.
16. Belikova A.S. i drugiye. Vliyaniye belkovo –vitaminogo premiksa na kachestvo korovyego moloka. J. Zootexniya, №2. 2005. s. 13-16
17. Boyarskiy L. Effektivnost yachmenno-lyusernovogo silosa v ratsionax korov. J.Molochnoye i myasnoye skotovodstvo. № 3 2004 g str. 16-17.
18. Boyarskiy L., Titov Yu.. Letneye kormleniye korov bez konsentratov. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo. № 3, 2003, str. 10-11.
19. Buriyev S. Sovershenstvovaniye seleksionnix priznakov potomstva importnogo cherno-pestrogo skota s ispolzovaniyem bikov golshtinskoy porodi. Avtoref. Diss. ... kand. s.-x. nauk. Tashkent: 1993.- 9 b.
20. Ganushenko O, Paxomov I, Razumovskiy, N. Zagotovka i ispolzovaniye zernosilosa iz viko- ovsyanix smesey. J. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo. №. 8. 2004. s 13-14
21. Gorbachyova N.N., Kirsanov A.F.. Poyedayemost kormov i perevarimost pitatelnix vemyestv ratsionov korovami v period razdoya. J.Zootexniya № 9, str. 14-16
21. Grin M, Kazaroves N, Maslyak. O. Vzaimosvyaz mejdu udoyem i komponentami moloka u korov cherno-pestroy porodi. // J. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo.- 1998.- № 3.- B. 25-28.
22. Davidov R.B. Spravochnik po molochnomu delu. -M.: 1952.- 36 b.
23. Do'stqulov S.D, Rahimov A.A. Har xil genotipli qoramollarning mahsuldorligifan yutuqlari va qishloq xo'jaligini rivojlantirish istiqbollari: Ilmiy anjuman materiallari. - S, 2004. 213 b.

24. Karchevskiy E.Yu. Teoriya i praktika razvedeniya cherno-pestrogo skota v Uzbekistane. -Tashkent.: Fan, 1984.- 4 b.

25. Kalinixin.V, Kalinixin.Ye.K. Miшyeiy penislinna v ratsione korov

J. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo №6, 2004 . s. 22-23

26. Korobkov.A.P, Moskalino S.N, Kuznesov M.Yu. Sravnitel'naya effektivnost skarmlivaniya korovam senaja raznoy texnologii zagatovki. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo, № 7. 2004 g. s. 25-26.

27. Kulakov V, Bolayeva O, Sherbakov M, Shpakov A. Kulturniye pastbiшa dlya molochnogo skota. J. Molochnogo i myasnoye skotovodstvo. №1, 2000 g. s. 16-20

28. Loginov S.A., Pogodayev S.F. Produktivnost korov raznix tipov stresso ustoychivosti. J.Zootexniya № 9, 2004, s. 26-27.

29. Magmedov.M, Simakov G, Gokubev.A. Osobeshnosti mineralnogo pitaniya molognix korov. J. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo N Cl. 1993 g. s. 11-12.

30. Marchenko G. Vliyaniye soderjaniya korov na ix molochnuyu produktivnost. //J. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo. -1996. -№ 2.- B. 6-8.

31. Nikitina N., A.Rodionov Yu., Livshis L. Kak uvelichit kolichestvo i kachestvo moloka. J. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo. № 3 2004, str. 28-29 .

32. Nikitina N. Produktivnost golshtinizirovannogo simmentalskogo skota Xakasii. J.Zootexniya № 9, 2004, s.7-8.

33. Simarev Yu. Kak uluchshit kachestvo moloka. //J. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo.- 1993.- № 2-3.- B. 22-24.

34. Sobirov P, Norboyeva M. Qizil eston zoti. //J. O'zbekiston qishloq xo'jaligi.- 2003,- № 6.- B. 21

35. Soldatov. A, Yaroshkevich A, Avsiser L, Marchenko L. Vliyaniye genotipa korov na kachestvo moloka. //J. Molochnoye i myasnoye skotovodstvo. -1991.- № 5. - B. 38-41.

36.Tmenov.I, Sosiyev R, Bosoyev Z. Tereklit v ratsionax laktirugorshix korov.

J.Molochnoye i myasnoye skotovodstvo. №8. 2004 g. S18

37. Tyurkin I. Vliyaniye silosa s muraviinoy kislotoy na sostav moloka. J.Molochnoye i myasnoye skotovodstvo. № 5, 2007 str. 16-17.
38. Ulitko V.Ye, Xaysanov D.P, Dushnin V.V. Vliyaniye razlichnix istochni-kov karotina na produktivnost korov.//J.Zootexniya.-1997.-№6.- B. 19-23.
39. Urolov.K., Xolmirayev D., Abdurasulov.A, Narzullayev. N. Turli genotipga mansub qora-ola va litva qizil zotli sigirlarning sut mahsuldorligi. Agrar xabarnomasi. 2003 yil, 18-19 betlar.
40. Sharafutdinov G.S. Produktivniye kachestva xolmogorskix korov pri povishennom urovne kormleniya. // J. Zootexniya.- 2000-. № 4.- B. 16-17.
41. Shidlovskaya V.P, Bezenko T.I. Bazisniye normi sodержaniya belka i jira v zakupayemom moloke. //J. Molochnaya promishlennost.- 1992.- № 5.- B. 25-30.
42. Shipilov V. “Programma” “Felusen” eto povsheniye rentabelnosti. Internet. Adres: Samkey –Peterburg. Jeleznodorojniy pr 40
43. Shundullayev R., Savenko N. Sbalansirovannoye kormleniye pri virashivanii korov. J.Molochnoye i myasnoye skotovodstvo. № 8, 2004 g. str. 14-16.
44. Internet saytlari :
- [www. Ziyonet.uz](http://www.Ziyonet.uz)
- email: <<mailto:info@selteh.com>> info@selteh.com
- sayt: <<http://www.selteh.com>> <http://www.selteh.com>

Поалар

Молочная продуктивность скота

Порода и тип скота. В процессе разведения пород скота были созданы характерные продуктивные качества животных. По этим качествам и с учетом молочной продуктивности породы скота можно разделить на следующие группы:

- 1) с высоким удоем и пониженным содержанием жира в молоке (черно-пестрая, красная степная и др.). Удои коров составляют в среднем 4-5 тис. кг на одну голову за год, жирномолочность 3,6-3,7 %;
- 2) жирномолочные (джерсейская, ярославская, англеская и др.). Удои коров 3-4 тис. кг молока, жирномолочность 4,3-6 % и выше;
- 3) с различными по величине удоями и средней жирностью молока (симментальская, лебединская, костромская и др.). Наряду с породой учитывают также внутривидовые типы животных по конституции организма и направлению продуктивности: молочные, комбинированные и мясные.

Живая масса. Кормление коров. Уход за коровой

Живая масса. Крупные коровы молочного типа более продуктивны и выгодны. Однако, если не учитывают тип скота, то наблюдаются криволинейный характер связи между живой массой и молочностью коров. Сопряженные показатели молочной продуктивности и живой массы коров после третьего отела и старше желательного типа следующие: 1000 кг молока и более у животных молочных пород с высоким удоем в расчете на 100 кг живой массы, 700-800 кг молока у коров комбинированных пород в расчете на 100 кг живой массы.

До определенной живой массы животных молочность повышается, а потом снижается. Самые высокопродуктивные коровы голштинско-фризской породы имеют и самую высокую живую массу - в среднем до 600 кг и более.

Кормление. Количество и качество молока в значительной мере зависят от количества сенового корма, его химического состава, сбалансированности рациона по питательным веществам. Соотношение питательных веществ в рационе должно быть оптимальным.

В структуре себестоимости молока удельный вес кормов составляет примерно 60 %.

Рационы коров необходимо регулировать по следующим показателям: сухому веществу, энергии, переваримому и сырому протеину, сахару, крахмалу,

клетчатке, жиру, калию, фосфору, синку, меди, кобальту, каротину, витаминам А и С.

Оптимальное сахаро-протеиновое отношение - 1 : 1, максимально допустимое - 1,5 : 1,0. Для коров наиболее эффективным соотношением между сахаром, крахмалом и переваримым протеином может быть 1 : 1 : 1.

Клетчатки грубых кормов в рационах должно быть не менее 10 %, в летних рационах - не менее 14% сухого вещества.

Содержание жира в рационах коров может составлять 60 % от жира, выделяемого с молоком. Из минеральных веществ контролируется в первую очередь содержание кальция и фосфора. При этом кальциево-фосфорное отношение может быть в пределах от 1,5: 1,0 до 3: 1. Наиболее экономичными и эффективными являются рационы коров, включающие зимой умеренные количества на одну голову в день, кг: силоса - 20, сена - 2-4, корнеплодов-10-25 или мелассы-1,0-1,5; в летний период - зеленых кормов - 60-70 и комбикормов с содержанием в 1 кг переваримого протеина 110-130 г (зимой - 140-150г). Большое значение в кормлении молочного скота летом имеют зеленые корма культурных пастбищ.

Оптимальной сахарная нагрузка считается при 150-160 г сахара сочного корма на 1 кг молока.

Некоторые корма (сахарная свекла, подсолнечниковый жмых) могут повысить, а другие (капустный лист, турнепс, жом), наоборот, снижают жирность молока. Вследствие скармливания капустного листа в значительных количествах снижается деятельность щитовидной железы животного, что обуславливает уменьшение содержания жира в молоке.

С повышением удоя коров расход корма на каждый килограмм молока уменьшается. Кормление низкопродуктивных коров обходится в 1,5-2 раза дороже по сравнению с высокопродуктивными.

Одна из основных задач селекционной работы - выведение животных, хорошо поедающих корма. Эта способность проявляется уже в раннем возрасте и зависит от наследственных качеств.

Уход и содержание. Условия ухода и содержания скота являются неотъемлемой частью технологии и могут способствовать повышению удоя или, наоборот, вызвать снижение его. Испытания академика И. С. Попова было установлено, что понижение температуры в коровнике на каждые 10 °С при прочих равных условиях вызвало увеличение содержания жира в молоке на 0,2 % и уменьшение удоев на 7-10 %.

На продуктивность молочных коров существенно влияет летняя жара. По мере повышения температуры уменьшается как продуктивность, так и содержание

жира в молоке. При стойловом содержании следует учитывать и влажность воздуха коровников. Нормальное содержание скота предполагает ежедневный выгон для животных. Оптимальные параметры микроклимата для коров следующие: температура воздуха 5...15 °С, относительная влажность 70-75 %, воздухообмен на 1 с живой массы 17 м³/ч, скорость движения воздуха 0,5 м/с, концентрация углекислоты 0,25 %, аммиака 20 мг/м.

Частые перегруппировки коров снижают их продуктивность в среднем на 10 %. Поэтому одним из требований промышленной технологии является распределение животных на стабильные группы по физиологическому состоянию, живой массе и возрасту.

Различные шумы, нарушения распорядка дня, чрезмерно большие группы коров при беспривязном и привязном содержании отрицательно сказываются на удоях. Возраст животных. Одним из селекционных показателей в молочном скотоводстве является долголетие животных. Длительное их использование в племенном и продуктивном отношении экономически выгодно. Возрастной состав коров по количеству отелов находится в прямой зависимости от интенсивности ввода первотелок в стадо и жесткости выбраковки из стада животных, непригодных к использованию. Молочная продуктивность коров по лактациям повышается до 4-, 5, 6-й лактации, а потом снижается. Она зависит от биологических особенностей возраста и молочной продуктивности коров. Пожизненные рекорды молочной продуктивности у коров определяют максимальную возможность в использовании их на протяжении всей жизни.

email: <<mailto:info@selteh.com>> info@selteh.com

сайт: <<http://www.selteh.com>> <http://www.selteh.com>