

**ЎЗБЕКИСТОН ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС
ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ҚАРШИ МУХАНДИСЛИК ИҚТИСОДИЁТ
ИНСТИТУТИ**

**МЕВАЧИЛИК,
САБЗАВОТЧИЛИК,
ПОЛИЗЧИЛИК**

(Маърузалар матни тўплами)

Қарши –2006 йил

ТУЗУВЧИ: қишлоқ хўжалик фанлари номзоди доцент М. Мираков

ТАКРИЗЧИЛАР:

А. Орипов – Қашқадарё вилоят ҳокимлиги агромажмуа котибияти бош мутахассиси қишлоқ хўжалик фанлари номзоди

Н.Жумаев – Агрономия фанлари кафедраси доценти, қ. х. ф. н.

Маъруза матнлари институт услубий кенгашида куриб чикилиб купайтириш ва фойдаланишга тавсия этилган.

“Мевачилик, сабзовотчилик, полизчилик” фани буйича маъруза матнлари тасдиқланган намунавий дастур асосида ёзилган булиб, ушбу фанга доир асосий тушунчалар ва маълумотлар киска баён этилган, фанни чуқур ва мукамал эгаллаш учун курсатилган адабиётлардан фойдаланишни тавсия этамиз.

Ушбу маъруза матнлари фанни урганишда илмий ва услубий ёрдам курсатишга хизмат қилади.

Маъруза матнлари барча “5620200 - Агрономия” (Деҳқончилик маҳсулотлари бўйича), “5620300 - Ўсимликлар ҳимояси” ва “5620500 - Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва уларни дастлабки қайта ишлаш технологияси” йўналишлари ихтисослигидаги талабалар учун мўлжалланган.

Сборник лекции

По предмету “Плодоводство, овощеводство и бахчеводство” написано согласно утвержденной рабочей программы.

Данный сборник лекции помогает студентам для усвоения этой науки, и даёт научно методический помощь и рассчитано для студентов по профилю 5620200 - агрономов, 5620300 - защиты растений и 5620500 - технология возделывания сельскохозяйственных продуктов, хранения и первичной обработки их.

Collection to lectureк

On the ksubject "Fruit growing, vegetable growing and melon-growing" ik written according to the confirmed teaching program.

This collection of lectureк helpк the ktudentк in maktering this ksubject and ik for the ktudentк on dikcipline 5620200 - agronomikt, 5620300 - plant protection and 5620500 - technology of cultivation agricultural produchк, prekerving and primary prosekking them.

МАЪРУЗА МАТНЛАРИ ВА АЖРАТИЛГАН СОАТЛАР.

№	МАЪРУЗА МАТНЛАРИ	Соат
1.	Кириш. Мева ва узумчилик халқ хўжалигидаги аҳамияти	2
2.	Мева дарахтларининг усиши ва	2

	махсулдорлиги	
3	Мева ва резавор мева усимликларини кўпайтириш, мева кўчатларини етиштириш технологияси	2
4.5.	Мева боғи барпо қилиш	4
6.7.	Боғларда тупроқни ишлаш системаси, боғларни суғориш ва ўғитлаш	4
6	Мева дарахтларни ва ҳосилдор боғларни парвариш қилиш	2
7	Сизот сувлари яқин, шурҳок, ботқоқ ерларда боғ барпо қилиш агротехникаси	2
8.9 .	Мева дарахтларига шакл бериш, буташ	4
10	Резавор меваларнинг агротехник хусусиятлари	2
11	Узумчилик халқ хужалигидаги аҳамияти. Токзорлар барпо қилиш. Ток кучатлари етиштириш технологияси	2
12	Ток усимлигининг биологияси	2
13	Токни кўпайтириш ва парвариш қилиш	2
14	Кириш. Сабзавот етиштириш технологияси	2
15	Сабзавот усимликларини биологик асослари ва уларни парвариш қилиш	2
16	Ҳимояланган ер иншоотларининг хусусиятлари, турлари, тузилиши	2
17	Очиқ ер учун кучат етиштириш технологияси	2
18	Ҳимоя қилинган жойларда сабзавотларни етиштириш технологияси	2
19-20	Томатдош сабзавотлар, етиштириш технологияси	4
21	Бодиринг ва сабзавот қовоқчалари агротехникаси	2
22	Карам усимликлари ва етиштириш	2
23	Илдиз мева сабзавотлар ва уларни етиштириш	2
24	Пиёзли сабзавотлар парвариши	2
25	Полиз экинларининг халқ хужалигидаги аҳамияти ва уларни турлари,маконлари	2

26	Полиз экинларининг ботаник таърифи ва навлари, морфобиологикхусусиятлари	2
27	Сувли ва лалмикор ерларда полизчилик хусусиятлари, уруғчилиги, тиштириш технологияси	2
ЖАМИ:		54

Суз боши

Мевачилик, сабзавотчилик ва полизчилик кишлок хужалигининг асосий тармокларидан бири булиб, ахоли учун озик-овкат махсулотлари, чорвачилик учун ем-хашак базаси ва енгил саноатта хом-ашё етказиб берувчи тармок сифатида фойдаланиладиган экинларни устириш ва хосил олишни узига мужассамлаштирган соҳадир. Бу соҳада махсулот етиштиришни купайтириш ва уни сифатини яхшилаш учун куплаб илмий изланишлар, янги навлар яратиш ҳамда технологик жараёнларни такомиллаштириш талаб килинади. Бунинг учун етук мутахассис кадрлар пухта билимга эга булиши керак.

Бу фан ҳам барча кишлок хужалик фанлари сингари узок тарихга эга. Мевачилик, сабзавотчилик ва полизчилик билан инсоният 4000 йиллар илгаридан шугулланиб келишган. Унинг махсулотлари пархез таом ва шифобахш хусусиятга эга эканлигини одамлар азадан билишиб, меваларнинг махсулотларини куришиб, консервалаб узок муддат саклаб истеъмол килганлар. Республикамизда етиштирилаётган мева, сабзавот, полиз махсулотлари дунё микёсида жуда катта ахамиятга эга, чунки мазаси ва сифати жихатидан бошка давлатлардагига нисбатан анча юкори баҳоланади ва талаб ҳам юкори, айникса кайта ишланган махсулотларимиз дунё бозорига кириб бораяпти.

Ушбу маърузалар матни мевачилик, сабзавотчилик ва полизчиликдан юкори ва сифатли хосил етиштириш усуллари ва хосилдорликни кутариш йуллари, нав ва тур хусусиятларига багишланган булиб, намунавий укув дастури ва иш режасига мувофик тузилган ва талабаларни узлаштиришлари учун содда холда ёзилди.

1- Маъруза: КИРИШ. МЕВА ВА УЗУМЧИЛИК ХАЛҚ

ХУЖАЛИГИДАГИ АҲАМИЯТИ

Режа:

1. Фаннинг мақсади ва вазифалари.
2. Ўрта Осиё ва ўзбекистонда мевачиликни қисқача ривожланиш тарихи.
3. Ўзбекистон вилоятларида мевали усимликларни тарқалган зоналари.
4. Мева ҳосилдорликларини қисқача тавсифномаси
5. Мевачиликни ривожлантиришда илмий-текшириш муассасаларини роли.

Адабиётлар: 1, 2, 3, 7.

Таянч иборалар. Морфо-биологик хусусиятлар, совуққу чидамли навлар, мосланиш, зоналар, Узуммева сабзавот-холдинг компанияси, фирма, қўйта ишлаш корхоналари, виночилик-узумчилик ишлаб чиқариш бирлашмаси, филиаллари, ўзбекистон усимликшунослик институти (ВИР).

1.1. Мевачилик ва узумчилик фанини уқитишдан мақсад, уларни етиштириш ва ялпи ҳосилни оширишдаги энг сунгги маълумотлар, ҳамда мевачилик ва токчиликни ҳозирги аҳволи ва уни преспектив ривожлантириш билан талабаларни таништириш.

Мевачилик ва узумчилик фанини вазифаларига қуйидагилар киради:

- мева ва ток усимликларини морфо-биологик хусусиятларини урганиш;
- мева ва ток усимликлари ташқи муҳит шароитига талаби;
- мева ва ток усимликларини навлари билан таништириш;
- мева боғлар, токзорлар барпо қилишда мева ва ток қўчатларини етиштириш технологиясини урганиш;
- мева ва резавор -мева усимликларини қисқача ривожланиш тарихи билан таништириш;
- мева ва резавор-мева усимликларни юқори сифатли совуққа чидамли навларини яратишда -илмий ташкилотларни роли.

1.2. Ўрта Осиё ва ўзбекистонда мевачиликни қисқача ривожланиш тарихи. Боғдорчиликка доир айрим маълумотлар дастлабки V-асрдаёқ пайдо бўлган. X-асрга келганда боғдорчилик анчагина ривож топди. XIX асрга келиб саноат аҳамиятига эга бўлган боғлар барпо этилиб, улар қишлоқ хужалиги да салмоқли урин эгаллайди.

Ўрта Осиёда маҳаллий боғбонлар қўй йиллардан бери боғдорчилик билан шуғулланиб келганликлари сабабли,

меванинг купгина навларини яратишга мувофиқ бўлинди. урик, ёнғоқ, шафтоли, анор, бодом каби меваларнинг маҳаллий навлари купрок яратилди, уларнинг айримларини ҳосилдорлиги, сифати ва маҳаллий иқлим шароитига мослашувчанлиги, касаллик ва зараркунандаларга, курғоқчиликка чидамлилиги билан фарқ қулар эди.

Олма, нок ва беҳизорлар барпо этиш фақат маҳаллий аҳамиятга эга эди, холос. Шунинг учун ҳам республикадан ташқарига мевачилик маҳсулотлари чиқариш учун ҳеч қандай ички имконият йуқ уди. Тошкент - Оренбург темир йули курилгандан кейингина саноат аҳамиятига эга булган боғлар барпо қилиниб Россия томонларга ҳул мева юбориш миқдори йил сайин ортиб борди. Кейинчалик Тошкент воҳасига, Қрим, Франция, Америкадан янги мева навларини олиб келиб, боғлар барпо қилина бошланди. Келтириб экилган мевалар Тошкент шароитига анча яхши мослашди. Натижада Тошкент воҳасида Европадан келтирилган олма ва бошқа хил мева навлари кенг тарқатила бошланди. Тошкент воҳасидан аста-секин республикамизнинг бошқа вилоятларига ҳам мева навлари ва турлари кенг тарқала бошланди.

Мева дарахтларнинг ватани урта Осиё, Закавказье, Узоқ Шарқ, Хитой, Ҳиндистон, Бирма, Эрон, Сирия ҳисобланиб, бундан 3-4 минг йил илгари аниқланган.

1.3. Ўзбекистон вилоятларида мевали усимликларни тарқалган зоналари ва уларга кискача тавсифнома бериш. узбекистонда боғлар майдони 1998-1999 йилда 227 минг гектарни ташкил этади. Боғлар асосан қуйидаги областларда жойлашган: Тошкент вилоятида 34,7 минг., Фарғона вилоятида 32,9 минг., Наманган вилоятида 30,3 минг., Андижон вилоятида 27,3 минг., Самарқанд вилоятида 21,0 минг., Бухоро вилоятида 10,4 минг., Қашқадарё вилоятида 17,8 минг., Жиззах вилоятида 11,7 минг., Сурхондарё вилоятида 12,0 минг., Хоразм вилоятида 13,6 минг., Қорақалпоғистон Республикасида 5,1 минг. гектар боғлар бор.

Тошкент вилоятида асосан уруғли мевалар, Фарғона воҳасида урикнинг яхши навлари, Сурхондарё ва Фарғона воҳасида анор, анжир, хурмо ва чилонжийда каби иссиқсевар мевалар куп экилган. Суғориладиган барча зоналарда янги боғларни ҳам ривожлантириш режалаштирилган. Боғдорчиликни ривожлантириш учун Қаршида, Амударё воҳасида ва Мирзачул зоналарида катта имкониятлар бор. республикамизнинг тоғли районларида ҳам боғдорчиликни

ривожлантириш имкониятлари катта. Агар боғдорчилик учун яхши зоналар танланиб, ерлар агротехника қоидаларига мувофиқ ишланса, бу ерлардан юқори ҳосил олиш мумкин.

Ҳозирги пайтда республикада Узмевасабзавот - Холдинг компанияси тузилди, 27 фирма унинг сафига кирди, 89 та хужаликлар Холдинг компанияси қайта ишлаш корхоналарини ҳам ашё билан таъминлаб келмоқда. Кейинги йилларда боғдорчиликда уруғли мева дарахтлари купрок экилиши натижасида данакли мевазорлар майдони олдинги йилларга нисбатан бир мунча узгарди. Ҳозирги пайтда данакли мева боғларни уларни кучатини купайтириш борасида катта ишлар олиб борилмоқда. Республикада етиштирилаётган хул меванинг 69,7% истеъмол қилинади, 6,8% дан консерва, 4,4% куритилади, 4,4% республикадан ташқарига реализация қилинади, қолган қисмидан ҳар хил ичимликлар тайёрланади

1.4. Мевачиликни ривожлантиришда илмий-текшириш муассасаларини роли. узбекистонда боғдорчиликни ривожлантиришга 1855 йилда ташкил этилган. Россия боғдорчилик филиали катта ижобий таъсир курсатди. 1889 йилда Туркистон қишлоқ хужалик академияси ташкил этилди ва бунга куп йиллар мобайнида боғдорчиликни ривожлантиришга катта хисса қўутган кузга куринган йирик олим, академик Рихард Рихардович Шредер раис килиб сайланди. 1917 йилларга келганда Һозирги узбекистон худудида бор йуғи 22 минг гектарга яқин боғлар мавжуд эди.

Республикада мевачиликни янада ривожлантиришда илмий муассасалар ва укув юртлари: академик Р.Р.Шредер номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик ишлаб чиқариш бирлашмаси, унинг филиаллари: узбекистон усимликшунослик институти (ВИР) нинг урта Осиё булими: Тошкент, Самарқанд қишлоқ хужалик институтларининг мевачилик ва узумчилик кафедралари катта ёрдам бермоқда.

Лекин шуни айтиш керакки, Һозирги пайтда етиштирилаётган боғдорчилик маҳсулотлари аҳолини усиб бораётган талабини қондира олмаяпти. Мадомики шундай экан, эндиги вазифа фан ютуқлари ва илғор тажрибаларни ишлаб чиқаришга кенг жорий қилиш билан яқин йиллар ичида мавжуд мевали боғлар ҳосилини гектар бошига камида 100-120 ц.га етказиш керак.

Саволлар:

1. Кишлок хужалигида иқтисодий ислохатларни янада чуқурлаштиришга қаратилган 1998 йил ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қандай қарорлари қабул қилингану
2. Ўзбекистонда мева ва резавор - мева усимликларининг нечта тури усадиу
3. Резавор мева усимликлари турлари қанча.
4. Ўзбекистонда мевачилик саноат асосида қачон ривожлана бошлагану
5. Мева дарахтларининг келиб чиқиш ватани ҳақида нималарни биласизу
6. Ўзбекистондаги боғларни майдонини айтинг.
7. Республикадаги ҳул меваларни майдонини айтинг.
8. Боғдорчиликка қачон асос солинган.
9. Мевачилик соҳасида қандай илмий муассасаларни биласиз.
10. Мева ҳосилдорлигини уртача ҳосилдорлиги қаннча.

2-Маъруза: МЕВА ВА РЕЗАВОР-МЕВА УСИМЛИКЛАРИНИ КУПАЙТИРИШ, МЕВА КУЧАТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ.

Режа:

1. Мева усимликларининг индивидуал ривожланиши.
2. Мева кучатларининг ривожланиш даврлари
3. Мева дарахтларининг узиш даврлари.
4. Мева дарахтларини антогенезлари
5. Меваларин маҳсулдорлиги

Адабиётлар : 2, 4, 8.

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР; дурагай, вегетатив купайиш, пайвандлаш, қаламча, бачкиновда, клон, эмбрионлик, ювинил, қариш, онтогенез, туқума, ҳужайра.

1.1. Мева усимликларининг индивидуал ривожланиши. И.Мичурин усимликларни ташқи муҳит шароити билан боғлиқ ҳолда урганди ва уларнинг ривожланиш тарихини ҳисобга олди. У организм қандай ташқи муҳит шароити таъсирида шакланган бўлса, бутун ривожланиш циклида ҳам худди шундай шароитни талаб қилишини аниқлади.

Мева усимликларнинг индивидуал ривожланиши, яъни онтогенез уларнинг уруғи униб чиққунидан бошлаб, то усимлик бутунлай қуриб қолгунча утадиган даврни ўз ичига олади. Онтогенезда асосан бир-бири билан бевосита муносабатда

булган усиш, ривожланиш, қариш ва ёшариш процесслари боради.

Битта дурагай усимликдан вегетатив (пайвандлаш, қаламча, бачки новдасини экиш) йули билан куп минг нусха янги усимлик ҳосил қилиш мумкин. Буларнинг ҳаммаси биргалиқда клон: клонни ташкил этган айрим усимликлар индивид деб аталади. Дурагайнинг иккинчи формаси клон индивид, учинчи формаси эса учинчи клон индивид ҳосил қилади ва ҳоказо.

Уруғ кучатнинг индивидуал ривожланиши зиготадан, яъни сперма билан тухум хужайранинг қўуилиши натижасида ҳосил булган битта хужайрадан бошланади ва усимликдаги барча қисм (орган) ларнинг қуриши билан тугалланади.

Вегетатив йул билан купайтириладиган усимликларда индивидуал ривожланишнинг бошланиши вегетатив қисмлардан янги усимлик ҳосил булиш вақтига тугри келмайди. Бу ҳолда янги усимлик уруғдан усиб чиққан она индивиднинг ҳаёт циклини давом эттиради. Шунинг учун индивид термини фақат бошлангич уруғ кучатга, яъни уруғидан усиб чиққан усимликларга тааллуқлидир, фақат шулар барча индивидуал ривожланиш стадияларини утади. Мазкур кучатларнинг айрим қисмларидан купайтирилган усимликлар эса индивид эмас, балки клон индивиди деб аталади.

1.2. И.В.Мичурин мева усимликлари уруғ кучатининг ёшини : эмбрионлик, ёшлик (ювинил). Махсуддорлик ва қуриш (қариш) давларидан иборат 4 даврга бўлинган.

Эмбрионлик даври зигота ҳосил булгандан бошланади: шундан сунг она (асосий) усимликда уруғ ривожланади. Бу давр уруғ униб чиққандан кейин уруғ палла ёриб чиққунча ва биринчи чинбарг пайдо булгунча давом этади. Бу даврда ёш организм жуда узгарувчан ва ташқи муҳит шароитига мослашишга мойил булади.

Ёшлик даври кейинги чинбарглр чиқарганидан бошланиб, ҳосилга киргандан сунг 3-5 йилгача давом этади. Бу даврда усимликнинг ирсиятига хос белгилари ва хусусиятлари тулик шакланади ҳамда тугалланади. Улар бир вақтда шакланмайди. Ҳаётнинг бошлангич босқичида вегетатив, кейин эса репродуктив белгилар шакланади. Репродуктив белгилари мустаҳкамланиши учун 3-5 йил ва ундан ҳам ортиқ вақт керак. Бу процессда уруғ кучатларни мақсадга мувофиқ парвариш қилиш жуда муҳимдир, чунки бу даврда уларнинг қимматли белги ва хусусиятлари шакланади ва

мустахкамланади. Уруг кучатлар, эмбрионал даврдаги сингари жуда узгарувчан, янги ҳаёт шароитига мослашишига мойил бўлади.

Уруг кучатлар ёшлик даврининг охирида (3-5 йил ҳосил бергандан сунг) махсулдорлик - етилиш даврига киради. Бу даврда усимликлар кам узгаради, белги ва хусусиятлари анча барқарор бўлиб, наслдан-наслга утади. Бундан кейин кичик узгаришлар содир бўлади ва улар ирсий узгаришларга боғлиқ бўлмайди: булар об-шаво шароити, тупрок ва парвариш қилиш таъсирида вужудга келадиган физиологик узгаришлардир.

Махсулдорлик даврида усимликларнинг ер усти ва ер ости қисми максимал даражада катталашади, шох-шаббасининг структураси ва ҳосил қилиш типи шаклланади. Бу давр энг узокга чузилади ва қанча давом этиши усимликларнинг ирсий асосига, табиий шароитига ва парвариш қилиш усулларига боғлиқ бўлади.

1.3. Усимликлар ҳаётининг учинчи даври охирига келиб усишдан тухтайди, шохларнинг учки қисмлари қурий бошлайди, сунгра ривожланишининг охириги - қариш, яъни қуриш даврига киради. Узгаришларга мойиллиги йуқолган усимликларнинг ташки муҳитга мосланиш, регенерация (тикланиш) хусусиятлари сусаяди. Танасида оксил тикланиш қийинлашади, моддалар алмашинуви сусаяди. Буларнинг ҳаммаси хужайралар нобуд бўлишига ва усимликларнинг қуришига сабаб бўлади. Нихоят, янгидан ҳосил бўлаётган хужайралар нобуд бўлаётган хужайраларнинг урнини тулдира олмай қолади. Натижада усимликнинг айрим қисмлари, туқума ва хужайралари орасида моддалар алмашинуви бузилади ҳамда физиологик хусусиятлари - усиши, қуртак чиқариши, гуллаши, мевалар пишиши секинлашади ва пировардида дарахт қуриб қолади.

1.4. Мева дарахтларининг усиш давлари. Мева дарахтлари усиши ва ривожланиши процессида ёшга оид кетма-кет бир нечта узгаришлар бўлиб утади. П.Г.Шитт, И.В.Мичуриннинг мева усимликларининг индивидуал ривожланиши ҳар хил ёшда турлича бўлиши ҳақидаги қоидабини ривожлантира бориб, дарахтнинг ҳаёт циклини (уруг кучатда, пайвандланган ва уз илдизидан усган дарахтда) уч асосий даврга: усиш, ҳосил бериш ва қуриш даврига ажратди. Биринчи давр уруг экилгандан ёки кучат утқазилгандан бошлаб, у ҳосилга қиргунча утган вақтни; иккинчи тула, яъни ҳар йили бир меъёрда мул ҳосил беришдан

бошлаб, усиши, тухтагунча булган даврни ва учинчи давр хосил беришдан тухтаб, тамомила куриб колгунча булган вақтни уз ичига олади.

Кейинрок профессор П.Г.Шитт мева дарахтларининг онтогенезини янада аниқроқ қилиб 9 даврга булади ва уларнинг ҳар бири учун қулланиладиган агротехника чоратадбирларини белгилаб чиқади. Бу даврларнинг таърифи ва агротехникасининг моҳияти, асосан, қуйидагилардан иборат.

1.5.Биринчи давр - дарахт вегетатив қисмларининг усиш даври. Бу давр уруғ униб чиққан кучат утказилган пайтдан бошлаб, у биринчи марта хосил бериши билан тугайди. Бу даврда дарахтнинг асосий шохлари ва попуқ ҳамда сурувчи илдиэлари билан бирга асосий илдиэлари усади. Бу даврда шохшабба шаклланади: усиш шароити яхшиланади ва бақувват илдиэ системаси хосил булади, асосий шохларнинг усиши тартибга солинади.

Иккинчи давр - усиш ва хосил бериш даври. Бу давр мева дарахти биринчи хосилга қирган вақтдан бошлаб, муттасил хосил бергунча булган ривожланиш вақтини уз ичига олади. Бу даврда дарахтнинг асосий шохлари ва илдиэи кучли усишда давом этади, майда шохчаларнинг сони ортади. мева хосили ошади, ҳар йили хосил бериш тенденцияси сакланади.

Бу даврда дарахтнинг шохшаббаси шаклланаверади, майда шохчаларнинг хосил булиши тезлашади, шунинг учун агротехника тадбирларини қулланиш йули билан дарахтларнинг усиши ва хосил беришига қулай шароит яратиш ишлари олиб борилиши керак.

Учинчи давр - хосил бериш ва усиш даври. Бу давр муайян дарахт тула хосилга қирганидан бошлаб, энг юкори хосил бериши билан тугалланади. Бу даврда дарахтнинг усиши секинлашади, қари шохлар қуриб, қуплаб янгилари чиқади, шунинг учун хосил ортиб боради.

Бу даврда бир йиллик янги новдаларни қискартириш, юкори тартиб нимжон ва сояда қолган шохларни буташ, дарахтни парвариш

Туртинчи давр - хосил бериш даври. Бу даврда дарахтлар энг қуп хосил беради. Асосий шохлар ривожланишдан тухтайди. Куртаклардан факат қалта новдалар усиб чиқади, майда шохлар деярли хосил бермайди, лекин қари ва қуриётган шохлар сони ортиб боради, шунинг учун асосий шохларда барглари тобора қамайиб бораётганлиги, майда шохларнинг нобуд булиши қузатилади. Хосил қуп булади, лекин унинг

товарлик сифати ва дарахтнинг кишга чидамлилиги секин-аста пасаяди.

Бу даврда дарахтнинг шох-шаббаси сийраклаштирилади, бир оз ёшартирилади. Ерни ишлаш, дарахтларни ва хосилни совук уришдан саклаш хар йили юкори ва сифатли хосил олишда катта роль уйнайди.

Бешинчи давр - хосил бериш ва курий бошлаш даври. Бу давр илгариги даврнинг давоми хисобланади. Бунда юкори тартиб нимжон асосий шохлар, сунгра йирикрок шохлар курий бошлайди. Дарахтлар яхши хосил бераверади, лекин меваси унчалик сифатли булмайди.

Бу даврда хам худди илгариги даврдаги каби агротехника тадбирлари кулланилади. Асосий новда ва шохлардаги четки шохчаларни ёшартиришга, шох-шабба орасидаги нимжон шохчаларни сийраклаштиришга, куриганларини кесиб ташлашга, дарахтни парвариш килиш ва ерни ишлашга алохида эътибор берилади.

Олтинчи давр - курий бошлаш. Хосил бериш ва усиш даври. Бу даврда мева дарахтининг хаёт фаолияти тобора сусаяди. Асосий шохлар куплаб курий бошлайди. Барглари тукилган бутокларда асосий скелет типидagi бачки новдалар пайдо булади. Хосилнинг сифати ва миқдори пасаяди.

Бу даврда хам илгариги даврдаги каби агротехника тадбирлари кулланилади. Лекин бу даврда бачки новдалардан асосий новдалар етиштирилади. Дарахт яхши парвариш килинади ва ер яхшилаб ишланади.

Еттинчи давр - куриш, усиш ва хосил бериш даври. Бу даврда биринчи тартиб асосий шохлар курий бошлайди, илгарирок хосил булган янги новдалар кучли ривожланади. Факат усаётган асосий шохлар хосил беради.

Бу даврда хам илгариги даврдаги каби агротехника тадбирлари кулланилади. Лекин бу даврда дарахтни яхшилаб ёшартириш керак.

Саккизинчи давр - куриш ва усиш даври. Бу даврда шох-шаббадаги янги асосий новдалар, нимжон шохлардан тортиб то йугон шохлар хамда тананинг асосигача курийди. Хосил кескин даражада камаяди. Дарахтлар танасида бачки новдалар пайдо булади. Дарахтлар узининг хужалик ахамиятини йукотади ва кундаков килинади.

Тукизинчи давр - усиш даври. Бу даврда дарахтнинг бутун шох-шаббаси ва танаси қарийди. Тункадан бачкилар усиб чикади. Лекин ишлаб чиқариш шароитида богларда дарахтлар

бу давргача сакланмай, кесиб ташланади. Тунка бачкисидан келгусида усимликнинг ер усти кисми ривожланади ва дарахтнинг устиш цикли янгидан бошланади. Учинчи-туртинчи давр мева дарахтнинг энг махсулдор даври хисобланади.

Саволлар:

1. Кучатзорларда жинссиз усулда купайтирилган пайвандтаглар етиштиришнинг узига хос хусусиятларини тушунтириб берингу
2. Пайвандтагдаги ортикча новда қачон кесиб ташланадиу
3. Шох-шаббаларни буташ нима ва мева кучатзорида қачон шакл бериш утказиладиу
4. Кучатзорда ихота дарахтзорлари ва шамол тусувчи дарахтлар барпо қилишнинг асосий қонун қоидалариу
5. Мичуриннг уруғ кучатларини ёшини неча даврда булгану
6. Эмбрионлик даври нимау
7. Зигота нимау
8. Регинирация нимау
9. Репродукция неча йилда мустақамланадиу
10. Шмитт мева дарахтларини энтогенезини неча даврда булгану

3-Мавзу: МЕВА ВА РЕЗАВОР МЕВА УСИМЛИКЛАРИНИ КУПАЙТИРИШНИ БИОЛОГИК АСОСЛАРИ ВА МЕВА КУЧАТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ.

Режа:

1. Мева ва резавор мева усимликларининг жинсий (уруғдан) ва жинссиз (вегетатив) йул билан купайтириш.
2. Резавор меваларни вегетатив жинссиз усулда купайтириш.
3. Кучатзорнинг типлари ва асосий қисмлари.
4. Мева дарахтлари учун асосий пайвандтаглар.

Адабиётлар : 2, 11.

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: жинсий (уруғдан жинсиз) (вегетатив), дурагай, регенерация, пайванддуст, қаламча, қўудирма пайванд, маданий навл, қўу пайванд, кесикли пайванд, аждод, товар, стандарт, қуратак.

1.1. Мева ва резавор-мева усимликларини жинсий (уруғдан) ва жинссиз (вегетатив) йул билан купайтириш. Янги навлар чиқариш ва пайвандтаглар етиштириш учун жинсий купайтириш, янги боғлар барпо қилишда эса жинссиз купайтириш усулидан фойдаланилади. Қупгина мева ва резавор- мева усимликлари четдан қангганиб, уруғ беради, бу уруғлар икки индивид белгиларни узида саклайди, бундай

усимликлардан устирилган усимликлар дурагай булади. Амалда мева ва резавор-мева усимликларини вегетатив усулда купайтриш кенг кулланилади. Унинг асосида усимликнинг яшаш қобилиятига эга булган маълум қисми - новдаси, илдизи, барги ва ҳатто туқима булақчасидан бутун организмни тиклаш (регенерация) қобилияти ётади. Органларнинг бу қисмлари она усимликда илдиз чиқарадиган илдиз бошланғичини тиклайди, қуртагидан эса барг чиқарадиган новда беради. Вегетатив усулда купайтиришда усимлик нисбатан соф ҳолда сакланади, унга она усимликнинг белгилари ва хусусиятлари утади. Жинсий йул билан купайтирилганда эса ҳам оналик, ҳам оталик, баъзан эса энг қадимги аجدодларининг белгиларига эга булган дурагай олинади.

Вегетатив йул билан купайтиришнинг жуда қуп усуллари бўлиб, булардан қуйидаги группасини ажратиш мумкин :

а) новда ва илдизларни қисмларга бўлиб(гажак) ларини илдиз бачқиси, тупларни бўлиш, қаламча ва илдиз қаламчасини экиш, парҳиш қилиш ва бошқалардан купайтириш ; б) пайванд қилиб купайтириш (трансплантация).

Мадааний усимликларнинг қупи пайванд қилиш йули билан купайтирилади. Бунда қаламча ёки қуртак ҳолида (пайвандуст) бир усимликни (мадааний нав) тупроқда уругидан чиқиб усаётган бошқа усимликка (пайвандтагга) пайванд қилинади. Бундай ҳолда мадааний усимлик бошқа усимлик илдизи (пайвандтаг) да усади. Новда ёки илдиз булақчасидан илдиз отган усимликлар уз илдизига эга булади.

Пайванд қилишнинг бир неча усули бор: қуртак ёки қуздан пайванд қилиш (мева усимликларини купайтиришнинг асосий усули ҳисобланади); қундирма пайванд, пустлок ичига эгарча шаклида урнатиш, қаламча пайванд, ёрма пайванд, ярим ёрма пайванд, ён томони кесикли пайванд, қуш пайванд (аблактировка) ва хоказо, жами 150 дан ортиқ усули бор.

1.2. Қучатзорнинг ахамияти ва вазифалари. Махсус ажратилган участкаларда мева, резавор-мева, манзарали усимликлар қучати купайтириладиган хужалик ёки унинг бир қисми мева дарахтлари қучатзори дейилади. Товар хусусияти юқори булган қимматли навлар чиқариш ва саноат микёсида мева етиштириладиган боғлар барпо қилиш суръати, утқизиларидиган қучатнинг микдорига, сифатига қуп жихатдан боғлиқдир.

Мева кучатзорининг вазифаси - кучат етиштиришнинг прогрессив усуллари кўлланиб ва ишлаб чиқариш процессларида механизациядан кенг фойдаланиб, маълум зона учун районлаштирилган, арзон ва юқори сифатли, тегишли тур ва навга хос кучатлар етиштиришдан иборат.

Намунали кучатзорлар ташкил қилмасдан туриб богдорчиликни ривожлантириш мумкин эмас. Мева кучатзори мевачиликнинг ҳолатини вилоят, туман, ҳужалик богларидаги усимликларнинг тур ва нав таркибини белгилайди. Мева кучатзориди бог ва мевазорлар барпо қилиш ҳамда уларни ремонт қилиш учун стандарт талабларига жавоб берадиган, район шароитига мос келадиган шу билан бирга аҳолининг ҳул ва қурук меваларга, озик-овқат саноатини эса ҳам ашёга бўлган талабини қондира оладиган тур ва навлардан иборат кучатлар етиштирилиши зарур. Шу билан бирга етиштириладиган навлар серхосил, мазкур район шароитига (совуққа, қурғокчиликка, шурхотқа ва бошқаларга) чидамли, мевалари юқори сифатли. Шунингдек касаллик ва зарарқунандаларга чидамли бўлиши керак.

1.3. Кучатзорнинг типлари ва асосий қисмлари. Табиий ва иқтисодий шароитлари ухшашлиги билан характерланадиган ҳар бир мевачилик зонаси узининг кучатзорига эга бўлиши лозим. Тупроқ-иқлим шароити жуда яхши бўлган районлардан келтирилган кучатлардан экиб барпо қилинган бог ва мевазорлар нобуд бўлади ёки уларнинг ҳосилдорлиги нисоятда паст бўлади.

Мева кучатзориди қуйидаги бўлим ва участкалар бўлади:

1. *Қупайтириш участкаси.* Бунга уруғ экиладиган бўлим ёки уруғ кучатзори ва қлон пайвандтагли (вегетатив йул билан қупайтириладиган) она кучатзори қиради.

Бу ерда кучатзорнинг навбатдаги янги қаласини барпо қилиш учун уруғ мевали қарахт турларининг қамдан-қам ҳолларда қанак мевали усимликларнинг - олча, қилос ҳамда антиқалар пайвандтаглари устирилади.

2. *Шакл бериш участкаси.* У икки бўлимдан иборат: пайванд қилинган ва пайванд қилинмаган кучатлардан иборат. Бу участкада икки ва ора-қира участка қала - биринчи, иккинчи ва учинчи қала, баъзан нолинчи қала бўлади.

Биринчи қалага уруғ кучатлар кучатзориди етиштириладиган уруғ мевалиларнинг пайвандтаглари (бир йиллик уруғ кучатлар) утқазилади. Қанак мевалиларнинг

биринчи даласига тез усувчи сифатида уругдан экиб устирилади.

Иккинчи далада пайванд килинган куртаклардан уруг кучатлари - бир йиллик кучатлар етиштирилади, бу ерда уларга шакл берилади ва шу йили бошка утказиш учун ковлаб олинади. Агар уруг мевалиларнинг кучатлари бирор белгиларига кура стандартга тутри келмаса (бу хол камдан-кам учрайди), бунда уларни етилтириш учун кучатзорнинг учинчи даласида яна бир йил колдирилади ва икки йиллик булганда ковлаб олиниб тегишли жойларга юборилади.

Анжир, анор, смородина, ток кучатлари етиштириладиган мева турлари булимларида илдиз бачкиларидан, новдалардан ва илдиз каламчаларидан, пархишлардан, гажак ва бошкалардан кучатлар етиштирилади.

1.4.Мева дарахтлари учун асосий пайвандтаглар. Пайвандтаглар келиб чикишига кура; ёввойи ва маданий хилларга булинади: купайтириш усулига кура - уруг кучатдан ва вегетатив йул билан купайтириладиган турлар (клон формалари) га; усиш кучига кура - кучли усадиган ва уртача - кучсиз усадиган турларга булинади.

Кучли усадиган пайвандтаглар асосан уругидан: уртача - кучсизлари эса вегетатив усулда купайтирилади. Уругдан купайтирилганда биологик хусусиятларига усиши, ташки мухитга чидамлилиги ва хоказо, кура пайвандтаглар бир хил булмайди. Шунинг учун уларни танлаш керак. Вегетатив пайвандтаглар у хусусиятлари ва белгиларига кура бир хил булади.

Куйидаги пайвандтаглар олма учун энг яхши хисобланади.

Махаллий Сиверс олмаси. Унинг купгина тур хилларидан Олма-ота ва Чимён олма хиллари энг яхши пайвандтаг хисобланади.

Нок учун пайвандтаглар. Махаллий ёввойи, урмон нок. Бу нокнинг куп тур - хиллари Чимён тогларидаги урмон массивларида усади. Бу пайвандтаг кучли усадиган, кишга чидамли, илдиз системаси ерга чукур кирадиган ук илдизли маданий навлар пайванд килинганда яхши тутиб кетади ва узок яшайди.

Беги учун пайвандтаглар. Махаллий тур бегининг уруг кучатлари беги учун энг яхши пайвандтаг хисобланади. Булардан Наманган вилояти учун Ширин ва Нордон, Фаргона вилояти учун оддий Кува (Чильги беги), Бухоро вилояти учун

Туруш, Хоразм вилояти учун Алмурут беги, Самарканд вилояти учун йирик меваги Самарканд навлари тавсия этилади.

Олча ва гилос учун пайвандтаглар. Олчани пайвандлаш учун антипка, магалёбка, магалёб олчаси, хуш буй олча навлари энг яхши пайвандтаг ҳисобланади. Бу навларнинг илдиш системаси бакувват булиб, кургокчиликка жуда чидамли булади.

Олхури учун пайвандтаглар. Олхури учун (махаллий) Сутдиён олчаси энг яхши пайвандтаг булади. У ҳар қандай ерга ҳам яхши мослашади.

Урик учун пайвандтаглар. Урик учун Урикнинг махаллий клонлари (хашаки Урик) дан етиштирилган уруғ кучатлар энг яхши пайвандтаг ҳисобланади.

Шафтоли учун пайвандтаглар. Махаллий шафтолилардан ок шафтоли уруғ кучатлари энг яхши пайвандтаг ҳисобланади. Шурга чидамли пайвандтаг сифатида Хоразм наф шафтолиси тавсия этилади. Бу нафнинг кучатлари сизот сувлари юза булган ерларда ҳам яхши усади.

Бодом учун пайвандтаглар. Ширин бодом учун оддий бодом яхши пайвандтаг булади. У асосан лалми, сершагал ва тошли тупроқда усади.

Ёнгок учун унинг махаллий кишга чидамли навлари пайвандтаг булиб хизмат қилиши мумкин.

Хурмо учун Кавказ ва виргин хурмолари пайвандтаг булади.

Хитой хурмоси учун унабининг меваси майда махаллий навлари ва 1-майда меваги нордон навлари пайвандтаг булиши мумкин. 1-майда меваги нордон нафнинг уруғи тез униб чиқади.

Саволлар:

1. Олмани кучли усадиган пайвандтагларини айтиб берингу
2. Вегетатив қупайтириш деганда нимани тушунасизу
3. Куртак пайванд қилишни энг яхши муддатлариу
4. Қаламча пайвандлашни қандай усуллари биласизу
5. Пайванд турларини айтингу
6. Жинсий қупайтириш нимау
7. Пайвантагларни таърифлангу
8. Данакли меваларни пайвандлашу
9. Кучатзор типларини биласизмиу
10. Мева дархтларини пайвантаглари таърифлаб берингу

4-5-Мавзу: МЕВА БОГИ БАРПО КИЛИШ ВА МЕВА ДАРАХТЛАРИНИ УТКАЗИШ.ПАРВАРИШ ҚИЛИШ

Режа:

1. Бог барпо килиш учун жой танлаш.
2. Бог майдонини ташкил килиш.
3. Мева турларини ва навларни танлаш.
4. Богда мева дарахтларини жойлаштириш усули.
5. Бог участкасини режалаш.

Адабиётлар : 2, 3, 4, 7, 9.

ТАЯНЧ ИБОРАЛАРИ: температура фактори, Шимолий ва Ғарбий ёнбағир, тупрок горизонти, сизот сувлари, ихтисослаштирилган боғлар, магистрал йуллар сунъий суғориш, денгиз сатҳи.

1.1. Боғ барпо қилиш учун жой танлаш. Боғ учун жой танлашда иқлим шароитлари, айниқса температура фактори ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Ўзбекистонда устириладиган мева турлари республиканинг деярли барча районларида усади ва ҳосил беради.

Ўзбекистон водийларидаги районларда боғ учун жой ажратишда қанча ёгин ёғиши айтирли аҳамиятга эга эмас, чунки боғлар сунъий йул билан суғорилади.

Боғ учун жой танлашда жойнинг паст-баландлиги муҳим аҳамиятга эга, чунки у боғнинг айрим участкаларида микроиқлим ҳосил қилади. Суғориладиган текис ерларда, ҳар 1000 м.да қуви билан 4-8 м нишаб бўлган участкаларни танлаш тавсия қилинади.

Ўзбекистонда шимолий ва Ғарбий тоғ ён бағирлар боғ барпо қилиш учун энг қулай жойлардир. Шарқий ва жанубий ёнбағирлар боғ барпо қилиш учун яроқли бўлмайди. Бундай ён бағирларини, одатда, анжир, анор, хурмо, унаби ва бошқа иссик севар ҳамда қургокчиликка чидамли турлар эгаллайди.

Тупрок ва тупрок ости. Ўзбекистон тупрогининг қупчилик қисми боғ барпо қилиш учун яроқлидир. Тупрокнинг боғ барпо қилишга яроқлилигини мева усимликларининг йулдошларига ҳам қараб аниқланади. Масалан, ёнгок, қайроғоч, терак, шумтол, акация, дуб, тол ва бошқалар яхши усган ерларда боғлар барпо қилиш мумкин.

Қупчилик мева турлари ҳайдалма қатлами уртача ва енгил қумок тупрок бўлган маданийлашган буз тупроқларда энг яхши ҳосил беради.

Илдиэлари чуқур жойлашадиган мева турлари (олма, нок, гилос ва бошқалар) тупрок горизонти қаида 2,0-2,5 м бўлган, данак мева турлари эса (Урик, шафтоли, бодом ва бошқалар) тупрок горизонти қаида 1,0-1,5 м бўлганида яхши усиб мул ҳосил беради.

Сизот сувлар. Сизот суви юза жойлашган ерлар мева усимликлари, айниқса, чуқур илдиэ отадиган дарахтлар учун деярли қулай эмас. Боғ барпо қилиш учун сизот сувлар ер сатҳидан қаида 2,0-2,5 м, айрим мева турлари (олхури, олча, парадизқага пайванд қилинган олма, жийда) учун эса 1-1,5 м,

шур тупрокларда 2,5-3,0 м чукурда жойлашган участкалар ажратилади. Денгиз сатҳидан 1000-1500 м баландликдаги тоғолди ва тоғли зонадагина сунъий сутурилмайдиган боғлар барпо килиш мумкин.

1.2. Боғ майдонини ташкил килиш. Ихтисослаштирилмаган хужаликларда саноат микёсидаги боғлар, одатда 25-30 га дан кам булмаслиги керак.

Ихтисослаштирилган боғдорчилик хужаликларда мева боғлар уртача 2 минг гектарга, умумий ер майдони эса 2,5-3,0 минг гектарга якин булиши керак.

Боғ учун участка ажратилгандан кейин унинг территорияси расмийлаштирилади: боғ чегараси белгиланади, уй-жой ва ишлаб чиқариш бинолари қуриш белгиланади, арик ва зовур (ташлама)лар, йулар, ихота дарахтлар лойихаси тузилади. Катта майдонлар 25-30 га, кичикрок боғларда эса 10-15 гектарли кварталларга ажратилади. Кварталларнинг чегаралари магистрал (катта) йулар, каналлар, ихота дарахтзорларга тугриланади. Одатда, ҳар кварталда 2-3 муддатда пишадиган бир хил мева нави утказилади. Қуп меҳнат талаб қиладиган, тез бузилладиган ва узок жойларга юборишга унчалик чидамли булмаган мева турлари (кулупнай, анжир ва бошқалар) аҳоли яшайдиган жойларга якин утқазилиши керак.

Кварталлар эни 10-12 м.ли йулар билан бир-биридан ажратилади, улар магистрал йул билан боғланган булади.

Кварталлар ичидаги йуларнинг эни 8-10 м булади.

1.3. Тур ва навларни танлаш. Ҳар бир мевали дарахт тур ва нави тупрок иқлимга нисбатан узига хос талабчан булади. Ана шу талабларга мувофиқ Ўзбекистон территорияси табиий ва иқлим шароитига қараб 26 минтақа ва 4 та кичик минтақага ажратилган. Уларнинг ҳар бирида мева турлари ва навлар фоииз ҳисобидаги нисбатда қупайтирилади. Ишлаб чиқариш тажрибаси ва илмий текшириш муассасалари маълумотларига қараб ҳар бир минтақа учун фоииз ҳисобида тур ва навлар районлаштирилган. Ҳар бир мевачилик минтақаси учун танланган тур ва навлар стандарт сортимент деб аталади ва боғ барпо қилишда мана шу стандарт сортиментларга риоя қилинади (бу район қишлоқ хужалик бошқармаларида булади).

Боғда тур ва навларни жойлаштириш. Ҳар бир тур ва ҳатто ҳар бир навнинг ташқи муҳитга булган талаби турлича булади. Шу сабабли уларни парвариш қилиш агротехникаси табақалаштирилган булиши лозим. Бунга эришиш учун турлар

алохида-алохида участкаларга ва хатто кварталларга, навлар эса алохида каторларга утказилиши керак.

Навлар шундай танланиши лозимки, улар узаро чангланиб, бутун вегетация даври давомида богдан бир меъёрда хосил чикиб турсин. Богдаги асосий уруглилар 3-5 навдан, данаклилар 3-4, бошкалари 2-3 навдан иборат булиб, улар хар хил муддатларда пишадиган булиши лозим. Уз-уздан чангланадиган навлар хам четдан чангланганда мул ва сифатли хосил беради, уларнинг тула чангланиши учун хар 10-12 асосий катордан кейин 1-2 катор 2-3 хил чангловчи нав утказилади.

1.4. Богда мева дарахтларини жойлаштириш усули. Мева дарахтларини богда жойлаштиришда уларнинг усиши ва хосил беришига зарар етказмаган холда усимликларнинг озикланиш майдонидан имкони борица туларок фойдаланиш кузда тутилади.

Текислик зонада мева дарахтлари квадрат, тутри бурчак ва шахмат усулида жойлаштирилади.

Квадрат усули жуда куп кулланилади. Бунда катор ораси ва каторлардаги туплар ораси тенг булади.

Тутри бурчак усулида каторлар ораси каторлардаги дарахтлар орасига нисбатан бирмунча (2-3 м) кенгрок колдирилади. Окибатда 1 га ерга квадрат усулидагига караганда купрок дарахт утказилади.

Дарахтларни шахмат (учбурчак) усулида жойлаштириш. Бу усулда дарахтлар учбурчак ёки олтибурчак тепаларига утказилади. Бунда бир гектар ерга квадрат ва тутри бурчак усулда жойлаштирилгандигига караганда купрок дарахт утказиш мумкин, лекин бог ишларини механизациялаштириш кийинлашади. Саноат асосида барпо килинган богларда бу усул истикболсиздир.

Куш каторлаб экиш усулини профессор **П.Г.Шитт** иклими континентал районларда утказиладиган дарахтлар учун тавсия этади.

Кучатларни уяларга утказиш усули. Урта Осиё чала чулларида кулланилади.

Мева дарахтларини утказиш калинлиги. Мева дарахтлари шундай калинликда утказилиши керак, бунда уларнинг максимал даражада юкори хосил бериши, меваларнинг сифати яхши булиши, шунингдек шамол, гармселга ва совук хамда кора совукларга чидамли булиши, тупрокни ишлаш ва дарахтларни парвариш килиш ишларини механизациялаштириш имкони яратилиши таъминлансин.

Ерни кучат утказишга тайёрлаш. Бог барпо килишдан олдин ер кучат утказишга сифатли тайёрлангандагина усимликлар соглом ва бакувват ривожланиши мумкин. Ерни экишга тайёрлаш - уни текислаш, хайдаш, утитлаш ва бошкалардан иборат.

1.5. Бог участкасини режалаш. Катта майдонларда бог барпо килишда айрим кварталларнинг катта-кичиклиги, уларнинг кандай жойлашиши, тегишли биноларнинг урни ва уларга борадиган йулар белгилаб куйилади.

Хар бир квартал бурчакларига квартал номи ёзилган столбалар кумилади. Дарахт каторлари сув яхши юрадиган энг кулай нишаб буйлаб олинади. катор иложи борица шарқдан Гарбга караб, доимий шамоллар булиб турадиган районларда эса шамол эсадиган томонга каратиб олингани маъкул. Ихота дарахтлар эса шамолга перпендикуляр утказилиши керак. Бог майдондан асосий арикка ёки магистрал йулга каратиб режаланади.

Режалаш учун: ер улчайдиган лента ёки рулетка, камида 110 м узунлиқдаги 2 та трос, узунлиги 3 м гача диаметри 5-8 см ли 15-20 та ёгоч козиклар, тросни тортиш учун узунлиги 1 м гача, диаметри 2-3 см келадиган 2 та темир козик, хар 5-10 гектар ерга кучат утказиш хисобидан узунлиги 1 м келадиган 400 та козикча ва узунлиги 24 м ли 2 та чизимча зарур.

Чукурлар ковлаш. Кузда чукурлар кучат утказишдан икки хафта илгари, бахорда утказилганда эса кузда ковлаб куйилади. Сугориладиган буз тупроки ерларда уларнинг кенглиги 60-75 см ва чукурлиги 60-70 см килинади: кам унумли шагал тошли тупрокларда чукурларнинг эни 1,5 м га етказилади.

Чукур ковланганда дарахт утказиладиган нуктани йукотиб куймаслик ва тутри чизик буйлаб утказишни бузмаслик учун узунлиги 1,5-2 м, экиш тахтасидан фойдаланилади.

Кучат утказиш муддатлари. Махаллий иклим шароити ва ташкилий ишларга караб мева дарахтлари одатда кузда ёки бахорда утказилади. Кузги дарахт утказиш хазонрезгиликдан кейин ноябрь бошларида бошланиб, кора совуклар тушгунга қадар давом этади. Бахорда эса кучатлар куртак ёзгунга қадар, тупрокнинг ҳолатига караб, яъни жанубий районларда 20-25 мартгача, шимолий районларда 10-15 апрелгача утказиш мумкин.

Кучат утказиш техникаси. Кучат утказиш олдидан чукурга тупрок ташланиб дунгча ҳосил килинади. Кучат утказиш

тахтасини контрол козикларга киритилади, тахтанинг Уртасидаги уйикка кучат куйилади.

Кучатни икки ишчи утказади. Бири кучатни олиб, илдиэларини тупрок уюми устига тараб куяди. Иккинчи ишчи чукур атрофига бир текис килиб юмшок тупрок ташлайди.

Кучат утказилганида илдиэ бутэи огир тупроки участкаларда ер юзидан 5-6 см, енгил тупроки участкаларда эса 4-5 см юкори килиб кумилши лозим. Кучат утказилгандан кейин кетма-кет суторилади.

Саволлар:

1. Ихтисослаштирилмаган хужаликларда саноат микёсидаги боглар майдони нима учун 25-30 гектардан кам булмаслиги кераку
2. Богзорларда нишаблик канча булиши кераку
3. Богзор учун энг яхши утмишдош экинлар кайсилару
4. Бог барпо килиш олдидан тупрок кандай тайёрланиши кераку
5. Богзор учун тур ва навларнинг аҳамияти нимадау
6. Уруг мевали боглар барпо килишда ёзги ва кишки навлар нисбати неча фоиздан булиши тавсия этиладиу
7. Богда мева дарахтлари кандай жойлаштириладиу
8. Куш каторлаб экиш афзалликлари нимадау
9. Бог участкалари кандай режалаштириладиу
10. Ихота дарахтзорлари нима максадда барпо килинади ва кайси дарахт турлари экиладиу

6-7-Мавзу: БОГЛАРНИ КАТОР ОРАСИГА ИШЛОВ БЕРИШ СИСТЕМАСИ, БОГЛАРНИ СУТОРИШ ВА УГИТЛАШ.

Режа:

1. Богларда ерни ишлаш системаси.
2. Бог катор ораларидан фойдаланиш.
3. Коплама экинлар (сидератлар).
4. Бегона утларга карши курашда гербицидлардан фойдаланиш.
5. Богларни угитлаш.
6. Богларни суториш.

Адабиётлар : 2, 3, 7, 8, 9.

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: тупрок унумдорлиги, юкори сифатли махсулот, мульчалаш, чиринди, хайдов чукурлиги, бир йиллик

дуккакли усимликлар, коплама экинлар, гербицидлар, яшил масса, меъёр.

1.1. Богларда ерни ишлаш системаси. Бунда бог катор ораларидан фойдаланиш, ерни ишлаш, суториш ва мева дарахтларини угитлаш, мульчалаш тушунилади. Тупрокни ишлашдан асосий мақсад унинг унумдорлигини мунтазам ошириб боришдир. Аммо булардан ташқари бог катор ораларидан мумкин қадар купрок юқори сифатли маҳсулотлар (мева-чевалар) билан бирга озик-овқат маҳсулотлари, ем-хашак ва техник экинлар етиштириш учун ҳам фойдаланиш керак.

1.2. Бог катор ораларидан фойдаланиш. Ёш дарахтлар дастлабки даврда майдондан тулик фойдаланмайди. Аввал дарахтларнинг ер устки қисми купрок буйига усади, илдиз системаси эса купрок чуқурга эмас атрофга усади. Шунинг учун дарахт тағлари, атрофлари бошқа экинлардан буш туриши лозим, юмшатилиши ва бегона утлардан тоза бўлиши керак. Тана атрофидаги доира диаметри шох-шабба кенглигига қараб белгиланади. Сув қамчил бўлса баҳорги суторишдан кейин бу доирага, чиринди, майда похол, ёғоч қипиги ва бошқа усимлик қолдиқлари 10-15 см қалинликда солинади, яъни мульчаланади. Кейинги вақтларда мульча қогозлардан фойдаланилмоқда. Мульчанинг аҳамияти: нам саклайди, ҳароратни қишда иссиқроқ, ёзда салқинроқ қилади, микроорганизмлар ва говоқ қиладиган чувалчанглар қупаяди, бегона утларни устирмайди, қириб кетиб тупрокни органик моддаларга бойитади. Бугланиш қамрок бўлгани сабабли зарарли тузлар ер устки қаватларига қикмайди. Мульчаланганда боглар қамрок суторилади. Суториш вақтида мульча очилади ва яна қайтадан ёпиб қуйилади. Қишда кемирувчи ҳайвонлар дарахтларга зарар етқазмаслиги учун қатор ораларига сочиб ташлаб, ҳайдаб юборилади ёки богдан чеккага қикариб ташланади.

Мульчаланган ерда ҳосилдорлик 60 % гача ошиши мумкин. Бироқ бу анча қимматга тушадиган сермехнат иш. Уни биринчи галда ёш богларда, қучатзорларда ва лалми богларда қуллаш мумкин. Бог қатор ораларига донли экинлар тавсия этилмайди (бугдой, сули, арпа, маккажухори, оқ жухори), шунингдек полиз экинлари ҳам.

Бог қатор ораларига сабзавот ва чопик қилинадиган экинлар, дуккакли дон экинлари (мош, нухот, қуқ нухот, ловия) ҳамда қуқ угит сифатида ҳайдаб юбориладиган экинлар экиш тавсия этилади. Айрим ҳолларда қуқ йиллик утлар экилади ёки шудгор қилиб қуйилади.

1.3. Коплама экинлар (сидератлар). Ерни органик моддага бойитиш учун ва тупрок структурасини яхшилаш учун кукут утит сифатида вегетация даври киска булган, куплаб яшил масса берадиган ва тупрокда азот туплайдиган бир йиллик (дуккакли) усимликлар экилади. Бунинг учун асал берувчи усимликлар хам экилади. Узбекистонда купинча никольсон нухоти, вигна ва шабдар экилади.

Коплама экинлар бегона утларни усишига йул куймайди, кузда хайдаб юборилгандан кейин, айникса енгил тупрокли богларда дарахтларнинг идизларини кишки совукдан саклайди.

1 га ерда экилган копллама экинлар 250-350 ц яшил масса туплайди. Бу эса хар гектар ерни 75 кг азот билан таъминлайди, бу эса 15-20 тонна гунгга тенгдир.

1.4. Бегона утларга карши курашда гербицидлардан фойдаланиш. Богларда Давлат Кимё Комиссияси томонидан рухсат этилган пестицидлардан - гербицидлар кулланилади.

1.5. Богларни утитлаш. Янги боглар (ёш боглар) 60 кг азот, 30 кг фосфор ва 15 кг калий (соф озик модда) 20 - 25 см чукурликда солинади. Агар гунг булса хар 3 йилда бир марта 10-20 тоннадан гунг солинади.

Хосилга кирган боглар. Гектаридан 150 ц хосил олинганда бир гектарига 120 кг азот, 60 кг фосфор, 15-30 кг калий ва 3 йилда бир марта 20-40 тонна гунг солиш тавсия этилади. Гунг солинмаган тақдирда минерал утитлар дозаси 30-40 кг.га купайтирилади.

1.6. Богларни суториш. Узбекистонда асосан 4 усул кулланилади.

Пол олиб суториш. 6-12 соат давомида текис жойларда дарахтдан 1-3 м наридан 30 см чукурликда ерни хайдаб сув куйилади. Бу усул шур ювишда кулланилади.

Ховузча шаклида суториш. Дарахт атрофини айлангириб ховузча олинади ва бир оз колаб уларга сув куйилади. Бу усул сув бир меъёрда келиб турмайдиган паст-баланд жойларда кулланилади. Пол ва ховузчалар дарахт атрофида сувни куп туплаш ва уни тежаш имконини беради. Бу усуллар жуда куп кул меҳнати талаб килади.

Бостириб суториш. Текис рельефли ерларда бостириб суторилади. Бу усулда хамма ер текис намланади ва сув ювиб кетиши кузатилмайди. Бу усул кишда бахорги кора совукларга курашишда кулланилади.

Баён этилган усулнинг 2 камчилиги яъни тупрок структураси бузилади, у букиб қолади, суторгандан кейин тезда куриб ва ёйилиб кетади. Илдизларга шаво етарли кирмайди., бир қисм илдиз туклари нобуд бўлади ва айрим ҳолларда дарахтнинг учи куриб қолади.

Жилдиратиб суториш - оғир тупроқда 100-120 см каторора, Урта кумок тупроқда - 80-100 см каторора, енгил кумок тупроқда - 60-70 см каторора. Биринчи эгат ёш боғларда дарахт танасидан 0,5 м ва ҳосилли боғларда 0,75 - 1,0 м ораликда утказилади. Ҳаммаси бўлиб 6-8 эгат олинади. Эгат узунлиги 150 м, қиярок ерларда эса 75-100 м. Шагал тошлиларда эса 50 м.гача бўлади.

Ёш боғларни эса халқ асимон ариқчалар олиб суторилади.

Суториш нормалари. Ёш боғларни бир гектар ҳисобига 500 м.кубдир. Ҳосилга кирган боғлар учун 800-1000м.куб.га. Шагал тошли ерларда бу норма 300-500 м.куб камайтирилади. Яхоб сувини бериш нормаси 1200-1500-2000 м.куб.

Боғларни суторишнинг янги усуллари: ёмғирлатиб суториш, тупрок остидан суториш, томчилатиб суториш, аэрозол (майда заррали) суториш. Бу усуллар қулланилганда боғдаги тупрок бир текис ва меъёрида намланади, ер каткалок бўлмайди, зичлашмайди, бегона ўтлар чиқиши камаяди, бир неча мартаба сув тежалади, боғларда микроиклим ҳосил бўлади ва бундан ташқари суториш учун ариқлар олиш ҳамда суторилгандан сунг ерни юмшатиш ва бошқа бир қатор агротехник ишлар ҳажми камаяди. Булар ўз навбатида боғ ҳосилининг таннархини пасайтириб, унинг самарадорлигини оширади.

Саволлар:

1. Боғларга ишлов бериш қандай утказиладиу
2. Мева дарахти танасининг атрофи нима мақсадда мульчаланедиу
3. Мульча сифати нималарга боғлику
4. Боғ қатор оралиғига нима сабабдан бошқоқли донлиларни экиш мумкин эмасу
5. Боғ қатор оралиғига қуқат ўғит сифатида қандай усимлиқларни экиш тавсия этиладиу
6. Қуқат усимлиқларнинг аҳамияти нимау
7. Боғларни суторишда қайси усуллардан фойдаланиладиу
8. Боғларни сув нормаси қанчау

9. Богларни суторишда (ишлаб чиқаришда) энг кенг кулланиладиган усулини айтиш
10. Суторилган богларда ишлов бериш

8-9-Маъруза: МЕВА ДАРАХТЛАРИГА ШАКЛ БЕРИШ ВА БУТАШ.

Режа:

1. Шакл бериш ва буташнинг ахамияти.
2. Шакл бериш технологияси.
3. Буташнинг иехнологияси.
4. Суст усувчи пайвандтагга уланган дарахтларни кесиш ва уларга шакл бериш.
5. Пальметта дарахтларга шакл бериш.

Адабиётлар: 2,7,11.

ТАЯНЧ ИБОРАЛАРИ: богларга шакл бериш, буташ, куёш радиацияси, ассимиляция, компакт шох, кан габаритли, ясси форма, хосил шох, суст усувчи пайвантаг, баланг буйли туп, сершох навлари, кесиш техникаси, пальметта.

1.1. Шакл бериш ва буташнинг ахамияти. Мевали дарахтларни буташ-хирургик операция булиб, бунда дарахтнинг хосилдорлиги ҳамда меваларнинг сифати билан боглик булган куёш радиациясидан рационал фойдаланишни дарахтларнинг усиши, ассимиляция апаратининг катталигини, шох-шаббада унинг жойланишини тартибга солишга имкон беради.

Буташ билан дарахтнинг хосилга кириш муддатларини узгартириш, унинг махсулдорлик даврини узайтириш, мустахкам ёритилган шох-шабба тузиш, богларни парвариш килишни кулайлаштириш, йилдан-йилга мева беришни тартибга солиш. Дарахт хосилдорлигини ошириш мумкин ва хоказо. Буташ ёрдамида гектарига купрок дарахт жойлаштиришга имкон берадиган ихчам (компакт) шох-шаббалар тузиш, шу билан бир вақтда буташда, меваларни узиб олишда меҳнат унумдорлигини ошириш мумкин. Ихчам шох-шаббалар бог ишларини механизациялашга ёрдам беради. Бундай шох-шаббалар кичикрок дарахтларда хосил килиниши мумкин. Кан габаритли ва ясси формалар бирмунча

афзалликларга эга, уларда асосий шохлар кам. Усувчи шохлар эса куп булади. Улар жуда сербарг булганда, хосил шохлари куп булади. Бу формалар дарахтларни зичлаштириш ва мевалардан юкори хосил олишга имкон беради. Улкан мева дарахтларга кизикиш колиб кетди. Хозир улар узини оклай олмайди. Лекин кам габаритли, ясси формалар эндигина ишлаб чикаришда жорий этилмоқда. Богларимизнинг мутлако купчилиги хажми формалардаги кучли усадиган пайвандтагларда барпо этилган. Улар хали анча узок вақт сакланади ва уларни янгиларини экиш давом этаверади.

1.2.Буташ -мева дарахтларига таъсир этадиган энг актив агротехник усулларида булиб, уларни парвариш килиш комплексида муҳим элемент ҳисобланади. Мева дарахтларини системали буташ орқали ҳосилни уч баробаргача ошириш мумкин.

Дарахтларни буташ меваларини 20,4%гача йириклаштирилади, уларнинг таъм сифатини ҳам яхшилади. Буталган мевали дарахтларнинг таркибида буталмаган дарахтларникидагига караганда шакар ва кислоталар куп булади. Буташ шох-шаббаларини йигинчок килади, шохлашини кучайтиради, асосий (скелет) шохларини мустаҳкамлайди, тирговичлар куйишга булган талабни камайтиради, шох-шаббанинг пастки қисмларидаги барглари тукилишини (дарахтнинг ялонгочлашини) кечиктирилади ва мевани шох-шаббанинг гектарида ҳосил булишига ёрдам беради, дарахтни синишдан саклайди ва шу билан дарахтларнинг узок яшашини таъминлайди. Буташ ёрдамида дарахтларни ёшартириб богнинг маҳсулдорлик ёшини узайтиради.

Буташ дарахтларнинг совуққа чидамлилигини ҳам оширади, яъни бунда буталган дарахтлар яхшироқ барг чикаради ва кишки тиним даври учун куп озик моддалар туплайди. Бу моддалар усимликни совуқдан химоя килиш қувватига эга булади.

Нихоят, буташ агротехниканинг бошқа усуллари билан бирга ҳар йилги ҳосилни тартибга солиб туришига ёрдам беради.

1.3. Шакл бериш. Кучли усадиган пайвандтакка улаб устирилган мева дарахтларига шакл беришни асосий тартиби - бу ярусли (каватли) килиб сийраклаштиришдир. Жумхуриятимизда олма ва нокларнинг купчилик навларига нисбатан шу усул қулланилади. Тула шакл берилган мева дарахтлари биринчи каватда беш-етти дона асосий шохга эга

булиши керак. Уларни шакллантириш билан бир вақтда иккинчи ва учинчи кават шохлари ҳам колдирилади. Иккинчи каватнинг биринчи шохи асосий шохлардан 30-40см, иккинчи шох биринси шохдан 25-30 см масофада колдирилади. Учинчи кават шохлари ҳам шу тартибда колдирилади.

Уч-турт йил шакл берилган ёш дарахтларни куп чилпиш тавсия этилмайди. Чунки бу уларни усишини кучайтириб, хосил беришни кечиктириб юборади. Олмаларга тулик хосил бера бошлашига қадар шохларини уртача кискартирилиб ва сийраклаштирилиб шакл берилади. Бу давр бошланишида бир-бирига соя ва халакит берадиган ҳамма шох ва новдалар олиниб ташланиб, дарахт шох-шаббаси маромида сийраклаштирилади.

Олма тула хосил бера бошлангандан кейин унинг усишини ва хосилдорлигини саклаб туриш учун меъёрида киркилади. Бунда фақат майда, дарахт шох-шаббасини калинлаштириб юбориши мумкин булган новдалар ва бачкилар олиб ташланади, баъзи янгидан усиб чиккан узун новдалар, уларни хосил шохига айланттириш учун калталаштирилади. Хаддан ташкари йирик уларни бошка шохларга тенглаштириш учун кискартириб кесилади.

Дарахтлар усишдан орқада колса (10-15см), бир йиллик новдаларнинг нормал усишини таъминлаш учун уч-беш ёшли усган она шохларга такаб кесилади.

1.4. Дарахт хосил килмаган йилда буташ системаси куйидагича булади: шу йили усиб новдалар купрок калталаштирилади, халк асимон мева шохлари сийраклаштирилиб, мураккаб халк асимон новдалар калталаштирилади. Натижада бир йиллик новдаларнинг усиши тезлашади, хосил куртакларининг шаклланиши сустлашади. Дарахт хосил берган йили: агар йиларо хосил берадиган дарахт хосил берган йили буталмаган булса, бу ишни хосил берган йили килиш керак. Бундай ҳолатда, новдалар 35-40 см усган эски шохлар такаб кесилади. Хосил куртакларини куплаб шакллантириш учун усган бир йиллик новдалари кискартирилади. Шу билан бир пайтда дарахтларни озикланиш ва сув билан таъминланиш шароитини кучайтириш керак. Дарахт хосил бермайдиган йилда кузда солинган утитлар (25-30 тонна гунг, 60 кг фосфор ва 30 кг калий) билан бирга мой ойининг охири ва июнь ойининг бошида азот (120 кг-га) утити солинади. Чунки бу пайтда азот хосил куртакларининг

купайишига унга таъсир этмайди. Июль ойида эса азотни 60-120 кг-га миқдорида солиш керак.

Дарахтлар ҳосил берадиган йилда азот март ойида гектарига 240 кг миқдорида солинади, май ойида новдаларнинг яхши усиши, баргларнинг физиологик ва мевалар ривожланишини кучайтириш мақсадида биринчи қушимча озиклантириш учун гектарига 60-120 кг миқдорида азот уғити солинади, июнь ойида меваларнинг яхши шаклланиши, ҳосил қуртакларининг пайдо бўлиши, дарахтда киш уйкусига зарур бўладиган жуда қўп пластик моддалар запасининг юзага келиши учун иккинчи қушимча озика берилади (азот 60, фосфор 30 кг).

Нокларни кесиш ҳудди олмаларни кесишга ухшашдир. Шунингдек, навлар хусусиятини ҳам эътиборга олиш керак. Қам шохлайдиган, аммо бир йиллик новдалари тез урган ва асосий халқ али мева шохлари қўп бўлган навларнинг уларнинг узунлигига қараб ярим ёки ўқдан бири кесиб ташланади. Қўп шохлайдиган ва асосан чивик новдаларида ҳосил берадиган дарахтларнинг шох-шаббалари сийраклаштирилади. Беҳи дарахтига олма дарахтига шакл берилгандек, ярусли сийраклаштирилган шакл берилади. Дарахтнинг қўп йиллик шохларини шаклланда уларнинг бир-бирига мойиллаштириш бўташ керак. Ўткир бурчакли бўлиб қолишига йўл қўймаслик лозим.

Дарахт тула ҳосилга киргач, новдаларнинг усиши кескин қамаяди ва мева бериш қалта шохларга ўтади. Бу даврда ҳосилли шохларнинг ҳаддан ташқари қўпайиб кетишининг олдини олиш учун пастроқда жойлашган ҳосилли шохча такаб шох қисқартириб кесилади.

Усиш сустлашган чоғда (охирги новдалар 25-30 см.дан қисқа бўлса) ўч-турт йилда бир марта 2-3 йиллик шохларга такаб шох-шаббаларни ёшартириш мақсадида қаллакланади.

1.5. Суст усувчи пайвандтагга ўланган дарахтларни кесиш ва уларга шакл бериш. Оддий думалок шох-шаббага эга бўлган паст бўйли дарахтларни бўташ техникаси ва принципи баланд бўйли тупларники билан деярли бир хилдир. Пакана пайвандтагга ўланган олмаларда (беҳига ўланган нокда) пастки қаватдаги она шохларнинг бир-бирида иккитадан иккинчи тартибдаги новда, ярим пакана олмаларда ўч-турттадан новда қолдирилади. Иккинчи тартибдаги она шохлардаги новдалар юқоридаги шохларда қолдирилса туп қалинлашиб кетади. Шунинг учун уларда факат қўпда ривожланмаган новдалар

колдирилади. Иккинчи тартибдаги биринчи келгуси она шох дарахт танасидан 40-50 см масофада, колганлари эса бир-биридан 50-60 см масофада колдирилади. Шу билан бир тупда етарли миқдорда келгусида она шохлар буладиган новдалар колдиришга алоҳида эътибор бериш керак. Чунки ҳосил берувчи бутокларнинг асосий қисми ана шу новдаларда жойлашади. Уларни дарахт танасида ва она шохларни ён томонларида тупни калинлаштириб юбормайдиган қилиб жойлаштириш керак. Кам новда берадиган навларда келгусида она шохлар пайдо қиладиган новдалар орасидаги масофа 30-40 см, сершох навларда 60 см.гача бўлиши лозим. Майда шохларни бир-биридан 15-20 см узокликда колдирилади. Барча бир хилдаги она шохлар пайдо қиладиган новдалар колдирилгандан кейин марказий шох аввалги икки-уч йил давомида ортикча ушиб кетмаслиги учун куп кесиб турилади ва кейин бутунлай олиб ташланади.

Кесиш техникаси қуйидагича: ёш нихолларда шох-шаббалар барпо қилинаётганда бир йиллик новдалар уларда тартибдаги шохлар пайдо бўлиши учун уч хисса қискартирилади. Айни пайтда асосий новданинг ҳамма ортикча ҳисобланган ва тупни калинлаштириб, калин соя-салкин қилиб юборадиган новдалар асосий танага такаб кесиб ташланади. Тупнинг асосий шохларини яратиш учун керак бўлмайдиган, лекин уни куп кесиш билан (4-6) куртак колдириб қуюклаштирмайдиган шохлар ҳосил берадиган новда сифатида колдирилади. Ана шундай новдалардан уларни ҳар йили купрок қискартириб, она шохлар шакллантирилади. Қалта қилинган меваги шохчаларда иккинчи йили икки-учта янги новда пайдо бўлади. Улар кесилиб ён томондагилари колдирилади. колдирилганлари уз навбатида 6-3 куртакни қискартирилади. Учи куртак билан тугайдиган мева берадиган қалта новдалар (15-20 см.гача бўлган) қесилмайди.

Дарахт тула мева бера бошлаб, унинг ушиб секинлашган пайтда шохлари купрок сийраклаштирилади. Бунда тупнинг калинлаштирувчи новдалар, шунингдек вақтинча қуйилган шохлар олиб ташланади. Шу билан бир пайтда шохларнинг давоми бўлган узун новдалар қискартирилади. Мева берувчи новдалар куп ушиб чикувчи новдаларда уларнинг бир қисми, энг қарилари кесиб ташланади ёки қалталаштирилади.

Паст бўйли, айникса қучсиз усувчи пакана дарахтларда, улар эрта ва мул мева беришга мойил бўлганлиги туфайли ушиб жараёни секинлашади. Шунинг учун уларни ёшартириш

учун баланд буйли дарахтларга нисбатан кесиш анча эртарок утказилади. Бир йиллик новдаларнинг усиши то 10-12 см.гача секинлашадиган олма ва нок дарахтлари тупидаги икки-уч йиллик шохларига такаб кесиб турилади. Шу билан бирга хосил берувчи новдалар ҳам сийраклаштирилади.

Дарахтларни ёшартириш учун бутаб кесишда ерга, албатта органик ва минерал утитлар солиниши ва тез-тез суторилиши керак.

1.6. Пальметта дарахтларга шакл бериш. Яссисимон тупли дарахтлардан иборат богнинг асосий ишлаб чиқарувчи тугри бу соддалаштирилган итальян пальметтасидир. Бунда темир бетон тиргович устунларга рухланган сим каторлари таранг килиб тортиб қуйилади. Бир гектар бог учун тирговуч устунларнинг икки босимдаги устун қуйиладиган бурчакларни ҳам қушиб хисоблаганда дарахтлар катор ораси 3,5 метр булса 200 дона, катор ораси 4 метр булса 175 дона темир бетон устун керак булади. Устунларнинг узунлиги ер сатхидан баландлиги 3,0-3,3 метр, ерга киргизиладиган 0,6 м қисми билан 3,6-3,8 м булиши керак.

Устунларга биринчи симни 50 см баландликдан, иккинчи сим биринчи симдан 35-40 см, кейингилари бир-биридан 60-70 см юкоридан тортилади.

Саволлар:

1. Мева дарахтларини шакл беришнинг аҳамияти
2. Бутаждан мақсад нима
3. Ҳосил бермайдиган богларга қачон утитланади
4. Ҳосилли богларда озиклантириш муддатлари қанча
5. Паст буйли дарахтларга ҳам шакл
6. Суст усувчи пайвандтагга уланган дарахтларни кесиш
7. Шакл бериш технологиясини таърифлангу
8. Мевали дарахтларда кесиш нималарга боглик булади
9. Сершоҳ навларда ораси қанча булиши керак
10. Пальметта дарахтларга шакл бериш хусусиятлари бошқа богларга нисбатан фарқи нимада

10-Мавзу: РЕЗАВОР МЕВАЛАРНИНГ АГРОТЕХНИК ХУСУСИЯТЛАРИ.

Режа:

1. Резавор мева усимликларини халк хужалиги даги ахамияти.
2. Кулупнайларни асосий навлари ва экиш муддатлари.
3. Кулупнайга ишлов бериш.
4. Смородина агротехникаси.
5. Резавор мева ҳосилини териш.

Адабиётлар: 2, 7.

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: кулупнай машка, (булдургун), смородина (коракат), корижовник. Солкашлик, вегетатив купайиш, аскарбин кислота, шифобахш, утсимон усимлик, кучат калинлиги, чириган гунг, мульчалаш, кўутир доглк, ун шудринг, зоза, маданийлашган навлар.

1.1. Ўзбекистонда кулупнай, малина (булдургун), кора смородина (коракат) ва крижовник экилади. Булар орасида асосан: кулупнай купрок таркалган, малина ва кора смородина камрок, крижовник эса айникса кам экилади.

Резавор-мева усимликлари мева дарахтлардан кескин фарк килади. Улар экилгандан кейин барвакт, 2-3 йили ҳосилга киради ва экиш билан боғлиқ булган харажатларни тезда коплайди. Резавор-меваларда салкашлик булмайди, улар юкори агротехника асосида парвариш килинса хар йили мул ва сифатли ҳосил олиш мумкин.

Резавор-мева усимликлари мева дарахтларига нисбатан осон ва кулай - вегетатив йул билан (пайванд килмасдан) купайтирилади.

Кулупнай - куп йиллик утсимон усимлик, суториладиган ерларда 2-4 йил давомида яхши ҳосил беради. У аҳолини эрта баҳорда витаминларга бой мева билан таъминлашда, шунингдек консерва ҳамда кондитер саноати учун кимматбаҳо хом ашё сифатида катта аҳамиятга эга. Унинг меваси канд, органик кислоталар, туз, темир, фосфор, кальций, А, В, С витаминларга, барглари эса аскарбин кислотага бой. Кулупнай мевалари шифобахш хусусиятларга эга.

Навлар тутри танланганда ва агротехникага риоя килинганда кулупнойдан гектарига 100 центнер ва ундан ортиқ ҳосил олиш мумкин. Юкори рентабелли кулупнойзорлар барпо этишда навларни танлаш катта аҳамиятга эга. Кулупнойнинг туманлаштирилган навларидан энг таркалган лари куйидагилар:

эртапишар Узбекистон ва Узбекистон гузали (Дилбар),
Уртапишар Кульвер, кечпишар Тошкент ва Зенга-зенгана.

1.2. Кулупной хосилдорлигини оширишда тупрок танлаш,
уни тайёрлаш, кучат утказиш муддати ва техникаси, суториш
уз вақтида тупрокни юмшатиш, минерал ва органик уғитлар
солиш, кулуп-нойзорларни соғломлаштириш ва бошқалар катта
аҳамиятга эга.

кулупнай экиш учун унумдор, текис, бир оз нишаб сув
билан яхши таъминланган ерлар танланади. Энг яхши
утмишдошлар - дон-дуккакли, сабзавот ва полиз экинлари.
Тупрок унумдорлигига кура ҳайдаш олдида гектарига 40-60 т
чириган от тезаги ёки куй кийи 600-1000 кг суперфосфатга
аралаштириб солинади

Кучат утказишдан олдин тупрок плут билан камида 30 см
чуқурликда ҳайдалади, бегона утларнинг илдизлари
йиғиштириб олинади, дала пухта текисланади ва эгатлар
олинади.

Энг яхши кучат утказиш муддати - 1 июлдан 15 августгача,
бундан кеч экилса, хосил пасаяди, лекин иссик кунлар давом
этганда суториб турилса, кузда экилганда ҳам кучатлар яхши
тутиб кетади.

Кулупной кучатлари 70-80-90 см катор ораларига, шагал
катлам якин жойлашган ерларда 60 см.ли катор ораларига
экилади. Усимликлар ораси 20-25 см. Кучатлар шу тартибда
утказилганда гектарига 44,4 дан 71,4 мингтагача усимлик
жойлаштирилади. Эгатлар олишда ва катор ораларига ишлов
беришда ДТ-26, Т-28 м (КОН-2,8П) тракторларидан
фойдаланилади. Кулупной кучатларини утказишдан олдин
эгатларга 15-18 соат давомида сув окизиб қуйилади. Соф навли
стандарт соғлом кулупнай кучати - илдиз системаси яхши
ривожланган, узунлиги камида 4-5 см ва 2-3 баргли жингалак.
Кучат илдиз бутзи баландликда утказилади, илдизи юқорига
ёки ён томонга букилмаслиги керак, узиш нуктаси тупрок
билан қумилши зарур, чунки бу усимликнинг тутиб кетишига
таъсир қилади. Агар кучат утказишда илдизлар очилиб қолса,
усимлик қуриб қолади, чуқур утказилганда жингалак чириб
кетиши мумкин.

Кучат утказилгандан кейин тупрокда нам сақлаб турилади.
Кулупной 8-10 кунда тутати. Навбатдаги суторишдан олдин
нобуд бўлган усимликлар урнига янгилари утказилади. Бир ой
мобайнида участка нам, юмшоқ ва бегона утлардан тоза ҳолда
сақлаб турилади. Дастлабки даврда ҳар 7 кунда, сунгра 10-15

кун оралатиб суторилади. Кузда 20 кунда бир марта суторилади ва ёмгирлар бошланиши билан суториш тухтатилади.

Кучат утказилганда 20-30 кундан кейин катор ораларига ва каторларга енгил ишлов берилади. Айни пайтда гектарига 60 кг азотли ва 30 кг фосфорли утитлар солинади. Бундай озиклантириш илдиз системаси, барг аппаратининг ривожланишига, ёш шохларнинг пайдо булишига ва уларда келаси йили хосилини таъминловчи гул куртаклар пайдо булишига ёрдам беради.

Кузда кулупнойзор чопик килиб, чукур юмшатилади. Илдиз ва ёш шохларни кишда кора совуклардан асраш мақсадида гектарига 10-15 тоннадан чириган гунг солинади ёки кипик билан мульчаланadi. Февраль охири - март бошларида катор ораларига ва усимлик атрофига ишлов берилади. Усимлик илдизлари юзага чикиб колганда асосий илдиз очилади, усимлик атрофи юмшатилиб, тупрок бостирилади. Айни пайтда куриган барглари олиб ташланади. Кулупной кучати тутмаган жойларга усимлик тупроги билан утказилади. Кулупнойни касаллик ва зараркунандалардан химоя килиш мақсадида профилактик тадбирлар утказилади. Мева тутиш даврида - апрелда тупрок иккинчи марта юмшатилади. Уток килинади ва суториш эгatlари тутрилаб куйилади.

Кейинчалик кулупнойга мевалар териб олингандан сунг ва кузда ишлов берилади. У 13-15 марта суторилади. Шагал катлам якин жойлашган ва жанубий туманларда суторишлар сони 24 тагача оширилади, лекин бир марталик суториш нормаси 500-800 дан 200-250 м.куб.гача камайтирилади. Мева етилиш даврида ҳам тез-тез, аммо кичик дозаларда суторилади. Суториш муддати тупрок намлигига ва шаво хароратига боғлиқ. Биринчи суториш мева тутиш даврида - апрелда, баҳор курук келганда анча эрта мартда утказилади. Сунгра майда 3-4 марта, июнда 2-3, июлда 3, августда 2, сентябрда 2 ва октябрда 1 марта суторилади.

Мева териб олингандан сунг участка кондириб суторилади, сунгра чукур юмшатилади ва гектарига 60 кг аммиакли селитра, 45 кг суперфосфат билан утитланади ва кузда 100 кг калий солинади.

Ўзбекистоннинг иссик ва курук иқлим шароитида мева териб олингандан кейин кулупнойни парвариш килишга алоҳида аҳамият бериш зарур. Бу даврда келаси йил хосили учун замин яратилади, яъни навбатдаги тартиб ва ёшдаги ер ости палаги хосил булади, янги илдиз системаси шаклланади,

ер устки палаги - жингалаклар ва новдалари янгиланади. Август ойигача кулупной барглари кесиш, сунгра бир-икки нормада (№ 120, Р 90) минерал утитлар билан озиклантириш, чукур юмшатиш ва суториш - янги ер ости поялари, барг ва илдизлар хосил килиб, уйкудаги куртакларнинг уйғонишига келгусида йил хосилининг усишига ёрдам беради. Барглар ёшартириш ва ок ҳамда кунгир доглик, ун шудрингта ва бошка зараркунанда ҳамда касалликларга карши согломлаштириш мақсадида кесилади. Бу тадбир катта майдондаги кулупнойзорларда механизмлар ёрдамида амалга оширилади. Барглар урок машинасида урилади, хаскашлар билан йигиштириб олинади.

Бундан сунг, албатта катта дозада суториш зарур.

1.3. Смородина (Корагат) - Смородина (корагат) резавор мевалар ичида кулупнойдан кейин иккинчи уринни эгаллайди. Смородина утказилгандан кейин иккинчи йили хосилга киради. каламчадан, пархиш килиш, тупларни булиш йули билан тез купаяди.

Ўзбекистонда кора, кизил, тилла ранг смородина таркалган

Кора смородина иклими иссик, тупрок ва шаво намлиги етарли булмаган туманларда кам хосил беради. Бундай шароитда тилла ранг смородина яхши усади ва мева килади.

Тилла ранг смородинанинг кишки уйку даври узок, шунинг учун у кишки совук ва кунлар тез-тез исиб кетадиган кескин континентал иклим шароитида ҳам яхши усади.

Шу хусусият туфайли тилла ранг смородина Ўзбекистонда, Козогистоннинг баъзи туманларида кенг таркалди. Унинг илдиз системаси ерга 2 метргача чукурлашади, натижада тупрокнинг чукур катламларидаги нам билан таъминланади. 39-42 градус иссиқда ҳам смородина барглари куёш нурларидан куймайди.

Утказилгандан кейин иккинчи йили хосилга киради. Учинчи ва туртинчи йили тулик хосил бера бошлайди.

Меваларнинг таъми турлича, улар пархез ва шифобахш хусусияти туфайли халк медицинасида гиповитаминозни, цингани, юрак-кон томир касалликларини даволашда кулланилади, смородина шарбати ошқозон яраси ва ичак касалликларида ичилади, хуллигича истеъмол килинади, “ассорти” компоти тайёрлашда, сиропларга ранг бериш ва уларни витаминлар билан бойитишда ишлатилади.

Тилла ранг смородина хушманзара усимлик сифатида болалар богчалари, касалхоналар, истирохат боглари, хиёбон ва йулларни кукаламзорлаштиришда кенг кулланилади.

Смородина куп йиллик бутасимон усимлик. У 10-15 йил мобайнида мул хосил беради. Смородина учун ерни тугри танлай билиш жуда мухимдир.

Смородина учун текис ёки бир оз Гарбга ёки шимолий-Гарбга нишаброк жой танланади. Нишаблиги 10 градус дан ортик булмаслиги керак.

Унумдор маданийлаштирилган, механик таркибида кумок, сувни яхши утказадиган соз тупрокларда смородина яхши усади. Сизот сувлар ер юзасидан 150 см дан юкори жойлашмаган булиши керак. Смородина экиладиган участка сув билан яхши таъминланган булиши лозим. Смородина куз ва бахорда утказилади. Кузда новдалар усиши тухтаганда, совуклар тушишидан олдин, бахорда куртаклар барг чикаргунча утказилади. Бахорда смородина жуда тез усади, шунинг учун купинча барг чикарган кучатларни утказишга тугри келади. Шу сабабли уни октябрда-ноябрь бошларида утказган маъкул.

Смородина кучатларини утказишдан олдин синган ва касал илдизлар кесилади, лекин уларнинг узунлиги 15-20 см.дан калта булмаслиги керак. Илдизлар кесилгандан кейин лойга ботирилади ва утказилади.

Кучат утказишдан олдин участканинг тупрок унумдорлигига кура гектарига 40-100 т гунгта 600-1000 кг суперфосфат аралаштириб солинади, сунгра чукур хайдалади ва ер текисланади.

Смородина, айникса тилла ранглиси суториш шароитида кучли усади ва калинлашади. Шунинг учун уни 3 м.ли катор ораларига, каторда эса 1,5-2 м ораликда утказилади. Бунда гектарига 1666-2222 та усимлик жойлашади.

Кучатлар олдиндан олинган эгатларга ёки ковланган чукурларга (40х40, 60х60) утказилади. Хужаликда органик угитлар етишмаганда хар бир чукурга кучат тагига 200-300 г суперфосфат ва 6-7 кг чиринди солинади. Кучатлар киялатиб, кучатзордагига нисбатан 5-6 см.га чукуррок утказилади. Илдизлар чукурда бир текис таркатади, буш жой колдирмай тупрок билан тулдирилади. Кучат утказгандан кейин олдиндан очилган эгатлар буйлаб суторилади, агар улар булмаса 2-3 та усимликка бир челак сув куйилади. Сунгра ер усти кисмида 3-4

та куртак колдириб, усимликлар кесилади, чиринди ёки гунг билан мульчаланади.

Смородинага азотли, фосфорли ва калийли утитлар солинади. Фосфорли ва калийли утитлар, одатда кузда хайдаш ёки чопик килиш вақтида, азотли утитлар - баҳорда, вегетация бошида ва гуллагандан кейин, мева туғиш даврида солинади.

Усимлик ёки тупрок унумдорлигига кура утитлар таъсир этувчи модда ҳисобидан 60-120 кг.га солинади. Дастлабки икки йилда утит дозасининг тахминан ярми бевосита туп тагига, кейинги йиллари усимликларнинг ривожланишига кура, ёппасига бутун майдонга солинади.

Органик утитлар дастлабки икки йилда туп атрофига 50-100 см диаметрда (5-10 кг) мульча тарикасида, учинчи ва туртинчи йилларда катор ораси бўйлаб 20-30 т.га ҳисобидан солинади.

Мульчалаш тупрокда нам ва озика моддаларининг сакланишида яхши воситадир. У кучатларнинг яхши тутиб кетиши, усимликларнинг усиши ва ривожланишига ёрдам беради.

Смородина вегетация даврида 5 дан 15 мартгача сутурилади.

Тупрок юмшок ва бегона утлардан холи бўлиши керак. Бунинг учун каторлар баҳор ва кузда 2-3 марта, зарур бўлганда ёзда ҳам юмшатилади. Ёш усимликларни сутуришдан сунг ерни юмшатиш айниқса муҳим, бу тадбир тупрокни куриб кетишдан саклайди.

Меваси ва усиш куртаклари куп бўлган бакувват шох-шаббали туп шакллантириш мақсадида усимлик кесилади.

Саволлар:

1. Резавор мева усимликларининг мевачилиқда тутган урни нималардан иборату
2. Кулупнойзорлар учун ерни тайёрлаш, экиш муддатларини биласизмиу
3. Экиш схемаси, навларни танлаш деганда нимани тушунасизу
4. Экиш технологияси кандай бажариладиу
5. Кулупнойдан мул хосил олиш учун кандай агротехника куллаш кераку
6. Эртачи навларни таърифлангу
7. Смородина кучатларини тайёрлаш муддатлариу
8. Кайси усулда купайтириладиу
9. Резавор меваларни купайтиришда асосий курсаткич нимау

10. Ҳосилини қандай терилади ва нима мақсадларда фойдаланилади

11-Мавзу: УЗУМЧИЛИК. УЗУМЧИЛИКНИНГ ХАЛК ХУЖАЛИГИ ДАГИ АҲАМИЯТИ, ТОКЗОРЛАР БАРПО КИЛИШ, ТОК КУЧАТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ.

Режа:

1. Узумчиликнинг халк хужалиги даги аҳамияти.
2. Токчиликнинг ахволи ва уни ривожлантириш истикболлари.
3. Ток кучатларини купайтириш технологияси.
4. Токзор барпо килиш.
5. Токзорларни парвариш килиш.

Адабиётлар: 1, 12.

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: витамин, кимслот, органик кислота, лиана, куёш нури, винобоп навлар, кучатзор, ер текислаш, кора совук.

1.1. Узум таркибида киши организми учун зарур булган хар турли витаминлар, кислоталар ва бошка элементлар жуда куп. Ток усимлигини кук кисми чорвачиликда ҳам фойдаланилади, шунинг билан бир каторда винзаводларида узумнинг чикиндиларидан кишлок хужалиги да утит сифатида фойдаланилади. Шунинг билан бир каторда хар турли нозик авиацияда кулланиладиган краскалар тайёрланади. Шунинг учун ток усимлигини халк хужалиги да аҳамиятини катталигини хисобга олиб ҳукумат хар 10-15 йилда токзорларларни майдонини купайтириш уларни ҳосилини ошириш янги машиналар ихтиро килиш тугтрисида махсус карор кабул килади.

Ҳозирги кунда 133 мингга якин ток майдони бор.

1.2. Ток энг кадимий гулли усимликлар группасига киради. Токнинг авлоди куёш нури яхши тушиб турадиган очик майдонларда бута холида устирилган. Шунинг учун ток ёрутсевар усимликлар группасига киради.

Табиат узгариши натижасида ёрутлик учун курашиб чирмашиб усадиган - Лиана шаклига айланиб урмон ларда ҳам яшашга мослашган.

Витис авлоди вакиллари олдин ер шарини иклими бир температуралар иссик булган арктика зона олдида усган музлик даври бошлангандан сунг шу арктика зонасидаги

тоқларнинг қуп қисми совуқдан зарарланиб нобуд бўлган бир қисми эса жанубга қараб силжиган.

Шимолий Америка, Шарқий Осиёда витезнинг қадимги турлари ва жанубий европада эса витез винифера турлари сақланиб қолган. Музлиқ даври бошланиши натижасида ва ер шарининг бўлиниши натижасида витез авлоди 3 гурупуага яқин шимолий Америка, Шарқий Осиё ва Европа Осиё гурупасига бўлиниб кетади.

Витез виниферани млн йиллар сунъий танланиши натижасида ҳозирги тоқларни хилма-хил навлари қелиб қикади. Инсонлар 1 қи маротаба урмон лардан ёввойи узумни мевасини олиб қелиб истъеом қила бошлаганлар ва одамлар утрoқ турмушни бошлагандан сунг уз ҳонадонларига тоқларни сер ширалиқларини олиб қелиб эқа бошлаганлар. Тоқ эқила бошлагандан сунг уч “Лиана” ҳамда устириш сеқин асталик билан уларни туп ҳолида устиришга утилади, қунки туп ҳолидаги тоқ тупига парвариш қилиш усуллари осонлаштирилади.

Тахминан 4-6 минг йил илгари тоқ Зақавқазияда, Урта Осиёда, Сурия ва Мисрда эқилган. Иққи ярим, уч минг илгари эса Грецияда қора денгиз, Урта аср денгиз соқилларида, Франция ва Италияда устирилган.

18-19 асрларда тоқ жанубий Америка, Австралияда, Японияда тарқалади ва шундан сунг ер шарини деярли барқа мамлақатларида эқила бошлайди.

17-18 асрларда Европа мамлақатларида тоққилиқ ва виноқилиқ яқши ривожланади.

Урта Осиё республиқаларида узумқилиқ тарихи узoқ асрлардан бошланган.

Урта Осиё зонасида тоқ Александр Македонский юриши бошлагандан олдин эқила бошлаган. 1 асрларда яъни греқлар Урта Осиёни бoсиб олишида тоққилиқ ва виноқилиқ яқши ривожланган. Фаргона водийсида феодаллар тоққилиқни яқши ривожлантириб улардан юқори сифатли винолар тайёрлаганлар. Бу виноларни 10-15 йил сақлаганлар. Араб ҳуқумдорлари УП-УШ асрларда Урта Осиё қитъасига Арабистондан, Хиндистондан ва Эрондан қуп миқдорда ҳурақи навларни олиб қелиб эққанлар. Тоқ усимлиги Урта Осиёни сунъий суториладиган Тошқент, Фаргона, Самарқанд, Зарафшон водийсида, Қашқадарёда ва Хоразмда қуп эқилган. Тоқдан тайёрланган майиз, шинниларни қушни шарқ мамлақатларга ва Волга бўйи районларга олиб бoриб сота

бошлаганлар. XIII асрда Монголларни Урта Осиёга хужуми дехкончиликни харобага айлантиради. Шу жумладан токчилик бутунлай яқсон бўлади. Лекин XV асрдан бошлаб токчилик секин асталик билан тикланади ва шу асрнинг 2-чи ярмида Урта Осиёдаги феодал давлатларда ёки Хоразмда, Бухоро, Куконларда мусулмон динига асосан вино ичиш ман этилади. Натижада винобоп ток навларини туплари билан олиб ташланади. Лекин ҳозирги вақтгача винобоп сортлардан Бахтиёрӣ, Обак, Васарга ва Буваки навлари ҳозиргача учрайди. Урта Осиёнинг Россияга қушилиши билан хураки сортлар ва ундан тайёрланган майизлар россияни бозорларига олиб бориб сотила бошлайди ва шунинг билан бир қаторда виночилик тез суратлар билан ривожланади.

Крим, Молдавия, Кавказ республикаларидан Урта Осиёга янги навлар олиб келиб экила бошлайди. Айниқса вино тайёрлайдиган сортлар ана шулардан: Баян Ширей, Саперави, Мускат венгерский ва бошқалар. Бу навлар Урта Осиё республикаларида узининг 2-чи ватанини топиб олади ва яхши усади, мул ҳосил беради.

Урта Осиё узумчилигини ривожланишида Россия богдорчилиги катта роль уйнаган. Кейинчалик Туркистон богдорчилик, узумчилик зонасига айлантирилади. 1911 йилдан бошлаб токчиликни ривожлантиришда касаллик ва зараркунандаларга қарши курашда янги токчилик кучатларини ташкил этишда ва агротехника тадбирларни ҳосилга қирган токзорларда куллашда жудаям катта аҳамиятга эга бўлади.

1924 йилдан бошлаб Урта Осиёда токчилик ва виночилик тезда ривожланади. Виночилик саноати учун асосий хом ашё базаси ҳисобланадиган узумчилик совхози Булунгур 1, Булунгур 2, Паркентда, сукоқда, Кибрай совхози ташкил қилинади. Кейинчалик кучатларни сифатлари яхшиланади ва биринчи маротаба ҳосилга қирган токзорларга сим бағазли шпалера урнатилади. Шунинг билан бир қаторда токзорларни парвариш қилиш йилдан йилга яхшиланади ва натижада ҳосилдорлик ошиб боради. Ўзбекистонда токчиликни ривожлантиришда илмий текшириш муассасалари яъни Шредер номидаги илмий текшириш ишлаб чиқариш бирлашмаси шунинг билан бир қаторда Самарқанд узумчилик институти, ВИРни иштироқи билан бир қаторда Тошкент ва Самарқанд кишлок хужалик институтлари мевачилик ва узумчилик кафедралари катта роль уйнайди.

Хозирги вақтда Ўзбекистонда токзорлар барпо этиш учун имкониятлар жуда катта. 1000 гектарлаб суғорилмайдиган пастликлар, тоғ багирларда тошлик ва шагал ерларда ер ости сув яқин бўлган участкаларда ва янги узлаштирилаётган Мирзачул, қарши ва бошқа участкаларда янги токзорлар барпо этилмоқда.

1.3. Токзорларнинг ҳосили купинча утказиладиган материалнинг сифатига боғлиқ. Ўзбекистонда ток кучатлари Р.Р.Шредер номидаги Ўзбекистон боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий текшириш институти қарамоғидаги бир қанча совхозлар - мева кучатзорларида етиштирилади.

Ток уруғидан ва вегетатив қисмлари (пояси, қаламчалари), шунингдек пархиддан ва пайванд йули билан қупайтирилади. Вегетатив қупайтиришда ток утказилгандан 2-3 йилдан кейин, уруғдан экилганда эса анчагина кеч ҳосилга қиради. Янги навлар етиштиришда селекция мақсадларидагина ток уруғидан қупайтирилади. Хужалик шароитида ток қаламчаларни парвариш қилиш йули билан устирилган кучатлардан қупайтирилади. Қамдан-қам ҳолларда қулай шароитда бевосита қаламчалардан қупайтирилади.

Қаламчаларни утказиш ва парвариш қилиш. қаламчалар кучатзорга эгат ёки ариқларга утказилади, булар ПРВН-2,5, КУ-0,3 рамасига ёки қизилга урнатилган мослаштирилган ишчи органлар билан олинади. Ёрни ишлаш қулай бўлиши ва кучатлар орасини механизация йули билан қопиш учун қаторлар орасида 80-90 см, қатордаги қаламчалар орасида 10-12 см масофа қолдирилади. Бунда кучатзорга ҳар гектар ерга 125 мингтагача кучат утказилади. Хозирги вақтда қуп хужаликларда кучатзорга қаламчалар утказишнинг ҳар хил схемалари синаб қурилмоқда. қаламчаларни гектарига 200 минг донагача 90х10х10 см схемада икки қаторлаб экиш, қатор ораларини тор қилиб (60 см.дан) гектарига 160 мингтадан, шунингдек ҳар уяга 4-6 тадан жойлаштириб 60х60 см схемада квадрат-уялаб экиш энг катта қизиқиш уйғотмоқда. қаламчаларни утказишда улар қесилган ёриқларга вертикал қилиб ёки бир оз ётқазиб қатор жойлаштирилади. қаламчаларнинг узунлиги 50 см бўлса, у ер юзасидан 30 см чуқурликка утказилади, унинг қолган қисми (20 см) эгатнинг юза қисмида қолади ва энг учки қуртагини очик қолдириб тупрокка қумилади. қаламчалар трактор оқучниклар ёрдамида тупрок билан бекитилади. қаламчаларнинг учи очик

колдирилган куртақдан 3-4 см юкоридан секатор билан кесилади.

Молдавияда, Украинада каламчаларни кучатзорларга утказадиган машиналарнинг тажриба намуналари конструкция килинган ва синаб курилмоқда. Бир утишнинг узида машина чуқур эгат очади, ерни юмшатади ва эгат тупини суғоради, каламчаларни жойлаштиради ва ёнига тупрок тортади.

Кучатзорнинг бир неча каторига каламчалар утказиб булингандан сунг эгатлар ва каторлар ораси тезда суғорилади. каламчалар кучатзорга утказилгандан сунг биринчи ойда хар 5-6 кунда бир марта суғорилади, иккинчи ва учинчи ойлarda (май-июнда) хар 10-15 кунда суғорилади. Июль ва августда 2 мартадан суғорилади. Баҳор ва ёз даврларида камида 12-15 марта суғорилади.

1.4. Токзорлар куп йиллар учун бир марта барпо этилади. Унинг хосилдорлиги, узок яшаши ва сермахсуллиги куп жихатдан уни тугри ташкил килишга боғлиқ. Ток утказишда йул куйилган хатолар усимликнинг келгуси ҳолатида баъзан бир неча йилдан сунг сезилади, лекин бу вақтда уларни тузатиш кийин булади ёки тузатиб булмайди. Шунинг учун токзор катъий ишлаб чиқилган план асосида барпо этилади, бу пландаги вазифалар, жойнинг тупрок-иклим шароити, токнинг биологик хусусиятлари ва ташкилий-хужалик шароит ҳисобга олинган ҳолда тузилади. Бундан ташқари, ток кучатларини утказишдан олдин навларни танлаш ва жойлаштиришга, ерни тайёрлашга ва кучат утказиш техникасига катта аҳамият берилади.

Каторлар ва каторлардаги ток туплари оралиги (м).

Сури	Каторлар оралиги	Навлар буйича катордаги ток туплари оралиги кучли усадиган	уртача усадига	секин усадиган
Сизот сувлар чуқур жойлашган водийдаги типик буз тупроқли ерларда суғориладиган токчилик				
Тик сури	2,5-3,0	3,0	2,5	2,0
Икки томонли сури	3,0-3,5	2,0	1,5	1,0
Соявонли сури	3,0-3,5	2,5	2,0	-
Сизот сувлар юзада жойлашган ерларда				
Тик сури	3,0	3,0	2,5	-

Икки томонли сури	3,5	2,0	1,5	-
Соявонли сури	3,5	3,0	2,5	-
Шагалли ерларда				
Тик сури	2,5-3,0	2,5	2,0	1,5
Икки томонли сури	3,0-3,5	2,0	1,5	1,0
Тогли ва тог олди районларида шартли суториладиган ерлардаги токчилик				
Тик сури	3,0	3,0	2,5	2,0
Икки томонли сури	3,5	2,0	1,5	1,0
Соявонли сури	3,5	2,5	2,0	-
Кирда				
Тик сури	3,0-3,5	3,0	3,0	2,0
Ерга ётказиб устирилган ток	3,0-4,0	3,0	3,0	3,0

Токни кузда ва баҳорда утказиш мумкин. Кузда ноябрь ойидан бошлаб, совук тушгунча давом эттирилади. Баҳорда эса тупрок ҳолати экиш учун ярокли була бошлагандан то кучатда куртаклар ёзила бошлагунча, яъни апрелнинг иккинчи ун кунигача давом эттирилади. Кучатлар анча кеч утказилса, улар ёмон тутади. Агар ер музламаган булса, ток кучатларини кишда температура нолдан юкори булган илик кунларда ҳам утказиш мумкин. Кучатларни баҳорда утказишга караганда кузда утказиш яхши, чунки кишда улар кумилмайди. Шу билан бирга тупрок кишда ёгин-сочин туфайли зичлашиб колиши мумкин ва баҳорда кучатлар атрофини юмшатиш учун кушимча меҳнат талаб этилади. Лекин кучатларни кузда утказишнинг афзаллиги ҳам бор, чунки бу муддат узок булиб, баҳорда ишчи кучига талабни камайтириш имконини беради. Кишда кучатлар илдизида каллус ҳосил булади, баҳорда улар яхши тутади ва эрта уса бошлайди. Шунинг учун катта-катта токзорлар барпо этишда ва ишчи кучи етишмаганда кучатлар кузда утказилгани маъкул. Лекин ёмгир ва кор сувлари тупланиб коладиган ва кучат утказиб булгандан сунг суториш мумкин булмайдиган майдонларга кучатни кузда утказиш мумкин эмас. Кучатларни кузда ёгин тушгунча курук буладиган чукурларга утказиб булмайди.

Ток кучатларини баҳорда утказишда барча тайёргарлик ишлари (ерни текислаш, хайдаш, булиш, чукур ковлаш) куздан бошланади.

Саволлар:

- 1..Токнинг экиладиган навларни айтинг, биологик ва хужалик тавсифнома беришу
- 2.Навларнинг биологик хусусияти нималардан иборату
- 3.Навни хужалик хусусияти деганда нималарни тушунасизу
- 4.Ўзбекистонда ток устиришни қандай усуллари мавжуду
- 5.Токни кесиш қоидаларини тушунтириб берингу
- 6.Ток неча градус совуққу чидамлиу
- 7.Совуқ ва қора совуқлардан зарарланган токзорларни тиклаш чора-тадбирлар тугтрисида нималарни биласизу
- 8.Токни экиш муддатиу
- 9.Ток кучатлари қандай сақланадиу
- 10.Қузда кучат утказишни афзаллиги нимадау

12-МАЪРУЗА: УЗУМЧИЛИК. ТОК УСИМЛИГИНИНГ БИОЛОГИЯСИ

Режа:

1. Токнинг биологик хусусиятлари.
2. Токнинг тузилиши.
3. Илдиш ва илдиш системаси.
4. Пояси, вегетатив ва генератив органлари.
5. Ҳосил органларининг шаклланиши ва ривожланиш хусусиятлари.

Адабиётлар 2, 3, 4, 7, 14.

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: Лиана, морфологик, биологик, физиологик, экологик, физиологик, экологик хусусиятлар, кутублик, дорзовентраллик, вегетатив органлар, генератив органлар, регенерация, яширин қуртаклар, барг сатхи.

1.1. Ўзбекистон Республикаси амалга оширилаётган аграр сиёсат, Республика Олий Мажлисининг XI ва XII сессияларида қабул қилинган “Ер кодекси”, “Қишлоқ хужалик кооперативи (ширкат хужалиги) тугтрисида”, “Фермер хужалиги тугтрисида”, “Дехқон хужалиги тугтрисида”, “Давлатер ер кадастри тугтриси”ги Ўзбекистон Республикаси қонунлари ва ҳукумат қарорлари мамлакатмизда қишлоқ хужалигида туб ислохатларни амалга ошириш, бу жараёнда жамоат ҳамда мулкчиликнинг турли шаклларида фойдаланиш асосида аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига, саноатни хом ашёга бўлган талабларини таъминлашга қаратилган.

Токнинг биологик хусусиятлари. Тоқдошлар оиласи Vitaceae јукқ нинг ҳозирги замон вақиллари ирсий узгарувчанлик, танланиш, ташқи муҳитнинг узгарувчанлигига

мослашиш кабимураккаб эволюцион йулни бошдан кечирган. Дастлаб улар бута шаклида жингалаксиз моноподиал усиш типига хос хусусиятларига эга булган. Асосан, очик майдонларда устанлиги туфайли уларнинг ёруғликка булган талаби юкори. Кейинги тарихий даврда уларнинг тузилиши, усиши, хосил бериши, яшаш шароитларида узгаришлар булди. У куп йиллик дарахтсимон лианага айланиб, узига хос морфологик, физиологик, экологик хусусиятларга эга булди. Ток эркин шароитда тик уса олмайди. Шунинг учун унга урмон шароитида дарахтлар тирговуч сифатида хизмат килган. Ток жингалаклари ёрдамида дарахтга чирмашиб ёруғлик томон усади.

Токнинг мухим биологик хусусиятларидан бири ундаги кутубликдир. Буйлама ёки юкори кутублилик туфайли новдалар буйига тез усади. Дастлабки новдалар бултурги новдалардаги учки куртаклардан ривожланади. Бундай кутублиликни новдаларни кесиш ва эгиброк боғлаш каби усуллар билан тартибга солинмаса, ток новдаларининг пастки кисмидаги куртаклар сушт ривожланади, усимлик барвакт ишдан чикади.

Энига (текис) кутублилик ёки дорзовентралик ток усимлигининг барча органларига тааллуки. Бундай кутублилик туфайли усимлик органларининг тузилиши ассиметрик, тухумсимон-думалок сифатга эга булади, новдаларнинг орка томони тезрок усиши (катталашиши) туфайли уларнинг учки кисми эгик холатга киради.

Токнинг физиологик хусусиятлари унинг барглари ва бошка яшил кисмлари оркали кечадиган трнаспирация, фотосинтез каби жараёнлар билан боғлиқ. Улар оркали хосил булган ассимиляция махсулотлари токнинг ривожланиши, хосилдорлиги ва хосил сифатига катта таъсир курсатади.

Ток усимлиги усиш ва хосил бериш жараёнини вегетатив ва генератив органлари оркали тартибга солади. Токнинг биологик хусусиятларини яхши урганиш, унинг усиши, ривожланиши, хосил беришини бошқариш учун имкониятлар яратиб беради.

1.2. Токнинг тузилиши, асосан, вегетатив ва генератив органлардан иборат. Вегетатив органларга идиз, поя, барг, куртак, жингалаклар киради. Уларнинг вазифалари усимлик хаётини таъминлаш учун хизмат килишдир. Генератив органларга тупгул, гул, узум боши, гужум, уруглар киради.

Уларнинг вазифаси турли мақсадларда ишлатиладиган сифатли мевани шакллантиришдир.

1.3. Илдиш ва илдиш системаси. Усимлик ҳаётида энг муҳим ораганлардан бири. Тупроқдаги сув ва минерал моддаларни суриб ер устки қисмига утказилади: унда органик моддалар синтезланади; озик моддалар куплаб ғамланади ва мураккаб биокимёвий жараёнлар содир бўлади: усимликни тупроқда мустаҳкам ушлаб туради ва тупрокни эрозиядан саклайди; тупрокни чириган органик бирикмалар билан бойитади ва тупроқда фойдали микроорганизмларни купайтирилади ва х.к.

Уруғ кучатда дастлаб уқ илдишча, сунгра илдиш тукчалари пайдо бўлади, кейин бир неча тартибдаги илдишчалар ҳосил бўлади. Барчаси илдиш системасини ташкил этади.

Ток каламчалардан купайтирилганда илдишлар, асосан, тупрок ости бутимларидан ривожланади. Илдишлар юза (шудринг шимувчи) илдишлар, ён илдишлар ҳамда асосий илдишларга бўлинади (хар бирининг хусусиятлари амалий машғулоти амалий машғулотлар даврида утилади).

Ток илдишлари қайта тикланиш (регенерация) хусусиётига эга. Илдиш системасининг тупроқда тарқалиш ва жойлашиш характери тупрокнинг физикавий, механикавий таркибига, шурланиш даражасига, ер ости сувларининг ҳолатига ва х. к. га боғлиқ.

1.4. Ток пояси, вегетатив ва генератив органларининг хусусиятлари. Ток пояси усимликнинг вегетатив ва генератив органларини илдиш системаси билан бирлаштириб туради. Тана ёки штаб ва ундан таралган турли ёшдаги новдалардан иборат. Асосий вазифалари: илдишдан баргга, баргдан илдишга ассимиляция маҳсулотларини утказиш, узида барглари ҳосил қилиш, озик моддаларни ғамлаш ва х.к. Ҳосилли ва ҳосилсиз яшил новдалар одатда утган йилги новдалардан ривожланади. Вегетатив ва генератив органлар, асосан, бир йиллик яшил новдаларда пайдо бўлади. Новдаларнинг узиш кучи таъки муҳит, тупрок шароитларига нав хусусиятларига, парваришга боғлиқ. Новдалар апиқал ва интелқалар узиш хусусиятига эга. Апиқал узишда новда уқ қисмининг қузилиши ҳисобига, интелқалар узишда эса новда бутим оралигининг қузилиши ҳисобига усади. Новда бир сутқада 4-5 смдан 10 см гача узиши мумкин. Новдаларнинг узишини тартибга солишда ғармонлар (ауқсинлар, ғиббереллинлар, ретардантлар)нинг роли қатта.

Поя ва новдаларнинг узиш ривожланиш қонуниятларини билиш тоқ парвариш усулларини тугри ва вақтида амалга оширишда яқиндан ёрдам беради.

Куртаклар усимликнинг муҳим қисми. Новданинг бошланғич муртақ ҳолати. Барг култигида ривожланади. Узиш қонуси ва поя муртагидан ташкил топган. Бошланғич муртақ ҳолатидаги кузларда барглари, жингалаклар, тупгуллар жойлашган бўлади.

Куртаклар ҳосилли ва ҳосилсиз бўлади. Ҳосилсиз куртакларда бошланғич муртақ ҳолатидаги эмбрионал барглари, жингалаклар ривожланиб ҳосилсиз новда ҳосил қилади. Ҳосил берувчи куртақ бошланғич поя муртагида юқоридагилардан ташқари эмбрионал ҳолатдаги тупгулларни сақлаб ҳосилли новдаларни пайдо қилади.

Куртаклар бир неча хилга: муртақ куртақча, култик ости куртаклар, кишловчи кузлардаги марказий ва уринбосар куртаклар, кишловчи култик куртаклар, ухловчи куртакларга бўлинади.

Култик куртаклар тез етилувчан, шу йилнинг узидаёқ иккинчи тартиб новдалар беради. Унинг асосида кишловчи куртаклар ривожланиб, ундан келгуси йили асосий новда ривожланади. кузча бир қанча куртаклар йигиндисидан иборат бўлиб, унинг марказида асосий (марказий) куртақ, ёнларида эса уринбосар куртаклар жойлашган бўлади.

Куртакларнинг ҳосил бериши новдаларнинг узиш қучига боғлиқ. Қучли усувчи новдаларда тупгулларнинг шаклланиши ва уларнинг дифференциалланиши жадал кечади. Шунинг учун тоқ қесишда қучли усган новдалар қолдирилади. Тоқнинг қуп йиллик қисмларида яширин (ухловчи) куртаклар жойлашган. Тоқ совуқдан, дулдан зарарланган, қучли озиклантирилганда уйғониб ривожланади. Улар асосан сурх (ҳосилсиз) новдалар.

Ўзбекистон шароитида кишловчи куртаклар узумнинг винобоп навларида май-июнда, хурақи навлари июл ойида шакллана бошлайди.

Барг тоқнинг вегетатив органи. Қуёш нури ва ёруғлик таъсирида унда фотосинтез, транспирация қабии физиологик жараёнлар кечади. Органиқ моддалар неорганиқ моддаларга айланади. Барг орқали усимлик ва ташқи муҳит уртасида газ алмашиш жадал кечади. Бу баргларнинг типдаги қони ва умумий сатҳига боғлиқ.

Тоқ барги оддий. Барг банди ҳамда барг пластинқасаси (барг сатҳи) дан иборат. Барг сатҳи қатта, ясси, четлари

тишсимон, айрим холларда бутун ва керткли (уймали), узум навига караб турли шаклда, оч яшилгача. Кузда ок ва пушти рангли узум навлариники сарик, гужуми коралариники кизил ранг олади. ток барги 5-6 хафтагина усиб маълум хажмга эга булгач,усишдан тухтайди. Ассимиляция кучайиб,хлорофил парчаланиб озик моддалар пояга утабошлайди.

Барг сатҳи гуллашгача 15-30 %,июн охирига 60-65 %,пишабошлаганда барг сатҳи энг куп булади. Фотосинтез учун энг кулай ҳарорат 30-32 градус булиб,38-40 градусдан ошса ёки 6-7 градусдан пасайса фотосинтез деярли тухтайди.Ток барглари орқули кучли сув буғлатиш хусусиятига эга.1 туп ток 24 градус иссиқда бир суткада 1-1,5 л.сув буғлатади.Шунинг 0,2 % органик масса учун сарфланади.

1.5.Ток жингалаклари шакли узгарган новда булиб, баргнинг карама-қаршисида жойлашади.Ҳосилсиз новдаларда жингалаклар пастки 3-4 буғимда,ҳосилли новдаларда юкори буғимларда булади.Жингалаклар механик вазифани бажаради.

Тупгулининг шакли булажак узум бошининг шаклига ухшайди.Гулларнинг миқдори нав ва шаклланиш шароитига боғлиқ.(50-1200)тагача булади.Битта ҳосилли новдада 1-3 тагача тупгул булади.Ток новдаларининг аксарияти икки жинсли гулга эга. Нимранг, каттакурғони, чарос,тавквери каби навлар урғочи гуллар булиб,уларни чангловчи навлар билан кўуиб экилади. Функционал урғочи гулларнинг чанглари наслсиз.Гул чанглари майда булганлиги учун тез шамол ёрдамида тарқалади.Гуллаш вақтида гул тумшукчаларида шира ажралади ва чангларни тез ушлаб қолади.

Ток гуллаб уруғланагндан кейин тупгул мевага айланади ва узум боши ҳосил қилади.Узум бошлари конуссимон, цилиндрсимон, булакли вашохланган булади. Зичлиги жуда тигиз, уртача, ҳаволи, Катталиги узум навларига боғлиқ. Ёужум мева эти, пуст ва уруғдан ташкил топади.Пустлок ҳужайраларида навга хос ранг берувчи буёк моддалар хлорофилл, ксантофилл,каротин,антоцианлар бор.

Мева эти ҳужайра шираси билан тулган вокуоллардан иборат. Узумнинг таъми, серширалиги, ранги, кислоталиги пустлок таркибида ги буёк ҳамда хушбуй моддаларга боғлиқ. Кимёвий таркиби қанд моддалари, органик кислоталардан иборат.Қанд миқдори 12-30 % гача булади. Узум пишиш даврида мева эти ғужум масасининг 75-85 % ни ташкил қилади.Пишган ғужум ёки меваси ошловчи, азотли, калий, кальций, натрий,

магний, темир, рух каби минерал моддалар, органик кислоталар (олма, шовул, вино, қаҳрабо,) га ҳам бой.

Саволлар;

1. Ўтмишда ток ўсимлиги қандай шароитларда ўсган,
2. Қутблиликни таърифланг,
3. Токни вегетатив органлари вазифаси нималардан иборат.
4. Токнинг генератив органлари нима,
5. Илдиз ва илдиз системаси шакллари айтинг,
6. Яширигн куртакни вазифаси нима,
7. Ток баргини ўсимлик ҳаётидаги вазифаси
8. Ҳосилли органлар деганда нимани тушунасиз,
9. Шаклланиш ва ривожланиш нима,
10. Ёвжумларни кимёвий таркибини таърифланг,

13-Маъруза: ТОКНИ КУПАЙТИРИШ ВА КУЧАТ ЕТИШТИРИШ.

Режа;

1. Токни купайтириш йуллари
2. Вегетатив купайтириш
3. Апробация
4. Селекция турлари
5. Она токзор
6. Қуламчалар тайёрлаш ва экишга ҳозирлаш
7. Ток кучатларини ташкил қилиш.

Адабиётлар;

Таянч иборалар; вегетатив, жинсий, уруғдан купайтириш, апробация, регенерация, дурагайлаш, тикланиш, селекция турлари, қаламча, фитосанитария, кучатзор, органик ва минерал моддалар, иссиқхоналар

1.1. Ток асосан жинсий ва вегетатив йул билан купаяди. Уруғдан купайтиришда селекция ишларида қўуланилади. Ток уруғдан купайтирилганда навини белги ва хусусиятларига қараб ёввойи шаклига қараб кетади. Кеч ҳосил беради.

1.2. Вегетатив купайтиришда ток қайта тикланиш хусусиятига эга. Ток органларининг қайта тикланиши бир хил эмас. М: илдиз булаг, барг банди, тупгул банди, илдиз чиқариш мумкин. Аммо уларда куртаклар йуқуиги учун новдаривожланмайди. Қайта тикланиш жараёни навнинг биологик хусусиятлари, новданинг ёши, озиқ моддаларнинг миқдори, тупроқ нами ва унумдорлигига боғлиқ. Ток қаламчаларидан купайтирилганда юқори қисмидан

новдалар,пастки қисмидан илдиз ҳосил қилади.Яхши пишган бир йиллик новдалардан урта қисмидан олинган қаламчалардан яхши кучат бўлади.Қаламчалар кузда тайёрланади.Токни пархишлаб купайтиришда унинг занг,маданг,яшил ва ярим яшил қисмларидан фойдаланилади. Пархишланишнинг тик, ётиқ, ер ости, ер усти каби усуллардан фойдаланилади.Токни пайвандлаб устириш қадимдан маълум.

1.3. Апробация.-токзорда наводор ток тупларини аниқлаш, демақдир. Маскур тадбирлар тоза навли, соғлом кучатлар тайёрлаш, кучат етиштириш, уларни нав тозалигини белгилаш мақсадида утказилади. Вақти-август. Бу вақтда токнинг нав таркиби белгиланади ва ҳар бир участкада токнинг ҳосилдорлиги,усиш кучи,касаллик ва зараркунандалар билан зарарланганлиги баҳоланади.

Аввал эртапишар, кейин урта пишар ва кечки пишарларда утказилади.Токлар наводорлик хусусиятига қараб уч гуруҳга: 1-бунда барча тупларда нав тозалиги 98 %, 2- сида 90 % ва 3-сида 90 % дан кам бўлади. Қаламчалар асосан 1 ва 2 гуруҳдан тайёрланади.

1.4.Селекция турлари: Қаламчалар тайёрлашда ялпи,клон ва фитосанитария селекциясидан фойдаланилади.Ялпи селекциядан мақсад кам ҳосил, касалланган ток тупларидан фойдалан маслик. Клон дейилгандақуртак мутацияси узгарганлиги тушунилади. Маскур навнинг бошланғич усимлигидан генотипик томондан фарқ қулиб уз белгиларини вегетатив купайтиришда сақлаб қолади.

Фитосанитария селекциясида она ўуимликдан соғлом кучатлар олишга хизмат қилади. Бактериал, доғли некроз, хлороз, вирусли касалликларни аниқлаш мақсадида утказилади.

1.5.Она токзорлар-соғлом ва сифатли қаламчалар тайёрлашга мулжалланган алоҳида токзор.Кучат етиштириш учун қаламчалар урнини купинча бир қанча навлар экилган токзорлар тайёрланади. Аралаш навларнинг ёмонлиги шундаки, 10-15м\га кучат тайёрлаш мумкин.Она токзорлар учун сув таъминоти яхши унумдор тупроқлар танланади ва қатор –туп ораси 2,5х2,5 м қалинликда қилинади.Бундай токзорларда 140-150 м\та қаламча тайёрлаш мумкин.

1.6. Қуламчалар 100-200 тадан қилиниб икки томонидан боғланади,ҳар бир боғламга қора қалам билан нав номи ва сони ёзиб қўуилади. Қаламчалар баҳорда экилгунча махсус хандакларда сақланади.Узоқ сақланган кучат лар таркибида озик моддалар камайиб баҳорда секин усади.

Каламчаларни экишга тайёрлашнинг қадимий усулларида бир буғим оралиғи пустиғини юза тилиш ва пастки куртакларни олиб ташлашдир. Пустиқоч тичоқ ёки шунга ухшаш мослама билан 3-4 жойидан юза тилиб қўйилади. Шунингдек, қаламчанинг иккита юқоридаги куртагидан бошқа барча куртаклар олиб ташланади. Бу икки усуллар ҳам экилган қаламчаларда илдизнинг тезроқ ва жадал ривожланишига ёрдам беради.

Точ кучатларини етиштиришда пайвандлаш усулидан ҳам фойдаланиш мумкин. Бундан пайвандтаг ва пайвандуст қаламчалар махсус технология билан олдиндан тайёрланиб, қўуда ёки машина (мослама) ёрдамида март ойи ва апрел бошларида тилчали ва ёрма усулларда пайвандланади.

7.Точ кучатзорини ташкил этиш. Тулақонли кучатларни етиштириш кучатзор учун танланадиган жойга ҳамда экиладиган қаламчаларнинг сифатига боғлиқ. Кучатзор учун текис, унумдор, суғориш имкониятлари яхши булган, бегона утлардан холи ерлар танланади. Кучатзордан фойдаланиш қулай булиши учун у катта йулга яқин булгани маъқул. Тупроқ шароитини яхшилаш мақсадида алмашлаб экиш жорий қилинади. утмишдош усимликлар сифатида беда, эртаги сабзавот экинларидан фойдаланилади. Асосан, 5 далали алмашлаб экиш тавсия қилиниб, иккита дала бедага, иккита дала кучатзор учун ва битта дала сабзавот экинларини экишга ажратилади.

Майдон кузда плантаж плуги ёрдамида 40-50 см, ёки оддий плутда 30 см.чуқурликда ҳайдала ди.Тупроққу механизация билан ишлов бериш назарга олинган кучатзорларда қатор оралири 80-90 см ва 10-12 см. қатор бўйлаб экилади. Бунда 125 м\га туп сарф булади.усув даврида қаламчаларни 10-12 марта суғорилади.1-марта апрелда,май-июнда 2 мартадан,июлда 2-3 марта ва августда 2 марта.Суғориш нормаси 300-400 м.куб\га.Новдаларни янги узиш давридв 20-25 кг\га азот,35-40 кг\га фосфор ва 15-20 кг\га калий берилади кейинги озиклантиришда икки марта куп миқдорда ва 3-озиклантиришда фақат фосфор ва калий берилади. Одатда ҳар га.ердан 60,70-75 минг туп кучатолиш мумкин.

Саволлар:

1. Жинсий купайтириш нима
2. Вегетатив купайганда тоқда қандай хусусиятлар утади
3. Апробация нима

4. Селекция турларини айтинг
5. Селекция турларини фарқи
6. Она тоқзорларда тайёрланадиган кучатларни айтинг
7. Қуламчалар қандай тайёрланади.
8. Тоқ кучатларини ташкил қилиш қоидаларини айтинг
9. Яшил қаламчадан ҳам кучат тайёрланадими.
- 10 Парқиш усули нима.

14-Маъруза: КИРИШ. САБЗАВОТ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ.

Режа;

1. Кириш..
2. Сабзавотчилик фани, мазмуни, ахамияти, вазифаси ва хусусиятлари.
3. Ўзбекистон сабзавотчиликни ривожланиш тарихи.
4. Сабзавотчиликни ҳозирги ҳолати.
5. Сабзавотчиликни ривожлантиришга оид илмий асослар.

Адабиётлар: 5,4,8,19.

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: кишлок хужалигининг маҳсулот тармоғи, сиркаланган, консерваланган, тузланган, истеъмол, қитъа, минтақа, вилоят, кимёвий элемент, осмотик босим, суяк туқималари, физиологик жараён, органик кислоталар, ферментлар, бактериялар.

1.1.Усимликлар дунёсидаги улут неъматлардан этли, сувли, ширали ва мазали қисмлари (мевалари, қарамбоши, пиёзбоши, илдизмеваси, барғи ёки бошқа аъзоси) қомлиғича, пиширилган консерваланган (тузланган, сиркаланган ва х.к.) ҳолатларда инсоният истеъмол қиладиган бир-икки ва қуп йиллик утсимон усимликлар сабзавотлар дейилади.

Ана шу усимликлар билан шугулланувчи кишлок хужалигининг махсус тармоғи сабзавотчилик дейилади. Шунингдек сабзавотчилик усимликларнинг биологияси ва маҳсулотлар етиштириш технологияларини урганувчи илмий ва амалий фандир. Кишлоқ хужалигидаги ушбу тармокнинг очик дала сабзавотқорлиғи, химояланган жой сабзавотчилиғи, полизчилик, уругчилик қабил йуналишлари ҳам мавжуд.

Сабзавотлар ер юзасининг турли қитъа ва минтақалари, шу жумладан Ўзбекистоннинг ҳамма вилоятларида етиштирилади. Сабзавотлар ҳайдаладиган жами майдоннинг 1-2%ни эгаллайди-ю, аммо олинладиган маҳсулот миқдори усимликшунослиқда биринчи уринни эгаллайди.

1.2.Аҳамияти. Сабзавотлар маҳсулотининг асосий қисми(75-95%) сув булиб, қуруқ моддалар қупчилик меваги ва илдизмеваги сабзавотларда 5-11%, картошка ва қук нухат, ловия, жандукларда 13-20% ва факат саримсоқда 35% ни ташкил қилади. Шунга қура сабзавотлар қиши организмнинг энергияга талабини тулик қондира олмади. Аммо сабзавотларнинг инсоният учун озикалик аҳамияти жуда қатта.

Сабзавотлар аввало инсон ҳаёти ва фаолияти учун зарур 20 ҳил: С₁, В₁, В₂, В₃, В₆, РР, В₁₂, Р, А, Д, Е, К ва бошқа витаминлар манбаидир. Буларга қиши организмнинг бир суткалик эҳтиёжи : С 50-100 мг, РР 15 - 25, В₃ 10-12, А, В₁, В₂, В₆, К 2-3 мг булиб, уларнинг етишмаслиги организмга турли ҳасталиқларни қелтиради. Сабзавотлар таркибида 50 дан ортиқ қимёвий элементлар мавжуд. Улар қиши организмга учун зарур ва осон узлашадиган қальций , фосфор, темир, қалий, мағний, марганец, никель, ва бошқа элементлар сабзавотчилиқда минерал тузлар ҳолида учрайди. Бу тузлар ишқорий реакцияга эга булиб, қиши организмда қон, қушт, туҳум қабиги юқори қаллорияли озуқалар истеъмолидан туқималарида ҳосил булувчи қислоталарни шу жумладан СО₂ ни ҳам нейтраллайди.

Инсон организмда қоннинг яратилишида темир, мис, қобальт, марганец, никель ва суяқ туқималарининг шаклланишида фосфор ва қальций асосий элементлардан ҳисобланади. Шунингдек, қимёвий элементлар организмда электр қарядлари - ионлар ҳолида булиб, улар уз навбатида ҳужайра суюқликларида осматик босимни ҳосил қилади ва шу туфайли туқималар озик-овқат билан таъминланади, физиологик қараёнларда воситачи ҳизмати қи бақаради.

Сабзавотлар таркибидаги органик (олма, лимон, узум, шовул) қислоталар, ферментлар эфир мойлари ва бошқа ҳушбуй моддалар қиши иштаҳасини қузғатиб, оксиллар, углеводлар ва мойларнинг сингишини яқшилади. Инсон организмнинг нормал ишлаши учун овқатлар серҳазм, уларда балласт-қикинди моддалар ҳам булмоғи лозим. Бундай ҳусусиятлар сабзавотларда мавжуд

Сабзавотларнинг шифобаҳшлик ҳусусиятлари қадимдан маълум. Улар асабий-рухий ҳолатларни нормаллаштиради. Бир қатор сабзавотларда (пиёзлар, саримсоқ, қалампир ҳрен, қарам, шолғом, укроп, петрушка, қашниқ ва бошқалар) фитонцидлар мавжудқи, улар инсонда қасаллиқ қузғатувчи бактериялар қушандасидир. Шу боис ҳалқ табобати турли гриппи

хасталикларни даволашда бундай сабзавотлардан кенг фойдаланади.

Организм учун зарур кимёвий моддалар барча сабзавотларда, айника чучук калампир ва кукатларда купдир. “С”-витамин чучук калампир, укроп, петрушка, хренларда 100-200мг, “А”-укроп, исмалок, салат, помидор, ковок, сабзиларда 8-9,5 мг, “В” - петрушка, пиёз, карамлар, сабзи, лавлаг, калампир, ковун, ковок, кук нухатларда 10.0-0,4мг. “РР”-дуккакдилар, жухори, картошка ва ковунда 2.1-1.0мг. Тиббиёт илми маълумотларига кура инсонлар овкатида сабзавотлар миқдори кундалик рационнинг 1-2 қисмдан кам булмаслиги лозим, ёки хар кундалик озукаларда 300гр картошка, 400гр сабзавот ва 50-60гр полиз махсулоти булиши керак. Бирок Ўзбекистон дехкончилиги хусусиятларини ва аҳолининг махсулотлар турига иштиёқини ҳисобга олиб, йил буйи давомида жон бошига уртача 113 кг сабзавот, 98 кг полиз махсулоти ва 45 кг картошка истеъмол қилиниши макбул деб топилган.

1.3.Сабзавотчилик вазифаси ва хусусиятлари. Сабзавот махсулотларининг инсоният ҳаётидаги аҳамиятига кура сабзавотчиликнинг асосий вазифаси келиб чиқади; бу турли хилма хил экинлардан мумкин қадар юқори ҳосиллар етиштириш ва аҳолини йил буйи давомида сурункали равишда сифатли ва арзон махсулотлар билан таъминлашдан иборатдир. Сабзавотчиликнинг ана шу вазифаси ва усимликларнинг агробиологик хоссаларига мувофик ушбу тармокнинг бошқа тармокларидан фаркланувчи узига хос қуйидаги хусусиятлари келиб чиқади.

- *Сабзавотлар икки усулда; очик майдонда ва химояланган махсус жойларда етиштирилади;*
- *Сабзавотчиликда кучатчилик услуби қулланади;*
- *Сабзавоткорликда бир йилда 1,5-2 марта ҳосил етиштириш орқали ердан жадал ва самарали фойдаланилади;*
- *Сабзавотчиликнинг мужассамлашган йирик хужаликлари аҳоли зичлашган шаҳар ва саноат марказлари атрофида ташкил қилинади.*
- *Сабзавоткорликда тулик етилмаган махсулотларни етилтириш усуллари қулланилади.*
- *Сабзавотчилик чорвачилик билан доимий алоқадорлик қилади.*

Сабзавотчиликнинг баён қилинган вазифалари ва хусусиятлари асосида мутахассислар ва сабзавоткор дехконларга қуйидаги вазифалари юкланади:

- Пахтакорлик, галлакорлик, ва бошқа тармоқларга ҳамда табиат муҳофазасига зарар етказмаган ҳолда экин майдонларидан 1,5-2 марта, оралик ва зичловчи экинлар жойлаштиришни ҳисобиға 3 мартагача ҳосил олиш.
- Олмашлаб экишларни тугри ташкил қилиш, тупрок унумдорлигини ошириш, уғитлар, кимёвий дорилар ва сувлардан илмий асосларда оқилона фойдаланиш.
- Бозор талабига жавоб берадиган маҳсулотлар етиштиришга молик серҳосил, ҳаридоргир, яхши сақланувчан, транспортбоп навлар яратиш ва қуллаш;
- Қам тарқалаган ва республика учун янги турларини урганиш билан маҳсулотлар ҳилини турини кенгайтириш.
- Уруғчиликда қадимдан синалган ва илмий асосланган тартибда наводор ва ҳосилдор уруғлар етиштириш;
- Илм-фан ва илгор тажриба ютуқларидан кенг фойдаланиш.

1.4. Сабавотчиликнинг узиға ҳос тарихи ҳам мавжуд. Марказий Осиёда шу жумладан Ўзбекистонда пиёз, сабзи, шолғом, турп, қалампир, бодринг, жамбил, шеролчин, райхон, исмалок қабилар 3-4 асрдан полиз экинлари, айника қовун эса эрамиздан олдинок аҳолининг қундалиқ эҳтиёжини қондириш учун ҳовли, томорқа ва маҳсус майдонларда етиштирганлар. Кейинчалиқ аҳоли зичлашиб бораётган шаҳарлар, вилоят ва саноат марказлари вужудға қела бошлашлари билан улар атрофида сабзавоткорлик ҳам ривожлана борган. Ҳавасқор ва миришқор сабзавоткорлар ҳар қайси минтақа иқлим-шароитига мос агротехника ва ҳатто навларни ҳам яратганлар. Натижада, сабзавот ва полиз усимлиқларининг ҳалқ селекцияси яратган ҳозиргача тенги йуқ маҳаллий навлари вужудға қелган. Бундай қадимдан сабзавоткорлик марказларига айланиб узининг “Марғилон тухум пиёзи”, “Марғилон турпи”, “Марғилон бодринги”, “Андижон оқ думалок пиёзи”, “Наманган қалампир”, “Самарқанд қизил пиёзи”, “Самарқанд қизил шолғоми” қабил маҳаллий номли сабзавотлар ва узиға ҳос агротехникаси мавжуд жойларини ва бошқа қуп номларни қелтириш мумкин.

Марказий Осиёда жумладан Ўзбекистонда сабзавот турларининг кенгайиши: картошқа, памидор, қарам, қучуқ қалампир, баклажон, қуқ нуҳат, редиска, шовул қабиларнинг етиштира бошланишлари 19 асрнинг иккинчи ярмида ҳориждан, айника Россиядан турли миллатлар элатлар вакиллариинг мамлакатимизға қучиб қелиши билан боглик булди. Шу боис қадимги тор доирадаги Тошқент яқинида

“Болгар дехкончилиги” ва “Нугай кургон” номли даҳалар вужудга келади ва бу жойлардаги дехконлар янги сабзавотлар ва картошка етиштириш агротехникасини тезда урганиб, бозорларни обод кила бошлайдилар. Уларнинг тажрибалари бошқа вилоят ва туманларга ҳам кенг ёйилди.

1.5.Ўзбекистон сабзавотчилигининг ривожланишида унинг илмий асослари ҳам юксалиб борди. Ушбу тармоққа оид дастлабки илмий тадқиқот ишлари собиқ Туркистон кишлок хужалик станциясида (ҳозирги Р.Р.Шредер номидаги Ўзбекистон богдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-текшириш институти) бошланиб, кейинчалик 1933 йилда Ўзбекистон сабзавот-картошқачилик тажриба станцияси ташкил этилади, сунгра у 1961 йилда ҳозирги Ўзбекистон сабзавот-полиз экинлари ва картошқачилик илмий-текшириш институтига айлантирилади. Марказий Осиёда биринчи 1930 йилда ташкил топган Тошкент кишлок хужалик институти, унинг Усим-ликшунослик кафедрасидан 1946 йилда мустақил Сабзавотчилик кафедраси вужудга келди ва бунда факат агрономларгина эмас профессор Н.Н.Балашев, В.И.Зуевлар раҳбарлигида куплаб илмий-ҳодимлар, фан номзодлари ва докторлари тайёрланмоқда.

Ҳозирги даврда сабзавотчилик, полизчилик ва картошқачи-ликни ривожлантиришга оид илмий-текшириш ишлари Ўзбекистон сабзавот-полиз ва картошқачилик буйича илмий текшириш институти, Тошкент Давлат аграр университетидаги Сабзавотчилик, полизчилик, Самарканд к/х институтида мева-сабзавотчилик кафедраларида олиб борилмоқда.

Сабзавоткорликда илм-фан ютуқлари ва илгор тажрибалардан тугри фойдаланган хужаликлар жуда юкори натижаларга эриш-моқдалар. Масалан, Тошкент яқинидаги Занги Ота туманидаги “корасув”, А.Навои, “Ўзбекистон” каби жамоа хужаликлари жуда барвақт сабзавот маҳсулотлари етиштириш, бир йилда, бир майдон-дан 1.5-2 марта ҳосил кутариш орқали гектаридан 40-65 тоннагача помидор, қарам, сабзи, пиёз қабилардан рекорд ҳосил олмоқдалар. Тезпишар қукат сабзавотларни зичловчи ва оралик экинлар ҳолида экиб бозор иқтисодиёти асосида ривожланишдан тугри фойдаланиб сабзавоткорлар йил давомида юкори даромадларга эришмоқдалар.

Миришкор ва тадбиркор сабзавоткор пул қиримиға ойда ёки йилдагина эмас, балки қунда эға булиши мумкин .

Саволлар;

1. “Сабзовотчиликни” нечта тури мавжуду
2. инсоният ҳаётида сабзовотни урниу
3. сабзовотлар таркибида қандай элемент, витаминлар купу
4. Урта ёшдаги инсон сутка мобайнида неча мг, “С”, “А” ва “РР” витаминлардан истеъмол килиши кераку.
5. Кайси сабзавот таркибида витамин “А” энг купу.
6. Урта ёшдаги инсон сутка мобайнида неча г, сабзавот истеъмол килиши кераку.
7. Сабзовотни инсон организмидаги урни нимау
8. Ахоли жон бошига талаб килинадиган сабзовот миқдорини айтингу
9. Сабзовотчилик тарихи ҳақида нималарни биласизу
10. Ўзбекистонда 2000 йилда неча минг тонна сабзавот етиштириладиу.

15-Маъруза: САБЗАВОТ УСИМЛИКЛАРИНИ БИОЛОГИК АСОСЛАРИ

Режа;

1. Сабзавот усимликларини классификацияларга булиниши.
2. Ташки мухит омилларига тавсиф.
3. Сабзавотларни иссиқлик, ёруғлик, намлик муносабатига кура гурухлаш.
4. Тупрок - ҳаво озикасига муносабати.
5. Сабзовотчиликда агротехник тадбирлар.

Адабиётлар: 1, 4, 8, 17.

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: классификация, тасниф, гурухланиш, минтака, ташки, мухит, омил, режим, минерал озукалар, газли мухит, уруг буртиши, ҳарорат, эмбрионлик, индивид, чинбарг, тукима, хужайра, моддалар алмашинуви, озикланиши.

1.1. Табиатда сабзавот усимликларнинг 1200 дан ортиқ тури мавжуд булиб, улар қуйидаги уч катта классификацияга булинади:

1. *Ботаник белгиларига кура таснифи.*
2. *Истеъмол килинадиган органларига кура таснифи.*
3. *Сабзавотларни етиштириш агротехникаларининг ушашлигига кура гурухланиши.*

Сабзавотлар экологик шароитлари узига хос булган 12-та минтакадан келиб чиккандир. Уларнинг ҳар бири кайси минтакадан келиб чиккан булса, ҳозир ҳам уша минтака иқлим шароитини талаб этадилар.

Сабзавотлар биологик асосини уларнинг иссиқлик, ёруғлик, тупроқ, ва ҳаво намлиги ҳамда тупроқ-ҳаво озикасига бўлган муносабатлари ташкил этади.

1.2.Ташки муҳит омиллари тафсили. Сабзавот экинларининг усиши ва ривожланиши, маҳсулотнинг миқдори, сифати ва етилиш муддати, уларнинг иқлимга ва тупроқ шароитига мослашишлари ирсий қобилиятларига боғлиқ. Ҳар қандай юкори ҳосил олиш усимлик биологияси ва ташки муҳит шароитининг диалектик бирлигига ҳамда етиштириш усулларига боғлиқлигига асосланади. Технологиянинг у ёки бу усуллари қуллаш билан ташки муҳитни усимликлар талабига мослаштириш мумкин. Ташки муҳит қанчалик мазкур экин талабига яқинлаштирилса, шунчалик унинг ҳосилдорлиги ва маҳсулот сифати ортади ва аксинча, ташки муҳит комплекси усимлик талабидан узоклашган сари ҳосил ва унинг сифати пасая боради. Ёруғлик, иссиқлик, нам, газли режим ва минерал озиклар усимлик ҳаёт фаолиятини белгиловчи, тенги йук, ҳаммаси ҳам зарурий омиллардир. Улардан бири иккинчисини урнини боса олмайди ва узаро доимо муайян нисбатда бўлиши лозим.

1.3.Ҳарорат тартиби. Усимликнинг усиш ва ривожланиш жараёнлари маълум бир ҳарорат шароитида утади. Барча жараёнлар жадаллик билан кечадиган энг мақбул ҳароратни қулай ҳарорат дейилади. Усимлик бундай ҳароратдан маҳрум бўлса, унинг туқималарида модда алмашилиш жараёни бузилади, натижада у касалланади, нобуд бўлади. Сабзавот экинларининг ҳароратга бўлган талаби усиш ва ривожланишнинг турли даврларида ҳар хилдир. Барча сабзавот экинлари уруғларининг қуқариб чиқши (униши) учун аввало юкори ҳарорат зарур. Юкори ҳарорат таъсирида уруғ тез буртади ва қобик ёриб чиқиш жараёни жадаллашади. Уруғқуқариб чиқши биланок ҳарорат анчагина пасайтирилиши лозим. Сабзавот экинлари ривожланишининг кейинги фазалари, айника, усимлик гуллаш ва мевалаш даврида ҳарорат юкориланиши зарур. Чунки бу даврда гулда қанглари шаклланиб, етилаётган бўлади

Сабзавот экинларининг ҳароратга талабчанлиги турлича бўлиб, уларни асосан икки гуруҳга бўлиш мумкин:

1.Салқин талаб икки йиллик усимликлар (қарамнинг барча турлари, пиёз ва илғизмеваларнинг ҳаммаси, шунингдек нухат, бир йиллик қуқатлар) ҳамда совуққа қидамли қуқ йиллик усимликлар (шовул, ровоч, қарсабил, ҳрен, пиёзлар). Бу

экинларнинг уруги 8-10⁰ дан паст хароратга униб чика бошлайди: 18-20⁰ га эса янада тезроқ унади. Совукка чигамли экинлар давомли -1-2⁰ га, киска мугдатли 3-5⁰ га, баъзан -7-8⁰ га чигайди. Бу экинларнинг нормал усиши ва ривожланиши учун харорат 18-20⁰ булиши керак. Харорат 30-32⁰ га кутарилиб кетса, уларнинг усиши тухтайди.

2.Иссикка талабчан (помидор, калампир, баклажон, бодринг, ковокча) хамда жазирама иссикка бардошли бу экинларнинг уруги 12-15⁰ га униб чика бошлайди, бироқ харорат 25-30⁰ булганда майсалаш тезлашади. Экинлар киска мугдатли совукка хам бардош бера олмайди. Улар учун харорат 25-30⁰ экинларнинг усиши ва ривожланиши 15⁰ дан пасайганда ёки 40⁰ дан юкори булганда тухтайди. Хароратнинг 3-5⁰ га пасайиши усимликнинг нобуд булишига олиб келади.

Салкин талаб, совукка, кишга бардошли сабзавот усимликларнинг гулпоялашга, гуллашга киришишлари учун 3-5⁰ ли ижобий паст (10⁰ дан юкорилашмаган) харорат узок мугдат 10-15, баъзиларига 1-2 ой давомида таъсир этиши лозим. Бундай шароит кузда учрайди, шунга кура 1 гурух усимликларининг купчилиги келгуси йилида гуллаб уруглайди. Бироқ, баъзан совук-салкин бахорнинг узок давом этишида икки йилликларнинг айрим “Киска стадияли” навлари биринчи йилидаёк гуллайди. Бундайларни “эркаклаш” - беъмовут гуллаш дейилади. (Карамнинг тезпишар, сабзининг сарик этли навларида купрок учрайди).

1.4.Ёруглик тартиби. Ёруглик усимликларда фотосинтез жараёни моддалар алмашиниши ва органик моддалар тупланиши учун энергия манбаидир. Мамлакатимизнинг турли районларига куёш нури турлича тушади. Бу борада шимолий районларни жанубий районларга тенглаштириб булмайди, албатта. Шунингдек, ёз пайти билан киш вакти, туш пайти билан кечкурун, ёки эрталаб билан кечаси бир-бирига ухшамайди. Бундай узгарувчанликларга сабзавот усимликлари табиатан мослашган, мослашган турлари ва навларини агротехник тадбирлар куллаш билан келиштирилади.

Сабзавот экинларининг ёругликка талабчанлигига кура куйидаги гурухларга булинади: ута ёругсевар 30 минг люкс - ковун, ошковок, калампир, баклажон, помидор, бодринг, маккажухори, ловия, нухат; уртача ёругсевар 20 минг люкс - саримсок, пиёз, илдизмевалилар, карам; кам талабчанлари - баргли сабзавот экинлари (салат, исмалок, петрушка);

сопарварлари-кук пиёз, петрушка, сельдрей, шовул, ровоч - бу экинлар ер ости илдимеваларнинг туплаган захира озик моддалари хисобига озгина ёругликда ҳам барг чиқараверади. Сабзавот экинлари куннинг узун ёки қисқалигига талаби бўйича 3 гуруҳга бўлинади: 1. узун кун усимликлари - қарам, брюква, шолгом, редиска, турп, сабзи, лавлагининг шимолий навлари, петрушка, пиёз, салат, исмалок, укроп, нухат ва бошқалар; 2. қисқа кун усимликлари - лавиянинг қуплаб жанубий навлари, нухат, лавлаги, бодринг, помидор, тарвуз, қовун, ошқовок, баклажон, маккажухори; 3. куннинг узунлигига лоқайд (ёки бетараф) усимликлар мамлакатимизнинг муътадил иқлими минтақаларидаги бодринг, помидор, нухат, лавия ва қопиз экинларининг баъзи навлари қиради.

Тупрок ва ҳаводан озикланишга талаблар. Сабзавот экинлари тупроқдан макро озикалардан қуп миқдорда қалийли, сунгра азотни ва қамрок фосфорни олади. Бу ҳол қалий уғитини қупрок қуллаш деган суз эмас, чунки республиқамиз республиқамиз тупроқларида қалий қуп бўлиб, экинлар аввало азот ва фосфорли уғитларни талаб қилади. Сабзавот усимликларининг илдилари, айниқа ёшлигида фосфорни қийин узлаштиради. Шунга қура бу озикани илдилчаларга яқинлаштириб бериш самаралидир. Сабзавот экинларининг тупрок унумдорлигига талаби озикаларни узлаштириш миқдориға, илдилар ривожига, вақт бирлигида суриш қобилиятиға боғлиқ. Одатда усув даври қисқа, тезпишар, илдилари қучсиз, саёз жойлашган усимликлар (қукатлар, бодринг, пиёз қабилар) усув даври давоми узун, қечпишар, ердан қуп миқдорда озика оладиган сабзавот (қарам, помидор, қовун, тарвуз қабилар) ларга нисбатан қупрок унумдор тупроқни талаб қилади. Улар вақт бирлигида қупрок озика суради. Шу боисдан тупроқнинг ҳайдов қатлами қупрок унумдор бўлишини хоҳлайди. Усимликлар озик моддаларни бутун усув даври давомида қуллаш ав мевалашда айниқа қупрок оладилар. Шунга қура қушимча озикалашлар лозим бўлади.

Сабзавот экинлари енгил, говақлашган қумок, узлаштирилган гидроморф ва шурланмаган унумдор ерларда яхши битади. Шурланиши (хлор иониға қура) 0,03% ли ерларда лавлаги қуза бошқоқли экинлар яхши битганда, сабзавотлар 0,02% ли шурланишда қийналади. Шурга бардошлироқлар - 0,015-0,02% да қоникарли ҳосил берувчилар ош лавлаги, исмалок, помидор, қарам, қопизлардир. Сабзавот усимликлари

хаводан нафас олиш учун оксигенни (O_2), озикланиш (фотосинтез) учун карбонат ангидридни (CO_2) олади. Хаводаги CO_2 нинг табиий миқдори - 0,03% усимликларни захарлайди. Усимликлар атрофида карбонат ангидридини миқдорини ерга органик угитлар солишлар билан оширилади. Чириндилар кам майдонларда органик угитлар куллаш лозимдир.

1.5.Сув тартиби: Сув усимлик тукималарининг таркибий кисмидир. Сабзавот усимликлари таркибининг 75-85%, махсулот кисмининг эса 65-97% ини сув ташкил килади.

Сувга булган талабчанлик усимликнинг морфологик ва тупрокнинг узига хос биологик хусусиятлари сабзавот экинлари учун тупрокнинг макбул намлик даражаси 70-85% ТДНС (тула дала нам сигими) ва хавонинг нисбий намлиги 50-90%. Сув етишмаслиги окибатида фотосинтез ва узиш жараёнлари секинлашади, нафас, олиш кучаяди, усимлик тез карийди, хосилдорлик кескин камаяди, сифати ҳам ёмонлашади. Сабзавотлар тупрок намгарчилигига муносабати буйича куйидаги гурухларга булинади: жуда нам талаб карамнинг хамма турлари, бодринг, редиска, турп шолгом, баклажон; нам талабчан сабзи, петрушка, помидор, каламбир; намсизликка чидамли тарвуз, ковун, ошковок, маккажухори, ловия.

Сабзавот экинлари хавонинг нисбий намига хам талаби бир хилда эмас. Бодринг, пиёз, карамнинг бир канча турлари ва баъзи бир баргли сабзавотлар учун хавонинг макбул нисбий намлиги 80-96%, сабзи, лавлаги, помидор, баклажон, булгор калампири ловия учун 60-80, шунингдек, полиз экинлари учун 50-60% булиши кулай

Саволлар:

1. Сабзавотларни совукбардош беришига сабаб нимау
2. Нима учун сабзавотлар иссикка талабчану
3. Сабзавотларни намликка ута талабчанлигини сабабиу
4. Сабзавотларни кургокчиликка чидамлиги нимага боғлику
5. Узун кун талаб экинларга кайси сабзавотлар кирадиу
6. Нима учун картошка усимлигини иссикка ярим талабчан деб юритиладиу
7. Сабзавотларни ташкил омилларга талабчанлигини айтингу
8. Хароратни урни нимадау
9. Ёрутсевар сабзавотлар кайсилару
10. Сабзавотларнинг тупроқдан узлаштирадиган азот, фосфор ва калий моддаларига талаблари кандайу

16-Маъруза: ХИМОЯЛАНГАН ЕР ИНШООТЛАРИНИНГ ВАЗИФАСИ, ХУСУСИЯТЛАРИ ТУРЛАРИ ВА ТУЗИЛИШИ.

Режа:

1. Химояланган ер сабавотчилигининг ахамияти, вазифаси.
2. Химояланган хусусиятлари ва тарихи хозирги ахволи.
3. Илитилган ерлар, парниклар ва иссиқхоналарнинг вазифаси.
4. Химояланган ер турлари ва тузилиши.
5. Замонавий иссиқхоналарни барпо этишда фойдаланиладиган қурилиш ускуналари ва жихозлари

Адабиётлар: 4, 8, 15.

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: химояланган ер иншооти, микроиклим, очик майдон, иссиқхона, парник, цитрус мевалар, соғлиқни сақлаш, муассасалари, иситилган ер, кучатхона, чодирсимон синч, нишаблик, ёйсимон синч, теплица, кучма парник, ром, кесаки, иситиш мосламалар, стандарт катаklar, қурилиш майдони, инвентар майдони, ҳайдаш майдони.

1.1. Химояланган ер сабавотчилигининг ахамияти, вазифалари ва хусусиятлари. Усимликларни мавсумдан ташқари муддатларда етиштириш учун сунъий равишда микроиклим шароити ҳосил қилиш ёки табиий микроиклим шароитини яхшилаш мақсадида қурилган иншоотлар, мосламалар химояланган ер иншоотлари деб юритилади. Химоя қилинган жой сабавотчилиги кишлок ҳужалигининг тармоқларидан бири ҳисобланган, шунингдек сабавотчиликни бир бўлими ҳисобланади. Сабавотларни Химоя қилинган жойларда етиштириш – Химоя қилинган жой сабавотчилиги деб аталади. Химоя қилинган жой сабавотчилигининг вазифаси қуйидаги асосий масалаларни ҳал этишга қаратилган бўлиб булар:

1. Аҳолини сабавотларга бўлган талабини мавсумдан ташқари вақтларда қондириш.
2. Очик майдонларда сабавотларни етиштириш учун кучат етказиб бериш.
3. Очик майдонларда етиштирилаётган сабавотларни усув даврларини давом эттириш ҳисобида етилмай қолган сабавотларни етилтириш.

1.2. Ушбу тармоқ сабавотчилиги узига хос хусусиятларга эга: усимликларни етиштириш учун мақбул шароит яратиб берадиган махсус мослама ва ускуналар мавжудлиги; унча катта бўлмаган майдонларда иншоотларни ихчам жойланиши; экин майдон-ларидан юқори самара билан фойдаланиш; юқори ҳосилдорлик; қул меҳнати сарфининг юқори механизация ва

автоматлашган ишлаб чиқариш жараёнлари билан алмаштириш; сабзаётлар етиштиришни юқори технологияси ва махсус навлардан фойдаланиш; меҳнатни ташкил этишнинг алоҳида шакллари ва ишчиларнинг юқори малакаси; куп моддий харажатлар ҳисобига махсулот таннарни юқорилиги.

Химоякилинган ер сабзаётчилигини қисқача тарихи, ҳозирги аҳоли ва ривожланиш истикболлари. Ўзбекистонда Химоя килинган жой майдонини кенгайтириш 60-йиллар охирига тугри келади. 1965 йили Республикамизда бор йути 3,7 га ойнаванд иссиқхона ва 24,4 га парник булиб, ушбу курсаткич 1970 йилга келиб иссиқхона майдони 66,6 га ни , парниклар 56,7 га ни ҳамда вақтинчалик пленкали ёйсимон қурилмалар 351 га ни ташкил этди. Кейинчалик иссиқхоналар ва пленкали ёйсимон қурилмаларнинг майдонлари ортиб борди, 1980 йилга келиб ойнаванд иссиқхоналар майдони 184 га ни ва пленкали ёйсимон қурилмалар 1068 га ни ташкил қилиб, парниклар эса қисқарди. Ҳозирги кунга келиб Рес-публикада 600 га, дан ортиқ ойнаванд ва пленкали иссиқхоналарда сабзаёт ва цитрус мевалар етиштирилмоқда. Ушбу майдоннинг қарийиб 558 га ижара усулида ишламоқда.

1980 йилда Ўзбекистонда аҳолини ҳар бир жон бошига химояланган ерда етиштирилган сабзаётдан 2,8 кг махсулот тугри келган, лекин бу курсаткич аҳоли талабини қондирмайди. Соғлиқни сақлаш муассасалари томонидан берилган тавсияга қура мавсумдан ташқари муддатда истеъмол қилинадиган сабзаёт Республика аҳолисига 7.6 кг булиши керак, шундан 4,1 кг помидор, 3,3 кг бодринг ва 0,2 кг қуқат сабзаётларига тугри қилиши керак.

Иситилган ер, уларнинг турлари ва тузилиши. Химоякилинган жой иншоотлари турли туман булиб, тузилишининг мураккаб-лиги ва усимликлар учун қулай шароит яратиш усулларига қараб улар иситилган ер ва мураккаб тузилишга эга булган иссиқхоналар, парникларга булинади. Ушбу икки гуруҳ иншоотларининг тугроги турли усулларда (қуёш, биологик ва техник) иситилиши, таянч конструкцияларининг ҳилига қараб синқли ва синқсиз, усти қопланадиган материалга қараб ойнали, пленкали ҳам стеклопластик булиши мумкин.

1.3.Иситилган ер мураккаб иншоотларда ерга ён тусиксиз урнатилиши билан ажралиб туради. Усти ер юзасидан унча баланд булмаганлиги туфайли усимликларга ишлов бериш даврида пленкалар очиб қуилади. Химоякилинган жой

иншоотлари нисбий хажми буйича бир-биридан фаркланиб (иншоотни ташки майдонини инвентар майдонга нисбатан), ушбу курсаткич иситилган ерларда 0,3 парникларда 0.3-0.5 ва иссикхоналар -1 дан 6 гача булади. Иситилган ер эрта куклам ойларида эртаги сабзавотлардан 10-25 кун барвакт махсулот олиш учун фойдаланилади. Шунингдек бу турдаги иншоотлар куз ойларида усимликларни совукдан саклаш мақсадида ҳам кулланилади.

Мазкур иншоот иситиладиган ва иситилмайдиган хилларга бўлинади. Иситилган ерларни усти пленкали копламалар билан беркитилган, иситилмайдиганлари эса химояланган ҳамда усти химоясиз булиши ҳам мумкин. Бу иншоотларни иккаласи ҳам якка ва бир неча гуруҳ усимликларини химоялаш мумкин. Иситилган ер биологик (буг чуқурлари, уюмлар, бутланадиган пушта ва жуяклар, иссик кучатхоналар) ва техник усулда иситиладиган майдончалар. Маркасий Осиёда бутланган жуяклар ва иссик кучатхоналар таркалагандир. Буг жуяклар калинлиги 20-25 см келадиган ерни остига 30-35 см калинликда кизиган гунг солиниб тайёрланади ва усти ёруглик утказувчан материаллар билан копланади.

Иссик кучатхоналар 45-50 см калинликда биологик ёнилги солиб тайёрланади, уларни эни 1,5-2 метр улчамда булиб, 12-15 см калинликда тупрок аралашмаси тушалган булади. Сабзавотчиликда иситилмайдиган ер турларидан совук кучатхоналар ва кичик хажмдаги ёйсимон плёнкали курилмалардан кенг фойдаланилади.

Совук кучатхоналарни тузилиши иссик кучатхоналарникига ухшаш булиб, факатгина чуқурлар юзарок жойлашади, ҳамда биологик ёнилгисиз усимлик устирилади. Кичик хажмдаги пленкали курилмалар синчли ҳамда синчсиз тузилган булади. Уларнинг синчлари ярим ёйсимон ва чодирсимон шаклда булади. Усимликларни синчсиз копламалар остида етиштирилганда махсус мосламалар ёрдамида пушталар 25-30 см баландликка кутарилиб, улар синч вазифасини бажаради. Кучат утказиш ва уругсепиш билан бирга бу иншоотларни усти пленка билан копланади, уларни четларига тупрок бостирилиб чикилади.

1.4. Чодирсимон синчлар нишаби икки томонлама булади. Улар 3х3,5х5 см тусин-брусдан стропел таянчларидан тузилган. Таянч-ларни тупрок юзасига жойлаб устидан тусин тортилади. Синчларнинг тепасига пленка ёпилади, уларнинг чеккаларига тупрок тортилади ёки ёғоч бабиналарга маҳкамланади.

Ёйсимон синчлар диаметри 4-6 мм ва узунлиги 1,5-2 метр симлардан ёки дарахтни эгулувчан майда шохларидан ясалади. Ёйлар бир-биридан 2-3 м узокликда жойланиб, улар 15-20 см чуқурликка кадалади. Ёйлар бир-бирлари билан каноппи билан боғланади, каноппларни ёй узунлиги бўйлаб 1-3 қатор утказилади. Синчларнинг тепасига эни 140-200 см бўлган пленка тортилади. Уларнинг устидан ҳар 3-4 метр оралиқда кичик ёйлар билан маҳкамланиб чиқилади. Пленкаларнинг четлари тупроқ билан беркитилиб, улар ҳар икки охириги томонларида қозикчаларга маҳкамланади.

Ёйсимон тиргакли қурилмаларни тузишда ҳар гектар ҳисобига 800-1000 кг пленка, 6-7 минг дона ёй, 250-300 дона қозикча ва 20-25 кг каноппи талаб этилади. Парникларнинг турлари ва уларнинг тузилиши. Парниклар - усимлик устирадиган кичик улчамдаги чуқурчалардан иборат бўлиб, тупроғи билан ром орасидаги масофа ҳам бўлганлиги учун, уларга ташқаридан туриб ишлов берилиб, парвариш ишлари фақат ташқи қулай ҳароратларда утказилади. Ушбу иншоотлар иситилган ерлардан фаркланиб, доимий ёки қучма ён тусиклари паст (25 см гача), қопқоғи осонгина олиб қўйиладиган ёруғлик утказувчи материаллардан қилинади.

Парниклар турлари бир-биридан қурилиш хусусиятларига қура фаркланади, улар қўйидагилар; нишабларининг сонига қура (бир ва икки нишабли) парникларнинг ер сатҳи бўйича жойлашишига қура (чуқур ва юза парниклар) фойдаланишдан доимийлик бўйича (қучириладиган) ва доимий (мустваҳкам урнатилган), усти ёпиш. материалларига қура (ойнали ва пленкали) ёпиш материалларини бириктириш усулига қура (ёппасига ёки ромли), иситиш усулига қура (қуёш ёрдамида, биологик ёнилғи ҳамда техник усулда), ишлатиш муддатига қура (эртанги ёки иссиқ, уртаги ёки илитилган ҳамда кечки ёки совуқ парниклар).

1.5. Энг қўп фойдаланиладиган парник турлари бир нишабли чуқурчали, ойна ромлари билан беркитиладиган парниклар бўлиб, бу турдаги иншоотлар иситиш усулига қура биологик, сувли ва электр ёрдамида тупроғи қизитилади. Бир қанча минтақаларда бир нишабли чуқур парниклар билан бирга биологик усулда иситиладиган қучма (париж) ва доимий (архангелский) парникларидан ҳам фойдаланилади. Шунингдек биологик йўл билан иситиладиган нишабли икки томонлама Бельгия туридаги парник ҳам ишлатилмоқда. Ҳозирда бир нишабли ойнали чуқур парниклар йиғиб қучириладиган

плёнкали курилмалар (УРП-20) билан алмаштирилмоқда. Нишаби бир томонлама чуқур парникларнинг асосий курилиш ускуналари, ром, кесаки, чуқур ва иситиш мосламасидан иборат. Биологик усулда иситилганда биологик ёнилги ишлатилади, парник чуқури хар йили тозаланиб янги биологик ёнилги билан тулдириб турилади. Техник усулда иситилганда парниклар курилишидаёк жойланадиган иситиш мосламаси ва уни ковшарловчи материаллар ишлатилади. Нишаби бир томонлама чуқур парниклар учун ромининг стандарт катталиги 160x106 см дир.

Парниклардаги бошка улчамдаги ромлардан ҳам фойдаланилади. Баъзан Марказий Осиёда катталиги 213x107 см ромлар, Болтик буйи мамлакатларида эса 150x80 см ли, катталиги 141x75 см келадиган яхлит ойнали ромлар ишлатилади. Нишаби бир томонлама чуқур парникларнинг кесакиси ёгочдан, гишт, бетон, ва бошка материаллардан ясалиши мумкин. Кесаки ва чуқурнинг буйи ва кенлиги фойдаланиладиган ромлар катталиги ва уларнинг сонига караб аникланади. Чуқурчанинг пастки сатхи иситиладиган курилманинг турига, биологик ёкилгида иситилганда эса ишлатиш даврига ҳам боғлиқ булади (эртанги экин парникларида у чуқуррок, кечки парникларда эса юзарок булади). Нишаби бир томонлама парниклар одатда гарбдан шарк томонга каратиб курилади. Ромлар 5-7⁰ нишаброк булиши учун кесакининг шимол томони бир мунча баландроқ килинади.

1.6. Иссиқхоналарнинг вазифаси, турлари ва уларнинг тузилши. Иссиқхоналар - экин устириладиган иншоотларнинг энг мураккаб тузилишига эга булган тури булиб, замонавий воситалар ёрдамида усимликлар учун кулай шароитлар яратилади.

Иссиқхоналарнинг тузилишида бошка иншоотлардан узига хос фаркли томонлари булиб, уларда ер билан том орасидаги масофа катта булади. Иссиқхоналарнинг парниклардан асосий фарқи шундай, бундай мураккаб тузилишга эга булган иншоотларда машина ва механизмлардан фойдаланиш, ишловчилар хар кандай нокулай иқлим шароитида ҳам ишни ичкарида туриб давом эттиришлари мумкин. Иссиқхоналарнинг асосий вазифаси мавсумдан ташкари муддатларда махсулот етиштириш ва кучат тайёрлашдан иборат. Иссиқхоналар-замонавий курилган истикболли иншоотлар булиб меҳнат унумдорлиги юкорилиги хисобига куп махсулот етиштирилади.

Фойдаланиш ва курилиш белгиларига караб сабзавот, кучат ҳамда кучат ва сабзавот етиштирадиган фойдаланиш муддатлари буйича йил давомида ва бахорги-ёзги мавсумда фойдаланадиган иссиқхоналарга бўлинади. Майдондан фойдаланиш усулига кура, тупроки ва сукчакли (стелажли булади). Усимликларни жойлаш-тириш усулига кура бир ярусли ва куп ярусли булади. Режа-лаштириш буйича бир ва куп звеноли булади. Илдиз оркали озиклантириш буйича тупрок, кичик хажмда гидропоникали булади. Иситиш усулига кура-куёш ёрдамида, биологик ёнилги ва техник усулда иситилади. Усти ёпиш материални турига кура ойнали, пленкали, стеклопластли. Томини шаклига кура бир ёки икки нишабли, ярим ёйсимон ёки соябонсимон булади. Фойдаланиш кетма-кетлиги буйича бир жойда доимий ишлатиладиган ҳам бир жойдан бошқа жойга кучириладиган иссиқхоналарга бўлинади. Синчини мавжудлигига кура ойнаванд иссиқхоналар хаамиша синчли синч вазифасини хаво бажарувчи иссиқхоналар булади.

1. Курилиш майдон; 2. Инвентар майдон; 3. Фойдали майдон.

Курилиш билан банд буладиган майдонга иссиқхоналарнинг ташки улчами буйича эгаллаган майдон киради. Инвентар майдон эса иссиқхонанинг ички томондан чуқурлиги ва эни киради. Фойдали майдон эса-бевосита экин устиришда банд булган майдон киради. Йулаклар, шунингдек ускуналари билан банд этилган майдон фойдали майдонга кирмайди. Иссиқхоналарнинг майдонидан фойдаланиш коэффиценти деганда-фойдали майдонни инвентар майдонга нисбатини тушунамиз. Ушбу коэффицент сукчакли, яъни стелажли иссиқхоналарда 0,6 ни, ерли иссиқхоналарда 0,8 ни ташкил этади. Иссиқхоналарнинг тусик коэффиценти -хамма тусиладиган кисмлар сатхини инвентар майдонга нисбати тушуни-лади. Бу коэффицент иссиқхонани майдонига боглик холдадир. Бу коэффицент 1 звенолида 1,5-1,7 блоклида 1,2-1,4 булади.

Саволлар:

1. Химоякилинган ер сабзавотчилигини ахамиятиу
2. Химояланган ер вазифалари нимадан иборату
3. Химоякилинган жой иншоотлари турларини курсатиб берингу
4. Парниклар кандай асосий кисмлардан тузилгану

5. Ишлаб чиқаришда куп қулланиладиган парник турларини биласизмиу
6. Ромларни стандарт размери канчау
7. Биологик ёкилги нимау
8. Иссикхоналарни замонавий турларини айтингу
9. Иссикхоналардан фойдаланиш коэффиценти нимау
10. Ишлаб чиқаришда куп қулланиладиган парник турларини биласизмиИссикхоналарнинг парниклардан фаркини айтиб берингу.

17-Маъруза: ОЧИК ЕР УЧУН КУЧАТ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ.

Режа:

1. Кучат етиштириш усули.
2. Кучат етиштиришнинг ахамияти.
3. Кучат етиштириш услублари.
4. Кучат етиштиришда микроиклим шароити ва уни созлаш.
5. Кучатларни химоялаш

Адабиётлар:8, 9, 10, 15, 19, 20.

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: химояланган жой, ёш нихол, майса, кучат, очик ер, эртачи, уртачи, кечки навлар, иссик парник, иситиладиган иссикхона, ярим иссик парник, аварияли иситиладиган иссикхона, туваксиз устириш, оптимол харорат.

1.1.Кучат етиштириш усули ва ахамияти. Кучат деб доимий узиш жойига кучириб утказишга мулжалланган, лекин хосил берувчи органлари хали шакланмаган ёш нихолга (майсага) айтилади. Уни иссиклик режими очик далага экиш имконини бергунга қадар Химоякилинган жойда устирилади.Кучат усули-бу усти-ришнинг махсус усули булиб, унда усимлик аввал махсус ажратил-ган жойда, сунгра далага ёки химояланган жойга экилади. Кучат килиб экиладиган усимлик очик ердаги сабавот экинларининг 60% дан ва химояланган жойда 90% дан купини ташкил қиладди. Кучат усули усув даври охирида катта озук майдони талаб қиладиган экинлар ва махсулотни эрта олиш зарур булганда махсадга мувофиқдир. Сабзавотларни кучатдан етиштириш, урутдан далага экил-ганга караганда бир канча афзалликларга эга. Кучат методи усим-лик хаётининг бошларида ерга булган эхтиёжини камайтиради. Кучат тайёрлашда майдон бирлигида куп миқдорда усимликларни устириб, усимликларни озук, намлик, иссиклик, ёруглик ва бошка омиллар билан яхшироқ таъминлаш, хали заиф нихолларни зарарку-нандалар,

касалликлар, бегона утлардан яхшироқ Химоякилиш, улар-га карши курашда меҳнат сарфини камайтириш мумкин. Кучат мето-дида уругсарфи доимий жойга экилгандагига кура 3-7 марта камади. Кучатлар 30-80 кун давомида етиштирилади. Сабзавотлар кучатдан экилиши хисобига, уругдан экилганларга нисбатан эрта пишади.

1.2.Ўзбекистонда кучат усулида усимликни устириш даврининг кискариши туфайли карамни бир жойга икки марта, памдорни тез пишар навларини эса такрор экиш имконини яратилади. Аммо кучат устириш иншоотларни куриш ва устиришга алоқадор меҳнат сарфини талаб килади. Таннархини юкорилигига карамай кучат усули иктисодий жихатдан узини оклайди, сабзавотчиликда кенг кулланилади. Сабзавотчиликда кучатдан устирилган усимликларни, кучатсиз усулда устирилган худди шундай усимликларга нисбатан узиш ва ривожланишда олдинга кетиш илгарилаш дейилади.

Сабзавот экинларини кучатлари устириш муддатига кура эртанги (бошли ва гул карам, эртанги памидор) уртаги (карам, бодринг, полиз экинлари, памидор, баклажон, гармдори) кечки (карам такрорий экин сифатида, помидорнинг тезпишар навлари) булади. Эртанги кучатлар иссик парник ва иситиладиган иссикхоналарда, урта кучатлар ярим иссик парник ва пленкали истилмайдиган ёки аварияли иситиладиган иссикхоналарда, кечкилар -очик ерда етиштирилади. Кучат устириш услублари. Кучат икки хил услубда етиштирилади: кучириб утказиб ёки кучириб утказмай устирилади. Кучириб утказишли устиришда уругкалин килиб сепилади ва тулик шакланган уругхакикий бир икки барги пайдо булгандан кейин усимлик озика майдони катта булган иншоот ерига озика кубик ёки тувакларга экилади. Бундай экиш ёш майсаларни кучириб утказиш пикировка (расад) килиш дейилади, ёш кучириб утказиладиган майса, уларни зич экиладиган жойи майсазор дейилади.

1.3.Кучат устиришнинг асосий усули 2 хил: тувакли ва туваксиз. Туваксиз устиришда уругларни экиш ёки пикировка килиш бевосита иншоот ерида амалга оширилади. Кучатни туваксиз устириш осон ва арзон. Аммо кучириб олишда илдизнинг куп кисми тупрокда колиб кетади ва бошка ерга экилганда у тутиш ва узишда кечилади. Кучат устиришда тупрок аралашмаларни таркиби ва сифати. Кучат устиришда тупрок сифатига катта аҳамият берилади. Унинг физик таркиби енгил, хаво, намлик утадиган рН нейтралга якин,

зараркунанда ва касалликлардан холи булиши керак. Тупрок таркибида 40 процент органик модда, 10-15% чиринди, зичлиги 0.8-1.0 г/см³, намлиги 70-75% говаклиги булиши керак. Озука моддаларининг миқдори 100 граммга якин азот 15-25, фосфор 20-30, калий 20-35 булиши керак. Тузларнинг умумий тупланиши 0.9-1.7%, хлор 0.0007% .

Ўзбекистонда кучат юкори сифатли чим тупрок, дала ер (40%) чиринди (40%), кипик, шоли шелухаси ёки кумдан (20%) иборат ерда устирилади. Сепиладиган уруглари олдиндан йирик ва урта фракцияга ажратилади, майдаси брак килинади (15-20% атрофида). Сунгра улар араркунанда ва замбурутспораларини улдириш учун киздирилади. Бу максатда сутка давомида 25-30 даражали хароратда яхшилаб курилган карам, бодринг, помидор уруглари 50-55° да 3-3,5 соат киздирилади. Агарда уруглари устида касалликлар кузгочилар ва зараркунандалар йук булса улар киздирилмай-ди, касалланишнинг олдини олиш учун улар рухсат этилган дорилар билан пуркалади аралаштирилади. Уруглари вирусли инфекцияга карши экишдан олдинги тайёргарликдан утказилади.

1.4.Кучат етиштиришда микроклим шароити ва уни созлаш. Кучат даврида иссикка талабчанлигига кура сабзавот экинлари уч гурухга ажратилади: совукка чидамли-кундузги оптимал харорат куёшли кунда 14-18 С, булутли кунда 12-16 С, кечаси 6-10 С.

1.5.Карамнинг барча турларининг иссикка талаби мутадилдир (кук пиёз, салат, сельдрей, лавлаги) куёшли кунда оптимал харорат 16-18 С, кечаси 12-24 С. Иссиксевар (помидор, бодринг, баклажон, полиз экинлари) помидор учун оптимал харорат куёшли кунда 20-24 С, булутли кунда 16-18 С, кечаси 10-12 С, гаримдори ва баклажон куёшли кунда 22-28 С, булутли кунда 18-20 С, кечаси 16-18 С, бодринг ва ковокдошлар кундузи -22-25 С, полиз экинлари учун 2-3 С пастрок. Кучат устириш учун курсатилган харорат режими доимий эмас. Кучат устириш жараёнида у узгариши мумкин. Масалан, экилгандан сунг нихолларни тез ва кийгос униб чикши учун биринчи, иккинчи гурух усимликлари ва помидор учун харорат 20-26 С атрофида, гармдори, баклажон ва ковокдошлар учун 25-30 С атрофида ушланади. Нихоллар пайдо булгач, улар тез усиб кетмаслиги учун харорат 6-10 градусга, карам учун 12-15° пасайтирилади, итузумдошлар ва ковокдошлар учун 15-17° даражасида 4-7 кун сакланади. Харорат шунингдек кучат экилишидан 10-15 кун олдин чиниктириш максатида совукка

чидамлилар учун 6-8⁰гача, иссик талабларга 12-14⁰гача, полиз экинлари учун 16-18⁰гача пасайтирилади. Экишдан бирнеча кун олдин коплама аввал кундуз кун, сунгра кечасига тулик олинади.

Кучат устиришда ёругликнинг яхши утиши учун коплама тоза холда булиши керак. Табиий ёритиш сифати ва интенсивлиги етарлидир, аммо баъзан кушимча ёритиш фойдалидир.

Саволлар:

1. Кучат етиштиришда кандай усуллари бору
2. Иссикхона нимау
3. Парник деганда нимани тушунасизу
4. Кандай усулларда сабзавот кучатлари етиштириладиу
5. Очик ерга кучат тай.рлашда энг куп куп кулланиладиган тупрок аралашмаларини таркибини курсатингу.
6. РН нимау
7. Уругуниб чикиш давридаги энг кулай микроиклим шароитларини курсатингу.
8. Кучатлар зараркунанда, касалликларга карши кандай ишланадиу
9. Кучатни кучириш нимау
10. Иссиксевар сабзавотлар кайсилару

18-Маъруза: ХИМОЯ КИЛИНГАН ЖОЙЛАРДА САБЗАВОТЛАРНИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ.

Режа:

1. Сабзавотлар етиштиришнинг умумий усуллари.
2. Кишки ойнаванд иссикхоналарда асосий сабавотларни етиштириш.
3. Бодринг етиштириш технологияси.
4. Помидор етиштириш технологияси.
5. Сабзавотларни иситилмайдиган пленкали иншоотларда етиштириш технологияси.

Адабиётлар : 8, 10, 11, 19, 20.

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: химояланган жой, ойнаванд, иссикхона, йигма мателл, конструкция, юкори унумдор, тупрок, дезинфекция, партено-карпик дурагайлар, усимликларни озикланиш майдони. Усишни тезлаштирувчи моддалари, вактинча плёнкаси копламалар.

1.1. Химояланган жойларда сабзавотларни етиштириш умумий усуллари. Республика ахолисини йил давомида янги сабзавот махсулотлари билан таъминлашда Химоякилинган

жойларнинг роли жуда катта. Охирги йилларда курилиш материалларини нархи кутарилиб йигма метал конструкцияларини келтирилиши анча кийин-лашганлиги химояланган жой майдонларини устига уз таъсирини курсатди. Шунга карамасдан 1998-2000 йиллардаги кишлок хужалигида иктисодий ислохатларни чуқурлаштириш дастурига биноан 558 га майдондаги иссиқхоналарни шахсий мулк килиб бериш кузда тутилган. Шу боисдан аҳолини мавсумдан ташқари даврларда янги сабзавотлар билан етарли миқдорда таъминлаш вазифаларидан бири ҳосилдорликни иложи борица ошириш масаласи қўйилган. Бунинг учун химояланган жойларда экиладиган нав ва дурагайларни тугри танлаш ва етиштириш технологияларини янада такомиллаштириш зарур.

Химояланган жойларда юқори ҳосил олиш асосий омиллари микроиклим шароитларини сунъий таъминлаш, ҳамда усимликларни илдиз орқали озиклантиришни тугри ташкил қилишдан иборат. Бу муаммоларни қўйидаги йўллар билан ҳал этиш мумкин.

- 1. Химоякилинган жойлар учун юқори унумдор, яхши уғитланган тупроқларни танлаш.*
- 2. Турли компонентлардан ташкил топган органик ва минерал уғитлар билан бойитилган озукали тупроқ аралашмаларни тайёрлаш.*
- 3. Тупроқ урнига органик моддалардан ташкил топган субстратлардан фойдаланиш (хемокултура).*
- 4. Усимликларни тупроксиз шароитда суюқ озукали эритмаларда етиштириш усуларини (гидропоника, айропоника, сувли экинлар, агрегатопоника) қўллаш.*

1.2. Ўзбекистон иссиқхоналарида сабзавотлар органик моддалар билан бойитилган табиий тупроқда етиштирилади. Бунда иссиқхона қурилишида табиий тупроқга гектарига 300-400 тонна гунг, ва бу ҳажмига нисбатан 20-30% олдиндан компостерланган говаклаштирувчи материаллар солинади. Келгусида ҳар 1 м кв. майдонга 20-25 кг дан гунг солиб турилади. Ҳар экиш мавсуми бошланишидан олдин тупроқни табиий ҳолда термик дезинфекция қилинади. Бу усул ёзнинг энг иссиқ даврида ҳайдаб қўйилган тупроқ усти икки ҳафта давомида пленка билан ёпилиб ҳамма тиркишлар ёпилади. Тупроқни кимёвий усулда ҳам дезинфекция қилинади, бунда ҳар 1 метр квадрат майдонга 2.5 л 40% ли формалин ва бошқа руҳсат этилган дорилар. Сувда эритиб сепилади, тупроқ усти

пленка билан 2 кун давомида копланиб турилади. Карбатионни экишга 25-30 кун колганда кулланилади ва ер хайдалгандан сунг тупрок яхшилаб ювилади.

Иссикхоналарни стерилизация килишда хоналарни хамма тиркишлари махкамлаб ёпилиб олтингутуртни ёкиб тутуни билан дудланади. (1 метр куб хажмдаги жойга 50-100 гр олтингутурт) ёки 1 процентли формалиннинг сувли эритмалари пуркалади.

Йил давомида фойдаланиладиган иссикхоналарни зарарсизлантириш ва профилактика килиш июл - августни биринчи яримигача томонланади. Иссикхоналарнинг куввати ва майдонидан унумли фойдаланиш учун хар ишлатиладиган мавсум учун экинларни навбатлаб жойлаштириш схемалари тузилади, уни экинларни айланиши деб номланади. Экинларни бир ёки бир неча маротаба бир ерда экиб айлантириш мумкин.

1.3.Узбекистоннинг кишки иссикхоналарида бодринг ва помидор асосан учта айланиш даврларида етиштирилади. Кузги-кишки (август ойидан, январ урталаригача), кишки-бахорги (январнинг биринчи иккинчи ярмидан - июл бошларигача) ва кузги-кишки-бахорги ёки утувчан (сентябр охири, октябр бошидан июл бошларигача) даврлар.

1. Кишки ойнаванд иссикхоналарда асосий сабзавотларни етиштириш.

2. Бодринг етиштириш технологияси.

Узбекистонда бодрингни асалари билан чангланадиган ҳамда партенокарпик нав ва дурагайлари етиштирилади. Республикада асосан асалари билан чангланадиган дурагайлاردан ТСХА-211, Навбахор, Сюрприз-60, партенокарпик дурагайлاردан Сентябрьский, Марафон туманлаштирилган. Улардан ташкари Стелла, ТСХА-1043, Московский тепличнуй дурагайлари экилмоқда.

Бодрингни етиштиришда куйидаги харорат ва намликни таъминлаш зарур. Усимликлар хосилга киргунга қадар куёшли кунларда 22-24⁰, булутли кунларда 20-22⁰, кечаси 17-18⁰, хосилга кирган даврда 24-26⁰; 21-23⁰ ва 18-20⁰. Тупрокни оптимал харорати 21-22⁰, намлиги хосилга киргунга қадар 60-70%, хосилга киргандан сунг 75-80%, хаво намлиги 75-80% ва 80-85%. Бодринг етиштиришда хаводаги карбонат ангидрит гази 0,1-0,2% ва озика моддалар юкори меъёрда булишини талаб килади. Шу боисдан ерни хайдаш даврида гектарига 100-200 кг азот, 200-350 фосфор ва 200-400 кг калий берилиб, вегетация даврида озиклантиришда 300-350 кг азот, 400-450 кг фосфор

беради. Озиклантиришни кучат экилгандан сунг бир ой утгач бошланиб хар икки хафтада беради ва вегетация даврининг охирига 1-1.5 ой колганда тухтатилади. Бодрингни юкоридаги айланиш даврларида экилганида нав ва мавсумларга кура турли схемаларда (кузги-кишки ва кишки-бахорги даврларда) 80x30, 35, 40 см ёки 3.5-4.0 дона кучат бир метр квадратга жойлаштирилади. кишки бахорги, айрим вақта кузги-кишки даврларда кечрок экиладиган булса тувакли кучатлардан фойдаланилади. Утувчан мавсумда, айника партенокарпик дурагайлар экилганда каттарок озиклантириш майдони олиниб 80x50, 90x60 ҳамда 160x60 схемада кучатлар жойлаштирилади. Бодрингни парвариш килишда куйидаги тадбирлар олиб борилади: экинларни суториш, озиклантириш, эгатлар ва усимликлар орасига ишлов бериш ва уз вактида шакл беришдан иборат.

1.4.Помидор етиштириш технологияси. Узбекистон иссикхоналарида етиштириш учун помидорни Гуликанд нави ва Стриж, Внуковский, Русич, Гамаюн, утувчан мавсум учун Ава-Мария дурагайлари туманлаштирилган. Улардан ташкари Кастелла, Карлсон, Домбелла ва бошка нав дурагайлар экиб келинмоқда. Помидор учун иссикхоналарда оптимал харорат кундузи куёшли кунларида 18-25⁰, булутли кунларда 18-20⁰, кечаси 15-16⁰ саклаш лозим. Хароратни 12⁰дан паст ва 35⁰дан юкори кутарилишига йул куймаслик керак. Помидор юкори тупрок намлигини талаб килади, айника мева шаклланаётган даврда (80-90%) ва паст хаво намлигини талаб килади (50-60%). Шу боисдан бодрингни помидор билан бирга битта иссикхоналарда етиштириш тавсия этилмайди. Помидорни озиклантиришда ер хайдаш олдида гектарига 150-250 кг азот, 200-350 кг фосфор, 250-300 кг калий ҳамда вегетация даврида 200-250 кг азот. Фосфор ва 150-200 кг калий билан озиклантирилади.

Помидор ҳам вертикал канопа олиниб битта асосий пояда устирилади. Тупрокни тоза, юмшок холда сакланади, 2-3 маротаба эгатлар ва усимликлар орасига ишлов берилиб кумик килинади. Помидор асосан туваксиз ва тувакли кучатлар билан экилади. Экиш схемалари бодрингга ухшаш булиб утувчан мавсумда усимликларни озикланиш майдони каттарок олинди (80x40, 80x50). Кузги-кишки мавсумда терим ноябр урталаридан бошланади. Минерал утитлар билан озиклантириш бодрингга ухшаш булиб, факат фосфорли утитларни меёридан бироз купрок солинади.

Помидор тупи гулларини чангланишини яхшилаш учун усимликларни горизонтал юкоридаги симларга кулда ёки электро-вибиратлар билан тебратиб турилади ёки гул тупларига усишни тезлаштирувчи моддалар билан пуркалади. Бу тадбирларни хар хафтада икки маротаба олиб борилади. Парваришлаш буйича олиб бориладиган тадбирлар: ён шох, бачкиларни ва касал, ишлаб булган барглари юлиб туриш, усув нуктасини чилпиш, харорат намликни меъёрида саклаш, бахор ёз даврларда ойнани оклаш ва суторишдан иборат. Ундан ташкари 2-3 маротаба органик утитлар билан шарбатлаш.

Утувчан мавсумда усимликларни поясини 2 маротаба (декабр ва феврал ойларида) пастга туширилиб, бунда меваларни териб олинган пояларнинг пастки кисми баргларидан тозаланиб тупрок юзига ётказилади ва усти тупрок аралашмаси билан кумилади. Бунда ёткизилган поялардан илдиз олдирилиб, усимликка кушимча озика бериш кучаяди ва хосилни териш апрелдан бошлаб яна давом этади.

1.5.Сабзавотларни иситилмайдиган пленкали иншоотларда етиштириш. Ўбекистонда иситилмайдиган пленкали иншоотларда сабавотларни етиштириш учун турли, енгил конструкцияга эга булган пленкали иссиқхоналар ва вактинча ярим ёй шаклидаги пленкали копламалардан фойдаланилади. Уларни турлари ва тузилиши утган мавзуларда курсатиб утилган. Бу иншоотлар усимликларни 1-1.5⁰ ташки совуқдан саклаши мумкин. Ташки харорат 15-20⁰ булганда, иншоот ичидаги харорат 5-10⁰ юкори булади. Бу эса очик ерга караганда хосилни 3-4 хафта барвакт етилишига имконият яратади. Аммо пленкали курилмаларда кундузги ва кечасидаги харорат ва намликни мувозанатида катта фарк борлиги усимликларни усиши ва ривожланишига салбий таъсир курсатади.

Пленкали иссиқхоналарда бодрингни Ўзбекистон 740, Навбахор, ТСХА-211, Серсув ва бошка нав ва дурагайларни, пленкали тонел копламалар остида етиштириш учун Ранний-645 ва Ўзбекистон-740 навлари экилади. Иссиқхоналарда бодрингни жанубий минтакаларда февраль охири март бошларида, марказий минтакаларда мартни ярмидан бошлаб уругёки тувакли кучатлар билан 80х40, 70х70 70х40 схемада экилади. Усимликларни парвариш килиш ва шакл бериш хусусиятлари иситиладиган иссиқхоналарга ухшаш. Аммо тупрок унумдорлиги паст булганлиги сабабли экилганидан бир хафта утгач озиклантира бошлаш тавсия этилади.

Вактинча пленкали копламалар остида бодрингни очик ерга экиладиган муддатлардан 15-20 кун илгари экилади. Ерни кузда тайёрлаб, эгатларни олиб куйилса, эрта бахорда даладаги тупрок тезрок селгиб курилмаларни барвакт далага чикариш, уларни урнатиш уругва кучатни экишга имконият яратилади.

Пленка курилмалар чикариб ташлангунга қадар олиб бориладиган агротехника тадбирлар (30-40 кун давомида) усимликларни иссик кунларда шамоллатиш, суториш, бир икки маротаба эгат ва кучатлар орасига ишлов беришдан иборат. Пленка олингандан сунг кулланадиган агротехник тадбирлар очик ердагига ухшаш.

Помидорни иситилмайдиган пленкали иссикхоналарда етиштириш учун Перемога 165, Майкопский урожайний, Гамаюн ва бошка янги нав ва дурагайлари 45-50 кунлик кучатлар билан бодринг экилган муддатларда экилади. Пленкали курилмалар остига эртапишар Талалихинга ухшаш навларни экиш тавсия этилади.

Помидор кенг каторли усулда 70х30, 35 ёки лентасимон усулда 80х60 30, 45 ва 90х50 30, 35 схемада экилади. Пленкали иссикхоналарда усимликларни бир икки фоиз устирилиб, ён шохлари ва бачкилари юлиниб турилади. Асосий пояни усув нуктаси 5 та гул тупламидан кейин чилпилади. колган агротехник тадбирлар юкоридагига ухшаш.

Саволлар:

1. Иссикхоналарни бир метр квадрат майдонида етиштирилаётган бодринг ва помидор миқдори, кг
2. Сабзавотларни тупроксиз шароитда етиштириш қандай номланади ва унинг турлари
3. Иситилмайдиган пленкали иссикхоналарда ва вактинча пленка билан копланган иншоотларда бодринг ва помидордан ташқари қайси сабзавотлар етиштирилади
4. Иссикхоналарда бодринг ва помидор етиштиришда харорат ва намлик режимини қандай сошлаш мумкин

19-20-Маъруза: ТОМАТДОШ САБЗАВОТЛАР ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Режа:

1. Томатдош сабзавотларни ахамияти ва ишлатилиши.
2. Келиб чиқши, тарқалиши, классификацияси ва навлари.
3. Биологик хусусиятлари.
4. Етиштириш технологияси, ёз, қуда помидор етиштириш, зараркунанда ва касалликларга қарши қураш.

5. Иссиқхоналарда қандай уғитлар қулланилади
6. Тупрок дезинфекцияси нима
7. Қучатлар қачон озиклантирилади
8. Асалари билан бодрингни қайси навлар қангланади
9. Помидор учун иссиқхонани оптимал ҳарорати неча градус булади
10. Иситилмайдиган плёнкаси иншоатини аҳамияти нима

Адабиётлар: 4, 8, 10, 15, 19.

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: тоmatдош сабзавотлар, олма ва лимон кислота, помидор шарбати, классификация, ярим маданий, помидор, перуқан помидор, тукли, ёввойи, маданий помидорлар, уғитлаш, ер танлаш, қучат экиш, парваришлаш, қучатсиз помидор етиштириш, мозатка туси, карантин объект.

1.1. Томатдош сабавотлар. Томатдош сабзавотларга серэт йирик мевалари истеъмол қилинадиган помидор, баклажон, аччик - чучук қалампирлар (гаримдорилар) ва пакпак (физалис) қиради.

Буларнинг ичида энг қуп тарқалагани ва аҳамиятлиси помидор. Баклажон ва қалампирлар қамрок тарқалаган, энг қам аҳамиятлиси пак-пак (физалис) усимлигидир. Улар Урта Осиё республиқаларида қуп экилади.

1.2. Помидор аҳамияти ва ишлатилиши. Ўзбекистон жумҳуриятида помидор усимлиги етакчи сабзавотлардан булиб, уни экиладиган майдон сабзавот экиладиган майдоннинг учдан бир қисмини эғаллаб, жами сабзавотлардан олинадиган ҳосилни 45-50 фоизини ташқил этади. Жумҳуриятимиз буйича помидорни уртача ҳосилдорлиги 220-250 центнерни ташқил этади.

Ўзбекистонда илгор ҳужалиқлар инсон ҳаёти учун зарур булган ушбу сабзавотдан жуда юқори ҳосил олмоқдалар. 2000 йилга бориб помидордан 850 минг тонна етиштирилиши қерак. Б.А.Рубиннинг маълумотларига қура помидор тарқибда урта ҳисобда қуйидагилар (ҳом мевасида % нисбатан): қурик модда - 6.0-9.0%; углеводлар (целлюлозасиз) - 3.99%; оксил - 0.95; ёғлар - 0.19; целлюлоза - 0.84; қул - 0.61; 1 қг да - 215 қалория энергия мавжуд. Пишган меваси тарқибда 0.5% атрофида олма ва лимон қислоталар, шунингдек С, А, В ва В₂ витаминлар ҳам қуп.

Помидорнинг қимёвий тарқибни усимлик навиға, меваларнинг етилиш вақтиға, ҳосилни йигиб олиш муддатларига, парваришлаш шароитига ва бошқа факторларға қараб ўзғариб туради. Урта Осиё. шароитида устирилган

помидор меваси таркибидаги курук модда шакар ва витаминлар (С 50 мг) шимолда етиштирилган помидорникига караганда, лалми ерларда етиштирилган помидор меваларидагиси эса суғориладиган ерлардагига караганда куп булади. У консерва саноати учун ҳам хом ашё ҳисобланади. Янги терилган помидордан фойдаланиш айника фойдалидир. Чунки бунда таркибидаги витаминлар деярли тула сақланади.

Помидор шарбатини обдон қайнатиш йули билан тайёрлана-диган томат-пюре ва томат пастаси, айника стерилизация қилинган янги томат шарбати (соки) қимматли озиқ-овқат маҳсулотларидан ҳисобланади, бундай томат шарбатида янги помидор мевасидаги ҳамма витаминлар деярли тула сақланиб қолади.

1.3.Келиб чиқиши ва тарқалиши. Помидор аслида Жанубий Америкадан келиб чиққан. Европага XVI асрнинг урталарида келтирилган бўлсада, узок вақтга қадар уни манзарали ёки доривор усимлик сифатида устириб келинган. XVIII асрнинг охирларида помидор озиқ-овқат экини сифатида устирила бошланди. Утган асрнинг охирларидан эътиборан помидор усимлиги Марказий Осиёда ҳам экила бошланди.

Классификацияси ва навлари. Д.Брежневнинг классификацияси бўйича (1964), туркумига қирувчи помидорлар уч турга бўлинади.

- *Перуан помидор* - куп йиллик, майда мевали, ётиб усувчи ёввойи усимлик.
- *Тукли помидор* - пояси сертук, меваси майда ва тахир, бир йиллик ёки куп йиллик ёввойи усимлик.
- *Оддий помидор* - бу тур ҳам уз навбатида учта кенжа турга бўлинади:
 1. *“Ёввойи помидор”* - бунга сершоҳ, ётиб усадиган, майда мевали ва мевасининг таркибида куп микдор курук модда (8-10) ҳамда шакар сақлайдиган смородинасимон помидор қиради.
 2. *“Ярим маданийлашган помидор”* - пояси ётиб ёки тик усади, меваси майда (20-30 г.). Ярим маданий помидор меваларининг йириклиги ва шаклига қараб бир-биридан фарқ қиладиган олчасимон, ноксимон, олхурисимон, узунчок ва куп уяли хилларга бўлинади.
 3. *Маданий помидор* навлари нихоятда хилма-хил шаклда бўлиши билан характерлидир.

Ўзбекистон Республикасида помидорни қуйидаги навлари районлаштирилган. Майкопский уржайнуй 2090,

тезпишар, Талалихин 186, Темно-краснуй тезпишар, Намуна 70, подарок, Волгоград 5/95, Новинка Приднестровая, Перемога 165, Прогрессивнуй, Сурхан 142, ТМК - 22, Уз МАШ - 1, Восток - 36, Октябрь, Узбекистон ва бошкалар.

1.4. Биологик хусусиятлари. Помидор иссиксева усимлик. Унинг уруги 10-12⁰ хароратда уна бошлайди. Усимлигининг нормал ушиб ривожланиши учун харорат 25⁰ атрофида булиши керак. Харорат 15⁰дан паст булганда гуллашдан ва 10⁰ пасайса вегетатив органлари ушибдан тухтайди. -1-2⁰ тумпературада усимликлар бутунлай нобуд булади. Помидорнинг хозирги вақтда яратилган баъзи навлари -3-4⁰ совукка бардош бера олади.

Ута юкори тумпература хам помидор усимлигининг ушиб ривожланишига салбий таъсир курсатади. Температура 33⁰ дан ошганда уларнинг ушиби секинлашади, харорат 35⁰га етганда эса усимлик ушибдан бутунлай тухтайди.

Температура ва намлик шароитлари кулай булганда уруги экилгандан 4-5 кун утгач, майсалари курина бошлайди, 3-4 кун утгандан сунг уч булимдан иборат биринчи чинбарг чикаради, усимликда эртапишарларда, 5-7, кечпишар навлари эса 10-11 та барг чикаргандан кейин дастлабки гул шингили пайдо була бошлайди. Бундай кейинги гул шингиллари хар учинчи, айрим холларда хар иккинчи баргдан сунг пайдо булади.

Помидор ёругсева усимлик. Ёруглигининг етарли булмаслиги усимлигининг ушиб ва ривожланишини секинлаштиради. Помидор усимлигининг намга булган талаби парваришланиш усулларига куп жихатдан боглик. Кучатдан етиштирилган ва илдиз системаси юзарок таралган помидор усимлиги бевосита уруги экиб устирилган ва илдиз системаси анча чукур жойлашган помидорга нисбатан намни хийла купрок талаб килади.

1.5. Агротехникаси. Ер танлаш. Урта Осиёда помидор усимлиги буз, утлок ва утлок боткок тупрокларда яхши усади. Сизот сувлари юза жойлашган шунингдек, шурланган ва корбон тупроклар помидор учун унчалик ярамайди. Алмашлаб экишда помидор учун сабзаот экинларидан дуккаклар, саримсок, пиёз, полиз усимликлари, карам, бодринг энг яхши утмишдош хисобланади.

Угитлаш. Помидор унумдор ерларни танлайди ва угитта нихоятда талабчан усимлик хисобланади. Шунинг учун буз тупрокларда етиштирилганида № 120-200, P₂O₅ - 140-150, K₂O -

90-100; утлоки ва утлоки-боткоккли тупрокларда № 140-150, P_2O_5 -140-150, K_2O - 100 кг.га бериш тавсия этилади.

1.6.Кучат экиш. Помидор экини, асосан кучат килиб камдан-кам холларда уруги бевосита далага экилиб етиштирилади. Помидор кучатлари экиш олдидан сутгорилган ерларга экилади, экишда кучат илдизларининг юкорига букилиб қолишига эҳтиёт бўлиш лозим. Кучатларнинг яхши тутиб кетиши учун экин бир-икки маротаба сутгорилади, зарур бўлса, хато жойларга кучат экилади.

Оддий усулда етиштирилган кучатлар 5-7 та барг чиқарганда, чиринди тувакчаларда устирилганда эса 8-10 та барг чиқарганда яъни гунчалай бошлаганда далага экилади.

Урта Осиёнинг купчилик районларида помидор апрель ойларида яъни бахорги қора совуқлар утгандан кейин экилади. Тог олди зоналарида эса апрель охири майнинг ярмиларида экилади.

Помидор кучатлари кенг пуштали эгатларга икки қатор килиб ётиқрок экилади. Суст усадиган, паст бўйли навлар пушталари 140-160 см кенгликда эгатларга туп орасини 25-30 см. Нисбатан баланд усадиган навлар эса 180-200 см кенгликда олинган эгатларга туп орасини 40 см килиб экилади.

Парваришлаш. Бегона утларни, ва қаткалокни йукотиш учун экин қатор оралари культивация қилинади, ерга ётиб усадиган помидорлар эса культивациядан ташқари қатор оралари бир икки маротаба юмшатилади ва қаторлардаги бегона утлар йукотилади.

Бегона утларни йукотиш мақсадида ерга гербицидлардан кучат утқозишга 5-7 кун қолганда солиш тавсия қилинади. Помидорнинг усув даврида бегона утларни йукотишда солан 3-10 кг.га препаратидан фойдаланиш ҳам яхши самара беради.

Биринчи чопик кучат утқозилгандан икки ҳафта кейин утқозилади. Орадан 3-4 ҳафта утгач, қатор оралари иккинчи марта юмшатилади. Усимликларни минерал угитлар билан озиклантириш 1 ва 3 культивация билан бир вақтда утқозилади.

Сизот сувлари чуқур жойлашгач буз тупроқли ерларда помидор экинлари мавсумда 18-20 марта сутгорилади. Сизот сувлари 1 м гача бўлганда 12 марта, 1-2 метргача бўлса 15 марта сутгорилади. Сугориш нормаси 600-700 м.куб/га, буз тупроқлар учун, нам сизими юкори бўлган утлок-боткок ерларда гектарига 800-900 метр куб ҳисобидан сув берилади.

Ёз-кузда помидор устириш. Ёз кузда помидор етиштириш усули Тошкент кишлок хужалик институтининг сабзавотчилик кафедраси илмий ходимлари томонидан ишлаб чикилган. Бу усулнинг мохияти шундаки, помидор эртаги сабзавотлардан бушаган ерларга такрорий экин сифатида уртапишар навлари экилади. Кучатлар далага июн ойининг урталарида туп ораларини зичрок (15-20см) килиб утказилади. Кечки булишига карамасдан помидордан дурустгина гектаридан 300-350 ц гача хосил олинади.

1.6.Зараркунанда ва касалликларга карши кураш. Урта Осиёда помидор усимлигининг вирусли касалликлари, айника куп таркалаган; столбур гул ва баргларнинг шаклини узгартириб мева тукималарининг айрим жойларини котириб куяди; стрик-бу касалликка чалинган усимлик баргларида аввал штрихлар (узук-узук йулар) пайдо булиб кейин, айрим холларда эса мевалар чирийди. Мозаика усимлик барглари рангининг мозаика тусига кириши ва уларнинг шаклини узгариши бу касалликнинг асосий белгилари хисобланади. Вирусли касалликларга карши кураш чоралари; уругни факат соглом усимликлардан олиш ва алоҳида ишлов бериш лозим. Каронтин объект хисобланган, бактериял ракка касалликларга карши рухсат этилган дорилар билан дорилаш ва касаланган усимликларни юлиб олиб даладан ташкарига чикариб ташлаш зарур.

Помидорни кучатсиз етириш. Помидорни далага бевосита уругини экиб устириш хам мумкинмиу Бунда уларни етиштиришга килинадиган харажатлар анча камаяди. Далага бевосита уруги экилган помидор усимлигининг совукка, кургокчиликка хамда столбур касаллигига чидамлилиги бир оз ошади. Помидор уругини мартда ва апрелнинг бошларида чигит ёки сабзавот сеялкасида гектарига 2-3 кг нормада экилади. Уругни оддий усулда каторлаб ёки квадрат уялаб экиш мумкин.

Хосилни йигиб-териб олиш. Помидор хосили, республикамиз минтакаси см етиштирилаётган навларига караб, май охири - июн бошида кузги бирламчи кора совукларгача 7-12 мартгача териб борилади. Купинча истеъмол учун тулик этилган, узок масофага жунатиш, тузлашлар учун окиш-нимкизил мевалари терилади.

Дастлабки кузги кора совуклар тушиши олдиан помидорларнинг хаммаси териб олинади, чунки совук урган мевалар саклаш ва тузлаш учун ярамайди. Териб олинган

помидор меваларнинг пишганлари ҳамда димлаб етилтиришга ва тузлашга ярайдиганлари сараланиб ажратилади, брак килинган (майда, касал теккан)лари молларга берилади. Помидор теришда ҳар хил типдаги тиркалма фойдаланишни қисман механизациялаштириш имконини беради.

1.7.Калампирлар: Аччиқ калампирлар таркибида куп миқдорда аччиқ модда-капсаицин ($C_{18}H_{28}O_3$) бўлиши, пустининг юпка меваларининг майдалиги билан фарк қилади. Аччиқ калампир курук янчилган ҳолда овкатга ишлатилади, шунингдек, сабзавотларни сиркалашда, тузлашда ва консервалашда доривор сифатида фойдаланилади. Чучук калампирнинг мевалари йирик, серэт, таркибида бир оз капсаицин моддаси бор, мазаси купинча чучук бўлади. Чучук калампирлар овкатга шунингдек ундан турли хил консервалар тайёрлашда фойдаланилади.

Калампирнинг навлари морфологик белгилардан ташқари тезпишарлиги, серхосиллиги, хуш-таъмлиги, таркибидаги шакар ва витаминларнинг миқдори жихатидан ҳам фарк қилади. Ўзбекистонда аччиқ ва чучук калампирларнинг куйидаги навлари туманлаштирилган:

Маргилон 330 кечпишар, аччиқ Пикантнуй-ярим аччиқ, Ласточка тезпишар, Дар Ташкента ва Заря Востока - уртапишар, Зумрад-кечпишар.

1.8.Баклажон. Баклажон озик моддалар ва витаминлар унчалик эмас. Мевасининг таркибида 6-11 курук моддалар, 2,5-4 шакар; 0,6-1,4 оксил ва 0,2-0,4 ёглар бўлади. Ундаги витамин С нинг миқдори 1,5-7 мг % атрофида узғариб туради. Баклажоннинг барра меваси овкатга ишлатилади ва консерва саноатида кенг миқёсда фойдаланилади. Тулик етилган меваларида соланинг М (молонген) деб аталувчи тахир модда тупланиб улар истеъмолга яроксизланади.

Навлари. Марказий Осиёда баклажоннинг асосан куйидаги навлари таркалаган, Болгарский 87 уртапишар, Аврора, Ереванский.

Калампир ва баклажон жуда иссиқсевар бўлиб, усув даври майсалар курингандан мевалари етилгунча -120-160 кун. Кундузги ҳарорат 25° дан ва тунгиси $15-18^{\circ}$ дан бошлаганда усимлик яхши усиб ривожланади. Ҳарорат $11-13^{\circ}$ бўлганда усимликлар усишдан тухтайди ва $-0,5-1^{\circ}$ совуқда нобуд бўлади.

Баклажон ва калампир помидорга караганда иссиқни купрок талаб қилади, унинг усув даври бирмунча узун. Урути $13-14^{\circ}$ да уна бошлайди, усиши ва ривожланиши учун энг қулай

харорат 20-30°. Харорат 20°дан паст булганда гулларнинг чангланиши ва меваларнинг усиши тухтаб колади. 15°дан паст хароратда эса гул ва тугунчалари ёппасига тукилиб кетади. Харорат 1° га якинлашганда усимликлар нобуд булади.

Агротехникаси. Баклажон ва калампир алмашлаб экишда, одатда, улар илдизмевалилар, пиёз, полиз экинлари ва карамдан кейин помидор билан бир далага жойлаштирилади.

Калампир ва баклажондан бирмунча мул ва эртаги хосил олиш учун уларнинг кучатлари диаметри 6-8 смли чиринди тувакчаларда етиштирилади.

Ўзбекистонда помидор етиштириладиган майдонларга кузги шудгорлаш даврида хар гектар ерга 20-30т гунг, 4-5 ц суперфосфат солиш, усув даврида эса гектарига 100-120 кг хисобида аммиакли селитра билан экинларни 1-2 марта озиклантириш тавсия этилади.

Майсалар 5-6 та барг чикарганда апрел ойининг бошлари (жанубий туманларда) ёки иккинчи ярмида кучатлари далага утказилади. Калампирларни, айника, тезпишар навларини май ойининг биринчи ун кунлигида ҳам экиш мумкин.

Калампир кучатлари катор оралари 60-70 ва туп оралари 20-30 смдан килиб каторлаб ёки 70х70 см схемада квадрат уялаб экилади ва хар уяда иккитадан кучат колдирилади. Баклажон 40х50 см оралик билан каторлаб ёки 70х70 см схемада квадрат уялаб экилади. калампирлар ва айника баклажон намга талабчан экин. Ер ости суви чукур жойлашган буз тупроки ерларда чучук калампир ва баклажон усув даврида 15-16 марта, калампирлар эса 12-13 марта суғорилади, катор ораси икки марта чопилади. Аччик калампирлар одатда меваси (урути) тула пишган даврида 2-3 марта териб олинади.

Баклажон техник жихатдан етилганда бирмунча йириклашади, пусти тук бинафша ранга кириб, усти ялтираб туради. Хосили 5-7 кун оралатиб банди билан узиб олинади.

Саволлар:

1. Томатдош сабзавотларга кайси усимликлар кирадиу
2. Помидорнинг ахамияти нимадау
3. Помидор таркибида инсон организми учун кандай моддалар мавжуду
4. Помидорни классификациясини айтингу
5. Помидорни ривожланиши учун зарур булган хароратлар
6. Эртапишар нав помидорларда гуллаганидан неча кундан сунг биринчи хосил пишадиу

7. Помидорни урутидан купайтириш усулини кандай камчиликлари бор;
8. Помидорни кучатсиз етиштириш мумкимиу
9. Калампир таркибида узига хос кандай модда бор ва унинг хусусиятиу
10. Баклажон навларини айтингу

21-Маъруза: БОДРИНГ ВА САБЗАВОТ КОВОКЧАЛАРИ АГРОТЕХНИКАСИ.

Режа:

1. Ахамияти ва таркалиши
2. Бодрингни ботаник таърифи.
3. Кулланилаётган навлари.
4. Биологик хусусиятлари.
5. Бодринг ва сабзавот ковокчалари агротехникаси.

Адабиётлар: 4, 8, 10, 19.

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: асосий поя, ук илдиз, ён илдиз, эркак гуллар, айрим жинсли, сабзавот ковокчалари, сиркалаш, усимлик палласи, пушта яганалаш, каткалок, эгат маркази.

1.1.Ахамияти ва таркалиши. Бодринг мевасида озик моддалар унчалик куп булмасада лекин мохияти таомларга лазат киритувчи махсулот, овкатнинг хазм булишига ёрдам берувчи масаллик хизматини уташидадир. Меваларида 4-5% курук моддалар, 1,5-2% кантлар А, В, С витаминлар, кулида куп микдорда калийли, кальцийли ва фосфорли тузлар мавжуд.

Ботаник таърифи. Асосий пояси навига ва усаётган жойининг шароитига караб 50х80 дан 2 метрга кадар етади, баъзан бундан хам ошиб кетади.

Илдиз системаси - асосан тупрокнинг 20х25 ли хайдалма катламига таралиб усади. Ук илдиз ва айрим ён илдизлари хатто 1 метрга кадар етиб бориши мумкин.

Гуллари - айрим жинсли, яъни эркак ва ургочи гуллардан иборат, ранги сарик, эркак гуллар барг култикларида жойлдашган булиб, калконсимон тупгул хосил килади. Меваси ковокча.

Навлари: Марказий Осиё республикаларида асосан илмий тадқиқот муассасалари томонидан яхшиланган махалий нав бодринглар экилади: Гулноз, Конкурент, Маргиланский 822, Омад, Парад, Первенец, Ўзбекистана 265, Ранний 645, Талаба, Ўзбекский 740, Хосилдор Г1.

1.2.Биологик хусусиятлари. Бодринг иссиксева усимлик. Урути 12-13⁰ хароратда униб чиқади. Харорат бундан паст

булса, уруг буртсада, аммо усишга харакат килдмайди ва чириб кетиши мумкин. Кулай, яъни 25-30° хароратда урги 5-6 кунда, ивитилмасдан экилганда эса 7-10 кунда униб чиқади.

Юкори (40° ва ундан юкори) харорат хам усимликка халокатли таъсир этади. Бодринг ёругсевар киска кун усимлиги. У 10 соат давом этадиган ёруг кунда яхши ривожланади.

Сабзаёт ковокчалари. Сабзаёт ковокчаларига кабачки ва патиссон киради. Буларнинг 2-4 кунлик ёш мева (тугунча)лари сиркалаш учун, етилмаган мевалари ошхоналарда ва консерва саноатида фойдаланилади, етилган - йирик мевалари чорва молларига озик сифатида берилади. Кабачка ва патиссон навлари унчалик куп эмас. Кабачканинг Греческий нави купрок таркалаган. Италиянский нави Греческийдан ранги жихатидан фарк килади, яъни биринчисининг ранги яшил иккинчисининг узук-узук йуллари бор. Патиссоннинг Белуй 13 нави таркалаган.

Бодринг ва сабзаёт ковокчалари агротехникаси. Алмашлаб экишда улар учун картошка, карам, сабзи, лавлаги энг яхши экин хисобланади, агар бу экинларга гунг солинган булса, янада максадга мувофик булади.

Угитлаш. Бодринг ва сабзаёт ковокчаларини усув даврида албатта озиклантириш шарт. Бунда биринчи озик усимликлар ён поялар чиқара бошлаган даврда (гектарига 1.5 ц аммиакли селитра ва 1.2 ц суперфосфат) берилади. Усимликнинг гунчалаш даврида ёки гуллаш бошлаган пайтда аммиакли селитра билан иккинчи марта ва 20-30 кун утгач, гектарига 1-1.5 ц хисобидан аммиакли селитра солиб, охири марта озиклантирилади.

1.3.Экиш Марказий Осиёнинг жанубий районларида эртаги бодринг экиш муддати март охири апрелнинг бошларига, колган районларда апрел ойининг иккинчи яримларига тутри келади, яъни у кора совуклар хаф-хатари утгандан кейин экилади. Кечки бодринг 15 июндан бошлаб то 10 июлгача экилади. Кабачки, патиссонлар бир марта - апрел охири май бошида экилади. Кабачки, патиссонлар бир марта-апрел охири-май бошида экилади.

Эртаги бодринг каторлаб эгатлар ораси 120x140 катордаги уялар ораси 30 см килиниб жойлаштирилади. Кечки бодрингни куш каторлаб экилади, бунда бир жуфт эгат маркази билан иккинчи жуфт эгат маркази ораси 210x240, уялар ораси эса 40 см килинади.

Патиссонлар 120К80 х70, (60), кабачкалар 170К80 х70 (60) см схемада экилади. Бахорги бодирингни курук ёки 18 - 24 соат увитилган уругларни хул - курук аралаштириб, ёзда эса суғорилган эгатлар чеккасига увитилган уруглар 3 - 4 см чуқурликга, уяларга 4 - 6 тадан экилади. Гектарига 4 - 5 кг.дан уругсарфланади.

1.4.Парвариш килиш - Бодринг ва сабзавот ковокчаларни эрта муддатларда экишда тупрокнинг каткалокланишига карши кура-шишга тутри келади. Уругуниб чиккандан кейин ягана килинади ва хато чиккан жойларга кайта уругэкилади. Биринчи яганалашда хар уяда 3-4 тадан, иккинчи яганалашда эса 1-2 донадан усимлик колдирилади, бирор сабабга кура уругуниб чикмаган уяларга ундирилган уругэкилади.

Нихоллар 2-3 та барг чикарган пайтда биринчи чопик килинади, эгатлар ва катор оралари эса культиваторда юмшатилади. Орадан 3 - 4 хафта утказиб иккинчи енгил чопик утказилади. Усимликлар палаги пушталарга таралади. Бодринг ва ковокчалар усув даврида сизот суви 1 - 2 метргача булса 9-10 маротаба ва 2 метрдан чуқурга жойлашган булса 15 маротабагача суғоришни талаб килади.

Саволлар:

1. Бодринг, харорат неча С градус булса усишдан тухтайди у
2. Бодринг гуллари кандай тузилгану
3. Бодринг навларини айтингу
4. Бодрингни асосий пояси канча буладиу
5. Уругини ивитиб ва ивитмасдан экилишини фарки нимадау
6. Сабзовот ковокчалари кандай максадларда ишлатиладиу
7. Сабзовот ковокчаларининг озикага талабиу
8. Бодрингни ун шудринг касаллигига карши кандай препарат сефиладиу
9. Бодринг нима учун намга талабчан сабзавот хисобланадиу
10. Сабзовот ковокчаларини экиш схемасини айтингу

22-Маъруза: КАРАМ УСИМЛИКЛАРИ ВА ЕТИШТИРИШ.

Режа:

1. Карамни ахамияти ва ишлатилиши.
2. Карам биологияси ва навлари.
3. Етиштириш агротехникаси.
4. Карам кучати тайёрлаш.
5. Гул карам ва кольраби

Адабиётлар : 8, 9, 19, 20.

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: бутгуллар, азотли моддалар, суткашк уртача харорат, терисаллар, торфли-боткок ва корамтир утлок тупроклар, кучатхона, тувакчалар, дала нам сигими, культиватор, кичик поллар, сохта уп-шудринг, бир йиллик усимлик, бош ураш, куёш нури, истикболли навлар.

1.1.Сабзавот экинлари грухига кирувчи крестгулдошлардан Марказий Осиёда оддий (ок бош) карам, гул карам, кизилбош карами, кольраби карам, хитой карамлари етиштирилади. Гул, Хитой ва Пекин карамлари бир - икки йиллик бошкалар икки йиллик усимликлардир.

Карамнинг ватани Европанинг Урта денгиз соҳили ҳисобланади. Ҳозирги вақтда карам жуда ҳам кенг тарқалган сабзавот экинидир, у тропик зонадан тортиб то Кутб доирасигача бориб етган. Оддий карам таркибида озик моддалар 6-11% туйимли, шу жумладан 2,6-5,3% кантлар, 1,1% гача оксил ва витаминлар мавжуд. Гул карам ва айника брюссель карами таркибида азотли моддалар ва витаминларнинг анча куплиги билан бошка карамлардан фарк қилади. Кольраби карам шакарга бой, бу эса унга ширин маза бериб туради. Икклими салкин минтақаларда етиштирилган карамлар таркибида курук моддалар биров камайсада, биров кантлар ва витаминлар миқдори ортади. Ўзбекистон шароитида баҳор-ёз мавсумидаги карамга нисбатан кузги - “кечки карам” салкинда ҳосил туплаганни туфайли шираси ва айника аскарбин кислотаси икки маротаба ортади.

1.2.**Биологик хусусиятлари.** Ок бош карам совуққа чидамли икки йиллик усимлик. Уруғи 4-5⁰ хароратда уна бошлайди, харорат 15-20⁰ бўлганда эса экилгандан сунг 3-4 кунда майса чиқаради. Лекин харорат юкори ва ёруғлик кам (парникларда) бўлганда карам майсалари буйига ушиб кетади. Майса чиккан даврда 6-8⁰ иссиқлик энг қулай харорат ҳисобланади. Усимликнинг карамбош ураши учун энг қулай харорат 15-17⁰ дир, лекин бир мунча паст (5-10⁰) хароратда ҳам карамбош ушиб ва шаклланиши давом этади.

Паст хароратларда чиниктирилган, яхши илдиш отган карам кучатлари -5-6⁰, йириклашган усимликлари 7-8⁰гача чидай олади, кузги Дербент нав карам кучатлари эса харорат хатто минус 10-12⁰ гача пасайганда ҳам зарарланмайди. Усимликларнинг ривожланиши ва гуллашга киришишлари учун қулай харорат 3-5⁰.

Хаддан ташкари юкори харорат карамнинг усиши ва ривожланишига салбий таъсир этади. Суткалик уртача харорат 25⁰ дан ортиб, кундузги харорат 30-35⁰ гача борганда, усимликда курук модданинг тупланиши ва карамбош ураши секинлашади, баъзи навларда эса бутунлай тухтаб колади. Карам- ёругликни ёктирувчи, узун (15-17 соатли) кунларни талаб килувчи усимлик.

Карам навлари тез етилишига караб бир-биридан кескин фарк килади: эртаги навлар кучати утказилгандан кейин 2-2,5 ой утгач, уртаги навлар 3 ой ва кечки навлар тахминан 4 ойдан сунг етилади, бундан ташкари оралик, яъни уртаги-эртаги хамда уртача-кечки навлар хам бор. Ўзбекистонда карамни куйидаги навлари экилади: Апшеронская озимая, Ашхабадская, Дербентская, местная, Июньская, Навруз, Номер первый Грибовский 147, Саратовни, Судья Узбекский, Ташкентская 10, Ўзбекистанская 133.

Агротехникаси. Марказий Осиёда карам дарёларнинг куйи террасаларидаги органик моддаларга бой, салкин, сув сигими яхши, торфли-боткок ёки корамтир утлок ерларда яхши усади.

1.3.Алмашлаб экишда картошка, бодринг, полиз экинлари ва дон-дуккакли усимликлар карамдан олдинги энг яхши утмишдош экин хисобланади. Кечки карамни эртаги картошка, сабзи, бодринг, кук нухат, ош лавлаги, бошокли галла экинларидан бушаган ерларга такрорий экин сифатида экиб, бемалол хосил олиш мумкин.

Угитлаш. Карам ердан озик моддалар олиш ва угитта талабчанлиги жихатидан сабзаёт экинлари орасида биринчи уринда туради.

Ўзбекистон сабзаёт-полиз экинлари ва картошкачилик ИТИ хар гектар ерга 5-6 ц.дан аммиакли селитра, 7-8 ц.дан супер-фосфат ва 1,5-2 ц.дан калий тузи солишни тавсия килади. Органик угитлар минерал угитлар билан аралаштириб, яъни хар гектар 20-25 т гунг ёки компост, 3-4 ц.дан аммиакли селитра ва суперфосфат солингани маъкул. Гунг, калий хамда фосфорли угитларнинг асосий кисми 2/3 ерни хайдаш олдидан, азотли угитларнинг бир кисми экиш олдидан ва бир кисми усув даврида кушимча озик тарикасида берилади. Биринчи озиклантиришда азотли ва фосфорли угитлар, кейингиларида эса факат азотли угитлар солинади. Эртаги карам бир-икки марта, кечки карам эса икки-уч марта озиклантирилади.

1.4.Кучат утказиш. Карам, одатда, далага кучат килиб уткаилади, камдан-кам холларда бевосита уруги экилади. Эртаги карам кучатлари иссик ва илик парникларда етиштирилади. Бунинг учун карам уруги декабр ёки январ ойлари бошида кучатхоналарга сепилади, лекин, хосилни эртарок етиштириш учун кучатлар чиринди-тувакчаларда етиштирилади.

Ёзги муддатларда экишга мулжалланган кечки карам кучат-лари, кечки карам экиладиган участка якинидаги кучатхоналарда, кичик поллар ёки эгатларда устирилади. Бунда уругмай ойининг урталаридан то июннинг урталаригача сепилади (пикировка килинмайди). Одатдагича етиштирилган кучатлар 4-5 та, тувакчада устирилганлари эса 5-7 та чинбарг чикарганида далага утказилади.

Ёз бошида карам хосили олиш учун кучат февраль охири - март ойида далага утказилади. Урта Осиёнинг жанубида эса кузда-ноябрь ойида ҳам экиш мумкин. Эрта бахорда экиш учун энг эртапишар навлардан, масалан, Биринчи номер, июнский, кузда экиш учун эса Дербент навидан фойдаланилади. Уртаги карам кучатлари апрель-май ойининг бошларида далага утказилади. Бу муддатларда экиш учун Слава 1305, Тошкент 10, шунингдек, Багирская ва Ликуришка навларидан фойдаланиш тавсия этилади. Карам бошлари майда, тезпишар нав карам кучати катор ораларини 70 ёки 60 см туп ораларини 25x30, карам бошлари йирик, кечпишар навлар кучати катор орасини 70 см каторда усимликлар орасини 45-50 см килиб экилади.

1.5.Парвариш килиш. Карамдан мул хосил етиштириш учун карам экилган ернинг нами дала нам сигимига нисбатан 80 % дан кам булмаслиги керак. Карам усимлигини неча марта суториш ва суториш муддати кучат утказилган вақт ҳамда тупрок шароитига, жумладан, ер ости сувларининг қандай чуқурликда жойлашганига қараб белгиланади. Эртаги карам 1 м гача, 5-6, 2 м дан чуқур булса 9 маротаба суторилади. Уртаги карам, 1 м гача 6, 1-2 м 8, 2 м дан чуқур 11, кечки карам 1 м гача 7, 1-2 м 9, 2 м дан чуқур 13 марта суторилади. Карам усимлиги кучат утказиш, илдиз ва карам бош ураш вақтида сувни, айника куп талаб килади. Лекин эртаги карам усув даврининг биринчи ярми бахорнинг салкин ҳамда тез-тез ёгингарчилик булиб турадиган даврига тугри келганлиги учун асосий суториш, одатда, апрель ойининг иккинчи ярмидан бошланади ва у усув даврида 5-9 марта суторилади. Карам бошлари шаклланаётган ва пишиш даврида экинни тез-тез, хар

6-8 кунда суториб туриш лозим. Харорат юкори булган пайтларда, хавони салкинлантириш учун экинларни сунъий ёмгирлатиб суториш катта ахамиятга эга.

Экинга дастлабки ишлов беришда экин катор оралари культиваторлар билан 5-6 см чуқурликда юмшатилади. Кейинги ишлов беришда эса юмшатиш чуқурлиги аста секин оширилиб 10-12 см етказилади. Карам бошлари шакллана бошлаб, усимлик барглари усиб кетиб, культиватор утишига халакит бера бошлаганда ишлов тухтатилади. Экин катор ораларини юмшатиш купинча чопик килиш ва озиклантириш билан бир вақтда олиб борилади.

Бегона утларга карши гербицидлар.

1.6.Касалликлар ва зараркунандалар. Сохта ун шудринг касаллиги - етук усимликларни ва сакланаётган карам боши зарарлай-диган замбуруткасалиги. Сохта ун-шудринг касаллигига карши намланган уругни 48-50⁰ хароратда 20 минут давомида кизди-рилади, карам кучати олтингутуртни охак аралаш-маси билан ишланади. Зараркунандалардан шира (бит), карам пашшаси, куя, карам капалаги ва крестгулдошлар бургалари карам усимлигига, айника, катта зарар еткази. Ширага карши усимликка анабазин - сульфатга (гектарига 0,9-1 кг) совун кушиб пуркалади. Карам куяси, капалаги, карам хасваси ва карам пашшасига карши хам усимликка ишлов берилади.

Гул карам. Бир йиллик усимлик. Барглари шакланганидан кейин киска, йугон, сершоҳ ва серэт поялардан иборат карам бош хосил килади. Кейин, бир кисми шоҳлар узайиб уса бошлайди ва руваксимон туп гул, гул хамда уругхосил килувчи гулпояларга айланади. Гул карам уруги 5-6⁰ тумпературада уна бошлайди, майсалашни жадаллашиши учун энг кулай харорат 18-20⁰ хисобланади. Карам боши паст тумпературада (8-12⁰) анча тез шоҳлайди, лекин карам бош урайдиган шоҳларнинг усиши эса сусаяди. Натижада карам бошлар жуда суст шаклланади ва карам бошлари майда, аммо зич булади. Харорат 15-18⁰ булганда карам бошлари йирик, лекин буш булади. Харорат бундан хам юкори (18-20⁰) булганда карам боши жуда тез шаклланади, лекин у катта булиб, тез сочилиб кетади. Харорат 35-40⁰ гача кутарилганда эса усимлик мутлако бош урамайди. Гул карам 2-3⁰, чиниккан кучатлари эса хатто 5⁰ гача совукка хам чидайди.

Навлари Марказий Осиёда гул карамнинг куйидаги навлари куп таркалаган. Отечественная уртача эртапишар нав,

Снежинка тезпишар (90-100 кунда етилади) карам боши чузикрок. Голландиядан келтирилган истикболли (Гудман ~₁) навлари ҳам кулланилмоқда.

Агротехникаси Гул карам бахор-ёз ва ёз-куз мавсумларда етиштирилади. Эрта бахорда экилганда кутарилаётган харорат шароитида усади ва ривожланади. Экишга мулжалланган кучатлар парникларда эртаги ок бош карамга ухшаш етиштирилади. Ёзда экиладиган гул карам уруглари июн ойининг урталарида оддий кучатхоналарга сепилиб, кучатлари июлнинг уртаси-августнинг дастлабки кунларида далага утказилади. Гул карам уғитга, айника, органик уғитга талабчан булади. Бинобарин, уни устиришда катта нормада гунг солиш(га 50-60 т) тавсия этилади. Бунда хар гектарга 3-4 ц.дан аммиакли селитра, 5-6 ц дан суперфосфат ва 1-2 ц дан калий тузи солинади.

Парваришлар - суториш, катор ораларини культивация ва чопик килишдан иборат. Гул карам устиришда шакллана бошлаётган карам бошчаларини куёш нури таъсиридан асраш агротехниканинг муҳим шартларидан хисобланади. Шунинг учун уни куёш нуридан соялантирилади, барглар туплами богланади ёки барглари кайрилади..

Саволлар:

1. Карма турлари, навларини айтингу
2. Карамни кесиб чиқиши ва таркалишу
3. Карам униши учун зарур харорату
4. Карам навларининг фарқи нимадау
5. Карам кучатини утказиш муддатлариу
6. Эртапишар карамлар неча дона барг хосил килганидан сунг карамбош урайдиу
7. Карам 500 ц/га хосил берса, тупроқдан неча кг N₂, P ва K ни олиб кетадиу
8. Карамни уругидан купайтиришни ижобий ва салбий томонлари нимадан иборату
9. Карманинг асосий касалликлариу
10. Гул карамни агротехникаси фарқиу

23-Маъруза. ИЛДИЗМЕВА САБЗАВОТЛАР ВА УЛАРНИ ЕТИШТИРИШ.

Режа:

1. Ахамияти, ишлатилиши.
2. Туманлашган навлари.
3. Илдизмеваларнинг биология хусусиятлари.
4. Илдизмеваларнинг парваришlash технологияси: Ер танлаш алмашлаб экишдаги урни, угитлаш, экиш муддатлари ва усуллари, экинни парвариш килиш.
5. Хосилни йигиб олиш

Адабиётлар: 4, 8, 9, 19.

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: карбон сувлар, азотли моддалар, ферментлар, витаминлар, истеъмолдаги сабзовотлар, вегетация даври, икки йиллик илдиз мевалилар, кургоччилик, томатдошлар, экиш схемалари, сизот сувлари, пархез таом, илдиз мевалар, мульчалаш.

1.1.Узбекистонда етиштириладиган илдизмевали сабзавотлар гурухига асосан сабзи, камрок лавлаги, турп ва шолгомлар киради.

Илдизмевалар таркибида куп миқдорда 10-15% курук моддалар жумладан 8-10% карбон сувлар, яхши сингийдиган азотли моддалар, витаминлар, ферментлар ҳамда минерал тузлар мавжуд.

Илдизмевалар таркибидаги углеводлар миқдори ва калорияси жихатидан биринчи уринда туради. Юрак - томир эсталикларини даволашдаги мухим омиллардан хисобланади изил сабзи витамин А га жуда бой, бу пархез овкат сифатида мухим ахамиятга эга. Лавлагининг таркибида витамин РР куп.

1.2.Келиб чикши ва таркалиши. Купчилик илдизмева сабза-вотлар Урта ер денгизи сохилларидан келиб чиккан. Улар кадим замонлардан бери экилиб бошланади. Хозир илдизмева сабзавотлар хамма жойда, айника, иклим шароити муътадил булган ерларга куп таркалаган. Бу экинлар республикамизда бутун сабзавот экинлари майлдонинг тахминан туртдан бир кисмини эгаллайди.

Марказий Осиёда сабзи куп миқдорда экилади, бу ерда сабзи экиш жуда кадимдан одат булиб колган. Узбекистонда сабзи истеъмолдаги сабзавотларнинг карийиб 15-16% ташкил этади. Ош лавлаги сабзига караганда кам майдонни, турп, шолгом ва айника петрушка сельдрей ундан хам камрок майдонни эгаллайди

Навлари: Сабзи навлари вегетация даврини узунлигига қараб, эртапишар экилгандан илдимевани техник пишига қадар 70-11- кун, уртапишар-110-130 кун ва кечпишар-130 кундан куп бўлади. Республикамизнинг барча районларида сабзининг қадимдан урта маҳаллий навлари Эртапишар Мушак-195, Уртапишар Сарик Мирзои 304, ва кизил Мирзои 228. Булардан ташқари янги яратилган нурли 70-уртапишар, Зийнатли-уртапишар ҳамда Европадан келтирилган уртапишар навлар Шантане 2461, Нантская 4 навлар экилади. Республикамизни барча вилоятларида лавлагини Бордо 237 нави, турпнинг Маргилон ва Андижон-9 навлари, шолғомни Наманган (ок) маҳаллий ва Самарқанд (кизил) ҳамда Петровская сарик навлари экилади.

1.3.Илдимевали сабзавотларнинг биологик хусусиятлари. Икки йиллик илдимевалар узун кун талаб қиладиган усимликлардир. Куннинг узун бўлиши илдимеваларнинг гуллаши ва ҳосил тутишини тезлатади, аксинча кун қисқа бўлса, уларнинг ривожланишини сусайтиради. Шимолда яратилган экин навлари жанубдан келиб чиққан навларга нисбатан бир мунча узун кун талаб қиладди.

Илдимеваларнинг ҳаммаси ҳам иссиққа унча талабчан эмас. Уларнинг урути 4-5⁰ ҳароратда униб чиқа бошлайди. Лекин уругининг униб чиқishi учун оптимал ҳарорат 20-25⁰ ҳисобланади. Бундай ҳароратда турп ва шолғом урути экилгандан кейин 3-6 кунда, лавлаги 5-10 кунда, сабзи 12-20 кунда униб чиқади. Шолғом, турпларни нормал узиши ва ривожланиши учун энг қулай ҳарорат 15-18⁰ ҳисобланади. Сабзи, айника, лавлаги иссиққа бирмунча талабчан бўлади. Уларнинг узиши учун 20-25⁰ ҳарорат оптимал ҳисобланади. Илдимеваларнинг деярли ҳаммаси совуққа бирмунча чидамли. Лавлаги 2-3⁰ гача, сабзи ва бошқа илдимевалар 4-5⁰ гача бўлган совуқдан унча зарарланмайди.

Лавлаги ва сабзининг жанубий навлари юқори ҳароратни яхши утқазади. Турп ва шолғом иссиқни унчалик хоҳламайди. Бу экинлар юқори ҳароратда тез пишиб утиб кетади: пук бўлиб мазаси бузилади ҳосили ҳам пасаяди.

Илдимевалар, айника сабзи ва сельдрей жуда ёрутсевар усимлик ҳисобланади. Лавлаги, сабзи сингари илдимева усимлик-лар илдиши бақувват бўлганлигидан курғокчиликка маълум даражада чидайди. Шолғом ва турп ҳаво ва тупроқ намлиги етишмаслигига чидамсиз бўлади.

Илдизмевалар технологияси. Ер танлаш. Илдизмевалар органик моддаларга бой утлок тупрокли ҳамда утитланган кумок ёки енгил соз буз тупрокли ерларда яхши усади. Боткок ва шур ерларни купчилик илдизмева усимликлар унчалик ёктирмайди. Лекин лавлаги огир соз тупроклар бир оз шурланган ерларда бошка сабзавотларга караганда яхшироқ усади.

1.4.Алмашлаб экишдаги урни. Сабзи, лавлаги, турп ва шолгом усув даврининг дастлабки пайтларда жуда секин усади ва бегона утлар босиб кетади. Шу сабабли уларни картошка, бодринг, карам ва томатдошлар каби, ерларни утлардан тозалайдиганлардан бушаган майдонларга жойлаштирилади.

Илдизмевалиларни, илдизмевалардан, полиз экинларидан, пиёздан кейин ҳамда хайдалган бедапояларга биринчи йили экиб булмайди, чунки бу ерларда бегона утлар жуда куп булади. Купчилик илдиз мевали сабзавотларни урути жуда майда булади. Шунинг учун уларга ерни экишга тайёрлаш хусусиятларидан бири, далани юзаси текис, тупроги майда ва юмшок булиши керак. Бунга экишдан олдин сифатли борона килиш йули билан эришиш мумкин.

Угитлаш. Илдизмевали сабзавотлар купчилик сабзавот экинларига караганда ерни унумдорлигига унчалик талабчан эмас. Лекин улар бутун вегетация даврида тупрокда озука булишини талаб килади. Юкори хосил олиш учун тупрок шароитига караб минерал угитлар куйидаги нормада солинади кг.га. Буз тупрокларда: № 120-150, фосфор 80-100, калий 40-50, утлоки ва утлоки-боткоккли тупрокларда, аот 80-100, фосфор 80-100, калий 40-50 кг.га соф холда, Калийли угитларни йиллик нормаси ва фосфорли угитларни 70-75% ер хайдашдан олдин солинади. Азотли угитлар вегетация даврида эгат ораларига озука хисобида 10-12 см чукурликка солинади.

Экиш муддатлари ва усуллари. Урта Осиёнинг иклим шароити илдиз мевали сабзавотларни бир нечта муддатда экишни тавсия килади. Эрта бахорда далага чикиш имконияти булиши билан жанубий ва марказий иклим зоналарда февралнинг охири ва мартни бошларида сабзи ва лавлаги экилади. Хосилни июнь июль бошларида йигиб олинади. Бунда сабзини Мушак 195 ва лавлагини Бордо 237 навлари экилади.

Бу муддатда уртапишар навларни экиш тавсия килинмайди, сабаби улар ёзда кунлар исиб кетгунча тулик хосил йигиб улгура-олмайдилар. Шолгом ва турп бахорда экилса хаддан ташкари эркаклаб кетади, хосили ёмон булади.

Шунинг учун улар факат ёзда экилади. Кеч кузда (15 ноябрь - 10 декабрь) каттик совук тушгунча сабзи ва лавлаги экилади. Бу муддатларда экишнинг авфзаллиги шундаки кукумда экинлар анча эртаги униб чикиб эрта серхосил булиб етилади.

Ёзги муддатларда сабзи, лавлаги, турп ва шолгом етиштирилади. Булар асосан такрорий экиш булади. Сабзи ва лавлаги 15 июндан 10 июлгача экилади. Турп билан шолгом эса июлни 2 ярмидан августни 10 ларигача экилади. Асосий келтирилган муддатлардан ташкари сабзини урта муддатларда яъни 20 апрелдан 5 майгача эса ҳам булади. Бунда иссиikka чидамлик сарик Мирзои 304 навини эккан маъкул. Хосили августда йигиб олинади.

Республикамизнинг марказий районларида сабзи августнинг иккинчи ярмида экилса усимлик кузда кишда ушиб, хосилини март-нинг охирида апрелда йигиштириб олса булади. Бу муддатда сабзининг эркаклаб кетмайдиган Нант 4 ва кизил Мирзои 228 навларини экиш керак.

Уругларни экишга тайёрлашнинг энг самарали усулларида бири дроздалашдир. Бу усул экиш нормасини икки марта камайти-ришга, уток килиш харажатларини кискартиришга ва хосилдор-ликни анча оширишга имкон беради.

Илдизмевали сабзавотлар каторлаб, лентасимон ёки кенг каторли килиб экилади. Лавлагини ва турпни илдизмевалари йирик булганлиги сабабли улар каторлаб, эгат оралари 60-70 см ёки лента шаклида кушкаторлаб 50K20% см, шолгом эса лента шаклида кушкаторлаб ленталар ораси 40-50 см, лентадаги каторчалар ораллиги 15-20 см колдирилиб ёки лентада сочма усулларда экилади. Усимликлар ягана килинаётганда усимликлар ораллиги кераклигича колдирилади.

Юкорида келтирилган экиш схемаларида усимликлар каллилиги бир гектарда куйидагича булади: 420-550 минг сабзида, шолгомда 300-400, турп ва лавлагиди 150-200 минг дона.

Ўзбекистонда илдизмевали сабавотлар СКОН-4,2 осма сеялкада экилади. Эрта бахорда экиладиган ерлар кузда эгат олиб куйилади. Уруглар эгатни устига ёки текис далага экиладиган булса усимликларни униб чиккандан сунг, биринчи сувдан олдин эгат олиниб сутурилади.

Ўзбекистонда куйидаги экиш нормалари тавсия килинади: лавлаги учун 15-16, турп ва сабзини уруглари 5-6 ва шолгомники 2 кг, га. Сабзи ва лавлаги кеч кузда экилса ёки

асосий ҳосил етил-гунча барра кукатидан ора-чора фойдаланиш ҳам кузда тутилган булса, бундай ҳолларда экиш нормаси 25-30% купайтирилади. Лав-лаги уруғи 2-4 см сабзи ва бошқа илдизмевали сабзавотларни уруғи 1-2 см, енгил кумок тупрокларда эса 3 см чуқурликгагача экилади.

1.5.Экинни парвариш қилиш. Эрта баҳор ва кеч кузда экилган илдизмевалар ёмгирдан кейин ҳосил булган каткалоқдан каттик қийналади. каткалоқнинг олдини олиш учун мулчалаш, яъни экилгандан кейин эгат устига 1-1,5 см калинликда чиринди сочиб чиқиш яхши самара беради. Экинларга узок вақт жилдиратиб сув қуйиш ҳам каткалоққа қарши қурашда муҳим тадбирлардан ҳисоб-ланади. Илдизмеваларни парвариш қилишда бегона утларни йуқо-тиш ниҳоятда мураккаб ва сермеҳнат ишдир. қатор ораларидаги бегона утлар КОР-4,2, КРН-2,8 А культиваторлари ёрдамида культивация қилиш, ленталар ораларидагиси эса уток қилиш йули билан йуқотади.

Ўзбекистон шароитида сабзи экилгунга қадар ва сабзи экилгандан сунг майсалар қурингунга қадар гербицидлар Илдизмевали сабзавот экинларини уз вақтида яғаналаш ниҳоятда қатта аҳамиятга эга. Илдизмевалилар иккинчи яғанадан сунг қатордаги усимликлар ораликлари қуйидагича бўлиши керак: сабзи 5-7 лавлаги, шолғом 8-12 ва турп 10-15 см.

Илдизмевалилар етиштиришда ернинг оптимал намлиги дала сув сигимига нисбатан 70-80 процент бўлиши лозим. Ер ости сувлари чуқур жойлашган, буз тупроқли ерларда эрта баҳорда экилган илдизмевалар ёппасига куқариб қикқандан кейин, одатда апрел ойининг иккинчи ярмидан бошлаб суғорилади ва бу 12-15 кунда бир марта такрорланиб турилади. Илдизмевалиларнинг ҳосил бўлиши тезлашган пайтда май ойининг урталаридан бошлаб экинлар ҳар 7-10 кунда суғорилади, майни охири ва июнда ҳар 5-6 кунда суғорилади. Умумий суғориш сони 8-9та бўлади. Сизот сувлар яқин жойлашган ерларда қамрок суғорилиб, умумий суғориш сони 6-5 марта бўлади. Кеч кузда экилганда ҳам суғориш режими тахминан шунга ухшаш бўлади.

Ёзда экилган экинлар майсалари ёппасига қурингунга қадар тез-тез, ҳар 3-4 кунда бир марта уруғсуви бериб турилади. Майсалар текис куқаргандан кейин суғоришлар ораси 8-10, ҳосил етилиши даврида эса 12-15 кунгча узайтирилади. Кечки илдизмевалар ҳосилини йигиб-теришга 2-3 ҳафта қолганда суғориш тухтатади. Шунда вегетация

даврида 10-12 марта суғорилади. Сизот сувлари яқин булган ерларда суғоришлар ораси узоқроқ бўлиб, умумий суғориш сони қисқаради ва 6-8 марта суғорилади.

Кеч баҳорда ёки урта муддатда сабзи экилгандан ҳар 5-6 кунда суғорилади ва жами 8-10 марта суғорилади. Августни иккинчи ярмида экилган сабзини ундириб олиш учун ҳам жилдиратиб суғориш керак, сентябр-октябр бошларида 4-5 марта суғорилади. Баҳорда бу экин деярли суғорилмайди ёки баҳор курук келса 1-2 марта сув берилади. Илди́змеваларни суғориш нормаси экиннинг тури ҳамда тупроқ шароитига қараб гектарига 500-600дан 800-900м³ белгиланади.

Қасаллик ва зарарқунандалар. Илди́змевали сабзавотлар қасалликлардан уншудринг, зарарқунандалардан шира билан айника қуп зарарланадилар. Қураш қоралари олтингугурт қуқуни билан оҳақни 1:1 гектарига 15-20 кг нисбатда аралаштириб ёки қоллоид олтингугуртнинг бир процентли ва бошқа руҳсат этилган дорилар суспензияси пурқалади.

Ҳосилни йиғиб олиш. Баҳорда, қузда ва қиш бошларида экилган сабзи ва лавлағи икки босқичда ҳосили йиғиштириб олинади. Майсалар қуриқгандан 50-60 кун утғач, сабзини илди́змевасини диаметри 1,5-2 см, лавлағини эса 3-3,5см, га етганда яғана қилиш ҳисобидан ҳосил тери́б олинади ва барғлари қесилмасдан бог-бог қилиб, шу қуннинг узидаёқ сотишга юборилади.

Ёзда экилган барча илди́змевалди сабзавотларни ҳосили бир марта октябр охири ноябр бошларида ёғингарчилиқ бошланмасдан қаттиқ совуқ тушмасдан олдин йиғиштириб олинади.

Илди́змеваларни қартошқа йиғадиган қомбайнда ҳам йиғиштириш мумкин. Бунда олдинига палағи палағ урадиган машина ёрдамида олинади, қовлағичлар ишлатилганда, иш унуми 1,5-2 баробар ортади. Ҳосилни йиғиш саралаш ва ташиш вақтида илди́змеваларни уринтирмасдан, шикастлантирмасликка ҳаракат қилиш керак, булмаса зарарланган илди́змевалар яхши сақланмайди.

Саволлар:

1. Нима учун илди́змевалилар экиладиган майдонларга янги гунг солинмайди
2. Нима учун сабзини Мирзои Сарик ва Мирзои қизил навлари туксонбости қилиб экилмайди
3. Сабзининг эртақи нави қайсилар ва қачон экилади

4. Нима учун турп ва шолгом бир муддатда июл ойида экиб етиштирилади
5. Бир дона лавдаги уругидан 2 ва ундан куп нихоллар кукариб чикшига нима сабабу
6. Илди́з мевали усимликларни инсон ҳаётидаги аҳамияти нимау
7. Сабзининг келиб чиқиш ватаркалишиу
8. Илди́з навларини усиши-ривожланиши учун кераклихароратларни айтингү
9. Тупрок намлигига шолгом – турпларни муносабати кандайу
10. Илди́з мевалилар учун кандай ер танланадиу

24-Маъруза: ПИЁЗЛИ САБЗАВОТЛАР ПАРВАРИШИ.

Режа:

1. Пиёзни аҳамияти, ишлатилиши.
2. Пиёз аҳамияти, классификацияси, навлари ва биологияси.
3. Агротехникаси (ер танлаш алмашлаб экишдаги урни, утитлаш, пиёз экиш, парвариш қилиш ва ҳосилни йиғиш).
4. Саримсок.
5. Алмашлаб экишни пиёзли сабзовотларни купайтиришдаги урниу

Адабиётлар 4, 8, 19, 20.

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: исли пиёз, пиёзгулдошлар, порей пиёз, эфир мойлари, азотсиз экстрактив моддалар, зиравор, масаллик, оптимал, харорат, каткалок, куртак, алмашлаб кэиш, майсалар, яганалаш, гулновда, яхлаган, табобат, юрак-кон томир системалари, пестицид.

1.1. Аҳамияти ва ишлатилиши. Пиёзлар группасига пиёзгулдошлар оиласи (*Allium seа* L.) авлодига мансуб барча сабзавот усимликлари киради. Улардан энг мухими оддий (бош) пиёз билан саримсоқдир. Порей пиёз, Исли пиёз (Жусей) ва бошка турдаги пиёзлар уларчалик аҳамиятга эга эмас.

Оддий пиёзнинг Урта Осиё навлари таркибида: 14-16,5% курук модда, 7,8-11,1% шакар, шу жумладан, 4,8-8,2% сахароза ва 1,37-6,9мг,% витамин С бор. Тошкент яқинида етиштирилган пиёзнинг яшил баргида 19-57 мг% гача витамин С борлиги аникланган. Пиёз А, В1, В2 витаминларга ҳам бой. Оддий пиёз таркибида эфир мойларининг миқдориға қараб уч группаға, яъни аччик (таркибида эфир мойи жуда куп), ярим аччик ва чучук пиёзларға булинади. Пиёз таркибида лимон ва олма кислоталари, сиртки курук пустларида эса кверцетин деган сарик буёк моддаси булади.

1.2. Саримсок таркибида озик моддаларнинг куплиги жихатидан факат оддий пиёздангина эмас, балки бошка барча сабзавотлардан ҳам анча устун туради. Унинг таркибида (уртача) 64-66 фоиз сув: 6,7% азотли моддалар: 0,06 % ёглар: 26,3% азотсиз экстрактив моддалар: 0,77% клетчатка: 1,44 фоиз кул ҳамда 10-12 мг% витамин С булади. Саримсок таркибидаги учувчан эфир мойлари унга узига хос маза ва хид беради.

Пиёз таомларга зиравор, масаллик сифатида ишлатилади ва янгилигича (хомлигича) истеъмол килинади, консервалашларда кулланилади.

Пиёзли сабзавотларнинг фитонцидлик хоссаси юкори булгани учун улар табобатда ошкозон хасталиклари, нафас олиш аъзолари, юрак контомир системалари даволашда ишлатилади.

Оддий (бошли) ва саримсок пиёзлар асосий махсулотлардан булиб, поррей пиёзи ва айника “Жусей” (исли) пиёз ҳам республикамизда кисик майдонларда етиштирилмоқда, истеъмол килинмоқда

Ўзбекистонда пиёзни куйидаги навлари туманлаштирилган. Андижон ок пиёзи - кечпишар, Ленинобод - кечпишар, Самарканд кизил пиёзи - кечпишар, Маргилон пиёзи - кечпишар, коратол нав пиёз - урта пишар, Фароб 167 нав - кеч пишар, Каба - кеч пишар, Тунгон 156 - кеч пишар, Испан 13 нави - кечпишар.

1.3. Биологик хусусиятлари. Бош пиёз навига, экилаётган районида, парваришлаш усулига караб, икки, уч ёки куп йиллик усимлик булиши мумкин. Урта Осиёда уругидан экилган пиёз биринчи йилиёк йирик пиёзбош хосил килиб. келгуси йилда гулновда чикариб гуллайди ва уругхосил килади.

Пиёз совукка чидамли усимлик. 3-5⁰ хароратда уруги унади ва пиёзбоши усади, аммо пиёз учун оптимал харорат 18-20⁰ хисобланади. Майсалари 2-3⁰ гача булган паст хароратга бардош беради, етилган пиёз бошлари эса 10-12⁰гача булган киска муддатли совукка ҳам чидайди. Яхлаган ва аста секин яхдан тушган пиёзлар хаётчанглигини йукотмайди. Пиёзнинг барги 6-7⁰гача совукка бардош бера олади. Пиёзнинг уруги каттик пуст билан уралган ва таркибида эфир мойи бор. Шунинг учун улар секин буртади ва унади. Бахорда экилган пиёз уруги 15-18 кунда майса чикаради.

Пиёз майсалари дастлаб жуда секин усади, шунинг учун ҳам уларни бегона утлар босиб нормал усишига халал беради, улар каткалоқдан, намнинг етишмаслиги ва бошка нокулай

шароитда каттик кийналади. Шу сабабли пиёзни усув даврининг бошида яхши парвариш килиш талаб этилади.

Урта Осиё маҳаллий пиёзларининг усув даври уругидан экилганда 130 кундан 160-180 кунгача давом этади. Уруглик пиёз бош утказилгандан то уругпишгунча 110-130 кун утади. Пиёзбошнинг шаклланиши учун энг кулай харорат 20-30°. Харорат бундан пастрок булса, пиёзбош суст усади: харорат юкори булса, таркибидаги пластик моддаларнинг нафас олишига сарфланиши туфайли пиёзбош майда булиб қолади.

Шимолий нав пиёзларининг усиши учун 15-18 соатлик узун кун кулоай ҳисобланади. Узун кун шароитида пиёзбош тез шаклланади, барварк этилади ва анча йирик булади. Киска кунда эса пиёзбошларнинг шаклланиши ва етилиши кечикади. Жанубий пиёз навлари учун, аксинча, киска кун керак. Бу пиёзлар шимолда экилди, узун кун шароитида пишмай қолади.

Пиёз шаклланаётган вақтда пиёз тубидаги серэт пардалар орасида бошлангич муртак булиб, булардан эса келаси йили гулпоялар ёки майда ёш пиёзбошлар ҳосил булади. Куртақдан янги пиёзбош ҳосил булиши ёки гулпоя чикши турли сабабларга, биринчи навбатда пиёзбошнинг шаклланиш хароратсига боғлиқ.

1.4. Агротехникаси. Ер танлаш. Пиёз унумдор, енгил, лойка утирган ерларда, шунингдек, соз тупроқли ва яхши утитланган кумлок тупроқли ерларда яхши усади. Пиёзнинг алмашлаб экишдаги урни ва утитлаш системаси унинг ердаги озик моддаларга ва бегона утларга булган муносабатига қараб белгиланади.

Утитлаш. Ўзбекистоннинг буз тупроқли ерларида пиёз минерал утитлар солинишига жуда талабчан ва азот, фосфор, калий биргалиқда солинганда айника мул ҳосил беради. Пиёз органик утитлар - гунг, компост солишга ҳам жуда талабчан экин. Аммо пиёз экилган ерга гунг солинса, пиёз кеч этилади ва купинча ер бегона утларнинг уруглари билан ифлосланади. Шунинг учун гунг шу ерга пиёздан олдин экиладиган экинларга солиниб, пиёзга эса чиринди ёки тупрок фекалий компости солинади.

Ўзбекистонда ер ҳайдаш вақтида гектарига 20-25 ц яхши чириган гунг, 1 ц аммиак селитраси ва калий тузи ҳамда 2-2,5 ц суперфосфат усув даврида эса қушимча озик сифатида гектарига 1,5-2 ц селитра ва 2-2,5 ц суперфосфат солиш тавсия этилади. қушимча озик биринчи чинбарг пайдо булганда ва пиёз шакллана бошлаганда берилади.

Пиёз экиш. Урта Осиё пиёз уч муддатда эрта бахорда, ёз-кузда ва кеч кузда экилади. Эрта бахорда пиёзни феврал охири-март ойларида экилади. Ушбу сабзавотни ноябр охири-декабр бошларида - “90 бости” номланишда экиш ҳам самаралидир.

Ёз кузги муддатли пиёз уруглари августда - сентяб бошларида сепилади. Бунда унинг хосили май ойидан етила бошлайди, август ойидан тулик пишади, пиёзбошлари йирик булади. Бирок кишки саклашга ярамайди купрок чикинди беради. Пиёз уруги сабзавот сеялкаларида лента шаклида куш каторлаб ёки уч катор килиб экилади. Бунда ленталар ораси 50-70 см ва лентадаги катор ораси 15-20 см булиши керак. Пиёз уруги огир тупрокли ерларда 1-2 см, енгил тупрокли ерларда эса 2-3 см чуқурликда СОН-2.8 сеялкаси билан экилади. Уругэкиш нормаси августда ва кеч кузда экишда гектарига 12-14 кг, бахорда эса 10-12 кг.

1.5.Пиёзни парвариш килиш. Август ойида экилган пиёзлар парвариши уругсуви беришдан бошланади ва майсалар кийгос кукариб чиккунча хар 3-4 кунда суториб турилади. Бахорда экилган пиёзлар кишда тупланган нам хисобига униб чикади, лекин ёмгирдан кейин хосил булган каткалок уларга ёмон таъсир этади. каткалок уругсуви бериш йули билан юмшатилади. Бахорда экилган пиёз уруглари 2-3 хафтадан, ёзда экилганлари эса 7-10 кундан кейин униб чикади. Пиёз чиканидан кейин уток ва ягана килишга киришилади.

Бегона утларга карши кураш. Майсалар униб чиккунча ва буйи 6-8 см.га етганда бир йиллик, бир ва икки паллали бегона утларга карши рухсат этилган гербицидлар ишлатилади.

Пиёз икки-уч марта ягана килинади, одатда, бу иш уток килиш билан биргаликда бажарилади. Бахорда экилган пиёзлар апрель май ойининг бошида, усимликнинг буйи 7-8 см.га етганда биринчи марта ягана килинади. Бунда усимлик ораларида 3-5 см.дан масофа колдирилади. Августда экилган пиёзлар эрта бахорда ягана килинади. Биринчи яганадан бир ой кейин, усимлик буйи 15-20 см етганда иккинчи марта ягана килинади. Иккинчи , охирги яганалашдан усимликлар орасида 7-8 см масофа колдирилади. Пиёз экини усув даврида 4-5 марта культивация килинади ва усимлик атрофидаги ҳамда каторлар орасидаги тупрокни юмшатиш учун 1-2 марта чопик килинади.

Сугориш. Пиёз, айника уругининг униш ва пиёзбоши шаклланиш вактида намни куп талаб килади. Августда экилган

пиёз куздаёк, кеч кузда ва бахорда экилганлари эса апрель ойидан бошлаб, бахорги егингарчилик тухтаганидан кейин суғорилади. Пиёз ер ости суви чуқур жойлашган буз тупроқли ерларга экилган пиёз тахминан 12-13 марта, ер ости суви 1-2 м чуқурликда жойлашган участкаларда 7-9 марта суғорилади.

Касаллик ва зараркунандаларга. Сохта ун-шудринг касаллиги ва (переноспороз) - сарик губор пайдо бўлиб, барг ва гул поя-лар саргайиб сулиб қолиши билан ифодаланадиган касаллик. Касаллик кузгатувчиси - замбурут. Кураш чоралари - усимликка рухсат этилган пестицидлар пуркалади.

1.6. Саримсок - пиёзсимон усимлик бўлиб, кискарган поя-туп ва паллалардан иборат мураккаб пиёзбош ҳосил қилади. Барги ясси, чизикли асосан думалок найсимон. Улар асослари билан бир-бирига каттик ёпишиб, сохта поя ҳосил қилади. Сохта поя марказидан уруглаётган саримсокнинг гул пояси (карнайи) утади. Саримсокнинг палласи калин, зич эт билан копланган битта ёки бир нечта ушиб нуктаси бўлган куртақдир. Паллалар саримсок тубига бирикади ва умумий курук пустга уралади. Саримсок - совуққа чидамли усимлик. У 3-5⁰ ҳароратда кукариб чиқа олади ҳамда -7-8⁰ совуққа бардош бера олади. Саримсокнинг ушиби учун оптимал ҳарорат ривожланишининг биринчи даврида 5-10⁰, паллалар ҳосил қилаётганда 15-20⁰ ва етилаётганда 20-25⁰ бўлиши керак. 20⁰ дан юқори ҳароратда илдизларнинг ушибини тухтатиб қуяди. Лекин саримсокнинг жанубий (кургокчилик) районларида етиштирилаётган навлари иссиққа чидамлилиги билан ажралиб туради.

Ўзбекистонда саримсокни қуйидаги навлари етиштирилади: **Ўзбекистон бинафша ранг саримсоғи** - тезпишар, **Андижон саримсоғи** - тез пишар, **тунгон саримсоғи** - тез пишар.

Алмашлаб экишда, саримсок бодринг, қарам ва картошка экилган ерларга экилгани маъқул, чунки бу экинлардан кейин дала ерларига саримсок пиёз бодринг, полиз экинлари, ковокча, қулча ковок, эртанги қарам ҳамда картошкадан кейин экилса мақсадга мувофиқдир. Саримсок пиёзларга органик ва минерал уғитлар қуйидаги миқдорда тавсия этилади: чириган гунг гектарига 20-30 т, азот гектарига 200 кг, фосфор 140-160 кг, калий 60-75 кг. Саримсок пиёзни биринчи сентябрдан 15 сентябргача эккан маъқул. Саримсок пиёз асосан палласидан экилади. Экилаётганда паллаларнинг оғирлиги 10-20 гр.дан кам бўлмаслиги керак. Паллаларни экиш миқдори гектарига 8-14 ц.

Айни пайтда саримсок пиёзни уругдонасини ҳам экса булади. Бунда экиш миқдори гектарига 50-100 кг. Саримсок пиёз лентасимон 2 ва 3 каторлаб экилади, лентанинг ва катор ораларининг кенглиги 70 см булиши керак. каторлар экилганда улар оралиги 15 см, икки каторларда эса 20 см булади. катордаги усимликлар оралиги эса 6-8 см колдирилади. Шундай килиб экиш схемаси: 50К20х5-6 см, 40К15К15х7-8 см. 1 га ерда усимликнинг сони 450-600 минг донани ташкил этади. Саримсок пиёз усув даврида 4-6 марта культивация килинади. кишга кириш олдиан кузда саримсок 2-3 марта суғорилади. Бахорда хаммаси булиб 4-5 марта суғорилади.

Ўзбекистон шароитида саримсок зараркунандалардан пиёз пашшаси, касалликлардан сохта ун-шудринг касаллиги билан зарарланади. Бунинг олдини олиш учун усимликка рухсат этилган пестицидлар белгиланган муддатларда пуркалади.

Саволлар:

1. Пиёз ноябр декабр ойларида туксонбости килиб экилганда экиладиган уругни 25-30% ли куп сарфланишига сабаб нимау
2. Пиёз 1 га. дан неча ц, уруг берадиу
3. Пиёз уругини етиштириш учун пиёз бош қачон ва қандай схемада экиладиу
4. Саримсок гулпојаси устки қисмида ҳосил буладиган саримсокчалардан экилса, куп булакли саримсок берадими ёки бир булаклимиу
5. Фистонцидлик нимау
6. Пиёз ва саримсок аччиклиги нимага боғлику
7. Пиёзли усимликларга қандай ер танланадиу
8. Пиёзли усимликларни озик элементларига талабчанлиги қандайу
9. Пиёз экишни қулай муддатиу
10. Саримсок қачон экиладиу

25-Маъруза: Кириш. Полиз экинларининг халқ хужалигидаги аҳамияти ва тарқалиши. Полизчилик турлари ва маконлари

Режа:

1. Полизчилик фанининг асослари ва вазифаси.
2. Полиз экинларининг халқ хужалигидаги аҳамияти, меваларининг қимёвий таркиби.
3. Полиз экинларининг келиб чиқиши ва тарқалиши.
4. Полизчилик турлари.
5. Полизчиликнинг асосий маконлари.

Адабиётлар 5, 6, 7, 21

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: полиз экинлари, ковун, тарвуз, ошқовок, атеросклероз, табобат, маданий турлар, клетчатка, қанд, оксил, мой, кул моддалари, лалмикор деҳқончилик, тропик, субтропик, муътадил, жангил полизчилиги, ҳимояланган жой полизчилиги, чул полизчилиги, қовунчилик маконлари.

1.1. Ковун, тарвуз ва ковок етиштиришни урганувчи кишлок хужалик соҳасига полизчилик деб айтилади. Полизчилик фан сифатида ковун, тарвуз ва ковок усимликларининг морфологик ва биологик хусусиятларини урганиш билан бирга, улардан юкори ҳосил етиштириш йулларини ҳам ишлаб чиқади.

Полизчиликнинг асосий вазифаларидан бири-аҳолини йил давомида полиз меваларига булган талабини қондириш, юкори технологиялар, механизацияни куллаб, сарф-харажатларни қамайтиришдир.

Ўзбекистон асрлар давомида полизчилик кенг ривожланган минтақа ҳисобланиб, сунгги йилларда бу соҳага янги технологиялар жорий қилиш устида илмий изланишлар олиб борилмоқда. Бундан мақсад, мавжуд булган экин майдонларини кенгайтирмасдан, янги технология ва механизацияларни жорий этиб, юкори ва сифатли маҳсулот етиштиришдир.

Соҳа мутахассислари олдида Ўзбекистонда полиз экинларининг потенциал ҳосилни янада ошириш, аҳолини полиз мевалари билан мумкин қадар узокрок вақт таъминлаш, бунинг учун эса эртапишар ва узок вақт сақланувчан навлар яратишдек муҳим масала турибди.

Сунгги йилларда бир қанча янги навлар яратилди, уларнинг агротехникаси ишлаб чиқилди, фан соҳасида эришилган ютуқларни амалда куллаб юкори ҳосил олишга эришилмоқда. Лекин Республикамизда қуп сифатли навлар эқилмай йуқулиб кетганлиги ачинарли ҳолдир. Эндиликдаги вазифалардан бири уларни тиклаш ва жорий этишдан иборатдир.

1.2. Полиз мевалари барча мамлакатларда аҳоли севиб истемол қиладиган озиқ-овқатдир. Чунки улар пархез, шифобахш, янгилигида ва қайта ишланган ҳолда ейиш мумкин. Тибиёт институтининг маълумотича аҳоли жон бошига бир йилда 98 кг, шу жумладан 54,5 кг қовун, 36,5 кг тарвуз ва 7 кг ковок истеъмол қилиниши керак. Қовундан асал (бекмес), тарвуз асали (нардек), шинни, тузланган ва қоқи қилиб

ейилади. Қовун меваси таркибида 11-20 % курук модда, ш.ж. канд 5-18 %, оксил 0,6 %, клетчатка 0,8%, мой 0,2 %, кул-0,6%. Қовун меваси С витаминига 30-40 мг, коротин 1,5-2 мг %, РР-1-2 мг %, калий, кальций, фосфор, олтингургут, темир, кобальт тузларига бой. Қовун таркибидаги фолат кислотаси организмда кон ишлаб чиқиш учун зарурдир. Қовун меваси бронхит, сил, ревматизм, юрак ва буйрук касалликларини даволашда ишлатилади.

Тарвуз меваси таркибида урта хисобда 10-12 % курук модда, шу жумладан, 6-11 % шакар, 0,5 % оксил, 0,5 % клетчатка. 0,1 % кул моддалари мавжуд. Тарвуз меваси С витаминига (5-10 мг %). А; В₁; В₂; РР ва бошқа витаминларга бой. Бундан ташқари улар таркибида темир, кальций, калий ва олтингургут тузлари бор. Кандли диабет, юрак-томир касалликлари, атеросклероз, камконликни, буйрак касаллигини даволашда тарвуз мевасидан фойдаланилади.

Ковок меваси пишган, димланган ва ковурулган ҳолда истеъмол қилинади. Ундан шарбат ҳам тайёрланади. Ковок мевасида 10-15 % курук модда булиб, шундан 4-11 % кандни ташкил этади. Бундан ташқари унинг таркибида 0,7 % клетчатка, 0,5 % оксил, 0,2 % мой, 0,6 % кул моддалари, куп миқдорда минерал тузлар ва витаминлар бор.

Ковок меваси атеросклероз, жигар, буйрак, ошқозон, юрак хасталикларига даво булиб, уруг қайнатмаси гижжа хайдаш хусуситига эга.

Полиз экинлари уруғларида куп миқдорда шафобахш мойлар бор. Қовун ва тарвуз уруғлари мағзида 31-56 % гача мойлар булади. 1 гектар қовун ва тарвуз экин майдонларидан 60-100 кг мой олинса, ковок экинлари 1 гектар майдонидан 360-400 кг; баъзи бир навларидан эса 600-700 кг мой олиш мумкин.

Полиз экинлари ем-хашак сифатида чорвачилиқда куплаб ишлатилади. Шу билан бирга полиз экинлари галла, пахта, сабзовот ва хашаки экинлар учун яхши утмишдош хисобланади.

Полиз экинларининг баъзи турлари ва анвлари жанубий мамлакатларда манзарали усимлик сифатида ҳам экилади.

1.3.. Полиз экинларининг келиб чиқиши ва тарқалиши.

Маданий қовунлар Хиндистон, Ирок, Афғонистон, Марказий ва кичик Осиёдан келиб чиккан. Бу мамлакатларда хозиргача қовуннинг ёввойи турларидан тортиб то ширинлиги буйича тенги йук навлари усади. Мисрда 3-4 минг йиллар олдин қовуннинг ярим маданий шакллари булганлиги қадимги

кабр тошларида чизилган расмлардан маъкул. Марказий Осиёда ковунлар эрамиздан олдинги IV асрда етиштирилган. Бу тугрида кадимий Хоразм шаҳарларидаги архелогик казилмалардан топилган ковун уруглари далолат беради.

Эрамизнинг IV асрида румда ковун кенг майдонларда устирилган.

Тарвуз усимлигининг келиб чикиш маркази Жанубий тропик ва Марказий Африка хисобланади. Тарвузнинг шаклланиши ва таркалиш маркази Мисрдир.бу ерда тарвуз 4000 йил аввал маълум булган.

Тарвузнинг келиб чикиши марказларидан бири Хиндистондир. Эрамиздан олдинги Iасрда бу ерда тарвуз етиштирила бошлаган.

Ковокнинг барча маданий турлари Америкадан келиб чиккан, шу жумладан, йирик мевали ковок-Жанубий Америка, каттик пустли ковок-Шимолий Америка ва мускат ковоклари-Жанубий Мексика ва Марказий Америкадан келиб чиккан. Археологик казилмалар курсатишича, ковокнинг маданий шакллари эрамиздан 3000 йил аввал инсониятга маълум булган.

Полиз экинлари ер куррасининг тропик, суптропик ва муътадил иклимли барча мамлакатларда етиштирилади. Жахон буйича полиз экинлари экиладиган майдон 2,8-2,9 млн. гектарни ташкил этади. Шулардан 70 %-тарвуз, 20 %-ковун ва 10 %-ковок экинлари ташкил этади. Бутун дунё буйича полиз махсулотини ишлаб чиқариш курсаткичи: тарвуз-23-26 млн.тонна, ковун-6,4-6,6 млн.тонна, ковок-4-5 млн тонна ташкил этади.

Полиз меваларини энг куп етиштиришдаги мамлакатлар каторига Хитой, Хиндистон, АКШ, Россия Федерацияси, Ўзбекистон Республикаси, Япония, Украина киради. Бу мамлакатларда 1 млн. тоннадан ортик махсулот ишлаб чиқарилади. Мексика, Испания, Италияда 500 минг тонна полиз мевалари етиштирилади. Полиз экинларининг йирик майдонлари Козогистон, Миср, Руминия, Югаславия, Болгария, Греция, Эрон, Афғонистон, Якин Шарк мамлакатлари, Марказий ва Жанубий америка ва Австралияда жойлашган.

Тарвузнинг 95 % турли намуналари Россиянинг жанубида, АКШ, Хитой, Япония, Кичик ва Марказий Осиёда мамлакатларида тупланган.

1.4. Ўзбекистон Республикасида тарқалган полизчилик турлари:

1. Суғориладиган ер полизчилиги-бунда полиз экинлари усув даври давомида 10-14 маротаба суғорилади. Мамлакатимизда суғориладиган полиз экинлари майдонлари 88-90% ни ташкил этади.

2. Лалмикор полизчилик-бунда полиз экинлари денгиз сатҳидан 1200-1500 метр баландликда булган, чириндига бой, тук тус буз тупрокли ва табиий ёгин миқдори 545 мм гача буладиган тоғ олди зонасида ёки денгиз сатҳидан 500-700 метр баландликда жойлашган типик буз тупроқлар ва ёгин миқдори 250-300 мм буладиган адир текисликларда суғорилмасдан етиштирилади. Лалмикор полиз экинлари майдони умумий полиз майдонининг 9-10 %ини ташкил этади.

3. Ярим суғориладиган полизчилик-бунда полиз экинлари сув танқис булган тоғ олди зоналарида етиштирилади. Бундай ерларда асосан тарвуз экилиб, экиш олдидан бир марта ва усув даври 1-2 марта сув хавзаларида тупланган ёгин сувлари, шунингдек тоғ булоқлари билан суғорилади.

4. Жангил полизчилиги-бу ерларда полиз экинларининг кечки навлари суғорилмасдан, ер ости сизот сувлари хисобига етиштирилади. Экиш муддатлари бу ерда бироз кечиктирилади. Бу турдаги полизчилик дарё буйларида, сизотсувлари ер юзасига якин жойлашган ерларда кенг тарқалган.

5. Чул полизчилиги-бундай ерларда полиз экинлари кумга ёки хандақлар казиб экилади. Бу полизчилик турида ҳам ер юзасига жойлашган сизот сувларидан фойдаланилади.

6. Химояланган жой полизчилиги-мамлакатимиздаги бу полизчилик майдонлари деярли катта эмас. Полиз экинларидан (ковун ва тарвуз) эрта ҳосил олиш учун плёнкали иссиқхоналардан ва кичик хажмдаги плёнкали қурилмалардан фойдаланилади.

Ўзбекистонда асрлар давомида ковун ва тарвузларнинг бир канча дунёда тенги йук навлари яратилиб, ковунчилик маконлари шаклланган. ҳозирги кунда ушбу ковунчилик маконлари қуйидагича тавсифланади:

1. Хоразм ковунчилик макони. Шимолий-Қорақалпоқ ва Хоразм-Қорақалпоқ ҳудудларини қз ичига олади. Бу ердаги иқлим кесикн континентал, киш даври узок. Тупроқлари шурланган, чул зонасининг утлоқи турларига оид. Бу маконда 30 дан ортик ковун турлари экилади.

2. Тошкент ковунчилик макони. Бу макон Тошкент, Сирдарё ва Жиззах вилоятларини уз ичига олади. Киш даври бир мунча юмшок, ёзи қуруқ ва жазирама. Тупроқларнинг

типик буз, утлоки-буз, утлоки ва оч тусли буз турлари таркалган.

3. Фаргона ковунчилик макони. Фаргона водийсининг Андижон, Наманган ва Фаргона вилоятларининг текис худудида жойлашган. Киш мавсуми юмшок, ёзи иссик, ёгин миқдори камлиги билан таърифланади. Ерлари утлоки ва утлоки-боткок, оч тусдаги ва типик буз тупроклари шурланмаган ёки кам шурланган.

4. Зарафшон ковунчилик макони. Зарафшон дарёси хавзасида жойлашган булиб, Самарканд, Навоий, Бухоро вилоятларини камраб олади. бу ерларнинг иклим шароити барча текис ерли туманларида полиз экинларини суториб етиштиришга, тоғ олди туманларида эса лалмикор ерларда етиштиришга имкон яратади. Бу маконда асосан шурланмаган типик ва оч тусли буз, утлоки ва боткок тупроklar. Бухоро вилоятида эса шурланган утлоки ва утлоки такир тупроklar таркалган.

5. Жанубий ковунчилик макони. Сурхонадарё ва Кашкадарё вилоятларини уз ичига олади. Киш даври бу ерда жуда ҳам юмшок, ёзи жазирама. Ковунларни галла экинларидан кейин такрорий экин сифатида етиштириш мумкин. Тупрок турлари ранг-баранг.

Саволлар:

1. Полиз экинларининг инсон ҳаётидаги аҳамияти,
2. Полиз маҳсулотларини халқ хужалигидаги аҳмияти,
3. Полиз ва сабзавот экинлари уртасида қандай ухшашлик ва фарқлар бору
4. Полиз экинлари ва турларининг яна қандай хусусиятларини биласиу
5. Полиз экинларидан қайси бири инсониятга олдинроқ маълум булгану
6. Сиз яшайдиган жойда полиз экинларининг қайси турлари ва навлари етиштириладиу
7. Полиз экинларининг ватани тарқалиши.
8. Полизчиликнинг узбекистонда тарқалган турлари.
9. Полизчилик маконларини айтинг,
10. Полиз экинларининг кимёвий таркибини биласизми,

26 -маъруза: Позил экинларининг ботаник таснифи ва навлари.

Режа:

1. Ковокгуллар оиласи вакиллариининг кискача тавсифи.
2. Cucumik авлоди таснифи.
3. Citruilik авлоди таснифи.
4. Cucurbita авлоди вакиллариининг таснифи.
5. Ўзбекистонда районлаштирилган полиз экинларининг навлари.

Адабиётлар:

ТАЯНЧ ИБОРАЛАР: Ковокдошлар, ёпик уруғли, ботаник оила, туркум, тур, айрим жинсли, энтомофил, эндоспермсииз, тупрок унумдорлиги, маданий усимликлар, ҳандалаклар, тукли тарвуз, экологик-географий гуруҳ, эратпишар, уртапишар, кечпишар. Деҳқон-фермер хужаликлар, томорқалар, вегетация, генерация.

1.1. Полиз экинлари Ковокдошлар (Cucurbitaceae Jukk) деган ботаник оилага киради, бу оила ёпик уруғли усимликларнинг жуда йирик бир оиласи булиб, 103 та туркум ва 1100 дан кура купрок турларни уз ичига олади. бу усимликларнинг купчилиги тропик ва субтропик мамлакатларда таркалган, ерга ёйилиб ёки палак ёзиб усувчи бир йиллик усимлик хисобланади.

Мамлакатимизда полиз экинларидан ковун, тарвуз, йирик мевали ва мускат ковок экилади. Уларнинг характерли белгилари куйидагилардир: жингалаклари булади, гуллари айрим жинсли, хашаротлар ёрдамида чангланади (энтомофил), узок турмайди (эркак гули бир кун яшайди, эрталаб очилиб, кечкурун ёпилади). Меваси ковок мева, уруглари эндоспермсииз, йирик муртакли ва иккита ясси уругпаллали булади. Ковокдошлар исиклик ва кургокчиликка чидамли, ёруг-севар киска кун усимликлари булиб, тупрок унумдорлигига унча талабчан эмас.

1.2. Ковун 40 дан ортик турларни уз ичига оладиган Cucumik L. Туркумига киради, шу турлар орасида факат ковун билан бодринг турлари маданий усимликлар булиб хисобланади.

Хозир полизкор олимларнинг купчилиги А. И. Филлов (1960, 1969) таклиф этган классификациясига мувофик ковунларнинг хаммаси еттита кенжа турни уз ичига оладиган Cucumik melo Adanк деган битта турга бирлаштирилади, бу кенжа турларнинг учтаси (урта осие-ккр. Rigiduk (Pang) Fil.,

кичик осие- ккр. Euroraеuқ Fil) ковунлари) маданий, учтаси (илонсимон ковун- ккр. Flexuoқuқ L., хитой ковуни- ккр. Chihenқiқ Pang ва хушбуй ёки хидли ковун- ккр. Qubrantaneuқ Fil.) ярим маданий ва биттаси (далада бегоан ут тарикасида усадиган ккр. Agreқtiқ Naudномли ковун) ёввойидир.

Маданий ковун кенжа турларини А. И. Филов турхилларига ёки экотипларга ажратади.

Урта Осие кенжа тури меваларида канд моддалари хаммадан куп булиши билан ажралиб туради. Палаги узун, каттик туклар билан копланган, думалок-кирали шаклда булиб, буйи 2,5-3 м га боради, туртинчи тартибга борадиган ён новдалар чикаради.

Хандалаклар-var. Chandalak (Pang).Gred-вегетация даври 55-70 кун. Мевалари майда (0,5-2 кг, думалок ёки ясси тортган, суств сегментланган, пусти жуда сийрак турли булиб, юмшок. Эти серсув, таркибидаги канд моддалари уртача микдорда (6-8 %), хушбуй.

Эти юмшок ёзги ковунлар-var Bucharica (Pang) Fill-вегетация даври 75-90 кун. Мевалари думалок ёки тухумсимон шаклда, уртача катталиқда ва йирик. Пусти сийрак тур билан копланган, юмшок. Эти майин, хушбуй, таркибидаги канд моддалари бир мунча купрок (8-12 %).

Эти каттик ёзги ковунлар-var Aektivoliқ Fil.-вегетация даври 90-110 кун. Мевалари чузинчок шаклда, хар хил катталиқда булади. Пусти каттик, калин тур билан копланган. Эти карсиллайди, хиди йук, таркибидаанчагина (8-18%) канд моддалари булади.

Кузги ковунлар-var autumnaliқ Fil-мевалари одатда тула етилмасдан туриб узилади. Вегетация дарви 110-120 кун. Мевалари уртача катталиқда ва йирик, тухимсимон шаклда, ярмигача ёки хамма томон тур билан копланган булади. Пусти каттик. Таркибида канд моддалари 9-11 %, саклаб куйиш ва транспортда ташишга яхши чирдайди.

Кишки ковунлар-var hibernuқ Fil-кишда саклаб куйилганида батомом етилиб олади. мевалари йирик, цилиндирсимон шаклда, пусти каттик, тури сийрак. Меваси узиб олинган махалда каттик, шираси кам, саклаб куйилганида анча серсув ва ширин булиб колади.

Кичик Осие кенжа тури-маданийлиги жихатидан олганда урта осие кенжа туридан кейин иккинчи уринда туради. Мевалари думалок ёки тухумсимон шаклда. Меваларида канд моддаларининг микдори 10-12 % га боради.

Бу кенжа тур уч-турт хилга булинади.: ёзги касобилар (var. Zhukowkii (Pang) Fil), кузги касобилар (var haqanbey (Pang) Fil), гуваклар (var-gurbek Fil) Гуваклар тур-хили Хоразм вилояти ва Коракалпогистон Республикасида куп экилади.

1.3. Т. Б. Фурса (1982) таснифига мувофик Citrulluk Khrad туркуми 4 та турга булинади:

1. Тукли тарвуз С. Lanatuk (Thunb) Matkum et Nakai.
2. Колоцинт С. Colocynthik (L) Kchrad.
3. Жингалаксиз тарвуз С. Ecirhoquk Cogn.
4. Ноден тарвуз С/ Naudinianuk (Kond) Hook.f. бу турларнинг сунги учтаси ёввойи холда усадиган усимликлардир. Тукли тарвуз хаммадан кура купрок таркалган булиб, учта кенжа турни уз ичига олади.
5. Шилимшик уругли тарвуз-ққр. Мусоқо қрегтик-ёввойи холда усувчи (шилимшик уругли тур-хили) ва ярим маданий (синегал тур-хили) формаларини бирлаштиради.
6. Тукли тарвуз-ққр. Lanatuk-юмшок туклар билан калин копланган булиб, ёввойи холда усувчи жанубий ва жанубий-гарбий африка формалари билан экиладиган хашаки ва цукат формаларни уз ичига олади.
7. Оддий тарвуз-var. Vulgarik-иккита тур-хилни: экиладиган тарвуз (var. Vulgarik) ва кардафон тарвуз (var. Cordorphanuk)ни уз ичига олади. буларнинг биринчисига хураки тарвузнинг хамма навлари, иккинчисига-мевасининг эти сарик буладиган, асосан Шимолий-Шаркий Африкада усадиган ярим маданий формалар киради.

Хураки тарвуз навларини бирмунча батафсил систематикага солиш учун улар 10 та экологик-географик гурухларга булинади:

1. Рус тарвузи-Россиянинг Оврупа кисми ва Украина тарвуз навларини бирлаштиради, булар кургокчиликка чидамлилиги билан фарк килади, уларнинг орасида меваси думалок шаклда, эти пушти рангда, сершира буладиган навлар устун туради.
2. Кичик осиё тарвузи-рус тарвузига якин булади-ю, лекин камрок маданийлаштирилгани ва камрок текислангани билан фарк килади.
3. Кавказ орти тарвузи-бу тарвуз навлари мезофил куринишда, этининг ранги оч тусда, лекин дагалрок ва шираси камрок булади.
4. Урта Осиё тарвузи-Марказий Осиё навларини бирлаштиради, тупи дагалрок тузилган, палаги узун, барги

йирик, пусти калин, кечпишар булиши билан ажралиб туради.

5. Афгон тарвузи-урта осие тарвузига якин туради-ю лекин камрок маданийлаштирилгани билан фарк килади.
6. Узок Шарк тарвузи-нам иклим шароитида вужудга келган. Бу гурухга кирадиган навлар палаги калта, меваси майда, тезпишар, эти лимон ранг ва камшира булади.
7. Шаркий осие нави-Япония, Хитой ва корея навларини уз ичига олади, япалок-эллипс шаклда, эти жуда ширали ва нордонрок булади.
8. Хинд тарвузи-тупининг тузилиши мезофил тусда, мевалари йирик ва каттик пусли, эти дагал ва шираси кам.
9. Америка тарвузи- АКШ ва Канада навларини бирлаштиради. Меваси чузинчок шаклда, эти очик рангли, майда дондор, жуда сешира ва лаззатли булиши билан ажралиб туради.
10. Гарбий оврупа тарвузи-тупи мезофил киефада булиб, етилиш муддатлари ва морфологик белгилари турлича булади.

1.4. Ковок 4 та кенжа туркум ва 25 турни уз ичига оладиган *cucurbita* L. туркумига киради. Мамлакатимизда экиладиган ковоклар хар хил морфологик ва хужалик-биологик белгиларига эга булган куйидаги учта турга киради:

1. Каттик пусли оддий ковок-С. *Pero* L. Var. *Citrus*. Поялари киррали булиб эгатчалари бор, барглари тук яшил, учи уткирлашиб келган, беш япрокли. Барглари, поялари ва мева бандлари каттик тиканакчалар билан копланган. Ковокнинг бу тури узун палакли усимликларни хам, калта палак чикариб, тупли булиб усадиган усимликларни уз ичига олади. мевалари бошка турларнинг меваларига караганда майдарок, купинча тухимсимон шаклда, саргиш-заргалдок ёки оч сарик тусда, йул-йул накли булади. Мевасининг шакли ва катта-кичиклиги жихатидан бир-биридан ажаралиб турадиган жуда куп навлари бор. Мева банди жуда киррали, призматик шаклда. Мевасининг эти сертола, бошка турлардан кура дагалрок.

2. Йирик мевали ковок-С. *Maxima* Duch. *Lina Alef*. Поялари цилиндирсимон, тукли думалок, жуда узун. Барглари яшил, йирик, буйраксимон ичи сал уйикли. Мевалари йирик, шарсимон ёки ясси тортган, гохо чузикрок булиб, пусти юмшок ва хар хил рангли. Эти кам толали, юмшок. Каттик пусли ковокка караганда бир мунча кечпишар. Турта кенжа турни уз ичига олади: эски дунё ковоги-кк. *maxima* (экиладиган

навлари); америка ковоги-ққр. *Americana* (анча тез пишар, палаги узун ва жуда каттик туклар билан копланган); хитой ковоги-ққр. *Furbankurbuk* (саллага ухшашшаклда майда ва уртача мева киладиган нимжон усимликлар); ёввойи холда усувчи ковок-ққр. *Andreara*.

3. Мускат ковок- *C. mokchata* Duch. Поялари ва баргларининг бандлари думалок-киррали, мева банди эса киррали булиб, мевага томон кенгайиб боради. Барглари салгина уйилган, беш япрокли ёки буйраксимон, томирлари орасида ок доглари бор. Бу турга мансуб усимликларнинг хаммаси узун палакли. Меваси шакли, катта-кичиклиги ва ранги жихатидан хар хил; чузик шаклда булиб, уртаси торайиб келган, пушти-жигарранг ёки сарик тусга кирган майда ва уртача мевалари купрок учрайди. Мевасининг эти заргалдок тусда, мушк хидли зич, майин. Росмана экологик-географик типлардан иборат булган олтита кенжа турни уз ичига олади: туркман ковоги-ққр. *noglita* (мевалари чузик шаклда булиб, суст сегментланган); япон ковоги-ққр. *japonica* (мевалари дагал сегментланган, буришган ёки эгатчали); мексика ковоги-ққр. *Mexi-sana* (меваларининг пусти ёгочсимон булиб, эти юпка, унсимон, ширин); колумбияковоги-ққр. *Columbiana* (мевалари калампир нусха); шимолий амаерика ковоги-ққр. *Boreali americana* (мевалари майда ва уртача катталиқда булиб, шакли ясси шаклдан тортиб то цилиндирсимон шаклгача боради) ва хинд ковоги-ққр. *indica* (мевалари жуда йирик, очик рангли, шарсимон ёки тухумсимон шаклда) шулар жумласидандир.

1.5. Узбекистон Республикаси худуди экинларида 160 дан ортик ковун навлари учрайди лекин уларнинг купчилиги кичик майдонларга экилади. 1999 йилга булган маълумотга кура, Республикамизда 33 та нав районлаштирилган булиб шулардан факат махаллий Гурбек нави кичик Осиё кенжа турига, колганлари эса Урта Осиё кенжа турига мансубдир. Усув даври давомийлигига кура, ковун навлари куйидаги гурухларга булинади:

1. Эртапишар навлар (майсалар пайдо булганда то биринчи мева пишгунига кадар 65-80 кун утади).
2. Уртапишар навлар (усув даври 81-110 кун).
3. Кечпишар навлар (усув даври 110 кундан ортик).

Мамлакатимизда районлаштирилган 33 та ковун навидан эртапишар навлар 9 та, уртапишар навлар 14 та ва кечпишарлари 10 та нави ташкил этади. Эртапишар навлар

ичида хандалаклар ва ёзги эти юмшок ковун гурухларига мансублари; уртапишар ковунлар ичида-ёзги эти юмшок ва ёзги эти каттик ковун навлари; кечпишар навлар ичида эса кузги ва кишки ковун навлари мавжуд.

Ўзбекистон Республикаси вилоятларида районлаштирилган ковун навлари.

Ковунчил ик макони	Вилоят	Районлаштирилган навлар		
		Эртапишар	Уртапишар	Кечпишар
1	2	3	4	5
1. Тошкент ковунчили к макони	Тошкент, Сирдарё, Жиззах	Хандалак, кукча 14, Тошлоки 862, Рохат	Байткургон; Ок урут 1137; йирик ичи кизил, Бухарка 944, шакарпалак 544	Куйбош 476, Умирбоки 3748, Корапучок 3744
	Тошкент	Зарчопон € ₁	Кук-тина 1057, Кукча 588, Олтинтепа, Лаззатли	
2. Фаргона ковунчили к макони	Фаргона, Андижон, Наманган	Хандалак кукча 14, Тошлоки 862	Ассати 3806, Шакарпалак 544, Кук-тина 1087, Кукча 588	Умирбоки 3748, Куйбош 476 Корапучок 3744
3. Зарафшон ковунчили к макони	Самарка нд	Махаллий сарик хандалак, Кук- калла-пуш, Ма-халлий Дахбеди, Самарканд обиновоти, Тошлоки 862	Кук тинна 1087	Заргалдок гулоби, Куйбош 476 Сайли, Махаллий кораканд
	Бузоро, Навойи	Махаллий сарик хандалак, Кук-	Кук-тинна 1087 Кукча 588,	

		калла-пуш, Махаллий Бури-калла, Тошлоки 862	Лаззатли, Олтин водий	
4. Жанубий Ковунчил ик макони	Сурхонда рё, Кашкада рё	Сарик хандалак, кук- калла-пуш, Махаллий Дахбеди, Тошлоки 862	Кук тинна 1087, Аравакаш 1219	Кашкадарёда Заргалдок гулоби, Сурхан дарёда: Махаллий кора-канд
5. Хоразм ковунчили к макони	Хоразм вилояти, Коракалп огистон Республи каси		Махаллий Гурбек, Олтин водий, Гурлан	Махаллий Бешак, Махаллий олахама, Махаллий кораканд, Туёна, Карикиз.

Узбекистонда 20 тадан ортик тарвуз навлари учрайди, шулардан 12 таси районлаштирилган. Усув даври узунлигига кура тарвуз навлари куйидаги гурухларга бўлинади.

1. Эртапишар (майса униб чиккандан то биринчи мева пишгунга қадар 85 кунгача утади).
2. Уртапишар (усув даври 85-110 кун).
3. Кечпишар (усув даври 110 кун ва ундан ортик).

Мамлақатимизда районлаштирилган тарвуз навларини усув даври узунлигига кура 3 гурухга киритиш мумкин: эртапишар навлар-Уринбой, Махаллий Мозаичний, Узбек-452; Уртапишар навлар-Корол Куби-92, Мраморний, Самаркандок тарвузи, Дилноз, Необичний, Спутник; кечпишар навлар-Кузивой 30, Хайит-кора, Гулистон.

Узбекистон Республикаси ковокнинг турли хил навларига эга. Жамоа, дехкон-фермер хужаликларида ва шахсий томоркаларда ковокнинг 140 дан ортик нав намуналари учрайди, булардан мускат ковоклари 40-45 %ни, йирик мевали ковоклар 30-35 % ни ва каттик пустли ковоклар 25-30 % ни ташкил этади. Республикамизда фақатгина 4 та нав районлаштирилган. Булардан Қашқар 1644 ва Палов қоди 268 навлари мускат ковокларига мансуб. Испан 73 нави йирик мевали ковокларга ва Нон-қоди нави каттик пустли ковоклар

турига киради. Испан 73 нави кечпишар хисобланиб, усув даври 120-130 кун, бошка навлар эса уртапишар булиб усув даври 110-120 кун.

Саволлар:

1. Кам тарқалган ковоқдошлар вакилари қайсилар.
2. Қувуннинг Европа турларини айтинг.
3. Хашаки ва маданий тарвузларнинг фарқи.
4. Ўзбекистонда етиштирилаётган полиз турларини биласизми.
5. Эртачи қовун навларини қайсилар.
6. Ўртапишар полиз навларини биласизми.
7. Кечпишар полиз навларини айтинг.
8. Тошкент қовунчилик маконларига қайси вилоятлар мансуб.
9. Хоразм қовунчилик минтақаси маконига қандай навлар киради.
10. Зарафшон қовунчилик маконинин бошка маконлардан фарқи нимада.

27-маъруза. Суғориладиган ерларда полиз экинларини етиштириш технологияси.

Режа:

1. Полиз экинларининг утмишдошларга муносабати ва алмашлаб экиш хусусиятлари.
2. Ерга асосий экишдан олдин ишлов бериш.
3. Полиз экинларини угитлаш.
4. Уруғларни экишга тайёрлаш.
5. Экиш муддатлари, уруғларни экиш чуқурлиги ва меъёрлари.
6. Усимликларнинг озикланиш майдони ва экиш схемалари.
7. Усув даврида тупрокка ишлов бериш ва усимликни парваришлаш.
8. Суғориш сони, суғориш ораллиги ва меъёрлари.
9. Касаллик ва зараркунандаларга қарши кураш
10. Лалмикор полизчилик хусусиятлари..

Адабиётлар: 1, 2, 3, 9, 10.

Таянч иборалар: тупрокнинг физик, механик, химик хусусиятлари, фузариоз-сулиш касаллиги, компост, қўшарус, хашаки экинлар, уруғни тайёрлаш, ивитиш, биоген таъсир, угит солиш меъёри, лентасимон қўу қўтор лаб, экиш, экиш схемаси, кучат қалинлиги, сизот сувлари, сув миқдори, суғориш нормаси, инсектицидлар, микро биопрепаратлар,

1.1. Полиз экинлари тупрокнинг механик ва химик хоссаларига, унинг унумдорлигига жуда талабчан усимликлардир. Хаво ва намликни яхши утказадиган говак тупрокларда полиз экинлари жуда яхши натижа беради. Органик ва минерал угитларга бой булган хамда бог ва токзорлардан янги бушаган ерларга экилган полиз экинлари касалликка чалинмай, юкори хосил беради. Полиз экинларидан юкори хосил олиш учун алмашлаб экишни тутри жорий килиш зарур. Полиз экинларини яхши униб ривожланишида утмишдош экиннинг ахамияти катта.

Кадимда полиз экинларининг янги узлаштирилган курик ва убз ерларга экиб келишган. Куп йиллик беда хам полиз экинлари учун яхши утмишдош экин хисобланади. Куп йиллик беда тупрок структурасини яхшилайти, унмдорликни оширади. Бунга сабаб полиз экинлари идизлар жойлашган тупрок катламида бошка экинлардагига нисбатан купрок миқдорда чиринди туланади, нитрат ва фосфорли элементлар миқдори ортади.

Куп йиллик беда экилган ерларда бегона утларга кам булиб, полиз экинлари учун энг хавфли касаллик-фузариоз сулиш касаллигини таркатувчи микроблар кам булади. урта Осиёда полиз экинлари нематода, шумгия ва фузариоз касалликларидан куп талофат курадилар. Шу сабабли полиз экинларини экишдан олдин утмишдош экинни яхши урганиб, юкорида кайд килинган касалликлар булмаган ерларга полиз экинларини жойлаштириш керак.

Полиз экинлари учун утмишдош экин сифатида донли, дуккакли экинлар, карам, картошка ва идиз мевали усимликлар энг яхши хисобланади. Полиз экинларини маккажухори, шоли усимликларидан сунг экилса, фузариоз сулиш ва нематода касалликлари билан касалланиш даражаси бирмунча камаяди.

Ўзбекистон шароитида полиз экинлари учун уч далали алмашлаб экиш схемаси жорий килинган. Бу схема куйидагича 1-2-3 йили беда, 4-йили полиз экинлари, 5-йили полиз ва кечки хашаки экинлар, 6-йил эртачи сабзовот ва кечки картошка, 7-йили пиёз ва карам, 8-йили полиз экинлари.

Полиз экинларининг кишки навларини иккинчи экин сифатида эртаги картошка, сабзи, карам, редиска ва икки йиллик сабзовот усимликларининг урутидан бушаган ерларга экилса, жуда яхши натижа беради.

1.2. Полиз экинларини етиштиришда ерни тайёрлаш кейинги барча агротехника чора-тадбирларининг яхши наф беришида муҳим шартдир. Ерга белгиланган муддатларда ва полиз экинларининг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ишлов бериш керак. Полиз экинларини экиш учун ерни тайёрлаш юзасидан бажариладиган асосий иш кузги шудгор қилишдан бошланади.

Утмишдош экинлардан барвақт бушайдиган суғориладиган ерларга аввал сув қуйилади, сунгра Т-4А чопик тракторига тиркалган ЧКУ-4 маркали чизел культиватор билан ер юмшатиб чикилади. Ерни ҳайдашдан олдин уғит солғичлардан фойдаланиб уғитланади. Эрта баҳорда нам сақлаш учун 6-8 см. чуқурликда бороналади. Полиз экинлари эртачи экилганда ер қайта юмшатилмайди, лекин кеч экилса қайта 22 см. чуқурликда ҳайдалади.

1.3. Полиз экинларини экишдан олдин 15-20 т\га гунг ва фосфорли уғитларни 75 % ни, солиш тавсия қилинади. Азотли уғитларни ярмини экиш олдида ва қолганини 3-4 чинбарг чиқарганда солинади. Азот –80-150 кг, фосфор- 100-150 кг, калий 50-60 кг\га ҳисобидан берилади.

1.4. Экиш учун тулик уруғлар олинади. 3-5 % ли ош тузи эритмасида сараланганч, тоза сувда ювилади. 12-18 соат давомида ивителиди. Касалликларга қарши руҳсат этилган кимёвий дорилар билан ишлов берилади.

1.5. 8-10 см чуқурликда ҳарорат 12-18 градусга етганда экилади. Қишда скланидиган навлари эса май-июн ойларида экилади.

	Жанубий	Марказий	Шимолий зоналар
Эрта пишар	1-10 апрел	1-30 апрел	20-30 апрел
Ўрта пишар	10-20 апрел	1- 15 май	1-15 май
Кечпишар	1-10 июн	15-3- май	20-30 май

Экиш чуқурлиги уруғ катта-кичиклиги, муддати, намлик ва иссиқликка қараб 5-7 см. Экиш нормалари экиш усули ва бир уяга экиладиган уруғ сонига боғлиқ. Купинча бир уяга 4-5 та уруғ, қовоқники 3-4 та, Бир гектарга қовун-қовоқдан 3-4 кг, 4-5 кг тарвуз уруғи сарфланади.

1.6. Полиз экинларини озикланиш майдони 1-2 м. кв. қовоқники 3-4 м. кв. Қатор ораларининг кенглиги трактор ғилдираклари орасига мос бўлиши керак.

Суғориладиган ерларда ариқлар орқали суғоришда лентасимон қўуқуторлаб экилади. Бунда қатор оралари 0,7-0,9 м.

ва кенг пушталарда 2,1-3,6 м.булади.ва навбатма-навбат жойлашади.

Қўу қуторли лентасимон-(қовун)

$$\frac{210 + 70}{2} \text{-----х70см} \quad \text{ва} \quad \frac{280 + 70}{2} \text{-----х70см}$$

усуллари ва бир қаторли (80х70) усулида.

Қўу қуторли лентасимон тарвузда

$$\frac{28 + 70}{2} \text{----- х70 см} \quad \text{ва бир қаторли 180х90 см усулида.}$$

қувоқда эса қўу қуторлаб экканда:

$$\frac{330 + 70}{2} \text{-----х70 см. ва бир қаторлаб 180х90 см усулида.}$$

Бунда қовун 8-10 минг туп, тарвуз 6-8 минг туп, қовоқ 5-5,5 минг туп булади.

1.7. Полиз экинларини парвариш қилиш тупрокни юмшатиш ,яганалаш, озиклантириш, чопик қулиш,суғориш,палакларни туғрилаш,бегона утлар ва зарақунандаларга қарши курашни уз ичига олади. Баҳор серёгин келса қатқалоқдан юмшатилади. Биринчи чинбарг чиқарганда яганаланади ва 2 тадан усимлик қолдирилиб шикастламаслик учун қирқиб олинади.Хатосига уруғлар ивителиб экилади.

Усимликлар 3-4 чинбарг чиқарганда ҳар бир уяда битта ривожланган усимлик қолдирилиб, иккинчи яганалаш утказилади. Яганалаш билан бирга экинлар чопик қилинади, бунда усимлик атрофидаги тупрок юмшатилиб, бегона утлар юлиб ташланади. Иккинчи чопик 25-30 кундан кейин, усимликлар гуллашидан олдин утказилади.

Нихоллар ялпи униб чиқиши билан қатор ораларини юмшатишга киришилади. Сизот сувлари чуқур жойлашган ерлар биринчи сугоришгача бир марта, ер ости сувлари яқин жойлашган майдонларда эса икки марта культивация қилинади. Кейинги культивациялар сугоришлардан кейин, тупрок етилиши билан утказилади. Усув даври давомида 4-5 культивацияланади ва ҳар сафар усимлик химоя зонаси

ошириб борилади. Суториш эгатлари мавжуд техникалар ёрдамида, 3 каторли экиш усулларида эса техникаларда олинади.

1. 8. Полиэ экинлари намга уртача талабчандир. Улар ер сатхи курук булган ва усимлик илдизлари жойлашган тупрокнинг намлиги етарли булган жойларда яхши усиб, ривожланади. Тупрокнинг ута нам булиши усимликларга салбий таъсир курсатади.

Ўзбекистон шароитида полиэ экинлари купинча суториб етиштирилади. Бунинг учун сув оқадиган ариклар уруг экиш билан бир вақтда 22-24 см чуқурликда киркилади. Арикларни бундай чуқурликда олиш усимлик илдизи атрофида намни купрок тупланишига имконият яратади. Нитажада усимлик яхши ривожланиб, палаги хар хил касалликдан сакланади. Шунинг учун полиэ экинларини усув даврида усимлик илдизи жойлашган тупрок катлами доимо нам, усимлик палаги ёйилиб ётадиган катлами курук булиши керак. Тупрок намлигининг юкори булиши усимликларга салбий таъсир курсатади.

Ковок усимлигининг палаги жуда катта, яъни новдалари узун (5-7 м), барглари жуда катта булганлигидан намликни жуда куп талаб килади. Шу сабабли тупрок намлиги ковок усимлиги учун доим 80 % булиши керак (80-80-80).

1.9. Касаллик ва зараркунандаларга карши кураш. Ўзбекистон шароитида полиэ экинлари купрок фузариоз сулиш, ун-шудринг касалликларига учрайдилар ва зараркунандалардан-полиэ бити, ургимчаккана, ва бошка тунламлар билан зарарланадилар.

1.10. Полиэ экинлари навлари лалмикор полиэчилиikka хар хил мослашиб турлича натижа беради. Тарвуз усимлигининг илдиз тупрокда чукур жойлашгани сабабли, бу экиннинг лалмикорликка мослашишини таъминлайди. Ковун тарвудан кура камрок ерларга экилади.

Ковокнинг илдиз системаси тупрок юзасига якин жойлашган, усимликдан куп намлик бутланиб кетади, шунинг учун ковок турлари лалми ерларга экишга ярокли эмас.

Лалмикор ерлардаги тупрок-иклим шароитлари бирмунча кесикн булганлиги сабабли, бу ерда устириладиган навлар иссикка ва кургокчиликка чидамли, илдизлари яхши ривожланадиган булиши керак. Бундай хусусиятларга эга булган бир канча навлар халк селекциялари ва олимлар томонидан яратилган ва районлаштирилган. Шулардан: Жиззах ва Самарканд вилоятларининг юкори текисликларида ва

пастки тоголди зоналарида етиштириш учун ковуннинг Юбилейная, Арбакешка 1219, Пурсилдок, Ичи кизил, кечпишарларидан, Гулоби богарная, тоголди зоналарининг юкори погоналарида юкорида номи келтирилган навлар ва шулар билан бирга Заргалдок-гулоби нави экишга тавсия этилади.

Кашкадарё ва Сурхондарё вилоятларининг лалми текисликларида ковуннинг Босводди, Пурсилдок, кеспишар навларидан-Куйбош, Ичи кизил, Куйбош 476, Богарная 34, тоголди лалми ерларида юкоридаги навлар билан бирга Арбекешка 1219, Кукча 588, кечпишарларидан-Заргалдок гулоби, Кора канд навлари экилади.

Ўзбекистон галлачилик ИТИ олимлари лалми ерларда етиштириш учун тарвузнинг куйидаги навларини экишга тавсия этади: Жиззах ва Самарканд вилоятларининг текисликларида Кузибой богарний; Багаевский мурашка, Оккузибой 30, Тезпишар, Спутник, тоголди зонасида-Кузибой 30, Кузибой богарний, Хайит кора, Спутник, Мозаичний, Кашкадарё ва Сурхондарё лалми текисликларида-Тезпишар, Мозаичний, Кузибой богарний: Ок кузибой, Хайит кора, Багавский мурашка, Динний лист, тоголди лалмикорликда юкоридаги навлар билан бирга Кузибой 30, Американский белий, Белий длинный 107.

Кишлок хужалик экинларини, синаш буйича давлат комиссияси томонидан 1998 йилдан Жиззах, Кашкадарё ва Тошкент вилоятларининг лалми ерларда етиштириш учун ковуннинг Арбакешка 1219, тарвузининг-Мозаичний, Спутник ва Кузибой 30 навларини тавсия этилган.

Ердан нам танкислиги тупроқда ва унинг полиз экинлари палаги таралган устки кисмида хароратнинг кескин кутарилиши усимликнинг усиши ва ривожланишига, шунингдек, улардан кечадиган физиологик жараёнларга маълум даражада тасир курсатади. Тупроқдаги нам танкислиги туфайли усимликка илдиз системаси оркали сув шимилиши бузилади, натижада усимликнинг усув даври, айникса об-хаво нокулай келган йилларда узокка чузилиб кетади. Лалмикор ерларда хаво ва тупроқ хароратининг жуда кутарилиб кетиши, хаво нисбий намлигининг пасайиши полиз экинларининг гуллашини сусайтиради, гунча ва чнги тугилган меваларнинг куриб қолишига сабаб булади. Баъзан вазни 200-300 г келадиган йирик мевалари ҳам куриб қолади. Бунга сабаб, усимлик гулидаги чанг хаёт кобиятининг пастлиги (24-25 %) ва

суториладиган ерлардагига караганда гулларга хашарот чанглатувчиларнинг кам келиб кунишидир. Буни, айникса об-хаво курук келган йилларда усимлик тупида биттадан мева тутилишига ёки бутанлай тугилмаслигига олиб келади.

Ерга тукиладиган гул ва тугунчалар фоизини пасайтириш ва майда булиб, етилмай коладиган мевалар миқдорини камайтириш учун устириш стимуляторлари (гетероауксин, альфа-НУК, бор кислотаси) кулланилади. Кушимча чанглатиш учун усимликка асаларилар жалб этилади ёки гуллар кулда чанглатилади.

Мамлақатимизнинг ламикор ерларида полиз экинлари хосилдорлигини тупроқда куз-киш ойларида тупланган нам миқдори белгилайди. Шунинг учун бу ерда полиз экинлари агротехникасига асосан эътибор ерда куп нам туплаш ва уни тула саклаб қолишга каратилиши керак.

Полиз экинлари экиш учун ерни тутри танлаш жуда катта аҳамиятга эга. Бунда паст текисликлардаги эриган кор ва ёмгир сувлари тупланадиган, ёзда тупрок намлиги жанубий кияликлардагига караганда 1,5-2 % юкори буладиган шимолий ва шимолий-гарбий кияликлардаги ерлар энг яхши хисобланади.

Ерларни экишга тайёрлаш кузда 20-22 см чуқурликда шудгорлаш ва баҳорда экин экиш олдидан кайта хайдашдан иборат. Лекин ерлар кузда оддий усулдашудгорланса, тупрок нами кочиб колганлигидан ер сифатсиз хайдалиб, кесак кучади. Бундан ташқари, ер кузда ва баҳорда кайта хайдалиши туфайли махсулот таннархи кимматлашиб кетади.

Ўзбекистон лалмикор дехкончилик илмий текшириш институти ерларни кузда шудгор қилмай, баҳорда апрел ойида 20-22 см чуқурликда хайдашни ва май ойида экин экиш олдидан 16-18 см чуқурликда кайта хайдашни тавсия қилади. Ерни хайдаш билан бир вақтда мола бостириш керак.

Полиз экинларини экиш муддати об-хаво шароитига қараб белгиланади. Об-хаво курук келган йилларда эса кечроқ экиш яхши натижа беради.

Намгарчилик уп юулган йилларда эса кечроқ экиш керак булади. Полиз экинларидан эгат хосил қилиш керак булган тақдирда, бу экинлар учун ажратилган майдоннинг бир қисмига уруғлар апрел ойида экилади.

Одатда полиз экинлари уруғи ивитишиб экилади. Уруғлар ерни экин экишга тайёрлаш пайтида бир йула очиб кетилган саёз эгатлар тубига 4-6 донадан қилиб уялаб экилади, плут

кайта утишида кушиб кетилади. Полиз экинлари уругини механизация ёрдамида экишда гуза сеялкаларидан фойдаланилади. Бунда уруглар олдиндан эгат очмай, текис ерга экилаверади. Экишда уруглар тупрокнинг нам каватига 7-8 см чуқурликка кадалиши керак. Уруг экиш нормаси гектарига 1,5-2 кг.

Полиз экинлари озикланиш майдонининг оптимал катталиги куп жихатдан йиллик об-хаво шаротига боғлиқ булади. Лалмикор дехкончилик илмий текшириш институтида олиб борилган тажриба натижаларига кура, ёгингарчилик куп булган йиллари ковун ва тарвузнинг озикланиши майдони кичик (2,5-3 м²) ва аксинча, курук келган пайтда катта (3-5 м²) булиши керак.

Полиз экинлари битта чинбарг чиқарганда яғаналанади. Бунда ҳар қайси уяда биттадан соғлом майса қолдирилади.

Лалмикорликда полиз экинларини парвариш қилишда ёгингарчиликдан кейин ҳосил буладиган тупрок қатқалогига қарши кураш муҳим тадбирлардан бири ҳисобланади. Майсалар униб чиққунга қадар қатқалок ротацион мотиға ёки тишли борона билан бузилиб, униб чиққандан кейин қатор оралари юмшатилади.

Полиз мевалари пишиб етилишига қараб, бир марта ёки бир неча марта узилади.

Саволлар.

1. Полиз экинларини бир майдонга неча йил узлуксиз экиш мумкину
2. Шурланган ерларда ерни экишга тайёрлаш хусусиятлари
3. Азотли минерал ўғитларнинг миқдори полиз мевалари сифатига қандай таъсир қурсатади
4. Полиз экинларининг неча йиллик уругларияхши ҳосил беради
5. Уругларни экишда қайси машина ва механизмлардан фойдаланилади
6. Полиз экинларининг эртапишар ва кечпишар навларида озикланиш майдони ва экиш схемалари қандай ўзгаради
7. Полиз майдонларида усув даврида неча марта чопиқ ва культивация ўтказилади
8. Полиз экинларининг турли усув даврларида суғориш оралиги (кун) қанча булади

9. Полиз экинларида касаллик ва зараркунандаларга қарши қандай профилактик чоралар қўуланилади
10. Полиз экинларини лалмикорликда эътибор берилишига сабаб нима
11. Нима учун полиз экинлари навлари лалми ерларда етиштириш мумкин эмас
12. Қувун ва тарвуз лалми ерларда қайси муддатларда экилади

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикасининг Олий мажлис қонунлари туплами. 1,2 қисм 1998.
2. Мирзаев М.М. Собиров М. Боғдорчилик Т. Меҳнат, 1987 й.
3. А.А.Рыбаков, С.А.Остроухова - “Ўзбекистон мевачилиги” Т.: “Ўқитувчи”, 1981.
4. Буриев Ҳ. Ч. Бахчеводство Т. ўзМЕДИН 2002 й.
5. Буриев Ҳ. Ч. ва бошқалар Полизчиликдан амалий машғулотлар Т. Меҳнат 1997й.
6. Буриев Ҳ. Ч. Ашурметов О. А. Полиз экинлари биологияси ва уларни етиштириш технологияси Т. Меҳнат 2000 й.
7. Зуев В.И. Абдуллаев А.Г. Сабзавот экинлари биологияси ва уларни етиштириш технологияси Т.Ўзбекистон 1997
8. Зуев В .Й. ва бошқалар Сабзавотчилик (лаборатория ва амалий машғулотлар) Т.ўқутувчи 1983 й.
9. Остоноқулов Т.Э ва бошқалар Мева – сабзавотчилик ва полизчиликдан амалий машғулотлар Самарқанд 2004 й.
10. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экишг учун тавсия этилган қишлоқ хужалик экинлари ДАВЛАТ РЕЕСТРИ Т.1998 й.
11. Мирзаев М.М. ва бошқалар Ўзбекистонда узум етиштиришнинг интенсив технологияси Т.1989 й.
12. Смитнов К.М. ва бошқалар Виноградарство М.1998 г.
13. Рыбаков ва бошқалар Виноградарство Т. Меҳнат 1988 й.
14. Остоноқулов Т.Э. Сабзавот экинлари биологияси ва устириш технологияси Т.1997 й.
15. Отабоева Ҳ. Ва бошқалар усимликшунослик Т.Меҳнат 2000 й.
16. Ёуломов Б.Х. Мевачилик М.М. Т.2000 й.
17. Темуров Ш. Узумчилик М. М Т 2000 й.

18. Қудирхужаев О ва бошқалар Сабзавот экинлари етиштириш технологияси ММ Т.2002
19. Меджитов С.М. ва бошқалар Сабзавотчилик (иш дафтар) Т.2003 й.
20. Буриев Ҳ.Ч. ва бошқалар Полизчилик ММ Т.1999 й.
23. Сортировка и обеззараживание семян. [http. /WWW good vol.zupagro/ fozqqedq htinl alex Kakankkya mail.zi](http://WWW.goodvol.zupagro/fozqqedqhtinlalexKakankkya@mail.zi).
24. Если рассада преросла. [http /WWW. Dachnikam zu/ /ogozed/ text/ zakkad 07. Htm](http://WWW.Dachnikam zu/ogozed/ text/ zakkad 07. Htm).
- 25 Картофель [http: \WWW good vol zu \agro \technologij\ kartofel. Html](http://WWW good vol zu \agro \technologij\ kartofel. Html).
26. Совершенный огород. [http \WWW ipmoe.ku \vR\veg\ veg-timl](http://WWW ipmoe.ku \vR\veg\ veg-timl).
27. Начальный курс овощеводства по питтлайдеру. [http \ \ WWW good. Vol zu\agro\mittlider\ 3 html](http://WWW good. Vol zu\agro\mittlider\ 3 html).
28. Защита растений от вредителей. [http \WWW good.vol.ru\agro\vrediteli\nobagk 2 html](http://WWW good.vol.ru\agro\vrediteli\nobagk 2 html).

МУНДАРИЖА.

№	МАЪРУЗА МАТНЛАРИ	Соат
1.	Кириш. Мева ва узумчилик халқ-хужалигидаги аҳамияти	
1.1.	Фаннинг максоди ва вазифалари	
1.2.	Урта Осиё ва Ўзбекистонда мевачиликни қисқача ривожлантириш тарихи.	
1.3.	Ўзбекистон вилоятларида мевали усимликларни тарқалган зоналари	
1.4.	Мева ҳосилдорликларини қисқача тавсифномаси	
1.5.	Мевачиликнинг ривожлантиришда илмий-текшириш муассасаларининг роли	
2.	Мева дарахтларининг усиши ва маҳсулдорлиги	
2.1.	Мева кучатларини индивидуал ривожланиши	
2.2.	Мева кучатларини ривожланиш давлари	
2.3.	Мева дарахтларини усиш давлари	
2.4.	Мева дарахтларини антогенезлари	
2.5.	Меваларнинг маҳсулдорлиги	
3.	Мева ва резавор мева усимликларини қупайтириш,	
3.1	Мева ва резавор мева усимликларининг жинсий (уругдан) ва жинсسىз (вегетатив) йул билан	
3.2	қупайтириш Резавор меваларни вегетатив (жинсسىз) усулда	

3.3	купайтириш	
3.4	Кучатдарни типлари ва кисмлари Мева дарахтлари учун асосий пайвандтаглар	
4.-5	Мева боғи барпо қилиш	
4.1	Боғ барпо қилиш учун жой танлаш	
4.2	Боғ майдонини ташкил қилиш	
4.3.	Мева турларини ва навларини танлаш	
4.4.	Боғда мева дарахтларини жойлаштириш усули	
4.5	Боғ участкаларини режалаш	
6.7.	Боғларда тупрокни ишлаш системаси, боғларни суғориш ва уғитлаш	
6.1	Боғларда ерни ишлаш системаси	
6.2	Боғ қатор ораларидан фойдаланиш	
6.3	Қуплама экинлар (сидератлар)	
6.4	Бегона утларга қарши курашишида гербицидлардан фойдаланиш.	
6.5		
6.6	Боғларни уғитлаш. Боғларни суғориш	
8.9.	Мева дарахтларига шакл бериш, буташ	
8.1.	Шакл бериш ва буташни аҳамияти	
8.2	Шакл бериш технологияси	
8.3	Буташнинг технологияси	
8.4	Суст усувчи пайвандтагга уланган дарахтларни кесиш ва уларга шакл бериш	
8.5	Пальметта дарахтларига шакл бериш	
10	Резавор меваларнинг агротехник хусусиятлари	
10.1	Резавор мева ўуимликларини халқ хужалигидаги аҳамияти	
10.2	Қулупнайни асосий навлари ва экиш муддатлари	
10.3	Қулупнайга ишлов бериш	
10.4	Смородина агротехникаси	
10.5	Резавор мева ҳосилини териш	
11	Узумчилик халқ хужалигидаги аҳамияти. Токзорлар барпо қилиш. Ток кучатлари етиштириш технологияси	
11.1		
11.2	Узумчиликнинг халқ хужалигидаги аҳамияти	
	Токчиликнинг аҳволи ва уни ривожлантириш истиқболлари	
11.3		
11.4	Ток кучатларини купайтириш технологияси	
11.5	Токзор барпо қилиш	
	Токзорларни парвариш қилиш	
12	Ток усимлигининг биологияси	

12.1	Токнинг биологик хусусиятлари	
12.2	Токнинг тузилиши	
12.3	Илдиз ва илдиз системаси	
12.4	Пояси, вегетатив ва генератив органлари	
12.5	Ҳосил органларининг шаклланиши ва ривожланиш хусусиятлари	
13	Токни купайтириш ва парвариш қулиш	
13.1	Токни купайтириш йуллари	
13.2	Вегетатив купайтириш	
13.3	Апробация	
13.4	Селекия турлари	
13.5	Она токзорлар	
13.6	Қуламчалар тайёрлаш ва экишга ҳозирлаш	
13.7	Ток кучатларини ташкил қилиш	
14	Кириш. Сабзавот етиштириш технологияси	
14.1	Кириш	
14.2	Сабзавотчилик фани, аҳамияти,вазифасива	
14.3	хусусиятлари	
14.4	Ўзбекистонда сабзавотчиликни ривожланиш тарихи	
14.5	Сабзавотнинг ҳозирги аҳволи	
	Сабзавотчиликни ривожлантиришга оид илмий асослар	

15	Сабзавот усимликларини биологик асослари ва уларни парвариш қилиш	
15.1	Сабзавотусимликларини классификацияларга	
15.2	булиниши	
15.3	Ташки муҳит омилларига тасниф	
	Сабзавотларни иссиқлик,урутлик,намлик	
15.4	муносабатларига кура гуруҳлаш	
15.5	Тупрок-хаво озикасига муносабати	
	Сабзавотчиликда агротехник тадбирлар	
16	Ҳимояланган ер иншоотларининг хусусиятлари,турлари,тузилиши	
16.1	Ҳимояланган ер сабзавотчилигинини аҳамияти	
16.2	Ҳимояланган ер хусусиятлари ва тарихи,ҳозирги	
16.3	аҳволи	
16.4	Илтифатланган ерлар,парниклар,иссиқхонларнинг	
16.5	вазифаси	
	Химояланган ер турлари ва тузилиши	
	Замонавий иссиқхонларни барпо этишда	

	фойдаланиладиган қурилиш ускуналари ва жихозлари.	
17	Очиқ ер учун кучат етиштириш технологияси	
17.1	Кучат етиштириш усули.	
17.2	Кучат етиштириш аҳамияти.	
17.3	Кучат етиштириш услублари.	
17.4	Кучат етиштиришда микроклим шароити ва уни	
17.5	созлаш Кучатларни ҳимоялаш.	
18	Ҳимоя қилинган жойларда сабзавотларни етиштириш технологияси	
18.1	Сабзавотлар етиштиришнинг умумий усуллари.	
18.2	Қушқи ойнаванд иссиқхоналарда асосий сабзавот етиштириш.	
18.3	Бодиринг етиштириш технологияси.	
18.4	Помидор етиштириш технологияси.	
18.5	Сабзавотларнинг иситилмайдиган плёнкали иншоотларда етиштириш.	
19-20	Томатдош сабзавотлар, етиштириш технологияси	
19.1	Томатдош сабзавотларни аҳамияти ыва ишлатилиши.	
19.2	Келиб чиқиши ва тарқалиши.	
19.3	Биологик хусусиятлар.	
19.4	Етиштириш технологияси ёз, кузда помидор етиштириш.	
19.5	Зараркунанда ва касалликларга қарши кураш.	
19.6	Қулампишлар етиштирилиши. Баклажонлар етиштириш.	
21	Бодиринг ва сабзавот қовоқчалари агротехникаси	
21.1	Аҳамияти ва тарқалиши.	
21.2	Бодирингни ботаник таърифи.	
21.3	Қўуланилаётган навлар.	
21.4	Биологик хусусиятлари.	
21.5	Бодиринг ва сабзавот қовоқчалари агротехникаси.	
22	Карам усимликлари ва етиштириш	
22.1	Карам. Аҳамияти, ишлатилиши.	
22.2	Карам биологияси, навлари.	
22.3	Етиштириш агротехникаси.	
22.4	Карам кучати тайёрлаш.	
22.5	Гул карам ва кольраби.	

23	Илдиз мева сабзаётлар ва уларни етиштириш	
23.1	Аҳамияти ва ишлатилиши.	
23.2	Туманлашган навлар.	
23.4	Илдизмеваларнинг биологик хусусияти.	
23.4	Илдизмевалиларнинг парваришlash технологияси, ер танлаш, алмашлаб экишдаги урни, уғитлаш, экиш, парвариш қилиш.	
23.5	Ҳосилни йиғиш	
24	Пиёзли сабзаётлар парвариши	
24.1	Пиёзни аҳамияти, ишлатилиши	
24.2	Классификацияси, навлари, биологияси	
24.3	Агротехникаси, ер танлаш, алмашлаб экишдаги урни, уғитлаш, экиш, парвариш қилиш.	
24.4	Саримсоқ	
25	Полиз экинларининг халқ хужалигидаги аҳамияти ва уларни турлари, маконлари	
25.1	Полизчилик фанининг асослари ва вазифалари	
25.2	Полиз экинларининг халқ хужалигидаги аҳамияти	
25.3	Келиб чиқиши ва тарқалиши	
25.4	Полизчилик турлари	
25.5	Полизчиликнинг асосий маконлари	
26	Полиз экинларининг ботаник таърифи ва навлари, морфо-биологикхусусиятлари	
26.1	Қувоқгуллар оиласи вакиллариининг қисқача таснифи	
26.2	Сусумік авлоди таснифи	
26.3	Citriiuk авлоди таснифи	
26.4	Citriiuk авлоди таснифи	
26.5	Cururbita авлоди таснифи	
	Ўзбекистонда районлаштирилган полиз экинларининг навлари	
27	Сувли ва лалмикор ерларда полизчилик хусусиятлари, уруғчилиги, етиштириш технологияси	
27.1	Полиз экинларининг утмишдошларга муносабати	
27.2	Ерга асосий экин экишдан олдин ишлов бериш	
27.3	Полиз экинларини уғитлаш	
27.4	Уруғларни экишга тайёрлаш	
27.5	Экиш муддатлари уруғларни экиш чуқурлиги	
27.6	Ўуимликни озикланиш майдони ва экиш схемаси	
27.7	Ўуув даврида тупрокку ишлов бериш ва усимликни парваришlash	
27.8	Суғориш сони, суғориш оралиғи, меъёрлари	

27.9	Касаллик ва зараркунандаларга қарши кураш	
27.10	Лалмикор полизчилик хусусиятлари	
ЖАМИ:		