

Оценка клинической эффективности флогэнзима в профилактике послеоперационных осложнений на молочных железах

А.Б Тусупкалиев, Е.А. Бактыбаев

Западно-Казахстанская Государственная Медицинская Академия имени М. Оспанова. Город Актобе. Республика Казахстан.

Цель: оценить клиническую эффективность «Флогэнзима» для профилактики общих и местных осложнений после операций на молочных железах.

Материалы и методы: эффективность «Флогэнзима» оценивалась по результатам применения у 27 пациентов (основная группа), которым были выполнены хирургические вмешательства на молочных железах. Контрольную группу составили 29 пациентов.

Результат: для объективной сравнительной характеристики обе группы по возрастному составу, характеру основного и сопутствующих заболеваний и перенесенных операций были максимально идентичны. Как показали проведенные клинические наблюдения, препарат «Флогэнзим» оказывает благоприятное действие на течение послеоперационного периода: «Флогэнзим» больным назначали в виде драже (по 3 таблетки в день), которые пациенты принимали натощак, за 30 минут до приема пищи, запивая 200 мл жидкости. При плановых и отсроченных операциях препарат назначали за 2-3 суток до операции и продолжали в послеоперационном периоде, в течение 9-11 дней. Эффективность препарата нами оценивалась по анализу результатов нижеследующих показателей:

- динамика болевого синдрома;- выраженность отека в зоне хирургического вмешательства;
- частота местных и общих осложнений в послеоперационном периоде;
- сроки пребывания больных в стационаре.

У пациентов основной группы в послеоперационном периоде отек вокруг послеоперационной раны исчезал на 1-2 сутки, в то время как в контрольной только на 3-5 сутки. Количество местных и общих осложнений в послеоперационном периоде у пациентов основной группы было в 2,5 раза меньше чем в контрольной. Меньшее число местных и общих осложнений, повлияло на характер заживления послеоперационной раны, что также отразилось на пребывании больных в стационаре, так в основной группе продолжительность пребывания в стационаре составила 7-9 суток, в контрольной 9-12 суток.

Выводы: Как показали проведенные клинические наблюдения, препарат «Флогэнзим» оказывает благоприятное действие на течение послеоперационного периода. Его противовоспалительное, противоотечное, анальгетическое, иммунокорректирующее и другие действия подтверждаются и данными, полученными в нашей клинике.

Указанные свойства позволяют значительно уменьшить процент послеоперационных осложнений и сократить пребывание больных в стационаре, что оказывает существенное влияние на экономические показатели больных.