

ЎЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЎЫЛ ҲАМ СУЎ ХОЖАЛИҒИ
МИНИСТРЛИГИ
ТАШКЕНТ МӘМЛЕКЕТЛИК АГРАР УНИВЕРСИТЕТИ
НӨКИС ФИЛИАЛЫ
АГРОХИМИЯ ҲАМ ЖЕР КАДАСТРЫ КАФЕДРАСЫ

«Агрохимия ҳәм агротопырақтаныў» тәлим бағдары

Төгин қолланыў системасы пәнинен

КУРС ЖОЙБАРЫ

Тема Егислик майданы 90 га. Топырағы - отлақлы. Режелестирилген пахта зүрәәти 30 ц/га. Маллар саны: жылқылар -23 бас, қарамаллар - 27 бас, қой-ешкилер -148 бас. Байлап бағылатуғын күн 120.

Орынлаған студенттиң А.Ә.А. Хожаниязова Алия

Курс - IV

2014 - жыл, 05-ай, 17 - сәнеси

Кабыллаган

И. С.Наурызбаев

Кирисиў.

Төгинлер зүрәәтликти асырыўдың тийкарғы факторы. Дийханшылықты химияластырыў егинлер зүрәәтлигин асырыўдың тийкарғы қуралы. Аўыл хожалығында ислеп шығарыўды жеделестириў экономикалық жақтан ең нәтийжели усыл болып есапланады. 1996-жылдың 7-августында Өзбекистан республикасы Министрлер Кабинетиниң «Аўыл-хожалығында агрохимия хызметин көрсетиўди жетилистириў илажлары ҳаққында» ғы қарары хәм дийханшылықты химияластырыўды кушейтиўде тийкарғы қәдем болды.

Хәзирги күнде республикамызда 6 төгин заводы (Шыршық, Алмалық, Наўайы, Самарқанд, Ферғана, Қокан) хызмет көрсетпекте. Төгин ислеп шығарыў хәм пайдаланыўдың жылдан-жылға артып барыўы менен олардың нәтийжелилигин асырыў химия санааты хәм аўыл-хожалығының биринши орындағы ўазыйпасы болып қалды.

Курс жумысының мақсети-төгинлердиң қәсийетлери хәм топырақ пенен өз-ара тәсирин есапқа алған ҳалда өсимликлердиң азықланыўы ушын қолайлы шәраят жаратыў, жергиликли топырақ-климат шараятлары ушын төгин қолланыўдың нәтийжели муғдары, ўақты хәм усылларын белгилеўден ибарат.

Топырақ - климат шәраятлары.

Төгинлерди қолланыў системасын дүзгенде - хожалықтың топырақ-климат шәраятларын есапқа алыў керек, себеби қолланылған төгинлердиң нәтийжеси биринши гезекте усы шараятларға байланыслы.

Климаты

Қарақалпақстан республикасы аймақлық-климатлық жайласыўы бойынша, Орта Азияның орайлық шөл аймағында жайласқан. Республиканың климаты кескин қурғақ, жаздың қурғақ хәм ыссылығы июнь, июль хәм август айларына, қыстың суўық күнлери декабрь, январь, февраль айларында гүзетиледи. Температура көп муғдарда суткалық хәм жыллық тербенис пенен ажыралып турады. Хаўаның ыссы хәм жыллы дәўири 190-205 күнге шекем созылады. Пайдалы температура жыйындысы 2000-2300 °С ты курайды. Биринши суўық түсиўи 31-октябрьге, ақырғысы 31-мартқа туўры келеди. Жаўынның жыллық муғдары дельтаның арқа бөлегинде 100-110 мм болады. Бул процесс бәхәр хәм қыс мәўсимлеринде көбирек болады. Қардың жаўыўы турақлы емес, айырым жыллары жаўмай қалады. Ығаллықтың муғдары бойынша булл жер Өзбекистанның ең қурғақ аймағы есапланады.

Хаўа райы мағлыўматларының орташа муғдары
(Нөкис станциясының мағлыўматы 2006-2013-жыл).

Айлар	Орташа хаўа температурасы (°C)			Хаўаның салыстырма ығаллығы (%)	Парлануў, мм	Жаўын муғдары, мм	Ығаллық коэффициенти	Атмосфера ығаллығы балансы	Самалдың тезлиги, м/сек
	Орташа	Максимум	Минимум						
Январ	-6.9	16	-42	77	13	-7	4	-7	4.6
Феврал	-4.0	20	-29	64	30	9	4	-21	4.0
Март	-4.1	14	-20	20	73	14	17	-60	4.9
Апрел	14.1	16	-6	48	164	14	9	-100	4.0
Май	20.0	34	-0	20	270	10	4	-260	4.9
Июн	20.0	42	6	26	444	6	2	-427	4.0
Июл	27.1	44	9	40	440	0	1	-440	4.8
Август	24.7	44	4	29	410	1	0.4	-414	4.0
Сентябр	18.4	40	-1	28	249	2	1	-247	4.2
Октябр	10.4	28	-11	44	140	4	4	-141	4.4
Ноябр	2.1	20	-27	40	71	0	7	-66	4.7
Декабр	-4	18	-29	74	24	7	4	-16	4.6
Йиллик	11.0	44	-42	44	2016	82	61.4	-1944	4.7

Хаўаның орташа температурасы жазда (июль) арқада 26 °C, шығыста 28,2 ° C. Максималь температурасы 43–44 ° C ыссы. Минималь температурасы айырым жыллары - 32 ° C қа шекем төменлейди. Өсимликлердин вегетация дәўири (температурасы 5° дан жоқары) 219 – 230 күнге созылады. Қыс мәўсиминде шөл аймақларында хаўа массаларының трансформациясы салыстырмалы төмен. Айырым ўақытлары Арктикадан суўық хаўа ағымы кубладан таў менен тосылған тегисликлерге ҳеш қандай тосықсыз кирип келеди ҳәм хаўаның жәнede суўып кетиўине себепши болады. Сонлықтан бул жерде, әсиресе Қарақалпақстанда қыс жүдә суўық болады.

Топырағы

Аллювиал жатқызықлар раўажланған отлақлы-аллювиал топырақлар шөл аймағының ең жас топырақлары есапланады. Қумлы жатқызықларда раўажланған отлақлы топырақларда болса төмендеги эволюцион өзгериў жүз береді: отлақлы-шөл топырағы-шөл қумлы топырақ. Егерде усы топырақлар тарқалған жерлерде суўлардың ағыў тезлиги тәмийнленмеген болса, отлақлы топырақлар шорланған топырақларға айланыўы мүмкин. Проллювиал жатқызықлардан пайда болған отлақлы топырақлардың гидрогеологик шараятлары өзгермесе, олар бирлешми отлақлы топырақлар қатарына кирип, кейин суўғарылатуғын отлақлы-топырақларға айланады.

Отлақлы топырақтар жер асты суы тереңлігі 1-3 м болғанда пайда болады. Жер асты сулары топырақ қатламдарын тұрақты ығаллап, топырақтардың үстіңгі бөлегінде отлақлы топырақтарға тән өсімдіктердің рауажланыуына алып келеді.

Әмірдерьяның төменгі бөлімі және Қарақалпақстан республикасы аймағында аллювиал-отлақлы топырақтардың төмендегі топтары парықланады; 1) суғарылатын отлақлы топырақтар, 2) суғарылатын аллювиал-отлақлы топырақтар, 3) суғарылатын тақыр топырақтар, 4) суғарылатын отлақлы-тақыр топырақтар.

1-кесте

Хожалықта ескіден суғарылатын аллювиал-отлақлы топырақтардың агрохимиялық көрсеткіштері

Топырақ тың типі	Гумус	Жалпы мұғдары, % есабында			Харекетшен формалары, топырақта мг/кг есабында			Алмасыу шаң калий, топырақта мг/кг есабында	pH
		N	P	K	NH ₃	NO ₃	P ₂ O ₅		
Отлақлы күшсіз шорланған суғарылатын аллювиал- топырақ	0,465	0,072	1,212	3,10	4,43	1,33	26,67	422,2	6,4

Қарақалпақстанның шөл аймағы топырақтарында шорланыу процесстері табиий-антропоген шарттар таірінде рауажланып, өзіннің морфологик дүзілісі, дузлардың қуамы, дуз топланыу белгілері менен шорлар бир-биринен парықланады. Соның ушын усы аймақтың топырақтары характеристикасы бойынша төмендегі типлерге ажыратылады. 1) әпиуайы шорлар, 2) отлақлы шорлар, 3) батпақлы шорлар. Оннан тысқары шорланған топырақтар бир-биринен дузлардың химиялық қуамы мененде парықланады. Мәселен: ClSO₄, HCO₃, Cl және HCO₃, SO₄ ионларының салыстырма көрсеткіштерінің мұғдарына қарап (>1; 0.2-1; <0.2; < 1 және басқалар) хлоридлы, сульфатлы-хлоридлы, хлоридлы-сульфатлы, сульфатлы, содалы-хлоридлы және басқа топарларға бөлінеді. Сондай-ақ шорланыу дереклеріне қарап қалдық жанаслы (литоген), ескі гидроморфлы және биологиялық топарларға бөлінеді.

Органикалық төгінлерді топлау және олардан пайдаланыу.

Фермер хожалығында органикалық төгінлерді топлау, сақлау және оннан пайдаланыуды арнаулы шөлкемлестірілген және жыл дауамында істейтуын, механизацияласқан шаруа фермаларында әмелге асырылады.

Жергиликли төгінлерден дурыс хәм кең пайдаланыў – топырақтың өнімдарлығын тиклеў, дийханшылық мәдениятын асырыў хәм аўыл-хожалық егисликлериниң зүрәатлигин көтериўдеги тийкарғы факторлардан есапланады. Илим жетискенликлери хамде алдыңғы хожалықлар тәжирийбелери жергиликли төгінлерден әсиресе, қыйдан нәтийжели пайдаланғанда барлық егисликлерден жоқары зүрәат алып, алынған өнімниң сапасы жақсы болыўын көрсетеди.

Ярым шириген қыйдан пайдаланыў жақсы нәтийже береді. Жұқпалы кесел менен аўырған хайўанлардан алынған қыйды жағып жиберіў зәрүр. Қый топлаўды дурыс шөлкемлестириў хәм оның муғдарын 30-40% ке көбейтиў ушын хәр түрли шығындылардан малдың астына төсеме сыпатында пайдаланыў керек.

Хожалықтың жәми егислик майданы 90 га. Топырағы - отлақлы. Режелестирилген пахта зүрәәти 30 ц/га. Маллар саны: жылқылар -23 бас, қарамаллар - 27 бас, қой-ешкилер -148 бас. Байлап бағылатуғын күн 120.

2-кесте

Хожалықта қый топлаў режеси

№	Шарўа тури	Саны	1 сутка даўамында бир бас малдан алынатуғын төсеме муғдары, кг	Бағылыў дәўири, күн	Бағылыў дәўиринде алынатуғын жәми төсемениң муғдары, т	1 бас малдан алынатуғын қый		Жәми малдан бағыў дәўиринде алына туғын қый, т
						1 сутка да, кг	Бағылыў дәўиринде, кг	
1	Қарамал	27	6	120	19,44	30	97200	97,2
2	Жылқы	23	5	120	13,8	20	55200	55,2
3	Қой-ешки	148	1,5	120	26,64	2	35520	35,52

Мал байлап бағылатуғын дәўиринде топланатуғын жыллық қыйдың муғдары суткалық топланатуғын қыйды бир жылға яки байлап бағылатуғын күнлер санына көбейтип табылады. Есаплаўларда төсемениде есапқа алыў мүмкин, себеби қыйдың шығыўы (топланыўы) төсеме муғдарынада байланыслы болады.

Бир бас малға орташа бир суткалы төсеме нормасы төмендегише: қарамал яки жылқыларға 3-6 кг; бузаўларға 2-3 кг; ана шошқаларға хамде қойлар ушын 1-1,5 кг етип белгиленген.

Хәр түрли хайўанлардың хәр бир басына орташа бир сутка даўамында төмендеги муғдарда шығындылар шығады: қармалдан 20-30 кг, жылқылардан 15-20 кг, қойлардан 1,5-2 кг.

Хожалықта топланған қыйдың муғдары анық болғаннан кейин оны алмаслап егиў атызлары бойынша бөлистириў зарүр. Әдетте, ғаўаша

майданларына жоңышқа майданы бузып сүрилгеннен 4 - 5 жылдан кейин 20-30 т/га муғдарында қый бериледи (бөлистириледи).

Алмаслап егий хэм егислик майданларын бөлистириу

Фермер хожалығында енгизилген жәми алмаслап егий майданлары 90 га. Тийкарынан хожалықта жоңышқа-ғауаша-силос ушын мәкке егини-егиледи. Хожалықта 3:4:3 схемадағы он атызлы алмаслап егий системасы енгизилген.

Жыллар	Алмаслап егий атызлары									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
2014	Ж1	Мс3	Мс2	Мс1	П4	П3	П2	П1	Ж3	Ж2
2015	Ж2	Ж1	Мс3	Мс2	Мс1	П4	П3	П2	П1	Ж3
2016	Ж3	Ж2	Ж1	Мс3	Мс2	Мс1	П4	П3	П2	П1
2017	П1	Ж3	Ж2	Ж1	Мс3	Мс2	Мс1	П4	П3	П2
2018	П2	П1	Ж3	Ж2	Ж1	Мс3	Мс2	Мс1	П4	П3
2019	П3	П2	П1	Ж3	Ж2	Ж1	Мс3	Мс2	Мс1	П4
2020	П4	П3	П2	П1	Ж3	Ж2	Ж1	Мс3	Мс2	Мс1
2021	Мс1	П4	П3	П2	П1	Ж3	Ж2	Ж1	Мс3	Мс2
2022	Мс2	Мс1	П4	П3	П2	П1	Ж3	Ж2	Ж1	Мс3
2023	Мс3	Мс2	Мс1	П4	П3	П2	П1	Ж3	Ж2	Ж1

Ескертиу: Ж1, Ж2, Ж3-1-2-3-жыллық жоңышқа,

П1, П2, П3-П4-1-2-3-4- жыллық пахта (ғауаша),

Мс1, Мс2, Мс3 – 1-2-3 жыллық силос ушын егилген мәкке,

Бул алмаслап егийде егислик майданы 90 га. 3 жыллық жоңышқа улыўма майданның 30% (30 га) ин ийелеген. Алмаслап егийде ғауаша 40% (40 га), силос ушын егилген мәкке 30 % (30 га), 30 % (30 га) майданды ийелеген. Режелестирилген пахта зүрәатлиги 30 ц/га.

Бул алмаслап егийде 4 жыллық ғауашадан соң ҳәр бир гектарға 30 тонна есабынан хожалықта шарўа маллары есабынан топланған қый бериледи. Усы есаптан 3 жыллық жоңышқа егилген майданларға ҳеш қандай дәрис берилмейди. Қалған майданларға жоқарыдағы есапта қый бериледи. Сонда улыўма егислик 90 га майданның 30 га жоңышқа, қалған 60 га майданға 1800 тонна қый керек. Хожалықта жәми шарўа малларынан 187,92 мың тонна қый топланады, демек хожалықта егинлерден мол зүрәт жетистириу ушын хожалықтағы шарўа маллары есабынан топланатуғын қый менен толық тамийнленеди.

Режелестирилген ғауаша өними ушын жыллық төгин нормаларын есаплау усылы,

(азотлы, фосфорлы, калийли төгинлерди қоллау режесин дүзиу)

Азотлы төгинлерди қолланыу режеси

Режелестирилген зүрәт ушын зәрүр болған азотлы төгинлер нормасы баланс-есаплау усылы менен табылады. Алдын биологиялық норма есаплап шығылады, соң топырақ типине қарап (3-кесте) дүзетиу (қосымша киритиу) коэффициентлери арқалы хәм агротехникалық фон (алдыңғы егилген егисликлерге) қарап (4-кесте) есаплауларына дүзетиулер киргизиледи.

Баланс - есаплау формуласына қарап азот нормасын табыу:

$$A = \frac{(B - b) \cdot 5 \cdot 100}{40}$$

$$\text{яки } A = (B - b) \cdot 12,5$$

Бул жерде: А – азоттың биологиялық нормасы, кг/га;

В - ғауаша зүрәтлігі, ц/га;

в - топырақ зүрәтлігі хәм жерге алдын берілген төгинлер есабынан алынған пахта зүрәти (зүрәтлік 20-30; 30-40; 40-50 ц/га болғанда бул зүрәт жоқарыдағы тәртипке мууапық 5-10; 10-12,5; 12,5-15,0 ц/га ды қурайды).

Мәселен, бизиң мысалымызда ғауаша зүрәтлігі 30 ц/га болғанда топырақ өнімдарлығы есабынан алынған зүрәт ҳар гектарға 10 ц/га ға тең болады.

5 - 1 ц пахта өнимин алыу ушын сарпланатуғын азот, кг;

40 - ғауашаның төгинлердеги азоттан пайдаланыу коэффициенті,%;

100 - константа

3-кесте

Өзбекистан топырақлары типине қарай азотлы төгинлерди бөлистирип режелестириу хәм қолланыу бойынша дүзетиу коэффициентлери

Шөл зонасы топырақлары	
Қубла, арқа кеңликтеги зоналар	Коэффициенти
Тақырлы, отлақлы-тақырлы, Жууылған, күшсиз шорланған	1,2
Отлақлы, жууылған хәм күшсиз шорланған	1,0
Отлақлы, орташа хәм күшсиз шорланған, турақлы шоры жууылатуғын	1,2
Жуқа қатламлы, қумақлы, эрозияға ушыраған	1,4

4-кесте

Республикамыздың суўғарылатуғын аймақларында агротехникалық фонға қарап азотлы төгинлерди бөлистирип режелестириу хәм қолланыу бойынша дүзетиу коэффициентлери

Агрофон	Зүрәтлік, ц/га	Азот нормасы кг/га	Дүзетиу коэффициенти	Бөлистирилген азот нормасы, кг/га
Ғауашадан кейин	30	250	1,2	300

Фермер хожалығында ғауаша зүрәтлігі 30 ц/га болғанлығы ушын азоттың биологиялық нормасы $A = (30 - 10) \cdot 12,5 = 250$ кг/га ды қурайды. Сол себепли 5-кестеге бул көрсеткиш (250 кг/га) ти жазып қоямыз. Соң оны 3 хәм 4 - кестелердеги дүзетиу коэффициентлери жәрдемінде бөлистиремиз. Бизиң мысалымызда (5-кесте) хожалықтың топырағы аллювиал-отлақлы күшсиз шорланған, ғауашадан кейин сүрилген, жоңышқа сүрилгеннен кейин 4 жыл мүддет өткен, 26 ц/га зүрәт ушын азоттың биологиялық нормасы 250 кг/га.

Дүзетиу коэффициентин итибарға алған халда бундай топырақ ушын азоттың бөлистирилген нормасы $250 \cdot 1,2 = 300$ кг/га. Бөлистирилген азот нормасын анықлағанмыздан кейин 5 кестеге жазып қоямыз хәм бул муғдарды жерге салыу мүддетлерине қарап бөлистириуге өтемиз.

Әдетте азотлы төгинлер бөлип-бөлип: егийге шекем, егий уақтында хәм өсимликти тәрбиялау-өсий дәуиринде бериледи. Егийге шекем берилген төгинлердин нәтийжелиги жүдә өзгерип турады хәм климат, топырақ, хожалықтың агротехникалық шәраятларына байланысly.

Шорланбаған хәм изейи қашырылмаған топырақларда, сондай-ақ типик боз топырақларда жыллық жауын муғдары 230-250 мм ди қурайтуғын регионларда жыллық азот нормасының 25% ин аммоний сульфат формасында егис алдынан берий мүмкин.

Басқа топырақ типлеринде жыллық азот нормасының 25-30% ин егис алдынан берген макул.

Шорланған, гүзги сүримнен кейин шор жууыу өткерилетуғын болса азот жерди чизеллеу уақтында бериледи. Илимий изертлеу шөлкемлері мағлыұматлары хәм хожалықлардағы алдыңғы тәжирийбелер нәтийжелері азотты егис уақтында берий нәтийжели екенлигин көрсетеди. Егис уақтында азот нормасы 20-25 кг/га нан артық болмауы зәрүр.

Азықландырыу саны жыллық азот нормасы хәм топырақ шәраятларына байланысly. Әдетте төмендеги мүддетлерде 2-3 мәрте азықландырыу өткериледи: 2-4 ҳақыйқый жапырақ шығарыу фазасында; ғумшалау; гүллеу, ғөреклеу фазаларында. Хәр бир азықландырыуда азот нормасы ғауашаның биологиялық мүтәжликлерине қарап бөлистириледи.

Жыллық азот нормасына қарап биринши азықландырыуда 50 ден 75 кг/га ға шекем, екынши хәм үшінши азықландырыуда 50 ден 100 кг/га ға шекем азот берилиуи мүмкин.

Ғауашаны азықландырыуды тамамлау мүддети тийкарғы әхмийетке ийе. Оны жүдә ерте тамамлау өсимликтин зүрәт топлау дәуиринде азот пенен азықланыуын шеклеп қояды, ғауашаны азықландырыуды жуумақлаудың оптимал мүддетлері арқа зоналар ушын 10-15 июль, орта зоналарда 15-20 июль, кубла зоналарда 20-25 июль есапланады. Қатламы жуқа топырақларда өсимликтин жағдайына қарап азықландырыуды 1 августқа шекем өткерий мүмкин. Биз үйренген хожалықта 240 кг/га азоттың белгиленген нормасы берий мүддетлерине қарап төмендегише бөлистириледи: егийден алдын 30 %, егис пенен бирге 50%, I, II хәм III азықландырыуда 20%.

Азотлы төгинлерди қолланыў режеси

Атыз №	Топырақ тың түрі	Майданы, га	Алмаслап егиу атызлары	Режелестірілген зүрәт, ц/га	Жыллық азот нормасы кг/га			Азотты қолланыу мүддетлеріне қарап бөлістіріу			Жәми төгінлерге (NH4 N03) мутәжлик, т
					Биологиялық	Бөлістірілген нормасы 300 кг/га		Қосымша азықландырыу			
						Егис алдынан 30 %	Егис пенен бірге 50 %	I	II	III	
								20%			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Аллювиал-отлақлы	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2		9	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3		9	3	-	-	-	-	-	-	-	-
4		9	4	30	250	810 кг	1350	180	180	180	2700
5		9	5	30	250	810 кг	1350	180	180	180	2700
6		9	6	30	250	810 кг	1350	180	180	180	2700
7		9	7	30	250	810 кг	1350	180	180	180	2700
8		9	8	-	-	-	-	-	-	-	-
9		9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
10		9	10	-	-	-	-	-	-	-	-

Фосфорлы төгинлерди қолланыў режеси

Фосфорлы төгинлердиң нәтийжелиги топырақтағы хәрекетшенң фосфор муғдарына байланыслы, сол себепли бул төгинлер нормасы хәм оларды бериў мүддетлери агрохимиялық картограммалар тийкарында анықланады.

Хожалықтың топырақтағы хәрекетшенң фосфор муғдары бойынша мағлыўматлар хожалықтың агрохимиялық картограммасынан алынды хәм фосфордың жыллық нормасы анықланды. Фосфордың биологиялық нормасы ғаўаша зүрәтлиги мағлыўматлары хәм ғаўаша өними менен шығып кететуғын фосфор муғдары тийкарында анықланады, 1 ц пахта ушын 1,5 кг фосфор сарпланады деп қабыл етилген.

Кейин фосфордың усы нормасы дүзетиў коэффициентлер арқалы топырақтағы хәрекетшенң фосфор муғдарына қарап хәм хожалықтағы фосфорлы төгинлер запасын есапқа алған ҳалда бөлистириледі. Жоқарыда келтирилген мысалда топырақтағы фосфатлар муғдары 15 мг/кг, хожалық фосфорлы төгинлер менен жетерли тамийнленген (биринши усул бойынша). Бундай шәраятларда фосфордың бөлистирилген нормасы төмендегише табылады. Фосфордың биологиялық нормасы дүзетиў коэффициентине көбейтиледі. (6- кестеден алынады), мысалы 0-10 см қатламда 80 мг/кг. $80 \cdot 5 = 400$ кг/га.

Фосфордың бөлистирилген нормасын анықлап, 8-кестеге жазып, төгинди бериў мүддетлери бойынша бөлистириледі. Фосфорлы төгинлерди бериў мүддетлерине қарай бөлистириў топырақтағы хәрекетшенң фосфор муғдарына қарап орынланады. Мәселен, топырақта хәрекетшенң фосфор муғдары - 0 ден 15 мг/ га шекем, төгинлер үш мүддетте бериледи; шүдигарлаўдан алдын; егис пенен бирге хәм гүллеў дәўиринде азықландырыў.

Топырақта 16-30 мг/кг хәрекетшенң фосфор болғанда төгин сүримнен алдын хәм егис пенен бирге бериледи. Хәрекетшенң фосфор муғдары 31 мг/кг нан артық болған топырақларда төгин тек бир мәрте сүримнен алдын бериледи.

Бизиң хожалық мысалында улыўма майдан 90 га, соннан пахта майданы 40 га. 1 га дан 1 ц/га пахта өними ушын суперфосфат төгини 1,5 кг сарп етиледі. Усы есапта улыўма пахта майданы (40 га) ушын 1 центнер өнимге 1,5 кг фосфор керек болса режелестирилген 30 ц/га пахта өними ушын 40 га пахта майданына 2т 700 (2700) кг фосфор төгини керек болады.

Калийли төгинлерди қолланыуы режеси.

Ғауаша калийди азот пенен бирге өзлестиреди. Калийли төгинлер қолланбастан ғауаша менен басқа егисликлерди жетистириу топырақтағы калий запасын (муғдарын) жүдә кемейип кетиуине алып келеди. Сол себепли аўыл хожалығында калийли төгинлерден пайдаланыу жүдә әхмийетли.

Хожалықта жыллық калий нормасы режелестирилген ғауаша зүрәатлиги, зүрәат пенен шығып кететуғын калий муғдары хәм топырақтағы алмасыушаң калий муғдары (агрохимиялық картограмма мағлыұматлары тийкарында) нәзерде тутылған халда белгиленеди. Мәселен, алмасыушаң калий муғдары 0 ден 200 мг/кг болған шәраятларда калийли төгинлер өсимликлер өзлестиретуғын муғдарына сәйкес келетуғын норма бойынша қолланылады (биологиялық норма). Бунда 1 центнер пахта ушын калий 5 кг деп белгиленеди.

6-кесте

Фосфордың бөлистирилген нормаларын белгилеу

Зүрәатлик, ц/га	Топырақтың фосфорлар менен тәмийнленген лик дәрежеси	Топырақтағы хәрекетшен фосфор муғдары, мг/кг	Фосфордың биологиялық нормасы, кг/га	Жыллық норма ушын дүзетиу коэффи- циенти	Фосфордың бөлистирилген нормалары, кг/га
Биринши усыл. (Хожалық фосфорлы төгинлер менен жетерли тамийнленген)					
30	жүдә төмен	0-15	45	5	225
30	төмен	16-30	45	4	180
30	орташа	31-45	45	3	135
30	жетерли	46-60	45	2	90
30	жоқары тәмийнленген	61 хәм оннан жоқары	45	1	45
Екинши усыл					
30	Жүдә төмен	0-15	45	4	180
30	Төмен	16-30	45	3	135
30	Орташа	31-45	45	2	90
30	Жетерли	46 хәм оннан жоқары	45	1	45

7-кесте

Фосфор нормасын төгин бериу мүддетлерине қарай бөлистириу

Топырақтағы хәрекетшен фосфор муғдары, мг/кг	Зүрәат лик, ц/га	Бөлистирилген фосфор нормасы, кг/га	Фосфорды қолланыу мүддетлери		
			Сүримнен алдын	Егис пенен бирге	Өсимликтің гүллеуинен алдын
15 ке шекем	30	225	140	45	40
16-30	30	180	135	45	-
31-45	30	135	135	-	-
45-60	30	90	90	-	-
61 хәм оннан жоқары	30	45	45	-	-

8-кесте

Фосфорлы төгинлерди қолланыў режеси

Атыз №	Топырақтың атама-сы	Алмаслап егиў атызлары	Егислик майдан, га	Хәрекет шең фосфор муғдары, мг/кг	Режелес тирилген зүрәт, ц/га	Жәми зүрәт, т/га	Жыллык фосфор нормаси, кг/га	
							Био-логиялық	Бөлис тирилген
1	2	3	4	5	6		7	8
1	Аллювиал-отлақлы-шорланған	1	-	-	-	-	-	-
2		2	-	-	-	-	-	-
3		3	-	-	-			
4		4	9	80	30	2,7	45	13,5
5		5	9	70	30	2,7	45	13,5
6		6	9	80	30	2,7	45	13,5
7		7	9	60	30	2,7	45	13,5
8		8	-	-	-	-	-	-
9		9	-	-	-	-	-	-
10		10	-	-	-	-	-	-

8-кестениң даўамы

Атыз №	Төгин бериў мүддетлери			Минерал төгинлерге болған мүтәжлик: кг/га, - жәми майданға тоннада Са (H ₂ PO ₄) ₂ (20 % P ₂ O ₅)			
	Сүримнен алдын 50%	Егис пенен бирге 30%	Ғаўаша гүлле Генде 20%	Сүримнен алдын	Егис пенен бирге	Ғаўаша гүлле генде	Са (H ₂ PO ₄) ₂ қа болған улыўма мүтәжлик
9	10	11	12	13	14	15	16
4	6,75кг/га	4,05 кг/га	2,7 кг/га	6,75кг/га	4,05 кг/га	2,7 кг/га	13,5 кг
5	6,75кг/га	4,05 кг/га	2,7 кг/га	6,75кг/га	4,05 кг/га	2,7 кг/га	13,5 кг
6	6,75кг/га	4,05 кг/га	2,7 кг/га	6,75кг/га	4,05 кг/га	2,7 кг/га	13,5 кг
7	6,75кг/га	4,05 кг/га	2,7 кг/га	6,75кг/га	4,05 кг/га	2,7 кг/га	13,5 кг

Калийли төгинлерди қолланыў режеси.

9-кесте

Атыз №	Топырақтың атамасы	Алмаслап егиў атызлары	Егислик майдан, га	Жыллык қыйдың нормасы, т/га (30 т/га)	Топырақтағы алмасыў-шаң калий муғдары, мг/кг	Режелес-тирилген зүрәт-лик, ц/га	Жыл-лык калий-дин нормасы, кг/га, мг/кг
17	18	19	20	21	22	23	24
1	Аллювиал-отлақлы-шорланған	1	-	-	-	-	-
2		2	-	-	-	-	-
3		3	-	-	-	-	-
4		4	9	270	188,0	30	270
5		5	9	270	83,6	30	270
6		6	9	270	176,2	30	270
7		7	9	270	83,7	30	270
8		8	-	-		-	-
9		9					
10		10					

Егер топырақта алмасыўшаң калий муғдары 200 - 400 мг/кг болса, 1 центнер пахта ушын биологиялық норма 205 кг деп қабыл етиледі. Топырақтағы алмасыўшаң калий 400 мг/кг нан артық болса калий төгинлери қолланылмайди.

Келтирилген мысалда (9-кесте) ғаўаша зүрәәтлиги 26 ц/га. Топырақтағы калий муғдары 188,0 мг/кг. Калийдиң биологиялық нормаси $26 \times 5 = 130$ кг/га ды қурайды. Биз жыллық калий нормасын 9-кестеге жазамыз.

Калийли төгинлер төмендегише бөлистириледі. Жыллық калий нормасы 50-75 кг/га болғанында калийли төгинлер ғумшалаў дәўиринде азот пенен бирге, норма 75 кг/га дан артық болғанда еки мүддетлерде ярымы жерди сүриўден алдын, ярымы ғумшалаў дәўиринде бериледи.